

ДЕРЖАВНА ВЕТЕРИНАРНА ТА ФІТОСАНІТАРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
STATE VETERINARY AND PHYTOSANITARY SERVICE OF UKRAINE
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН
UKRAINIAN INSTITUTE FOR PLANT VARIETY EXAMINATION

ОХОРОНА ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН

PLANT VARIETY RIGHTS PROTECTION

Офіційне видання
OFFICIAL PUBLICATION

Бюлетень
BULLETIN

1

2014

частина 1

ОХОРОНА ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН

PLANT VARIETY RIGHTS PROTECTION

<i>Бюлетень</i> Свідоцтво КВ № 20112-9912 ПР від 01.07.2013	<i>Видається</i> щоквартально	<i>Заснований</i> 24 січня 2003 р.	<i>Випуск 1 ч. 1,</i> 2014

СПІВЗАСНОВНИКИ –


ДЕРЖАВНА ВЕТЕРИНАРНА ТА ФІТОСАНІТАРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН



Державна ветеринарна
та фітосанітарна служба
України

STATE VETERINARY AND PHYTOSANITARY
SERVICE OF UKRAINE

Український інститут
експертизи сортів рослин
UKRAINIAN INSTITUTE FOR
PLANT VARIETY EXAMINATION



ЧАСТИНА 1

Головний редактор
О.А. Демидов

Editor-in-chief
O. Demydov

Редакційна колегія
В.Є. Симонов
П.М. Василюк
(заступники головного редактора)
Н.П. Костенко
(відповідальний секретар)

Editorial board
V. Symonov
P. Vasyliuk
(deputy editor-in-chief)
N. Kostenko
(executive secretary)

С.В. Васьківська
С.М. Гринів
М.І. Загинайло
З.Б. Києнко
М.М. Краснопольський
Н.В. Лещук
Н.Г. Ніколенко
В.І. Приходько
В.О. Романченко
Т.Д. Сонець
В.І. Сорока
Н.Б. Якубенко

S. Vaskivska
S. Gryniv
M. Zagynailo
Z. Kyienko
M. Krasnopolskyi
N. Leschuk
N. Nikolenko
V. Prykhodko
V. Romanchenko
T. Sonets
V. Soroka
N. Yakubenko

УДК 347.77:633(055)

ББК 67.404.1

0-92

0-92 Охорона прав на сорти рослин: Бюлетень / Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України, Український інститут експертизи сортів рослин. – 2014. – Вип. 1 ч. 1. – 744 с.

Бюлетень видається на виконання Закону України “Про охорону прав на сорти рослин” з метою організації офіційної інформаційної діяльності у сфері охорони прав на сорти рослин та реалізації міжнародних зобов’язань України, що випливають з її членства в Міжнародному союзі з охорони нових сортів рослин (UPOV).

Поширюється для селекціонерів, власників майнових прав інтелектуальної власності на поширення сортів, володільців патенту, виробників насіння і садивного матеріалу, селекційно-насінницьких фірм, науково-дослідних інститутів, вузів, технікумів. Представляє також інтерес для господарств різної форми власності, городників і садівників.

УДК 347.77:633(055)

ББК 67.404.1

Адреси видавців колегії:

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, Україна,

тел.: +38 044 279-12-70, факс: +38 044 279-48-83

веб-сайт: <http://vet.gov.ua>;

Український інститут експертизи сортів рослин,

вул. Генерала Родімцева, 15, м. Київ-41, 03041, Україна,

тел.: +38 044 257-99-33, факс: +38 044 257-99-63

e-mail: sops@sops.gov.ua,

веб-сайт: <http://sops.gov.ua>

ЗМІСТ

ВІДОМОСТІ, ВНЕСЕНІ ДО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ЗАЯВОК НА СОРТИ РОСЛИН.....	9
Заявки на сорти рослин, по яких завершена формальна експертиза.....	9
Відомості щодо заявок на сорти рослин, за якими прийнято рішення про відмову у державній реєстрації прав на сорт.....	19
Відкликані заявки або такі, що вважаються відкликаними.....	21
 ВІДОМОСТІ ЩОДО ЗМІНИ НАЗВИ СОРТУ РОСЛИН.....	 28
 ВІДОМОСТІ, ВНЕСЕНІ ДО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА СОРТИ РОСЛИН (РЕЄСТР ПАТЕНТІВ).....	 37
Відомості про сорти рослин, щодо яких прийнято рішення про державну реєстрацію прав на сорт та внесених до Державного реєстру прав інтелектуальної власності на сорти рослин.....	37
Відомості про видані патенти на сорти рослин та їх завіреної копії.....	39
Відомості щодо припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин та визнання їх не чинними.....	42
Інші відомості, внесені до Державного реєстру прав інтелектуальної власності на сорти рослин.....	43
 ВІДОМОСТІ, ВНЕСЕНІ ДО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ СОРТІВ РОСЛИН, ПРИДАТНИХ ДЛЯ ПОШИРЕННЯ В УКРАЇНІ (РЕЄСТР СОРТІВ).....	 46
Відомості про сорти рослин, щодо яких прийнято рішення про державну реєстрацію прав на сорт та внесених до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні.....	46
Відомості щодо виданих свідоцтв про авторство на сорт рослин.....	61
Відомості щодо припинення чинності майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослин.....	62
Відомості щодо відновлення чинності майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослин.....	97
Інші відомості, внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні.....	100

ОФІЦІЙНІ ОПИСИ ТА ПОКАЗНИКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ПРИДАТНОСТІ.....	105	105
Буряк кормовий	105	ЕС Кубус..... 171
Жамон.....	105	ЕС Рейнджер..... 173
Стармон.....	106	ЕС Сафарі..... 175
Буряк цукровий	107	Камаріллас..... 177
БАСІЛУС.....	107	Корифей..... 179
ВАВІЛОВ.....	108	КСМ 3509..... 181
Іпель.....	109	КСМ 6509..... 183
НІ 0835.....	110	КСМ 7117..... 185
СИ Бадіа.....	111	КСМ 7119..... 187
Тіза.....	112	КСМ 7713..... 189
ЯРОСЛАВ.....	113	ЛГ30288..... 191
ЯШИН.....	114	ЛГ30290..... 193
Горох посівний	115	ЛГ30310..... 195
Меценат.....	115	ЛГ30360..... 197
Саламанка.....	117	МАС 23К..... 199
Слован.....	119	МАС 25Т..... 201
Горошок посівний (ярий)	121	МАС 26Б..... 203
Надія Поділля.....	121	МАС 41Б..... 205
Озіряна.....	122	МАС 53Б..... 207
Гречка їстівна	123	НС 2032..... 209
Софія.....	123	НС 2610..... 211
Картопля	124	НС 2612..... 213
Арія.....	124	НС 2622..... 215
Білявка.....	126	Окато..... 217
Лабелла.....	128	Пріоріти..... 219
Лаперла.....	130	СИ Аладіум..... 221
Летана.....	132	СИ Батанга..... 223
Наташа.....	134	СИ Дельван..... 225
Случ.....	136	СИ Нікель..... 227
Чарунка.....	138	СИ Новатоп..... 229
Конюшина лучна (червона)	140	СИ Ондіна..... 231
Тайфун.....	140	СИ Унітоп..... 233
Кукурудза звичайна	141	Сільвініо..... 235
Адевей.....	141	СЛ Багато..... 237
Брессі КС.....	143	Сумбра..... 239
Десперадо.....	145	Сурреал..... 241
ДКС3014.....	147	Тессалі..... 243
ДКС3409.....	149	Люпин вузьколистий 245
ДКС3507.....	151	Грозинський 9..... 245
ДКС3717.....	153	Пшениця м'яка (яра)
ДКС3912.....	155	Улюблена..... 246
ДКС4014.....	157	Ріпак (ярий)
ДКС4408.....	159	Ахат..... 248
ДКС4515.....	161	Лунеді..... 249
ДКС4608.....	163	Макро..... 250
ДС0306.....	165	Хіола 433..... 251
ДС0336.....	167	Хіола 571 КЛ..... 252
ЕС Зізу.....	169	Хіола 61..... 253

Соняшник однорічний	254	Соя культурна	348
8X570KL.....	254	Алігатор.....	348
Аміго.....	256	Брюненсіс.....	349
Батяня.....	258	Галлек.....	349
Босфора.....	260	Кардифф.....	350
Венеція.....	262	Кент.....	352
ЕС Артїк.....	264	Опалін.....	353
ЕС Балістік СЛ.....	266	Опус.....	354
ЕС Бесана.....	268	Сігалія.....	355
ЕС Ванілла.....	270	Сінара.....	356
ЕС Дома.....	272	Султана.....	357
Естрада.....	274	Тритикале (яре)	358
Златсон.....	276	Лебідь харківський.....	359
Крессідія.....	278	Ячмінь звичайний (ярий)	360
КС 104.....	280	Аграрій.....	360
КС105.....	282	Алегро.....	362
КСФ 10113.....	284	Барвистий.....	364
КСФ 10116.....	286	Натасія.....	366
КСФ 11902.....	288	Верба прутovidна	368
ЛГ5400ХО.....	290	Вільгельм.....	368
МАС 82А.....	292	Виноград справжній	369
МАС 87ІР.....	294	Мальбек.....	369
Мілан.....	296	Каберне Фран.....	371
Наполі.....	298	Гренаш чорний.....	373
НК Ададжіо.....	300	Анчеллотта червона.....	375
НС ФЕЛІКС.....	302	Совіньон блан.....	377
НС Х 187.....	304	Груша звичайна	379
НС Х 195.....	306	Новосадівська.....	379
НС Х 6341.....	308	Житняк гребінчастий	381
НС Х 6343.....	310	Яструбинівський.....	381
НС Х 6593.....	312	Капуста броколі	382
Пактера.....	314	Нексос.....	382
Равенна.....	316	Капуста брюссельська	383
Санай МР.....	318	Ірен.....	383
Санбро МР.....	320	Капуста кольрабі	384
СИ Еденіс.....	322	Колібрі.....	384
СИ Сабтіл.....	324	Коріст.....	385
Торо.....	326	Капуста пекінська	386
Трансол.....	328	Вілі F1.....	386
Флоренція.....	330	Саммер Хайленд F1.....	387
Хайсан 204.....	332	Лядвенець рогатий	388
Хайсан 231 КЛ ВО.....	334	Терцій.....	388
Хімалія КЛ.....	336	Гелон.....	389
Сорго звичайне			
(двокольорове)	338	Мітлиця тонка	390
Арміда.....	338	Юнона.....	390
ЕС Арматан.....	340	Перець однорічний (солодкий) ...	391
КСС19.....	342	Арістотель ХЗР F1.....	391
КСС29.....	344	Притавіт F1.....	393
МР Екліпс.....	346	Флексеум 1.....	395

Джипсі F1.....	397	Місора.....	470
Етеле.....	399	Овієдо F1.....	471
Турбін.....	401	Старгейт F1.....	472
Лотта.....	403	Фрідом F1.....	473
Ведрана.....	405	Капуста червоноголова	474
Яніка.....	407	Клімаро F1.....	474
Катан.....	409	Ранчеро F1.....	476
Троянда	411	Квасоля звичайна (зернова)	478
Шісеколд.....	411	Галактика.....	478
Цибуля порей	413	Квасоля звичайна (овочева)	480
Джампер.....	413	Палаті.....	480
Лілійник	414	Кукурудза цукрова	482
Стожари.....	414	ГСС 1477 F1.....	482
Суріпиця звичайна (озима)	415	МС 12.....	483
Раміра.....	415	МС 401.....	484
Баклажан	416	Світстар F1.....	485
Ітака F1.....	416	Соло F1.....	486
Диня звичайна	417	Старшайн F1.....	487
Оксана.....	417	Шайнрок F1.....	488
Фантазія.....	419	Морква	489
Кабачок	421	Карболі.....	489
Ам'яд F1.....	421	Карведжо.....	490
Голд Раш F1.....	423	Кардіф F1.....	491
Кавун звичайний	425	Кордоба F1.....	492
Колізей F1.....	425	Люсія F1.....	493
Меланія F1.....	427	Ньюкасл F1.....	494
Соренто F1.....	429	Санта Круз F1.....	495
Фенвей F1.....	431	Огірок посівний	496
Капуста білоголова	433	Дерія.....	496
Артікус.....	433	ЕПСІЛОН.....	498
Байонет F1.....	435	Магдалена F1.....	500
Браксан F1.....	437	Седрік.....	502
Василина.....	439	Сігурд.....	504
Веронор F1.....	441	Тумі.....	506
Джетодор F1.....	443	Помідор їстівний	508
Джубілі F1.....	445	Афамія.....	508
Зеніт F1.....	447	Велоз F1.....	510
Карафлекс F1.....	449	Дімероза.....	512
Кебтон.....	451	Дочет F1.....	514
Орієнта F1.....	453	Кібо.....	516
PX 05843338 F1.....	455	Кітару.....	518
Сінтекс.....	456	Мерліс.....	520
Хіпо.....	458	Миролубівський.....	522
Циклон F1.....	460	Мішель F1.....	524
Чекмейт.....	462	Монті F1.....	526
Капуста цвітна	464	Пандароза.....	528
Аероспейс F1.....	464	Пінк Буш F1.....	530
Альдрін F1.....	465	ПС 02431185 F1.....	532
Балбоа F1.....	466	Пулрекс F1.....	534
Ванза.....	467	Розаліса F1.....	536
Вероніка F1.....	468	Сафаікс F1.....	538
Кердос F1.....	469	Старбак.....	540

Таня F1.....	542	K10.....	592
Фізума.....	544	K248.....	593
Форонті.....	546	KB5Г0874.....	594
Хердон F1.....	548	KB7X022.....	595
Редька посівна (редиска).....	550	KB7X1013.....	596
Глоріет.....	550	KB9Ф604.....	597
Ролекс F1.....	551	KB9X1018.....	598
Цибуля городня.....	552	KB9X1024.....	599
Айсперл F1.....	552	KBCEK 009.....	600
Вайт Вінг F1.....	553	KBCEK 011.....	601
Катінка F1.....	554	KBCEK 015.....	602
Ред Рум F1.....	555	KBCEK 507.....	603
Стур BC 20.....	556	KBCEK 509.....	604
Хієло.....	557	KBCEK 510.....	605
Центуріон F1.....	558	KBCEK 511.....	606
Шерман F1.....	559	ЛВХ369.....	607
Жито озиме - батьківський компонент.....	560	ЛДР1687.....	608
961358Б.....	560	ЛЖБ2661.....	609
120337Б.....	561	ЛІМABO2 ЛІМАВВ26.....	610
Діхар.....	562	ЛІМЖАА845.....	611
Кукурудза звичайна - батьківський компонент.....	563	ЛІМЖІЛ37.....	612
1032 НС.....	563	ЛІМЖМЛ26.....	613
11С0201.....	564	ЛІМІЛ5420.....	614
11С0201 ССР2151.....	565	ЛІМПВ821.....	615
123098 НС.....	566	ЛІМПЛН13.....	616
155Р680.....	567	ЛІМФВЕ32 ЛІМІВТ44.....	617
191 НС.....	568	ЛІМФДД514.....	618
200023 НС.....	569	ЛІМФМЖ841.....	619
200024 НС.....	570	ЛУХ431.....	620
230174 НС.....	571	ЛФН1961.....	621
230177 НС.....	572	ЛФР1941 ЛФР1944.....	622
240311 НС.....	573	МЕФ4505.....	623
266ФА069.....	574	МЕФ5298.....	624
284К817.....	575	Наташа М.....	625
291Г752.....	576	НП1739 ЛАН1503.....	626
316342 НС.....	577	НП1914 С.....	627
323289 НС.....	578	НП1927НП1928.....	628
4641 НС.....	579	НП2171 С.....	629
465Ц653.....	580	НП2319 С.....	630
493Е747.....	581	НПАФ3441.....	631
71 НС.....	582	НПВР0715НП1941.....	632
731 НС.....	583	НПД2530НПД2534.....	633
87НН1.....	584	НПД2598НПД2530.....	634
А00363.....	585	НПД2819.....	635
В61093.....	586	НПД4820.....	636
ВР0773.....	587	НПХ1759НПХ0643.....	637
Дж3134з.....	588	НПНЮ1809.....	638
Дж9960з.....	589	НСЛ4011.....	639
ЕГ2123.....	590	НСЛ506ВХС.....	640
ЕС3504.....	591	ПХ13ЙЦ.....	641

ПХ13ЦП.....	642	IP134PPO.....	682
ПХ13ЦХ.....	643	Л13Б.....	683
ПХ3ПР.....	644	ЛВО 71В.....	684
ПХВВБ.....	645	ЛГ71234А.....	685
ПХВВХ.....	646	Мх 524 Б.....	686
ПХВНЙ.....	647	НС КОД 4.....	687
ПХЙББ.....	648	Р890ЖП.....	688
ПХРЦЕ.....	649	РХА ОРО 7.....	689
ПХХ2В.....	650	РХА ПЕС 26Рф.....	690
ПХХЕН.....	651	СА436Р.....	691
ПХХРЙ.....	652	СР98МЖ.....	692
СМС2156.....	653	СУ Рф 49.....	693
ССР1743.....	654	СФ9074 МА.....	694
ССР1745.....	655	Сх IP10 А.....	695
Т41863.....	656	Т75.....	696
ХА 402 МВ.....	657	Т82.....	697
ХА 408 МВ.....	658	ТРО2503.....	698
ХА 418 М.....	659	ТРО2662.....	699
Харківська 152 М.....	660	ТРХ3170.....	700
Харківська 215 М.....	661	ТФО2444.....	701
Харківська 404 МВ.....	662	ТФО2880.....	702
Харківський 27 М.....	663	ТФХ3175.....	703
НПЦ ЗР 3709.....	664	УК58.....	704
13К25.....	665	УН 1100 ХА.....	705
20М60.....	666	УН 1220 ХА.....	706
37032ІМ.....	667	УН 1234 ХА.....	707
63Г13.....	668	УН 3502 ХА.....	708
72В13.....	669	Ф4АЕ1МА.....	709
А899.....	670	ФС73100.....	710
АД4027013.....	671	ФС73700.....	711
Б РО 013А.....	672	ФС73900.....	712
Б РО 0155А.....	673	ФС74400.....	713
Б РО 017А.....	674	Х 1007 Б.....	714
Б РО 03А.....	675	Х 1010 Б.....	715
Б РО 04А.....	676	Х 2111 Б.....	716
БГ Н 1.....	677	Х 2122 Б.....	717
БГ Н 2.....	678	Х 503 Б.....	718
ЗЛ 0089В.....	679	Х 808 Б.....	719
ЗЛ 260В.....	680	Х 809 Б.....	720
ИМИ АБ 18.....	681	ХАФЛ 54.....	721

ВІДОМОСТІ ПРО ЗМІНУ НАЗВИ І / АБО АДРЕСИ ЮРИДИЧНОЇ ЧИ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ.....	722

СКОРОЧЕНІ НАЗВИ, СКОРОЧЕННЯ ТЕРМІНІВ, ЯКІ ВЖИТІ В БЮЛЕТЕНІ.....	724

Перелік заявників, підтримувачів сортів, власників прав на сорти рослин.....	724
Інші скорочені назви, скорочення термінів, які вжиті в Бюлетені.....	739

ІНШІ ВІДОМОСТІ.....	740

Інші відомості Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України.....	740
Інші відомості Українського інституту експертизи сортів рослин.....	741

2. ВІДОМОСТІ, ВНЕСЕНІ ДО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ЗАЯВОК НА СОРТИ РОСЛИН (РЕЄСТР ЗАЯВОК)

2. NOTIFICATIONS LISTED IN THE STATE REGISTER OF PLANT VARIETY APPLICATIONS (REGISTER OF APPLICATIONS)

2.1. Заявки на сорти рослин, по яких завершена формальна експертиза

2.1. Plant variety applications, which formal examination has been completed

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Назва сорту Variety denomination	а: Заявник (код) в: Представник (код) а: Applicant (code) в: Representative (code) <i>Zea mays L.</i>	Мета реєстрації (ПС, РС, АС) Purpose of registration (PBR, NLI, AC)
Кукурудза звичайна Maize, Corn				
13009069	30.10.2013	Зорин Zoryn	а: 966 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS
13009070	31.10.2013	Магнум Mahnum	а: 966 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS
13009071	31.10.2013	Корунд Korund	а: 966 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS
13009072	31.10.2013	Маршал Marshal	а: 966 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS
13009154	26.11.2013	ДС1083С DS1083C	а: 918 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS
13009155	26.11.2013	ДС1157А DS1157A	а: 918 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS
13009156	26.11.2013	ДС1304С DS1304C	а: 918 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS
13009157	26.11.2013	ДС1176Б DS1176B	а: 918 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS
13009174	27.11.2013	АС 34003 AS 34003	а: 1893 в:	ПС, РС PBR, NLI
13009175	27.11.2013	АС 34002 AS 34002	а: 1893 в:	ПС, РС PBR, NLI
13009176	27.11.2013	АС 13260 AS 13260	а: 1893 в:	ПС, РС PBR, NLI
13009177	27.11.2013	АС 33049 AS 33049	а: 1893 в:	ПС, РС PBR, NLI
13009178	27.11.2013	АС 34012 AS 34012	а: 1893 в:	ПС, РС PBR, NLI
13009179	27.11.2013	АС 13280 AS 13280	а: 1893 в:	ПС, РС PBR, NLI
13009180	27.11.2013	АС 34011 AS 34011	а: 1893 в:	ПС, РС PBR, NLI
13009181	27.11.2013	АС 34010 AS 34010	а: 1893 в:	ПС, РС PBR, NLI
13009182	27.11.2013	АС 13270 AS 13270	а: 1893 в:	ПС, РС PBR, NLI
13009183	27.11.2013	АС 34007 AS 34007	а: 1893 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS
13009184	27.11.2013	АС 34006 AS 34006	а: 1893 в:	ПС, РС PBR, NLI
13009185	27.11.2013	АС 34005 AS 34005	а: 1893 в:	ПС, РС PBR, NLI
13009186	27.11.2013	АС 13250 AS 13250	а: 1893 в:	ПС, РС PBR, NLI
13009187	27.11.2013	АС 32005 AS 32005	а: 1893 в:	ПС, РС PBR, NLI
13009188	27.11.2013	АС 33034 AS 33034	а: 1893 в:	ПС, РС PBR, NLI
13009189	27.11.2013	АС 13281 AS 13281	а: 1893 в:	ПС, РС PBR, NLI
13009190	27.11.2013	АС 33033 AS 33033	а: 1893 в:	ПС, РС PBR, NLI

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Назва сорту Variety denomination	а: Заявник (код) в: Представник (код) a: Applicant (code) v: Representative (code)	Мета реєстрації (ПС, РС, АС) Purpose of registration (PBR, NLI, AC)
13009191	27.11.2013	AC 33035 AS 33035	а: 1893 в:	ПС, РС PBR, NLI
13009192	27.11.2013	AC 13290 AS 13290	а: 1893 в:	ПС, РС PBR, NLI
13009193	27.11.2013	AC 33039 AS 33039	а: 1893 в:	ПС, РС PBR, NLI
13009194	27.11.2013	AC 13291 AS 13291	а: 1893 в:	ПС, РС PBR, NLI
13009195	27.11.2013	AC 13320 AS 13320	а: 1893 в:	ПС, РС PBR, NLI
13009196	27.11.2013	AC 13330 AS 13330	а: 1893 в:	ПС, РС PBR, NLI
13009216	02.12.2013	ЗУМ305 SUM305	а: 1694 в:	ПС, РС PBR, NLI
Пшениця м'яка (яра) Soft Wheat (Spring)			<i>Triticum aestivum L.</i>	
13013002	28.11.2013	Баярд Baiaard	а: 786 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS
Ячмінь звичайний (ярий) Barley (Spring)			<i>Hordeum vulgare L.</i>	
13020005	14.11.2013	СИ 411 287 SY 411 287	а: 1959 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS
13020006	14.11.2013	СИ 412 329 SY 412 329	а: 1959 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS
13020009	19.11.2013	AC 07/602/58 AC 07/602/58	а: 926 в:	ПС, РС PBR, NLI
13020010	19.11.2013	Гезіне Gesine	а: 926 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS
13020011	19.11.2013	AC 07/624/34 AC 07/624/34	а: 926 в:	ПС, РС PBR, NLI
13020021	29.11.2013	Крешендо Crescendo	а: 1797 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS
Соняшник однорічний Sunflower			<i>Helianthus annuus L.</i>	
13039026	25.09.2013	Метеор КЛ Meteor CL	а: 273 в:	ПС, РС PBR, NLI
13039027	25.09.2013	Корал Coral	а: 273 в:	ПС, РС PBR, NLI
13039036	14.11.2013	Таленто Talento	а: 1219 в:	РС, АС NLI, AS
13039037	14.11.2013	HX32328 NX32328	а: 1219 в:	РС, АС NLI, AS
13039038	14.11.2013	HX32324 NX32324	а: 1219 в:	РС, АС NLI, AS
13039039	14.11.2013	HX32234 NX32234	а: 1219 в:	РС, АС NLI, AS
13039040	14.11.2013	HX32233 NX32233	а: 1219 в:	РС, АС NLI, AS
13039058	26.11.2013	МГ305КП MG305CP	а: 918 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS
13039059	26.11.2013	НТО4.0КП НТО4.0CP	а: 918 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS
13039060	26.11.2013	8С461ДМ 8S461DM	а: 918 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS
13039061	26.11.2013	8Х412КПДМ 8H412CPDM	а: 918 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS
13039087	02.12.2013	МН 11357 MN 11357	а: 1694 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Назва сорту Variety denomination	а: Заявник (код) в: Представник (код) a: Applicant (code) v: Representative (code)	Мета реєстрації (ПС, РС, АС) Purpose of registration (PBR, NLI, AC)
13039097	18.12.2013	AC 34101	а: 1893	ПС, РС
		AS 34101	в:	PBR, NLI
13039098	18.12.2013	AC 34110	а: 1893	ПС, РС
		AS 34110	в:	PBR, NLI
13039099	18.12.2013	AC 34104	а: 1893	ПС, РС, АС
		AS 34104	в:	PBR, NLI, AS
13039100	18.12.2013	AC 34103	а: 1893	ПС, РС
		AS 34103	в:	PBR, NLI
13039101	18.12.2013	AC 34108	а: 1893	ПС, РС
		AS 34108	в:	PBR, NLI
13039102	18.12.2013	AC 34107	а: 1893	ПС, РС
		AS 34107	в:	PBR, NLI
13039103	18.12.2013	AC 34102	а: 1893	ПС, РС
		AS 34102	в:	PBR, NLI
13039104	18.12.2013	AC 34105	а: 1893	ПС, РС
		AS 34105	в:	PBR, NLI
13039105	18.12.2013	AC 34111	а: 1893	ПС, РС
		AS 34111	в:	PBR, NLI
13039106	18.12.2013	AC 34109	а: 1893	ПС, РС
		AS 34109	в:	PBR, NLI
13039107	18.12.2013	AC 34106	а: 1893	ПС, РС
		AS 34106	в:	PBR, NLI
Картопля Potato			<i>Solanum tuberosum L.</i>	
12031007	08.10.2012	Леді Анна	а: 1787	РС, АС
		Lady Anna	в:	NLI, AS
13088008	03.04.2013	Перлина Полісся	а: 428	ПС, РС, АС
		Perlyna Polissia	в:	PBR, NLI, AS
Боби кінські Field Bean			<i>Vicia faba L. var. minor</i>	
13094001	05.12.2013	Віват	а: 1669	ПС, РС, АС
		Vivat	в:	PBR, NLI, AS
Капуста білоголова White Cabbage			<i>Brassica oleracea L. var. alba DC.</i>	
13096001	26.06.2013	Стінг F1	а: 887	ПС, РС, АС
		Sting F1	в:	PBR, NLI, AS
13096002	19.07.2013	Форте	а: 1926	ПС, РС, АС
		Forte	в:	PBR, NLI, AS
Капуста савойська Savoy Cabbage			<i>Brassica oleracea L. var. sabauda DC.</i>	
13100001	26.06.2013	Корналін F1	а: 887	ПС, РС, АС
		Cornalyn F1	в:	PBR, NLI, AS
13100002	26.06.2013	Турмалін F1	а: 887	ПС, РС, АС
		Tourmaline F1	в:	PBR, NLI, AS
Капуста цвітна Cauliflower			<i>Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis</i>	
13101003	26.06.2013	Рауль F1	а: 887	ПС, РС, АС
		Raoul F1	в:	PBR, NLI, AS
Цибуля батун Welsh Onion, Japanese Bunching Onion			<i>Allium fistulosum L.</i>	
13104001	26.06.2013	Карел	а: 887	ПС, РС, АС
		Carel	в:	PBR, NLI, AS
Цибуля городня Onion, Echalion			<i>Allium cepa L.</i>	
12041012	14.12.2012	ХЕНДРІКС	а: 753	ПС, РС, АС
		HENDRIX	в:	PBR, NLI, AS

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Назва сорту Variety denomination	а: Заявник (код) в: Представник (код) а: Applicant (code) в: Representative (code)	Мета реєстрації (ПС, РС, АС) Purpose of registration (PBR, NLI, AC)
12041013	14.12.2012	НУН 7202 ОН NUN 7202 ON	а: 753 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS
12041014	14.12.2012	СОЛСТИС SOLSTICE	а: 753 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS
12041015	14.12.2012	НУН 07206 ОНЛ NUN 07206 ONL	а: 753 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS
12041017	14.12.2012	ХАРРИСОН HARRISON	а: 753 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS
12041018	18.12.2012	КАМПЕРО CAMPERO	а: 753 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS
13106025	26.06.2013	Валентіно F1 Valentino F1	а: 887 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS
13106026	26.06.2013	Дормо F1 Dormo F1	а: 887 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS
13106027	26.06.2013	Меранто F1 Meranto F1	а: 887 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS
13106028	26.06.2013	Коррадо F1 Corrado F1	а: 887 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS
13106029	26.06.2013	Камал F1 Kamal F1	а: 887 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS
13106030	26.06.2013	Пантер F1 Panther F1	а: 887 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS
13106031	26.06.2013	Фронтіно F1 Frontino F1	а: 887 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS
13106032	26.06.2013	Купідо F1 Cupido F1	а: 887 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS
13106033	19.07.2013	Голд Стар Gold Star	а: 1533 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS
Морква Carrot			<i>Daucus carota L.</i>	
12034009	14.12.2012	ТОПКАТ TOPCUT	а: 753 в:	РС, АС NLI, AS
12034010	14.12.2012	АЛЪЯНС ALLYANCE	а: 753 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS
12034011	14.12.2012	ШУГАСНЕКС SHUGARSNAX	а: 753 в:	РС, АС NLI, AS
12034012	14.12.2012	АППЕРКАТ UPPERCUT	а: 753 в:	РС, АС NLI, AS
12034013	14.12.2012	ХАНІСНЕКС HONEYSNAX	а: 753 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS
12034014	18.12.2012	БРІЛІАНС BRILLYANCE	а: 753 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS
Огірок посівний Cucumber			<i>Cucumis sativus L.</i>	
12035008	14.12.2012	КРЕЙТОР CREATOR	а: 753 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS
12035009	14.12.2012	АКТИВАТОР ACTIVATOR	а: 753 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS
13110007	19.07.2013	Коломбо Kolombo	а: 1926 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS
13110008	15.08.2013	Ніжинський 23 Nizhyns`kyi 23	а: 1708 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS
Пастернак посівний Parsnip			<i>Pastinaca sativa L.</i>	
13111001	10.09.2013	Пульс Pul's	а: 1708 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Назва сорту Variety denomination	а: Заявник (код) в: Представник (код) а: Applicant (code) в: Representative (code)	Мета реєстрації (ПС, РС, АС) Purpose of registration (PBR, NLI, AC)
Перець однорічний (солодкий) Sweet Pepper, Paprika			<i>Capsicum annuum L.</i>	
13113006	26.06.2013	Аккорд F1 Accord F1	а: 887 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS
13113007	19.07.2013	Фіджи Fidzhy	а: 1926 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS
Петрушка городня Parsley			<i>Petroselinum crispum (Mill.) Nym. ex A.W. Hill</i>	
13114001	10.09.2013	Найда Naida	а: 1708 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS
Помідор їстівний Tomato			<i>Solanum lycopersicum L.</i>	
12040034	14.12.2012	Дельфо F1 Delfo F1	а: 753 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS
12040035	14.12.2012	ТЕЙЛОР TAYLOR	а: 753 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS
13115025	12.07.2013	Ісміні F1 Ismiini F1	а: 1952 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS
13115027	12.07.2013	Пінк Клер F1 Pinc Klair F1	а: 1952 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS
13115028	12.07.2013	Галілея F1 Galilea F1	а: 1952 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS
13115029	19.07.2013	Соренто Sorento	а: 1926 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS
13115030	19.07.2013	Чезена Chezena	а: 1926 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS
Редька посівна (редиска) Radish, Garden Radish, European			<i>Raphanus sativus L. var. sativus</i>	
13118006	21.06.2013	Радіш Валері Valerie	а: 1730 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS
Салат посівний листовий Lettuce			<i>Lactuca sativa L. var. secalina</i>	
13120001	26.06.2013	Канкан Cancan	а: 887 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS
13120002	26.06.2013	Фрістіна Fristina	а: 887 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS
13120003	12.07.2013	Лібі Libi	а: 1952 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS
13120004	12.07.2013	Роналі Ronaly	а: 1952 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS
Буряк столовий Beetroot, Garden Beet			<i>Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. conditiva Alef.</i>	
13122002	20.11.2013	Ломако Lomako	а: 1730 в:	РС, АС NLI, AS
Мангольд (буряк листовий) Leaf Beet, Swiss Chard			<i>Beta vulgaris L. var. cicla L. (Ulrich)</i>	
13137001	10.09.2013	Кобзар Kobzar	а: 1708 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS
Кавун звичайний Watermelon			<i>Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai.</i>	
13146002	12.07.2013	Сандей Спешл F1 Sunday Special F1	а: 1952 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS
13146003	12.07.2013	Донован F1 Dopovan F1	а: 1952 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS
13146004	12.07.2013	Лахат F1 Lahat F1	а: 1952 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS
13146005	19.07.2013	Енріке Enrike	а: 1926 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Назва сорту Variety denomination	а: Заявник (код) в: Представник (код) а: Applicant (code) в: Representative (code)	Мета реєстрації (ПС, РС, АС) Purpose of registration (PBR, NLI, AC)
Диня звичайна Melon			<i>Cucumis melo L.</i>	
13147001	12.07.2013	Нево F1 Nevo F1	а: 1952 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS
13147002	12.07.2013	Мейрон F1 Meiron F1	а: 1952 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS
13147003	19.07.2013	Сеньоріта Sen`orita	а: 1926 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS
Кабачок Vegetable Marrow, Squash			<i>Cucurbita pepo L.var. giromontia Duch.</i>	
13148004	28.03.2013	Білик Bilyk	а: 1939 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS
Гарбуз звичайний Pumpkin			<i>Cucurbita pepo L.</i>	
13150001	28.03.2013	ЕЛЬДОРАДО El`dorado	а: 1939 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS
Люцерна посівна Lucerne			<i>Medicago sativa L.</i>	
13196011	21.10.2013	МАДАЛІНА MADALINA	а: 807 в:	РС NLI
Пажитниця багаторічна Perennial Ryegrass			<i>Lolium perenne L.</i>	
13222002	21.10.2013	ТУРФСАН TURFSUN	а: 807 в:	РС NLI
Груша звичайна Pear			<i>Pyrus communis L.</i>	
13258002	03.06.2013	Легенда Карпат Lehenda Karpat	а: 1940 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS
13258003	03.06.2013	Сайва Saiva	а: 1940 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS
Персик звичайний Peach			<i>Persica vulgaris Mill.</i>	
12079002	20.12.2012	Дар Степу Dar Stepu	а: 1850 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS
Черешня Sweet Cherry			<i>Prunus avium L.</i>	
72085003	01.01.1972	Крупноплідна Krupnoplidna	а: 325 в:	ПС PBR
93085001	20.11.1976	Талісман Talisman	а: 325 в:	ПС PBR
89085003	29.12.1989	Ера Era	а: 325 в:	ПС PBR
Яблуна домашня Apple			<i>Malus domestica Borkh.</i>	
13263001	01.03.2013	Джерамісу Dzheramisu	а: 1141 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS
13263002	01.03.2013	Голд Крим Hold Krym	а: 1141 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS
13263003	01.03.2013	Крим Стар Krym Star	а: 1141 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS
13263004	01.03.2013	Фуджісу Fudzhisu	а: 1141 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS
Горіх грецький Walnut			<i>Juglans regia L.</i>	
13284002	01.04.2013	Легінь Lehin`	а: 1940 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Назва сорту Variety denomination	а: Заявник (код) в: Представник (код) а: Applicant (code) в: Representative (code) <i>Paenonia L.</i>	Мета реєстрації (ПС, РС, АС) Purpose of registration (PBR, NLI, AC)
Півонія				
Реону				
13329001	03.07.2013	Чорномор	а: 348	ПС, РС, АС
		Chornomor	в:	PBR, NLI, AS
13329002	03.07.2013	Блондин	а: 348	ПС, РС, АС
		Blondyn	в:	PBR, NLI, AS
13329003	03.07.2013	Травневі Роси	а: 348	ПС, РС, АС
		Travnevi Rosy	в:	PBR, NLI, AS
13329004	03.07.2013	Світлячок	а: 348	ПС, РС, АС
		Svitliachok	в:	PBR, NLI, AS
Бузок звичайний				
Lilac				
13332001	30.10.2013	Севастопольський Салют	а: 1585	ПС, РС, АС
		Sevastopol's`kyi Caliut	в:	PBR, NLI, AS
Верба прутовидна				
Hemp Willow, Osier				
13373001	09.10.2013	ЛІННЕЯ	а: 1745	ПС, РС, АС
		LINNEA	в:	PBR, NLI, AS
Тонконіг лучний				
Kentucky Bluegrass				
13375001	21.10.2013	ЦЕПТОР	а: 807	РС
		ZEPTOR	в:	NLI
Люпин жовтий				
Yellow Lupin				
13402001	27.02.2013	Лучеськ	а: 1935	ПС, РС, АС
		Luches`k	в:	PBR, NLI, AS
Калістефус китайський				
China Aster				
13415001	25.09.2013	Срібний дощ	а: 348	ПС, РС, АС
		Sribnyi dosch	в:	PBR, NLI, AS
Міскантус гігантський				
Giant Chinese Silver Grass				
13553002	19.09.2013	Верум	а: 1955	ПС, РС, АС
		Verum	в:	PBR, NLI, AS
Міскантус китайський				
Chinese Silver Grass				
12529004	18.12.2012	Велетень	а: 348	ПС, РС, АС
		Veleten`	в:	PBR, NLI, AS
Аронія чорноплідна				
Black Chockberry				
13624001	31.07.2013	Галичанка	а: 1951	ПС, РС, АС
		Galicjanka	в:	PBR, NLI, AS
Нут звивистий				
Curling Ckick-Pea				
13629001	20.11.2013	Йордан	а: 1952	РС, АС
		Yarden	в:	NLI, AS
Кукурудза звичайна - батьківський компонент				
Maize, Corn - parental component				
13909084	30.10.2013	М 267 MB	а: 966	ПС, РС, АС
		М 267 MV	в:	PBR, NLI, AS
13909085	30.10.2013	М 214 М	а: 966	ПС, РС, АС
		М 214 М	в:	PBR, NLI, AS
13909087	30.10.2013	М 205 3М	а: 966	ПС, РС, АС
		М 205 ZM	в:	PBR, NLI, AS
13909088	30.10.2013	Лорд СВ	а: 966	ПС, РС, АС
		Lord SV	в:	PBR, NLI, AS
13909089	30.10.2013	Зарина М	а: 966	ПС, РС, АС
		Zaryna M	в:	PBR, NLI, AS

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Назва сорту Variety denomination	а: Заявник (код) в: Представник (код) a: Applicant (code) v: Representative (code)	Мета реєстрації (ПС, РС, АС) Purpose of registration (PBR, NLI, AC)
13909090	31.10.2013	M 236 C	a: 966	ПС, РС, АС
		M 236 S	в:	PBR, NLI, AS
13909091	31.10.2013	M 258 CB	a: 966	ПС, РС, АС
		M 258 SV	в:	PBR, NLI, AS
13909092	31.10.2013	Кама С	a: 966	ПС, РС, АС
		Кама S	в:	PBR, NLI, AS
13909093	31.10.2013	M 242 C	a: 966	ПС, РС, АС
		M 242 S	в:	PBR, NLI, AS
13909094	31.10.2013	M 223 CB	a: 966	ПС, РС, АС
		M 223 SV	в:	PBR, NLI, AS
13909095	31.10.2013	M 36 M	a: 966	ПС, РС, АС
		M 36 M	в:	PBR, NLI, AS
13909096	31.10.2013	M 105 MB	a: 966	ПС, РС, АС
		M 105 MV	в:	PBR, NLI, AS
13909097	31.10.2013	ЛЕН1825	a: 924	ПС, РС, АС
		LEN1825	в:	PBR, NLI, AS
13909098	31.10.2013	CBX2375	a: 924	ПС, РС, АС
		CWX2375	в:	PBR, NLI, AS
13909099	31.10.2013	ЛДХ1671	a: 924	ПС, РС, АС
		LDH1671	в:	PBR, NLI, AS
13909100	31.10.2013	CBX1872	a: 924	ПС, РС, АС
		CWX1872	в:	PBR, NLI, AS
13909101	31.10.2013	ЛЕН1825 ЛЖР2038	a: 924	ПС, РС, АС
		LEN1825.LGR2038	в:	PBR, NLI, AS
13909102	31.10.2013	ЛИН2247 ЛИН2248	a: 924	ПС, РС, АС
		LIN2247.LIN2248	в:	PBR, NLI, AS
13909103	31.10.2013	ЛИР2234 ЛАР1490	a: 924	ПС, РС, АС
		LIR2234.LAR1490	в:	PBR, NLI, AS
13909107	31.10.2013	ЛЕН1811 ЛИР2226	a: 924	ПС, РС, АС
		LEN1811.LIR2226	в:	PBR, NLI, AS
13909108	31.10.2013	ЛИР2227	a: 924	ПС, РС, АС
		LIR2227	в:	PBR, NLI, AS
13909109	31.10.2013	ЛИН2246	a: 924	ПС, РС, АС
		LIN2246	в:	PBR, NLI, AS
13909110	31.10.2013	ЛФХ1909	a: 924	ПС, РС, АС
		LFH1909	в:	PBR, NLI, AS
13909111	31.10.2013	ЛФХ1940 ЛФХ1917	a: 924	ПС, РС, АС
		LFH1940.LFH1917	в:	PBR, NLI, AS
13909168	25.11.2013	АЛ0295хАЛ0306	a: 918	ПС, РС, АС
		AL0295хAL0306	в:	PBR, NLI, AS
13909169	25.11.2013	АЛ0055хАЛ0057	a: 918	ПС, РС, АС
		AL0055хAL0057	в:	PBR, NLI, AS
13909170	25.11.2013	АЛ0057хАЛ0134Б	a: 918	ПС, РС, АС
		AL0057хAL0134B	в:	PBR, NLI, AS
13909171	25.11.2013	Р1437хАЛ0134Б	a: 918	ПС, РС, АС
		R1437хAL0134B	в:	PBR, NLI, AS
13909173	25.11.2013	АС3512	a: 918	ПС, РС, АС
		AC3512	в:	PBR, NLI, AS
13909174	25.11.2013	АД6145	a: 918	ПС, РС, АС
		AD6145	в:	PBR, NLI, AS
13909175	25.11.2013	АЛ0295	a: 918	ПС, РС, АС
		AL0295	в:	PBR, NLI, AS
13909176	25.11.2013	АЛ0306	a: 918	ПС, РС, АС
		AL0306	в:	PBR, NLI, AS
13909180	25.11.2013	АЛ0216	a: 918	ПС, РС, АС
		AL0216	в:	PBR, NLI, AS

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Назва сорту Variety denomination	а: Заявник (код) в: Представник (код) а: Applicant (code) в: Representative (code)	Мета реєстрації (ПС, РС, АС) Purpose of registration (PBR, NLI, AC)
13909181	25.11.2013	АЛ6124Б AL6124B	а: 918 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS
13909182	25.11.2013	АЛ6155 AL6155	а: 918 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS
13909184	25.11.2013	ДК247 DK247	а: 918 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS
13909185	25.11.2013	МЕА01 MEA01	а: 918 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS
13909186	25.11.2013	СБК22 SBK22	а: 918 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS
13909187	25.11.2013	СЛБ01 SLB01	а: 918 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS
13909188	25.11.2013	СЛК20 SLK20	а: 918 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS
13909189	25.11.2013	ТВА56-9 TVA56-9	а: 918 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS
14909022	27.01.2014	ПН1312ХПН3020 PN1312XPN3020	а: 1893 в:	ПС, РС PBR, NLI
14909023	27.01.2014	ПН3028ХПН3031 PN3028XPN3031	а: 1893 в:	ПС, РС PBR, NLI
14909024	27.01.2014	ПН3031ХПН3035 PN3031XPN3035	а: 1893 в:	ПС, РС PBR, NLI
14909025	27.01.2014	13PP1860 13RR1860	а: 1893 в:	ПС, РС PBR, NLI
14909026	27.01.2014	ПН3028 PN3028	а: 1893 в:	ПС, РС PBR, NLI
14909027	27.01.2014	ПН2037 PN2037	а: 1893 в:	ПС, РС PBR, NLI
14909028	27.01.2014	ПН1012 PN1012	а: 1893 в:	ПС, РС PBR, NLI
14909029	27.01.2014	13KK0466 13QQ0466	а: 1893 в:	ПС, РС PBR, NLI
14909030	27.01.2014	13KK0504 13QQ0504	а: 1893 в:	ПС, РС PBR, NLI
14909031	27.01.2014	13KK2166 13QQ2166	а: 1893 в:	ПС, РС PBR, NLI
14909032	27.01.2014	ПН4035 PN4035	а: 1893 в:	ПС, РС PBR, NLI
14909033	27.01.2014	ПН2036 PN2036	а: 1893 в:	ПС, РС PBR, NLI
14909034	27.01.2014	13АД0192 13AD0192	а: 1893 в:	ПС, РС PBR, NLI
14909035	27.01.2014	13АД0202 13AD0202	а: 1893 в:	ПС, РС PBR, NLI
14909036	27.01.2014	ПН3037 PN3037	а: 1893 в:	ПС, РС PBR, NLI
14909037	27.01.2014	13ДЛ1825 13DL1825	а: 1893 в:	ПС, РС PBR, NLI
14909038	27.01.2014	13ФМ1069 13FM1069	а: 1893 в:	ПС, РС PBR, NLI
14909039	27.01.2014	13ФР1618 13FR1618	а: 1893 в:	ПС, РС PBR, NLI
14909040	27.01.2014	ПН3035 PN3035	а: 1893 в:	ПС, РС PBR, NLI
14909041	27.01.2014	ПН3034 PN3034	а: 1893 в:	ПС, РС PBR, NLI

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Назва сорту Variety denomination	а: Заявник (код) в: Представник (код) a: Applicant (code) в: Representative (code)	Мета реєстрації (ПС, РС, АС) Purpose of registration (PBR, NLI, AC)
Соняшник однорічний - батьківський компонент Sunflower - parental component			<i>Helianthus annuus L.</i>	
14939001	27.01.2014	ХП3009IA	а: 1893	ПС, РС
		НР3009IA	в:	PBR, NLI
14939002	27.01.2014	ФТ473I	а: 1893	ПС, РС
		FT473I	в:	PBR, NLI
14939003	27.01.2014	ХП249EP	а: 1893	ПС, РС
		НР249ER	в:	PBR, NLI
14939004	27.01.2014	ХП3815IP	а: 1893	ПС, РС
		НР3815IR	в:	PBR, NLI
14939005	27.01.2014	ФХП179309	а: 1893	ПС, РС
		FHP179309	в:	PBR, NLI
14939006	27.01.2014	ФХП309473	а: 1893	ПС, РС
		FHP309473	в:	PBR, NLI
14939007	27.01.2014	ФХП309212	а: 1893	ПС, РС
		FHP309212	в:	PBR, NLI
14939008	27.01.2014	ФХП212473	а: 1893	ПС, РС
		FHP212473	в:	PBR, NLI
14939009	27.01.2014	ФХП179212	а: 1893	ПС, РС
		FHP179212	в:	PBR, NLI
14939010	27.01.2014	ФХП21226	а: 1893	ПС, РС
		FHP21226	в:	PBR, NLI
Ріпак (озимий) - батьківський компонент Rape Seed (Winter) - parental component			<i>Brassica napus L. oleifera</i>	
13940012	05.06.2013	B1-CB9	а: 1702	ПС, РС, АС
		V1-SV9	в:	PBR, NLI, AS

2.2. Відомості щодо заявок на сорти рослин, за якими прийнято рішення про відмову у державній реєстрації прав на сорт

2.2. Notifications on plant variety applications, for which decision has been adopted on refusing the plant variety rights registration

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Назва сорту Variety denomination	а: Заявник (код) в: Представник (код) а: Applicant (code) в: Representative (code)	Мета реєстрації (ПС, РС, АС) Purpose of registration (PBR, NLI, AS)	Дата відмови Date of refusal
Кукурудза звичайна Maize, Corn			<i>Zea mays L.</i>		
11004140	21.11.2011	КХБ1308	а: 938	ПС, РС, АС	21.01.2014
		КХВ1308	в:	PBR, NLI, AS	
11004141	21.11.2011	Керберос	а: 938	ПС, РС, АС	21.01.2014
		Kerberos	в:	PBR, NLI, AS	
11004142	21.11.2011	КХБ1474	а: 938	ПС, РС, АС	21.01.2014
		КХВ1474	в:	PBR, NLI, AS	
11004146	21.11.2011	Колізей	а: 938	ПС, РС, АС	21.01.2014
		Colisee	в:	PBR, NLI, AS	
11004147	21.11.2011	КХБ1326	а: 938	ПС, РС, АС	21.01.2014
		КХВ1326	в:	PBR, NLI, AS	
11004148	21.11.2011	Калієнтес	а: 938	ПС, РС, АС	21.01.2014
		Kalientes	в:	PBR, NLI, AS	
Пшениця м'яка (озима) Soft Wheat (Winter)			<i>Triticum aestivum L.</i>		
13012049	10.09.2013	Спадок Орлюка	а: 1698	ПС, РС, АС	19.03.2014
		Spadok Orliuka	в:	PBR, NLI, AS	
Соняшник однорічний Sunflower			<i>Helianthus annuus L.</i>		
12017211	12.12.2012	Досконалий	а: 1771	ПС, РС, АС	24.01.2014
		Doskonalyi	в:	PBR, NLI, AS	
12017212	12.12.2012	Потужний	а: 1771	ПС, РС, АС	24.01.2014
		Potuzhnyi	в:	PBR, NLI, AS	
Ріпак (озимий) Rape Seed (Winter)			<i>Brassica napus L. oleifera</i>		
12016050	17.07.2012	Моделіні	а: 1807	РС	17.03.2014
		Modelini	в:	NLI	
12016051	17.07.2012	САПФІР	а: 1807	РС	17.03.2014
		SAPFIR	в:	NLI	
Горох посівний (овочевий) Pea, Garden Pea			<i>Pisum sativum L.</i>		
12001005	14.09.2012	Гропеса	а: 753	ПС, РС, АС	18.02.2014
		Gropesa	в:	PBR, NLI, AS	
12001006	14.09.2012	КОМПАНА	а: 753	ПС, РС, АС	18.02.2014
		COMPANA	в:	PBR, NLI, AS	
12001007	14.09.2012	Стандана	а: 753	ПС, РС, АС	18.02.2014
		Standana	в:	PBR, NLI, AS	
12001008	14.09.2012	Прімана	а: 753	ПС, РС, АС	18.02.2014
		Primana	в:	PBR, NLI, AS	
12001009	14.09.2012	Інновеса	а: 753	ПС, РС, АС	18.02.2014
		Innovesa	в:	PBR, NLI, AS	
Горошок посівний (ярий) Common Vetch (Spring)			<i>Vicia sativa L.</i>		
13177001	05.09.2013	Акварель	а: 1635	ПС, РС, АС	12.03.2014
		Akvarel`	в:	PBR, NLI, AS	
Малина Raspberry			<i>Rubus idaeus L.</i>		
13296002	20.05.2013	Уейкфілд	а: 1944	ПС, РС, АС	24.01.2014
		Wakefield	в:	PBR, NLI, AS	

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Назва сорту Variety denomination	а: Заявник (код) в: Представник (код) а: Applicant (code) в: Representative (code)	Мета реєстрації (ПС, РС, АС) Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	Дата відмови Date of refusal
Кукурудза звичайна - батьківський компонент Maize, Corn - parental component			<i>Zea mays L.</i>		
11004139	21.11.2011	KBCEK 012	а: 938	ПС, РС, АС	21.01.2014
		KWSEK 012	в:	PBR, NLI, AS	
11004143	21.11.2011	KBCEK 512	а: 938	ПС, РС, АС	21.01.2014
		KWSEK 512	в:	PBR, NLI, AS	
11004144	21.11.2011	KB4X1038	а: 938	ПС, РС, АС	21.01.2014
		KW4H1038	в:	PBR, NLI, AS	
11004145	21.11.2011	KB5Ф1521	а: 938	ПС, РС, АС	30.01.2014
		KW5F1521	в:	PBR, NLI, AS	
11004149	21.11.2011	KB6Ю1001	а: 938	ПС, РС, АС	21.01.2014
		KW6Q1001	в:	PBR, NLI, AS	
11004150	21.11.2011	KB5Ф1570	а: 938	ПС, РС, АС	21.01.2014
		KW5F1570	в:	PBR, NLI, AS	
11004151	21.11.2011	KB1Ф422	а: 938	ПС, РС, АС	21.01.2014
		KW1F422	в:	PBR, NLI, AS	
11004152	21.11.2011	KB9Ю0912	а: 938	ПС, РС, АС	21.01.2014
		KW9Q0912	в:	PBR, NLI, AS	
11004153	21.11.2011	KB6X1002	а: 938	ПС, РС, АС	21.01.2014
		KW6H1002	в:	PBR, NLI, AS	

2.3. Відкликані заявки або такі, що вважаються відкликаними

2.3. Withdrawn applications or that considered to be withdrawn

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Назва сорту Variety denomination	а: Заявник (код) в: Представник (код) a: Applicant (code) в: Representative (code)	Мета реєстрації (ПС, РС, АС) Purpose of registration (PBR, NLI, AS)	Дата відкликання Date of withdrawal
Кукурудза звичайна Maize, Corn				Zea mays L	
08004166	28.11.2008	СУМ 1802 SUM 1802	а: 918 в	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS	21.01.2014
09004616	25.11.2009	ДА 3oi DA Szo	а: 918 в	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS	21.01.2014
09004620	25.11.2009	ДАС08130 DAS08130	а: 918 в	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS	21.01.2014
10004045	07.10.2010	Ваєтрікс Viatrix	а: 924 в	РС, АС NLI, AS	14.03.2014
10004249	30.11.2010	Супреме Supreme	а: 918 в	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS	21.01.2014
10004250	30.11.2010	Сумзум Somzoom	а: 918 в	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS	21.01.2014
10004253	30.11.2010	ДС0332 DS0332	а: 918 в	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS	21.01.2014
10004254	30.11.2010	ДС0330 DS0330	а: 918 в	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS	21.01.2014
10004256	30.11.2010	ДС0321 DS0321	а: 918 в	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS	21.01.2014
10004257	30.11.2010	ДС0311 DS0311	а: 918 в	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS	21.01.2014
10004258	30.11.2010	ДС0308 DS0308	а: 918 в	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS	21.01.2014
10004260	30.11.2010	ДС0301 DS0301	а: 918 в	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS	21.01.2014
11004080	10.11.2011	СИ Верда SY Werda	а: 1219 в	РС, АС NLI, AS	14.03.2014
11004085	10.11.2011	СИ Найстоп SY Nicetop	а: 1219 в	РС, АС NLI, AS	14.03.2014
11004086	10.11.2011	СИ Гепард SY Gepard	а: 1219 в	РС, АС NLI, AS	14.03.2014
11004180	22.11.2011	КСМ 8156 CSM 8156	а: 485 в	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS	17.03.2014
11004185	24.11.2011	ЛЗМ46102 LZM46102	а: 793 в	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS	21.03.2014
11004229	29.11.2011	ГУ8194 GW8194	а: 1329 в	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS	12.03.2014
12004149	06.12.2012	СБ0801 SB0801	а: 1219 в	РС, АС NLI, AS	14.03.2014
12004166	11.12.2012	ЛЗМ36166 LZM36166	а: 793 в	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS	30.01.2014
12004282	14.12.2012	ЛЗМ26104 LZM26104	а: 793 в	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS	30.01.2014
12004284	14.12.2012	ЛЗМ26287 LZM26287	а: 793 в	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS	30.01.2014
13009032	23.04.2013	ТХР744Ф TXP744F	а: 844 в	ПС, РС PBR, NLI	21.01.2014

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Назва сорту Variety denomination	а: Заявник (код) в: Представник (код) a: Applicant (code) в: Representative (code)	Мета реєстрації (ПС, РС, АС) Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	Дата відкликання Date of withdrawal
13009033	23.04.2013	EXP740НЛВз EXP740НЛВЗ	а: 844 в	ПС, РС PBR, NLI	21.01.2014
13009034	23.04.2013	HC4702НЛВз NC4702НЛВЗ	а: 844 в	ПС, РС PBR, NLI	21.01.2014
13009035	23.04.2013	ЕД3801НЛВз ED3801НЛВЗ	а: 844 в	ПС, РС PBR, NLI	21.01.2014
13009036	23.04.2013	EXP151НЛВз EXP151НЛВЗ	а: 844 в	ПС, РС PBR, NLI	21.01.2014
13009037	23.04.2013	НВ4903НЛВз NB4903НЛВЗ	а: 844 в	ПС, РС PBR, NLI	21.01.2014
13009038	23.04.2013	ТХР939Аз ТХР939АЗ	а: 844 в	ПС, РС PBR, NLI	21.01.2014
13009039	23.04.2013	ЕС2907НЛВз ED2907НЛВЗ	а: 844 в	ПС, РС PBR, NLI	21.01.2014
13009040	23.04.2013	МРА422СМС MPA422СМС	а: 844 в	ПС, РС PBR, NLI	21.01.2014
13009041	23.04.2013	ЕД2908НЛВз ED2908НЛВЗ	а: 844 в	ПС, РС PBR, NLI	21.01.2014
13009042	23.04.2013	ЕД3412НЛВз ED3412НЛВЗ	а: 844 в	ПС, РС PBR, NLI	21.01.2014
13009043	23.04.2013	ЕД3008НЛВз ED3008НЛВЗ	а: 844 в	ПС, РС PBR, NLI	21.01.2014
13009081	31.10.2013	МЖМ247896 MGM247896	а: 924 в	РС, АС NLI, AS	03.03.2014
13009104	19.11.2013	П0247 P0247	а: 9 в	РС NLI	13.03.2014
13009105	19.11.2013	П9239 P9239	а: 9 в	РС NLI	13.03.2014
13009172	27.11.2013	КСМ0761 CSM0761	а: 485 в	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS	12.03.2014
13009173	27.11.2013	КСМ1160 CSM1160	а: 485 в	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS	12.03.2014
13009229	04.12.2013	Принцип Principe	а: 1941 в	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS	13.03.2014
13009230	04.12.2013	Альтаір 505 Altair 505	а: 1941 в	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS	12.03.2014
13009288	25.12.2013	ГКТ 417 GKT 417	а: 1280 в	РС NLI	14.03.2014
Сорго звичайне (двокольорове) Sorghum		<i>Sorghum bicolor (L.) Moench</i>			
13018014	25.12.2013	ГК Балаш GK Balazs	а: 1280 в	РС NLI	14.03.2014
Ячмінь звичайний (ярий) Barley (Spring)		<i>Hordeum vulgare L.</i>			
10012016	29.11.2010	Плазма Plasma	а: 1498 в	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS	21.01.2014
11012023	29.11.2011	СИ 409 201 SY 409 201	а: 1420 в	РС, АС NLI, AS	30.01.2014
11012024	29.11.2011	СИ Батік SY Batyk	а: 1420 в	РС, АС NLI, AS	30.01.2014

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Назва сорту Variety denomination	а: Заявник (код) в: Представник (код) а: Applicant (code) в: Representative (code)	Мета реєстрації (ПС, РС, АС) Purpose of registration (PBR, NLI, AS)	Дата відкликання Date of withdrawal
12012015	10.12.2012	Міраж Mirazh	а: 1811 в	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS	30.01.2014
13020025	12.12.2013	Ахіллес Akhilles	а: 1591 в	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS	21.03.2014
Нут звичайний Chick-Pea				<i>Cicer arietinum L.</i>	
13028001	12.07.2013	Ярден Yarden	а: 1952 в	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS	24.01.2014
Соняшник однорічний Sunflower				<i>Helianthus annuus L.</i>	
09017261	19.11.2009	8X559КЛ 8H559CL	а: 918 в	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS	21.01.2014
10017195	30.11.2010	8X449КЛПДМ 8Kh449KL PDM	а: 918 в	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS	21.01.2014
10017198	30.11.2010	8X581КЛДМ 8Kh581KLDM	а: 918 в	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS	21.01.2014
10017199	30.11.2010	8K410КЛ 8C410CL	а: 918 в	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS	21.01.2014
11017031	16.09.2011	MAC 84OP MAS 84OR	а: 924 в	РС, АС NLI, AS	21.03.2014
11017033	16.09.2011	МЖТ47227 MGТ47227	а: 924 в	РС, АС NLI, AS	14.03.2014
11017080	10.11.2011	Прімера Primera	а: 1219 в	РС, АС NLI, AS	14.03.2014
12017176	10.12.2012	8X270КЛДМ 8H270CLDM	а: 918 в	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS	21.03.2014
12017177	10.12.2012	Сулфосол SULFOSOL	а: 883 в	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS	17.03.2014
12017178	10.12.2012	Голдімі GOLDIMI	а: 883 в	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS	17.03.2014
Ріпак (озимий) Rape Seed (Winter)				<i>Brassica napus L.</i>	
11016022	18.03.2011	Табор Tabor	а: 912 в	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS	21.01.2014
12016008	06.03.2012	РАП 1121 RAP 1121	а: 912 в	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS	21.01.2014
Ріпак (ярий) Rape Seed (Spring)				<i>Brassica napus L.</i>	
11016052	29.11.2011	5525 КЛ 5525 CL	а: 912 в	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS	12.03.2014
12016075	17.12.2012	ДЛЕ 1210 DLE 1210	а: 912 в	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS	14.03.2014
Соя культурна Soya Bean				<i>Glycine max. (L.) Merr.</i>	
11018022	29.11.2011	КОРДОБА CORDOBA	а: 1704 в	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS	17.03.2014
12018005	07.12.2012	КС-14 KS-14	а: 416 в	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS	21.03.2014
Картопля Potato				<i>Solanum tuberosum L.</i>	
11031012	03.11.2011	Ельмундо El Mundo	а: 1673 в	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS	17.03.2014

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Назва сорту Variety denomination	а: Заявник (код) в: Представник (код) а: Applicant (code) в: Representative (code)	Мета реєстрації (ПС, РС, АС) Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	Дата відкликання Date of withdrawal
11031028	14.12.2011	Транзит Transit	а: 1011 в	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS	12.03.2014
Баклажан Egg Plant, Eggplant			<i>Solanum melongena L.</i>		
11022004	06.12.2011	Шеріл F1 Cheryl F1	а: 1730 в	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS	17.03.2014
Горох посівний (овочевий) Pea, Garden Pea			<i>Pisum sativum L.</i>		
11024003	30.11.2011	Мастін Mastin	а: 1050 в	РС, АС NLI, AS	30.01.2014
Капуста білоголова White Cabbage			<i>Brassica oleracea L. var. capitata (L.) alba DC.</i>		
09028023	26.11.2009	Термінатор F1 Terminator F1	а: 273 в	РС, АС NLI, AS	21.01.2014
Кукурудза цукрова Sweet Corn			<i>Zea mays L.</i>		
10032002	18.11.2010	Юрасик F1 Jurassic F1	а: 1050 в	РС, АС NLI, AS	30.01.2014
Цибуля городня Onion, Echalion			<i>Allium cepa L.</i>		
10041004	30.11.2010	Ковбой F1 Cowboy F1	а: 751 в	РС, АС NLI, AS	21.01.2014
11041014	27.10.2011	Медео F1 Medeo F1	а: 751 в	РС, АС NLI, AS	21.01.2014
11041018	22.11.2011	Талон F1 Talon F1	а: 751 в	РС, АС NLI, AS	21.01.2014
Морква Carrot			<i>Daucus sativus (Hoffm.) Roehl.</i>		
10034003	30.11.2010	Базель F1 Basel F1	а: 751 в	РС, АС NLI, AS	21.01.2014
Огірок посівний Cucumber			<i>Cucumis sativus L.</i>		
12035004	06.12.2012	КАФКА KAFKA	а: 1050 в	РС, АС NLI, AS	14.03.2014
12035005	06.12.2012	НОВА ТОП NOVA TOP	а: 1050 в	РС, АС NLI, AS	14.03.2014
12035006	06.12.2012	ПРУВА PRUVA	а: 1050 в	РС, АС NLI, AS	14.03.2014
12035013	18.12.2012	12 -73 12 -73	а: 1730 в	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS	18.02.2014
Перець однорічний (солодкий) Sweet Pepper, Paprika			<i>Capsicum annuum L.</i>		
12037001	21.03.2012	Унікум Unikum	а: 1624 в	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS	30.01.2014
Помідор їстівний Tomato			<i>Lycopersicon esculentum Mill.</i>		
12040009	18.07.2012	Ладоба Ladoga	а: 1730 в	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS	18.02.2014
Часник Garlic			<i>Allium sativum L.</i>		
14129001	09.01.2014	Олександрівський Oleksandrivs'kyi	а: 1601 в	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS	14.03.2014

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Назва сорту Variety denomination	а: Заявник (код) в: Представник (код) а: Applicant (code) в: Representative (code)	Мета реєстрації (ПС, РС, АС) Purpose of registration (PBR, NLI, AS)	Дата відкликання Date of withdrawal
Кавун звичайний Watermelon			<i>Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai</i>		
10027003	18.11.2010	Ладонас F1 Ladonas F1	а: 1050 в	РС, АС NLI, AS	30.01.2014
12027001	06.12.2012	БОНАНЗА BONANZA	а: 1050 в	РС, АС NLI, AS	17.03.2014
Абрикос звичайний Apricot			<i>Armeniaca vulgaris Lam.</i>		
00070001	24.10.2000	Ювілейний Федченкової Yuvileinyi Fedchenkovoï	а: 325 в	РС NLI	12.03.2014
Вишня звичайна Sour cherry, Tart cherry, Morello			<i>Prunus cerasus L.</i>		
94074006	01.01.1994	Сіянець Туровцевої Siianets' Turovtsevoi	а: 325 в	РС NLI	12.03.2014
Лілійник Daylily			<i>Heemerocallis L.</i>		
13326004	02.12.2013	Шико Shyko	а: 1967 в	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS	21.03.2014
13326005	02.12.2013	Світанок над Удаєм Svitanok nad Udaïem	а: 1967 в	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS	21.03.2014
Кукурудза звичайна - батьківський компонент Maize, Corn - parental component			<i>Zea mays L</i>		
11004293	20.12.2011	ББ64 BB64	а: 793 938 в	РС, АС NLI, AS	21.03.2014
12004308	17.12.2012	ПХЙ0Б PHJ0B	а: 1688 в	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS	17.03.2014
13909048	23.04.2013	Дж13303ХЛБЗ J1330ZHLBZ	а: 844 в	ПС, РС PBR, NLI	17.03.2014
13909049	23.04.2013	В42423ХЛБЗ W4242ZHLBZ	а: 844 в	ПС, РС PBR, NLI	17.03.2014
13909050	23.04.2013	МЕТ9434ЦМС MET9434CMS	а: 844 в	ПС, РС PBR, NLI	17.03.2014
13909051	23.04.2013	Ф85203ХЛБЗ F8520ZHLBZ	а: 844 в	ПС, РС PBR, NLI	17.03.2014
13909052	23.04.2013	МЕК2967ЦМС MEK2967CMS	а: 844 в	ПС, РС PBR, NLI	17.03.2014
13909053	23.04.2013	МЕФ5298МС MEF5298MS	а: 844 в	ПС, РС PBR, NLI	17.03.2014
13909054	23.04.2013	0911СДМС 0911SDMS	а: 844 в	ПС, РС PBR, NLI	17.03.2014
13909055	23.04.2013	МЕФ2195ЦМС MEF2195CMS	а: 844 в	ПС, РС PBR, NLI	17.03.2014
13909056	23.04.2013	МЕФ1892ЦМС MEF1892CMS	а: 844 в	ПС, РС PBR, NLI	17.03.2014
13909057	23.04.2013	МЕФ1740ЦМС MEF1740CMS	а: 844 в	ПС, РС PBR, NLI	17.03.2014
13909058	23.04.2013	ХЦЛ1013МС HCL1013MS	а: 844 в	ПС, РС PBR, NLI	17.03.2014
13909059	23.04.2013	Е2ІФІ494МС E2IFI494MS	а: 844 в	ПС, РС PBR, NLI	17.03.2014
13909060	23.04.2013	СК455МС SK455MS	а: 844 в	ПС, РС PBR, NLI	17.03.2014

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Назва сорту Variety denomination	а: Заявник (код) в: Представник (код) а: Applicant (code) в: Representative (code)	Мета реєстрації (ПС, РС, АС) Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	Дата відкликання Date of withdrawal
13909061	23.04.2013	Ц3АХД08ЦМС С3АНД08СМС	а: 844 в	ПС, РС PBR, NLI	17.03.2014
13909062	23.04.2013	1064СДМС 1064СDMS	а: 844 в	ПС, РС PBR, NLI	17.03.2014
13909063	23.04.2013	0997СДМС 0997SDMS	а: 844 в	ПС, РС PBR, NLI	17.03.2014
13909064	23.04.2013	91ДЮК1ЦМС 91DUQ1СMS	а: 844 в	ПС, РС PBR, NLI	17.03.2014
13909065	23.04.2013	94І3І9СДМС 94ІZІ9SDMS	а: 844 в	ПС, РС PBR, NLI	17.03.2014
13909066	23.04.2013	94АХА8ЦМС 94АНА8СMS	а: 844 в	ПС, РС PBR, NLI	17.03.2014
13909067	23.04.2013	МЕФ5096 MEF5096	а: 844 в	ПС, РС PBR, NLI	17.03.2014
13909068	23.04.2013	МЕФ1892 MEF1892	а: 844 в	ПС, РС PBR, NLI	17.03.2014
13909070	23.04.2013	Дж2085з JR2085Z	а: 844 в	ПС, РС PBR, NLI	17.03.2014
13909071	23.04.2013	В2417з W2417Z	а: 844 в	ПС, РС PBR, NLI	17.03.2014
13909072	23.04.2013	В1361з W1361Z	а: 844 в	ПС, РС PBR, NLI	17.03.2014
13909073	23.04.2013	В1245з W1245Z	а: 844 в	ПС, РС PBR, NLI	17.03.2014
13909074	23.04.2013	В3594з W3594Z	а: 844 в	ПС, РС PBR, NLI	17.03.2014
13909086	30.10.2013	Лада С стерильний Lada S steryl'nyi	а: 966 в	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS	13.03.2014
13909172	25.11.2013	АС1330 AC1330	а: 918 в	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS	14.03.2014
13909177	25.11.2013	АЛ0055А AL0055A	а: 918 в	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS	14.03.2014
13909178	25.11.2013	АЛ0057 AL0057	а: 918 в	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS	14.03.2014
13909179	25.11.2013	АЛ0134Б AL0134B	а: 918 в	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS	14.03.2014
13909183	25.11.2013	Р1437 R1437	а: 918 в	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS	14.03.2014
13909192	27.11.2013	497Ц058СТР 497C058STR	а: 485 в	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS	12.03.2014
13909193	27.11.2013	422М766 x 497Ц058 422M766 x 497C058	а: 485 в	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS	12.03.2014
13909194	27.11.2013	497ЦБ602 497CB602	а: 485 в	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS	12.03.2014
13909195	27.11.2013	422М766СТР 422M766STR	а: 485 в	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS	12.03.2014
13909196	27.11.2013	422М766СТР x 422M766STR x	а: 485 в	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS	12.03.2014
13909197	27.11.2013	117ЦБ343 117CB343	а: 485 в	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS	12.03.2014

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Назва сорту Variety denomination	а: Заявник (код) в: Представник (код) а: Applicant (code) в: Representative (code)	Мета реєстрації (ПС, РС, АС) Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	Дата відкликання Date of withdrawal
13909198	27.11.2013	48A014 48A014	а: 485 в	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS	12.03.2014
13909199	27.11.2013	427Ф567 427F567	а: 485 в	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS	12.03.2014
13909200	27.11.2013	112K564 112K564	а: 485 в	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS	12.03.2014
13909201	27.11.2013	111B070 111W070	а: 485 в	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS	12.03.2014
13909202	27.11.2013	249Д635 x 48A014 249D635 x 48A014	а: 485 в	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS	12.03.2014
13909203	27.11.2013	446ЖА695 446JA695	а: 485 в	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS	12.03.2014
13909204	27.11.2013	227ЮБ148 227QB148	а: 485 в	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS	12.03.2014
13909205	27.11.2013	226YA988 226YA988	а: 485 в	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS	12.03.2014
13909275	20.12.2013	CA 0163 SA 0163	а: 1867 в	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS	14.03.2014
13909276	20.12.2013	CA 8363 SA 8363	а: 1867 в	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS	14.03.2014
Соняшник однорічний - батьківський компонент Sunflower - parental component			Helianthus annuus L.		
10017045	19.10.2010	IA919 IA919	а: 485 в	РС, АС NLI, AS	17.03.2014
11017028	01.04.2011	ХАФЛ-5 HAFL-5	а: 1719 в	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS	30.01.2014
11017043	19.09.2011	ТХС6159 TKhS6159	а: 924 в	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS	14.03.2014
13939051	27.11.2013	72B13i 72W13i	а: 485 в	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS	12.03.2014
13939052	27.11.2013	85П10Р 85P10R	а: 485 в	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS	12.03.2014
13939053	27.11.2013	97Ф25 97F25	а: 485 в	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS	12.03.2014

3. ВІДОМОСТІ ЩОДО ЗМІНИ НАЗВИ СОРТУ РОСЛИН

3. NOTIFICATIONS OF CHANGING PLANT VARIETY DENOMINATION

Номер заявки Application number	а: Заявник (код) в: Представник (код) а: Applicant (code) в: Representative (code)	Назва сорту Variety denomination	Назва сорту нова New variety denomination
Кукурудза звичайна Maize, Corn		<i>Zea mays L</i>	
05004003	а: 806 в: 28	ЕС Лаймс	ЕС Лаймс ES Limes
09004676	а: 485 в:	КСМ 5859	Жерзі КС Gerzi CS
09004680	а: 485 в:	КСМ 6107	Кодіфлу Codiflou
09004681	а: 485 в:	КСМ 7504	Ланері Laperi
10004107	а: 879 1210 в:	НС 4023	НС 3023 NS 3023
10004111	а: 485 в:	КСМ 8727	Тессалі Tessali
10004206	а: 844 в:	ЕГ4405	ДКС4406 DKC4406
10004207	а: 844 в:	ЕН4103	ДКС4114 DKC4114
10004210	а: 844 в:	ЕН4609	ДКС4711 DKC4711
10004212	а: 844 в:	ЕН4812	ДКС4814 DKC4814
10004213	а: 844 в:	ЕН5011	ДКС4718 DKC4718
10004214	а: 844 в:	НФ4211	ДКС3811 DKC3811
10004215	а: 844 в:	НХ4329	ДКС4316 DKC4316
10004217	а: 844 в:	ЕН3521	ДКС3509 DKC3509
10004219	а: 844 в:	ЕН3430	ДКС3417 DKC3417
10004220	а: 844 в:	ЕН3426	ДКС3415 DKC3415
10004221	а: 844 в:	ЕН3015	ДКС3016 DKC3016
10004239	а: 793 в:	ЛЗМ15562	ЛГ3216 LG3216
11004003	а: 1055 в:	Х75А211	П7709 P7709
11004037	а: 924 в:	МЖМ213381	МАС 09П MAS 09P
11004038	а: 924 в:	МЖМ245113	МАС 15Ф MAS 15F
11004039	а: 924 в:	МЖМ185929	МАС 35К MAS 35K
11004040	а: 924 в:	МЖМ229214	МАС 35К MAS 35K
11004041	а: 924 в:	МЖМ212987	Балма Balma
11004042	а: 924 в:	МЖМ245112	Плевен Pleven
11004043	а: 924 в:	МЖМ196208	МАС 33СР MAS 33CR
11004044	а: 924 в:	МЖМ164113	МАС 24Н MAS 24N
11004045	а: 924 в:	МЖМ184458	МАС 55Ф MAS 55F
11004080	а: 1219 в:	СБ0740	МАС 39Т MAS 39T
11004081	а: 1219 в:	СБ0810	СИ Верда SY Werda
			СИ Тіптон SY Tipton

Номер заявки Application number	а: Заявник (код) в: Представник (код) а: Applicant (code) в: Representative (code)	Назва сорту Variety denomination	Назва сорту нова New variety denomination
11004082	а: 1219	СЦ1450	СИ Еніґма
	в:		SY Enigma
11004084	а: 1219	СЦ2400	СИ Амплітуд
	в:		SY Amplitude
11004085	а: 1219	СЦ3710	СИ Найстоп
	в:		SY Nicetop
11004086	а: 1219	СЦ3850	СИ Гепард
	в:		SY Geparard
12004006	а: 1761	КСМ 4402	Кодівал
	в:		Codival
12004007	а: 1761	КСМ 6318	Кодіфлаг
	в:		Codiflag
12004083	а: 924	МЖМ213935	МАС 28А
	в:		MAS 28A
12004085	а: 924	МЖМ211242	МАС 24В
	в:		MAS 24V
12004086	а: 924	МЖМ208158	МАС 25Ф
	в:		MAS 25F
12004140	а: 1219	СЦ2701	СИ Грейсі
	в:		SY Grasy
12004141	а: 1219	СА0431	СИ Сертіона
	в:		SY Sertiona
12004147	а: 1219	СД2001	СИ Амбіціус
	в:		SY Ambitius
12004151	а: 1219	СЕ4031	СИ Октавіус
	в:		SY Octavius
12004187	а: 1854	Новатор	ДН Ной
	в:		DN Noi
12004215	а: 1581	Смерека	Девіз
	в:		Deviz
12004224	а: 1034	Валедо	Валледо
	в:		Valledo
12004230	а: 1591	АТОЛ	Династія
	в:		Dynastiia
12004257	а: 1688	Х95Б157	П9606
	в:		P9606
12004289	а: 966	Лотос	Зернослаб
	в:		Zernoslav
12004290	а: 966	Омега М стерильний	Омега М
	в:		Omeha M
13009027	а: 844	НЖ4139	ДКС3931
	в:		DKC3931
13009030	а: 844	НХ4035	ДКС4025
	в:		DKC4025
13009044	а: 844	ЕН3708	ДКС3711
	в:		DKC3711
13009045	а: 844	ЕІ4104	ДКС4122
	в:		DKC4122
13009046	а: 844	ЕІ3909	ДКС3822
	в:		DKC3822
13009047	а: 844	ЕІ4408	ДКС4522
	в:		DKC4522
13009048	а: 844	ЕІ3806	ДКС3623
	в:		DKC3623
13009051	а: 844	ЕІ3910	ДКС4012
	в:		DKC4012
13009056	а: 844	ЕЛ4415	ДКС4433
	в:		DKC4433
13009061	а: 844	ЕЛ5016	ДКС5031
	в:		DKC5031
13009062	а: 844	ЕН4813	ДКС4717
	в:		DKC4717
13009064	а: 844	ЕЛ3712	ДКС3830
	в:		DKC3830

Номер заявки Application number	а: Заявник (код) в: Представник (код) а: Applicant (code) в: Representative (code)	Назва сорту Variety denomination	Назва сорту нова New variety denomination
Овес посівний (ярий) Oat (Spring)		<i>Avena sativa L.</i>	
12005003	а: 1854 в:	Конкур	Мусон Muson
Пшениця м'яка (озима) Soft Wheat (Winter)		<i>Triticum aestivum L.</i>	
12007011	а: 1591 в:	Крок	Сториця Storytsia
12007034	а: 1749 в:	Глорія	Бажен Bazhen
12007046	а: 1581 в:	Добірна	Диво Dyvo
13012017	а: 355 в:	Здобуток	Даринка Київська Darynka Kyivs'ka
13012018	а: 355 в:	Лідер	Райгородка Raihorodka
13012025	а: 786 в:	Аграрій	Атей Atey
Пшениця м'яка (яра) Soft Wheat (Spring)		<i>Triticum aestivum L.</i>	
12007051	а: 807 в:	ЦХ 211.13508	ЦХ 21113508 СН 21113508
12007055	а: 807 в:	ЦХ 211.13002	ЦХ 21113002 СН 21113002
Жито посівне (озиме) Rye (Winter)		<i>Secale cereale L.</i>	
11003007	а: 736 в:	004Ж	Сіріус Sirius
Сорго звичайне (двокольорове) Sorghum		<i>Sorghum bicolor (L.) Moench</i>	
12010004	а: 1520 в:	23012	Бянка Bianca
Ячмінь звичайний (ярий) Barley (Spring)		<i>Hordeum vulgare L.</i>	
11012011	а: 793 в:	Лаудіс	Лаудіс 550 Laudis 550
12012013	а: 1420 в:	Майкл	Мікл Mickle
12012020	а: 1581 в:	Козир	Вектор Vektor
13020001	а: 1914 в:	АС 06/659/48/2	Русалка Rusalka
Горох посівний Pea		<i>Pisum sativum L.</i>	
13023001	а: 736 1910 в:	Альфа	Босфор Bosfor
Соняшник однорічний Sunflower		<i>Helianthus annuus L.</i>	
09017213	а: 1055 в:	ПР64ЛЕ20	П64ЛЕ20 Р64ЛЕ20
09017273	а: 485 в:	КСФ 9109	Кодівокс КЛ Codivox CL
09017274	а: 485 в:	КСФ 8424	Кодікап Codicap
10017082	а: 485 в:	КСФ 10124	Крессідія Cressidia
10017085	а: 485 в:	КСФ 11901	Хімалія КЛ Himalia CL
10017174	а: 736 в:	003С	Атілла Atilla
10017175	а: 736 в:	002С	Ауріс Auric Auris

Номер заявки Application number	а: Заявник (код) в: Представник (код) a: Applicant (code) v: Representative (code)	Назва сорту Variety denomination	Назва сорту нова New variety denomination
10017207	а: 1219	HX82748	Естрада
	в:		Estrada
11017031	а: 924	МЖТ40214	MAC 84OP
	в:		MAS 84OR
11017032	а: 924	МЖТ41123	MAC 80IP
	в:		MAS 80IR
11017034	а: 924	МЖТ35228	MAC 95OL
	в:		MAS 95OL
11017036	а: 924	МЖТ44635	MAC 81C
	в:		MAS 81C
11017047	а: 1671	Дайтона	Ягуар 2
	в:		Jaquar II
11017074	а: 1694	Еспера КЛ	IN 5543 IMI
	в:		IN 5543 IMI
11017075	а: 1219	HX82275	СИ Ласкала
	в:		SY Lascala
11017076	а: 1219	HX99146	СИ Куава
	в:		SY Kupava
11017079	а: 1219	HX87258	СИ Карузо
	в:		SY Caruso
11017086	а: 1688	ХФ4078	П64ЛЛ82
	в:		P64LL82
11017088	а: 1688	ХФ4175	П64ЛЛ84
	в:		P64LL84
12017156	а: 1219	HX22211	СИ Естива
	в:		SY Estiva
12017159	а: 1219	HX22313	СИ Експерто
	в:		SY Experto
12017160	а: 1219	HX22304	СИ Фламенко
	в:		SY Flamenco
12017166	а: 806	ЕСХ 1196	ЕС Кандіміс СЛ
	в:		ES Candimis CL
12017167	а: 806	ЕСХ 1161	ЕС Терраміс СЛ
	в:		ES Terramis CL
12017203	а: 1581	Юр'ївсон	Юрсон
	в:		Yurson
12017207	а: 1581	Печеніг	Клад
	в:		Klad
Ріпак (озимий) Rape Seed (Winter)		Brassica napus L.	
09016014	а: 437	ДК Імпала КЛ	Тімос КЛ
	в:		Timos CL
09016161	а: 807	/ВРХ 354/	МАРАФОН
	в:		MARATHON
10016001	а: 844	ДК Імлект КЛ	ДК Імірон КЛ
	в:		DK Imiron CL
10016028	а: 1055	/X08B984I/	ПТ200ЦЛ
	в:		PT200CL
10016064	а: 807	ВРХ 400	ДК Імпрешн КЛ
	в:		DK Impression CL
10016066	а: 807	ВРХ 392	Меріва КЛ
	в:		Meriva CL
11016003	а: 844	ДК Іміон КЛ	ДК Імістар КЛ
	в:		DK Imistar CL
11016004	а: 844	СВХ 216	ДК Екзодіак
	в:		DK Exodiak
12016028	а: 983	ДІЕ712/09	Оттава
	в:		Ottawa
12016029	а: 983	ДСД717/09	Тампа
	в:		Tampa
12016030	а: 983	ДСД009 10	Мемфіс
	в:		Memphis
12016031	а: 983	ДІЕ711/09	Торонто
	в:		Toronto

Номер заявки Application number	а: Заявник (код) в: Представник (код) a: Applicant (code) v: Representative (code)	Назва сорту Variety denomination	Назва сорту нова New variety denomination
12016032	а: 1789 в:	РГ21005	Бергер Berger
12016034	а: 1789 в:	РГ21115	Фенцер Fencer
13040021	а: 1789 в:	РГ21006	Флайер Flyer
13040023	а: 1789 в:	РГ27015	Харпер Harper
13040033	а: 793 в:	ЛЕ11223	Александр Alexander
13040034	а: 1702 в:	Авалон	Параллакс Parallaks
Ріпак (ярий) Rape Seed (Spring)		<i>Brassica napus L.</i>	
12016076	а: 912 в:	ДЛЕ 1251	Культус КЛ Cultus CL
Буряк цукровий Sugar Beet		<i>Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Doell</i>	
10013028	а: 796 в:	ФД 1106	Кандімакс Candimax
10013029	а: 796 в:	ФД 1107	Сігон Cigogne
10013037	а: 1219 в:	НІ 1064	Футура Futura
11013040	а: 1219 в:	ХІ0985	Монсан Monsun
Картопля Potato		<i>Solanum tuberosum L.</i>	
12031002	а: 428 в:	Адмірал	Ажур Azhur
Баклажан Egg Plant, Eggplant		<i>Solanum melongena L.</i>	
05022004	а: 753 в:	Тірренія F1	Тірренія Tirpenia
05022005	а: 753 в:	Анет F1	Анет Anet
11022005	а: 1730 в:	Естелле F1	Естелле Estelle
11022006	а: 1730 в:	Анатолія F1	Анатолія Anatolia
Капуста білоголова White Cabbage		<i>Brassica oleracea L. var. capitata (L.) alba DC.</i>	
11028013	а: 751 в:	Сіркон F1	Сіркон Sircon
11028014	а: 751 в:	Експект F1	Експект Expect
11028015	а: 751 в:	Чекмейт F1	Чекмейт Checkmate
11028016	а: 751 в:	Кебтон F1	Кебтон Cabton
11028017	а: 751 в:	Сінтекс F1	Сінтекс Sintex
11028018	а: 751 в:	Тайфун F1	Тайфун Typhoon
12028007	а: 1833 в:	Артікус F1	Артікус Arcticus
12028008	а: 1833 в:	Хіпо F1	Хіпо Hypo
12028013	а: 1050 в:	ВІЗОДОР	Лексікон Lexicon
12028015	а: 1050 в:	СГВ0348	Сторідор Storidor

Номер заявки Application number	а: Заявник (код) в: Представник (код) a: Applicant (code) v: Representative (code)	Назва сорту Variety denomination	Назва сорту нова New variety denomination
12028017	а: 900 в:	Легат F1	Легат
12028019	а: 900 в:	Негус F1	Legat Negus
96028001	а: 753 в:	Коронет F1	Коронет Coronet
Капуста цвітна Cauliflower		<i>Brassica oleracea L. var. capitata (L.) alba DC.</i>	
12028020	а: 900 в:	Майбах F1	Майбах Maybach
Кукурудза цукрова Sweet Corn		<i>Zea mays L</i>	
12004196	а: 1854 в:	Лакомка	ДН Намисто DN Namysto
Цибуля городня Onion, Echalion		<i>Allium cepa L.</i>	
05041020	а: 753 в:	Соброссо F1	Сабросо
06041017	а: 753 в:	Пандеро F1	Sabroso Пандеро
09041008	а: 753 в:	Каунтач F1	Pandero Каунтач
99041002	а: 753 в:	Універсо F1	Countach Універсо
99041003	а: 753 в:	Комета F1	Universto Комета
Морква Carrot		<i>Daucus sativus (Hoffm.) Roehl.</i>	
05034003	а: 753 в:	Лагуна F1	Лагуна
05034006	а: 753 в:	Сіркана F1	Laguna Сіркана
05034007	а: 753 в:	Колтан F1	Sirkana Колтан
06034014	а: 753 в:	Елеганза F1	Coltan Елеганза
12034015	а: 1730 в:	55 205	Elegance Фідра
Огірок посівний Cucumber		<i>Cucumis sativus L.</i>	
00035002	а: 753 в:	Делпіна F1	Fidra Делпіна
05035018	а: 753 в:	Афіна F1	Delpina Афіна
05035027	а: 753 в:	Доломіт F1	Aphina Доломіт
05035028	а: 753 в:	Спарта F1	Dolomit Спарта
05035029	а: 753 в:	Сатіна F1	Sparta Сатіна
10035010	а: 753 в:	Платіна F1	Satina Платіна
10035011	а: 753 в:	Немо F1	Platina Немо
99035013	а: 753 в:	Гектор F1	Nemo Гектор
Перець однорічний (солодкий) Sweet Pepper, Paprika		<i>Capsicum annuum L.</i>	
05037026	а: 753 в:	Джеміні F1	Gektor Джеміні
07037001	а: 647 964 в:	Наско №5001/06	Gemini Актеон

Номер заявки Application number	а: Заявник (код) в: Представник (код) а: Applicant (code) в: Representative (code)	Назва сорту Variety denomination	Назва сорту нова New variety denomination
11037004	а: 647 964	Талісман F1	Боярд F1
	в:		Boiard F1
12036003	а: 900	Соломон F1	Соломон
	в:		Salomon
94037005	а: 753	Клаудіо F1	Клаудіо
	в:		Claudio
Помідор їстівний Tomato		<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill.	
05040014	а: 753	Солероссо F1	Солероссо
	в:		Solerosso
05040053	а: 753	Дональд F1	Дональд
	в:		Donald
05040056	а: 753	Сомма F1	Сомма
	в:		Somma
05040058	а: 753	Шеді Леді F1	Шеді Леді
	в:		Shady Lady
05040059	а: 753	Тарпан F1	Тарпан
	в:		Tarpan
06040019	а: 753	Лампо F1	Лампо
	в:		Lampo
06040020	а: 753	Ламантин F1	Ламантин
	в:		Lamantin
09040021	а: 753	Грифон F1	Грифон
	в:		Gryphon
10040007	а: 753	Валдай F1	Валдай
	в:		Valday
11040008	а: 753	НУН 03559 ТОФ	Діаграмма
	в:		Diagramma
12040007	а: 1730	73 521 P3	Дофу
	в:		Doufu
12040031	а: 900	СТЕЛЛА РЕД F1	Стелла Ред
	в:		Stella Red
12040032	а: 900	П'єтра Росса F1	П'єтра Росса
	в:		Pietra Rossa
12040036	а: 1730	73-667	Аттія
	в:		Attiya
12040039	а: 900	АФЕН F1	Афен
	в:		Aphen
Редька посівна (редиска) Radish, Garden Radish, European Radish		<i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>radicula</i> Pers.	
05038004	а: 753	Дабел F1	Дабел
	в:		Dabel
07038001	а: 753	Анабель	Аннабель
	в:		Annabel
12038003	а: 1833	Глоріет F1	Глоріет
	в:		Gloriette
Буряк столовий Beetroot, Garden Beet		<i>Beta vulgaris</i> L. ssp. <i>vulgaris</i> var. <i>conditiva</i> Alef.	
12013014	а: 215	Камаро F1	Камаро
	в:		Samaro
Капуста броколі Calabrese, Sprouting Broccoli		<i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>capitata</i> (L.) alba DC.	
12028009	а: 1833	Нексос F1	Нексос
	в:		Naxos
Кавун звичайний Watermelon		<i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai	
05027010	а: 753	Вікторія F1	Вікторія
	в:		Victoria
05027011	а: 753	Монтана F1	Монтана
	в:		Montana
05027012	а: 753	Ред Стар F1	Ред Стар
	в:		Red Star

Номер заявки Application number	а: Заявник (код) в: Представник (код) a: Applicant (code) v: Representative (code)	Назва сорту Variety denomination	Назва сорту нова New variety denomination
08027006	а: 753	Стайл F1	Стайл
	в:		Style
08027021	а: 753	Бостон F1	Бостон
	в:		Boston
98027002	а: 753	Леді F1	Леді
	в:		Lady
99027003	а: 753	Долбі F1	Долбі
	в:		Dolby
Диня звичайна Melon		<i>Melo sativus Sager.ex M.Roem</i>	
06025004	а: 753	Роксолана F1	Роксолана
	в:		Roxolana
06025005	а: 753	Делано F1	Делано
	в:		Delano
10025003	а: 753	Соккар F1	Соккар
	в:		Sokkar
11025004	а: 1740	Медетлі F1	Радміла
	в:		Radmila
Кабачок Vegetable Marrow, Squash		<i>Cucurbita pepo L. var. giromontia Duch.</i>	
00026003	а: 753	Кавілі F1	Кавілі
	в:		Cavili
05026004	а: 753	Сангрум F1	Сангрум
	в:		Sungroom
12026001	а: 1050	Отто F1	Отто
	в:		Otto
12026005	а: 1823	Ніч в П'яченці	Ніч в П'яченці
	в:		Nich v Piachentsi
12026007	а: 1050	ЦА4172	Серена
	в:		Serena
Буряк кормовий Fodder Beet		<i>Beta vulgaris L.</i>	
09046001	а: 421 1245	Фортуна	Славія
	в:		Slaviia
Сорго цукрове Sweet Sorghum		<i>Sorghum saccharatum (L.) Pers.</i>	
12010020	а: 1591	Одк-305В	Одк305В
	в:		Odk305V
12010022	а: 1591	Одк-305А	Одк305А
	в:		Odk305A
12010023	а: 1591	Одк-79В	Одк79В
	в:		Odk79V
12010025	а: 1591	Одк-79А	Одк79А
	в:		Odk79A
Виноград справжній Grape, Grapevine		<i>Vitis vinifera L.</i>	
13304003	а: 1605	Анцеллотта	Анцеллотта червона
	в:		Anchellotta chervona
Троянда Rose		<i>Rosa L.</i>	
11246003	а: 348	Акварель	Акварель Роуз Парк
	в:		Akvarel Rose Park
Смикавець їстівний (чужа) Nufa Sedge, Nut Grass, Yellow Nutsedge		<i>Cyperus esculentus L.</i>	
12436002	а: 348	Скіф'янка	Снігурівський
	в:		Snihurivs`kyi
Хризантема садова Chrysanthemum		<i>Chrysanthemum L.</i>	
12413004	а: 348	Білочка	Осінній Блюз
	в:		Osinnii Bliuz

Номер заявки Application number	а: Заявник (код) в: Представник (код) а: Applicant (code) в: Representative (code)	Назва сорту Variety denomination	Назва сорту нова New variety denomination
Кукурудза звичайна - батьківський компонент Maize, Corn - parental component		<i>Zea mays L</i>	
11004224	а: 1684 в:	Крос 301М стерильна	Крос 301М Kros 301M
11004231	а: 1684 в:	ДК402М стерильна	ДК402М DK402M
11004233	а: 1684 в:	ДК777М стерильна	ДК777М DK777M
12004170	а: 806 в:	ЕГ 7031 х ЕГ 7169	ЕГ7031 ЕГ7169 EG7031 EG7169
12004174	а: 806 в:	ЕГ 7193 х ЕГ 7169	ЕГ7193 ЕГ7169 EG7193 EG7169
12004177	а: 806 в:	ЕГ 2123 х ЕГ 2099	ЕГ2123 ЕГ2099 EG2123 EG2099
12004181	а: 806 в:	ЕГ 7060 х ЕГ 7033	ЕГ7060 ЕГ7033 EG7060 EG7033
12004288	а: 966 в:	М 266 С стерильна	М 266 С M 266 S
12004291	а: 966 в:	М 26 М стерильна	М 26 М M 26 M
Соняшник однорічний - батьківський компонент Sunflower - parental component		<i>Helianthus annuus L.</i>	
10017226	а: 1719 в:	ХАФЛ-1126 А	ХАФЛ 1126А HAFL 1126A
11017103	а: 806 1435 в:	Ф 5 ДН 3 МА	Ф5ДН3МА F5DN3MA
12017147	а: 806 1435 в:	Р 4 НП 8 МЖ	Р4НП8МЖ R4NP8MJ
12017150	а: 806 1435 в:	Р 4 НО 4 М	Р4НО4М R4NO4M
12017151	а: 806 1435 в:	Ф 7 БП 2 ІА	Ф7БП2ІА F7BP2IA
12017153	а: 806 1435 в:	Ф 7 АХ 2 МА	Ф7АХ2МА F7AX2MA
12017179	а: 883 в:	РХА ПЕС 26 1Рф	РХАПЕС261Рф RXAPES261Rf
12017180	а: 883 в:	Б РО 54А СУ	БРО54АСУ BRO54ASU
12017229	а: 1591 в:	Од 5350А х Од 1042Б	Од 5342А Od 5342A
13939018	а: 1468 в:	СНА 058-6	СНА 058 SNA 058
13939019	а: 1468 в:	РНД 044-7-3	РНД 044 RND 044
13939020	а: 806 1435 в:	Ф 5 БД 6 МА	Ф5БД6МА F5BD6MA
13939024	а: 806 1435 в:	РПФ 646 ЖА х СОЛФ 0618 Ж	РПФ646ЖА СОЛФ0618Ж RPF646JA SOLF0618J
Ріпак (озимий) - батьківський компонент Rape Seed (Winter) - parental component		<i>Brassica napus L.</i>	
12016052	а: 1817 в:	ЖР940-38	ЖР940 38 GR940 38

5. ВІДОМОСТІ, ВНЕСЕНІ ДО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА СОРТИ РОСЛИН (РЕЄСТР ПАТЕНТІВ)

5. NOTIFICATIONS LISTED IN THE STATE REGISTER OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS ON PLANT VARIETIES (REGISTER OF PATENTS)

5.1. Відомості про сорти рослин, щодо яких прийнято рішення про державну реєстрацію майнових прав інтелектуальної власності на сорти рослин

5.1. Notifications on plant varieties, for which decision has been adopted on State registration of rights on plant variety and on that listed in the State Register of Intellectual Property Rights for Plant Varieties

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер патенту Number of patent	Дата реєстрації прав Date of rights registration	Дата пріоритету Date of Priority	Назва сорту Variety denomination	Власник сорту (код) Variety owner (code)
Кукурудза звичайна Maize, Corn		<i>Zea mays L.</i>				
08004229	12.12.2008	130256	10.12.2013	12.12.2008	Карахо Karacho	1034
08004230	12.12.2008	130257	10.12.2013	12.12.2008	Бельмондо Belmondo	1034
08004231	12.12.2008	130258	10.12.2013	12.12.2008	Едуардо Eduardo	1034
08004232	12.12.2008	130259	10.12.2013	12.12.2008	Гінко Ginko	1034
Ячмінь звичайний (ярий) Barley (Spring)		<i>Hordeum vulgare L.</i>				
08012006	24.09.2008	130268	28.11.2013	24.09.2008	Крок Krok	356
Соняшник однорічний Sunflower		<i>Helianthus annuus L.</i>				
09017324	01.12.2009	140007	06.02.2014	01.12.2009	EC Amic СЛ ES Amis CL	806
Соя культурна Soya Bean		<i>Glycine max. (L.) Merr.</i>				
09018005	24.11.2009	130267	28.11.2013	24.11.2009	Ромашка Romashka	356
Картопля Potato		<i>Solanum tuberosum L.</i>				
09031004	24.11.2009	130255	22.11.2013	24.11.2009	Білявка Biliavka	320
10031004	02.02.2010	140003	23.01.2014	02.02.2010	Дайдо Dido	1472
10031006	02.02.2010	140004	23.01.2014	02.02.2010	Актрис Actrice	1472
10031007	02.02.2010	140005	23.01.2014	02.02.2010	Метро Metro	1472
Диня звичайна Melon		<i>Melo sativus Sager.ex M.Roem</i>				
10025002	22.04.2010	140002	26.02.2014	22.04.2010	Фантазія Fantaziia	410
Конюшина лучна (червона) Red Clover		<i>Trifolium hybridum L.</i>				
08052001	19.02.2008	140006	03.03.2014	19.02.2008	Тайфун Taifun	600
Абрикос звичайний Apricot		<i>Armeniaca vulgaris Lam.</i>				
11070001	05.01.2011	130250	13.06.2013	05.01.2011	Маїстр Mahistr	1585
11070002	05.01.2011	130251	13.06.2013	05.01.2011	Приусадебний Priusadiebnyi	1585
11070003	05.01.2011	130252	13.06.2013	05.01.2011	Діоніс Dionis	1585
Персик звичайний Peach		<i>Persica vulgaris Mill.</i>				
10079016	23.12.2010	130266	13.06.2013	23.12.2010	Нарядний Нікітський Nariadnyi Nikits'kyi	1585

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер патенту Number of patent	Дата реєстрації прав Date of rights registration	Дата пріоритету Date of Priority	Назва сорту Variety denomination	Власник сорту (код) Variety owner (code)
Гранатник звичайний Pomegranate			<i>Punica granatum L.</i>			
10209002	11.01.2010	130253	13.06.2013	11.01.2010	Нютінський Niutins`kyi	365
10209003	11.01.2010	130254	13.06.2014	11.01.2010	Нікітський Ранній Nikits`kyi Rann	365
Мигдаль звичайний Almond			<i>Amygdalus communis L.</i>			
11215001	05.01.2011	130262	13.06.2013	05.01.2011	Витязь Vytiaz`	1585
Нектарин Nectarine			<i>Prunus persica (L.) Batsch var. nucipersica (Suckow) Schneid.</i>			
11396001	05.01.2011	130263	13.06.2013	05.01.2011	Рубіновий 9 Rubinovyi 9	1585
11396002	05.01.2011	130264	13.06.2013	05.01.2011	Кримчанін Krymchanin	1585
Верба прутівидна Hemp Willow, Osier			<i>Salix L.</i>			
13373002	22.11.2013	140001	28.02.2014	22.11.2013	Вільгельм Wilhelm	1947
Люпин вузьколистий Blue Lupin			<i>Lupinus albus L.</i>			
09056001	17.11.2009	130260	04.12.2013	17.11.2009	Грозинський 9 Hrozyns`kyi 9	320
09056002	17.11.2009	130261	22.11.2013	17.11.2009	Переможець Peremozhets`	320
Персик декоративний Ornamental Peach			<i>Prunus mira Koehne, P. davidiana (carr.) Franch., P. kansuensis Rehd.)</i>			
11359001	01.04.2011	130265	13.06.2013	01.04.2011	Білосніжка Bilosnizhka	1585
Кукурудза звичайна - батьківський компонент Maize, Corn - parental component			<i>Zea mays L</i>			
13909001	30.01.2013	140008	21.03.2014	30.01.2013	K248	1302
13909002	30.01.2013	140009	21.03.2014	30.01.2013	K248 K10 K10	1302

5.2. Відомості про видані патенти на сорти рослин та їх завіреної копії

5.2. Notifications on Plant Variety Patents issued and certified copies thereof

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер Патенту Patent number	Назва сорту Variety denomination	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Дата видачі Date of granting
Пшениця тверда (озима) Durum Wheat (Winter)			<i>Triticum durum</i> Desf.		
07008001	02.03.2007	10802	Лінкор	378	06.02.2014
			Linkor		
07008003	02.03.2007	10803	Крейсер	378	06.02.2014
			Kreiser		
08008001	27.02.2008	110423	Босфор	378 922	06.02.2014
			Bosfor		
08008002	27.02.2008	110424	Гавань	378 922	06.02.2014
			Havan`		
08008003	25.11.2008	130220	Шулиндінка	404	19.03.2014
			Shulyndinka		
Кукурудза звичайна Maize, Corn			<i>Zea mays</i> L.		
09004662	23.11.2009	130058	Кардинал МВ	404	07.02.2014
			Kardynal MV		
09004663	23.11.2009	130059	Серпанок	404	07.02.2014
			Serpanok		
09004664	23.11.2009	130060	Пам'ять Чупікова	404	07.02.2014
			Pam'iat` Chupikova		
09004665	23.11.2009	130061	Русич	404	07.02.2014
			Rusych		
09004666	23.11.2009	130062	Танго МВ	404	07.02.2014
			Tanho MV		
09004667	23.11.2009	130063	Шедевр МВ	404	07.02.2014
			Shedevr MV		
09004668	23.11.2009	130064	Борець МВ	404	07.02.2014
			Borets MV		
Пшениця м'яка (озима) Soft Wheat (Winter)			<i>Triticum aestivum</i> L.		
08007011	22.02.2008	110411	Княгиня Ольга	378 922	06.02.2014
			Kniahynia Ol'ha		
08007012	22.02.2008	110412	Ластівка одеська	378 922	06.02.2014
			Lastivka odes`ka		
08007013	22.02.2008	110413	Журавка одеська	378	06.02.2014
			Zhuravka odes`ka		
08007014	22.02.2008	110414	Лебідка одеська	378	06.02.2014
			Lebidka odes`ka		
08007015	22.02.2008	110415	Голубка одеська	378	06.02.2014
			Holubka odes`ka		
08007016	22.02.2008	110416	Зорепад	378	06.02.2014
			Zorepad		
08007017	22.02.2008	110417	Пилипівка	378	06.02.2014
			Pylupivka		
08007018	22.02.2008	110418	Ватажок	378	06.02.2014
			Vatazhok		
08007019	22.02.2008	110419	Небокрай	378 922	06.02.2014
			Nebokrai		
09007001	25.02.2009	120345	Сейлор	1048	22.01.2014
			Sailor		
09007027	05.06.2009	120364	Етела	1390	03.02.2014
			Etela		
Жито посівне (озиме) Rye (Winter)			<i>Secale cereale</i> L.		
08003009	25.11.2008	130164	Стоір	404	19.03.2014
			Stoir		
Ячмінь звичайний (озимий) Barley (Winter)			<i>Hordeum vulgare</i> L.		
07012006	06.07.2007	110425	Герлах	934	03.02.2014
			Gerlach		

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер Патенту Patent number	Назва сорту Variety denomination	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Дата видачі Date of granting
07012020	26.11.2007	110427	Академічний Akademichnyi	378	06.02.2014
07012022	26.11.2007	110428	Айвенго Aivenho	378	06.02.2014
Ячмінь звичайний (ярий) Barley (Spring)			<i>Hordeum vulgare L.</i>		
08012032	03.12.2008	130248	Армакс Armaks	791 306	26.02.2014
Горох посівний Pea			<i>Pisum sativum L.</i>		
09001001	16.11.2009	130142	Чекригінський Chekryhins`kyi	404	07.02.2014
Соняшник однорічний Sunflower			<i>Helianthus annuus L.</i>		
09017202	04.11.2009	130114	Кочеток Kochetok	404	07.02.2014
09017203	04.11.2009	130115	Сонагро Sonahro	404	07.02.2014
09017204	04.11.2009	130116	Перістр Rehistr	404	07.02.2014
09017205	04.11.2009	130117	Юр'ївський Yurivs`kyi	404	07.02.2014
09017206	04.11.2009	130118	Елітнянський Elitnians`kyi	404	07.02.2014
09017207	04.11.2009	130119	Гайчур Haichur	404 329	07.02.2014
09017208	04.11.2009	130120	Ореол Oreol	404 378	07.02.2014
09017209	04.11.2009	130121	Сібсон Sibson	404 378	07.02.2014
Ріпак (озимий) Rape Seed (Winter)			<i>Brassica napus L. oleifera</i>		
09016095	28.04.2009	130222	Фрідолін Fridolin	1789	10.02.2014
09016096	28.04.2009	130223	Беньямін Benjamin	1789	10.02.2014
Соя культурна Soya Bean			<i>Glycine max (L.) Merr.</i>		
09018010	23.11.2009	130134	Естафета Estafeta	404	07.02.2014
09018011	23.11.2009	130135	Спритна Sprytna	404	07.02.2014
Кукурудза цукрова Sweet Corn			<i>Zea mays L. ssp. saccharata Sturt.</i>		
09032005	23.11.2009	130149	Білявка Biliavka	404	07.02.2014
09032008	07.12.2009	130150	Марічка Marichka	404 311	07.02.2014
Тритикале (яре) Triticale (Spring)			<i>Triticosecale Witt.</i>		
09011004	23.11.2009	130055	Сонцедар харківський Sontsedar kharkivs`kyi	404	07.02.2014
Малина Raspberry			<i>Rubus idaeus L.</i>		
08077004	29.09.2008	130158	Рафцакю Rafzaqu	1310	29.01.2014
Кукурудза звичайна - батьківський компонент Maize, Corn - parental component			<i>Zea mays L.</i>		
10004006	19.02.2010	130066	Харківська 126 М Kharkivs`ka 126 M	404	07.02.2014
10004007	19.02.2010	130067	Харківська 164 М Kharkivs`ka 164 M	404	07.02.2014
10004008	19.02.2010	130068	Харківський 45 М Kharkivs`kyi 45 M	404	07.02.2014

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер Патенту Patent number	Назва сорту Variety denomination	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Дата видачі Date of granting
10004009	19.02.2010	130069	Харківська 164 MB Kharkivs`ka 164 MV	404	07.02.2014
10004053	07.10.2010	130183	ЛСХ344 LSH344	924	13.02.2014
10004054	07.10.2010	130184	ЛДХ1656 LDH1656	924	13.02.2014
10004055	07.10.2010	130185	ЛБХ1534 LBH1534	924	13.02.2014
10004056	07.10.2010	130186	ЛЕХ1773 LEH1773	924	13.02.2014
10004057	07.10.2010	130187	ЛЕН1811 LEN1811	924	13.02.2014
10004058	07.10.2010	130188	ЛФН1963 LFN1963	924	13.02.2014
10004059	07.10.2010	130189	ЛАР1492 ЛАР1490 LAR1492 LAR1490	924	13.02.2014
10004060	07.10.2010	130190	ЛДР1687 ЛДР1689 LDR1687 LDR1689	924	13.02.2014
10004061	07.10.2010	130191	ЛКЮН110 ЛЕН1811 LQN110 LEN1811	924	13.02.2014
10004062	07.10.2010	130192	ЛАР1490 ХЕ006 LAR1490 HE006	924	13.02.2014
10004243	30.11.2010	130075	Лелека М Leleka M	404	07.02.2014
10004246	30.11.2010	130076	Харківська 155 М Kharkivs`ka 155 M	404	07.02.2014
11004005	28.01.2011	130194	ЛСР131 НВІУ0811 LSR131.NVIU0811	924	13.02.2014
11004006	28.01.2011	130195	ЛАР1490 LAR1490	924	13.02.2014
11004007	28.01.2011	130196	ЛБН1564 ЛАН1503 LBN1564.LAN1503	924	13.02.2014
Соняшник однорічний - батьківський компонент Sunflower - parental component			Helianthus annuus L.		
10017042	07.10.2010	130225	ТФС2922 TFC2922	924	13.02.2014
10017043	07.10.2010	130226	ТРІ3169 TRI3169	924	13.02.2014
10017178	30.11.2010	130093	Сх 035 А Skh 035 A	404	07.02.2014
10017179	30.11.2010	130094	Мх 845 А Mkh 845 A	404	07.02.2014
10017180	30.11.2010	130095	Х 06135 В Kh 06135 V	404	07.02.2014
11017006	28.01.2011	130231	ПХМ711РМ PHM711RM	924	13.02.2014
11017008	28.01.2011	130233	ТФС2281 TFC2281	924	13.02.2014

5.3. Відомості щодо припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин та визнання їх не чинними

5.3. Notifications on terminating the validity of proprietary rights of intellectual property for plant variety and acknowledging expiration thereof

Номер патенту Number of patent	Назва сорту Variety denomination	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Дата реєстрації припинення права Registration date of the right termination	Підстава On the basis of
Соняшник однорічний Sunflower			<i>Helianthus annuus L.</i>	
08281	СВ 25А SV 25A	1107	30.01.2014	Наказ Держветфітослужби від 30.01.2014 № 244
10872	Європа Yevropa	1107	30.01.2014	Наказ Держветфітослужби від 30.01.2014 № 244
Кмин звичайний Caraway			<i>Carum carvi L.</i>	
08697	Надійний Nadiinyi	418	30.01.2014	Наказ Держветфітослужби від 30.01.2014 № 244
Помідор їстівний Tomato			<i>Solanum lycopersicum L.</i>	
09103	Художник Khudozhnyk	402 822	30.01.2014	Наказ Держветфітослужби від 30.01.2014 № 244
09104	Алтей Altei	402 822	30.01.2014	Наказ Держветфітослужби від 30.01.2014 № 244
09105	Лапочка Lapochka	402 822	30.01.2014	Наказ Держветфітослужби від 30.01.2014 № 244
09106	Золотий поток Zolotoi potok	402 822	30.01.2014	Наказ Держветфітослужби від 30.01.2014 № 244
Грчиця біла White Mustard			<i>Sinapis alba L.</i>	
08345	Подольянка Podolianka	418	30.01.2014	Наказ Держветфітослужби від 30.01.2014 № 244
Соняшник однорічний - батьківський компонент Sunflower - parental component			<i>Helianthus annuus L.</i>	
110179	ЛС56 LS 56	1107	30.01.2014	Наказ Держветфітослужби від 30.01.2014 № 244

5.7. Інші відомості, внесені до Державного реєстру прав інтелектуальної власності на сорти рослин

5.7. Other notifications as listed in the State Register of Intellectual Property Rights on Plant Varieties (Register of Patents)

Перелік сортів рослин, внесених до Реєстру патентів, правонаступником яких є Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України (код 1698), відповідно до наказу Держветфітослужби України від 07.02.2014 року № 261

List of Plant Varieties as included into the Register of Patents and to be inherited by the Irrigated Farming Institute of National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine (code 1698) according to the Order of State Veterinary and Phytosanitary Service of Ukraine No. 261 of February 7, 2014

№ з/п	Культура Crop	Назва сорту Variety denomination	Номер заявки Application number	Рік реєстрації Registration year
1.	Пшениця м'яка (озима)	Овідій	05007067	2009
2.	Пшениця м'яка (озима)	Кохана	05007068	2009
3.	Пшениця м'яка (озима)	Благо	07007058	2011
4.	Пшениця м'яка (озима)	Марія	08007055	2013
5.	Пшениця тверда (озима)	Андромеда	08008004	2013
6.	Кукурудза звичайна	Азов	04004050	2007
7.	Кукурудза звичайна	Асканія	08004145	2013
8.	Соя культурна	Діона	03018016	2007
9.	Соя культурна	Даная	05018011	2010
10.	Соя культурна	Аратта	08018011	2013
11.	Люцерна посівна	Зоряна	05058002	2008
12.	Житняк	Кімбурн	05103002	2008
13.	Кострець безостий	Сиваш	05065001	2008
14.	Кострець безостий	Борозенський 7	05065003	2009
15.	Грястиця збірна	Інгулка 17	05049003	2009
16.	Помідор їстівний	Кіммерієць	99040019	2008
17.	Помідор їстівний	Наддніпрянський 1	03040037	2006
18.	Помідор їстівний	Інгулецький	06040035	2009
19.	Помідор їстівний	Сармат	06040034	2009
20.	Помідор їстівний	Тайм	07040007	2010
21.	Помідор їстівний	Легінь	09040034	2013
22.	Бавовник звичайний	Підозерський 4	03366001	2007

Перелік сортів рослин, внесених до Реєстру патентів, правонаступником яких є Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України (код 1809) відповідно до наказу Держветфітослужби України від 03.03.2014 року № 350

List of Plant Varieties as included into the Register of Patents and to be inherited by the Agricultural Microbiology and Agro-Industry Production Institute of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine (code 1809) according to the Order of State Veterinary and Phytosanitary Service of Ukraine No. 350 of March 3, 2014

Культура Crop	Назва сорту Variety denomination	Номер заявки Application number	Рік реєстрації Registration year
Овес посівний	Зірковий	04005005	2008
Овес посівний	Парламентський	05005001	2008
Люпин білий	Щедрий 50	05055002	2008
Люпин жовтий	Прогресивний	05057002	2008

Перелік сортів рослин, внесених до Реєстру патентів, правонаступником яких є Національний науковий центр «Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України» (код 1626) відповідно до наказу Держветфітослужби України від 07.02.2014 № 261

List of Plant Varieties as included into the Register of Patents and to be inherited by the National Research Center 'Irrigated Farming Institute of National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine' (code 1626) according to the Order of State Veterinary and Phytosanitary Service of Ukraine No. 261 of February 7, 2014

№ з/п	Номер заявки Application number	Назва сорту Variety denomination	Культура Crop	Рік реєстрації Registration year
1.	05002002	Оранта	Гречка їстівна	2007
2.	07002003	Син-3/02	Гречка їстівна	2011
3.	03003001	Сіверське	Жито посівне озиме	2007
4.	99003002	Інтенсивне 99	Жито посівне озиме	2008
5.	04087003	Перлина	Квасоля звичайна (зернова)	2007
6.	07087005	Щедра	Квасоля звичайна (зернова)	2011
7.	05052001	Полісянка	Конюшина лучна	2008
8.	03004013	Депутат МВ	Кукурудза звичайна	2008
9.	03004014	Говерла МВ	Кукурудза звичайна	2008
10.	03004015	Случ СВ	Кукурудза звичайна	2008
11.	04004042	Остер СВ	Кукурудза звичайна	2008
12.	04004043	Буг СВ	Кукурудза звичайна	2008
13.	07004029	Остреч СВ	Кукурудза звичайна	2011
14.	07004030	Смотрич МВ	Кукурудза звичайна	2011
15.	08004001	Ятрань МВ	Кукурудза звичайна	2011
16.	08004002	Хорол СВ	Кукурудза звичайна	2012
17.	09004270	Ук 2 УВ	Кукурудза звичайна (батьківські компоненти)	2011
18.	09004271	Ма 21 МВ	Кукурудза звичайна (батьківські компоненти)	2010
19.	09004272	УкПг 67 С	Кукурудза звичайна (батьківські компоненти)	2010
20.	09004273	Антей М	Кукурудза звичайна (батьківські компоненти)	2010
21.	09004274	Граніт М	Кукурудза звичайна (батьківські компоненти)	2010

№ з/п	Номер заявки Application number	Назва сорту Variety denomination	Культура Crop	Рік реєстрації Registration year
22.	09004275	Фортуна С	Кукурудза звичайна (батьківські компоненти)	2010
23.	09004276	УкПг 101 М	Кукурудза звичайна (батьківські компоненти)	2010
24.	09004277	УкПг 102 М	Кукурудза звичайна (батьківські компоненти)	2010
25.	09004278	УкПг103 С	Кукурудза звичайна (батьківські компоненти)	2010
26.	09004279	Президент С	Кукурудза звичайна (батьківські компоненти)	2010
27.	09004280	Псьол М	Кукурудза звичайна (батьківські компоненти)	2010
28.	09004281	Ук 1712 СВ	Кукурудза звичайна (батьківські компоненти)	2011
29.	09004282	Ук 26 СВ	Кукурудза звичайна (батьківські компоненти)	2010
30.	09004283	Ук 62 МВ	Кукурудза звичайна (батьківські компоненти)	2010
31.	03055001	Серпневий	Люпин білий	2006
32.	05055001	Макарівський	Люпин білий	2008
33.	09055002	Чабанський	Люпин білий	2013
34.	04056001	Зірковий	Люпин вузьколистий	2007
35.	05056002	Пелікан	Люпин вузьколистий	2008
36.	08057001	Світязь	Люпин жовтий	2011
37.	05462001	Наречена Півночі	Люцерна жовта (серповидна)	2007
38.	06094002	Блакитно помаранчевий	Льон низький, кудряш	2007
39.	06094003	Симпатик	Льон низький, кудряш	2007
40.	10094001	Оригінал	Льон низький, кудряш	2012
41.	05061001	Лагідна	Пажитниця багатоквіткова	2009
42.	05062010	Мрія	Пажитниця багаторічна	2010
43.	02006003	Омріяне	Просо посівне	2005
44.	05007032	Аналог	Пшениця м'яка озима	2009
45.	05007033	Бенефіс	Пшениця м'яка озима	2009
46.	09007035	Краєвид	Пшениця м'яка озима	2013
47.	03007034	Недра	Пшениця м'яка яра	2007
48.	99007010	Скороспілка 99	Пшениця м'яка яра	2007
49.	01018003	Єлена	Соя культурна	2006
50.	04018010	Анжеліка	Соя культурна	2007
51.	05018012	Ворскла	Соя культурна	2008
52.	05018013	Легенда	Соя культурна	2009
53.	07018012	Сузір'я	Соя культурна	2011
54.	07018013	Вільшанка	Соя культурна	2012
55.	09018012	Хвиля	Соя культурна	2013
56.	09018013	Сіверка	Соя культурна	2013
57.	97018008	Київська 98	Соя культурна	2006
58.	98018003	Устя	Соя культурна	2006
59.	05049002	Українка	Грястиця збірна	2013
60.	05054002	Катріна	Костриця лучна	2013
61.	05065002	Арсен	Стоколос безостий	2013

6. ВІДОМОСТІ, ВНЕСЕНІ ДО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ СОРТІВ РОСЛИН, ПРИДАТНИХ ДЛЯ ПОШИРЕННЯ В УКРАЇНІ (РЕЄСТР СОРТІВ)

6. NOTIFICATIONS LISTED IN THE STATE REGISTER OF PLANT VARIETIES SUITABLE FOR DISSEMINATION IN UKRAINE (REGISTER OF VARIETIES)

6.1. Відомості про сорти рослин, щодо яких прийнято рішення про державну реєстрацію прав на сорт та внесених до Державного реєстру сортів рослин, придатних до поширення в Україні

6.1. Notifications on plant varieties, for which decision has been adopted on State registration of rights on plant variety and on that listed in the State Register of Plant Varieties Suitable for Dissemination in Ukraine

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата пріоритету Date of Priority	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)
Гречка їстівна Buckwheat			Fagopyrum esculentum Moench		
09002002	07.03.2014	16.10.2009	Софія Sofia	1117	1117
Кукурудза звичайна Maize, Corn			Zea mays L.		
09004628	03.03.2014	30.11.2009	ДКС4608	844	844
09004630	03.03.2014	30.11.2009	ДКС4608 ДКС4014	844	844
09004631	03.03.2014	30.11.2009	ДКС4014 ДКС3014	844	844
09004634	03.03.2014	30.11.2009	ДКС3014 ДКС4515	844	844
09004635	03.03.2014	30.11.2009	ДКС4515 ДКС4408	844	844
09004636	03.03.2014	30.11.2009	ДКС4408 ДКС3507	844	844
09004637	03.03.2014	30.11.2009	ДКС3507 ДКС3409	844	844
09004640	03.03.2014	30.11.2009	ДКС3409 ДКС3912	844	844
09004641	03.03.2014	30.11.2009	ДКС3912 ДКС3717	844	844
09004734	26.02.2014	30.11.2009	ДКС3717 СЛ Багато	1034	1034
09004746	13.03.2014	01.12.2009	SL Bahato Камаріллас	938	938
09004747	13.03.2014	01.12.2009	Kamarillas Корифей	938	938
09004748	13.03.2014	01.12.2009	Согурфее Сільвініо	938	938
10004037	03.03.2014	13.07.2010	Silvinio СИ Новатор	1219	1219
10004038	26.02.2014	13.07.2010	SY Novator СИ Нікель	1219	1219
10004039	03.03.2014	13.07.2010	SY Nickel СИ Ондіна	1219	1219
10004042	06.03.2014		SY Ondina MAC 53B	924	924
10004043	06.03.2014		MAS 53B MAC 41B	924	924
10004046	06.03.2014		MAS 41B MAC 25T	924	924
10004047	17.03.2014		MAS 25T MAC 26B	924	924
10004048	17.03.2014		MAS 26B MAC 23K	924	924
10004052	17.03.2014		MAS 23K Пріоріти	924	924
10004103	14.03.2014	03.11.2010	Priority HC 2622	879 1210	879 1210
10004104	15.03.2014	03.11.2010	NS 2622 HC 2032	879 1210	879 1210
			NS 2032		

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата пріоритету Date of Priority	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)		Власник сорту (код) Variety owner (code)	
10004105	17.03.2014	03.11.2010	HC 2610	879	1210	879	1210
10004106	14.03.2014	03.11.2010	NS 2610 HC 2612 NS 2612	879	1210	879	1210
10004108	03.03.2014	10.11.2011	Бресці KC Bressi CS	485		485	
10004109	03.03.2014	10.11.2011	KCM 6509	485		485	
10004110	03.03.2014	10.11.2011	CSM 6509 KCM 3509	485		485	
10004111	17.03.2014	10.11.2011	CSM 3509 Тессалі	485		485	
10004112	03.03.2014	10.11.2011	Tessali KCM 7713	485		485	
10004113	03.03.2014	10.11.2011	CSM 7713 KCM 7119	485		485	
10004114	03.03.2014	10.11.2011	CSM 7119 KCM 7117	485		485	
10004152	04.03.2014	25.11.2010	CSM 7117 ЕС Рейнджер	806		806	
10004153	06.03.2014	25.11.2010	ES Ranger ЕС Кубус	806		806	
10004156	06.03.2014	25.11.2010	ES Cubus ЕС Сафарі	806		806	
10004157	06.03.2014	25.11.2010	ES Saphari ЕС Зізу	806		806	
10004232	06.03.2014		ES Zizou ЛГ30360	793		793	
10004234	06.03.2014		LG30360 ЛГ30310	793		793	
10004236	06.03.2014		LG30310 ЛГ30288	793		793	
10004237	06.03.2014		LG30288 ЛГ30290	793		793	
10004238	06.03.2014		LG30290 Адевей	793		793	
10004248	03.03.2014	30.11.2010	Adevey Сурреал	918		918	
10004251	03.03.2014	30.11.2010	Surreal Сумбра	918		918	
10004252	03.03.2014	30.11.2010	Sumbra ДС0336	918		918	
10004259	03.03.2014	30.11.2010	DS0336 ДС0306	918		918	
10004280	03.03.2014	03.12.2010	DS0306 СИ Аладіум	1219		1219	
10004282	03.03.2014	03.12.2010	SY Aladium СИ Дельван	1219		1219	
10004284	03.03.2014	03.12.2010	SY Delvan СИ Унітоп	1219		1219	
10004286	03.03.2014	03.12.2010	SY Unitor СИ Батанга	1219		1219	
10004291	03.03.2014	14.12.2010	SY Batanga Десперадо	1034		1034	
10004292	03.03.2014	14.12.2010	Desperado Окато	1034		1034	
			Okato				
Пшениця м'яка (яра) Soft Wheat (Spring)				<i>Triticum aestivum L.</i>			
10007048	13.03.2014	05.11.2010	Улюблена	404		404	
			Uliublena				
Сорго звичайне (двокольорове) Sorghum				<i>Sorghum bicolor L.</i>			
09064008	03.03.2014		KCC29	485		485	
			CSS29				

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата пріоритету Date of Priority	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)		Власник сорту (код) Variety owner (code)	
09064009	03.03.2014		KCC19	485		485	
10064004	27.03.2014	29.11.2010	CSS19 MP Еклінс MR Eclipse	1520		1520	
10064005	04.03.2014	29.11.2010	Арміда Armida	806		806	
10064007	06.03.2014	29.11.2010	ЕС Арматан ES Harmattan	806		806	
Ячмінь звичайний (ярий) Barley (Spring)			Hordeum vulgare L.				
09012020	17.03.2014	01.12.2009	Натасія Nastaja	824	1037	824	1037
10012012	27.03.2014	24.11.2010	Барвистий Barvystyi	306		306	
10012026	13.03.2014	30.11.2010	Алегро Alehro	404		404	
10012029	13.03.2014	30.11.2010	Аграрій Ahrarii	404		404	
Горох посівний Pea			Pisum sativum L.				
09001003	12.03.2014	27.11.2009	Саламанка Salamanka	912		912	
10001001	17.03.2014	30.11.2010	Слован Slovan	880		880	
10001002	13.03.2014	30.11.2010	Меценат Metsenat	404		404	
Квасоля звичайна (зернова) French Bean			Phaseolus vulgaris L.				
11087001	27.03.2014	10.03.2011	Галактика Halaktyka	1669		1669	
Соняшник однорічний Sunflower			Helianthus annuus L.				
08017098	13.03.2014		Наполі Napoli	1219		1219	
08017103	03.03.2014		Трансол Transol	1219		1219	
08017104	17.03.2014		Торо Toro	1227		1227	
08017105	17.03.2014		Аміго Amigo	1227		1227	
09017245	21.03.2014	30.11.2009	КС 104 QC 104	883		883	
09017269	21.03.2014	16.12.2009	КС105 QC105	883		883	
09017327	27.03.2014		Хайсан 204 Khaisan 204	1466		1466	
10017036	03.03.2014	02.08.2010	Босфора Bosfora	1219		1219	
10017037	03.03.2014	02.08.2010	НК Ададжіо NK Adagio	1219		1219	
10017038	17.03.2014	07.10.2010	MAC 82A MAS 82A	924		924	
10017039	17.03.2014		MAC 87IP MAS 87IR	924		924	
10017070	14.03.2014	03.11.2010	НС Х 187 NS H 187	879	1210	879	1210
10017071	14.03.2014	03.11.2010	НС Х 195 NS H 195	879	1210	879	1210
10017072	14.03.2014	03.11.2010	НС Х 6341 NS H 6341	879	1210	879	1210
10017073	14.03.2014	03.11.2010	НС Х 6343 NS H 6343	879	1210	879	1210
10017074	14.03.2014	03.11.2010	НС ФЕЛІКС NS FELIX	879	1210	879	1210

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата пріоритету Date of Priority	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)		Власник сорту (код) Variety owner (code)	
10017075	14.03.2014	03.11.2010	НС Х 6593	879	1210	879	1210
			NS H 6593				
10017081	04.03.2014	10.11.2011	КСФ 10113	485		485	
			CSF 10113				
10017082	17.03.2014	10.11.2011	Крессідія	485		485	
			Cressidia				
10017083	03.03.2014	10.11.2011	КСФ 10116	485		485	
			CSF 10116				
10017084	04.03.2014	10.11.2011	КСФ 11902	485		485	
			CSF 11902				
10017085	17.03.2014	10.11.2011	Хіمالія КЛ	485		485	
			Himalia CL				
10017134	06.03.2014	25.11.2010	ЛГ5400ХО	793		793	
			LG5400HO				
10017144	26.03.2014	25.11.2010	Равенна	1517		1517	
			Ravenna				
10017146	26.03.2014	25.11.2010	Флоренція	1517		1517	
			Florentsia				
10017147	28.03.2014	25.11.2010	Венеція	1517		1517	
			Venetsiia				
10017148	26.03.2014	25.11.2010	Мілан	1517		1517	
			Milan				
10017149	03.03.2014	26.11.2010	Хайсан 231 КЛ ВО	1520		1520	
			Khaisan 231 KL VO				
10017162	04.03.2014	29.11.2010	ЕС Дома	806		806	
			ES Doma				
10017170	04.03.2014	29.11.2010	ЕС Балістік СЛ	806		806	
			ES Balistic CL				
10017171	04.03.2014	29.11.2010	ЕС Артїк	806		806	
			ES Artic				
10017172	04.03.2014	29.11.2010	ЕС Ванілла	806		806	
			ES Vanilla				
10017173	04.03.2014	29.11.2010	ЕС Бесана	806		806	
			ES Besana				
10017187	13.03.2014	30.11.2010	Златсон	404		404	
			Zlatson				
10017192	13.03.2014	30.11.2010	Батяня	404		404	
			Batania				
10017197	03.03.2014	30.11.2010	8Х570КЛ	918		918	
			8H570CL				
10017205	03.03.2014	03.12.2010	Санбро МР	1219		1219	
			Sanbro MR				
10017206	05.03.2014	03.12.2010	СИ Сабтіл	1219		1219	
			SY Subtil				
10017207	17.03.2014	03.12.2010	Естрада	1219		1219	
			Estrada				
10017208	03.03.2014	03.12.2010	Пактера	1219		1219	
			Pactera				
10017209	04.03.2014	03.12.2010	Санай МР	1219		1219	
			Sanay MR				
10017210	03.03.2014	03.12.2010	СИ Еденіс	1219		1219	
			SY Edenis				
Ріпак (ярий)			Brassica napus L. oleifera				
Rape Seed (Spring)							
08016061	07.03.2014		Лунеді	983		983	
			Lunedie				
09016183	27.03.2014		Хіола 571 КЛ	1464		1464	
			Hyola 571 CL				
09016184	27.03.2014		Хіола 61	1464		1464	
			Hyola 61				
10016060	26.02.2014	26.11.2010	Хіола 433	1520		1520	
			Hyola 433				
10016069	12.03.2014	01.12.2010	Макро	912		912	
			Makro				
10016070	12.03.2014	01.12.2010	Ахат	912		912	
			Achat				

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата пріоритету Date of Priority	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)		Власник сорту (код) Variety owner (code)	
Соя культурна Soya Bean			Glycine max (L.) Merr.				
08018015	26.02.2014		Кент	1034		1034	
08018016	26.02.2014		Kent Кардифф	1034		1034	
10018005	04.03.2014	25.11.2010	Cardiff Алігатор	806		806	
10018007	14.03.2014	29.11.2010	Aligator Опус	142		142	
10018011	04.03.2014	29.11.2010	Opus Сігалія	1194		1194	
10018012	04.03.2014	29.11.2010	Sigalia Сінара	1194		1194	
10018013	04.03.2014	29.11.2010	Sinara Султана	1194		1194	
10018014	04.03.2014		Sultana Галлек	807		807	
10018015	04.03.2014	30.11.2010	Gallec Опалін	807		807	
10018017	14.03.2014	30.11.2010	Opaline Брюненсіс	142		142	
Суріпиця звичайна (озима) Rocket-cress (Winter)			Barbarea vulgaris R. Br.				
09145001	20.01.2014	16.12.2009	Раміра	1669	348	1669	348
Ramira							
Буряк цукровий Sugar Beet			Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Doell.				
08013024	05.03.2014		NI 0835	1219		1219	
09013029	18.02.2014	30.11.2009	NI 0835 Тіза	796		796	
09013031	18.02.2014	30.11.2009	Tisza Іпель	796		796	
10013024	11.03.2014		Ipel ВАВІЛОВ	1304		1304	
10013025	11.03.2014	30.11.2010	WAWILOW ЯШИН	1304		1304	
10013026	11.03.2014		JASCHIN БАСІЛІУС	1304		1304	
10013027	11.03.2014		BASILIUS ЯРОСЛАВ	1304		1304	
10013035	06.03.2014		JAROSLAV СИ Бадіа	1219		1219	
SY Badia							
Картопля Potato			Solanum tuberosum L.				
09031004	19.02.2014	24.11.2009	Білявка	320		320	
10031012	26.02.2014	22.11.2010	Biliavka Лаперла	801		801	
10031013	26.02.2014	22.11.2010	Laperla Лабелла	801		801	
10031014	26.02.2014	22.11.2010	Labella Наташа	1508		1508	
10031016	27.03.2014	22.11.2010	Natascha Летана	347		347	
10031017	27.03.2014	22.11.2010	Lietana Чарунка	347		347	
10031018	27.03.2014	24.11.2010	Charunka Арія	347		347	
10031019	28.03.2014	24.11.2010	Ariia Случ	347		347	
Sluch							

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата пріоритету Date of Priority	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)
Баклажан Egg Plant, Eggplant			<i>Solanum melongena L.</i>		
09022004	24.02.2014		Ітака F1 Itaca F1	744	744
Капуста білоголова White Cabbage			<i>Brassica oleracea L. var. alba DC.</i>		
08028011	19.03.2014		Василина Vasylyna	343	343
09028027	24.02.2014		Зеніт F1 Zennith F1	744	744
09028028	24.02.2014		PX 05843338 F1 RKh 05843338 F1	744	744
10028002	06.03.2014		Браксан F1 Braхан F1	1050	1050
10028003	04.03.2014		Веронор F1 Veronor F1	1050	1050
10028004	05.03.2014		Циклон F1 Cyclone F1	751	751
10028005	05.03.2014		Джубілі F1 Jubilee F1	751	751
11028009	17.03.2014	18.04.2011	Орієнта F1 Orienta F1	1562	1562
11028015	06.03.2014		Чекмейт Checkmate	751	751
11028016	06.03.2014		Кебтон Cabton	751	751
11028017	06.03.2014		Сінтекс Sintex	751	751
11028019	05.03.2014		Байонет F1 Bajonet F1	751	751
11028020	05.03.2014		Карафлекс F1 Caraflex F1	751	751
11028025	26.02.2014		Джетодор F1 Jetodor F1	1050	1050
12028007	17.03.2014		Артікус Arcticus	1833	1833
12028008	17.03.2014		Хіпо Huroo	1833	1833
Капуста червоноголова Red Cabbage			<i>Brassica oleracea L. var. rubra DC.</i>		
11030002	05.03.2014		Ранчеро F1 Ranchero F1	751	751
11030003	05.03.2014		Клімаро F1 Klimaro F1	751	751
Капуста кольрабі Kohlrabi			<i>Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. gongylodes L.</i>		
11105001	27.12.2013		Колібри Kolibri	751	751
11105002	27.12.2013		Коріст Korist	751	751
Капуста брюссельська Brussels Sprouts			<i>Brassica oleracea L. var. gemmifera DC.</i>		
11149001	27.12.2013		Ірен Irene	751	751
Капуста цвітна Cauliflower			<i>Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis</i>		
09029004	24.02.2014		Фрідом F1 Freedom F1	744	744
09029005	24.02.2014		Кердос F1 Kerdos F1	744	744
11029002	05.03.2014		Вероніка F1 Veronica F1	751	751
11029003	05.03.2014		Овієдо F1 Oviedo F1	751	751

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата пріоритету Date of Priority	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)
11029004	05.03.2014		Старгейт F1	751	751
11029005	05.03.2014		Stargate F1 Балбоа F1	751	751
11029008	04.03.2014		Balboa F1 Альдрін F1	1050	1050
11029009	04.03.2014		Aldrin F1 Аероспейс F1	1050	1050
13101001	07.03.2014		Aerospace F1 Ванза	658	658
13101002	07.03.2014		Vanza Місора	658	658
Кукурудза цукрова Sweet Corn			<i>Zea mays L. ssp. saccharata Sturt.</i>		
10032001	04.03.2014		Світстар F1	1050	1050
10032003	04.03.2014		Sweetstar F1 Старшайн F1	1050	1050
10032004	04.03.2014		Starshine F1 Шайнрок F1	1050	1050
10032005	04.03.2014		Shinerock F1 ГСС 1477 F1	1050	1050
10032011	13.03.2014	27.12.2010	GSS 1477 F1 МС 12	404	404
10032012	13.03.2014	27.12.2010	MS 12 МС 401	404	404
10032013	13.03.2014	27.12.2010	MS 401 Соло F1	404	404
Цибуля порей Leek			<i>Allium porrum L.</i>		
11175002	27.12.2013		Джампер Jumper	751	751
Цибуля городня Onion, Echalion			<i>Allium cepa L.</i>		
10041003	05.03.2014	30.11.2010	Центуріон F1	751	751
10041005	05.03.2014		Centurion F1 Стур ВС 20	751	751
11041015	05.03.2014		Stur BC 20 Вайт Вінг F1	751	751
11041016	05.03.2014		White Wing F1 Катінка F1	751	751
11041017	05.03.2014		Katinka F1 Шерман F1	751	751
11041019	05.03.2014		Sherman F1 Ред Рум F1	751	751
11041020	05.03.2014		Red Rum F1 Айсперл F1	751	751
11041021	05.03.2014		Icepearl F1 Хієло	751	751
Морква Carrot			<i>Daucus carota L.</i>		
09034009	24.02.2014		Карведжо	744	744
09034010	24.02.2014		Carvejo Карболі	744	744
09034012	24.02.2014		Carboli Санта Круз F1	744	744
10034001	05.03.2014	30.11.2010	Santa Cruz F1 Кордоба F1	751	751
10034002	05.03.2014		Cordoba F1 Кардіф F1	751	751
11034002	17.03.2014	18.04.2011	Cardiff F1 Люсія F1	1562	1562
11034014	05.03.2014		Lucia F1 Ньюкасл F1	751	751
			Newcastle F1		

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата пріоритету Date of Priority	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)
Огірок посівний Cucumber			<i>Cucumis sativus L.</i>		
09035012	24.02.2014		Магдалена F1 Magdalena F1	744	744
12035007	03.03.2014		ЕПСІЛОН EPSILON	1050	1050
13110002	07.03.2014		Седрік Cedrik	840	840
13110003	07.03.2014		Сігурд Sigurd	840	840
13110004	07.03.2014		Дерія Derya	840	840
13110005	07.03.2014		Тумі Tumi	840	840
Перець однорічний (солодкий) Sweet Pepper, Paprika			<i>Capsicum annuum L.</i>		
09037017	24.02.2014		Арістотель Х3Р F1 Aristotle X3R F1	744	744
09037019	24.02.2014		Притавіт F1 Pritavit F1	744	744
09037021	24.02.2014		Флексум F1 Flexum F1	744	744
09037022	24.02.2014		Джипсі F1 Gypsy F1	744	744
09037024	17.03.2014	30.11.2009	Етеле Etele	1460	1460
11037007	27.12.2013		Турбін Turbine	751	751
13113001	07.03.2014		Лотта Lotta	840	840
13113002	07.03.2014		Ведрана Vedrana	840	840
13113003	07.03.2014		Яніка Yanika	658	658
13113004	07.03.2014		Катан Katan	658	658
Помідор їстівний Tomato			<i>Solanum lycopersicum L.</i>		
08040061	07.03.2014		Пандароза Pandarosa	744	744
08040062	24.02.2014		Розаліса F1 Rosalisa F1	744	744
08040067	19.03.2014		Миролюбівський Myroliubivskyi	343	343
09040055	24.02.2014		Велоз F1 Veloz F1	744	744
09040056	24.02.2014		Хердон F1 Herdon F1	744	744
09040057	24.02.2014		ПС 02431185 F1 PS 02431185 F1	744	744
09040058	24.02.2014		Пулрекс F1 Pulrex F1	744	744
09040059	24.02.2014		Таня F1 Tanya F1	744	744
09040060	24.02.2014		Дочет F1 Docet F1	744	744
09040061	24.02.2014		Монті F1 Monty F1	744	744
11040015	03.03.2014		Сафаікс F1 Safaix F1	1050	1050
11040024	07.03.2014	30.11.2011	Мерліс Merlice	744	744
11040026	07.03.2014	30.11.2011	Форонті Foronti	744	744
11040027	07.03.2014	30.11.2011	Старбак Starbuck	744	744

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата пріоритету Date of Priority	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)
12040010	17.03.2014		Мішель F1	1833	1833
12040011	17.03.2014		MICHELE F1		
			Пінк Буш F1	1833	1833
13115012	07.03.2014		PINK BUSH F1		
			Афамія	840	840
13115013	07.03.2014		Afamia		
			Дімероза	840	840
13115014	07.03.2014		Dimerosa		
			Фізума	840	840
13115015	07.03.2014		Fizuma		
			Кітару	658	658
13115016	07.03.2014		Kitaru		
			Кібо	658	658
			Kibo		
Редька посівна (редиска) Radish, Garden Radish, European Radish				Raphanus sativus L. var. sativus	
11038005	05.03.2014		Ролекс F1	751	751
			Rolex F1		
12038003	17.03.2014		Глорієт	1833	1833
			Gloriette		
Квасоля звичайна (овочева) French Bean				Phaseolus vulgaris L.	
10087003	03.03.2014		Палаті	1050	1050
			Palati		
Капуста пекінська Chinese Cabbage				Brassica rapa L. var. pekinensis (Lour.) Kitam.	
11152003	27.03.2014	28.09.2011	Віні F1	1650	1650
			Vili F1		
11152004	27.03.2014	28.09.2011	Саммер Хайленд F1	1650	1650
			Summer Highland F1		
Капуста броколі Calabrese, Sprouting Broccoli				Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. cymosa Duch.	
12028009	17.03.2014		Нексос	1833	1833
			Naxos		
Кавун звичайний Watermelon				Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai.	
09027017	07.03.2014		Колізей F1	744	744
			Colosseo F1		
09027018	24.02.2014		Меланія F1	744	744
			Melania F1		
09027019	24.02.2014		Фенвей F1	744	744
			Fenway F1		
11027002	26.02.2014		Соренто F1	1050	1050
			Sorento F1		
Диня звичайна Melon				Cucumis melo L.	
10025002	09.01.2014	22.04.2010	Фантазія	410	410
			Fantaziia		
11025002	07.03.2014		Оксана	840	840
			Oksana		
Кабачок Vegetable Marrow, Squash				Cucurbita pepo L.var. giromontia Duch.	
09026005	24.02.2014		Голд Раш F1	744	744
			Gold Rush F1		
09026006	24.02.2014		Ам'яд F1	744	744
			Amjad F1		
Конюшина лучна (червона) Red Clover				Trifolium pratense L.	
08052001	03.03.2014	19.02.2008	Тайфун	600	600
			Taifun		
Буяк кормовий Fodder Beet				Beta vulgaris L.	
09046005	18.02.2014	30.11.2009	Стармон	796	796
			Starmon		

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата пріоритету Date of Priority	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)
09046006	18.02.2014	30.11.2009	Жамон Jamon	796	796
Горошок посівний (ярий) Common Vetch (Spring)					
10047001	27.03.2014	03.11.2010	Надія Поділля Nadiia Podillia	306	306
11047001	18.03.2014	11.02.2011	Озіряна Oziriana	334	334
Лядвенець рогатий Bird's Foot Trefoil					
11119001	14.03.2014	21.03.2011	Терцій Tertsii	1607	1669
11119002	27.03.2014	05.04.2011	Гелон Helon	1669	1669
Груша звичайна Pear					
11076001	19.03.2014	18.07.2011	Новосадівська Novosadivs`ka	1585	1585
Тритикале (яре) Triticale (Spring)					
10011001	13.03.2014	05.11.2010	Лебідь харківський Lebid` kharkivs`kyi	404	404
Виноград справжній Grape, Grapevine					
12073002	20.03.2014		Мальбек Mal`bek	1605	1605
13304001	20.03.2014		Каберне Фран Kaberne Fran	1605	1605
13304002	20.03.2014		Гренаш чорний Hrenash chornyi	1605	1605
13304003	20.03.2014		Анчеллотта червона Anchellotta chervona	1605	1605
13304004	20.03.2014		Совіньон блан Sovin`on blan	1605	1605
Лілійник Daylily					
11236002	14.03.2014	29.11.2011	Стожари Stozhary	348	348
Троянда Rose					
12246002	17.03.2014	16.01.2012	Шісеколд Schysecold	882	882
Мітлиця тонка Brown Top					
11294001	27.03.2014	22.11.2011	Юнона Yunona	1669	1669
Верба прутовидна Hemp willow, Osier					
13373002	28.02.2014	22.11.2013	Вільгельм Wilhelm	1947	1947
Люпин вузьколистий Blue Lupin					
09056001	04.12.2013	17.11.2009	Грозинський 9 Hrozyns`kyi 9	320	320
Житняк гребінчастий Fairway Crested Grass, Wheatgrass					
11500001	14.03.2014	21.03.2011	Яструбинівський Yastrubynivs`kyi	1607	1669
Кукурудза звичайна - батьківський компонент Maize, Corn - parental component					
09004749	13.03.2014	01.12.2009	KB9F604	938	938
09004750	13.03.2014	01.12.2009	KW9F604 KB7X022 KV7Kh022	938	938

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата пріоритету Date of Priority	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)		Власник сорту (код) Variety owner (code)	
09004755	13.03.2014	01.12.2009	KBCEK 510	938		938	
09004756	13.03.2014	01.12.2009	KWSEK 510	938		938	
			KB9X1018				
09004757	17.03.2014	01.12.2009	KV9Kh1018	938		938	
			KBCEK 015				
09004758	17.03.2014	01.12.2009	KWSEK 015	938		938	
			KBCEK 511				
09004759	13.03.2014	01.12.2009	KWSEK 511	938		938	
			KB5Г0874				
10004012	06.03.2014	19.05.2010	KW5G0874	1219		1219	
10004013	05.03.2014	19.05.2010	НП1914 C	1219		1219	
			NP1914 C				
10004063	13.03.2014	13.10.2010	НП2319 C	938		938	
			NP2319 C				
10004064	13.03.2014	13.10.2010	KB9X1024	938		938	
			KW9H1024				
10004065	13.03.2014	13.10.2010	KBCEK 507	938		938	
			KWSEK 507				
10004066	13.03.2014	13.10.2010	KB7X1013	938		938	
			KW7H1013				
10004069	13.03.2014	13.10.2010	KBCEK 011	938		938	
			KWSEK 011				
10004070	13.03.2014	13.10.2010	KBCEK 509	938		938	
			KWSEK 509				
10004082	04.03.2014	13.10.2011	KBCEK 009	485		485	
			KWSEK 009				
10004116	14.03.2014	15.11.2010	291Г752	1210 879		879 1210	
			291G752				
10004118	14.03.2014	15.11.2010	200024 HC	1210 879		879 1210	
			200024 NS				
10004119	14.03.2014	15.11.2010	323289 HC	879 1210		879 1210	
			323289 NS				
10004122	14.03.2014	15.11.2010	316342 HC	879 1210		879 1210	
			316342 NS				
10004154	04.03.2014	25.11.2010	230174 HC	806		806	
			230174 NS				
10004155	04.03.2014	25.11.2010	EC3504	806		806	
			ES3504				
10004185	06.03.2014	29.11.2010	ЕГ2123	844		844	
			EG2123				
10004186	06.03.2014	29.11.2010	BP0773	844		844	
			WR077Z				
10004187	06.03.2014	29.11.2010	87IH1	844		844	
			87IH1				
10004188	06.03.2014	29.11.2010	НСЛ4011	844		844	
			HCL4011				
10004189	06.03.2014	29.11.2010	МЕФ4505	844		844	
			MEF4505				
10004190	06.03.2014	29.11.2010	B61093	844		844	
			W6109Z				
10004191	06.03.2014	29.11.2010	T41863	844		844	
			T4186Z				
10004192	06.03.2014	29.11.2010	A00363	844		844	
			A0036Z				
10004193	06.03.2014	29.11.2010	Дж3134з	844		844	
			J3134Z				
10004197	06.03.2014	29.11.2010	Дж9960з	844		844	
			J9960Z				
10004205	06.03.2014	29.11.2010	НСЛ506BXC	844		844	
			HCL506WXC				
10004222	06.03.2014	30.11.2010	МЕФ5298	793		793	
			MEF5298				
10004223	06.03.2014	30.11.2010	ЛИМФВЕ32 ЛІМІВТ44	793		793	
			LIMFVE32 LIMIVT44				
			ЛИМЖІЛ37	793		793	
			LIMJIL37				

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата пріоритету Date of Priority	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)		Власник сорту (код) Variety owner (code)	
10004224	06.03.2014	30.11.2010	ЛИМABO2 ЛІМАВВ26	793		793	
10004225	06.03.2014	30.11.2010	ЛИМЖАА845	793		793	
10004226	06.03.2014	30.11.2010	ЛИМФМЖ841	793		793	
10004227	06.03.2014	30.11.2010	ЛИМФДД514	793		793	
10004228	06.03.2014	30.11.2010	ЛИМЖМЛ26	793		793	
10004229	06.03.2014	30.11.2010	ЛИМИЛ5420	793		793	
10004242	13.03.2014	30.11.2010	Наташа М	404		404	
10004244	13.03.2014	30.11.2010	Харківський 27 М	404		404	
10004245	13.03.2014	30.11.2010	Харківська 152 М	404		404	
10004247	13.03.2014	30.11.2010	Харківська 215 М	404		404	
10004279	05.03.2014	03.12.2010	НП2171 С	1219		1219	
11004046	06.03.2014	19.09.2011	ЛЖБ2661	924		924	
11004047	06.03.2014	19.09.2011	НП1739 ЛАН1503	924		924	
11004048	06.03.2014	19.09.2011	ЛВХ369	924		924	
11004049	06.03.2014	19.09.2011	ЛУХ431	924		924	
11004050	06.03.2014	19.09.2011	ЛФР1941 ЛФР1944	924		924	
11004051	06.03.2014	19.09.2011	ЛФН1961	924		924	
11004053	06.03.2014	19.09.2011	ЛДР1687	924		924	
11004054	06.03.2014	19.09.2011	СМС2156	924		924	
11004055	06.03.2014	19.09.2011	ССР1745	924		924	
11004056	06.03.2014	19.09.2011	ССР1743	924		924	
11004057	06.03.2014	19.09.2011	11С0201	924		924	
11004058	06.03.2014	19.09.2011	11С0201 ССР2151	924		924	
11004071	17.03.2014	04.11.2011	71 НС	879	1210	879	1210
11004072	17.03.2014	04.11.2011	123098 НС	879	1210	879	1210
11004073	17.03.2014	04.11.2011	4641 НС	879	1210	879	1210
11004074	17.03.2014	04.11.2011	1032 НС	879	1210	879	1210
11004075	17.03.2014	04.11.2011	191 НС	879	1210	879	1210
11004076	17.03.2014	04.11.2011	731 НС	879	1210	879	1210
11004077	17.03.2014	04.11.2011	240311 НС	879	1210	879	1210
11004078	17.03.2014	04.11.2011	230177 НС	879	1210	879	1210
11004079	17.03.2014	04.11.2011	200023 НС	879	1210	879	1210
11004096	04.03.2014	18.11.2011	НПІД2598НПІД2530	1219		1219	

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата пріоритету Date of Priority	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)
11004097	05.03.2014	18.11.2011	НПІХ1759НПІХ0643	1219	1219
11004098	04.03.2014	18.11.2011	NPІХ1759NPІХ0643 НПВР0715НП1941	1219	1219
11004099	04.03.2014	18.11.2011	NPWR0715NP1941 НПІД2530НПІД2534	1219	1219
11004100	04.03.2014	18.11.2011	NPID2530NPID2534 НПАФ3441	1219	1219
11004102	04.03.2014	18.11.2011	NPAF3441 НП1927НП1928	1219	1219
11004103	04.03.2014	18.11.2011	NP1927NP1928 НПНЮ1809	1219	1219
11004106	04.03.2014	18.11.2011	NPNU1809 НПІД4820	1219	1219
11004107	04.03.2014	18.11.2011	NPID4820 НПІД2819	1219	1219
11004189	06.03.2014	24.11.2011	NPID2819 ЛІМІІВ821	793	793
11004190	06.03.2014	24.11.2011	LIMIIV821 ЛІМІПЛН13	793	793
11004294	27.03.2014		LIMPLN13 ПХВНІ	1690	1690
11004296	27.03.2014		PHWNJ ПХВВБ	1690	1690
11004297	27.03.2014		PHVWB ПХВВХ	1690	1690
11004299	27.03.2014		PHVVH ПХРЦЕ	1690	1690
11004300	27.03.2014		PHRCE ПХІББ	1688	1688
11004301	27.03.2014		PHJBВ ПХ13ЙЦ	1690	1690
11004302	27.03.2014		PH13JC ПХХРІ	1690	1690
11004303	27.03.2014		PHHRJ ПХХЕН	1690	1690
11004304	27.03.2014		PHHEN ПХ13ЦП	1688	1688
11004305	27.03.2014		PH13CP ПХ13ЦХ	1688	1688
11004306	27.03.2014		PH13CH ПХХ2В	1688	1688
11004307	27.03.2014		PHH2V ПХ3ПР	1690	1690
12004010	04.03.2014	03.02.2012	PH3PR 493E747	485	485
12004012	04.03.2014	03.02.2012	493E747 465Ц653	485	485
12004014	04.03.2014	03.02.2012	465C653 284K817	485	485
12004018	04.03.2014	03.02.2012	284K817 155P680	485	485
12004024	04.03.2014	03.02.2012	155R680 266FA069	485	485
12004029	13.03.2014	06.02.2012	266FA069 ХА 408 MB	1581	1581
12004030	13.03.2014	06.02.2012	KhA 408 MV ХА 402 MB	1581	1581
12004031	13.03.2014	06.02.2012	KhA 402 MV ХА 418 M	1581	1581
12004032	13.03.2014	06.02.2012	KhA 418 M Харківська 404 MB	1581	1581
13909001	13.03.2014	30.01.2013	Kharkivs`ka 404 MV K248	1302	1302
13909002	13.03.2014	30.01.2013	K248 K10	1302	1302

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата пріоритету Date of Priority	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)	
Жито озиме - батьківський компонент Winter Rye - parental component				Secale cereale L.		
10003005	13.03.2014	09.06.2010	961358Б	404	404	
			961358В			
10003006	13.03.2014	14.06.2010	Діхар	404	404	
			Dikhar			
10003007	13.03.2014	29.06.2010	120337Б	404	404	
			120337В			
Соняшник однорічний - батьківський компонент Sunflower - parental component				Helianthus annuus L.		
10017089	20.01.2014	11.11.2010	ЛВО 71В	1702	1702	
			LVO 71V			
10017092	20.01.2014	11.11.2010	Л13Б	1702	1702	
			L13В			
10017099	20.01.2014	11.11.2010	ЗЛ 0089В	1702	1702	
			ZL 0089V			
10017104	20.01.2014	11.11.2010	ЗЛ 260В	1702	1702	
			ZL 260V			
10017132	06.03.2014	25.11.2010	СФ9074 МА	793	1435	793 1435
			SF9074 MA			
10017139	10.02.2014	25.11.2010	УН 3502 ХА	1517	1517	
			UN 3502 KhA			
10017140	10.02.2014	25.11.2010	УН 1220 ХА	1517	1517	
			UN 1220 KhA			
10017141	10.02.2014	25.11.2010	УН 1100 ХА	1517	1517	
			UN 1100 KhA			
10017143	10.02.2014	25.11.2010	УН 1234 ХА	1517	1517	
			UN 1234 KhA			
10017156	21.01.2014	29.11.2010	T75	1169	1169	
			T75			
10017157	21.01.2014	29.11.2010	T82	1169	1169	
			T82			
10017158	21.03.2014	29.11.2010	Б РО 017А	883	883	
			B RO 017A			
10017159	21.03.2014	29.11.2010	Б РО 0155А	883	883	
			B RO 0155A			
10017160	28.03.2014	29.11.2010	Б РО 013А	883	883	
			B RO 013A			
10017163	04.03.2014	29.11.2010	P890ЖП	806	806	
			R890JP			
10017177	13.03.2014	30.11.2010	Cx IP10 А	404	404	
			Skh IR10 A			
10017204	27.03.2014	02.12.2010	PXA OPO 7	1719	1719	
			RHA ORO 7			
10017213	27.03.2014	03.12.2010	ХАФЛ 54	1719	1719	
			HAFL 54			
11017009	13.03.2014	08.02.2011	Mx 524 Б	1581	1581	
			Mkh 524 B			
11017011	13.03.2014	08.02.2011	X 1010 Б	1581	1581	
			Kh 1010 B			
11017013	13.03.2014	08.02.2011	X 2111 Б	1581	1581	
			Kh 2111 B			
11017014	13.03.2014	08.02.2011	X 2122 Б	1581	1581	
			Kh 2122 B			
11017016	13.03.2014	08.02.2011	X 503 Б	1581	1581	
			Kh 503 B			
11017017	13.03.2014	08.02.2011	X 808 Б	1581	1581	
			Kh 808 B			
11017021	13.03.2014	08.02.2011	X 1007 Б	1581	1581	
			Kh 1007 B			
11017022	13.03.2014	08.02.2011	X 809 Б	1581	1581	
			Kh 809 B			
11017023	13.03.2014	08.02.2011	Б РО 03А	883	883	
			B RO 03A			
11017024	13.03.2014	08.02.2011	PXA ПЕС 26Рф	883	883	
			RHA PES 26Rf			

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата пріоритету Date of Priority	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)		Власник сорту (код) Variety owner (code)	
11017027	13.03.2014	08.02.2011	Б РО 04А	883		883	
11017037	06.03.2014		В РО 04А TRO2662	924		924	
11017039	06.03.2014	19.09.2011	TRO2662 ТФХ3175	924		924	
11017040	06.03.2014	19.09.2011	TFKh3175 TRO2503	924		924	
11017041	06.03.2014	19.09.2011	TRO2503 ТФО2444	924		924	
11017042	06.03.2014	19.09.2011	TFO2444 ТФО2880	924		924	
11017045	06.03.2014	19.09.2011	TFO2880 ТРХ3170	924		924	
11017064	17.03.2014	04.11.2011	TRKh3170 НС КОД 4	879	1210	879	1210
11017065	17.03.2014	04.11.2011	NS KOD 4 ИМИ АБ 18	879	1210	879	1210
11017066	17.03.2014	04.11.2011	IMI AB 18 БГ Н 1	879	1210	879	1210
11017067	17.03.2014	04.11.2011	BG N 1 БГ Н 2	879	1210	879	1210
11017068	17.03.2014	04.11.2011	BG N 2 СУ Рф 49	879	1210	879	1210
11017109	06.03.2014	24.11.2011	SU Rf 49 37032IM	793		793	
11017110	06.03.2014	24.11.2011	37032IM ЛГ71234А	793		793	
11017112	06.03.2014	24.11.2011	LG71234A CP98MJ	793	1435	793	1435
11017114	06.03.2014	24.11.2011	SR98MJ Ф4AE1MA	793	1435	793	1435
11017141	04.03.2014	30.11.2011	F4AE1MA AD4027013	1219		1219	
11017142	04.03.2014	30.11.2011	AD4027013 ФС73900	1219		1219	
11017143	05.03.2014	30.11.2011	FS73900 ФС73700	1219		1219	
11017144	04.03.2014	30.11.2011	FS73700 ФС74400	1219		1219	
11017145	04.03.2014	30.11.2011	FS74400 ФС73100	1219		1219	
11017173	04.03.2014	29.12.2011	FS73100 CA436P	1671		1671	
12017022	04.03.2014	03.02.2012	SA436R 13K25	485		485	
12017023	04.03.2014	03.02.2012	13K25 20M60	485		485	
12017024	04.03.2014	03.02.2012	20M60 УК58	485		485	
12017026	04.03.2014	03.02.2012	UK58 IP134PPO	485		485	
12017027	04.03.2014	03.02.2012	IR134RRO 72B13	485		485	
12017028	05.03.2014	03.02.2012	72W13 A899	485		485	
12017029	04.03.2014	03.02.2012	A899 63Г13	485		485	
			63G13				
Ріпак (ярий) - батьківський компонент Rape Seed (Spring) - parental component				Brassica napus L. oleifera			
10016071	12.03.2014	01.12.2010	НПЦ ЗР 3709 NPZ SR 3709	912		912	

6.2. Відомості щодо виданих свідоцтв про авторство на сорт рослин

6.2. Notifications on Certificates of Plant Variety Authorship issued

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер свідоцтва Number of Certificate	Назва сорту Variety denomination	Автор(и) сорту(ів) Author (s) of Variety	Дата видачі Date of granting
Буряк цукровий Sugar Beet			<i>Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Doell.</i>		
06013026	19.01.2006	10457	ІЦБ 0503 ITsB 0503	Роїк Микола Володимирович Roik Mykola Volodymyrovych	12.03.2014
07013013	02.04.2007	10639	Кварта Kvarta	Роїк Микола Володимирович Roik Mykola Volodymyrovych	12.03.2014
07013015	02.04.2007	10638	Злука Zluka	Роїк Микола Володимирович Roik Mykola Volodymyrovych	12.03.2014
07013028	30.11.2007	110113	ІЦБ 0801 ITsB 0801	Роїк Микола Володимирович Roik Mykola Volodymyrovych	12.03.2014
07013029	30.11.2007	110112	ІЦБ 0802 ITsB 0802	Роїк Микола Володимирович Roik Mykola Volodymyrovych	12.03.2014
07013030	30.11.2007	110111	ІЦБ 0803 ITsB 0803	Роїк Микола Володимирович Roik Mykola Volodymyrovych	12.03.2014
07013032	30.11.2007	110110	ІЦБ 0805 ITsB 0805	Роїк Микола Володимирович Roik Mykola Volodymyrovych	12.03.2014
09013004	15.01.2009	110317	ІЦБ 0902 ITsB 0902	Роїк Микола Володимирович Roik Mykola Volodymyrovych	12.03.2014
09013005	15.01.2009	110318	ІЦБ 0903 ITsB 0903	Роїк Микола Володимирович Roik Mykola Volodymyrovych	12.03.2014
09013006	15.01.2009	110319	ІЦБ 0904 ITsB 0904	Роїк Микола Володимирович Roik Mykola Volodymyrovych	12.03.2014
09013007	15.01.2009	110320	ІЦБ 0905 ITsB 0905	Роїк Микола Володимирович Roik Mykola Volodymyrovych	12.03.2014
Яблуна домашня Apple			<i>Malus domestica Borkh.</i>		
12086002	02.07.2012	130349	Володимир Симиренко Volodymyr Symyrenko	Мельничук Максим Дмитрович Mel'nychuk Maksym Dmytrovych	20.01.2014
Суниця садова Strawberry			<i>Fragaria ananassa Duch.</i>		
10084001	10.02.2010	110115	Атлантида Atlantyda	Павлюк Василь Васильович Pavliuk Vasyli' Vasyli'ovych	24.03.2014
10084002	10.02.2010	110116	Янтарна Yantarna	Павлюк Василь Васильович Pavliuk Vasyli' Vasyli'ovych	24.03.2014
12084002	04.09.2012	130339	Аліна Alina	Мельничук Максим Дмитрович Mel'nychuk Maksym Dmytrovych	20.01.2014
Калістефус китайський China Aster			<i>Callistephus chinensis (L.) Nees</i>		
10285001	18.03.2010	10931	Оксамит Oksamyt	Шевель Лариса Олексіївна Shevel' Larysa Oleksiivna	24.03.2014
10285002	18.03.2010	10932	Ангеліна Anhelina	Шевель Лариса Олексіївна Shevel' Larysa Oleksiivna	24.03.2014

6.3. Відомості щодо припинення чинності майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослин

6.3. Notifications on proprietary right of intellectual property for plant variety dissemination validity terminated

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата припинення Date of cancellation	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)		Власник сорту (код) Variety owner (code)			
Пшениця тверда (яра) Durum Wheat (Spring)			Triticum durum Desf.						
00008004	26.12.2003	30.01.2014	Букурія Bukuriia	1112	430		430		
04008001	11.01.2007	30.01.2014	Кучумовка Kuchumovka	404			404		
05008005	01.01.2009	30.01.2014	Славута Slavuta	350	1112		350	1112	
07008002	30.11.2010	30.01.2014	Метиска Metyska	1112	350		350	1112	
99008002	12.02.2003	30.01.2014	Харківська 41 Kharkivs`ka 41	404			404		
Пшениця тверда (озима) Durum Wheat (Winter)			Triticum durum Desf.						
85008001	01.01.1990	30.01.2014	Айсберг одеський Aisberh odes`kyi	378					
94008006	01.01.2000	30.01.2014	Дельфін Del`fin	378			378		
Гречка їстівна Buckwheat			Fagopyrum esculentum Moench						
00002002	26.12.2003	30.01.2014	Слобожанка Slobozhanka	392					
04002003	23.01.2008	30.01.2014	Крупнозелена Krupnozelena	483			303		
05002001	23.01.2008	30.01.2014	Амазонка Amazonka	1192			1192		
05002002	11.01.2007	30.01.2014	Оранта Oranta	345	1117		1626	1117	
05002003	23.01.2008	30.01.2014	Ювілейна 100 Yuvileina 100	392			392		
06002003	29.12.2009	30.01.2014	Ярославна Yaroslavna	392			392		
07002003	30.11.2010	30.01.2014	Син-3/02 Syn-3/02	345	1117		1626	1117	
80002003	01.01.1985	30.01.2014	Сумчанка Sumchanka	392					
86002002	01.01.1990	30.01.2014	Крупинка Krupinka	392					
92002001	01.01.1997	30.01.2014	Іванна Ivanna	392					
99002001	01.01.2002	30.01.2014	Антарія Antariia	345	1117		1626		
Кукурудза звичайна Maize, Corn			Zea mays L.						
00004016	12.02.2003	30.01.2014	Наутилус Nautilus	350	759	826	758	760	
00004024	12.02.2003	30.01.2014	Дніпровський 453 СВ Dniprovs`kyi 453 SV	311					
01004018	26.12.2003	30.01.2014	Петропавлівський 392 МВ Petropravlivs`kyi 392 MV	957	765				
01004019	26.12.2003	30.01.2014	Престиж 365 МВ Prestyzh 365 MV	957	765				
01004020	26.12.2003	30.01.2014	Меридіан 341 МВ Merydian 341 MV	957	765				
01004021	26.12.2003	30.01.2014	Оазис 315 СВ Oazys 315 SV	957	765				
01004029	26.12.2003	30.01.2014	Прім 247 МВ Prim 247 MV	311	181				

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата припинення Date of cancellation	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)		Власник сорту (код) Variety owner (code)		
02004040	01.01.2005	30.01.2014	Білозірський 295 CB	311	181		181	311
			Bilozirs'kyi 295 SV					
02004041	01.01.2005	30.01.2014	Руно 198 CB	311	181		181	311
			Runo 198 SV					
02004062	01.01.2005	30.01.2014	Сиваш	411	311	1123	1698	
			Syvash					
02004067	01.01.2006	30.01.2014	Іскра MB	181	404		404	181
			Iskra MV					
03004021	01.01.2006	30.01.2014	Сталкер	404			404	
			Stalker					
03004024	23.01.2008	30.01.2014	Тендра	311	411	1123	411	311 1123
			Tendra					
03004027	01.01.2006	30.01.2014	Юніон	311	770		311	770
			Yunion					
03004029	01.01.2006	30.01.2014	Моніка 350 MB	311	770		311	770
			Monika 350 MV					
04004053	11.01.2007	30.01.2014	Чемеровецький 260 CB	311	376		311	376
			Chemerovets'kyi 260 SV					
04004058	11.01.2007	30.01.2014	Сов 329 CB	311	376		311	376
			Sov 329 SV					
04004068	23.01.2008	30.01.2014	Розівський 311 CB	311	327		327	311
			Rozivs'kyi 311 SV					
05004033	23.01.2008	30.01.2014	Краснодарський 194 MB	25			25	
			Krasnodars'kyi 194 MV					
05004050	23.01.2008	30.01.2014	Пірс MB	378			378	
			Pirs MV					
05004056	23.01.2008	30.01.2014	Орільський 357 CB	376	311		311	376
			Oril's'kyi 357 SV					
05004057	23.01.2008	30.01.2014	Вись 287 CB	376	311		311	376
			Vys' 287 SV					
05004058	23.01.2008	30.01.2014	Маг	376	311		311	376
			Mah					
05004060	23.01.2008	30.01.2014	Борозенський 277 MB	376	311		376	311
			Borozens'kyi 277 MV					
05004061	23.01.2008	30.01.2014	Криничанський 257 CB	376	311		376	311
			Krynichans'kyi 257 SV					
06004044	23.01.2008	30.01.2014	ХЛ 2017	749				
			KhL 2017					
06004045	23.01.2008	30.01.2014	ХЛ 2093	749				
			KhL 2093					
06004046	23.01.2008	30.01.2014	ХЛ 2222	749				
			KhL 2222					
06004121	30.11.2010	30.01.2014	Бренди	1034				
			Brandy					
07004013	30.11.2010	30.01.2014	ХЛ 2015	749			749	
			HL 2015					
08004031	26.12.2011	30.01.2014	Морадор	1267			1267	
			Mogador					
94004009	01.01.1997	30.01.2014	Луганський 287 MB	309				
			Lughans'kyi 287 MV					
98004093	01.01.2002	30.01.2014	Харківський 325 MB	404				
			Kharkivs'kyi 325 MV					
99004045	12.02.2003	30.01.2014	ОДЛ-1	378	309	1083		
			ODL-1					
Овес посівний (ярий) Oat (Spring)			Avena sativa L.					
05005001	01.01.2009	30.01.2014	Парламентський	429	430		1809	430
			Parlaments'kyi					
84005009	01.01.1988	30.01.2014	Скакун	167				
			Skakun					
Пшениця м'яка (озима) Soft Wheat (Winter)			Triticum aestivum L.					
00007015	01.01.2005	30.01.2014	Дальницька	378			378	
			Dal'nyts'ka					

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата припинення Date of cancellation	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)		Власник сорту (код) Variety owner (code)		
01007019	01.01.2005	30.01.2014	Ліона Liona	378		378		
02007019	01.01.2006	30.01.2014	Супутниця Suputnytsia	378		378		
02007020	01.01.2006	30.01.2014	Апогей Луганський Apohei Luhans'kyi	1121	309	1121	309	
02007040	11.01.2007	30.01.2014	Росинка Rosynka	412		412		
03007009	01.01.2006	30.01.2014	Вдала Vdala	922	378	378	922	
03007011	11.01.2007	30.01.2014	Кольчуга Kol'chuha	1192		1192		
03007023	11.01.2007	30.01.2014	Лист 25 Lyst 25	1059		1059		
04007009	23.01.2008	30.01.2014	Кнопа Knopa	381		381		
04007015	23.01.2008	30.01.2014	Трипільська Trypil's'ka	1203	367	367	1203	375
04007023	23.01.2008	30.01.2014	Вінничанка Vinnychanka	888	367	367	888	375
04007035	23.01.2008	30.01.2014	Паляниця Palianytsia	1059		1059		
04007045	23.01.2008	30.01.2014	Ювілейна 100 Yuvileina 100	25		25		
04007046	23.01.2008	30.01.2014	Пам'ять Pam'iat'	25		25		
05007046	02.09.2008	30.01.2014	Нота Nota	25		25		
05007050	02.09.2008	30.01.2014	Єсаул Yesaul	25		25		
05007051	02.09.2008	30.01.2014	Оградська Ohrads'ka	25		25		
06007008	08.09.2009	30.01.2014	Польовик Pol'ovuk	378	922	378	922	
07007031	22.11.2010	30.01.2014	Златоглава Zlatohlava	1059		1059		
07007039	22.11.2010	30.01.2014	Іришка Iryshka	25		25		
07007040	22.11.2010	30.01.2014	Юнона Yunona	25		25		
86007024	01.01.1989	30.01.2014	Миронівська 61 Myronivs'ka 61	341				
92007002	01.01.1995	30.01.2014	Українка одеська Ukrainka odes'ka	378				
92007056	01.01.1996	30.01.2014	Фантазія одеська Fantaziia odes'ka	378				
93007010	01.01.1997	30.01.2014	Іванівська остиста Ivanivs'ka ostysta	394				
94007001	01.01.1998	30.01.2014	Нела Nela	946				
98007007	12.02.2003	30.01.2014	Копилівчанка Korylivchanka	345				
98007017	01.01.2002	30.01.2014	Саскія Saskiia	946				
99007004	01.01.2002	30.01.2014	Харус Kharus	404		404		
99007008	12.02.2003	30.01.2014	Повага Povagha	378		378		
Пшениця м'яка (яра) Soft Wheat (Spring)			<i>Triticum aestivum L.</i>					
00007025	26.12.2003	30.01.2014	Печерянка Pecherianka	305		1669		
03007031	01.01.2006	30.01.2014	Срібнянка Sribnianka	1112		1112		

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата припинення Date of cancellation	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)		Власник сорту (код) Variety owner (code)		
04007042	11.01.2007	30.01.2014	Стаvisька Stavys`ka	350	1112	350	1112	
04007043	23.01.2008	30.01.2014	Євдокія Yevdokiia	404		404		
06007003	23.01.2008	30.01.2014	ПХРСВ - 02 PHRSW - 02	687				
06007004	23.01.2008	30.01.2014	ПХРСВ - 03 05018004	686		686		
06007024	23.01.2008	30.01.2014	Хофман Khofman	749				
07007052	30.11.2010	30.01.2014	Яргора Yarhora	350	1112	350	1112	
96007019	01.01.2000	30.01.2014	Харківська 26 Kharkivs`ka 26	404				
Просо посівне Common Millet				<i>Panicum miliaceum L.</i>				
04006002	01.01.2006	30.01.2014	Таврійське Tavriis`ke	1192		1192		
Жито посівне (озиме) Rye (Winter)				<i>Secale cereale L.</i>				
00003003	12.02.2003	30.01.2014	Первісток F1 Pervistok F1	404		404		
01003001	26.12.2003	30.01.2014	Ірина Iryna	307		307		
07003003	22.11.2010	30.01.2014	Радомирське Radomyrs`ke	319		319		
91003009	27.01.1995	30.01.2014	Паллада Pallada	307		1186	1190	1188
99003001	25.12.2001	30.01.2014	Хасто Khasto	404		404		
Рис посівний Rice				<i>Oryza sativa L.</i>				
02009008	01.01.2005	30.01.2014	Пам'яті Гічкіна Pam`iati Hichkina	412		412		
02009009	01.01.2005	30.01.2014	Антеї Antei	412		412		
02009010	01.01.2005	30.01.2014	Янтарний Yantarnyi	412		412		
Сорго звичайне (двокольорове) Sorghum				<i>Sorghum bicolor L.</i>				
00064003	26.12.2003	30.01.2014	Вінець Vinets`	414				
01064002	01.01.2005	30.01.2014	Максим Maksym	309	1083	440	1083	
01064003	26.12.2003	30.01.2014	Анна Anna	309	1083	361	440	
02064001	01.01.2005	30.01.2014	Слав'янське поле 210 Slav`ians`ke pole 210	1039		1039		
04064003	11.01.2007	30.01.2014	Ковчег Kovcheh	414	311	414	311	
87064004	01.01.1992	30.01.2014	Кримбел Krymbel	361				
87064005	01.01.1992	30.01.2014	Кримдар 10 Krymdar 10	361				
99064003	12.02.2003	30.01.2014	Генічеське 209 Heniches`ke 209	414				
Ячмінь звичайний (озимий) Barley (Winter)				<i>Hordeum vulgare L.</i>				
00012003	12.02.2003	30.01.2014	Огоньковський Ohon`kovs`kyi	358				
00012004	12.02.2003	30.01.2014	Метелиця Metelytsia	378		378		
01012005	01.01.2005	30.01.2014	Добриня 3 Dobrynia 3	25		25		

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата припинення Date of cancellation	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)
04012023	11.01.2007	30.01.2014	Морозко Morozko	25	25
04012024	11.01.2007	30.01.2014	Фантаст Fantast	25	25
05012022	02.09.2008	30.01.2014	Мастер Зернограда Mastier Zernohrada	212	212
07012008	22.11.2010	30.01.2014	Переможець Peremozhets`	1059	1059
07012009	22.11.2010	30.01.2014	Кондрат Kondrat	25	25
07012010	22.11.2010	30.01.2014	Платон Platon	25	25
88012003	01.01.1993	30.01.2014	Буран Buran	358	
92012018	01.01.1995	30.01.2014	Миронівський 87 Myronivs`kyi 87	341	
93012027	01.01.1999	30.01.2014	Онега Onega	358	
94012018	01.01.1999	30.01.2014	Паллідум 77 Pallidum 77	341	341
97012019	20.01.2001	30.01.2014	Михайло Mykhailo	25	25
98012016	01.01.2002	30.01.2014	Восход Voskhod	358	
Ячмінь звичайний (ярий) Barley (Spring)			<i>Hordeum vulgare L.</i>		
00012012	26.12.2003	30.01.2014	Персей Persei	341	341
00012016	26.12.2003	30.01.2014	Вінницький 28 Vinnyts`kyi 28	306	
00012017	12.02.2003	30.01.2014	Данута Danuta	926	926
01012008	26.12.2003	30.01.2014	Селеніт Selenit	922 378	378 922
01012018	26.12.2003	30.01.2014	Аннабель Annabell	926	926
02012003	01.01.2005	30.01.2014	Оксамитовий Oksamytovyi	303	303
02012007	01.01.2006	30.01.2014	Лофант Lofant	306	306
03012010	11.01.2007	30.01.2014	Незабудка Nezabudka	306	306
04012006	11.01.2007	30.01.2014	Віват Vivat	1112	1112
04012009	23.01.2008	30.01.2014	Созонівський Sozonivs`kyi	356	356
04012026	23.01.2008	30.01.2014	Набат Nabat	306	306
06012005	23.01.2008	30.01.2014	Баланс Balance	749	
06012006	23.01.2008	30.01.2014	Брюсефілд Brucefield	749	
06012009	27.07.2010	30.01.2014	Ратник Ratnyk	212	
06012015	27.07.2010	30.01.2014	Оберіг Oberih	306 791	306 791
06012029	12.02.2010	30.01.2014	Джей Бі Мальтазія JB Maltasia	1149	1149
07012017	20.12.2011	30.01.2014	Статок Statok	356	356
89012017	01.01.1992	30.01.2014	Прерія Preriia	378	
94012015	01.01.1999	30.01.2014	Галактик Halaktyk	378	378
94012024	01.01.1998	30.01.2014	Карат Karat	307	

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата припинення Date of cancellation	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)		Власник сорту (код) Variety owner (code)	
95012003	01.01.1998	30.01.2014	Цезар Tsezar	341			
96012003	01.01.1999	30.01.2014	Джерело Dzherelo	404			
96012004	01.01.1999	30.01.2014	Бад'юрий Bad'oryi	404			
96012007	24.02.1999	30.01.2014	СН 28 SN 28	356			
96012015	24.02.1999	30.01.2014	Тюрінгія Thuringia	926		926	
97012002	01.01.2000	30.01.2014	Лотос Lotos	306			
97012005	01.01.2000	30.01.2014	Фенікс Feniks	404			
97012020	01.01.2001	30.01.2014	Аскольд Askol'd	341			
98012006	01.01.2002	30.01.2014	Ефект Efekt	404		404	
99012004	12.02.2003	30.01.2014	Скіф Skif	306		306	
Тритикале (озиме) Triticale (Winter)			Triticosecale Witt.				
04011008	23.01.2008	30.01.2014	Валентин 90 Valentyн 90	25		25	
05011007	30.09.2009	30.01.2014	Полянське Polians'ke	305		1669	
05011011	02.09.2008	30.01.2014	Дон Don	217		217	
07011009	10.10.2011	30.01.2014	Половецьке Polovets'ke	305		1669	
93011006	01.01.1998	30.01.2014	АДМ 8 ADM 8	341			
95011010	01.01.2000	30.01.2014	Амфідиплоїд 52 Amfidyploid 52	404	1024		
99011004	01.01.2002	30.01.2014	Ладне Ladne	404		404	
Горох посівний Pea			Pisum sativum L.				
01001004	01.01.2005	30.01.2014	Камертон Kamerton	404		404	
01001006	26.12.2003	30.01.2014	Степовик Stepovuk	309	1121		
03001011	01.01.2006	30.01.2014	Конто Konto	912		912	
05001008	01.01.2009	30.01.2014	ЧБЛ-5 ChBL-5	404		404	
05001010	01.01.2009	30.01.2014	Гарде Harde	934		934	
06001007	20.12.2011	30.01.2014	Меліор Melior	309		309	
94001003	01.01.1999	30.01.2014	Полтавець 2 Poltavets` 2	952	1041		
99001003	12.02.2003	30.01.2014	Комбайновий 1 Kombainovyi 1	309	1121		
Квасоля звичайна (зернова) French Bean			Phaseolus vulgaris L.				
03087001	01.01.2005	30.01.2014	Дніпрянка Dniprianka	399	311	399	311
Сочевиця харчова Lentil			Lens culinaris Medik.				
03089001	01.01.2005	30.01.2014	Любава Liubava	1121	309		
Нут звичайний Chick-Pea			Cicer arietinum L.				

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата припинення Date of cancellation	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)		Власник сорту (код) Variety owner (code)	
01088002	12.02.2003	30.01.2014	Добробут	309			
94088003	01.01.2000	30.01.2014	Dobrobut Розанна Rozanna	378	1051		
Гірчиця сарептська (яра) Brown Mustard (Spring)			Brassica juncea (L.) Czern.				
08144001	31.12.2009	30.01.2014	Террафіт	825		825	
94144002	01.01.1999	30.01.2014	Террафіт Роксолана Roksolana	332			
Льон низький, кудряш Linseed			Linum humile Mill.				
05094001	01.01.2006	30.01.2014	Славний	329		329	
06094001	11.01.2007	30.01.2014	Славний Надійний Nadiinyi	1192	216	216	1192
07094001	01.01.2009	30.01.2014	Віра Vira	1076		1076	
Мак снотворний Opium /Seed poppy			Papaver somniferum L.				
01095001	01.01.2006	30.01.2014	Ямгорів	332			
92095001	01.01.1996	30.01.2014	Ямгорів Беркут Berkut	332			
Соняшник однорічний Sunflower			Helianthus annuus L.				
00017014	01.01.2005	30.01.2014	Одор	378		378	
01017015	26.12.2003	30.01.2014	Одор Донбас Donbas	1083		1083	
01017016	12.02.2003	30.01.2014	Віталія	886			
01017021	01.01.2005	30.01.2014	Віталія Октава Oktava	366	51	366	51
01017023	01.01.2005	30.01.2014	Дует	366	51	51	366
01017025	26.12.2003	30.01.2014	Дует Ант Ant	404		404	
02017004	01.01.2005	30.01.2014	Ант Старобільський Starobil's'kyi	404	1083	1059	
02017022	01.01.2005	30.01.2014	ЛГ 5660	793			
03017005	23.01.2008	30.01.2014	ЛГ 5660 Орасол Orasol	1219			
03017008	01.01.2005	30.01.2014	Алмаз	1192		1192	
03017009	11.01.2007	30.01.2014	Алмаз Міраж Mirazh	216	1192	216	1192
03017010	01.01.2006	30.01.2014	Тайфун	216	1192	216	1192
03017022	01.01.2006	30.01.2014	Тайфун Лакомка Lakotka	16		16	
03017023	01.01.2006	30.01.2014	Мастер	16		16	
03017024	01.01.2006	30.01.2014	Мастер Роднік Rodnik	16		16	
03017026	01.01.2006	30.01.2014	Флагман	16		16	
04017016	01.01.2006	30.01.2014	ЛГ 5380	793			
04017023	11.01.2007	30.01.2014	ЛГ 5380 ПР64Г91 PR64H91	767		767	
04017028	11.01.2007	30.01.2014	Іберіко IBERICO	793			

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата припинення Date of cancellation	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)		Власник сорту (код) Variety owner (code)		
04017029	11.01.2007	30.01.2014	Латіно	793				
			Latino					
04017041	23.01.2008	30.01.2014	Доріана	938				
			Doriana					
04017042	11.01.2007	30.01.2014	Ясон	404		404		
			Yason					
04017057	23.01.2008	30.01.2014	Кошовий	1093		1093		
			Koshovyi					
04017070	23.01.2008	30.01.2014	Айдар	1059	404	1059	404	
			Aidar					
04017071	23.01.2008	30.01.2014	Степок	1059		1059		
			Stepok					
04017072	23.01.2008	30.01.2014	Лиман	404	1059	1059	404	
			Lyman					
05017050	01.01.2009	30.01.2014	Принц	1034				
			Prince					
06017017	01.01.2009	30.01.2014	ПСФ - 03	690		690		
			PSF - 03					
06017018	23.01.2008	30.01.2014	ПСФ - 02	690		690		
			PSF - 02					
06017041	30.11.2010	30.01.2014	Сорока	886		886		
			Soroka					
06017042	30.11.2010	30.01.2014	Ксенія	886		886		
			Ksenyia					
07017022	20.12.2011	30.01.2014	Мир	736	1078	736	1078	
			Myr					
07017024	20.12.2011	30.01.2014	Люкс	736	1078	736	1078	
			Liuks					
07017026	12.02.2010	30.01.2014	MH6320	1219		437		
			MN6320					
07017094	30.11.2010	30.01.2014	ЛГ5370	793		793		
			LG5370					
82017010	01.01.1987	30.01.2014	Донський 60	1192	216			
			Dons'kyi 60					
85017007	01.01.1989	30.01.2014	Одеський 123	378				
			Odes'kyi 123					
89017003	20.01.1992	30.01.2014	Донський крупнонасінний	216				
			Dons'kyi krupnonasinnyi					
89017004	20.01.1992	30.01.2014	Оріон	216				
			Orion					
94017002	01.01.1999	30.01.2014	Погляд	404				
			Poghliad					
98017039	12.02.2003	30.01.2014	Байда	1093	329			
			Baida					
98017043	20.01.2001	30.01.2014	PR64A10 (Синонім: Mixail)	404	767			
			PR64A10 (Synonim: Mikhail)					
99017012	26.12.2003	30.01.2014	Деркул	1083		1083		
			Derkul					
99017021	25.12.2001	30.01.2014	Еней	404		404		
			Enei					
Ріпак (озимий) Rape Seed (Winter)			Brassica napus L. oleifera					
01016001	01.01.2005	30.01.2014	Дембо	332				
			Dembo					
01016002	01.01.2005	30.01.2014	Геліо	423		1654		
			Helio					
03016002	01.01.2006	30.01.2014	Антарія	306	1106	350		
			Antariia					
03016006	01.01.2006	30.01.2014	Трабант	912		912		
			Trabant					
04016002	23.01.2008	30.01.2014	Дема	332		332		
			Dema					
04016003	11.01.2007	30.01.2014	Аліот	350	538	798	350	798
			Aliot					538

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата припинення Date of cancellation	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)			Власник сорту (код) Variety owner (code)		
04016006	23.01.2008	30.01.2014	Джеспер Jesper	934			934		
05016009	02.09.2008	30.01.2014	Опава Opaва	519					
05016010	02.09.2008	30.01.2014	Оксана Oksana	519			519		
06016009	08.09.2009	30.01.2014	Демерка Demerka	332			332		
06016032	27.07.2010	30.01.2014	ОПБН13 OPBN13	519			519		
06016044	29.11.2010	30.01.2014	Манітоба Manitoba	793					
07016001	10.10.2011	30.01.2014	Черемош Cheremosh	332			332		
07016020	30.11.2010	30.01.2014	Аплаус Aplaus	880			880		
07016022	30.11.2010	30.01.2014	ОП 02 OP 02	519			519		
07016063	10.10.2011	30.01.2014	Смарагт Smaragt	350	332	538	350	332	538
08016020	10.10.2011	30.01.2014	Бакара Bakara	1253			1253		
08016022	10.10.2011	30.01.2014	Таня Tanja	1213					
84016001	01.01.1989	30.01.2014	Тисменицький Tysmenyts'kyi	332					
88016008	01.01.1995	30.01.2014	Света Svieta	332					
90016017	01.01.1995	30.01.2014	Світоч Svitoch	306					
92016004	01.01.1997	30.01.2014	Галицький Halys'kyi	332					
92016015	26.02.1997	30.01.2014	Федорівський поліпшений Fedorivs'kyi polipshenyi	350					
97016013	01.01.2001	30.01.2014	Дангал Danhal	332					
97016022	01.01.2002	30.01.2014	Чорний велетень Chornyi veleten'	306					
97016023	01.01.2002	30.01.2014	Ранок Поділля Ranok Podillia	306					
Ріпак (ярий) Rape Seed (Spring)			Brassica napus L. oleifera						
03016003	01.01.2005	30.01.2014	Аіра Aira	306	350	1106			
05016022	01.01.2009	30.01.2014	Марине Maryne	332			332		
06016041	15.01.2010	30.01.2014	Зоня КЛ Sonja CL	912			912		
90016015	20.01.1993	30.01.2014	Калинівський Kalynivs'kyi	350					
91016002	01.01.1996	30.01.2014	Арїон Arion	332					
92016017	01.01.1997	30.01.2014	Микитинецький Mykutynets'kyi	332					
95016001	24.02.1999	30.01.2014	Клітинний 8 Klitynniy 8	350					
95016002	24.02.1999	30.01.2014	Ліколли Licolly	807					
97016005	20.01.2001	30.01.2014	Ольга Olga	912			912		
97016014	01.01.2001	30.01.2014	Ліра Liira	332					
98016005	12.02.2003	30.01.2014	Лужок Luzhok	332					
99016009	01.01.2002	30.01.2014	Сієста F1 Siecta F1	912			912		

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата припинення Date of cancellation	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)		Власник сорту (код) Variety owner (code)	
Рижий посівний (ярий) Camelina, False Flax (Spring)			Camelina sativa (L.) Crantz				
97097001	01.01.2000	30.01.2014	Гірський Hirs`kyi	332			
Соя культурна Soya Bean			Glycine max (L.) Merr.				
00018004	26.12.2003	30.01.2014	Феміда Femida	411	305	1669	411
00018005	26.12.2003	30.01.2014	Золотиста Zolotysta	411	305	1669	411
02018001	01.01.2005	30.01.2014	Знахідка Znakhidka	356		356	
02018002	01.01.2005	30.01.2014	Ювілейна Yuvileina	356		356	
04018004	11.01.2007	30.01.2014	Дельта Del`ta	16			
04018005	11.01.2007	30.01.2014	Вілана Vilana	16		16	
04018008	11.01.2007	30.01.2014	Омега вінницька Omeha vinnyts`ka	305	345	1669	345
04018009	11.01.2007	30.01.2014	КиВін KyVin	305	345	1669	345
05018004	23.01.2008	30.01.2014	Монада Monada	305		1669	
05018005	23.01.2008	30.01.2014	Смолянка Smolianka	305		1669	
05018010	01.01.2009	30.01.2014	Говерла Hoverla	330	305	1669	330
06018003	23.01.2008	30.01.2014	Колбі Kolbi	749			
06018004	23.01.2008	30.01.2014	Ентерпрайс Enterprise	749			
06018012	12.02.2010	30.01.2014	Вінні Vinni	305		1669	
06018013	12.02.2010	30.01.2014	Вежа Vezha	305		1669	
07018006	30.11.2010	30.01.2014	Хуторяночка Khutorianochka	305		1669	
07018011	20.12.2011	30.01.2014	Коннор Connor	749		749	
08018008	20.12.2011	30.01.2014	Княжна Kniazhna	305		1669	
75018001	01.01.1981	30.01.2014	Білосніжка Bilosnizhka	349			
83018001	01.01.1986	30.01.2014	Аркадія одеська Arkadiia odes'ka	378			
83018013	01.01.1987	30.01.2014	Юг 40 Yuh 40	411			
87018007	01.01.1990	30.01.2014	Юг 30 Yuh 30	411			
90018004	01.01.1994	30.01.2014	Ізумрудна Izumrudna	356			
94018005	26.02.1997	30.01.2014	Медєя Medeia	356			
94018017	01.01.2000	30.01.2014	Агат Ahat	305	399		
97018002	20.01.2001	30.01.2014	Валюта Valiuta	356			
97018003	20.01.2001	30.01.2014	Артеміда Artemida	305	399	399	1669
97018004	01.01.2001	30.01.2014	Оксана Oksana	305	411	411	1669
97018005	01.01.2001	30.01.2014	Прикарпатська 96 Prykarpats'ka 96	305	330	330	1669

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата припинення Date of cancellation	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)		Власник сорту (код) Variety owner (code)	
97018007	20.01.2001	30.01.2014	Анатоліївка Anatoliivka	356	305	1669	356
98018001	01.01.2002	30.01.2014	Оріана Oriana	305	411	1669	411
99018004	12.02.2003	30.01.2014	Срібна Sribna	329			
Суріпиця звичайна (яра) Rocket-cress (Spring)				<i>Barbarea vulgaris R. Br.</i>			
98145002	01.01.2001	30.01.2014	Горянка Horianka	332			
Коріандр посівний (кінза) Coriander				<i>Coriandrum sativum L.</i>			
05185002	11.01.2007	30.01.2014	Міус Mius	366			
71185001	01.01.1980	30.01.2014	Ранній Rannii	366			
72185001	01.01.1980	30.01.2014	Янтар Yantar	366			
90185002	01.01.1999	30.01.2014	Нектар Nektar	366			
90185003	25.01.1996	30.01.2014	Оксаніт Oksanit	356			
98185001	12.02.2003	30.01.2014	Медун Medun	366			
Лаванда вузьколиста Lavender				<i>Lavandula angustifolia Mill.</i>			
06187001	23.01.2008	30.01.2014	Вдала Vdala	366		366	
57187002	01.01.1962	30.01.2014	Степова Stepova	366			
73187002	01.01.1983	30.01.2014	Рання Rannia	366			
86187002	01.01.1997	30.01.2014	Сінєва Sinieva	366			
92187001	01.01.2000	30.01.2014	Ізіда Izida	366			
Троянда дамаська Damask Rose				<i>Rosa damascena Mill.</i>			
06246008	01.01.2009	30.01.2014	Лада Lada	366		366	
86238001	01.01.1990	30.01.2014	Лань Lan'	366			
90238001	01.01.1984	30.01.2014	Радуга Raduha	366			
97238001	01.01.2001	30.01.2014	Аура Aura	366			
Кмин звичайний Caraway				<i>Carum carvi L.</i>			
06156001	23.01.2008	30.01.2014	Надійний Nadiinnyi	418		418	
77156001	01.01.1983	30.01.2014	Подільський 9 Podil's'kyi 9	418			
90156001	25.01.1996	30.01.2014	Случ Sluch	418			
Шавлія мускатна Clary Sage				<i>Salvia sclarea L.</i>			
06204001	23.01.2008	30.01.2014	Тайган Taihan	366		366	
61204001	01.01.1967	30.01.2014	С 785 С 785	366			
81204001	01.01.1991	30.01.2014	Кримська пізня Kryms'ka piznia	366			
96204001	01.01.2001	30.01.2014	Мрія Mriia	366			

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата припинення Date of cancellation	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)
98204001	12.02.2003	30.01.2014	Ай-Тодор Ai-Todor	366	
Фенхель звичайний Fennel				<i>Foeniculum vulgare Miller.</i>	
86200001	01.01.1999	30.01.2014	Мерцишор Mertsyshor	366	
99200001	12.02.2003	30.01.2014	Оксамит Криму Oksamyt Krymu	366	
Котяча м'ята лимонна Cat Mint, Catnip				<i>Nepeta cataria L. f. citriodora Dum.</i>	
82112001	01.01.1983	30.01.2014	Первенець Pervenets'	366	
88112001	01.01.1991	30.01.2014	Ювілей Вавилова Yuvilei Vavilova	366	
Буряк цукровий Sugar Beet				<i>Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Doell.</i>	
01013011	26.12.2003	30.01.2014	Софія Sofia	421	
02013010	01.01.2005	30.01.2014	Севаст'янівський Sevast'ianivs'kyi	421	
02013033	01.01.2006	30.01.2014	Мілан Milan	829	
03013003	24.01.2006	30.01.2014	Люміна Lumina	796	
03013004	24.01.2006	30.01.2014	Фертіла Fertila	796	
03013006	24.01.2006	30.01.2014	Стабіла Stabila	796	
03013024	01.01.2006	30.01.2014	Доброслава Dobroslava	230	
04013028	11.01.2007	30.01.2014	Япола Japola	884	
05013013	23.01.2008	30.01.2014	Зорипа Zorupa	539	530
05013014	23.01.2008	30.01.2014	Галактик Halaktik	539	530
88013002	01.01.1995	30.01.2014	Кубанський ЧС 36 Kubans'kyi ChS 36	736	
88013012	20.01.1992	30.01.2014	Орікс Oryks	743	
92013006	01.01.1998	30.01.2014	Галина Galina	334	743
92013098	01.01.1997	30.01.2014	Яміра Jamira	884	
94013095	01.01.1999	30.01.2014	Аватар Avatar	736	
94013096	01.01.2001	30.01.2014	Аратта Aratta	736	
98013056	01.01.2002	30.01.2014	Арій 1 Arii 1	736	
98013058	01.01.2002	30.01.2014	Уладівський ЧС 35 Uladivs'kyi ChS 35	736	
98013060	25.12.2001	30.01.2014	Свіфт Swift	743	
99013030	01.01.2002	30.01.2014	Український ЧС 72 Ukrains'kyi ChS 72	421	
99013034	25.12.2001	30.01.2014	Елоді Elodie	796	
Хміль звичайний Hop				<i>Humulus lupulus L.</i>	
03021001	01.01.2006	30.01.2014	Пивовар Pivovar	320	
03021002	01.01.2006	30.01.2014	Житомирський 75 Zhytomyrs'kyi 75	320	

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата припинення Date of cancellation	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)
05021001	01.01.2006	30.01.2014	Видибор Vudybor	320	
05021002	01.01.2006	30.01.2014	Оскар Oskar	320	
05021006	23.01.2008	30.01.2014	Чаклун Chaklun	320	320
05021007	23.01.2008	30.01.2014	Ксанта Ksanta	320	320
88021001	01.02.1994	30.01.2014	Славянка Slavianka	318	
90021003	26.02.2000	30.01.2014	Зміна Zmina	318	
90021004	25.01.1996	30.01.2014	Альта Al'ta	318	
90021005	01.02.1994	30.01.2014	Кумир Kumyr	318	
92021001	21.02.1998	30.01.2014	Заграва Zahrava	318	
92021002	26.02.2000	30.01.2014	Промінь Promin`	318	
94021003	21.02.1998	30.01.2014	Гайдамацький Haidamats'kyi	318	
98021001	26.12.2003	30.01.2014	Хмелеслав Khmeleslav	320	
Цикорій кореневий (промисловий) Industrial Chicory				<i>Cichorium intybus L. partim</i>	
99202001	20.01.2001	30.01.2014	Уманський 99 Umans'kyi 99	421	
Коноплі посівні Hemp				<i>Cannabis sativa L.</i>	
01014001	26.12.2003	30.01.2014	Глера Hlera	393	393
05014002	11.01.2007	30.01.2014	Зоряна Zoriana	393	393
09014001	14.01.2011	30.01.2014	Вікторія Viktoriia	393	393
Льон звичайний, довгунець Flax, Linseed				<i>Linum usitatissimum L.</i>	
05015001	11.01.2007	30.01.2014	Батист Batyst	345	345
Картопля Potato				<i>Solanum tuberosum L.</i>	
00031009	12.02.2003	30.01.2014	Веста Vesta	319	319
01031015	26.12.2003	30.01.2014	Тирас Tyras	319	
01031017	01.01.2005	30.01.2014	Малинська біла Malyns`ka bila	319	
04031010	11.01.2007	30.01.2014	Поліська ювілейна Polis`ka iuvileina	319	319
05031014	23.01.2008	30.01.2014	Звіздаль Zvizdal`	319	319
06031004	27.07.2010	30.01.2014	Дубрава Dubrava	83	83
06031010	12.02.2010	30.01.2014	Вимір Vymir	319	319
06031011	01.01.2009	30.01.2014	Ведруска Vedruska	319	319
06031012	01.01.2009	30.01.2014	Партнер Partner	319	319
92031043	01.01.1997	30.01.2014	Провенто Provento	741	
97031015	01.01.2001	30.01.2014	Дубравка Dubravka	319	

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата припинення Date of cancellation	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)		Власник сорту (код) Variety owner (code)	
99031004	01.01.2002	30.01.2014	Тетерів Teteriv	319			
Аніс звичайний Anise				Anisum vulgare Gaertn.			
94370001	01.01.1999	30.01.2014	Артек Artek	366			
Баклажан Egg Plant, Eggplant				Solanum melongena L.			
02022003	01.01.2005	30.01.2014	Ліловий ранок Lilovyi ranok	736			
05022002	23.01.2008	30.01.2014	Прем'єр Prem'ier	402			402
08022001	27.07.2010	30.01.2014	Біла лілія Bila liliia	402			402
79022001	01.01.1983	30.01.2014	Алмаз Almaz	313			
98022003	01.01.2001	30.01.2014	Ультраранній F1 Ul'trarannii F1	402			
98022004	01.01.2002	30.01.2014	Адоніс F1 Adonis F1	402			
Боби кінські Field Bean				Vicia faba L. var. minor			
05043001	23.01.2008	30.01.2014	Переможець Peremozhets`	330	305	330	1669
Горох посівний (овочевий) Pea, Garden Pea				Pisum sativum L.			
02024001	01.01.2005	30.01.2014	Стригунік Stryhunok	339			
04024011	17.05.2011	30.01.2014	Зелений цукат Zelenyi tsukat	309	1121		
05024005	03.02.2011	30.01.2014	Ранок Ranok	313			313
08024002	31.12.2009	30.01.2014	Корал Coral	1050			
08024004	31.12.2009	30.01.2014	Ноторіус Notorius	1050			
89024005	01.01.1995	30.01.2014	Перас Pehas	339			
92024002	01.01.1996	30.01.2014	Селена Selena	339			
97024005	01.01.2001	30.01.2014	Вікма Vikma	339			
98024001	20.01.2001	30.01.2014	Уладовський харчовик ов. Uladovs`kyi kharchovyk ov.	304			
Капуста білоголова White Cabbage				Brassica oleracea L. var. alba DC.			
00028002	12.02.2003	30.01.2014	Ольга Ol'ha	343			343
02028001	26.12.2003	30.01.2014	Камінна голова Kamienna glova	1081			
03028008	01.01.2006	30.01.2014	Колобок F1 Kolobok F1	49	964	964	49
05028007	23.01.2008	30.01.2014	Віват F1 Vivat F1	964	1042	964	1042
05028008	11.01.2007	30.01.2014	Мостар F1 Mostar F1	273			
05028010	14.01.2011	30.01.2014	Лазурна Lazurna	402			402
06028022	01.01.2009	30.01.2014	Грацієла Hratsiela	343			343
68028002	01.01.1974	30.01.2014	Білосніжка Bilosnizhka	402			
71028002	01.01.1976	30.01.2014	Харківська зимова Kharkivs'ka zymova	402			

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата припинення Date of cancellation	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)
79028005	01.01.1983	30.01.2014	Столична Stolychna	343	343
80028001	01.01.1985	30.01.2014	Ліка Lika	402	
83028003	01.01.1987	30.01.2014	Українська осінь Ukrains'ka osin'	402	
90028006	01.01.1993	30.01.2014	Ярославна Yaroslavna	402	
91028002	01.02.1994	30.01.2014	Віоланта Violanta	343	343
92028001	25.01.1996	30.01.2014	Жозефіна Zhozefina	343	343
94028015	24.02.1999	30.01.2014	Тетянка Tetianka	343	
94028016	20.01.2001	30.01.2014	Княгиня Kniahynia	343	
94028017	21.02.1998	30.01.2014	Росава Rosava	343	
95028001	01.01.1999	30.01.2014	Леся Lesia	402	
98028004	25.12.2001	30.01.2014	Брага F1 Braha F1	1013	
99028008	01.01.2002	30.01.2014	Яна Yana	402	402
Капуста червоноголова Red Cabbage			<i>Brassica oleracea L. var. rubra DC.</i>		
06030003	23.01.2008	30.01.2014	Палета Paleta	402	402
Капуста цвітна Cauliflower			<i>Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis</i>		
06029006	11.01.2007	30.01.2014	Фаті F1 Faty F1	273	
06029007	11.01.2007	30.01.2014	Лейла F1 Leila F1	273	
98029002	26.02.2000	30.01.2014	Робер Rober	1081	
Кукурудза цукрова Sweet Corn			<i>Zea mays L. ssp. saccharata Sturt.</i>		
01032003	12.02.2003	30.01.2014	Роялті F1 Royalty F1	1013	
04032001	11.01.2007	30.01.2014	Мадонна F1 Madonna F1	1013	1013
07032002	01.01.2009	30.01.2014	Кокані F1 Kokanee F1	789	
07032003	01.01.2009	30.01.2014	Растлер F1 Rustler F1	789	
07032004	01.01.2009	30.01.2014	Легасі F1 Legacy F1	789	
08032009	29.11.2010	30.01.2014	Конкурент Konkurent	311	
79032001	01.01.1982	30.01.2014	Ароматна Aromatna	340	
89032001	09.02.1991	30.01.2014	Делікатесна Delikatesna	340	
91032001	01.01.1995	30.01.2014	Брусниця Brusnytsia	339	
94032002	26.12.2003	30.01.2014	Ласуня одеська Lasunia odes'ka	378	
Цибуля батун Welsh Onion, Japanese Bunching Onion			<i>Allium fistulosum L.</i>		
01174001	12.02.2003	30.01.2014	П'єро P'iero	402	
08174001	25.11.2008	30.01.2014	Стася Stasia	402	402

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата припинення Date of cancellation	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)		Власник сорту (код) Variety owner (code)
Цибуля порей Leek			Allium porrum L.			
82175001	01.01.1997	30.01.2014	Йолант Jolant	751		
Цибуля городня Onion, Echalion			Allium cepa L.			
00041003	12.02.2003	30.01.2014	Мавка Mavka	402		
00041004	26.12.2003	30.01.2014	Славний Slavnyi	313		
01041002	26.12.2003	30.01.2014	Амфора Amfora	402		
02041001	17.03.2009	30.01.2014	Антоніна Antonina	350	310	
03041001	01.01.2006	30.01.2014	Любчик Liubchuk	402		402
05041006	11.01.2007	30.01.2014	Вікторія Скернєвіц Wiktoria Skierniewic	1081	50	
05041007	11.01.2007	30.01.2014	Слава Ожарова Slawa Ozarowa	1081	50	
08041004	15.01.2010	30.01.2014	Варяг Variah	402		402
37041007	01.01.1940	30.01.2014	Стригунівська носівська Stryhunivs'ka nosivs'ka	429		
60041001	01.01.1965	30.01.2014	Луганська Luhans'ka	520		
66041001	01.01.1972	30.01.2014	Золотиста Zolotysta	402		
85041004	01.01.1991	30.01.2014	Ткаченківська Tkachenkivs'ka	402		
90041005	01.01.1994	30.01.2014	Харківська 82 Kharkivs'ka 82	402		
91041001	01.01.1994	30.01.2014	Веселка Veselka	402		
94041001	01.01.1997	30.01.2014	Глобус Hlobus	402		
97041009	20.01.2001	30.01.2014	Вольська Wolska	1071		
98041001	12.02.2003	30.01.2014	Супра Supra	1081		
98041003	01.01.2001	30.01.2014	Черняковська Czerniakowska	1081		
98041009	25.12.2001	30.01.2014	Роккаде F1 Roccade F1	1013		
Цибуля шалот Shallot, Grey Shallot			Allium oschaninii O. Fedtsch.			
00176001	01.01.2002	30.01.2014	Забава Zabava	402		
00176002	01.01.2002	30.01.2014	Сюрприз Siurpryz	402		
02176001	26.12.2003	30.01.2014	Ліра Lira	402		
08176001	25.11.2008	30.01.2014	Ольвія Ol'viia	402		
Цибуля шніт (скорода, трибулька) Chives			Allium schoenoprasum L.			
03177001	01.01.2005	30.01.2014	Приліпський Prylips`kyi	402		
05177001	29.05.2007	30.01.2014	Флірт Flirt	313		313
09177001	14.01.2011	30.01.2014	Дівон Divonne	1102		1102
Морква Carrot			Daucus carota L.			
00034001	26.12.2003	30.01.2014	Квітневська Kvitnevs'ka	339		

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата припинення Date of cancellation	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)		Власник сорту (код) Variety owner (code)	
02034001	26.12.2003	30.01.2014	Берлікумер 2 Berlikumer 2	1081			
03034006	01.01.2006	30.01.2014	Перший збір Pierwszy zbior	1081	50		
05034008	23.01.2008	30.01.2014	Вереснева Veresneva	402			402
06034001	17.03.2009	30.01.2014	Корунд Korund	1084			1084
06034024	17.03.2009	30.01.2014	Ньюз F1 News F1	751			
49034001	01.01.1950	30.01.2014	Нантська харківська Nants'ka kharkivs'ka	402			
92034001	01.01.1995	30.01.2014	Оленка Olenka	402			
96034001	01.01.2000	30.01.2014	Яскрава Yaskrava	402			
Огірок посівний Cucumber			Cucumis sativus L.				
00035001	20.01.2001	30.01.2014	Гермес Скерневіцький F1 Hermes Skiemiewicki F1	1081			
03035004	01.01.2006	30.01.2014	Кронос Скерневіцький F1 Kronos Skiemiewicki F1	1081	50	1081	50
03035005	01.01.2006	30.01.2014	Одис F1 Odys F1	1081	50	1081	50
03035008	11.01.2007	30.01.2014	Сувенір F1 Suvenir F1	402		402	
05035004	11.01.2007	30.01.2014	Родос F1 Rodos F1	1081	50	1081	50
05035035	23.01.2008	30.01.2014	Рея Reja	50	1081	1081	50
06035017	11.01.2007	30.01.2014	Щедрик F1 Schedryk F1	898	893		
06035018	11.01.2007	30.01.2014	Кураж F1 Kurazh F1	898	893		
06035019	11.01.2007	30.01.2014	Кадет F1 Kadet F1	898	893		
06035020	11.01.2007	30.01.2014	Атлет F1 Atlet F1	898	893		
06035021	11.01.2007	30.01.2014	Бобрик F1 Bobryk F1	898	893		
06035022	11.01.2007	30.01.2014	Трембіта F1 Trembita F1	898	893		
06035024	11.01.2007	30.01.2014	Казанова F1 Kazanova F1	893	898		
06035036	15.01.2010	30.01.2014	Калинка F1 Kalynka F1	350	177	853	
08035002	27.07.2010	30.01.2014	Еврика F1 Evryka F1	402			402
91035001	01.01.1995	30.01.2014	Лялюк Lialiuk	402			
92035004	01.01.1997	30.01.2014	Гейм Heim	402			
94035008	01.01.1999	30.01.2014	Джерело Dzherelo	402			
96035005	24.02.1999	30.01.2014	Леон Leon	1013			
96035007	01.01.2000	30.01.2014	Сквирський 1/27 F1 Skvyr's'kyi 1/27 F1	1025	339		
97035006	21.02.1998	30.01.2014	Пасадена F1 Pasadena F1	1050			
98035001	12.02.2003	30.01.2014	Ізід Izyd	1081			
99035011	12.02.2003	30.01.2014	Ксана F1 Ksana F1	402			402
99035012	01.01.2002	30.01.2014	Слобожанський F1 Slobozhans'kyi F1	402			402

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата припинення Date of cancellation	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)		Власник сорту (код) Variety owner (code)	
99035016	01.01.2002	30.01.2014	Самородок F1 Samorodok F1	402		402	
99035017	01.01.2002	30.01.2014	Смак F1 Smak F1	402		402	
Пастернак посівний Parsnip				Pastinaca sativa L.			
92161001	01.01.1995	30.01.2014	Петрик Petryk	402			
Перець однорічний (гіркий) Hot Pepper, Chili				Capsicum annuum L.			
46036001	01.01.1947	30.01.2014	Український гіркий Ukrains'kyi hirkyi	402			
79036001	01.01.1983	30.01.2014	Харківський Kharkivs'kyi	402			
Перець однорічний (солодкий) Sweet Pepper, Paprika				Capsicum annuum L.			
00037001	20.01.2001	30.01.2014	Подстоліна Podstolina	1081			
00037002	20.01.2001	30.01.2014	Ожарівський Ozargowski	1081			
00037006	26.12.2003	30.01.2014	Вікон Vikon	313			
01037001	26.12.2003	30.01.2014	Злагода F1 Zlahoda F1	402			
03037004	01.01.2005	30.01.2014	Етюда Etiuda	1081	50	1081	50
03037005	01.01.2005	30.01.2014	Ноктюрн Nokturn	1081	50	1081	50
03037006	01.01.2006	30.01.2014	Валюша Valiusha	402		402	
05037003	11.01.2007	30.01.2014	Оленка Olenka	1081	50		
05037024	23.01.2008	30.01.2014	Лада Lada	402		402	
05037025	23.01.2008	30.01.2014	Велетень Veleten`	402		402	
08037001	26.12.2011	30.01.2014	Світозар Svitozar	402		402	
82037006	01.01.1990	30.01.2014	Піонер Pioner	402			
90037002	01.01.1995	30.01.2014	Полтавський Poltavs'kyi	402			
91037002	01.01.1997	30.01.2014	Голубок Holubok	402			
92037013	01.01.1990	30.01.2014	Дружок Druzhok	402			
94037004	01.01.1998	30.01.2014	Обрій Obrii	339			
95037001	01.01.1998	30.01.2014	Надія Nadiia	402			
97037006	01.01.2001	30.01.2014	Снігур Snigur	402			
98037010	01.01.2002	30.01.2014	Світлячок Svitliachok	402		402	
Петрушка городня Parsley				Petroselinum crispum (Mill.) Nym. ex A.W. Hill			
02163001	12.02.2003	30.01.2014	Оломунська Olomunska	1081			
06163003	26.05.2006	30.01.2014	Глорія Hloriia	898	893		
92163001	01.01.1995	30.01.2014	Харків'янка Kharkiv'ianka	402			
Помідор їстівний Tomato				Solanum lycopersicum L.			
01040010	26.12.2003	30.01.2014	Карась Karas`	402		402	

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата припинення Date of cancellation	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)		Власник сорту (код) Variety owner (code)	
01040012	26.12.2003	30.01.2014	Доля F1 Dolia F1	343			
01040013	26.12.2003	30.01.2014	Ласунчик Lasunchuk	736			
01040014	26.12.2003	30.01.2014	Красунчик Krasunchuk	736			
02040002	26.12.2003	30.01.2014	Румба Ожаровська Rumba Ozarowska	1081			
02040011	11.01.2007	30.01.2014	Чайка ChAIKA	402		402	
02040012	01.01.2006	30.01.2014	Незабудка F1 Nezabudka F1	402			
03040020	01.01.2005	30.01.2014	Олена Olena	122			
03040028	01.01.2006	30.01.2014	Радісний Radisnyi	1109		1109	
04040024	11.01.2007	30.01.2014	Південна Пальміра Pivdenna Pal'mira	381		381	
04040031	11.01.2007	30.01.2014	Шевальє F1 Sheval'ie F1	402		402	
04040032	11.01.2007	30.01.2014	Клондайк Klondaik	402		402	
04040033	11.01.2007	30.01.2014	Малинове Віканте Malynove Vikante	402		402	
04040034	11.01.2007	30.01.2014	Цвітік F1 Tsvietik F1	402		402	
04040035	11.01.2007	30.01.2014	Астероїд Asteroid	402			
04040039	11.01.2007	30.01.2014	Хорів Khoriv	343			
05040002	23.01.2008	30.01.2014	Сабала Sabala	1081	50	1081	50
05040003	23.01.2008	30.01.2014	Хубала Hubal	1081	50	1081	50
05040009	23.01.2008	30.01.2014	Роксолана F1 Roksolana F1	273			
05040035	23.01.2008	30.01.2014	Консуело F1 Konsuelo F1	402		402	
05040044	23.01.2008	30.01.2014	Дама Dama	402		402	
05040045	23.01.2008	30.01.2014	Елеонора Eleonora	402		402	
05040047	23.01.2008	30.01.2014	Малиновий дзвін Malynovyi dzvin	402		402	
05040048	23.01.2008	30.01.2014	Зореслав Zoreslav	402		402	
05040080	23.01.2008	30.01.2014	Колядник Koliadnyk	1109		1109	
05040081	23.01.2008	30.01.2014	Тясмінський Tiasmins'kyi	1109		1109	
05040085	23.01.2008	30.01.2014	Ондрашек Ondraszek	1081	50	1081	50
05040092	23.01.2008	30.01.2014	Янтар Одеський Yantar Odes'kyi	381		381	
05040110	11.01.2007	30.01.2014	Кенан Kenan	840			
06040001	23.01.2008	30.01.2014	Кенан /Одеська перлина/ /Odes'ka perlyna/	381		381	
06040012	05.04.2007	30.01.2014	Алькасар F1 Al'kasar F1	898	893		
06040015	05.04.2007	30.01.2014	Благовест F1 Blahovest F1	893	898		
06040016	05.04.2007	30.01.2014	Ля-Ля-фа F1 Lia-Lia-fa F1	893	898		
06040028	01.01.2009	30.01.2014	Одеська сливка Odes'ka slyvka	381			

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата припинення Date of cancellation	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)		Власник сорту (код) Variety owner (code)	
06040030	01.01.2009	30.01.2014	Лопочка	402	822	402	822
06040031	01.01.2009	30.01.2014	Lapochka	402	822	402	822
06040032	01.01.2009	30.01.2014	Алтей	402	822	402	822
06040033	01.01.2009	30.01.2014	Altei	402	822	402	822
06040033	01.01.2009	30.01.2014	Художник	343		343	
06040038	01.01.2009	30.01.2014	Khudozhnyk	402	822	402	822
08040011	26.12.2011	30.01.2014	Борівський	402		402	
09040002	20.11.2009	30.01.2014	Borivs'kyi	402	822	402	822
09040003	20.11.2009	30.01.2014	Золотой поток	402		402	
10040016	28.12.2011	30.01.2014	Zolotoi potok	402		402	
82040008	01.01.1987	30.01.2014	Удавчик	402		402	
90040017	01.01.1993	30.01.2014	Udavchuk	273		402	
90040022	01.01.1996	30.01.2014	Зейна F1	273		402	
91040005	25.01.1996	30.01.2014	Zeina F1	343		343	
92040001	01.01.1997	30.01.2014	Ангел MC F1	402		402	
96040004	24.02.1999	30.01.2014	Anhel MC F1	402		402	
96040006	24.02.1999	30.01.2014	Веселка F1	402		402	
98040002	01.01.2001	30.01.2014	Veselka F1	402		402	
98040004	01.01.2001	30.01.2014	Любимий	402		402	
99040016	12.02.2003	30.01.2014	Liubymyi	402		402	
99040017	12.02.2003	30.01.2014	Кременчуцький	402		402	
99040035	12.02.2003	30.01.2014	Kremenchuts'kyi	402		402	
99040038	12.02.2003	30.01.2014	Sv'iatoslav F1	402		402	
Редька посівна			Raphanus sativus L. var. sativus				
Radish, Garden Radish							
51039001	01.01.1960	30.01.2014	Одеська 5	381			
73039001	01.01.1978	30.01.2014	Odes'ka 5	339			
73039002	01.01.1978	30.01.2014	Сквирська біла	339			
84039001	01.01.1993	30.01.2014	Skvyrs'ka bila	402			
97039001	01.01.1999	30.01.2014	Сквирська чорна	402			
97039002	01.01.1999	30.01.2014	Skvyrs'ka chorna	402			
02038001	26.12.2003	30.01.2014	Сударушка	1081			
06038010	01.01.2009	30.01.2014	Sudarushka	1071			
50038002	01.01.1955	30.01.2014	Лебідка	381			
			Lebidka				
			Трояндова				
			Troiandova				
Редька посівна (редиска)			Raphanus sativus L. var. sativus				
Radish, Garden Radish, European Radish							
02038001	26.12.2003	30.01.2014	Люцинка	1081			
06038010	01.01.2009	30.01.2014	Liutsynka	1071			
50038002	01.01.1955	30.01.2014	Сілезія	381			
			Silesia				
			Льодяна бурулька				
			L'odiana burul'ka				

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата припинення Date of cancellation	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)		Власник сорту (код) Variety owner (code)	
55038005	01.01.1947	30.01.2014	Рубін Rubin	402			
85038003	01.01.1989	30.01.2014	Базис Bazys	402			
90038003	01.01.1994	30.01.2014	Богиня Bohynia	402			
90038004	01.01.1994	30.01.2014	Ксенія Kseniia	402			
95038001	01.01.2000	30.01.2014	Катруся Katrusia	402			
Салат посівний листковий Lettuce			Lactuca sativa L.var. secalina				
02291001	12.02.2003	30.01.2014	Королева літа Krulowa Lata	1081			
02291002	12.02.2003	30.01.2014	Евеліна Ewelina	1081			
06291001	05.04.2007	30.01.2014	Гейзер Heizer	898	893		
08291001	01.01.2009	30.01.2014	Малахіт Malakhit	350	177	177	350
53291001	01.01.1987	30.01.2014	Кучерявець одеський Kucheriavets' odes'kyi	381			
98291003	15.01.2000	30.01.2014	Модесто Modesto	1013			
Буряк столовий Beetroot, Garden Beet			Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. conditiva Alef.				
02023001	01.01.2006	30.01.2014	Ліко Liko	339			339
03023002	01.01.2006	30.01.2014	Регульський циліндр Regulski Cylinder	1081	50		
04023005	11.01.2007	30.01.2014	Бордо київський Bordo kyivs`kyi	343			343
05023005	01.01.2009	30.01.2014	Вітал Vital	402			402
81023001	01.01.1997	30.01.2014	Дій Dii	402			
90023006	01.01.1994	30.01.2014	Делікатесний Delikatesnyi	339			
96023002	01.01.2000	30.01.2014	Бордо харківський Bordo kharkivs`kyi	402			
96023003	01.01.2000	30.01.2014	Багрянний Bahrianyi	402			
98023002	25.12.2001	30.01.2014	Буллет Bullet	1013			
Селера листкова Cutting Celery, Leaf Celery, Smallage			Apium graveolens L. var. secalinum Alef.				
02167001	12.02.2003	30.01.2014	Едвард Edvard	1081			
97167001	01.01.1999	30.01.2014	Іванко Ivanko	402			
Кріп пахучий Dill			Anethum graveolens L.				
02158002	26.12.2003	30.01.2014	Скіф Skif	366			
05158002	01.01.2006	30.01.2014	Туркус Turkus	1081	50	1081	50
06158002	26.05.2006	30.01.2014	Аллігатор Alligator	898	893		
82158001	01.01.1986	30.01.2014	Харківський 85 Kharkivs'kyi 85	402			
98158001	01.01.2000	30.01.2014	Шмарагд Szmaragd	1081			

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата припинення Date of cancellation	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)			Власник сорту (код) Variety owner (code)		
Квасоля звичайна (овочева) French Bean			Phaseolus vulgaris L.						
02087001	12.02.2003	30.01.2014	Галопка Galopka	1081					
02087002	12.02.2003	30.01.2014	Полька Polka	1081					
04087001	01.01.2005	30.01.2014	Артемід Artemis	1013				1013	
04087002	01.01.2005	30.01.2014	Киліан Kylian	1013					
05087002	23.01.2008	30.01.2014	Тосик Tosyk	339				339	
07087003	03.02.2011	30.01.2014	Шахиня Shakhynia	402				402	
90087002	01.01.1994	30.01.2014	Присадибна Prysadybna	339					
94087005	01.01.1999	30.01.2014	Українка Ukrainka	339					
95087001	21.02.1998	30.01.2014	Сонеста F1 Sonesta F1	1013					
98087001	25.12.2001	30.01.2014	Скуба Scuba	1013					
Часник Garlic			Allium sativum L.						
01042001	01.01.2006	30.01.2014	Мереф'янський білий Meref'ians`kyi bilyi	402				402	
01042002	26.12.2003	30.01.2014	Дюшес Diushes	402					
05042002	05.04.2007	30.01.2014	Мануйлівський Manuilivs`kyi	402					
85042002	01.01.1990	30.01.2014	Софіївський Sofiivs'kyi	425				425	
97042001	01.01.1999	30.01.2014	Прометей Prometei	425				425	
Шпинат городній Spinach			Spinacea oleracea L.						
02179001	12.02.2003	30.01.2014	Матадор Matador	1081					
02179002	26.12.2003	30.01.2014	Лазіо F1 Lazio F1	1163	1013				
08179001	18.12.2009	30.01.2014	Тарпі Tarpi	840					
08179003	01.10.2010	30.01.2014	Переможець Peremozhets`	402				402	
Щавель кислий Garden Sorrel			Rumex acetosa L.						
63180001	01.01.1969	30.01.2014	Одеський 17 Odes'kyi 17	381					
Капуста броколі Calabrese, Sprouting Broccoli			Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. cymosa Duch.						
02148001	12.02.2003	30.01.2014	В'ярус Wiarus	1081					
03148001	11.01.2007	30.01.2014	Цезар Cezar	1081	50				
Пшениця м'яка (дворучка) Soft Wheat (spring and winter compatible)			Triticum aestivum L.						
04007013	23.01.2008	30.01.2014	Хуторянка Khutorianka	1203	367	375	1203	375	367
Крес-салат Cress			Lepidium sativum L.						
84157002	01.01.1990	30.01.2014	Вість Vist'	402					

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата припинення Date of cancellation	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)
Капуста листкова (декоративна) Field Kale			<i>Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef.</i>		
08151001	18.12.2009	30.01.2014	Красуня Борівська Krasunia Borivs'ka	343	343
08151002	18.12.2009	30.01.2014	Чарівниця Charivnytsia	343	343
Кавун звичайний Watermelon			<i>Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai.</i>		
01027007	01.01.2005	30.01.2014	Херсонський Khersons'kyi	410	
05027002	11.01.2007	30.01.2014	Кенді MC F1 Kendi MS F1	273	
08027001	01.01.2009	30.01.2014	Бонус F1 Bonus F1	273	
08027002	01.01.2009	30.01.2014	Троя F1 Troya F1	273	
08027022	28.12.2010	30.01.2014	Макс Плюс Maks Plus	402	402
55027004	01.01.1960	30.01.2014	Огоньок Oghon'ok	402	
78027001	01.01.1987	30.01.2014	Восход Voskhod	410	
78027005	01.01.1982	30.01.2014	Таврійський Tavriis'kyi	410	
79027002	01.01.1983	30.01.2014	Борчанський Borchans'kyi	402	
81027003	01.01.1987	30.01.2014	Сніжок Snizhok	410	
85027003	20.01.1990	30.01.2014	Красень Krasen'	410	
85027009	01.01.1990	30.01.2014	Голопристанський Holoprystan's'kyi	410	
86027002	01.01.1990	30.01.2014	Широнінський Shyronins'kyi	402	
91027003	25.01.1996	30.01.2014	Рясний Riasnyi	410	
91027004	25.01.1996	30.01.2014	Серьоженька Ser'ozhen'ka	410	
91027005	01.01.1997	30.01.2014	Чорногорець Chornohorets'	402	
92027001	25.01.1996	30.01.2014	Орфей Orfei	410	
95027001	01.01.1999	30.01.2014	Гарний Harnyi	402	
97027004	20.01.2001	30.01.2014	Легінь Lehin`	410	
97027013	26.02.2000	30.01.2014	Каховський Kakhovs'kyi	410	
99027006	12.02.2003	30.01.2014	Княжич Kniazhych	410	
Диня звичайна Melon			<i>Cucumis melo L.</i>		
06025002	11.01.2007	30.01.2014	Сера F1 Sera F1	273	
06025003	11.01.2007	30.01.2014	Анзер F1 Anzer F1	273	
80025002	01.01.1985	30.01.2014	Криничанка Krynuchanka	402	
85025003	01.01.1990	30.01.2014	Голянка Holianka	410	
86025001	20.01.1990	30.01.2014	Гопрінка Hoprinka	410	
89025003	25.01.1996	30.01.2014	Серпанка Serpianka	410	

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата припинення Date of cancellation	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)		Власник сорту (код) Variety owner (code)	
92025001	26.02.1997	30.01.2014	Лада	410			
			Lada				
99025003	12.02.2003	30.01.2014	Інгулка	410			
			Inghulka				
Кабачок Vegetable Marrow, Squash				Cucurbita pepo L.var. giromontia Duch.			
03026003	26.12.2003	30.01.2014	Нефрит F1	1081	50		
			Nefrit F1				
05026001	11.01.2007	30.01.2014	Медуза F1	273			
			Meduza F1				
05026005	23.01.2008	30.01.2014	Престиж F1	313		313	
			Prestyzh F1				
49026002	01.01.1950	30.01.2014	Одеський 52	381			
			Odes'kyi 52				
87026001	20.01.1992	30.01.2014	Золотінка	410			
			Zolotinka				
98026001	01.01.2001	30.01.2014	Сорая	1081			
			Soraya				
99026002	01.01.2002	30.01.2014	Чаклун	402			
			Chaklun				
Патисон Yellow Summer Squash, Custard Squash				Cucurbita pepo var. melopepo (L.) Harz			
01162001	01.01.2002	30.01.2014	Перлінка	402			
			Perlynka				
92162001	24.02.1999	30.01.2014	Оранжевий	410			
			Oranzhevyi				
Гарбуз звичайний Pumpkin				Cucurbita pepo L.			
05102002	23.01.2008	30.01.2014	Юнона	1081	50	1081	50
			Junona				
49102003	01.01.1950	30.01.2014	Мозоліївський 15	402			
			Mozoliivs'kyi 15				
73102001	01.01.1982	30.01.2014	Херсонський	410			
			Khersons'kyi				
84102001	20.01.1992	30.01.2014	Новинка	410			
			Novynka				
92102001	27.01.1995	30.01.2014	Гілея	410			
			Hileia				
97102002	20.01.2001	30.01.2014	Польовичка	410			
			Pol'ovychka				
99102003	12.02.2003	30.01.2014	Південний	410			
			Pivdennyi				
Конюшина лучна (червона) Red Clover				Trifolium pratense L.			
51052002	01.01.1961	30.01.2014	Носівська 5	429			
			Nosivs'ka 5				
64052001	01.01.1971	30.01.2014	Носівська 4	429			
			Nosivs'ka 4				
68052001	01.01.1975	30.01.2014	Миронівська 45	341			
			Myronivs'ka 45				
91052005	01.01.1997	30.01.2014	Тернопільська 3	395			
			Ternopil's'ka 3				
94052001	21.02.1998	30.01.2014	Анітра	305		1669	
			Anitra				
94052003	01.01.2000	30.01.2014	Миронівська 5	341			
			Myronivs'ka 5				
97052001	01.01.2001	30.01.2014	Тернопільська 4	395			
			Ternopil's'ka 4				
99052001	25.12.2001	30.01.2014	Спарта	305		1669	
			Sparta				
Конюшина гібридна Alsike Clover Hybrid				Trifolium hybridum L.			
07051001	28.12.2011	30.01.2014	Вілія	305		1669	
			Viliia				

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата припинення Date of cancellation	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)		Власник сорту (код) Variety owner (code)	
94051001	24.02.1999	30.01.2014	Левада Levada	305		1669	
Конюшина біла (повзуча) White Clover				<i>Trifolium repens L.</i>			
94053004	24.02.1999	30.01.2014	Даная Danaia	305		1669	
Конюшина олександрійська Alexandrian Clover, Berseem Clover				<i>Trifolium alexandrinum L.</i>			
92143001	27.01.1995	30.01.2014	Оріана Oriana	305		1669	
Сорго-суданковий гібрид Sorghum x Sudan Grass hybrids				<i>Sorghum vulgare Pers. x Sorghum sudanense (Piper) Stapf.</i>			
02063002	01.01.2006	30.01.2014	Присиваський 4 Prysyvas'kyi 4	414			
04063002	11.01.2007	30.01.2014	Арабат Arabat	414	311	311	414
90063003	01.01.1992	30.01.2014	Сократор 87 Sokrator 87	361			
94063001	01.01.1998	30.01.2014	Ювілей 50 Yuvilei 50	361			
98063001	01.01.2001	30.01.2014	Ювілейний 75 Yuvileinyi 75	361			
Фацелія пижмолиста Scorpion Weed, Lacy phacelia, California bluebell				<i>Phacelia tanacetifolia Benth.</i>			
91199004	01.01.1995	30.01.2014	Аліна Alina	302			
Буряк кормовий Fodder Beet				<i>Beta vulgaris L.</i>			
05046003	23.01.2008	30.01.2014	Дністер Dnister	330		330	
72046001	01.01.1979	30.01.2014	Київський Kyivs'kyi	333	345		
99046002	25.12.2001	30.01.2014	Веселка Veselka	421			
Цибуля запашна Sweet-scented onion				<i>Allium odorum L.</i>			
08416001	17.03.2009	30.01.2014	Зоряний Zoranyi	402		402	
Сафлор красильний Safflower				<i>Carthamus tinctorius L.</i>			
05323001	01.01.2006	30.01.2014	Степовий Stepovyi	1192		1192	
Боби кормові Broad Bean				<i>Vicia faba L. var. major Harz</i>			
02043001	12.02.2003	30.01.2014	Янкель білий Jankiel bialy	1081			
03043001	01.01.2005	30.01.2014	Візір Vizyr	305		1669	
58043005	01.01.1962	30.01.2014	Хоростківські Khorostkivs'ki	395			
98043001	01.01.2000	30.01.2014	Білун Bilun	330	305	330	1669
Горошок посівний (озимий) Common Vetch (Winter)				<i>Vicia sativa L.</i>			
98047001	20.01.2001	30.01.2014	Приморка Prymorka	305	381	1669	381
Горошок посівний (ярий) Common Vetch (Spring)				<i>Vicia sativa L.</i>			
00047002	12.02.2003	30.01.2014	Білоцерківська 10 Bilotserkivs'ka 10	335			
01047001	01.01.2005	30.01.2014	Віаріка Viarka	306			

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата припинення Date of cancellation	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)			Власник сорту (код) Variety owner (code)		
01047002	01.01.2005	30.01.2014	Ізида Izyda	335	1092	1031			
01047003	01.01.2005	30.01.2014	Ларія Lariia	395					
02047001	01.01.2006	30.01.2014	Світлана Svitlana	306					
03047001	01.01.2006	30.01.2014	Ярослава Yaroslava	335			335		
03047002	11.01.2007	30.01.2014	Ірина Iryna	306			306		
05047001	23.01.2008	30.01.2014	Ліліана Liliana	306			306		
05047002	23.01.2008	30.01.2014	Євгена Yevhena	1031	335	1092	1031	335	1092
06047001	15.01.2010	30.01.2014	Владіслава Vladislava	306			306		
06047002	01.10.2010	30.01.2014	Ліла Lila	335	1092	1031	335	1031	1092
08047001	20.12.2011	30.01.2014	Єлізавета Yelizaveta	306			306		
92047005	01.01.1998	30.01.2014	Подільська 2 Podil's`ka 2	395					
94047002	01.01.2000	30.01.2014	Подільська 9 Podil's`ka 9	306					
94047003	01.01.1999	30.01.2014	Маргарита Marharyta	306					
94047004	01.01.1999	30.01.2014	Багатоплідна Bahatoplidna	395					
97047002	01.01.2000	30.01.2014	Білоцерківська 7 Bilotserkivs'ka 7	335					
98047004	01.01.2001	30.01.2014	Білоцерківська 96 Bilotserkivs`ka 96	1092	335	1091			
99047001	12.02.2003	30.01.2014	Аріадна Ariadna	306					
99047002	01.01.2001	30.01.2014	Гібридна 85 Hibrydna 85	335	387		1943	335	
Буркун білий White Sweet Clover				Melilotus albus Medik.					
87044003	09.02.1991	30.01.2014	Еней Enei	305			1669		
Грястиця збірна Cocksfoot				Dactylis glomerata L.					
71049002	01.01.1979	30.01.2014	Київська рання 1 Kyivs'ka rannia 1	337					
Житняк Wheatgrass				Agropyron Gaertn.					
05103001	23.01.2008	30.01.2014	Петрівський Petrivs`kyi	305			1669		
Пирій середній Wild Triga, Intermediate Wheatgrass				Elytrigia intermedia (Host.) Nevski					
07423001	01.01.2009	30.01.2014	Хорс Khors	305			1669		
Кострець безостий Smooth Brome Grass				Bromopsis inermis (Leyss.) Holub					
97065001	25.12.2001	30.01.2014	Всеслав Vseslav	305			1669		
97065002	20.01.2001	30.01.2014	Марс Mars	305			1669		
Люцерна посівна Lucerne				Medicago sativa L.					
00058001	26.12.2003	30.01.2014	Власта Vlasta	912			1845		
06058001	15.01.2010	30.01.2014	Синюха Syniukha	305			1669		

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата припинення Date of cancellation	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)
07058002	26.12.2011	30.01.2014	ПР55В48	1055	
07058003	26.12.2011	30.01.2014	ПР55V48 ПР54В46	1055	
92058004	25.01.1996	30.01.2014	ПР54V46 Регіна Rehina	305	1669
Люпин білий White Lupin			Lupinus albus L.		
87055008	20.01.1992	30.01.2014	Козелецький Kozelets'kyi	429	
Лядвенець рогатий Bird's Foot Trefoil			Lotus corniculatus L.		
97119001	24.02.1999	30.01.2014	Аякс Aiaks	305	1669
Костриця лучна Meadow Fescue			Festuca pratensis Huds.		
00054001	01.01.2005	30.01.2014	Венера Venega	392	
03054001	11.01.2007	30.01.2014	Діброва Dibrova	305	1669
92054001	01.01.1998	30.01.2014	Росинка Rosynka	392	
Костриця очеретяна Tall Fescue			Festuca arundinacea Schreb.		
92109001	01.01.1998	30.01.2014	Садівничанка Sadivnychanka	392	
97109001	20.01.2001	30.01.2014	Людмила Liudmyla	305	1669
Сорго вінікове Broom Corn			Sorghum technicum Roshev.		
00135001	12.02.2003	30.01.2014	Любиме 80 Liubyme 80	361	
90135001	01.01.1995	30.01.2014	Українське 20 Ukrains'ke 20	361	
Регнерія шорсткостеблова Slender Wheat Grass			Roegneria trachycaulon (Link) Nevski		
08491001	28.12.2011	30.01.2014	Колумб Kolumb	305	1669
Редька олійна Fodder Radish			Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.		
07096002	18.12.2009	30.01.2014	Колонель Colonel	825	
97096001	01.01.2000	30.01.2014	Журавка Zhuravka	332	
Гірчиця чорна Black Mustard			Brassica nigra (L.) Koch		
05428001	01.01.2006	30.01.2014	Софія Sofia	332	
М'ята довголиста Mint Horse			Mentha longifolia L.		
04430001	23.01.2008	30.01.2014	Діана Diana	427	427
05430001	23.01.2008	30.01.2014	Оксамитова Oksamytova	427	427
Пажитниця багатоквіткова Italian Ryegrass			Lolium multiflorum Lam.		
05061002	01.01.2009	30.01.2014	Коломийська Kolomyis'ka	330	330
Пажитниця багаторічна Perennial Ryegrass			Lolium perenne L.		
04062001	01.01.2005	30.01.2014	Руслана Ruslana	305	1669

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата припинення Date of cancellation	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)		Власник сорту (код) Variety owner (code)	
06062001	03.02.2011	30.01.2014	Довбушанка Dovbushanka	330		330	
08062002	27.01.2009	30.01.2014	Галліус Gallius	600		600	
97062001	20.01.2001	30.01.2014	Обрій Obrii	305		1669	
Райграс високий Tall Oatgrass			<i>Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. S. et K. B. Presl.</i>				
03060001	26.12.2003	30.01.2014	Дронго Dronho	305		1669	
Сорго суданське Sudan Grass			<i>Sorghum sudanense (Piper.) Stapf.</i>				
00067001	26.12.2003	30.01.2014	Дніпровська 54 Dniprovs`ka 54	340			
06067001	23.01.2008	30.01.2014	Білявка Biliavka	414		414	
90067002	01.01.1996	30.01.2014	Фіолета Fioleta	361			
Тимофіївка лучна Timothy			<i>Phleum pratense L.</i>				
02068001	01.01.2006	30.01.2014	Витава Vytava	305		1669	
Еспарцет виколистий Sainfoin			<i>Onobrychis viciifolia Scop.</i>				
04050001	11.01.2007	30.01.2014	Смарагд Smarahd	305	356	1669	356
71050001	01.01.1978	30.01.2014	Інгільський Inhul's'kyi	356			
87050002	20.01.1993	30.01.2014	Кіровоградський 27 Kirovohrads'kyi 27	356			
90050003	27.01.1995	30.01.2014	Костянтин Kostiantyn	356			
97050001	01.01.2002	30.01.2014	Кримський Kryms'kyi	358			
98050001	25.12.2001	30.01.2014	Кіровоградський 22 Kirovohrads'kyi 22	356	305	356	1669
Сорго цукрове Sweet Sorghum			<i>Sorghum saccharatum (L.) Moench</i>				
00010001	26.12.2003	30.01.2014	Аграрний 5F Ahrarnyi 5F	361			
06472001	23.01.2008	30.01.2014	Пам'яті Шепеля Pam"iati Shepelia	361		361	
85010005	01.01.1991	30.01.2014	Сиваський 85 Syvas`kyi 85	414			
98010001	01.01.2001	30.01.2014	Кримське 15 Kryms`ke 15	361			
Горох польовий (пелюшка) Field Pea			<i>Pisum arvense L.</i>				
92048004	01.01.1997	30.01.2014	Резонатор Rezonator	404			
Меліса лікарська Gardem Balm			<i>Melissa officinalis L.</i>				
00356001	12.02.2003	30.01.2014	Соборна Soborna	402			
Груша звичайна Pear			<i>Pyrus communis L.</i>				
06076002	11.01.2007	30.01.2014	Яніс Yanis	433		1539	
57076001	01.01.1969	30.01.2014	Десертна Desertna	359			
57076002	01.01.1969	30.01.2014	Вітчизняна Vitchyzniana	359			

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата припинення Date of cancellation	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)
58076001	01.01.1975	30.01.2014	Золотиста	359	
			Zolotysta		
66076001	01.01.1979	30.01.2014	Васса	359	
			Vassa		
74076003	01.01.1976	30.01.2014	Таврійська	359	
			Tavriis'ka		
82076009	20.01.1993	30.01.2014	Ізумрудна	359	
			Izumrudna		
83076003	01.02.1994	30.01.2014	Ізюминка Криму	359	
			Iziiumynka Krymu		
86076003	24.02.1999	30.01.2014	Якимівська	359	
			Yakymivs'ka		
87076006	25.01.1996	30.01.2014	Чернівчанка	433	
			Chernivchanka		
87076007	25.01.1996	30.01.2014	Буковинка	433	
			Bukovynka		
87076009	25.01.1996	30.01.2014	Яблунівська	433	
			Yablunivs'ka		
87076011	25.01.1996	30.01.2014	Крупноплідна	433	
			Krupnoplidna		
88076001	25.01.1996	30.01.2014	Осінь Буковини	433	
			Osin' Bukovyny		
88076003	25.01.1996	30.01.2014	Кучерянка	433	
			Kucherianka		
92076011	20.01.2001	30.01.2014	Марія	359	
			Mariia		
97076002	23.01.2008	30.01.2014	Мрія	359	359
			Mriia		
Слива домашня Plum			<i>Prunus domestica L.</i>		
90080005	01.01.1999	30.01.2014	Чачакська найкраща	363	
			Chachaks'ka naikrascha		
Черешня Sweet Cherry			<i>Prunus avium L.</i>		
49085003	01.01.1954	30.01.2014	Нектарна	424	
			Nektarna		
Яблуна домашня Apple			<i>Malus domestica Borkh.</i>		
06086003	23.01.2008	30.01.2014	Білосніжка	359	359
			Bilosnizhka		
06086004	23.01.2008	30.01.2014	Фаворит	359	359
			Favoryt		
55086002	01.01.1971	30.01.2014	Пепінка золотиста	424	
			Pepinka zolotysta		
69086006	01.01.1984	30.01.2014	Кримське зимове	359	
			Kryms'ke zimove		
69086010	01.01.1989	30.01.2014	Сентябрьське красне	359	
			Sentiabrs'ke krasne		
73086019	01.01.1977	30.01.2014	Аврора кримська	359	
			Avroga kryms'ka		
73086021	01.01.1981	30.01.2014	Салгірське	359	
			Salhirs'ke		
75086004	21.02.1998	30.01.2014	Кримське	359	
			Kryms'ke		
75086008	01.01.1984	30.01.2014	Таврія	359	
			Tavriia		
75086026	21.02.1998	30.01.2014	Предгорне	359	
			Predghorne		
78086006	24.02.1999	30.01.2014	Ровесник	424	
			Rovesnyk		
82086007	20.01.1993	30.01.2014	Алі паруси	359	
			Ali parusy		
85086004	26.02.2000	30.01.2014	Балаклавське	359	
			Balaklavs'ke		
92086003	25.01.1996	30.01.2014	Кимерія	359	
			Kymeriia		

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата припинення Date of cancellation	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)		Власник сорту (код) Variety owner (code)	
Щириця Amaranth			Amaranthus L.				
08099002	28.12.2010	30.01.2014	Пальміра PAL`MIRA	305		1669	
90099001	20.01.1993	30.01.2014	Атлант Atlant	305		1669	
94099001	26.02.1997	30.01.2014	Ацтек Atstek	305		1669	
94099005	21.02.1998	30.01.2014	Орхідея Orkhideia	305		1669	
Петунія гібридна Petunia Hybrid			Petunia x hybrida Vilm.				
05240001	01.01.2006	30.01.2014	Аура Aura	1163		1163	
05240002	01.01.2006	30.01.2014	Рожевий фламінго Rozheviy flamingo	1163		1163	
05240003	01.01.2006	30.01.2014	Фейєрверк Feyerwerk	1163		1163	
М'ята Mint			Mentha L.				
49116001	01.01.1956	30.01.2014	Прилуцька 6 Pryluts'ka 6	366	427	366	427
61116001	01.01.1967	30.01.2014	Краснодарська 2 Krasnodars'ka 2	427	366	366	427
90116001	01.01.1995	30.01.2014	Заграва Zahrava	427	366	427	366
92116001	01.01.1998	30.01.2014	Українська перцева Ukrains'ka pertseva	427	366	366	427
97116001	01.01.2001	30.01.2014	Удайчанка Udaichanka	427	366	427	366
97116002	01.01.2001	30.01.2014	Прилуцька карвонна Pryluts`ka karvonna	427	366	427	366
Унабі справжній (зізіфус) Jujube			Ziziphus jujuba Mill.				
05124001	23.01.2008	30.01.2014	Плодівський Plodivs`kyi	1067		1067	
Льон великоквітковий (декоративний) Flowering Flax, red (scarlet) flax, crimson flax			Linum grandiflorum Desf.				
07308001	01.01.2009	30.01.2014	Запорізький сувенір Zaporiz`kyi souvenir	328		328	
08308001	17.03.2009	30.01.2014	Перший сніжок Pershyi snizhok	328		328	
10308001	29.11.2010	30.01.2014	Вогник Vohnyk	328		328	
Горіх грецький Walnut			Juglans regia L.				
87075003	01.02.1994	30.01.2014	Буковинський 2 Буковинський 2	433			
87075007	01.02.1994	30.01.2014	Буковинська бомба Буковинська бомба	433			
91075009	01.02.1994	30.01.2014	Клішківський Клішківський	433			
91075010	01.02.1994	30.01.2014	Прикарпатський Прикарпатський	433			
91075012	01.02.1994	30.01.2014	Ярівський Ярівський	433			
91075014	01.02.1994	30.01.2014	Топорівський Топорівський	433			
95075001	25.01.1996	30.01.2014	Чернівецький 1 Чернівецький 1	433			
97075002	11.01.2007	30.01.2014	Рудківський Рудківський	433		433	

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата припинення Date of cancellation	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)
Ліщина велика (фундук) HazelNut			<i>Corylus maxima Mill.</i>		
09216001	05.03.2010	30.01.2014	Косфорд Cosford	1364	
09216002	05.03.2010	30.01.2014	Барселонський Barcelonski	1364	
09216003	05.03.2010	30.01.2014	Галле Halle	1364	
Тритикале (яре) Triticale (Spring)			<i>Triticosecale Witt.</i>		
02011007	01.01.2006	30.01.2014	Микола Mykola	1112	1112
04011005	11.01.2007	30.01.2014	Лосинівське Losynivs'ke	350	1112 350
05011006	23.01.2008	30.01.2014	Вересоч Veresoch	350	1112 350
91011001	01.01.1995	30.01.2014	Аїст харківський Aist kharkivs'kyi	404	
98011005	01.01.2002	30.01.2014	Жайворонок харківський Zhaivoronok kharkivs'kyi	404	404
Суниця садова Strawberry			<i>Fragaria ananassa Duch.</i>		
08084009	18.12.2009	30.01.2014	Юніол Yuniol	359	359
77084002	01.01.1985	30.01.2014	Кримська рання Kryms'ka rannia	359	
80084008	01.01.1987	30.01.2014	Кримчанка 87 Krymchanka 87	359	
81084001	01.01.1985	30.01.2014	Кримська ремонтантна Kryms'ka remontantna	359	
Агрус звичайний (відхилений) Gooseberry			<i>Ribes uva-crispa L.</i>		
51071001	01.01.1969	30.01.2014	Мліївський жовтий Mliivs'kyi zhovtyi	424	
Малина Raspberry			<i>Rubus idaeus L.</i>		
86077001	02.10.1998	30.01.2014	Рось Ros'	424	
Виноград справжній Grape, Grapevine			<i>Vitis vinifera L.</i>		
01073001	01.01.2002	30.01.2014	Кок пандас Kok pandas	917	
01073002	01.01.2002	30.01.2014	Джеват кара Dzhevat kara	917	
01073003	01.01.2002	30.01.2014	Солдайя Soldaiia	917	
05073001	01.01.2006	30.01.2014	Шоколадний Shokoladnyi	1068	1068
49073015	01.01.1958	30.01.2014	Серціаль Sersial'	1010	
52073003	01.01.1958	30.01.2014	Вердельо Verdel'o	1010	
52073006	01.01.1958	30.01.2014	Мускат рожевий Muskat rozhevyi	1010	
54073004	01.01.1958	30.01.2014	Алеатіко Aleatiko	1010	
57073007	01.01.1958	30.01.2014	Шабаш Shabash	1010	
57073008	01.01.1958	30.01.2014	Альбіліо кримський Al'bil'o kryms'kyi	1010	
57073010	01.01.1958	30.01.2014	Морастель Morastel'	1010	
60073003	25.12.2001	30.01.2014	Цимлянський чорний Tsymlians'kyi chornyi	1010	
79073006	01.01.1995	30.01.2014	Кефесія Kefesiia	917	

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата припинення Date of cancellation	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)
79073007	01.01.1995	30.01.2014	Сари пандас Sary pandas	917	
80073010	01.01.1986	30.01.2014	Асма Asma	1010	
90073019	09.02.1991	30.01.2014	Восторг Vostorh	211	
92073004	01.01.2006	30.01.2014	Буковинка Буковунка	1068	1068
92073012	01.01.1995	30.01.2014	Капсельський білий Kapsel's'kyi bilyi	917	
92073013	01.01.1995	30.01.2014	Крона Krona	917	
97073006	01.01.2006	30.01.2014	Мускат Голодриги Muskat Holodryhy	1068	1068
Лілійник Daylily				Hemerocallis L.	
08236006	27.07.2010	30.01.2014	Ювілейний Yuvileinyi	827	827
Бузок звичайний Lilac				Syringa vulgaris L.	
04223002	01.01.2009	30.01.2014	Чарівність Charivnist`	317	317
Троянда Rose				Rosa L.	
07246001	01.01.2009	30.01.2014	Тан 00993 Tan 00993	484	484
Цибуля галузиста Onion				Allium ramosum L.	
04419001	29.05.2007	30.01.2014	Донецький малахіт Donets'kyi malakhit	317	317
04419002	29.05.2007	30.01.2014	Євген Yevhen	317	317
Люцерна мінлива Hybrid Lucerne				Medicago x varia Martyn	
74392001	01.01.1979	30.01.2014	Херсонська 9 Khersons`ka 9	411	
Хурма східна Persimmon				Diospyros kaki L.	
05442001	01.01.2006	30.01.2014	Новінка Novinka	1067	1067
05442002	01.01.2006	30.01.2014	Гора Говерла Hora Hoverla	1067	1067
05442003	01.01.2006	30.01.2014	Гора Роман Кош Hora Roman Kosh	1067	1067
05442004	01.01.2006	30.01.2014	Гора Роджерс Hora Rodzhers	1067	1067
Азіміна трилопатева Равправ				Asimina triloba (L.) Dunal	
05443002	23.01.2008	30.01.2014	Новокаховчанка Novokakhovchanka	1067	1067
Пажитниця вестервольдська Westerwolds Ryegrass				Lolium multiflorum Lam. var. westerwoldicum Wittm	
91397001	27.01.1995	30.01.2014	Тиверський Tyvers'kyi	305	1669
97397001	24.02.1999	30.01.2014	Ореол Oreol	305	1669
Тонконіг лучний Kentucky Bluegrass				Poa pratensis L.	
04069001	01.01.2005	30.01.2014	Удич Udych	305	1669
Костриця червона Red Fescue, Creeping Fescue				Festuca rubra L.	

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата припинення Date of cancellation	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)		Власник сорту (код) Variety owner (code)	
08111006	05.03.2010	30.01.2014	Айра	305		1669	
94111001	21.02.1998	30.01.2014	Aira	305		1669	
94111002	21.02.1998	30.01.2014	Ahata	305		1669	
			Янка	305		1669	
			Yanka	305		1669	
Гірчиця біла White Mustard			Sinapis alba L.				
06092001	23.01.2008	30.01.2014	Подольнка	418		418	
08092003	31.12.2009	30.01.2014	Podolianka	825			
09092002	28.12.2010	30.01.2014	Луна	305		1669	
90092002	20.01.1993	30.01.2014	Luna	305		1669	
94092001	01.01.2000	30.01.2014	Ослава	332			
			Oslava	332			
			Кароліна	332			
			Karolina	332			
			Підпечерецька	332			
			Pidpecherets'ka	332			
Люпин жовтий Yellow Lupin			Lupinus luteus L.				
08057001	20.12.2011	30.01.2014	Світязь	307	345	307	1626
82057001	01.01.1985	30.01.2014	Svitiaz`	307			
86057001	01.01.1990	30.01.2014	Волинський 1	307			
			Volyns'kyi 1	307			
			Прип'ятський	307			
			Pryp'iats'kyi	307			
Калістефус китайський China Aster			Callistephus chinensis (L.) Nees				
76285009	01.01.1996	30.01.2014	Поліна	344			
79285001	01.01.1997	30.01.2014	Polina	344			
79285005	01.01.1999	30.01.2014	Юлія	344			
90285005	01.01.1996	30.01.2014	Yuliia	344			
90285006	01.01.1995	30.01.2014	Нежність	344			
90285007	01.01.1996	30.01.2014	Niezhnost`	344			
91285003	01.01.1996	30.01.2014	Оксана	344			
92285004	01.01.1994	30.01.2014	Oksana	344			
97285001	01.01.1999	30.01.2014	Звезда Полесья	344			
			Zvezda Polies'ia	344			
			Осінній вечір	344			
			Osinnii vechir	344			
			Павліна	344			
			Pavlina	344			
			Яблунова	344			
			Yabluneva	344			
			Одарка	344			
			Odarka	344			
Сориз			Sorghum oryoidum				
00330003	12.02.2003	30.01.2014	Крупинка 10	361			
00330004	01.01.2002	30.01.2014	Krupinka 10	361			
00330005	12.02.2003	30.01.2014	Прогрес F1	361			
06330001	01.01.2009	30.01.2014	Progres F1	361			
			Коричневе 11	361			
			Korychneve 11	361			
			Наш	361		361	
			Nash	361		361	
Конюшина відкритозіва Open Clover			Trifolium apertum Bobr.				
97361001	21.02.1998	30.01.2014	Діана	305		1669	
			Diana	305		1669	
Гарбуз великоплідний Pumpkin			Cucurbita maxima Duch.				
05102001	23.01.2008	30.01.2014	Данка Полька	1081	50	1081	50
			Danka Polka	1081	50	1081	50

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата припинення Date of cancellation	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)
Розторопша плямиста Milk Thistle			<i>Silybum marianum (L.) Gaertn.</i>		
05194001	11.01.2007	30.01.2014	Бойківчанка Boikivchanka	332	332
Васильки справжні Basil			<i>Ocimum basilicum L.</i>		
00340001	12.02.2003	30.01.2014	Юнга Yunha	402	
06340002	11.01.2007	30.01.2014	Філософ Filosof	898 893	
Змієголовник молдавський Moldavian Dragonshead			<i>Dracocephalum moldavica L.</i>		
00336002	12.02.2003	30.01.2014	Медоніс Medonis	402	
Костриця овеча Sheep's Fescue			<i>Festuca ovina L.</i>		
94331001	26.02.1997	30.01.2014	Забава Zabava	305	1669
Костриця тонколиста Fine-Leaf Sheep Fescue, Hair Fescue			<i>Festuca tenuifolia Sibth.</i>		
04295001	01.01.2005	30.01.2014	Барва Barva	305	1669
Яблуня (підщепа) Malus Apple Rootstock			<i>Malus Mill.</i>		
09108001	25.08.2009	30.01.2014	Батуринська Baturyns`ka	1368	1368
09108002	25.08.2009	30.01.2014	Надія Nadiia	1368	1368
09108003	25.08.2009	30.01.2014	Самбірська Sambirs`ka	1368	1368
09108004	28.12.2011	30.01.2014	Конотопська Konotops`ka	1368	1368
09108005	28.12.2011	30.01.2014	Ніжинська Nizhyns`ka	1368	1368
09108006	28.12.2011	30.01.2014	Слобожанська Slobozhans`ka	1368	1368
09108007	28.12.2011	30.01.2014	Малюк Maliuk	1368	1368
09108008	28.12.2011	30.01.2014	K 104 K 104	359	359
Пшениця шарозерна Round-Grained Wheat			<i>Triticum sphaerococcum Perc.</i>		
05466001	23.01.2008	30.01.2014	Шарада Sharada	25	25
Деревій майже звичайний Achillea			<i>Achillea submillefolium Klok. et Krytzka</i>		
06468001	01.01.2009	30.01.2014	Еней Enei	366	
Стоколос прибережний Meadow Brome			<i>Bromopsis riparia (Rehm.) Holub</i>		
07479001	01.01.2009	30.01.2014	Боян Boian	305	1669
Кукурудза звичайна - батьківський компонент Maize, Corn - parental component			<i>Zea mays L.</i>		
08004201	26.03.2009	30.01.2014	KB1Г142 KW1G142	938	938
08004204	26.03.2009	30.01.2014	KBCEK 502 KWSEK 502	938	938
08004205	26.03.2009	30.01.2014	KB4M011 x KB4Ф513 KW4M011 x KW4F513	938	938
08004208	26.03.2009	30.01.2014	KB7Ф518 x KB7Ф517 KW7F518 x KW7F517	938	938
08004263	26.03.2009	30.01.2014	KB5361 KW5361	938	938

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата припинення Date of cancellation	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)	
08004268	26.03.2009	30.01.2014	KB6518 x KB6509	938	938	
08004272	26.03.2009	30.01.2014	KW6518 x KW6509 KB6502	938	938	
09004236	30.11.2010	30.01.2014	KW6502 Бест 281 С стерильна	311	311	
09004304	16.04.2010	30.01.2014	Best 281 S steryl'na C 7 M	957	957	
09004305	26.02.2010	30.01.2014	S 7 M Крос 300 С	957	957	
09004309	26.02.2010	30.01.2014	Kros 300 S MC 481	957	957	
09004310	16.04.2010	30.01.2014	MS 481 BK 205 MB	957	957	
09004318	16.04.2010	30.01.2014	VK 205 MV K 1273	957	957	
Соняшник однорічний - батьківський компонент Sunflower - parental component				<i>Helianthus annuus L.</i>		
09017085	26.03.2009	30.01.2014	X702P H702R	938	938	793
Ріпак (ярий) - батьківський компонент Rape Seed (Spring) - parental component				<i>Brassica napus L. oleifera</i>		
09016080	20.11.2009	30.01.2014	МСЛ 543 Ц MSL 543 С	807	807	
09016168	01.10.2010	30.01.2014	ПОЛЛ 52 POLL 52	807	807	

6.4. Відомості щодо відновлення чинності майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослин

6.4. Notifications on proprietary right of intellectual property for plant variety dissemination validity restored

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата відновлення Date of renewal	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)		Власник сорту (код) Variety owner (code)			
Гречка їстівна Buckwheat			<i>Fagopyrum esculentum</i> Moench						
00002004	01.01.2005	19.03.2014	Єлена Yelena	417		417			
Пшениця м'яка (озима) Soft Wheat (Winter)			<i>Triticum aestivum</i> L.						
00007019	01.01.2005	28.03.2014	Співанка Spivanka	312					
08007007	10.10.2011	28.03.2014	Комерційна Komertsiiina	312		312			
Соняшник однорічний Sunflower			<i>Helianthus annuus</i> L.						
09017270	20.12.2011	21.01.2014	КС 108 QC108	883		883			
Тютюн справжній Tobacco			<i>Nicotiana tabacum</i> L.						
05019001	11.01.2007	28.03.2014	Галицький оригінальний Halys`kyi oryhinal`nyi	396		396			
94019008	21.02.1998	28.03.2014	Тернопільський 14 Ternopil`s`kyi 14	396		396			
97019002	20.01.2001	28.03.2014	Берлей 38 Berlei 38	396		396			
Капуста кольрабі Kohlrabi			<i>Brassica oleracea</i> L. convar. acephala (DC.) Alef. var. gongylodes L.						
06105001	11.01.2007	28.03.2014	Фея Feia	647	1044	964	647	1044	964
06105002	11.01.2007	28.03.2014	Сніжана Snizhana	647	1044	964	647	1044	964
Капуста цвітна Cauliflower			<i>Brassica oleracea</i> L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis						
06029002	23.01.2008	28.03.2014	Фламінго Flaminho	647	1044	964	647	964	1044
06029003	23.01.2008	28.03.2014	Акварель Akvarel`	647	1044	964	1044	647	964
Морква Carrot			<i>Daucus carota</i> L.						
03034004	11.01.2007	28.03.2014	Кадріль Kadriľ`	964	647	647		964	
03034009	01.01.2006	28.03.2014	Ассоль Assol`	964	647	647		964	
03034010	01.01.2006	28.03.2014	Карнавал Karnaval	964	647	647		964	
03034011	01.01.2006	28.03.2014	Кармен Karmen	964	647	647		964	
Петрушка городня Parsley			<i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nym. ex A.W. Hill						
06163001	11.01.2007	19.03.2014	Челеста Chelesta	647	1044	964	647	1044	964
06163002	11.01.2007	28.03.2014	Фреска Freska	647	1044	964	647	1044	964
Помідор їстівний Tomato			<i>Solanum lycopersicum</i> L.						
03040035	01.01.2006	19.03.2014	Арфа F1 Arfa F1	964	647	964		647	
03040036	01.01.2006	19.03.2014	Муза F1 Muza F1	964	647	964		647	
Редька посівна (редиска) Radish, Garden Radish, European Radish			<i>Raphanus sativus</i> L. var. sativus						
06038001	23.01.2008	28.03.2014	Арсенал Arsenal	647	964	1044	647	1044	964

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата відновлення Date of renewal	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)		Власник сорту (код) Variety owner (code)			
06038002	23.01.2008	28.03.2014	Пікнік Piknik	1044	647	964	647	1044	964
06038003	23.01.2008	28.03.2014	Опус Opus	647	964	1044	647	1044	964
06038004	23.01.2008	28.03.2014	Лінда Linda	1044	647	964	647	1044	964
06038006	23.01.2008	28.03.2014	Герда Herda	1044	647	964	647	1044	964
Капуста броколі Calabrese, Sprouting Broccoli			<i>Brassica oleracea</i> L. convar. botrytis (L.) Alef. var. cymosa Duch.						
06148001	11.01.2007	28.03.2014	Трубадур Trubadur	1044	647	964	647	1044	964
Конюшина біла (повзуча) White Clover			<i>Trifolium repens</i> L.						
98053002	20.01.2001	13.01.2014	Рівендел Rivendel	724					
Костриця лучна Meadow Fescue			<i>Festuca pratensis</i> Huds.						
98054001	25.12.2001	13.01.2014	Сену Senu	724					
Костриця очеретяна Tall Fescue			<i>Festuca arundinacea</i> Schreb.						
98109001	25.12.2001	13.01.2014	Кора Kora	724					
Пажитниця багаторічна Perennial Ryegrass			<i>Lolium perenne</i> L.						
94062009	21.02.1998	13.01.2014	Тайя Taya	724					
98062006	20.01.2001	21.03.2014	Гатор Gator	740					
98062010	20.01.2001	21.03.2014	Нуман Numan	740					
Черешня Sweet Cherry			<i>Prunus avium</i> L.						
09085004	14.01.2011	12.03.2014	Гізела 6 Gisela 6	1447			1447		
09085005	14.01.2011	12.03.2014	Гізела 5 Gisela 5	1447					
Виноград справжній Grape, Grapevine			<i>Vitis vinifera</i> L.						
49073003	01.01.1959	12.03.2014	Мускат білий Muskat bilyi	1010					
76073007	01.01.1978	19.03.2014	Рипарія x Рупестрис 101-14 Rypariia x Rupestrys 101-14	1010					
76073011	01.01.1978	19.03.2014	Берландієрі x Рипарія СО4 Berlandiieri x Rypariia SO4	1010					
Тонконіг лучний Kentucky Bluegrass			<i>Poa pratensis</i> L.						
92069003	21.02.1998	13.01.2014	Балін Balin	724					
94069003	21.02.1998	13.01.2014	Конні Conni	724					
98069001	20.01.2001	13.01.2014	Компакт Comract	724					
98069002	20.01.2001	13.01.2014	Собра Sobra	724					
98069006	24.02.1999	21.03.2014	Міракле Miracle	740					
Костриця червона Red Fescue, Creeping Fescue			<i>Festuca rubra</i> L.						
98111006	24.02.1999	21.03.2014	Геральд Herald	740					

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата відновлення Date of renewal	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)		Власник сорту (код) Variety owner (code)	
Мітлиця повзуча Creeping Bent			Agrostis stolonifera L.				
98352001	20.01.2001	13.01.2014	Кромі Kromi	724			
Люпин вузьколистий Blue Lupin							
05056001	23.01.2008	21.03.2014	Фламініго Flaminho	585	586	585	586
Тонконіг звичайний Rough Stalked Meadow Grass			Lupinus angustifolius L.				
98358001	20.01.2001	13.01.2014	Дасас Dasas	724			
Костриця шорстколиста Hard Fescue, Reliant Hard Fescue			Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina				
98364002	24.02.1999	21.03.2014	Саманта Samanta	740			
Костриця Беккера Hard Fescue			Festuca beckeri (Hack) Trautv.				
95333002	21.02.1998	13.01.2014	Ріду Ridu	724			
Васильки справжні Basil			Ocimum basilicum L.				
06340001	11.01.2007	28.03.2014	Етруск Etrusk	964 647 1044		647 964 1044	

6.5. Інші відомості, внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні

6.5. Other notifications listed in the State Register of Plant Varieties Suitable for Dissemination in Ukraine

Перелік сортів рослин, внесених до Реєстру сортів, правонаступником яких є Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України (код 1698), відповідно до наказу Держветфітослужби

України від 07.02.2014 року № 261

List of Plant Varieties as included into the Register of Varieties and to be inherited by the Irrigated Farming Institute of National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine (code 1698) according to the Order of State Veterinary and Phytosanitary Service of Ukraine No. 261 of February 7, 2014

№ з/п	Культура Crop	Назва сорту Variety denomination	Номер заявки Application number	Рік реєстрації Registration year
1.	Пшениця м'яка (озима)	Овідій	05007067	2009
2.	Пшениця м'яка (озима)	Кохана	05007068	2009
3.	Пшениця м'яка (озима)	Херсонська безоста	97007005	2002
4.	Пшениця м'яка (озима)	Херсонська 99	99007011	2005
5.	Пшениця м'яка (озима)	Благо	07007058	2011
6.	Пшениця м'яка (озима)	Марія	08007055	2013
7.	Пшениця тверда (озима)	Дніпряна	94008002	2001
8.	Пшениця тверда (озима)	Кассіопея	04008002	2008
9.	Пшениця тверда (озима)	Андромеда	08008004	2013
10.	Кукурудза звичайна	Борисфен 600 СВ	99004032	2003
11.	Кукурудза звичайна	Сиваш	02004062	2005
12.	Кукурудза звичайна	Азов	04004050	2008
13.	Кукурудза звичайна	Наддніпрянська 50	78004038	1982
14.	Кукурудза звичайна	Асканія	08004145	2013
15.	Соя культурна	Витязь 50	88018009	1992
16.	Соя культурна	Деймос	94018002	1998
17.	Соя культурна	Фаетон	95018002	2000
18.	Соя культурна	Аполон	99018002	2003
19.	Соя культурна	Діона	03018016	2007
20.	Соя культурна	Даная	05018011	2009
21.	Соя культурна	Аратта	08018011	2013
22.	Люцерна мінлива	Вавіловка 2	90392001	1996
23.	Люцерна мінлива	Синська	80392001	1986
24.	Люцерна мінлива	Веселка	92392001	1998

№ з/п	Культура Crop	Назва сорту Variety denomination	Номер заявки Application number	Рік реєстрації Registration year
25.	Люцерна посівна	Наdejда	78058003	1982
26.	Люцерна посівна	Серафіма	99058001	2004
27.	Люцерна мінлива	Унітро	89392001	1995
28.	Люцерна посівна	Зоряна	05058002	2010
29.	Житняк	Кімбурн	05103002	2008
30.	Стоколос безостий	Таврійський	95065001	2000
31.	Кострець безостий	Сиваш	05065001	2008
32.	Кострець безостий	Борозенський 7	05065003	2009
33.	Грястиця збірна	Херсонська рання 1	84049002	1994
34.	Грястиця збірна	Олешка 14	94049001	2001
35.	Грястиця збірна	Інгулка 17	05049003	2009
36.	Помідор їстівний	Кіммерієць	99040019	2007
37.	Помідор їстівний	Наддніпрянський 1	03040037	2007
38.	Помідор їстівний	Інгулецький	06040035	2009
39.	Помідор їстівний	Сармат	06040034	2009
40.	Помідор їстівний	Тайм	07040007	2010
41.	Помідор їстівний	Легінь	09040034	2013
42.	Бавовник звичайний	Дніпровський 5	97366001	2001
43.	Бавовник звичайний	Підозерський 4	03366001	2007

Перелік сортів рослин, внесених до Реєстру сортів, правонаступником яких є Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України (код 1809)

відповідно до наказу Держветфітослужби України від 03.03.2014 року № 350

List of Plant Varieties as included into the Register of Varieties and to be inherited by the Agricultural Microbiology and Agro-Industry Production Institute of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine (code 1809) according to the Order of State Veterinary and Phytosanitary Service of Ukraine No. 350 of March 3, 2014

Культура Crop	Назва сорту Variety denomination	Номер заявки Application number	Рік реєстрації Registration year
Жито озиме	Боротьба	87003001	1993
Овес посівний	Чернігівський 27	86005014	1990
Овес посівний	Чернігівський 28	92005014	1996
Овес посівний	Зірковий	04005005	2008
Овес посівний	Нептун	01005003	2005

Овес посівний	Парламентський	05005001	2009
Конюшина лучна (червона)	Агрос 12	87052001	1993
Конюшина лучна (червона)	Атлас	75052001	1983
Люпин білий	Гарант	94055002	1998
Люпин білий	Либідь	00055001	2002
Люпин білий	Щедрий 50	05055002	2009
Люпин жовтий	Прогресивний	05057002	2009
Люпин жовтий	Чернігівець	97057001	2001
Люцерна посівна	Анді	88058001	1996
Огірок посівний	Ера	90035005	1997
Цибуля городня	Грандина	87041001	1992

Перелік сортів рослин, внесених до Реєстру сортів, правонаступником яких є Національний науковий центр «Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України» (код 1626) відповідно до наказу Держветфітослужби України від 07.02.2014 № 261

List of Plant Varieties as included into the Register of Varieties and to be inherited by the National Research Center 'Irrigated Farming Institute of National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine' (code 1626) according to the Order of State Veterinary and Phytosanitary Service of Ukraine No. 261 of February 7, 2014

№ з/п	Номер заявки Application number	Назва сорту Variety denomination	Культура Crop	Рік реєстрації Registration year
1.	00046001	Сонет	Бурак кормовий	2003
2.	99046001	Дарина	Бурак кормовий	2003
3.	03092001	Еталон	Гірчиця біла	2003
4.	03144002	Романтика	Гірчиця сарептська озима	2005
5.	05002002	Оранта	Гречка їстівна	2007
6.	07002003	Син-3/02	Гречка їстівна	2010
7.	83002003	Лілея	Гречка їстівна	1987
8.	92002007	Українка	Гречка їстівна	1997
9.	99002001	Антарія	Гречка їстівна	2002
10.	00049001	Наталка	Грястиця збірна	2005
11.	05049002	Українка	Грястиця збірна	2009
12.	95049001	Муравка	Грястиця збірна	2000
13.	03003001	Сіверське	Жито посівне озиме	2007
14.	95003005	Інтенсивне 95	Жито посівне озиме	1999
15.	99003002	Інтенсивне 99	Жито посівне озиме	2002
16.	04087003	Перлина	Квасоля звичайна (зернова)	2006
17.	07087005	Щедра	Квасоля звичайна (зернова)	2010
18.	98087004	Мавка	Квасоля звичайна (зернова)	2001
19.	05052001	Полісянка	Конюшина лучна (червона)	2010
20.	92052001	Поліс	Конюшина лучна	1996
21.	92052002	Маруся	Конюшина лучна	1998
22.	98052001	Полянка	Конюшина лучна	2003
23.	00054002	Сіверянка	Костриця лучна	2005
24.	05054002	Катріна	Костриця лучна	2009
25.	95054001	Літава	Костриця лучна	2000
26.	05331002	Дева	Костриця овеча	2006

№ з/п	Номер заявки Application number	Назва сорту Variety denomination	Культура Crop	Рік реєстрації Registration year
27.	00109001	Доменіка	Костриця очеретяна	2001
28.	01109001	Чабанська	Костриця очеретяна	2003
29.	00111001	Богданка	Костриця червона	2001
30.	02111001	Оленка	Костриця червона	2003
31.	03004013	Депутат МВ	Кукурудза звичайна	2005
32.	03004014	Говерла МВ	Кукурудза звичайна	2005
33.	03004015	Случ СВ	Кукурудза звичайна	2005
34.	04004042	Остер СВ	Кукурудза звичайна	2006
35.	04004043	Буг СВ	Кукурудза звичайна	2007
36.	07004029	Остреч СВ	Кукурудза звичайна	2010
37.	07004030	Смотрич МВ	Кукурудза звичайна	2010
38.	08004001	Ятрань МВ	Кукурудза звичайна	2010
39.	08004002	Хорол СВ	Кукурудза звичайна	2011
40.	09004271	Ма 21 МВ	Кукурудза звичайна (батьківські компоненти)	2010
41.	09004272	УкПг 67 С	Кукурудза звичайна (батьківські компоненти)	2010
42.	09004273	Антей М	Кукурудза звичайна (батьківські компоненти)	2010
43.	09004274	Граніт М	Кукурудза звичайна (батьківські компоненти)	2010
44.	09004275	Фортуна С	Кукурудза звичайна (батьківські компоненти)	2010
45.	09004276	УкПг 101 М	Кукурудза звичайна (батьківські компоненти)	2010
46.	09004277	УкПг 102 М	Кукурудза звичайна (батьківські компоненти)	2010
47.	09004278	УкПг103 С	Кукурудза звичайна (батьківські компоненти)	2010
48.	09004279	Президент С	Кукурудза звичайна (батьківські компоненти)	2010
49.	09004280	Псьол М	Кукурудза звичайна (батьківські компоненти)	2010
50.	09004281	Ук 1712 СВ	Кукурудза звичайна (батьківські компоненти)	2010
51.	09004282	Ук 26 СВ	Кукурудза звичайна (батьківські компоненти)	2010
52.	09004283	Ук 62 МВ	Кукурудза звичайна (батьківські компоненти)	2010
53.	03055001	Серпневий	Люпин білий	2006
54.	05055001	Макарівський	Люпин білий	2008
55.	09055002	Чабанський	Люпин білий	2013
56.	94055001	Володимир	Люпин білий	1998
57.	94055003	Дієта	Люпин білий	2003
58.	97055002	Борки	Люпин білий	2000
59.	99055001	Вересневий	Люпин білий	2003
60.	04056001	Зірковий	Люпин вузьколистий	2005
61.	05056002	Пелікан	Люпин вузьколистий	2008
62.	01057001	Бурштин	Люпин жовтий	2003
63.	01057002	Круглик	Люпин жовтий	2005
64.	08057001	Світязь	Люпин жовтий	2011
65.	98057002	Обрій	Люпин жовтий	2002
66.	05462001	Наречена Півночі	Люцерна жовта (серповидна)	2007
67.	82058002	Ярославна	Люцерна посівна	1987
68.	89058004	Роксолана	Люцерна посівна	1997
69.	94058001	Ольга	Люцерна посівна	2000
70.	03015001	Вручий	Льон звичайний, довгунець	2007
71.	92015001	Український 3	Льон звичайний, довгунець	1997

№ з/п	Номер заявки Application number	Назва сорту Variety denomination	Культура Crop	Рік реєстрації Registration year
72.	97015001	Рушничок	Льон звичайний, довгунець	2000
73.	03094001	Еврика	Льон низький, кудряш	2003
74.	06094002	Блакитно помаранчевий	Льон низький, кудряш	2007
75.	06094003	Симпатик	Льон низький, кудряш	2007
76.	10094001	Оригінал	Льон низький, кудряш	2012
77.	69125001	Київська	Очеретянка звичайна	1977
78.	05061001	Лагідна	Пажитниця багатоквіткова	2009
79.	87061002	Гібридний (Ярослав)	Пажитниця багатоквіткова	1992
80.	00062002	Оріон	Пажитниця багаторічна	2001
81.	02062001	Андріана-80	Пажитниця багаторічна	2003
82.	05062010	Мрія	Пажитниця багаторічна	2010
83.	79062001	Литвинівський 1	Пажитниця багаторічна	1986
84.	89062002	Святошинський	Пажитниця багаторічна	1995
85.	99062008	Лета	Пажитниця багаторічна	2001
86.	04423001	Вітас	Пирій середній	2005
87.	00006003	Новокиївське 01	Просо посівне	2003
88.	02006003	Омріяне	Просо посівне	2005
89.	87006002	Київське 87	Просо посівне	1991
90.	96006002	Київське 96	Просо посівне	1999
91.	01007003	Столична	Пшениця м'яка озима	2005
92.	02007022	Артеміда	Пшениця м'яка озима	2008
93.	05007032	Аналог	Пшениця м'яка озима	2008
94.	05007033	Бенефіс	Пшениця м'яка озима	2008
95.	09007035	Красвид	Пшениця м'яка озима	2013
96.	90007028	Поліська 90	Пшениця м'яка озима	1994
97.	03007034	Недра	Пшениця м'яка яра	2007
98.	93007063	Рання 93	Пшениця м'яка яра	1982
99.	99007010	Скороспілка 99	Пшениця м'яка яра	2003
100.	03097001	Клондайк	Рижий посівний (ярий)	2003
101.	02016008	Сенатор Люкс	Ріпак озимий	2006
102.	02016009	Чемпіон України	Ріпак озимий	2006
103.	02016007	Магнат	Ріпак ярий	2005
104.	01018003	Слена	Соя культурна	2003
105.	04018010	Анжеліка	Соя культурна	2007
106.	05018012	Ворскла	Соя культурна	2008
107.	05018013	Легенда	Соя культурна	2009
108.	07018012	Сузір'я	Соя культурна	2010
109.	07018013	Вільшанка	Соя культурна	2011
110.	09018012	Хвиля	Соя культурна	2013
111.	09018013	Сіверка	Соя культурна	2013
112.	86018003	Київська 27	Соя культурна	1990
113.	97018008	Київська 98	Соя культурна	2001
114.	98018003	Устя	Соя культурна	2002
115.	00065001	Геліус	Стоколос безостий	2003
116.	00065002	Топаз	Стоколос безостий	2003
117.	05065002	Арсен	Стоколос безостий	2009
118.	90065001	Вишгородський	Стоколос безостий	1996
119.	00068001	Каріна	Тимофіївка лучна	2005
120.	54068001	Пірни́вчанка	Тимофіївка лучна	2009
121.	91068001	Аргента	Тимофіївка лучна	1997
122.	94068003	Вишгородська	Тимофіївка лучна	2001
123.	00069001	Макс-1	Тонконіг лучний	2001
124.	02402001	Алекс	Тонконіг фіолетовий	2003
125.	98011003	Поліський 7	Тритикале озиме	2002

7. ОФІЦІЙНІ ОПИСИ ТА ПОКАЗНИКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ПРИДАТНОСТІ
7. OFFICIAL DESCRIPTIONS AND INDICES OF VALUE FOR CULTIVATION AND USE

Вид: Буряк кормовий Beta vulgaris L.

Заявка №: 09046006 **Назва сорту** Жамон

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 30.11.2009

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

18.02.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140120

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Клубочок: тип ростковості	одноростковий	1
2	Рослина: плоідність	триплоїд	3
3	Гіпокотиль: колір	жовтий	3
4	Листок: положення	проміжне	5
5	Листок: за довжиною (черешок включно)	середній	5
6	Листок: за шириною	широкий	7
7	Листкова пластинка: відношення довжина/ ширина	середнє	5
8	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
9	Листкова пластинка: забарвлення жилок	біле	1
10	Листкова пластинка: форма кінчика	злегка округла	2
11	Черешок: за довжиною	короткий	3
12	Черешок: забарвлення основи	білувато-зелене	1
13	Коренеплід: за формою	циліндрично-конічний	7
14	Коренеплід: за довжиною	середній	5
15	Коренеплід: за шириною	середній	5
16	Коренеплід: відношення довжина/ширина	середнє	5
17	Коренеплід: заглибленість у ґрунт	середня	5
18	Коренеплід: забарвлення шкірки над поверхнею ґрунту	оранжеве	4
19	Коренеплід: забарвлення шкірки у ґрунті	жовто-оранжеве	4
20	Коренеплід: вміст сухої речовини	середній	5

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	75,4	89,1	72,6
Гарантована прибавка (до національного стандарту), ц/га	14	12,3	-3,7
Гарантована прибавка (до національного стандарту), %	23	16	-5
Гарантована прибавка (до умовного стандарту), ц/га	1,1	9,5	-8,1
Гарантована прибавка (до умовного стандарту), %	2	12	-10
Урожай коренеплідів, ц/га	592,2	597,5	485,6
Маса коренеплідів, г	818,4	817,8	615,8
Вміст сухої речовини, %	13,6	17	15,5
Днів до досягання	162,6	152	151,9
Ступінь заглиблення в ґрунт, б	5,2	5,1	5,3
Густота стояння, тис. шт/га	76	81	76,6
Процент стрілкуючих	0	0	0
Стійкість до церкоспорозу, б	7,8	7,2	5,3
Лежкість, %	-	65,3	-
Ураженість коренеїдом, б	1	2,4	2,3
Придатність до механізованого збирання, б	7,4	6,8	5,7

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп

Вид: Буряк кормовий Beta vulgaris L.

Заявка №: 09046005 **Назва сорту** Стармон

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 30.11.2009

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

18.02.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140124

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Клубочок: тип ростковості	одноростковий	1
2	Рослина: плоідність	триплоїд	3
3	Гіпокотиль: колір	жовтий	3
4	Листок: положення	напівпрямостояче	3
5	Листок: за довжиною (черешок включно)	середній	5
6	Листок: за шириною	середній	5
7	Листкова пластинка: відношення довжина/ ширина	середнє	5
8	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
9	Листкова пластинка: забарвлення жилок	біле	1
10	Листкова пластинка: форма кінчика	злегка округла	2
11	Черешок: за довжиною	середній	5
12	Черешок: забарвлення основи	білувато-зелене	1
13	Коренеплід: за формою	конічний	5
14	Коренеплід: за довжиною	середній	5
15	Коренеплід: за шириною	середній	5
16	Коренеплід: відношення довжина/ширина	середнє	5
17	Коренеплід: заглибленість у ґрунт	середня	5
18	Коренеплід: забарвлення шкірки над поверхнею ґрунту	зелене	2
19	Коренеплід: забарвлення шкірки у ґрунті	жовте	3
20	Коренеплід: вміст сухої речовини	високий	7

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	75,4	89,1	72,6
Гарантована прибавка (до національного стандарту), ц/га	14	12,3	-3,7
Гарантована прибавка (до національного стандарту), %	23	16	-5
Гарантована прибавка (до умовного стандарту), ц/га	1,1	9,5	-8,1
Гарантована прибавка (до умовного стандарту), %	2	12	-10
Урожай коренеплідів, ц/га	592,2	597,5	485,6
Маса коренеплідів, г	818,4	817,8	615,8
Вміст сухої речовини, %	13,6	17	15,5
Днів до досягання	162,6	152	151,9
Ступінь заглиблення в ґрунт, б	5,2	5,1	5,3
Густота стояння, тис. шт/га	76	81	76,6
Процент стрілкуючих	0	0	0
Стійкість до церкоспорозу, б	7,8	7,2	5,3
Лежкість, %	-	65,3	-
Ураженість коренієм, б	1	2,4	2,3
Придатність до механізованого збирання, б	7,4	6,8	5,7

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп, Полісся

Вид: Буряк цукровий Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Doell

Заявка №: 10013026 Назва сорту БАСІЛУС

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

11.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140261

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Клубочок: тип ростковості	одноростковий	1
2	Рослина: плідність	диплоїд	2
3	Паросток: антоціанове забарвлення	наявне	9
4	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірне	5
5	Паросток: переважаюче забарвлення (понад 50%)	рожеве	5
6	Рослина: тип розетки	напівпохила	7
7	Листок: за довжиною (черешок з пластинкою)	середній	5
8	Листок: довжина черешка (відносно довжини пластинки)	довгий	7
9	Листок: розмір пластинки	середня	5
10	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5
11	Листкова пластинка: за шириною	широка	7
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
13	Листкова пластинка: хвилястість країв	помірна	5
14	Листкова пластинка: характер поверхні	слабко гофрована	3
15	Листкова пластинка: блиск	помірний	5
16	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
17	Листкова пластинка: форма верхівки	тупа	2
18	Черешок: за шириною	вузький	3
19	Черешок: колір	зелений	2
20	Черешок: забарвлення основи	червоне	4
21	Рослина: квітконосні стебла	відсутні	1
22	Час початку розвитку квітконосного стебла	ознака не визначається	0
23	Коренеплід: за розміром	середній	5
24	Коренеплід: за довжиною	середній	5
25	Коренеплід: форма	овально-конічна	5
26	Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт	заглиблений на 3/4	5

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	С	Значення Л	П
Збір цукру, ц/га	90,5	84,8	86,3
Гарантована прибавка (до національного стандарту), ц/га	12,2	3,5	2,6
Гарантована прибавка (до національного стандарту), %	15,6	4,3	3,1
Урожайність, ц/га	512,9	498,9	459,8
Цукристість, %	17,7	17,3	18,6
Вихід цукру, ц/га	80,6	70,9	81
Вихід цукру, %	14,7	14,6	16,5
Гарантована прибавка (до національного стандарту), ц/га	10,4	18,4	-7,6
Гарантована прибавка (до національного стандарту), %	14,8	35,0	-8,6
Вміст розчину золи, %	0,5	0,5	0,5
Втрати цукру в мелясі, %	1,9	1,9	1,9
Динаміка приросту цукру, %	19,5	28,1	29,3
Придатність до механізованого збирання, б	8,4	8,6	6,1
Стійкість до цвітущості, б	9,0	9,0	9,0
Ураж. коренієм, б	1,0	3,7	2,3
Стійк. до церкоспорозу, б	5,4	5,9	4,3

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп

Вид: Буряк цукровий Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Doell

Заявка №: 10013024 Назва сорту БАВІЛОВ

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

11.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140259

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Клубочок: тип ростковості	одноростковий	1
2	Рослина: плоідність	диплоїд	2
3	Паросток: антоціанове забарвлення	наявне	9
4	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірне	5
5	Паросток: переважаюче забарвлення (понад 50%)	рожеве	5
6	Рослина: тип розетки	напівпохила	7
7	Листок: за довжиною (черешок з пластинкою)	середній	5
8	Листок: довжина черешка (відносно довжини пластинки)	середній	5
9	Листок: розмір пластинки	середня	5
10	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5
11	Листкова пластинка: за шириною	середня	5
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
13	Листкова пластинка: хвилястість країв	помірна	5
14	Листкова пластинка: характер поверхні	помірно гофрована	5
15	Листкова пластинка: блиск	сильний	7
16	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
17	Листкова пластинка: форма верхівки	гостра	1
18	Черешок: за шириною	вузький	3
19	Черешок: колір	зелений	2
20	Черешок: забарвлення основи	червоне	4
21	Рослина: квітконосні стебла	відсутні	1
22	Час початку розвитку квітконосного стебла	ознака не визначається	0
23	Коренеплід: за розміром	середній	5
24	Коренеплід: за довжиною	середній	5
25	Коренеплід: форма	овально-конічна	5
26	Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт	заглиблений на 3/4	5

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	С	Значення Л	П
Збір цукру, ц/га	88,4	88,8	93,9
Гарантована прибавка (до національного стандарту), ц/га	10,1	7,5	10,2
Гарантована прибавка (до національного стандарту), %	12,9	9,2	12,2
Урожайність, ц/га	537,8	516,5	499,4
Цукристість, %	16,5	18,3	18,5
Вихід цукру, ц/га	76,4	76,8	76,7
Вихід цукру, %	12,8	15,0	15,4
Гарантована прибавка (до національного стандарту), ц/га	6,2	24,3	-11,9
Гарантована прибавка (до національного стандарту), %	8,8	46,3	-13,4
Вміст розчиної золи, %	0,6	0,6	0,6
Втрати цукру в мелясі, %	2,3	2,2	2,3
Динаміка приросту цукру, %	18,1	21,9	32,7
Придатність до механізованого збирання, б	8,8	8,8	6,1
Стійкість до цвітущості, б	9,0	9,0	9,0
Ураж. коренідом, б	1,0	3,7	3,0
Стійк. до церкоспорозу, б	5,8	6,6	5,0

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп, Полісся

Вид: Буряк цукровий Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Doell

Заявка №: 09013031 Назва сорту Іпель

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 30.11.2009

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

18.02.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140123

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Клубочок: тип ростковості	одноростковий	1
2	Рослина: плоідність	диплоїд	2
3	Паросток: антоціанове забарвлення	наявне	9
4	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірне	5
5	Паросток: переважаюче забарвлення (понад 50%)	рожеве	5
6	Рослина: тип розетки	напіврозлога	3
7	Листок: за довжиною (черешок з пластинкою)	середній	5
8	Листок: довжина черешка (відносно довжини пластинки)	середній	5
9	Листок: розмір пластинки	середня	5
10	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5
11	Листкова пластинка: за шириною	середня	5
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
13	Листкова пластинка: хвилястість країв	помірна	5
14	Листкова пластинка: характер поверхні	помірно гофрована	5
15	Листкова пластинка: блиск	помірний	5
16	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
17	Листкова пластинка: форма верхівки	гостра	1
18	Черешок: за шириною	середній	5
19	Черешок: колір	зелений	2
20	Черешок: забарвлення основи	білувато-зелене	1
21	Рослина: квітконосні стебла	відсутні	1
22	Час початку розвитку квітконосного стебла	ознака не визначається	0
23	Коренеплід: за розміром	середній	5
24	Коренеплід: за довжиною	середній	5
25	Коренеплід: форма	широко конічна	3
26	Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт	заглиблений на 3/4	5

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	С	Значення Л	П
Збір цукру, ц/га	85,9	90,5	107,2
Гарантована прибавка (до національного стандарту), ц/га	0,3	0,6	7,3
Гарантована прибавка (до національного стандарту), %	0,4	0,7	7,3
Гарантована прибавка (до умовного стандарту), ц/га	-45,0	-54,7	-32,8
Гарантована прибавка (до умовного стандарту), %	-34,0	-38,0	-23,0
Урожайність, ц/га	500,9	532,7	593,9
Цукристість, %	17,1	17,1	18,0
Вихід цукру, ц/га	75,0	76,6	106,1
Вихід цукру, %	14,2	14,5	16,8
Гарантована прибавка (до національного стандарту), ц/га	-0,1	1,8	10,7
Гарантована прибавка (до національного стандарту), %	-0,1	2,4	11,3
Вміст розчинної золи, %	0,6	0,6	0,6
Втрати цукру в мел'ясі, %	2,2	2,1	2,2
Динаміка приросту цукру, %	19,5	24,5	36,0
Придатність до механізованого збирання, б	7,6	8,4	6,0
Стійкість до цвітущості, б	9,0	9,0	9,0
Ураж. коренідом, б	1,0	1,1	1,0
Стійк. до церкоспорозу, б	4,6	5,9	3,3

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Полісся

Вид: Буряк цукровий Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Doell

Заявка №: 08013024 Назва сорту HI 0835

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

05.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140121

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Клубочок: тип ростковості	одноростковий	1
2	Рослина: плідність	диплоїд	2
3	Паросток: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
4	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначалась	0
5	Паросток: переважаюче забарвлення (понад 50%)	ознака не визначалась	0
6	Рослина: тип розетки	напівпохила	7
7	Листок: за довжиною (черешок з пластинкою)	середній	5
8	Листок: довжина черешка (відносно довжини пластинки)	середній	5
9	Листок: розмір пластинки	середня	5
10	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5
11	Листкова пластинка: за шириною	широка	7
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
13	Листкова пластинка: хвилястість країв	помірна	5
14	Листкова пластинка: характер поверхні	помірно гофрована	5
15	Листкова пластинка: блиск	ознака не визначалась	0
16	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
17	Листкова пластинка: форма верхівки	ознака не визначалась	0
18	Черешок: за шириною	ознака не визначалась	0
19	Черешок: колір	білий	1
20	Черешок: забарвлення основи	білувато-зелене	1
21	Рослина: квітконосні стебла	ознака не визначалась	0
22	Час початку розвитку квітконосного стебла	середній	5
23	Коренеплід: за розміром	середній	5
24	Коренеплід: за довжиною	ознака не визначалась	0
25	Коренеплід: форма	широко конічна	3
26	Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт	ознака не визначалась	0

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	С	Значення Л	П
Збір цукру, ц/га	92,4	96,3	107,8
Гарантована прибавка (до національного стандарту), ц/га	3,0	4,0	6,4
Гарантована прибавка (до національного стандарту), %	3,3	4,3	6,4
Гарантована прибавка (до умовного стандарту), ц/га	-38,5	-48,9	-32,2
Гарантована прибавка (до умовного стандарту), %	-29,0	-34,0	-23,0
Урожайність, ц/га	519,6	536,6	557,7
Цукристість, %	17,7	18,0	19,2
Вихід цукру, ц/га	80,9	84,6	99,6
Вихід цукру, %	15,1	15,2	18,0
Гарантована прибавка (до національного стандарту), ц/га	2,1	2,6	6,5
Гарантована прибавка (до національного стандарту), %	2,7	3,2	6,9
Вміст розчинної золи, %	0,5	0,5	0,5
Втрати цукру в меліасі, %	1,8	1,9	1,8
Динаміка приросту цукру, %	20,6	24,0	30,2
Придатність до механізованого збирання, б	8,6	8,7	5,6
Стійкість до цвітущості, б	9,0	9,0	9,0
Ураж. коренідом, б	1,0	2,0	2,2
Стійк. до церкоспорозу, б	6,5	8,0	4,6

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп, Полісся

Вид: Буряк цукровий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *altissima* Doell

Заявка №: 10013035 **Назва сорту** СИ Бадіа

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

06.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140125

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Клубочок: тип ростковості	одноростковий	1
2	Рослина: плідність	диплоїд	2
3	Паросток: антоціанове забарвлення	наявне	9
4	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірне	5
5	Паросток: переважаюче забарвлення (понад 50%)	оранжеве	4
6	Рослина: тип розетки	напіврозлога	3
7	Листок: за довжиною (черешок з пластинкою)	середній	5
8	Листок: довжина черешка (відносно довжини пластинки)	довгий	7
9	Листок: розмір пластинки	середня	5
10	Листкова пластинка: за довжиною	довга	7
11	Листкова пластинка: за шириною	середня	5
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
13	Листкова пластинка: хвилястість країв	помірна	5
14	Листкова пластинка: характер поверхні	слабко гофрована	3
15	Листкова пластинка: блиск	слабкий	3
16	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
17	Листкова пластинка: форма верхівки	тупа	2
18	Черешок: за шириною	середній	5
19	Черешок: колір	білий	1
20	Черешок: забарвлення основи	білувато-зелене	1
21	Рослина: квітконосні стебла	відсутні	1
22	Час початку розвитку квітконосного стебла	ознака не визначається	0
23	Коренеплід: за розміром	середній	5
24	Коренеплід: за довжиною	середній	5
25	Коренеплід: форма	вузько конічна	2
26	Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт	заглиблений на 3/4	5

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	С	Значення Л	П
Збір цукру, ц/га	86,6	88,7	101,1
Гарантована прибавка (до національного стандарту), ц/га	8,3	7,4	17,4
Гарантована прибавка (до національного стандарту), %	10,6	9,1	20,8
Урожайність, ц/га	503,4	506,1	532,0
Цукристість, %	17,2	17,6	19,0
Вихід цукру, ц/га	71,9	69,7	100,1
Вихід цукру, %	14,1	14,9	18,6
Гарантована прибавка (до національного стандарту), ц/га	1,7	17,2	11,5
Гарантована прибавка (до національного стандарту), %	2,4	32,8	13,0
Вміст розчинної золи, %	0,5	0,5	0,5
Втрати цукру в мелясі, %	2,0	2,0	2,0
Динаміка приросту цукру, %	22,5	28,0	35,0
Придатність до механізованого збирання, б	8,2	8,8	6,1
Стійкість до цвітущості, б	9,0	9,0	9,0
Ураж. коренієм, б	1,0	3,8	2,3
Стійк. до церкоспорозу, б	5,8	7,4	4,3

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп

Вид: Буряк цукровий Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Doell

Заявка №: 09013029 Назва сорту Тіза

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 30.11.2009

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

18.02.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140122

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Клубочок: тип ростковості	одноростковий	1
2	Рослина: плоідність	диплоїд	2
3	Паросток: антоціанове забарвлення	наявне	9
4	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірне	5
5	Паросток: переважаюче забарвлення (понад 50%)	рожеве	5
6	Рослина: тип розетки	напіврозлога	3
7	Листок: за довжиною (черешок з пластинкою)	середній	5
8	Листок: довжина черешка (відносно довжини пластинки)	середній	5
9	Листок: розмір пластинки	середня	5
10	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5
11	Листкова пластинка: за шириною	середня	5
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
13	Листкова пластинка: хвилястість країв	помірна	5
14	Листкова пластинка: характер поверхні	помірно гофрована	5
15	Листкова пластинка: блиск	помірний	5
16	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
17	Листкова пластинка: форма верхівки	гостра	1
18	Черешок: за шириною	середній	5
19	Черешок: колір	зелений	2
20	Черешок: забарвлення основи	білувато-зелене	1
21	Рослина: квітконосні стебла	відсутні	1
22	Час початку розвитку квітконосного стебла	ознака не визначається	0
23	Коренеплід: за розміром	середній	5
24	Коренеплід: за довжиною	середній	5
25	Коренеплід: форма	овально-конічна	5
26	Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт	повністю заглиблений	3

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	С	Значення Л	П
Збір цукру, ц/га	83,0	88,6	105,0
Гарантована прибавка (до національного стандарту), ц/га	-2,6	-1,3	5,1
Гарантована прибавка (до національного стандарту), %	-3,0	-1,4	5,1
Гарантована прибавка (до умовного стандарту), ц/га	-47,9	-56,6	-35,1
Гарантована прибавка (до умовного стандарту), %	-36	-39	-25
Урожайність, ц/га	495,8	527,1	566,0
Цукристість, %	16,7	16,9	18,3
Вихід цукру, ц/га	71,7	75,0	105,0
Вихід цукру, %	14,0	14,6	16,5
Гарантована прибавка (до національного стандарту), ц/га	-3,4	0,2	9,6
Гарантована прибавка (до національного стандарту), %	-4,5	0,3	10,1
Вміст розчинної золи, %	0,5	0,5	0,5
Втрати цукру в мел'ясі, %	1,9	1,9	1,9
Динаміка приросту цукру, %	27,5	22,5	39,9
Придатність до механізованого збирання, б	8,4	8,5	6,0
Стійкість до цвітущості, б	9,0	9,0	9,0
Ураж. коренідом, б	1,0	1,1	1,9
Стійк. до церкоспорозу, б	4,6	6,1	3,6

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Полісся

Вид: Буряк цукровий Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Doell

Заявка №: 10013027 Назва сорту ЯРОСЛАВ

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

11.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140262

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Клубочок: тип ростковості	одноростковий	1
2	Рослина: плідність	диплоїд	2
3	Паросток: антоціанове забарвлення	наявне	9
4	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірне	5
5	Паросток: переважаюче забарвлення (понад 50%)	рожеве	5
6	Рослина: тип розетки	напівпохила	7
7	Листок: за довжиною (черешок з пластинкою)	довгий	7
8	Листок: довжина черешка (відносно довжини пластинки)	довгий	7
9	Листок: розмір пластинки	середня	5
10	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5
11	Листкова пластинка: за шириною	середня	5
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
13	Листкова пластинка: хвилястість країв	слабка	3
14	Листкова пластинка: характер поверхні	помірно гофрована	5
15	Листкова пластинка: блиск	помірний	5
16	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
17	Листкова пластинка: форма верхівки	тупа	2
18	Черешок: за шириною	середній	5
19	Черешок: колір	червонуватий	3
20	Черешок: забарвлення основи	світло-оранжеве	3
21	Рослина: квітконосні стебла	відсутні	1
22	Час початку розвитку квітконосного стебла	ознака не визначається	0
23	Коренеплід: за розміром	середній	5
24	Коренеплід: за довжиною	середній	5
25	Коренеплід: форма	широко конічна	3
26	Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт	заглиблений на 3/4	5

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	С	Значення Л	П
Збір цукру, ц/га	91,5	84,4	93,9
Гарантована прибавка (до національного стандарту), ц/га	13,2	3,1	10,2
Гарантована прибавка (до національного стандарту), %	16,9	3,8	12,2
Урожайність, ц/га	509,3	486,1	493,9
Цукристість, %	18,0	17,7	17,8
Вихід цукру, ц/га	77,9	73,1	87,9
Вихід цукру, %	14,7	15,0	17,3
Гарантована прибавка (до національного стандарту), ц/га	7,7	20,6	-0,7
Гарантована прибавка (до національного стандарту), %	11,0	39,2	-0,8
Вміст розчину золи, %	0,5	0,5	0,5
Втрати цукру в мелясі, %	2,1	2,0	2,0
Динаміка приросту цукру, %	18,7	20,6	28,6
Придатність до механізованого збирання, б	8,4	8,3	5,9
Стійкість до цвітущості, б	9,0	9,0	9,0
Ураж. коренідом, б	1,0	3,7	2,3
Стійк. до церкоспорозу, б	5,0	6,3	5,4

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп

Вид: Буряк цукровий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *altissima* Doell

Заявка №: 10013025 **Назва сорту** ЯШИН

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 30.11.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

11.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140260

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Клубочок: тип ростковості	одноростковий	1
2	Рослина: плоідність	диплоїд	2
3	Паросток: антоціанове забарвлення	наявне	9
4	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабке	3
5	Паросток: переважаюче забарвлення (понад 50%)	рожеве	5
6	Рослина: тип розетки	напівпохила	7
7	Листок: за довжиною (черешок з пластинкою)	довгий	7
8	Листок: довжина черешка (відносно довжини пластинки)	середній	5
9	Листок: розмір пластинки	середня	5
10	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5
11	Листкова пластинка: за шириною	широка	7
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
13	Листкова пластинка: хвилястість країв	слабка	3
14	Листкова пластинка: характер поверхні	слабко гофрована	3
15	Листкова пластинка: блиск	помірний	5
16	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
17	Листкова пластинка: форма верхівки	гостра	1
18	Черешок: за шириною	середній	5
19	Черешок: колір	червонуватий	3
20	Черешок: забарвлення основи	світло-оранжеве	3
21	Рослина: квітконосні стебла	відсутні	1
22	Час початку розвитку квітконосного стебла	ознака не визначається	0
23	Коренеплід: за розміром	середній	5
24	Коренеплід: за довжиною	середній	5
25	Коренеплід: форма	широко конічна	3
26	Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт	заглиблений на 3/4	5

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	С	Значення Л	П
Збір цукру, ц/га	86,5	94	102,5
Гарантована прибавка (до національного стандарту), ц/га	8,2	12,7	18,8
Гарантована прибавка (до національного стандарту), %	10,5	15,6	22,5
Урожайність, ц/га	490,8	536,8	530,8
Цукристість, %	17,7	17,7	19,4
Вихід цукру, ц/га	76,6	75,5	101,0
Вихід цукру, %	15,0	14,9	16,1
Гарантована прибавка (до національного стандарту), ц/га	6,4	23	12,4
Гарантована прибавка (до національного стандарту), %	9,1	43,8	14,0
Вміст розчинної золи, %	0,6	0,5	0,6
Втрати цукру в мелясі, %	2,1	2,0	2,1
Динаміка приросту цукру, %	18,3	25,3	34,6
Придатність до механізованого збирання, б	8,4	8,7	5,9
Стійкість до цвітущості, б	9,0	9,0	9,0
Ураж. коренієм, б	1,0	3,7	2,3
Стійк. до церкоспорозу, б	6,6	7,6	4,6

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп, Полісся

Вид: Горох посівний *Pisum sativum* L.

Заявка №: 10001002 Назва сорту Меценат

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 30.11.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

13.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140264

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
2	Стебло: антоціанове забарвлення пазухи	відсутнє	1
3	Стебло: фасціація	відсутня	1
4	Стебло: за довжиною	довге	7
5	Стебло: кількість вузлів (перший фертильний вузол включно)	багато	7
6	Листя: забарвлення	жовто-зелене	1
7	Лише сорти з зеленим забарвленням листя. (Озн. 6, стан 2). Листки: інтенсивність зеленого забарвлення	ознака не визначається	0
8	Листок: вторинні листочки	відсутні	1
9	Листок: кількість вторинних листочків	ознака не визначалась	0
10	Вторинний листочок: за розміром	ознака не визначалась	0
11	Вторинний листочок: за довжиною	ознака не визначалась	0
12	Вторинний листочок: за шириною	ознака не визначалась	0
13	Вторинний листочок: положення найширшої частини	ознака не визначалась	0
14	Вторинний листочок: зубчастість	ознака не визначалась	0
15	Прилисток: за довжиною	довгий	7
16	Прилисток: за шириною	широкий	7
17	Прилисток: за розміром	великий	7
18	Прилисток: відстань від пазухи до верхівки	довга	7
19	Прилисток: частина під пазухою за довжиною	середня	5
20	Прилисток: плямистість	наявна	9
21	Прилисток: щільність плямистості	не щільна	3
22	Черешок: за довжиною від пазухи до першого листка чи вусика	довгий	7
23	Лише сорти без вторинних листочків. Черешок: за довжиною від пазухи до останнього вусика	довгий	7
24	Час цвітіння	середній	5
25	Лише нефасційовані сорти. Рослина: максимальна кількість квіток на вузлі	три	5
26	Лише сорти з антоціаном. Квітка: забарвлення крил (весел)	ознака не визначається	0
27	Лише сорти без антоціану. Квітка: колір паруса	білий	1
28	Квітка: ширина паруса	вузька	3
29	Квітка: форма основи паруса	піднесена	3
30	Квітка: хвилястість паруса	слабка	3
31	Квітка: ширина чашолистка	середня	5
32	Квітка: форма верхівки верхнього чашолистка	округла	3
33	Квітконіжка: за довжиною	коротка	3
34	Квітконіжка: відстань від стебла до першого бобу	коротка	3
35	Квітконіжка: відстань між першим і другим бобом	коротка	3
36	Квітконіжка: кількість приквітков	відсутні або мало	1
37	Біб: за довжиною	дуже короткий	1
38	Біб: за шириною	дуже вузький	1
39	Біб: пергаментність	відсутня або часткова	1
40	За винятком пергаментних сортів. Біб: потовщення стулок	відсутнє	1
41	Лише сорти без потовщення стулок. Біб: форма дистального кінця	загострена	1
42	Біб: ступінь вигину	слабкий	3
43	Біб: колір	зелений	2
44	Лише сорти з зеленим забарвленням бобу (Озн. 43: стан 2): інтенсивність зеленого забарвлення	світле	3
45	За винятком пергаментних сортів. Біб: волокна шва	відсутні	1
46	Біб: кількість насінних зачатків	середня кількість	5
47	Не стигле насіння: інтенсивність зеленого забарвлення	світле	3
48	Насінина: загальна форма	еліптична	1
49	Насінина: тип крохмальних зерен	простий	1
50	Лише сорти з циліндричною формою насінини і простим типом крохмальних зерен. Насінина: зморшкуватість сім'ядолей	ознака не визначається	0

51	Лише сорти з насінинами із складним типом крохмальних зерен. Насінина: ступінь зморшкуватості сім'ядолей	ознака не визначається	0
52	Насінина: забарвлення сім'ядолей	жовте	2
53	Лише сорти з антоціаном. Насінина: мармуровість насінної шкірки	ознака не визначається	0
54	Лише сорти з антоціаном. Насінина: фіолетові чи рожеві плями на насінній шкірці	ознака не визначається	0
55	Насінина: забарвлення рубчика	не відрізняється від насінної шкірки	1
56	Лише сорти з антоціаном. Насінина: забарвлення насінної шкірки	ознака не визначається	0
57	Насіння: маса 1000 шт.	середня	5
58,1	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. pisi Paca 1	наявна	9
58,2	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. pisi Paca 5	наявна	9
58,3	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. pisi Paca 6	наявна	9
59	Стійкість до <i>Erysiphe pisi</i> Syd.	наявна	9
60	Стійкість до <i>Ascochyta pisi</i> , Race C	наявна	9
61	Стійкість до <i>Erysiphe communis</i> Syd.	наявна	9

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	С	Значення Л	П
Урожайність, ц/га	19,5	30,0	25,7
Гарантована прибавка, ц/га	1,8	2,3	0,2
%	10,2	8,3	0,8
Вегетаційний період, дн	72	74	80
Стійкість до: бал			
-вилягання	8,9	8,3	8,3
-осипання	8,3	8,2	7,8
-посухи	6,5	8,2	8,3
-аскохітозу	8,8	8,4	8,3
-антракнозу	9,0	8,5	8,4
-кореневих гнилей	8,9	7,8	8,5
Якісні характеристики:			
-вміст білку, %	21,0	20,4	21,3
Напрямок використання	зерно	зерно	зерно
Висота рослини, см	45,1	59,2	70,9
Маса 1000 насінин, см	238,6	232,2	242,3

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп

Вид: Горох посівний *Pisum sativum* L.

Заявка №: 09001003 Назва сорту Саламанка

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 27.11.2009

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

12.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140263

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
2	Стебло: антоціанове забарвлення пазухи	відсутнє	1
3	Стебло: фасціація	відсутня	1
4	Стебло: за довжиною	середнє	5
5	Стебло: кількість вузлів (перший фертильний вузол включно)	багато	7
6	Листя: забарвлення	зелене	2
7	Листе сорти з зеленим забарвленням листя. (Озн. 6, стан 2). Листки: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
8	Листок: вторинні листочки	відсутні	1
9	Листок: кількість вторинних листочків	ознака не визначалась	0
10	Вторинний листочок: за розміром	ознака не визначалась	0
11	Вторинний листочок: за довжиною	ознака не визначалась	0
12	Вторинний листочок: за шириною	ознака не визначалась	0
13	Вторинний листочок: положення найширшої частини	ознака не визначалась	0
14	Вторинний листочок: зубчастість	ознака не визначалась	0
15	Прилисток: за довжиною	короткий	3
16	Прилисток: за шириною	вузький	3
17	Прилисток: за розміром	малий	3
18	Прилисток: відстань від пазухи до верхівки	середня	5
19	Прилисток: частина під пазухою за довжиною	середня	5
20	Прилисток: плямистість	наявна	9
21	Прилисток: щільність плямистості	помірна	5
22	Черешок: за довжиною від пазухи до першого листка чи вусика	довгий	7
23	Листе сорти без вторинних листочків. Черешок: за довжиною від пазухи до останнього вусика	довгий	7
24	Час цвітіння	середній	5
25	Листе нефасційовані сорти. Рослина: максимальна кількість квіток на вузлі	дві	3
26	Листе сорти з антоціаном. Квітка: забарвлення крил (весел)	ознака не визначається	0
27	Листе сорти без антоціану. Квітка: колір паруса	білий	1
28	Квітка: ширина паруса	вузька	3
29	Квітка: форма основи паруса	пряма	5
30	Квітка: хвилястість паруса	помірна	5
31	Квітка: ширина чашолистка	середня	5
32	Квітка: форма верхівки верхнього чашолистка	округла	3
33	Квітконіжка: за довжиною	коротка	3
34	Квітконіжка: відстань від стебла до першого бобу	коротка	3
35	Квітконіжка: відстань між першим і другим бобом	коротка	3
36	Квітконіжка: кількість приквітков	середня кількість	2
37	Біб: за довжиною	середній	5
38	Біб: за шириною	вузький	3
39	Біб: пергаментність	відсутня або часткова	1
40	За винятком пергаментних сортів. Біб: потовщення стулок	відсутнє	1
41	Листе сорти без потовщення стулок. Біб: форма дистального кінця	загострена	1
42	Біб: ступінь вигину	слабкий	3
43	Біб: колір	зелений	2
44	Листе сорти з зеленим забарвленням бобу (Озн. 43: стан 2): інтенсивність зеленого забарвлення	світле	3
45	За винятком пергаментних сортів. Біб: волокна шва	відсутні	1
46	Біб: кількість насінних зачатків	середня кількість	5
47	Не стигле насіння: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
48	Насінина: загальна форма	еліптична	1
49	Насінина: тип крохмальних зерен	простий	1
50	Листе сорти з циліндричною формою насінини і простим типом крохмальних зерен. Насінина: зморшкуватість сім'ядолей	ознака не визначається	0

51	Лише сорти з насінинами із складним типом крохмальних зерен. Насінина: ступінь зморшкуватості сім'ядолей	ознака не визначається	0
52	Насінина: забарвлення сім'ядолей	жовте	2
53	Лише сорти з антоціаном. Насінина: мармуровість насінної шкірки	ознака не визначається	0
54	Лише сорти з антоціаном. Насінина: фіолетові чи рожеві плями на насінній шкірці	ознака не визначається	0
55	Насінина: забарвлення рубчика	не відрізняється від насінної шкірки	1
56	Лише сорти з антоціаном. Насінина: забарвлення насінної шкірки	ознака не визначається	0
57	Насіння: маса 1000 шт.	середня	5
58,1	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. pisi Paca 1	наявна	9
58,2	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. pisi Paca 5	наявна	9
58,3	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. pisi Paca 6	наявна	9
59	Стійкість до <i>Erysiphe pisi</i> Syd.	наявна	9
60	Стійкість до <i>Ascochyta pisi</i> , Race C	наявна	9
61	Стійкість до <i>Erysiphe communis</i> Syd.	наявна	9

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	С	Значення Л	П
Урожайність, ц/га	19,8	29,1	23,2
Гарантована прибавка, ц/га	2,1	1,4	-2,3
%	11,9	5,1	-9,0
Вегетаційний період, дн	73	76	82
Стійкість до: бал			
-вилягання	8,8	8,8	8,8
-осипання	8,4	8,3	8,2
-посухи	6,9	8,0	8,0
-аскохітозу	8,7	8,6	8,4
-антракнозу	9,0	8,5	8,8
-коренових гнилей	9,0	8,1	8,6
Якісні характеристики:			
-вміст білку, %	23,3	21,5	20,7
Напрямок використання	зерно	зерно	зерно
Висота рослини, см	49,6	60,9	72,4
Маса 1000 насінин, см	231,6	219,4	223,3

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп

Вид: Горох посівний *Pisum sativum* L.

Заявка №: 10001001 Назва сорту Слован

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 30.11.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

17.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140321

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
2	Стебло: антоціанове забарвлення пазухи	відсутнє	1
3	Стебло: фасціяція	відсутня	1
4	Стебло: за довжиною	коротке	3
5	Стебло: кількість вузлів (перший фертильний вузол включно)	мало	3
6	Листя: забарвлення	жовто-зелене	1
7	Лише сорти з зеленим забарвленням листя. (Озн. 6, стан 2). Листки: інтенсивність зеленого забарвлення	ознака не визначається	0
8	Листок: вторинні листочки	відсутні	1
9	Листок: кількість вторинних листочків	ознака не визначалась	0
10	Вторинний листочок: за розміром	ознака не визначалась	0
11	Вторинний листочок: за довжиною	ознака не визначалась	0
12	Вторинний листочок: за шириною	ознака не визначалась	0
13	Вторинний листочок: положення найширшої частини	ознака не визначалась	0
14	Вторинний листочок: зубчастість	ознака не визначалась	0
15	Прилисток: за довжиною	короткий	3
16	Прилисток: за шириною	вузький	3
17	Прилисток: за розміром	малий	3
18	Прилисток: відстань від пазухи до верхівки	середня	5
19	Прилисток: частина під пазухою за довжиною	середня	5
20	Прилисток: плямистість	наявна	9
21	Прилисток: щільність плямистості	помірна	5
22	Черешок: за довжиною від пазухи до першого листка чи вусика	середній	5
23	Лише сорти без вторинних листочків. Черешок: за довжиною від пазухи до останнього вусика	середній	5
24	Час цвітіння	середній	5
25	Лише нефасційовані сорти. Рослина: максимальна кількість квіток на вузлі	три	5
26	Лише сорти з антоціаном. Квітка: забарвлення крил (весел)	ознака не визначається	0
27	Лише сорти без антоціану. Квітка: колір паруса	білий	1
28	Квітка: ширина паруса	вузька	3
29	Квітка: форма основи паруса	піднесена	3
30	Квітка: хвилястість паруса	слабка	3
31	Квітка: ширина чашолистка	середня	5
32	Квітка: форма верхівки верхнього чашолистка	округла	3
33	Квітконіжка: за довжиною	середня	5
34	Квітконіжка: відстань від стебла до першого бобу	середня	5
35	Квітконіжка: відстань між першим і другим бобом	середня	5
36	Квітконіжка: кількість приквітков	середня кількість	2
37	Біб: за довжиною	короткий	3
38	Біб: за шириною	середній	5
39	Біб: пергаментність	відсутня або часткова	1
40	За винятком пергаментних сортів. Біб: потовщення стулок	відсутнє	1
41	Лише сорти без потовщення стулок. Біб: форма дистального кінця	загострена	1
42	Біб: ступінь вигину	відсутній або дуже слабкий	1
43	Біб: колір	зелений	2
44	Лише сорти з зеленим забарвленням бобу (Озн. 43: стан 2): інтенсивність зеленого забарвлення	світле	3
45	За винятком пергаментних сортів. Біб: волокна шва	відсутні	1
46	Біб: кількість насінних зачатків	мало	3
47	Не стигле насіння: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
48	Насінина: загальна форма	еліптична	1
49	Насінина: тип крохмальних зерен	простий	1
50	Лише сорти з циліндричною формою насінини і простим типом крохмальних зерен. Насінина: зморшкуватість сім'ядолей	ознака не визначається	0

51	Лише сорти з насінинами із складним типом крохмальних зерен. Насінина: ступінь зморшкуватості сім'ядолей	ознака не визначається	0
52	Насінина: забарвлення сім'ядолей	жовте	2
53	Лише сорти з антоціаном. Насінина: мармуровість насінної шкірки	ознака не визначається	0
54	Лише сорти з антоціаном. Насінина: фіолетові чи рожеві плями на насінній шкірці	ознака не визначається	0
55	Насінина: забарвлення рубчика	не відрізняється від насінної шкірки	1
56	Лише сорти з антоціаном. Насінина: забарвлення насінної шкірки	ознака не визначається	0
57	Насіння: маса 1000 шт.	середня	5
58,1	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. pisi Paca 1	наявна	9
58,2	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. pisi Paca 5	наявна	9
58,3	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. pisi Paca 6	наявна	9
59	Стійкість до <i>Erysiphe pisi</i> Syd.	наявна	9
60	Стійкість до <i>Ascochyta pisi</i> , Race C	наявна	9
61	Стійкість до <i>Erysiphe communis</i> Syd.	наявна	9

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	С	Значення Л	П
Урожайність, ц/га	18,4	27,2	23,9
Гарантована прибавка, ц/га	0,7	-0,5	-1,6
%	4,0	-1,8	-6,3
Вегетаційний період, дн	74	76	80
Стійкість до: бал			
-вилягання	8,4	8,4	8,3
-осипання	8,4	8,3	7,8
-посухи	6,6	7,8	8,0
-аскохітозу	8,9	8,5	8,5
-антракнозу	9,0	8,5	8,4
-коренових гнилей	8,9	8,1	8,5
Якісні характеристики:			
-вміст білку, %	22,0	21,3	20,8
Напрямок використання	зерно	зерно	зерно
Висота рослини, см	47,5	61,3	74,0
Маса 1000 насінин, см	231,5	222,5	228,2

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ

Вид: Горошок посівний (ярий) *Vicia sativa* L.

Заявка №: 10047001 Назва сорту Надія Поділля

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 03.11.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

27.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140381

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Сіянець: відношення довжини до ширини листочків (другого справжнього листка)	середнє	5
2	Сіянець: антоціанове забарвлення основи стебла	наявне	9
3	Сіянець: інтенсивність антоціанового забарвлення на основі стебла	слабке	3
4	Рослина: інтенсивність зеленого забарвлення листків (напередодні цвітіння)	світле	3
5	Час початку цвітіння (30 % рослин)	середній	5
6	Стебло: опушення верхнього міжвузля	наявне	9
7	Стебло: антоціанове забарвлення пазух листків	відсутнє або дуже слабке	1
8	Листок: форма верхівки листочків (на середній третині рослини)	пряма	5
9	Листок: ширина листочків (як для 8)	вузькі	3
10	Прилистки: антоціанове забарвлення залозок	відсутнє або дуже слабке	1
11	Квітка: забарвлення паруса	світло-фіолетовий	3
12	Біб: опушення	відсутнє або дуже слабке	1
13	Біб: за довжиною	середній	5
14	Біб: за шириною	середній	5
15	Біб: довжина дзьобика	середній	5
16	Біб: кількість насінних зачатків	середня кількість	5
17	Насіння: за розміром	середнє	5
18	Насіння: за формою	кулясте	1
19	Насіння: основне забарвлення насінної оболонки	сіро-коричнєве	2
20	Насіння: коричнева орнаментация	тільки дифузна	2
21	Насіння: вираження коричневої орнаментации	слабке	3
22	Насіння: блакитно-чорна орнаментация	тільки плями	3
23	Насіння: виявлення блакитно-чорної орнаментации	дуже слабке	1
24	Насіння: забарвлення сім'ядолей	сірувато-коричнєве	1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність сухої речовини, ц/га	41,2	50,2	64,1
Гарантована різниця, ц/га	-3,8	2,6	-1,5
%	-8	6	-2
Вегетаційний період, діб	58	61	59
Стійкість до, бал			
вилягання	7,5	7,0	6,8
осипання	7,6	7,8	7,7
посухи	8,3	8,5	8,3
аскохітозу	8,8	8,0	9,0
іржі	9,0	9,0	9,0
Залистяність, %	62,1	58,9	55,2
Вміст сирого протеїну, %	19,4	19,1	21,4
Напрямок використання	кормовий		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп

Вид: Горошок посівний (ярий) *Vicia sativa* L.

Заявка №: 11047001 Назва сорту Озіряна

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 11.02.2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

18.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140382

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Сіянець: відношення довжини до ширини листочків (другого справжнього листка)	середнє	5
2	Сіянець: антоціанове забарвлення основи стебла	наявне	9
3	Сіянець: інтенсивність антоціанового забарвлення на основі стебла	слабке	3
4	Рослина: інтенсивність зеленого забарвлення листків (напередодні цвітіння)	світле	3
5	Час початку цвітіння (30 % рослин)	середній	5
6	Стебло: опушення верхнього міжвузля	наявне	9
7	Стебло: антоціанове забарвлення пазух листків	відсутнє або дуже слабке	1
8	Листок: форма верхівки листочків (на середній третині рослини)	пряма	5
9	Листок: ширина листочків (як для 8)	вузькі	3
10	Прилистки: антоціанове забарвлення залозок	відсутнє або дуже слабке	1
11	Квітка: забарвлення паруса	світло-фіолетовий	3
12	Біб: опушення	відсутнє або дуже слабке	1
13	Біб: за довжиною	середній	5
14	Біб: за шириною	середній	5
15	Біб: довжина дзьобика	середній	5
16	Біб: кількість насінних зачатків	середня кількість	5
17	Насіння: за розміром	велике	7
18	Насіння: за формою	кулясте	1
19	Насіння: основне забарвлення насінної оболонки	сіро-коричнєве	2
20	Насіння: коричнева орнаментация	відсутня	1
21	Насіння: вираження коричневої орнаментации	дуже слабке	1
22	Насіння: блакитно-чорна орнаментация	відсутня	1
23	Насіння: виявлення блакитно-чорної орнаментации	дуже слабке	1
24	Насіння: забарвлення сім'ядолей	сірувато-коричнєве	1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність сухої речовини, ц/га	40,3	55,8	70,1
Гарантована прибавка			
ц/га	-2	2,7	4,5
%	-4,7	0,5	6,8
Урожайність насіння, ц/га	12,3	18,5	19,3
Вегетаційний період, діб	59	62	62
Стійкість бал, до			
вилягання	7,0	7,4	7,0
осипання	7,8	7,8	7,0
посухи	8,2	7,4	8,5
аскохітозу	9,0	9,0	9,0
іржі	9,0	9,0	9,0
Залистяність, %	62,3	56,8	54,9
Вміст сирого протеїну, %	21,6	20,3	21,2
Напрямок використання	кормовий		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп, Полісся

Вид: Гречка їстівна *Fagopyrum esculentum* Moench

Заявка №: 09002002 **Назва сорту** Софія

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 16.10.2009

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

07.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140126

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: плоідність	диплоїдна	2
2	Сім'ядоля: антоціанове забарвлення	помірне	5
3	Стебло: антоціанове забарвлення	помірне	2
4	Суцвіття: антоціанове забарвлення бруньки	ознака не визначалась	0
5	Час початку цвітіння	середній	5
6	Рослина: тип росту	детермінантний	1
7	Рослина: за висотою	висока	7
8	Листкова пластинка: форма основи	обрізнана	1
9	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого кольору	помірний	2
10	Квітка: за розміром	велика	3
11	Квітка: колір пелюсток	білий	1
12	Квітка: довжина квітконіжки	ознака не визначалась	0
13	Рослина: загальна кількість квіткових кластерів	середня кількість	2
14	Стебло: за довжиною	довге	7
15	Стебло: кількість вузлів	багато	7
16	Стебло: діаметр	великий	3
17	Рослина: час досягання	середній	5
18	Насіння: за довжиною	середня	2
19	Насінина: форма	трикутна	3
20	Насінина: колір шкірки	помірно коричневий	2
21	Насіння: маса 1000 насінин	велика	7

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	13,6	21,3	23,3
Гарантоване відхилення:			
ц/га	1,2	4	6,5
%	10	23	38
Днів до досягання	82,6	88,9	99,6
Висота рослин, см	106,5	109,4	106,5
Стійкість до:			
вилягання	8,6	7,6	8,2
осипання	7,9	8,0	8,2
посухи	7,5	7,9	8,1
Стійкість проти:			
перноспорозу	9,0	9,0	9,0
борошнистої роси	9,0	9,0	9,0
Вміст білку, %	17,1	16,0	17,3
плівчатість	22,9	22,3	23,7
вихід крупи	75,0	75,2	73,9
Маса 1000 зерен, г	27,3	27,8	28,2
Напрямок використання	харчовий	харчовий	харчовий

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп, Полісся

Вид: Картопля Solanum tuberosum L.

Заявка №: 10031018 Назва сорту Арія

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 24.11.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

27.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140387

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Світловий паросток: за розміром	середній	5
2	Світловий паросток: за формою	яйцеподібний	2
3	Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення основи	сильна	7
4	Світловий паросток: співвідношення блакитного в антоціановому забарвленні основи	середнє	2
5	Світловий паросток: опушення основи	сильне	7
6	Світловий паросток: розмір верхівки порівняно з основою	середня	5
7	Світловий паросток: характеристика верхівки	проміжна	3
8	Світловий паросток: антоціанове забарвлення верхівки	помірне	5
9	Світловий паросток: опушення верхівки	сильне	7
10	Світловий паросток: кількість кореневих кінчиків	середня кількість	5
11	Світловий паросток: довжина бічних пагінців	середні	5
12	Рослина: тип розвитку	проміжний	2
13	Рослина: габітус	прямий	3
14	Стебло: антоціанове забарвлення	помірне	5
15	Листок: загальний розмір	середній	5
16	Листок: відкритість	проміжний	3
17	Листок: виявлення вторинних листочків	помірне	5
18	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
19	Листок: поширення антоціанового забарвлення жилок на верхньому боці	слабке	3
20	Друга пара бічних листочків: за розміром	малі	3
21	Друга пара бічних листочків: за шириною	вузькі	3
22	Верхівкові і бічні листочки: частота зрощення	рідко	3
23	Листочок: хвилястість краю	слабка	3
24	Листочок: глибина жилок	середнє	5
25	Листочок: глянуватість верхнього боку	помірно глянуватий	5
26	Листочок: опушеність пластинки на верхівці розетки	наявна	9
27	Бутон: антоціанове забарвлення	сильне	7
28	Рослина: за висотою	висока	7
29	Рослина: ясність цвітіння	помірне	5
30	Суцвіття: за розміром	велике	7
31	Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки	помірне	5
32	Віночок квітки: розмір	середній	5
33	Віночок квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення зовнішнього боку	дуже сильне	9
34	Віночок квітки: співвідношення блакитного у антоціановому забарвленні внутрішнього боку	середнє	2
35	Віночок: поширення антоціанового забарвлення на внутрішньому боці	велике	7
36	Рослина: час досягання	середній	5
37	Бульба: форма	видовжена	5
38	Бульба: глибина вічок	дуже мілкі	1
39	Бульба: колір шкірки	червоний	3
40	Бульба: забарвлення основи вічка	червоне	3
41	Бульба: забарвлення м'якоті	кремове	2
42	Лише сорти із світло-бежевою і жовтою шкіркою: Бульба: антоціанове забарвлення шкірки під впливом світла	ознака не визначається	0

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га		232,0	283,6
Гарантована прибавка (до національн стандарту), ц/га		30,8	49,7
Гарантована прибавка (до національного стандарту), %		15	21
Гарантована прибавка (до умовного стандарту), ц/га		16,5	25,2
Гарантована прибавка (до умовного стандарту), %		8	10
Вміст крохмалю, %		15,7	16,3

Збір крохмалю, ц/га	32,5	39,5
Вміст сухої речовини, %	23,0	23,2
Вегетаційний період, днів	78	72
Маса бульб, г	92,3	96,7
Урожай 1-ї копки, ц/га	115,2	83,4
Урожай 2-ї копки, ц/га	161,6	124,7
Урожай 3-ї копки, ц/га	201,5	188,6
Смакові якості, б	7,7	8,4
Товарність бульб, %	93,3	95,7
Лежкість, бал	6,3	6,3
Стійкість до пошкодження нематодою	Ст.	Ст.
Стійкість до звичайного патотипу збудника раку	Ст.	Ст.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп, Полісся

Вид: Картопля Solanum tuberosum L.

Заявка №: 09031004 Назва сорту Білявка

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 22.11.2013 Патент №: 130255

Дата пріоритету 24.11.2009

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

19.02.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140268

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Світловий паросток: за розміром	середній	5
2	Світловий паросток: за формою	круглий	1
3	Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення основи	помірна	5
4	Світловий паросток: співвідношення блакитного в антоціановому забарвленні основи	середнє	2
5	Світловий паросток: опушення основи	помірне	5
6	Світловий паросток: розмір верхівки порівняно з основою	середня	5
7	Світловий паросток: характеристика верхівки	проміжна	3
8	Світловий паросток: антоціанове забарвлення верхівки	помірне	5
9	Світловий паросток: опушення верхівки	сильне	7
10	Світловий паросток: кількість кореневих кінчиків	багато	7
11	Світловий паросток: довжина бічних пагінців	середні	5
12	Рослина: тип розвитку	стебловий	1
13	Рослина: габітус	прямий	3
14	Стебло: антоціанове забарвлення	слабке	3
15	Листок: загальний розмір	середній	5
16	Листок: відкритість	закритий	1
17	Листок: виявлення вторинних листочків	помірне	5
18	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	темне	7
19	Листок: поширення антоціанового забарвлення жилок на верхньому боці	слабке	3
20	Друга пара бічних листочків: за розміром	середні	5
21	Друга пара бічних листочків: за шириною	вузькі	3
22	Верхівкові і бічні листочки: частота зрощення	рідко	3
23	Листочок: хвилястість краю	помірна	5
24	Листочок: глибина жилок	середнє	5
25	Листочок: глянуватість верхнього боку	помірно глянуватий	5
26	Листочок: опушеність пластинки на верхівці розетки	наявна	9
27	Бутон: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
28	Рослина: за висотою	висока	7
29	Рослина: ясність цвітіння	помірне	5
30	Суцвіття: за розміром	середнє	5
31	Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки	відсутнє або дуже слабке	1
32	Віночок квітки: розмір	середній	5
33	Віночок квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення зовнішнього боку	відсутнє або дуже слабке	1
34	Віночок квітки: співвідношення блакитного у антоціановому забарвленні внутрішнього боку	відсутнє або мале	1
35	Віночок: поширення антоціанового забарвлення на внутрішньому боці	відсутнє або дуже мале	1
36	Рослина: час досягання	середній	5
37	Бульба: форма	овальна	3
38	Бульба: глибина вічок	дуже мілкі	1
39	Бульба: колір шкірки	жовтий	2
40	Бульба: забарвлення основи вічка	жовте	2
41	Бульба: забарвлення м'якоті	кремове	2
42	Лише сорти із світло-бежевою і жовтою шкіркою: Бульба: антоціанове забарвлення шкірки під впливом світла	сильне	7

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га		212,9	259,1
Гарантована прибавка (до національн стандарту), ц/га		39,5	21,2
Гарантована прибавка (до національного стандарту), %		23	9
Гарантована прибавка (до умовного стандарту), ц/га		-21,9	-15,9
Гарантована прибавка (до умовного стандарту), %		-9	-6
Вміст крохмалю, %		16,6	17,1

Збір крохмалю, ц/га	34,6	42,3
Вміст сухої речовини, %	25,3	25,8
Вегетаційний період, днів	93	93
Маса бульб, г	77,1	90
Смакові якості, б	7	7
Товарність бульб, %	89	95
Лежкість, бал	6	8,7
Стійкість до пошкодження нематодою	стійкий	
Стійкість до звичайного патотипу збудника раку	стійкий.	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп, Полісся

Вид: Картопля Solanum tuberosum L.

Заявка №: 10031013 Назва сорту Лабелла

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 22.11.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

26.02.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140017

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Світловий паросток: за розміром	середній	5
2	Світловий паросток: за формою	яйцеподібний	2
3	Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення основи	помірна	5
4	Світловий паросток: співвідношення блакитного в антоціановому забарвленні основи	відсутнє або дуже мале	1
5	Світловий паросток: опушення основи	помірне	5
6	Світловий паросток: розмір верхівки порівняно з основою	середня	5
7	Світловий паросток: характеристика верхівки	проміжна	3
8	Світловий паросток: антоціанове забарвлення верхівки	помірне	5
9	Світловий паросток: опушення верхівки	помірне	5
10	Світловий паросток: кількість кореневих кінчиків	середня кількість	5
11	Світловий паросток: довжина бічних пагінців	короткі	3
12	Рослина: тип розвитку	проміжний	2
13	Рослина: габітус	прямий	3
14	Стебло: антоціанове забарвлення	помірне	5
15	Листок: загальний розмір	середній	5
16	Листок: відкритість	проміжний	3
17	Листок: виявлення вторинних листочків	помірне	5
18	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
19	Листок: поширення антоціанового забарвлення жилок на верхньому боці	слабке	3
20	Друга пара бічних листочків: за розміром	малі	3
21	Друга пара бічних листочків: за шириною	вузькі	3
22	Верхівкові і бічні листочки: частота зрощення	рідко	3
23	Листочок: хвилястість краю	слабка	3
24	Листочок: глибина жилок	мільке	3
25	Листочок: глянуватість верхнього боку	помірно глянуватий	5
26	Листочок: опушеність пластинки на верхівці розетки	наявна	9
27	Бутон: антоціанове забарвлення	сильне	7
28	Рослина: за висотою	середня	5
29	Рослина: ясність цвітіння	обрідне	3
30	Суцвіття: за розміром	середнє	5
31	Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки	помірне	5
32	Віночок квітки: розмір	середній	5
33	Віночок квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення зовнішнього боку	сильне	7
34	Віночок квітки: співвідношення блакитного у антоціановому забарвленні внутрішнього боку	середнє	2
35	Віночок: поширення антоціанового забарвлення на внутрішньому боці	середнє	5
36	Рослина: час досягання	пізній	7
37	Бульба: форма	короткоовальна	2
38	Бульба: глибина вічок	мількі	3
39	Бульба: колір шкірки	червоний	3
40	Бульба: забарвлення основи вічка	біле	1
41	Бульба: забарвлення м'якоті	кремове	2
42	Лише сорти із світло-бежевою і жовтою шкіркою: Бульба: антоціанове забарвлення шкірки під впливом світла	ознака не визначається	0

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га		208,9	258,3
Гарантована прибавка (до національн стандарту), ц/га		-0,9	20,5
Гарантована прибавка (до національного стандарту), %		0	8
Гарантована прибавка (до умовного стандарту), ц/га		-3,2	-10,8
Гарантована прибавка (до умовного стандарту), %		-2	-4
Вміст крохмалю, %		14,5	17,0

Збір крохмалю, ц/га	27,6	33,9
Вміст сухої речовини, %	21,5	22,0
Вегетаційний період, днів	90	79
Маса бульб, г	105,1	93,6
Смакові якості, б	6,3	8,1
Товарність бульб, %	93,5	93,9
Лежкість, бал	7,2	8,1
Стійкість до пошкодження нематодою	Ст.	Ст.
Стійкість до звичайного патотипу збудника раку	Ст.	Ст.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Полісся

Вид: Картопля Solanum tuberosum L.

Заявка №: 10031012 Назва сорту Лаперла

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 22.11.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

26.02.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140016

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Світловий паросток: за розміром	середній	5
2	Світловий паросток: за формою	яйцеподібний	2
3	Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення основи	помірна	5
4	Світловий паросток: співвідношення блакитного в антоціановому забарвленні основи	відсутнє або дуже мале	1
5	Світловий паросток: опушення основи	слабке	3
6	Світловий паросток: розмір верхівки порівняно з основою	середня	5
7	Світловий паросток: характеристика верхівки	відкрита	5
8	Світловий паросток: антоціанове забарвлення верхівки	помірне	5
9	Світловий паросток: опушення верхівки	помірне	5
10	Світловий паросток: кількість кореневих кінчиків	середня кількість	5
11	Світловий паросток: довжина бічних пагінців	короткі	3
12	Рослина: тип розвитку	проміжний	2
13	Рослина: габітус	напіврозлогий	5
14	Стебло: антоціанове забарвлення	помірне	5
15	Листок: загальний розмір	середній	5
16	Листок: відкритість	відкритий	5
17	Листок: виявлення вторинних листочків	сильне	7
18	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
19	Листок: поширення антоціанового забарвлення жилок на верхньому боці	слабке	3
20	Друга пара бічних листочків: за розміром	малі	3
21	Друга пара бічних листочків: за шириною	вузькі	3
22	Верхівкові і бічні листочки: частота зрощення	рідко	3
23	Листочок: хвилястість краю	слабка	3
24	Листочок: глибина жилок	мільке	3
25	Листочок: глянуватість верхнього боку	помірно глянуватий	5
26	Листочок: опушеність пластинки на верхівці розетки	наявна	9
27	Бутон: антоціанове забарвлення	середнє	5
28	Рослина: за висотою	середня	5
29	Рослина: ясність цвітіння	обрідне	3
30	Суцвіття: за розміром	середнє	5
31	Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки	помірне	5
32	Віночок квітки: розмір	середній	5
33	Віночок квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення зовнішнього боку	сильне	7
34	Віночок квітки: співвідношення блакитного у антоціановому забарвленні внутрішнього боку	відсутнє або мале	1
35	Віночок: поширення антоціанового забарвлення на внутрішньому боці	середнє	5
36	Рослина: час досягання	середній	5
37	Бульба: форма	короткоовальна	2
38	Бульба: глибина вічок	середні	5
39	Бульба: колір шкірки	світло-бежевий	1
40	Бульба: забарвлення основи вічка	біле	1
41	Бульба: забарвлення м'якоті	кремове	2
42	Лише сорти із світло-бежевою і жовтою шкіркою: Бульба: антоціанове забарвлення шкірки під впливом світла	помірне	5

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га		257,9	309,9
Гарантована прибавка (до національн стандарту), ц/га		56,7	76,0
Гарантована прибавка (до національного стандарту), %		28	32
Гарантована прибавка (до умовного стандарту), ц/га		42,3	20
Гарантована прибавка (до умовного стандарту), %		20	14
Вміст крохмалю, %		14,6	14,6

Збір крохмалю, ц/га	27,5	34,3
Вміст сухої речовини, %	22,9	21,8
Вегетаційний період, днів	78	71
Маса бульб, г	111,8	109,2
Урожай 1-ї копки, ц/га	131,1	104,3
Урожай 2-ї копки, ц/га	188,9	150,2
Урожай 3-ї копки, ц/га	226,4	207,6
Смакові якості, б	9,0	7,7
Товарність бульб, %	93,7	97,7
Лежкість, бал	7,2	6,3
Стійкість до пошкодження нематодою	Ст.	Ст.
Стійкість до звичайного патотипу збудника раку	Ст.	Ст.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп, Полісся

Вид: Картопля Solanum tuberosum L.

Заявка №: 10031016 Назва сорту Лстана

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 22.11.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

27.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140385

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Світловий паросток: за розміром	середній	5
2	Світловий паросток: за формою	конічний	3
3	Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення основи	сильна	7
4	Світловий паросток: співвідношення блакитного в антоціановому забарвленні основи	відсутнє або дуже мале	1
5	Світловий паросток: опушення основи	помірне	5
6	Світловий паросток: розмір верхівки порівняно з основою	середня	5
7	Світловий паросток: характеристика верхівки	проміжна	3
8	Світловий паросток: антоціанове забарвлення верхівки	помірне	5
9	Світловий паросток: опушення верхівки	сильне	7
10	Світловий паросток: кількість кореневих кінчиків	мало	3
11	Світловий паросток: довжина бічних пагінців	короткі	3
12	Рослина: тип розвитку	листяний	3
13	Рослина: габітус	прямий	3
14	Стебло: антоціанове забарвлення	сильне	7
15	Листок: загальний розмір	середній	5
16	Листок: відкритість	проміжний	3
17	Листок: виявлення вторинних листочків	сильне	7
18	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	темне	7
19	Листок: поширення антоціанового забарвлення жилок на верхньому боці	помірне	5
20	Друга пара бічних листочків: за розміром	малі	3
21	Друга пара бічних листочків: за шириною	вузькі	3
22	Верхівкові і бічні листочки: частота зрощення	середньо	5
23	Листочок: хвилястість краю	помірна	5
24	Листочок: глибина жилок	середнє	5
25	Листочок: глянуватість верхнього боку	глянуватий	7
26	Листочок: опушеність пластинки на верхівці розетки	наявна	9
27	Бутон: антоціанове забарвлення	сильне	7
28	Рослина: за висотою	висока	7
29	Рослина: ясність цвітіння	помірне	5
30	Суцвіття: за розміром	велике	7
31	Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки	сильне	7
32	Віночок квітки: розмір	середній	5
33	Віночок квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення зовнішнього боку	сильне	7
34	Віночок квітки: співвідношення блакитного у антоціановому забарвленні внутрішнього боку	середнє	2
35	Віночок: поширення антоціанового забарвлення на внутрішньому боці	середнє	5
36	Рослина: час досягання	пізній	7
37	Бульба: форма	видовженооувальна	4
38	Бульба: глибина вічок	мількі	3
39	Бульба: колір шкірки	червоний	3
40	Бульба: забарвлення основи вічка	червоне	3
41	Бульба: забарвлення м'якоті	біле	1
42	Лише сорти із світло-бежевою і жовтою шкіркою: Бульба: антоціанове забарвлення шкірки під впливом світла	ознака не визначається	0

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га		203,8	265,8
Гарантована прибавка (до національн стандарту), ц/га		-4,2	28
Гарантована прибавка (до національного стандарту), %		-2	12
Гарантована прибавка (до умовного стандарту), ц/га		-8,3	-3,3
Гарантована прибавка (до умовного стандарту), %		-4	-1
Вміст крохмалю, %		17,1	17,4

Збір крохмалю, ц/га	30,6	39,2
Вміст сухої речовини, %	22,8	24,1
Вегетаційний період, днів	93	80
Маса бульб, г	101,0	91,4
Смакові якості, б	7,1	7,0
Товарність бульб, %	89,8	95,6
Лежкість, бал	7,7	7,9
Стійкість до пошкодження нематодою	Ст.	Ст.
Стійкість до звичайного патотипу збудника раку	Ст.	Ст.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Полісся

Вид: Картопля Solanum tuberosum L.

Заявка №: 10031014 Назва сорту Наташа

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 22.11.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

26.02.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140018

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Світловий паросток: за розміром	середній	5
2	Світловий паросток: за формою	яйцеподібний	2
3	Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення основи	помірна	5
4	Світловий паросток: співвідношення блакитного в антоціановому забарвленні основи	відсутнє або дуже мале	1
5	Світловий паросток: опушення основи	помірне	5
6	Світловий паросток: розмір верхівки порівняно з основою	середня	5
7	Світловий паросток: характеристика верхівки	проміжна	3
8	Світловий паросток: антоціанове забарвлення верхівки	помірне	5
9	Світловий паросток: опушення верхівки	помірне	5
10	Світловий паросток: кількість кореневих кінчиків	середня кількість	5
11	Світловий паросток: довжина бічних пагінців	середні	5
12	Рослина: тип розвитку	проміжний	2
13	Рослина: габітус	прямий	3
14	Стебло: антоціанове забарвлення	помірне	5
15	Листок: загальний розмір	середній	5
16	Листок: відкритість	відкритий	5
17	Листок: виявлення вторинних листочків	сильне	7
18	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
19	Листок: поширення антоціанового забарвлення жилок на верхньому боці	слабке	3
20	Друга пара бічних листочків: за розміром	малі	3
21	Друга пара бічних листочків: за шириною	вузькі	3
22	Верхівкові і бічні листочки: частота зрощення	середньо	5
23	Листочок: хвилястість краю	помірна	5
24	Листочок: глибина жилок	мілке	3
25	Листочок: глянуватість верхнього боку	помірно глянуватий	5
26	Листочок: опушеність пластинки на верхівці розетки	наявна	9
27	Бутон: антоціанове забарвлення	слабке	3
28	Рослина: за висотою	середня	5
29	Рослина: ясність цвітіння	помірне	5
30	Суцвіття: за розміром	середнє	5
31	Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки	помірне	5
32	Віночок квітки: розмір	середній	5
33	Віночок квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення зовнішнього боку	слабке	3
34	Віночок квітки: співвідношення блакитного у антоціановому забарвленні внутрішнього боку	відсутнє або мале	1
35	Віночок: поширення антоціанового забарвлення на внутрішньому боці	відсутнє або дуже мале	1
36	Рослина: час досягання	середній	5
37	Бульба: форма	овальна	3
38	Бульба: глибина вічок	мілкі	3
39	Бульба: колір шкірки	жовтий	2
40	Бульба: забарвлення основи вічка	жовте	2
41	Бульба: забарвлення м'якоті	помірно жовте	4
42	Лише сорти із світло-бежевою і жовтою шкіркою: Бульба: антоціанове забарвлення шкірки під впливом світла	помірне	5

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га		215,6	268,8
Гарантована прибавка (до національн стандарту), ц/га		7,6	31
Гарантована прибавка (до національного стандарту), %		3	13
Гарантована прибавка (до умовного стандарту), ц/га		3,4	-103
Гарантована прибавка (до умовного стандарту), %		2	0
Вміст крохмалю, %		16,0	15,6

Збір крохмалю, ц/га	30,0	36,4
Вміст сухої речовини, %	23,4	22,6
Вегетаційний період, днів	89	82
Маса бульб, г	107,8	90,1
Смакові якості, б	7,6	8,1
Товарність бульб, %	91,6	95,3
Лежкість, бал	6,3	8,1
Стійкість до пошкодження нематодою	Ст.	Ст.
Стійкість до звичайного патотипу збудника раку	Ст.	Ст.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп, Полісся

Вид: Картопля Solanum tuberosum L.

Заявка №: 10031019 Назва сорту Слuch

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 24.11.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

28.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140388

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Світловий паросток: за розміром	середній	5
2	Світловий паросток: за формою	яйцеподібний	2
3	Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення основи	дуже сильна	9
4	Світловий паросток: співвідношення блакитного в антоціановому забарвленні основи	велике	3
5	Світловий паросток: опушення основи	сильне	7
6	Світловий паросток: розмір верхівки порівняно з основою	середня	5
7	Світловий паросток: характеристика верхівки	закрита	1
8	Світловий паросток: антоціанове забарвлення верхівки	сильне	7
9	Світловий паросток: опушення верхівки	сильне	7
10	Світловий паросток: кількість кореневих кінчиків	багато	7
11	Світловий паросток: довжина бічних пагінців	короткі	3
12	Рослина: тип розвитку	проміжний	2
13	Рослина: габітус	напіврозлогий	5
14	Стебло: антоціанове забарвлення	помірне	5
15	Листок: загальний розмір	середній	5
16	Листок: відкритість	відкритий	5
17	Листок: виявлення вторинних листочків	помірне	5
18	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
19	Листок: поширення антоціанового забарвлення жилок на верхньому боці	слабке	3
20	Друга пара бічних листочків: за розміром	малі	3
21	Друга пара бічних листочків: за шириною	вузькі	3
22	Верхівкові і бічні листочки: частота зрощення	рідко	3
23	Листочок: хвилястість краю	слабка	3
24	Листочок: глибина жилок	середнє	5
25	Листочок: глянуватість верхнього боку	помірно глянуватий	5
26	Листочок: опушеність пластинки на верхівці розетки	наявна	9
27	Бутон: антоціанове забарвлення	середнє	5
28	Рослина: за висотою	висока	7
29	Рослина: ясність цвітіння	помірне	5
30	Суцвіття: за розміром	середнє	5
31	Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки	помірне	5
32	Віночок квітки: розмір	середній	5
33	Віночок квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення зовнішнього боку	помірне	5
34	Віночок квітки: співвідношення блакитного у антоціановому забарвленні внутрішнього боку	відсутнє або мале	1
35	Віночок: поширення антоціанового забарвлення на внутрішньому боці	середнє	5
36	Рослина: час досягання	пізній	7
37	Бульба: форма	видовжена	5
38	Бульба: глибина вічок	мілкі	3
39	Бульба: колір шкірки	червоний	3
40	Бульба: забарвлення основи вічка	червоне	3
41	Бульба: забарвлення м'якоті	кремове	2
42	Лише сорти із світло-бежевою і жовтою шкіркою: Бульба: антоціанове забарвлення шкірки під впливом світла	ознака не визначається	0

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га		223,6	280,6
Гарантована прибавка (до національн стандарту), ц/га		1,3	30,9
Гарантована прибавка (до національного стандарту), %		1	12
Гарантована прибавка (до умовного стандарту), ц/га		27,6	29,6
Гарантована прибавка (до умовного стандарту), %		14	12
Вміст крохмалю, %		16,0	16,9

Збір крохмалю, ц/га	32,6	40,7
Вміст сухої речовини, %	24,0	23,6
Вегетаційний період, днів	95	82
Маса бульб, г	93,5	92,6
Смакові якості, б	7,7	7,8
Товарність бульб, %	90,0	94,1
Лежкість, бал	7,2	7,2
Стійкість до пошкодження нематодою	Ст.	Ст.
Стійкість до звичайного патотипу збудника раку	Ст.	Ст.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп, Полісся

Вид: Картопля Solanum tuberosum L.

Заявка №: 10031017 Назва сорту Чарунка

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 22.11.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

27.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140386

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Світловий паросток: за розміром	середній	5
2	Світловий паросток: за формою	круглий	1
3	Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення основи	дуже сильна	9
4	Світловий паросток: співвідношення блакитного в антоціановому забарвленні основи	середнє	2
5	Світловий паросток: опушення основи	помірне	5
6	Світловий паросток: розмір верхівки порівняно з основою	середня	5
7	Світловий паросток: характеристика верхівки	проміжна	3
8	Світловий паросток: антоціанове забарвлення верхівки	помірне	5
9	Світловий паросток: опушення верхівки	сильне	7
10	Світловий паросток: кількість кореневих кінчиків	середня кількість	5
11	Світловий паросток: довжина бічних пагінців	короткі	3
12	Рослина: тип розвитку	проміжний	2
13	Рослина: габітус	прямий	3
14	Стебло: антоціанове забарвлення	сильне	7
15	Листок: загальний розмір	середній	5
16	Листок: відкритість	відкритий	5
17	Листок: виявлення вторинних листочків	сильне	7
18	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
19	Листок: поширення антоціанового забарвлення жилок на верхньому боці	слабке	3
20	Друга пара бічних листочків: за розміром	малі	3
21	Друга пара бічних листочків: за шириною	вузькі	3
22	Верхівкові і бічні листочки: частота зрощення	рідко	3
23	Листочок: хвилястість краю	слабка	3
24	Листочок: глибина жилок	мільке	3
25	Листочок: глянуватість верхнього боку	помірно глянуватий	5
26	Листочок: опушеність пластинки на верхівці розетки	наявна	9
27	Бутон: антоціанове забарвлення	середнє	5
28	Рослина: за висотою	висока	7
29	Рослина: ясність цвітіння	помірне	5
30	Суцвіття: за розміром	середнє	5
31	Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки	сильне	7
32	Віночок квітки: розмір	середній	5
33	Віночок квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення зовнішнього боку	відсутнє або дуже слабке	1
34	Віночок квітки: співвідношення блакитного у антоціановому забарвленні внутрішнього боку	відсутнє або мале	1
35	Віночок: поширення антоціанового забарвлення на внутрішньому боці	відсутнє або дуже мале	1
36	Рослина: час досягання	пізній	7
37	Бульба: форма	куляста	1
38	Бульба: глибина вічок	середні	5
39	Бульба: колір шкірки	жовтий	2
40	Бульба: забарвлення основи вічка	біле	1
41	Бульба: забарвлення м'якоті	біле	1
42	Лише сорти із світло-бежевою і жовтою шкіркою: Бульба: антоціанове забарвлення шкірки під впливом світла	помірне	5

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га		224,9	267,7
Гарантована прибавка (до національн стандарту), ц/га		16,9	29,9
Гарантована прибавка (до національного стандарту), %		8	12
Гарантована прибавка (до умовного стандарту), ц/га		12,8	-1,4
Гарантована прибавка (до умовного стандарту), %		6	0
Вміст крохмалю, %		14,8	18,8

Збір крохмалю, ц/га	29,8	38,1
Вміст сухої речовини, %	22,4	21,8
Вегетаційний період, днів	87	78
Маса бульб, г	110,5	89,4
Смакові якості, б	6,5	8,3
Товарність бульб, %	92,5	94,8
Лежкість, бал	6,3	7,9
Стійкість до пошкодження нематодою	Ст	Ст
Стійкість до звичайного патотипу збудника раку	Ст.	Ст.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп, Полісся

Вид: Конюшина лучна (червона) *Trifolium pratense* L.

Заявка №: 08052001 Назва сорту Тайфун

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 03.03.2014 Патент №: 140006

Дата пріоритету 19.02.2008

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

03.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140020

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: забарвлення шкірки	фіолетове	2
2	Плоїдність	тетраплоїд	4
3	Сім'ядолі: за довжиною	ознака не визначалась	0
4	Сім'ядолі: за шириною	ознака не визначалась	0
5	Рослина: за висотою у рік сівби	середня	5
6	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення у рік сівби	ознака не визначалась	0
7	Рослина: габітус восени у рік сівби	ознака не визначалась	0
8	Рослина: тенденція до цвітіння у рік сівби	ознака не визначалась	0
9	Рослина: за висотою навесні	ознака не визначалась	0
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення весною	ознака не визначалась	0
11	Рослина: час цвітіння	середній	5
12	Стебло: за довжиною	середнє	5
13	Стебло: за товщиною	середнє	5
14	Стебло: кількість міжвузлів	мало	3
15	Стебло: щільність опушення	помірне	5
16	Листок: форма центрального листочка	ознака не визначалась	0
17	Листок: довжина центрального листочка	середній	5
18	Листок: ширина центрального листочка	середній	5
19	Листок: частота трапляння білих міток	часто	7
20	Рослина: природна висота другого укусу	ознака не визначалась	0

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність сухої речовини, ц/га		62,7	87,9
гарантована прибавка			
ц/га		3	-0,2
%		5	0
Вегетаційний період, діб		59	76
Стійкість до, бал			
вильгання		8,1	7,5
посухи		7,9	8,4
іржі		9,0	9,0
бурої плямистості		9,0	9,0
антракнозу		9,0	9,0
Перезимувало рослин, бал		8,7	7,3
Залистяність, %		44,7	47,6
Вміст сирого протеїну		19,8	19,5
Напрямок використання		кормовий	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп

Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.

Заявка №: 10004238

Назва сорту Адевей

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

06.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140166

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	сильне	7
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	дуже сильне	9
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	дуже довга	9
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	середня	5
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5
28	Качан: за довжиною	середній	5
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	зубоподібний	4
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовто-оранжевий	4
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	оранжевий	5
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	С	Значення Л	П
Урожайність, ц/га	62,8	89,7	95,1
Гарантована прибавка, ц/га	3,6	12,7	16
Гарантована прибавка, %	6	16	20
Днів до достигання	111	118	123
Збиральна вологість зерна, %	21,2	22,5	23,2

Вихід зерна при обмолоті, %	79	78	80
Стійкість до, бал			
посухи	8	9	9
полягання	9	9	9
пухирчастої сажки	9	9	9
Вміст, %			
білку	10,3	10,0	10,2
крохмалю	70,8	73,2	73,4

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп, Полісся

Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.

Заявка №: 10004108

Назва сорту Бресі КС

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 10.11.2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

03.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140025

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	сильна	3
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мало	1
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	довга	7
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	середня	5
27	Качан: ніжка за довжиною	довга	7
28	Качан: за довжиною	середній	5
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	оранжевий	5
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	оранжевий	5
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	С	Значення Л	П
Урожайність, ц/га	63,3	77,6	81,8
Гарантована прибавка, ц/га	4,1	0,6	2,7
Гарантована прибавка, %	7	1	4
Днів до достигання	111	118	122
Збиральна вологість зерна, %	19,4	22,6	23,8

Вихід зерна при обмолоті, %	80	75	81
Стійкість до, бал			
посухи	8	9	9
полягання	9	9	9
пухирчастої сажки	9	9	9
Вміст, %			
білку	10,3	10,3	10,2
крохмалю	71,7	74,2	74,0

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ

Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.

Заявка №: 10004291

Назва сорту Десперадо

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 14.12.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

03.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140039

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мало	1
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	довга	7
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	середня	5
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5
28	Качан: за довжиною	середній	5
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовто-оранжевий	4
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	оранжевий	5
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	С	Значення Л	П
Урожайність, ц/га	61	80,4	85,5
Гарантована прибавка, ц/га	1,8	3,4	6,4
Гарантована прибавка, %	3	4,5	8
Днів до достигання	111	116	124
Збиральна вологість зерна, %	18,9	20,8	22,7

Вихід зерна при обмолоті, %	78	79	80
Стійкість до, бал			
посухи	8	9	9
полягання	9	9	9
пухирчастої сажки	9	9	9
Вміст, %			
білку	9,5	10,0	10,2
крохмалю	73,7	74,5	74,1

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Полісся

Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.

Заявка №: 09004631

Назва сорту ДКС3014

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 30.11.2009

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

03.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140148

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
8	Волоть: час цвітіння	від дуже раннього до раннього	2
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	середнє	5
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	довга	7
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	середня	5
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	короткий	3
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	оранжевий	5
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	оранжевий	5
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	С	Значення Л	П
Урожайність, ц/га	63,1	71,1	78,3
Гарантована прибавка, ц/га	3,9	-5,9	-0,8
Гарантована прибавка, %	6,6	-7,7	-1
Днів до достигання	110	114	122
Збиральна вологість зерна, %	19,2	20,3	22,8

Вихід зерна при обмолоті, %	79	76	81
Стійкість до, бал			
посухи	8	8	9
полягання	9	9	9
пухирчастої сажки	9	9	9
Вміст, %			
білку	10,0	10,2	10,0
крохмалю	73,2	74,3	72,2

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ

Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.

Заявка №: 09004637

Назва сорту ДКС3409

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 30.11.2009

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

03.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140152

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабе	1
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	дуже довга	9
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	середня	5
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5
28	Качан: за довжиною	короткий	3
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	оранжевий	5
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	оранжевий	5
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	слабе	3

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	С	Значення Л	П
Урожайність, ц/га	66,4	80,6	85,9
Гарантована прибавка, ц/га	7,2	3,6	6,8
Гарантована прибавка, %	12,1	4,6	8,6
Днів до достигання	112	117	124
Збиральна вологість зерна, %	18,8	20,8	24,0

Вихід зерна при обмолоті, %	80	78	80
Стійкість до, бал			
посухи	8	8	9
полягання	9	9	9
пухирчастої сажки	9	9	9
Вміст, %			
білку	9,8	9,8	9,3
крохмалю	72,8	72,2	73,8

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Полісся

Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.

Заявка №: 09004636

Назва сорту ДКС3507

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 30.11.2009

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

03.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140151

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3
18	Волоть: щільність розташування колосків	нещільне	3
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	дуже довга	9
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	середня	5
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5
28	Качан: за довжиною	середній	5
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовто-оранжевий	4
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	оранжевий	5
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	слабке	3

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	С	Значення Л	П
Урожайність, ц/га	65,1	82,2	86,3
Гарантована прибавка, ц/га	5,9	5,2	7,2
Гарантована прибавка, %	10	6,7	9,1
Днів до достигання	111	116	124
Збиральна вологість зерна, %	18,6	20,7	23,2

Вихід зерна при обмолоті, %	80	77	80
Стійкість до, бал			
посухи	8	8	9
полягання	9	9	9
пухирчастої сажки	9	9	9
Вміст, %			
білку	10,0	10,0	9,8
крохмалю	72,0	71,8	74,6

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп, Полісся

Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.

Заявка №: 09004641

Назва сорту ДКС3717

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 30.11.2009

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

03.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140154

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	дуже малий	1
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	дуже довга	9
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	середня	5
27	Качан: ніжка за довжиною	довга	7
28	Качан: за довжиною	короткий	3
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	зубоподібний	4
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовтий	3
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	жовто-оранжевий	4
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	С	Значення Л	П
Урожайність, ц/га	67,2	79,9	90,0
Гарантована прибавка, ц/га	8,0	2,9	10,9
Гарантована прибавка, %	13,5	3,7	13,7
Днів до достигання	112	116	124
Збиральна вологість зерна, %	18,5	21,0	22,5

Вихід зерна при обмолоті, %	78	79	81
Стійкість до, бал			
посухи	8	9	9
полягання	9	9	9
пухирчастої сажки	9	9	9
Вміст, %			
білку	9,2	9,8	9,7
крохмалю	72,7	74,7	72,0

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Полісся

Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.

Заявка №: 09004640

Назва сорту ДКС3912

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 30.11.2009

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

03.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140153

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	помірне	5
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	сильне	7
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	ранній	3
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	дуже довга	9
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	середня	5
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5
28	Качан: за довжиною	короткий	3
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	зубоподібний	4
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовтий	3
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	оранжевий	5
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	С	Значення Л	П
Урожайність, ц/га	66,8	83,9	
Гарантована прибавка, ц/га	3,3	4,1	
Гарантована прибавка, %	5	5	
Днів до достигання	119	123	
Збиральна вологість зерна, %	19,3	21,6	

Вихід зерна при обмолоті, %	80	79
Стійкість до, бал		
посухи	8	8
полягання	9	9
пухирчастої сажки	9	9
Вміст, %		
білку	10,2	9,8
крохмалю	72,7	73,3

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп

Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.

Заявка №: 09004630

Назва сорту ДКС4014

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 30.11.2009

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

03.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140147

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	помірне	5
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	сильне	7
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
18	Волоть: щільність розташування колосків	нещільне	3
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	довга	7
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	середня	5
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5
28	Качан: за довжиною	середній	5
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	зубовий	5
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовтий	3
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	жовто-оранжевий	4
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	С	Значення Л	П
Урожайність, ц/га	66,9	89,1	
Гарантована прибавка, ц/га	3,4	9,3	
Гарантована прибавка, %	5	11,6	
Днів до достигання	119	124	
Збиральна вологість зерна, %	19,2	21,2	

Вихід зерна при обмолоті, %	80	77
Стійкість до, бал		
посухи	8	9
полягання	9	9
пухирчастої сажки	9	9
Вміст, %		
білку	9,8	9,5
крохмалю	74,6	73,9

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп

Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.

Заявка №: 09004635

Назва сорту ДКС4408

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 30.11.2009

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

03.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140150

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	дуже сильне	9
2	Перший листок: форма верхівки	від округлої до лопатоподібної	4
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	дуже довга	9
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	середня	5
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5
28	Качан: за довжиною	короткий	3
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	зубовий	5
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовтий	3
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	жовто-оранжевий	4
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	С	Значення Л	П
Урожайність, ц/га	65,3	86,9	
Гарантована прибавка, ц/га	1,8	7,1	
Гарантована прибавка, %	3	9	
Днів до достигання	119	124	
Збиральна вологість зерна, %	18,9	21,9	

Вихід зерна при обмолоті, %	79	79
Стійкість до, бал		
посухи	8	8
полягання	9	9
пухирчастої сажки	9	9
Вміст, %		
білку	9,9	9,4
крохмалю	75,5	75,3

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп

Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.

Заявка №: 09004634

Назва сорту ДКС4515

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 30.11.2009

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

03.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140149

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	від округлої до лопатоподібної	4
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	дуже довга	9
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	середня	5
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5
28	Качан: за довжиною	середній	5
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	зубовий	5
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовтий	3
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	жовто-оранжевий	4
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	С	Значення Л	П
Урожайність, ц/га	64,3	86,2	
Гарантована прибавка, ц/га	0,8	6,4	
Гарантована прибавка, %	1	8	
Днів до достигання	120	125	
Збиральна вологість зерна, %	20,0	23,7	

Вихід зерна при обмолоті, %	81	80
Стійкість до, бал		
посухи	8	8
полягання	9	9
пухирчастої сажки	9	9
Вміст, %		
білку	9,9	9,4
крохмалю	73,0	73,6

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп

Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.

Заявка №: 09004628

Назва сорту ДКС4608

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 30.11.2009

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

03.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140146

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	від округлої до лопатоподібної	4
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	середній	5
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	дуже довга	9
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	середня	5
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5
28	Качан: за довжиною	середній	5
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовто-оранжевий	4
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	оранжевий	5
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	С	Значення Л	П
Урожайність, ц/га	61,7		
Гарантована прибавка, ц/га	4,7		
Гарантована прибавка, %	8		
Днів до достигання	125		
Збиральна вологість зерна, %	22,1		

Вихід зерна при обмолоті	79
Стійкість до, бал	
посухи	8
полягання	9
пухирчастої сажки	9
Вміст, %	
білку	9,4
крохмалю	73,6

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ

Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.

Заявка №: 10004259 Назва сорту ДС0306

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 30.11.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

03.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140034

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабе	1
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	великий	7
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	середній	5
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	дуже довга	9
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	середня	5
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5
28	Качан: за довжиною	середній	5
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	зубоподібний	4
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовтий	3
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	жовто-оранжевий	4
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	С	Значення Л	П
Урожайність, ц/га	59,8		
Гарантована прибавка, ц/га	2,8		
Гарантована прибавка, %	5		
Днів до достигання	124		
Збиральна вологість зерна, %	21,5		

Вихід зерна при обмолоті	79
Стійкість до, бал	
посухи	8
полягання	9
пухирчастої сажки	9
Вміст, %	
білку	9,7
крохмалю	74,8

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ

Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.

Заявка №: 10004252 Назва сорту ДС0336

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 30.11.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

03.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140033

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	темне	3
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	середній	5
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	помірне	5
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	сильне	7
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	середній	5
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	дуже сильне	9
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	дуже довга	9
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	середня	5
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5
28	Качан: за довжиною	середній	5
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	зубовий	5
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовтий	3
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	жовто-оранжевий	4
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	С	Значення Л	П
Урожайність, ц/га	60,9	91,4	
Гарантована прибавка, ц/га	-2,6	11,6	
Гарантована прибавка, %	-4	14,5	
Днів до достигання	118	124	
Збиральна вологість зерна, %	20,1	21,8	

Вихід зерна при обмолоті	79	80
Стійкість до, бал		
посухи	8	9
полягання	9	9
пухирчастої сажки	9	9
Вміст, %		
білку	10,2	9,5
крохмалю	73,2	72,2

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп

Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.

Заявка №: 10004157 Назва сорту ЕС Зізу

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 25.11.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

06.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140161

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7
18	Волоть: щільність розташування колосків	нещільне	3
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	довга	7
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	середня	5
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5
28	Качан: за довжиною	короткий	3
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовто-оранжевий	4
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	оранжевий	5
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	С	Значення Л	П
Урожайність, ц/га	62,3	78,8	75,3
Гарантована прибавка, ц/га	3,1	1,8	-3,8
Гарантована прибавка, %	5	2	-5
Днів до достигання	110	117	123
Збиральна вологість зерна, %	18,1	21,0	23,2

Вихід зерна при обмолоті, %	79	77	79
Стійкість до, бал			
посухи	8	8	8
полягання	9	9	9
пухирчастої сажки	9	9	9
Вміст, %			
білку	9,3	9,6	9,2
крохмалю	73,2	75,0	73,4

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ

Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.

Заявка №: 10004153

Назва сорту ЕС Кубус

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 25.11.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

06.03.2014

Свідчення про державну реєстрацію № 140159

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	середній	5
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	дуже довга	9
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	середня	5
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5
28	Качан: за довжиною	середній	5
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	оранжевий	5
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	оранжевий	5
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	слабке	3

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	С	Значення Л	П
Урожайність, ц/га	66,6	81,7	
Гарантована прибавка, ц/га	3,1	1,9	
Гарантована прибавка, %	5	2	
Днів до достигання	117	125	
Збиральна вологість зерна, %	20,1	22,9	

Вихід зерна при обмолоті	80	78
Стійкість до, бал		
посухи	8	9
полягання	9	9
пухирчастої сажки	9	9
Вміст, %		
білку	9,8	9,7
крохмалю	73,3	73,7

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ

Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.

Заявка №: 10004152 Назва сорту ЕС Рейнджер

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 25.11.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

04.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140158

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	дуже довга	9
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	середня	5
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5
28	Качан: за довжиною	короткий	3
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовто-оранжевий	4
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	жовто-оранжевий	4
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	С	Значення Л	П
Урожайність, ц/га	59,6	77,8	84,3
Гарантована прибавка, ц/га	0	0,8	5,2
Гарантована прибавка, %	0	1	6
Днів до достигання	111	119	123
Збиральна вологість зерна, %	19,6	21,3	24,2

Вихід зерна при обмолоті, %	81	78	79
Стійкість до, бал			
посухи	8	9	8
полягання	9	9	9
пухирчастої сажки	9	9	9
Вміст, %			
білку	9,8	9,7	9,5
крохмалю	75,3	73,4	74,4

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Полісся

Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.

Заявка №: 10004156

Назва сорту ЕС Сафарі

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 25.11.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

06.03.2014

Свідчення про державну реєстрацію № 140160

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	ранній	3
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	сильне	7
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7
18	Волоть: щільність розташування колосків	нещільне	3
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	середнє	5
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	довга	7
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	середня	5
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	короткий	3
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	оранжевий	5
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	оранжевий	5
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	С	Значення Л	П
Урожайність, ц/га	58	79,6	80,1
Гарантована прибавка, ц/га	-1,2	2,6	1
Гарантована прибавка, %	-2	3	1
Днів до достигання	110	116	123
Збиральна вологість зерна, %	18,6	20,7	23,9

Вихід зерна при обмолоті, %	79	78	79
Стійкість до, бал			
посухи	8	8	8
полягання	9	9	9
пухирчастої сажки	9	9	9
Вміст, %			
білку	9,4	9,8	9,3
крохмалю	73,8	73	74,5

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп

Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.

Заявка №: 09004746

Назва сорту Камаріллас

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 01.12.2009

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

13.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140269

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	сильна	3
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	помірно похиле	5
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3
18	Волоть: щільність розташування колосків	нещільне	3
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	довга	7
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	середня	5
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5
28	Качан: за довжиною	короткий	3
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	зубовий	5
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовтий	3
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	жовто-оранжевий	4
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	С	Значення Л	П
Урожайність, ц/га	62,9	83,8	
Гарантована прибавка, ц/га	0	4	
Гарантована прибавка, %	0	5	
Днів до достигання	120	123	
Збиральна вологість зерна, %	19,7	22,4	

Вихід зерна при обмолоті, %	79	77
Стійкість до, бал		
посухи	8	8
полягання	9	9
пухирчастої сажки	9	9
Вміст, %		
білку	9,7	9,5
крохмалю	73,8	73,8

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп

Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.

Заявка №: 09004747

Назва сорту Корифей

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 01.12.2009

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

13.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140270

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	дуже сильне	9
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	сильна	3
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	від дуже раннього до раннього	2
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	сильне	7
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	від дуже раннього до раннього	2
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	сильне	7
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	дуже сильне	9
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	довга	7
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	середня	5
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	короткий	3
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	оранжевий	5
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	оранжевий	5
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	С	Значення Л	П
Урожайність, ц/га	57,0	75,0	70,5
Гарантована прибавка, ц/га	2,9	-1,2	-6
Гарантована прибавка, %	5	-1,6	-7,8
Днів до достигання	102	106	121
Збиральна вологість зерна, %	19,4	19,2	21,6

Вихід зерна при обмолоті, %	79	78	80
Стійкість до, бал			
посухи	8	8	9
полягання	9	9	9
пухирчастої сажки	9	9	9
Вміст, %			
білку	10,2	9,3	9,8
крохмалю	72,2	72,3	73,0

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ

Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.

Заявка №: 10004110 Назва сорту КСМ 3509

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 10.11.2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

03.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140027

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	дуже сильне	9
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	середній	5
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	довга	7
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	середня	5
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5
28	Качан: за довжиною	короткий	3
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовто-оранжевий	4
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	жовто-оранжевий	4
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	С	Значення Л	П
Урожайність, ц/га	66,8	77,4	
Гарантована прибавка, ц/га	3,3	-2,4	
Гарантована прибавка, %	5,2	-3	
Днів до достигання	117	124	
Збиральна вологість зерна, %	19,8	22,7	

Вихід зерна при обмолоті, %	79	77
Стійкість до, бал		
посухи	8	9
полягання	9	9
пухирчастої сажки	9	9
Вміст, %		
білку	9,8	9,8
крохмалю	72,9	73,0

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ

Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.

Заявка №: 10004109

Назва сорту КСМ 6509

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 10.11.2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

03.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140026

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	дуже сильне	9
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мало	1
15	Качан: час появи шовку	ранній	3
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	середнє	5
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	дуже довга	9
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	середня	5
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5
28	Качан: за довжиною	середній	5
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовто-оранжевий	4
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	оранжевий	5
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	С	Значення Л	П
Урожайність, ц/га	57,7	85,7	80,5
Гарантована прибавка, ц/га	-1,5	8,7	1,4
Гарантована прибавка, %	-2	11	2
Днів до достигання	111	116	122
Збиральна вологість зерна, %	20	22,3	23,6

Вихід зерна при обмолоті, %	78	78	79
Стійкість до, бал			
посухи	8	9	8
полягання	9	9	9
пухирчастої сажки	9	9	9
Вміст, %			
білку	9,6	9,3	9,8
крохмалю	73,4	73,0	72,6

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп

Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.

Заявка №: 10004114 Назва сорту КСМ 7117

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 10.11.2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

03.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140030

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	дуже ранній	1
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	від дуже раннього до раннього	2
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	дуже довга	9
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	середня	5
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5
28	Качан: за довжиною	короткий	3
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	зубоподібний	4
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовто-оранжевий	4
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	оранжевий	5
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	С	Значення Л	П
Урожайність, ц/га	55	76,1	82,2
Гарантована прибавка, ц/га	1	0	5,7
Гарантована прибавка, %	2	0	8
Днів до достигання	100	106	124
Збиральна вологість зерна, %	19,0	18,2	22,4

Вихід зерна при обмолоті, %	81	79	81
Стійкість до, бал			
посухи	8	9	9
полягання	9	9	9
пухирчастої сажки	9	9	9
Вміст, %			
білку	9,2	9,8	9,5
крохмалю	73,2	75,3	73,2

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Полісся

Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.

Заявка №: 10004113 Назва сорту КСМ 7119

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 10.11.2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

03.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140029

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	від дуже раннього до раннього	2
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	ранній	3
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3
18	Волоть: щільність розташування колосків	щільне	7
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	довга	7
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5
28	Качан: за довжиною	короткий	3
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовтий	3
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	оранжевий	5
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	С	Значення Л	П
Урожайність, ц/га	56,1	77,3	84,2
Гарантована прибавка, ц/га	-3,1	0,3	5,1
Гарантована прибавка, %	-5	0	6
Днів до достигання	110	115	122
Збиральна вологість зерна, %	18,7	20,6	22,3

Вихід зерна при обмолоті, %	80	76	80
Стійкість до, бал			
посухи	8	8	8
полягання	9	9	9
пухирчастої сажки	9	9	9
Вміст, %			
білку	10,4	10,1	9,4
крохмалю	72,5	74	73,2

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Полісся

Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.

Заявка №: 10004112 Назва сорту КСМ 7713

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 10.11.2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

03.03.2014

Свідчення про державну реєстрацію № 140028

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	середній	5
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	дуже сильне	9
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	дуже довга	9
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	середня	5
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	короткий	3
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	зубовий	5
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовтий	3
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	жовто-оранжевий	4
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	С	Значення Л	П
Урожайність, ц/га	65,4		
Гарантована прибавка, ц/га	8,4		
Гарантована прибавка, %	15		
Днів до достигання	124		
Збиральна вологість зерна, %	21,7		

Вихід зерна при обмолоті	79
Стійкість до, бал	
посухи	8
полягання	9
пухирчастої сажки	9
Вміст, %	
білку	9,3
крохмалю	72,8

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ

Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.

Заявка №: 10004236

Назва сорту ЛГ30288

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

06.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140164

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	світле	1
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	помірно похиле	5
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	великий	7
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мало	1
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	сильне	7
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	довга	7
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	середня	5
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5
28	Качан: за довжиною	середній	5
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	зубоподібний	4
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовто-оранжевий	4
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	оранжевий	5
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	слабке	3

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	С	Значення Л	П
Урожайність, ц/га	63,2	78,8	90,6
Гарантована прибавка, ц/га	4	1,8	11,5
Гарантована прибавка, %	7	2	14
Днів до достигання	111	120	125
Збиральна вологість зерна, %	19,6	22,5	23,4

Вихід зерна при обмолоті, %	79	76	81
Стійкість до, бал			
посухи	8	9	9
полягання	9	9	9
пухирчастої сажки	9	9	9
Вміст, %			
білку	10,5	10,0	9,0
крохмалю	71,0	73,3	74,4

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Полісся

Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.

Заявка №: 10004237 Назва сорту ЛГ30290

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

06.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140165

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	помірно похиле	5
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	середній	5
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мало	1
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	дуже довга	9
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	середня	5
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5
28	Качан: за довжиною	середній	5
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	зубовий	5
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовтий	3
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	жовто-оранжевий	4
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	С	Значення Л	П
Урожайність, ц/га	63,5	82,2	83,2
Гарантована прибавка, ц/га	4,3	5,2	4,1
Гарантована прибавка, %	7	7	5
Днів до достигання	111	120	123
Збиральна вологість зерна, %	19,6	22,6	23,1

Вихід зерна при обмолоті, %	81	76	77
Стійкість до, бал			
посухи	8	9	9
полягання	9	9	9
пухирчастої сажки	9	9	9
Вміст, %			
білку	9,4	9,2	9,8
крохмалю	71,6	72,3	73,5

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп, Полісся

Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.

Заявка №: 10004234 Назва сорту ЛГ30310

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

06.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140163

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	помірно похиле	5
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	середній	5
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабе	1
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	відсутнє або дуже слабе	1
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	довга	7
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	середня	5
27	Качан: ніжка за довжиною	довга	7
28	Качан: за довжиною	середній	5
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	зубоподібний	4
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовто-оранжевий	4
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	червоно-оранжевий	6
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	С	Значення Л	П
Урожайність, ц/га	68,1	77,2	
Гарантована прибавка, ц/га	4,6	-2,6	
Гарантована прибавка, %	7	-3	
Днів до достигання	118	125	
Збиральна вологість зерна, %	19,5	22,7	

Вихід зерна при обмолоті	80	77
Стійкість до, бал		
посухи	8	8
полягання	9	9
пухирчастої сажки	9	9
Вміст, %		
білку	10,0	10,1
крохмалю	71,0	71,3

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ

Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.

Заявка №: 10004232 Назва сорту ЛГ30360

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

06.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140162

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	від округлої до лопатоподібної	4
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	середній	5
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	великий	7
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	помірно похиле	5
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	дуже довга	9
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	середня	5
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5
28	Качан: за довжиною	середній	5
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	зубовий	5
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовто-оранжевий	4
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	оранжевий	5
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	слабке	3

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	С	Значення Л	П
Урожайність, ц/га	64,2	83,9	
Гарантована прибавка, ц/га	0,7	4,1	
Гарантована прибавка, %	1	5	
Днів до достигання	118	126	
Збиральна вологість зерна, %	19,7	23,6	

Вихід зерна при обмолоті	80	77
Стійкість до, бал		
посухи	8	9
полягання	9	9
пухирчастої сажки	9	9
Вміст, %		
білку	9,5	9,9
крохмалю	73,5	74,2

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп

Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.

Заявка №: 10004048

Назва сорту МАС 23К

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

17.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140323

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	від дуже раннього до раннього	2
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	сильне	7
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	ранній	3
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	сильне	7
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	дуже сильне	9
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	довга	7
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	середня	5
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5
28	Качан: за довжиною	середній	5
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	оранжевий	5
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	оранжевий	5
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	С	Значення Л	П
Урожайність, ц/га	64,6	78,5	80,7
Гарантована прибавка, ц/га	5,4	1,5	1,6
Гарантована прибавка, %	9	2	2
Днів до достигання	110	112	124
Збиральна вологість зерна, %	19,4	19,9	23,0

Вихід зерна при обмолоті, %	78	79	79
Стійкість до, бал			
посухи	8	9	8
полягання	9	9	9
пухирчастої сажки	9	9	9
Вміст, %			
білку	9,7	9,3	9,6
крохмалю	71,7	73,5	73,3

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ

Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.

Заявка №: 10004046

Назва сорту МАС 25Т

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

06.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140157

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	від дуже раннього до раннього	2
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	сильне	7
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	ранній	3
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	сильне	7
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	дуже довга	9
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	середня	5
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5
28	Качан: за довжиною	середній	5
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	оранжевий	5
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	оранжевий	5
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	С	Значення Л	П
Урожайність, ц/га	64,9	88,7	86
Гарантована прибавка, ц/га	5,7	11,7	6,9
Гарантована прибавка, %	9,6	15	8,7
Днів до достигання	110	116	124
Збиральна вологість зерна, %	20,2	21,0	23,6

Вихід зерна при обмолоті, %	77	77	79
Стійкість до, бал			
посухи	8	9	9
полягання	9	9	9
пухирчастої сажки	9	9	9
Вміст, %			
білку	10,2	10,3	9,8
крохмалю	72,2	72,8	73,2

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп, Полісся

Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.

Заявка №: 10004047

Назва сорту МАС 26Б

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

17.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140322

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
8	Волоть: час цвітіння	від дуже раннього до раннього	2
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	сильне	7
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	ранній	3
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7
18	Волоть: щільність розташування колосків	нещільне	3
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	довга	7
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	середня	5
27	Качан: ніжка за довжиною	довга	7
28	Качан: за довжиною	середній	5
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	оранжевий	5
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	оранжевий	5
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	С	Значення Л	П
Урожайність, ц/га	61,7	90,1	81,7
Гарантована прибавка, ц/га	2,5	13,1	2,6
Гарантована прибавка, %	4	17,0	3,3
Днів до достигання	111	116	124
Збиральна вологість зерна, %	22,0	22,1	24,4

Вихід зерна при обмолоті, %	75	78	76
Стійкість до, бал			
посухи	8	9	8
полягання	9	9	9
пухирчастої сажки	9	9	9
Вміст, %			
білку	10,2	10,3	10,3
крохмалю	71,5	74,1	72,0

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп

Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.

Заявка №: 10004043

Назва сорту МАС 41Б

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

06.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140156

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	дуже сильне	9
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	середній	5
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	середній	5
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	дуже довга	9
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	середня	5
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	середній	5
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	зубовий	5
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовтий	3
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	жовто-оранжевий	4
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	69,8		
Гарантована прибавка, ц/га	12,8		
Гарантована прибавка, %	22		
Днів до достигання	124		
Збиральна вологість зерна, %	21,8		

Вихід зерна при обмолоті	80
Стійкість до, бал	
посухи	8
полягання	9
пухирчастої сажки	9
Вміст, %	
білку	9,6
крохмалю	73,1

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ

Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.

Заявка №: 10004042

Назва сорту МАС 53Б

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

06.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140155

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	від округлої до лопатоподібної	4
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	середній	5
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	дуже довга	9
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	середня	5
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5
28	Качан: за довжиною	середній	5
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	зубовий	5
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовтий	3
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	жовто-оранжевий	4
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	слабке	3

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	67,3		
Гарантована прибавка, ц/га	10,3		
Гарантована прибавка, %	18		
Днів до достигання	126		
Збиральна вологість зерна, %	24,0		

Вихід зерна при обмолоті	80
Стійкість до, бал	
посухи	8
полягання	9
пухирчастої сажки	9
Вміст, %	
білку	9,8
крохмалю	73,0

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ

Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.

Заявка №: 10004104 Назва сорту НС 2032

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 03.11.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

15.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140326

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	середня кількість	5
15	Качан: час появи шовку	середній	5
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	середнє	5
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	довга	7
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	середня	5
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5
28	Качан: за довжиною	короткий	3
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	зубовий	5
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовтий	3
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	оранжевий	5
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	дуже сильне	9

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	С	Значення Л	П
Урожайність, ц/га	58,9	82,1	77,4
Гарантована прибавка, ц/га	0	5,1	-1,7
Гарантована прибавка, %	0	6,6	-2
Днів до достигання	112	118	124
Збиральна вологість зерна, %	20,8	20,8	22,5

Вихід зерна при обмолоті	78	80	80
Стійкість до, бал			
посухи	8	9	8
полягання	9	9	8
пухирчастої сажки	9	9	9
Вміст, %			
білку	10,3	10,2	9,7
крохмалю	72	72,5	72,6

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп

Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.

Заявка №: 10004105 Назва сорту НС 2610

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 03.11.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

17.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140327

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	дуже сильне	9
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	від дуже раннього до раннього	2
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	ранній	3
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	дуже сильне	9
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	довга	7
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	середня	5
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	середній	5
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовтий	3
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	оранжевий	5
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	С	Значення Л	П
Урожайність, ц/га	59	80,6	81,8
Гарантована прибавка, ц/га	0	3,6	2,7
Гарантована прибавка, %	0	5	3,5
Днів до достигання	111	116	124
Збиральна вологість зерна, %	20,3	22,4	24,8

Вихід зерна при обмолоті, %	77	77	78
Стійкість до, бал			
посухи	8	9	8
полягання	9	9	9
пухирчастої сажки	9	9	9
Вміст, %			
білку	9,8	10,0	9,4
крохмалю	73,0	72,0	73,7

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп

Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.

Заявка №: 10004106

Назва сорту НС 2612

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 03.11.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

14.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140328

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	темне	3
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	помірно похиле	5
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	від дуже раннього до раннього	2
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	сильне	7
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	від дуже раннього до раннього	2
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	дуже сильне	9
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	довга	7
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	середня	5
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5
28	Качан: за довжиною	середній	5
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	зубоподібний	4
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовтий	3
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	оранжевий	5
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	С	Значення Л	П
Урожайність, ц/га	63	77,8	76,7
Гарантована прибавка, ц/га	3,8	0,8	-2,4
Гарантована прибавка, %	6,4	1	-3
Днів до достигання	111	115	124
Збиральна вологість зерна, %	20,8	21,4	24,0

Вихід зерна при обмолоті	77	74	78
Стійкість до, бал			
посухи	8	9	8
полягання	9	9	9
пухирчастої сажки	9	9	9
Вміст, %			
білку	9,9	9,5	9,4
крохмалю	72,5	71,8	74,3

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ

Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.

Заявка №: 10004103 Назва сорту НС 2622

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 03.11.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

14.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140325

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	темне	3
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	середня кількість	5
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	довга	7
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	середня	5
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5
28	Качан: за довжиною	короткий	3
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	зубовий	5
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовтий	3
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	оранжевий	5
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	С	Значення Л	П
Урожайність, ц/га	57,9	73,1	82,8
Гарантована прибавка, ц/га	-1,3	-3,9	3,7
Гарантована прибавка, %	-2	-5	5
Днів до достигання	121	115	124
Збиральна вологість зерна, %	19,5	20,2	22,5

Вихід зерна при обмолоті	78	77	79
Стійкість до, бал			
посухи	8	9	9
полягання	9	9	9
пухирчастої сажки	9	9	9
Вміст, %			
білку	10,6	10,4	9,8
крохмалю	71,4	72,8	73

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Полісся

Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.

Заявка №: 10004292 Назва сорту Окато

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 14.12.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

03.03.2014

Свідчення про державну реєстрацію № 140040

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	дуже сильне	9
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	помірне	5
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мало	1
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	середнє	5
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	довга	7
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	середня	5
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5
28	Качан: за довжиною	середній	5
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	оранжевий	5
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	оранжевий	5
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабе	1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	С	Значення Л	П
Урожайність, ц/га	63,6	82,2	77
Гарантована прибавка, ц/га	4,4	5,2	-2,1
Гарантована прибавка, %	7	7	-3
Днів до достигання	111	116	124
Збиральна вологість зерна, %	18,9	20,2	22,6

Вихід зерна при обмолоті, %	78	79	78
Стійкість до, бал			
посухи	9	8	8
полягання	9	9	9
пухирчастої сажки	9	9	9
Вміст, %			
білку	10,2	10,3	10,0
крохмалю	72,5	72,5	71,5

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп

Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.

Заявка №: 10004052 Назва сорту Пріоріті

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

17.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140324

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабе	3
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	великий	7
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	середній	5
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабе	1
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабе	3
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	дуже довга	9
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	середня	5
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5
28	Качан: за довжиною	середній	5
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	зубоподібний	4
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовто-оранжевий	4
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	оранжевий	5
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	ознака не визначалась	0

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	С	Значення Л	П
Урожайність, ц/га	64,8	89,5	
Гарантована прибавка, ц/га	1,9	9,7	
Гарантована прибавка, %	2	12	
Днів до достигання	119	123	
Збиральна вологість зерна, %	20,8	21,2	

Вихід зерна при обмолоті, %	80	78
Стійкість до, бал		
посухи	8	9
полягання	9	9
пухирчастої сажки	9	9
Вміст, %		
білку	10,0	9,8
крохмалю	73,3	74,4

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп

Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.

Заявка №: 10004280

Назва сорту СИ Аладіум

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 03.12.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

03.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140035

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	дуже сильне	9
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	помірне	5
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	середній	5
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	довга	7
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	середня	5
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5
28	Качан: за довжиною	короткий	3
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	зубовий	5
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовтий	3
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	жовто-оранжевий	4
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	С	Значення Л	П
Урожайність, ц/га	66,5	86,5	90,7
Гарантована прибавка, ц/га	7,3	9,5	11,6
Гарантована прибавка, %	12,3	12	14,6
Днів до достигання	112	116	125
Збиральна вологість зерна, %	18,7	20,6	23,2

Вихід зерна при обмолоті, %	79	77	81
Стійкість до, бал			
посухи	8	9	9
полягання	9	9	9
пухирчастої сажки	9	9	9
Вміст, %			
білку	9,8	9,6	9,6
крохмалю	72,5	73,4	73,6

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп, Полісся

Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.

Заявка №: 10004286

Назва сорту СИ Батанга

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 03.12.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

03.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140038

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	середній	5
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	довга	7
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	середня	5
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	короткий	3
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	зубовий	5
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовтий	3
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	жовто-оранжевий	4
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	С	Значення Л	П
Урожайність, ц/га	60	83,9	
Гарантована прибавка, ц/га	-3,5	4,1	
Гарантована прибавка, %	-5	5	
Днів до достигання	119	123	
Збиральна вологість зерна, %	19,5	21,5	

Вихід зерна при обмолоті	80	78
Стійкість до, бал		
посухи	8	8
полягання	9	9
пухирчастої сажки	9	9
Вміст, %		
білку	9,2	9,4
крохмалю	73,6	72,5

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп

Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.

Заявка №: 10004282

Назва сорту СИ Дельван

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 03.12.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

03.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140036

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	темне	3
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	від дуже раннього до раннього	2
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	ранній	3
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	довга	7
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	середня	5
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5
28	Качан: за довжиною	короткий	3
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовто-оранжевий	4
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	жовто-оранжевий	4
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	ознака не визначалась	0

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	С	Значення Л	П
Урожайність, ц/га	66	76,4	76,9
Гарантована прибавка, ц/га	6,8	0,6	-2,2
Гарантована прибавка, %	11,5	0	-3
Днів до достигання	111	115	124
Збиральна вологість зерна, %	18,1	19,6	23,2

Вихід зерна при обмолоті, %	79	78	79
Стійкість до, бал			
посухи	8	8	8
полягання	9	9	9
пухирчастої сажки	9	9	9
Вміст, %			
білку	9,9	9,6	9,3
крохмалю	72,0	74,1	72,0

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ

Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.

Заявка №: 10004038

Назва сорту СИ Нікель

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 13.07.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

26.02.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140023

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	темне	3
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	помірне	5
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	сильне	7
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	середній	5
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	дуже довга	9
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	середня	5
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5
28	Качан: за довжиною	середній	5
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	зубовий	5
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовтий	3
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	жовто-оранжевий	4
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	С	Значення Л	П
Урожайність, ц/га	68,6	81,6	90,6
Гарантована прибавка, ц/га	9,4	4,6	11,5
Гарантована прибавка, %	16	6	14
Днів до достигання	110	118	123
Збиральна вологість зерна, %	20,0	22,4	22,4

Вихід зерна при обмолоті, %	79	78	79
Стійкість до, бал			
посухи	8	9	8
полягання	9	9	9
пухирчастої сажки	9	9	9
Вміст, %			
білку	9,4	10,3	9,0
крохмалю	72,7	74,4	72,8

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп, Полісся

Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.

Заявка №: 10004037

Назва сорту СИ Новатоп

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 13.07.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

03.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140022

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	великий	7
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	помірно похиле	5
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	дуже сильне	9
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	довга	7
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	середня	5
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5
28	Качан: за довжиною	короткий	3
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовтий	3
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	оранжевий	5
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	С	Значення Л	П
Урожайність, ц/га	62,6	84,4	86,2
Гарантована прибавка, ц/га	3,4	7,4	7,1
Гарантована прибавка, %	6	10	9
Днів до достигання	110	116	125
Збиральна вологість зерна, %	19,7	21,3	24,5

Вихід зерна при обмолоті, %	77	77	79
Стійкість до, бал			
посухи	8	9	9
полягання	9	9	9
пухирчастої сажки	9	9	9
Вміст, %			
білку	9,4	9,3	9,2
крохмалю	73,5	74,1	73,7

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп, Полісся

Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.

Заявка №: 10004039

Назва сорту СИ Ондіна

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 13.07.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

03.03.2014

Свідчення про державну реєстрацію № 140024

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7
18	Волоть: щільність розташування колосків	щільне	7
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	дуже довга	9
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	середня	5
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	короткий	3
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	зубоподібний	4
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	оранжевий	5
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	оранжевий	5
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	С	Значення Л	П
Урожайність, ц/га	71,3	89,5	80,0
Гарантована прибавка, ц/га	12,1	12,5	0,9
Гарантована прибавка, %	20	16,2	1
Днів до достигання	112	116	127
Збиральна вологість зерна, %	19,6	21,2	23,5

Вихід зерна при обмолоті, %	79	79	80
Стійкість до, бал			
посухи	8	9	9
полягання	9	9	9
пухирчастої сажки	9	9	9
Вміст, %			
білку	9,6	9,4	9,4
крохмалю	72,2	73,7	75,3

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп

Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.

Заявка №: 10004284

Назва сорту СИ Унітоп

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 03.12.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

03.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140037

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	від дуже раннього до раннього	2
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	ранній	3
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	довга	7
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	середня	5
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5
28	Качан: за довжиною	короткий	3
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	оранжевий	5
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	оранжевий	5
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	С	Значення Л	П
Урожайність, ц/га	64	75,6	82,1
Гарантована прибавка, ц/га	4,8	-1,4	3
Гарантована прибавка, %	8	-2	4
Днів до достигання	111	115	124
Збиральна вологість зерна, %	19,2	21,0	23,8

Вихід зерна при обмолоті, %	80	77	79
Стійкість до, бал			
посухи	8	8	8
полягання	9	9	9
пухирчастої сажки	9	9	9
Вміст, %			
білку	10,0	10,1	9,3
крохмалю	71,0	73,4	74,4

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ

Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.

Заявка №: 09004748

Назва сорту Сільвініо

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 01.12.2009

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

13.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140271

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	дуже ранній	1
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	сильне	7
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мало	1
15	Качан: час появи шовку	від дуже раннього до раннього	2
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
18	Волоть: щільність розташування колосків	нещільне	3
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	довга	7
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5
28	Качан: за довжиною	короткий	3
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	оранжевий	5
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	оранжевий	5
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабе	1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	С	Значення Л	П
Урожайність, ц/га	59,2	75,4	83,1
Гарантована прибавка, ц/га	0	-2	4
Гарантована прибавка, %	0	-3	5
Днів до достигання	109	113	122
Збиральна вологість зерна, %	18,0	19,3	23,2

Вихід зерна при обмолоті, %	79	76	77
Стійкість до, бал			
посухи	8	8	8
полягання	9	9	9
пухирчастої сажки	9	9	9
Вміст, %			
білку	10,0	10,0	9,5
крохмалю	73,2	71,8	73,4

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Полісся

Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.

Заявка №: 09004734

Назва сорту СЛ Багато

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 30.11.2009

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

26.02.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140021

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	дуже довга	9
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	довга	7
28	Качан: за довжиною	короткий	3
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	зубоподібний	4
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовто-оранжевий	4
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	оранжевий	5
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	С	Значення Л	П
Урожайність, ц/га	59,4	80,5	81
Гарантована прибавка, ц/га	0,2	3,5	1,9
Гарантована прибавка, %	1	5	2,4
Днів до достигання	112	117	125
Збиральна вологість зерна, %	19,4	20,7	23,0

Вихід зерна при обмолоті, %	79	79	81
Стійкість до, бал			
посухи	8	8	8
полягання	9	9	9
пухирчастої сажки	9	9	9
Вміст, %			
білку	9,6	9,4	9,8
крохмалю	76,3	74,6	74,6

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп

Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.

Заявка №: 10004251 Назва сорту Сумбра

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 30.11.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

03.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140032

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
8	Волоть: час цвітіння	середній	5
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3
18	Волоть: щільність розташування колосків	щільне	7
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	дуже довга	9
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	середня	5
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	середній	5
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	зубовий	5
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовто-оранжевий	4
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	оранжевий	5
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	61		
Гарантована прибавка, ц/га	4		
Гарантована прибавка, %	7		
Днів до достигання	125		
Збиральна вологість зерна, %	22,9		

Вихід зерна при обмолоті	79
Стійкість до, бал	
посухи	8
полягання	9
пухирчастої сажки	9
Вміст, %	
білку	10,0
крохмалю	73,6

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ

Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.

Заявка №: 10004248

Назва сорту Сурреал

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 30.11.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

03.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140031

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	дуже довга	9
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	середня	5
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5
28	Качан: за довжиною	короткий	3
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	зубовий	5
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовто-оранжевий	4
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	оранжевий	5
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	С	Значення Л	П
Урожайність, ц/га	59,8	85,8	
Гарантована прибавка, ц/га	-3,7	6	
Гарантована прибавка, %	-5	8	
Днів до достигання	118	124	
Збиральна вологість зерна, %	20,9	22,1	

Вихід зерна при обмолоті	80	78
Стійкість до, бал		
посухи	8	9
полягання	9	9
пухирчастої сажки	9	9
Вміст, %		
білку	9,3	9,8
крохмалю	75,2	73,7

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп

Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.

Заявка №: 10004111 Назва сорту Тессалі

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 10.11.2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

17.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140329

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	великий	7
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	відсутнє або дуже слабке	1
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	дуже довга	9
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	середня	5
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5
28	Качан: за довжиною	середній	5
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	зубовий	5
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовто-оранжевий	4
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	оранжевий	5
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	слабке	3

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	С	Значення Л	П
Урожайність, ц/га	66,8	86,8	
Гарантована прибавка, ц/га	3,3	7	
Гарантована прибавка, %	5,2	9	
Днів до достигання	118	125	
Збиральна вологість зерна, %	20,5	22,9	

Вихід зерна при обмолоті, %	79	77
Стійкість до, бал		
посухи	8	8
полягання	9	9
пухирчастої сажки	9	9
Вміст, %		
білку	9,4	9,4
крохмалю	74,0	73,1

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп

Вид: Люпин вузьколистий *Lupinus angustifolius* L.

Заявка №: 09056001 **Назва сорту** Грозинський 9

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 04.12.2013 **Патент №:** 130260

Дата пріоритету 17.11.2009

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

04.12.2013

Свідоцтво про державну реєстрацію № 130502

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Зерно: гірка речовина	відсутня	1
2	Рослина: за висотою у вегетативній стадії	висока	7
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення (у фазі бутонізації)	помірне	5
4	Стебло: антоціанове забарвлення (у фазі бутонізації)	відсутнє або дуже слабке	1
5	Час початку цвітіння	середній	5
6	Рослина: за висотою у фазі початку цвітіння	низька	3
7	Центральний листок: за довжиною	ознака не визначалась	0
8	Центральний листок: за шириною	ознака не визначалась	0
9	Квітка: колір крил	синовато-білий	2
10	Квітка: забарвлення кінчика човника	жовте	1
11	Рослина: тип росту	детермінантний	1
12	Біб: час настання зеленої стиглості	середній	5
13	Рослина: за висотою прикріплення першого суцвіття, за зеленої стиглості (від поверхні ґрунту до першого суцвіття)	ознака не визначалась	0
14	Рослина: за висотою у зеленій стиглості	низька	3
15	Біб: за довжиною	довгий	7
16	Час достигання	середній	5
17	Зерно: орнаментация	наявна	9
18	Зерно: забарвлення орнаментации	ознака не визначалась	0
19	Зерно: розподіл орнаментации	ознака не визначалась	0
20	За винятком сортів з бровою. Зерно: щільність орнаментации	ознака не визначалась	0
21	Зерно: маса 100 шт.	велика	7

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	С	Значення Л	П
Уражайність сухої речовини, ц/га		45,5	57,4
Гарантована прибавка, ц/га		6,7	11,2
%		17	24
Урожайність насіння, ц/га		21,1	19,8
Вегетаційний період, діб		58	66
Стійкість бал, до вилягання		9,0	8,5
осипання		8,9	8,0
посухи		8,3	7,9
антракнозу		9,0	9,0
фузаріозу		9,0	9,0
бактеріальної плямистості		9,0	9,0
Залистяність, %		59,8	56,3
Вміст сирого протеїну, %		22,4	21,8
Напрямок використання		кормов.	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп, Полісся

Вид: Пшениця м'яка (яра) *Triticum aestivum* L.
Заявка №: 10007048 **Назва сорту** Улюблена

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 05.11.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

13.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140294

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеоптиль: ступінь антоціанового забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
2	Рослина: форма куща (габітус)	напівпрямостоячий	3
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1
4	Рослина: наявність зігнутого прапорцевого листка	помірно	5
5	Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середнє	5
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний	5
7	Колос: восковий наліт	сильний	7
8	Соломина : восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу і найближчим вузлом)	слабо виповнена	3
11	Колос: форма (вигляд збоку)	циліндрична	2
12	Колос: за щільністю	нещільний	3
13	Колос: за довжиною	довгий	7
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2
15	Колос: довжина зубців / остюків на верхівці	середні	5
16	Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий	1
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	слабке	3
18	Нижня колоскова луска: ширина плеча (колосок в середині колоса)	вузьке	3
19	Нижня колоскова луска : форма плеча	скошене	1
20	Нижня колоскова луска: довжина зубця	короткий	3
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3
23	Нижня квітова луска першої квітки: форма зубця	ледь зігнутий	2
24	Зернівка: колір	червоний	2
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	темне	7
26	Тип розвитку	ярий	3
27	Зернівка: за довжиною	коротка	3
28	Зернівка: за шириною	середня	5
29	Зернівка: відношення довжина/ ширина	середнє	5
30	Зернівка: за крупністю	середня	5
31	Язичок: виявлення	короткий	3
32	Нижня квітова луска: киль	відсутній	1
33	Вушка: за формою	гострі	2
34	Колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колосу)	овально-ланцетна	3

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	С	Значення Л	П
Урожайність, ц/га	20,9	32,9	31,7
+, - до стандарту:			
ц/га	3,3	-0,7	-0,5
%	18,8	-2,1	-1,6
Вегетаційний період, днів	82	83	93
Висота рослин, см	70	85	88
Маса 1000 зерен, г	33,3	36,0	38,5
Стійкість до, бал:			
вилягання	8,8	8,9	8,6
осипання	9,0	9,0	8,8
посухи	6,3	7,4	8,0
борошнистої роси	9,0	9,0	9,0
бурої іржі	9,0	9,0	9,0
фузаріозу	9,0	9,0	9,0
Якість:			
вміст білка, %	15,5	13,8	13,8
вміст клейковини, %	31,7	29,9	30,2

W, о. а.	256	217	202
об'єм хліба з 100 г борошна, г	1000	900	870
Напрям використання	ц	ц	ф

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ

Вид: Ріпак (ярий) *Brassica napus* L. *oleifera*
Заявка №: 10016070 **Назва сорту** Ахат

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 01.12.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

12.03.2014

Свідчення про державну реєстрацію № 140353

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1
2	Сім'ядоля: за довжиною	довга	7
3	Сім'ядоля: за шириною	широка	7
4	Листок: інтенсивність зеленого кольору	помірний	5
5	Листок: наявність часток	наявні	9
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня кількість	5
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	довгий	7
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5
10	Сорти тільки з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середній	5
11	Рослина: час цвітіння	ранній	3
12	Квітка: колір пелюсток	жовтий	3
13	Квітка: довжина пелюсток	короткі	3
14	Квітка: ширина пелюсток	вузькі	3
15	Рослина: утворення пилку	відсутнє	1
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7
17	Рослина: загальна довжина (бічні пагони включно)	середня	5
18	Стручок: за довжиною (між ніжкою і зубцем)	довгий	7
19	Стручок: довжина зубця	короткий	3
20	Стручок: довжина ніжки	середня	5
21	Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби	ознака не визначається	0
22	Тенденція формування суцвіття в рік пізньолітньої сівби	відсутня або дуже слабка	1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	14,7	18,3	21,1
Прибавка до національного стандарту, ц/га	-0,1	0,6	1,3
Прибавка до національного стандарту, %	-0,5	3,6	6,7
Прибавка до умовного стандарту, ц/га	1,8	-3,6	6,0
Прибавка до умовного стандарту, %	14	-16	12
Стійкість до, бал: - вилягання	9,0	8,8	8,9
-посухи	7,4	6,0	8,8
-осипання	7,0	7,0	7,6
-ріпакового квіткоїду	7,8	7,7	8,5
-бактеріозу	9,0	9,0	9,0
-пероноспорозу	9,0	9,0	8,4
Вміст олії, %	44,6	43,1	45,4
Вміст білку, %	26,8	25,3	24,0
Вміст ерукової кислоти, %	0,1	0,0	0,0
Вміст глюкозинолатів, %	0,8	0,7	0,8
Тип по якості		00	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп, Полісся

Вид: Ріпак (ярий) Brassica napus L. oleifera

Заявка №: 08016061 Назва сорту Лунеді

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

07.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140227

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: ерукова кислота	ознака не визначалась	0
2	Сім'ядоля: за довжиною	довга	7
3	Сім'ядоля: за шириною	широка	7
4	Листок: інтенсивність зеленого кольору	помірний	5
5	Листок: наявність часток	наявні	9
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня кількість	5
7	Листок: зубчастість краю	слабка	3
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	вузький	3
10	Сорти тільки з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середній	5
11	Рослина: час цвітіння	ранній	3
12	Квітка: колір пелюсток	жовтий	3
13	Квітка: довжина пелюсток	короткі	3
14	Квітка: ширина пелюсток	вузькі	3
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7
17	Рослина: загальна довжина (бічні пагони включно)	середня	5
18	Стручок: за довжиною (між ніжкою і зубцем)	довгий	7
19	Стручок: довжина зубця	середній	5
20	Стручок: довжина ніжки	середня	5
21	Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби	ознака не визначається	0
22	Тенденція формування суцвіття в рік пізньолітньої сівби	ознака не визначається	0

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	14,6	22,7	21,8
Прибавка до національного стандарту, ц/га	2,1	4,0	3,2
Прибавка до національного стандарту, %	17,1	21,1	17,2
Прибавка до умовного стандарту, ц/га	1,1	0,2	2,0
Прибавка до умовного стандарту, %	8	1	10
Стійкість до, бал: - вилягання	9,0	8,3	9,0
-посухи	7,1	7,5	8,6
-осипання	7,7	7,0	7,4
-ріпакового квіткоїду	8,9	9,0	8,6
-бактеріозу	9,0	9,0	9,0
-пероноспорозу	9,0	9,0	8,9
Вміст жиру, %	42,5	44,1	40,2
Вміст білку, %	26,4	24,5	26,1
Вміст ерукової кислоти, %	0,1	0,1	0,2
Вміст глюкозинолатів, %	0,7	0,6	0,7
Тип по якості		00	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп, Полісся

Вид: Ріпак (ярий) Brassica napus L. oleifera
Заявка №: 10016069 Назва сорту Макро

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 01.12.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

12.03.2014

Свідчення про державну реєстрацію № 140295

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: ерукова кислота	ознака не визначалась	0
2	Сім'ядоля: за довжиною	довга	7
3	Сім'ядоля: за шириною	широка	7
4	Листок: інтенсивність зеленого кольору	помірний	5
5	Листок: наявність часток	наявні	9
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня кількість	5
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	довгий	7
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	вузький	3
10	Сорти тільки з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середній	5
11	Рослина: час цвітіння	ранній	3
12	Квітка: колір пелюсток	жовтий	3
13	Квітка: довжина пелюсток	короткі	3
14	Квітка: ширина пелюсток	середні	5
15	Рослина: утворення пилку	відсутнє	1
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7
17	Рослина: загальна довжина (бічні пагони включно)	середня	5
18	Стручок: за довжиною (між ніжкою і зубцем)	довгий	7
19	Стручок: довжина зубця	середній	5
20	Стручок: довжина ніжки	середня	5
21	Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби	ознака не визначається	0
22	Тенденція формування суцвіття в рік пізньолітньої сівби	відсутня або дуже слабка	1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	14,4	18,7	21,6
Прибавка до національного стандарту, ц/га	-0,4	1,0	1,8
Прибавка до національного стандарту, %	-2,5	5,8	9,3
Прибавка до умовного стандарту, ц/га	1,4	-3,2	1,7
Прибавка до умовного стандарту, %	11	-15	8
Стійкість до, бал: - вилягання	9,0	8,8	9,0
-посухи	7,2	6,5	8,8
-осипання	6,8	7,2	7,6
-ріпакового квіткоїду	7,2	8,3	8,0
-бактеріозу	9,0	9,0	9,0
-пероноспорозу	9,0	9,0	8,4
Вміст олії, %	44,6	43,5	44,8
Вміст білку, %	26,8	25,8	24,3
Вміст ерукової кислоти, %	0,1	0,0	0,1
Вміст глюкозинолатів, %	0,6	0,8	0,8
Тип по якості		00	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп, Полісся

Вид: Ріпак (ярий) *Brassica napus* L. *oleifera*
Заявка №: 10016060 **Назва сорту** Хіола 433

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 26.11.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

26.02.2014

Свідчення про державну реєстрацію № 140406

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: ерукова кислота	ознака не визначалась	0
2	Сім'ядоля: за довжиною	довга	7
3	Сім'ядоля: за шириною	широка	7
4	Листок: інтенсивність зеленого кольору	помірний	5
5	Листок: наявність часток	наявні	9
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	мало	3
7	Листок: зубчастість краю	слабка	3
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	короткий	3
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	вузький	3
10	Сорти тільки з часточковими листками. Листок: довжина черешка	короткий	3
11	Рослина: час цвітіння	ранній	3
12	Квітка: колір пелюсток	жовтий	3
13	Квітка: довжина пелюсток	короткі	3
14	Квітка: ширина пелюсток	середні	5
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5
17	Рослина: загальна довжина (бічні пагони включно)	коротка	3
18	Стручок: за довжиною (між ніжкою і зубцем)	довгий	7
19	Стручок: довжина зубця	середній	5
20	Стручок: довжина ніжки	коротка	3
21	Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби	ознака не визначається	0
22	Тенденція формування суцвіття в рік пізньолітньої сівби	відсутня або дуже слабка	1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	15,6	19,9	19,9
Прибавка до національного стандарту, ц/га	0,8	2,2	0,1
Прибавка до національного стандарту, %	5,6	12,6	0,7
Прибавка до умовного стандарту, ц/га	2,6	-2,0	0,0
Прибавка до умовного стандарту, %	20	-9	0
Стійкість до, бал: - вилягання	9,0	8,8	8,8
-посухи	6,6	6,9	8,8
-осипання	7,1	7,0	7,4
-ріпакового квіткоїду	6,9	8,7	7,7
-бактеріозу	9,0	9,0	9,0
-пероноспорозу	9,0	9,0	8,4
Вміст олії, %	44,0	43,9	44,6
Вміст білку, %	25,7	24,3	23,1
Вміст ерукової кислоти, %	0,1	0,1	0,1
Вміст глюкозинолатів, %	0,9	0,8	0,7
Тип по якості		00	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп

Вид: Ріпак (ярий) Brassica napus L. oleifera
Заявка №: 09016183 Назва сорту Хіола 571 КЛ

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

27.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140404

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: ерукова кислота	ознака не визначалась	0
2	Сім'ядоля: за довжиною	довга	7
3	Сім'ядоля: за шириною	широка	7
4	Листок: інтенсивність зеленого кольору	помірний	5
5	Листок: наявність часток	наявні	9
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня кількість	5
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5
10	Сорти тільки з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середній	5
11	Рослина: час цвітіння	ранній	3
12	Квітка: колір пелюсток	жовтий	3
13	Квітка: довжина пелюсток	короткі	3
14	Квітка: ширина пелюсток	вузькі	3
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5
17	Рослина: загальна довжина (бічні пагони включно)	коротка	3
18	Стручок: за довжиною (між ніжкою і зубцем)	середній	5
19	Стручок: довжина зубця	короткий	3
20	Стручок: довжина ніжки	середня	5
21	Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби	ознака не визначається	0
22	Тенденція формування суцвіття в рік пізньолітньої сівби	відсутня або дуже слабка	1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	15,1	19,1	19,6
Прибавка до національного стандарту, ц/га	0,3	1,4	-0,2
Прибавка до національного стандарту, %	2,3	8,1	-0,8
Прибавка до умовного стандарту, ц/га	2,1	-2,8	-0,3
Прибавка до умовного стандарту, %	16	-13	-2
Стійкість до, бал: - вилягання	9,0	8,8	9,0
-посухи	6,8	6,9	8,8
-осипання	6,9	6,8	7,4
-ріпакового квіткоїду	6,8	9,0	8,5
-бактеріозу	9,0	9,0	9,0
-пероноспорозу	9,0	9,0	9,0
Вміст олії, %	43,1	42,8	43,2
Вміст білку, %	26,8	25,0	24,4
Вміст ерукової кислоти, %	0,1	0,1	0,1
Вміст глюкозинолатів, %	0,8	0,7	0,8
Тип по якості		00	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп

Вид: Ріпак (ярий) *Brassica napus* L. *oleifera*
Заявка №: 09016184 **Назва сорту** Хіюла 61

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

27.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140405

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: ерукова кислота	ознака не визначалась	0
2	Сім'ядоля: за довжиною	середня	5
3	Сім'ядоля: за шириною	широка	7
4	Листок: інтенсивність зеленого кольору	темний	7
5	Листок: наявність часток	наявні	9
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	мало	3
7	Листок: зубчастість краю	слабка	3
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	короткий	3
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	вузький	3
10	Сорти тільки з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середній	5
11	Рослина: час цвітіння	ранній	3
12	Квітка: колір пелюсток	жовтий	3
13	Квітка: довжина пелюсток	короткі	3
14	Квітка: ширина пелюсток	вузькі	3
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5
17	Рослина: загальна довжина (бічні пагони включно)	коротка	3
18	Стручок: за довжиною (між ніжкою і зубцем)	середній	5
19	Стручок: довжина зубця	короткий	3
20	Стручок: довжина ніжки	середня	5
21	Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби	ознака не визначається	0
22	Тенденція формування суцвіття в рік пізньолітньої сівби	відсутня або дуже слабка	1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	14,6	19,8	19,5
Прибавка до національного стандарту, ц/га	-0,2	2,1	-0,3
Прибавка до національного стандарту, %	-1,1	12,1	-1,3
Прибавка до умовного стандарту, ц/га	1,7	-2,1	-0,5
Прибавка до умовного стандарту, %	13	-10	-2
Стійкість до, бал: - вилягання	9,0	8,8	8,8
-посухи	6,4	6,8	8,8
-осипання	7,0	7,2	7,6
-ріпакового квіткоїду	6,9	9,0	7,8
-бактеріозу	9,0	9,0	9,0
-пероноспорозу	9,0	9,0	8,4
Вміст олії, %	44,0	42,6	44,1
Вміст білку, %	27,7	25,4	24,0
Вміст ерукової кислоти, %	0,1	0,2	0,1
Вміст глюкозинолатів, %	0,8	0,9	0,6
Тип по якості		00	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка №: 10017197 Назва сорту 8X570КЛ

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 30.11.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

03.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140083

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: аноціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3
3	Листок: за розміром	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	темне	7
5	Листок: пухирчастість	помірна	5
6	Листок: зубці	грубі	7
7	Листок: форма у поперечному перерізі	сильно увігнута	1
8	Листок: форма верхівки	загострена	8
9	Листок: наявність вушок	великі	7
10	Листок: крила	відсутні або слабо виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	відсутня або дуже слабка	1
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: за щільністю	щільні	7
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцевидні	2
17	Язичкові квітки: за положенням	плескаті	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: за кольором	помірно жовті	3
20	Трубчасті квітки: за кольором	оранжеві	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначалась	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Зовнішні листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1
25	Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки	середня	5
26	Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку	помірний	5
27	Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або злегка охоплює	1
28	Рослина: за природною висотою	дуже низька	1
29	Рослина: галушення (за винятком галушення, викликаного умовами середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галушення (як для 29)	ознака не визначалась	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначалась	0
32	Кошик: положення	напівобернене донизу разом із стеблом	5
33	Кошик: розмір	середній	5
34	Кошик: форма з боку сім'янок	злегка випукла	4
35	Сім'янка: за розміром	середня	5
36	Сім'янка: за формою	вузькоюйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: за основним кольором	чорна	7
39	Сім'янка: смугастість на краях	відсутня або дуже слабка	1
40	Сім'янка: смугастість між краями	відсутня або дуже слабка	1
41	Сім'янка: колір смужок	сірий	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість до вовчка (<i>Orobanche cumana</i> , раса E)	стійкий	1
44	Стійкість до <i>Plasmodiophora Halstedii</i>	відсутня	1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	С	Значення Л	П
Урожайність, ц/га	21,1	23,2	
Гарантована різниця, ц/га	-1,5	0,6	
Гарантована різниця, %	-6,6	3	
Стійкість до вилягання, бал	9	8,7	

Діаметр кошика, см.	17,1	18,2
Маса 1000 сім'янок, г.	50,9	50,0
Стійкість до ураження, бал		
гнилями	8,7	8,3
вовчком	8,7	9
Вихід олії кг/га	1267	1380
Вміст, %		
жиру	54,2	54,8
білку	15,7	15,4

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка №: 08017105 Назва сорту Аміго

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

17.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140364

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: аноціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
3	Листок: за розміром	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	дрібні	3
7	Листок: форма у поперечному перерізі	слабко увігнута	2
8	Листок: форма верхівки	загострена	8
9	Листок: наявність вушок	великі	7
10	Листок: крила	відсутні або слабко виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	відсутня або дуже слабка	1
14	Час цвітіння	ранній	3
15	Язичкові квітки: за щільністю	щільні	7
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцевидні	2
17	Язичкові квітки: за положенням	плескаті	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: за кольором	помірно жовті	3
20	Трубчасті квітки: за кольором	оранжеві	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначалась	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Зовнішні листки обгортки: за формою	також чітко видовжені, але й чітко округлі	2
25	Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки	середня	5
26	Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку	помірний	5
27	Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за природною висотою	середня	5
29	Рослина: галузнення (за винятком галузнення, викликаного умовами середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галузнення (як для 29)	ознака не визначалась	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначалась	0
32	Кошик: положення	обернене донизу разом із сильним викривленням стебла	8
33	Кошик: розмір	великий	7
34	Кошик: форма з боку сім'янок	сильно випукла	5
35	Сім'янка: за розміром	велика	7
36	Сім'янка: за формою	широкояйцеподібна	3
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: за основним кольором	чорна	7
39	Сім'янка: смугастість на краях	дуже сильна	3
40	Сім'янка: смугастість між краями	відсутня або дуже слабка	1
41	Сім'янка: колір смужок	сірий	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість до вовчка (<i>Orobanche cumana</i> , раса E)	ознака не визначалась	0
44	Стійкість до <i>Plasmodiophora Halstedii</i>	ознака не визначалась	0

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	С	Значення Л	П
Урожайність, ц/га	25,3	27,1	
Гарантована різниця, ц/га	3,2	2,2	
Гарантована різниця, %	14	9	

Стійкість до вилягання, бал	9	9
Діаметр кошика, см.	16,6	18,7
Маса 1000 сім'янок, г.	58,3	59,7
Стійкість до ураження, бал		
гнилями	8,7	8,6
вовчком	8,9	9
Вихід олії кг/га	1406	1241
Вміст, %		
жиру	50,7	49,2
білку	16,3	17,1

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка №: 10017192 Назва сорту Батяня

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 30.11.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

13.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140299

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: аноціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3
3	Листок: за розміром	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	світле	3
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	дрібні	3
7	Листок: форма у поперечному перерізі	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6
9	Листок: наявність вушок	помірні	5
10	Листок: крила	слабо виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабка	3
14	Час цвітіння	ранній	3
15	Язичкові квітки: за щільністю	щільні	7
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцевидні	2
17	Язичкові квітки: за положенням	плескаті	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: за кольором	помірно жовті	3
20	Трубчасті квітки: за кольором	оранжеві	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначалась	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Зовнішні листки обгортки: за формою	також чітко видовжені, але й чітко округлі	2
25	Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки	середня	5
26	Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку	помірний	5
27	Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за природною висотою	середня	5
29	Рослина: галузнення (за винятком галузнення, викликаного умовами середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галузнення (як для 29)	ознака не визначалась	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначалась	0
32	Кошик: положення	напівобернене донизу разом із прямим стеблом	4
33	Кошик: розмір	маленький	3
34	Кошик: форма з боку сім'янок	сильно випукла	5
35	Сім'янка: за розміром	середня	5
36	Сім'янка: за формою	вузькояйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: за основним кольором	чорна	7
39	Сім'янка: смугастість на краях	слабка	2
40	Сім'янка: смугастість між краями	відсутня або дуже слабка	1
41	Сім'янка: колір смужок	сірий	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість до вовчка (<i>Orobanche cumana</i> , раса E)	стійкий	1
44	Стійкість до <i>Plasmodiophora Halstedii</i>	відсутня	1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	19,6	26,1	
Гарантована різниця, ц/га	-1,9	3	

Гарантована різниця, %	-8,8	13
Стійкість до вилягання, бал	8,9	8,8
Діаметр кошика, см.	16,8	18,5
Маса 1000 сім'янок, г.	48,6	58,1
Стійкість до ураження, бал		
гнилями	8,7	8,5
вовчком	8,8	9
Вихід олії кг/га	1149	1166
Вміст, %		
жиру	48,5	49,5
білку	18,6	18,2

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка №: 10017036 **Назва сорту** Босфора

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 02.08.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

03.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140078

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: аноціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3
3	Листок: за розміром	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
5	Листок: пухирчастість	відсутня або дуже слабка	1
6	Листок: зубці	помірні	5
7	Листок: форма у поперечному перерізі	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6
9	Листок: наявність вушок	помірні	5
10	Листок: крила	відсутні або слабо виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	відсутня або дуже слабка	1
14	Час цвітіння	ранній	3
15	Язичкові квітки: за щільністю	середньої щільності	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцевидні	2
17	Язичкові квітки: за положенням	зігнуті за довжиною	2
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: за кольором	помірно жовті	3
20	Трубчасті квітки: за кольором	оранжеві	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначалась	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Зовнішні листки обгортки: за формою	також чітко видовжені, але й чітко округлі	2
25	Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки	середня	5
26	Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку	помірний	5
27	Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за природною висотою	середня	5
29	Рослина: галузнення (за винятком галузнення, викликаного умовами середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галузнення (як для 29)	ознака не визначалась	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначалась	0
32	Кошик: положення	обернене донизу разом із легким викривленням стебла	7
33	Кошик: розмір	середній	5
34	Кошик: форма з боку сім'янок	злегка випукла	4
35	Сім'янка: за розміром	середня	5
36	Сім'янка: за формою	широкояйцеподібна	3
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: за основним кольором	чорна	7
39	Сім'янка: смугастість на краях	слабка	2
40	Сім'янка: смугастість між краями	відсутня або дуже слабка	1
41	Сім'янка: колір смужок	сірий	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість до вовчка (<i>Orobanche cumana</i> , раса E)	стійкий	1
44	Стійкість до <i>Plasmodiophora Halstedii</i>	відсутня	1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	24,4	28,0	
Гарантована різниця, ц/га	1,8	3,6	

Гарантована різниця, %	8	14,7
Стійкість до вилягання, бал	8,9	9
Діаметр кошика, см.	15,6	18,6
Маса 1000 сім'янок, г.	57,9	61,1
Стійкість до ураження, бал		
гнилями	8,7	8,1
вовчком	8,9	9
Вихід олії кг/га	1382	1279
Вміст, %		
жиру	49,2	48,2
білку	17,0	17,3

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.
Заявка №: 10017147 **Назва сорту** Венеція

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 25.11.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

28.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140420

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: аноціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3
3	Листок: за розміром	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
5	Листок: пухирчастість	відсутня або дуже слабка	1
6	Листок: зубці	окремі або дуже дрібні	1
7	Листок: форма у поперечному перерізі	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6
9	Листок: наявність вушок	помірні	5
10	Листок: крила	відсутні або слабо виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабка	3
14	Час цвітіння	ранній	3
15	Язичкові квітки: за щільністю	середньої щільності	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцевидні	2
17	Язичкові квітки: за положенням	плескаті	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: за кольором	помірно жовті	3
20	Трубчасті квітки: за кольором	оранжеві	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначалась	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Зовнішні листки обгортки: за формою	також чітко видовжені, але й чітко округлі	2
25	Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки	середня	5
26	Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку	помірний	5
27	Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за природною висотою	середня	5
29	Рослина: галузнення (за винятком галузнення, викликаного умовами середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галузнення (як для 29)	ознака не визначалась	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначалась	0
32	Кошик: положення	обернене донизу разом із легким викривленням стебла	7
33	Кошик: розмір	середній	5
34	Кошик: форма з боку сім'янок	плеската	3
35	Сім'янка: за розміром	середня	5
36	Сім'янка: за формою	вузькояйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: за основним кольором	чорна	7
39	Сім'янка: смугастість на краях	дуже сильна	3
40	Сім'янка: смугастість між краями	відсутня або дуже слабка	1
41	Сім'янка: колір смужок	сірий	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість до вовчка (<i>Orobanche cumana</i> , раса E)	стійкий	1
44	Стійкість до <i>Plasmodiophora Halstedii</i>	відсутня	1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	С	Значення Л	П
Урожайність, ц/га	22,9	26,4	
Гарантована різниця, ц/га	0,3	2	

Гарантована різниця, %	1,3	8,2
Стійкість до вилягання, бал	8,8	8,6
Діаметр кошика, см.	15,7	17,6
Маса 1000 сім'янок, г.	57,4	62,5
Стійкість до ураження, бал		
гнилями	8,6	8,1
вовчком	8,7	9
Вихід олії кг/га	1293	1207
Вміст, %		
жиру	42,0	40,0
білку	19,9	19,8

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, лісостеп

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка №: 10017171 Назва сорту ЕС Артїк

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 29.11.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

04.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140231

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: аноціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7
3	Листок: за розміром	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	темне	7
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	окремі або дуже дрібні	1
7	Листок: форма у поперечному перерізі	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	загострена	8
9	Листок: наявність вушок	великі	7
10	Листок: крила	відсутні або слабо виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	тупий	3
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабка	3
14	Час цвітіння	ранній	3
15	Язичкові квітки: за щільністю	середньої щільності	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцевидні	2
17	Язичкові квітки: за положенням	плескаті	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: за кольором	помірно жовті	3
20	Трубчасті квітки: за кольором	оранжеві	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначалась	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Зовнішні листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1
25	Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки	коротка	3
26	Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку	помірний	5
27	Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за природною висотою	середня	5
29	Рослина: галушення (за винятком галушення, викликаного умовами середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галушення (як для 29)	ознака не визначалась	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначалась	0
32	Кошик: положення	напівобернене донизу разом із стеблом	5
33	Кошик: розмір	середній	5
34	Кошик: форма з боку сім'янок	злегка випукла	4
35	Сім'янка: за розміром	середня	5
36	Сім'янка: за формою	широкоюйцеподібна	3
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: за основним кольором	чорна	7
39	Сім'янка: смугастість на краях	слабка	2
40	Сім'янка: смугастість між краями	відсутня або дуже слабка	1
41	Сім'янка: колір смужок	сірий	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість до вовчка (<i>Orobanche cumana</i> , раса E)	стійкий	1
44	Стійкість до <i>Plasmodiophora Halstedii</i>	відсутня	1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	С	Значення Л	П
Урожайність, ц/га	24,0	29,0	
Гарантована різниця, ц/га	1,4	4,6	
Гарантована різниця, %	6,2	19	
Стійкість до вилягання, бал	8,8	8,8	

Діаметр кошика, см.	16,2	19,4
Маса 1000 сім'янок, г.	56,3	60,4
Стійкість до ураження, бал		
гнилями	8,9	8,1
вовчком	8,9	8,9
Вихід олії кг/га	1585	1415
Вміст, %		
жиру	52,1	52,6
білку	16,3	16,1

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка №: 10017170 Назва сорту ЕС Балістік СЛ

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 29.11.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

04.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140230

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: аноціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7
3	Листок: за розміром	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
5	Листок: пухирчастість	відсутня або дуже слабка	1
6	Листок: зубці	дрібні	3
7	Листок: форма у поперечному перерізі	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	загострена	8
9	Листок: наявність вушок	помірні	5
10	Листок: крила	відсутні або слабо виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	відсутня або дуже слабка	1
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: за щільністю	середньої щільності	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцевидні	2
17	Язичкові квітки: за положенням	плескаті	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: за кольором	помірно жовті	3
20	Трубчасті квітки: за кольором	оранжеві	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначалась	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Зовнішні листки обгортки: за формою	також чітко видовжені, але й чітко округлі	2
25	Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки	середня	5
26	Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку	помірний	5
27	Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за природною висотою	середня	5
29	Рослина: галуження (за винятком галуження, викликаного умовами середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначалась	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначалась	0
32	Кошик: положення	напівобернене донизу разом із стеблом	5
33	Кошик: розмір	маленький	3
34	Кошик: форма з боку сім'янок	злегка випукла	4
35	Сім'янка: за розміром	середня	5
36	Сім'янка: за формою	вузькояйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: за основним кольором	сіра	3
39	Сім'янка: смугастість на краях	слабка	2
40	Сім'янка: смугастість між краями	відсутня або дуже слабка	1
41	Сім'янка: колір смужок	сірий	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	наявна	9
43	Стійкість до вовчка (<i>Orobanche cumana</i> , раса E)	стійкий	1
44	Стійкість до <i>Plasmodiophora Halstedii</i>	відсутня	1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	С	Значення Л	П
Урожайність, ц/га	23,9	28,6	
Гарантована різниця, ц/га	1,3	6	
Гарантована різниця, %	5,7	26,5	

Стійкість до вилягання, бал	9	9
Діаметр кошика, см.	16,0	18,5
Маса 1000 сім'янок, г.	57,5	66,0
Стійкість до ураження, бал		
гнилями	8,8	8,4
вовчком	8,7	9
Вихід олії кг/га		
Вміст, %		
жиру		
білку		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка №: 10017173 Назва сорту ЕС Бесана

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 29.11.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

04.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140233

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: аноціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3
3	Листок: за розміром	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
5	Листок: пухирчастість	відсутня або дуже слабка	1
6	Листок: зубці	дрібні	3
7	Листок: форма у поперечному перерізі	слабко увігнута	2
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6
9	Листок: наявність вушок	помірні	5
10	Листок: крила	відсутні або слабко виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабка	3
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: за щільністю	щільні	7
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцевидні	2
17	Язичкові квітки: за положенням	хвилясті (закручені)	3
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: за кольором	помірно жовті	3
20	Трубчасті квітки: за кольором	оранжеві	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначалась	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Зовнішні листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1
25	Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки	коротка	3
26	Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку	помірний	5
27	Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за природною висотою	середня	5
29	Рослина: галуження (за винятком галуження, викликаного умовами середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначалась	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначалась	0
32	Кошик: положення	обернене донизу разом із легким викривленням стебла	7
33	Кошик: розмір	середній	5
34	Кошик: форма з боку сім'янок	сильно випукла	5
35	Сім'янка: за розміром	середня	5
36	Сім'янка: за формою	широкояйцеподібна	3
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: за основним кольором	чорна	7
39	Сім'янка: смугастість на краях	дуже сильна	3
40	Сім'янка: смугастість між краями	відсутня або дуже слабка	1
41	Сім'янка: колір смужок	сірий	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість до вовчка (<i>Orobanche cumana</i> , раса E)	стійкий	1
44	Стійкість до <i>Plasmodiophora Halstedii</i>	відсутня	1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	С	Значення Л	П
Урожайність, ц/га	24,7	29,3	
Гарантована різниця, ц/га	2,1	4,9	
Гарантована різниця, %	9,3	20	

Стійкість до вилягання, бал	8,8	8,8
Діаметр кошика, см.	16,2	18,4
Маса 1000 сім'янок, г.	56,7	59,2
Стійкість до ураження, бал		
гнилями	8,9	7,7
вовчком	8,9	9
Вихід олії кг/га	1494	1478
Вміст, %		
жиру	53,5	54,2
білку	15,9	15,6

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка №: 10017172 Назва сорту ЕС Ванілла

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 29.11.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

04.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140232

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: аноціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3
3	Листок: за розміром	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
5	Листок: пухирчастість	відсутня або дуже слабка	1
6	Листок: зубці	помірні	5
7	Листок: форма у поперечному перерізі	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6
9	Листок: наявність вушок	помірні	5
10	Листок: крила	відсутні або слабо виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	відсутня або дуже слабка	1
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: за щільністю	щільні	7
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцевидні	2
17	Язичкові квітки: за положенням	плескаті	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: за кольором	помірно жовті	3
20	Трубчасті квітки: за кольором	оранжеві	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначалась	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Зовнішні листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1
25	Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки	середня	5
26	Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку	помірний	5
27	Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або злегка охоплює	1
28	Рослина: за природною висотою	низька	3
29	Рослина: галуження (за винятком галуження, викликаного умовами середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначалась	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначалась	0
32	Кошик: положення	напівобернене донизу разом із стеблом	5
33	Кошик: розмір	маленький	3
34	Кошик: форма з боку сім'янок	сильно випукла	5
35	Сім'янка: за розміром	середня	5
36	Сім'янка: за формою	вузькояйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: за основним кольором	чорна	7
39	Сім'янка: смугастість на краях	дуже сильна	3
40	Сім'янка: смугастість між краями	відсутня або дуже слабка	1
41	Сім'янка: колір смужок	сірий	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість до вовчка (<i>Orobancha cumana</i> , раса E)	стійкий	1
44	Стійкість до <i>Plasmodiophora Halstedii</i>	відсутня	1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	С	Значення Л	П
Урожайність, ц/га	25,0	28,8	
Гарантована різниця, ц/га	2,4	4,4	
Гарантована різниця, %	10,6	18	

Стійкість до вилягання, бал	9	8,6
Діаметр кошика, см.	16,5	17,5
Маса 1000 сім'янок, г.	54,7	54,1
Стійкість до ураження, бал		
гнилями	8,8	7,9
вовчком	8,8	8,9
Вихід олії кг/га	1324	1418
Вміст, %		
жиру	53,3	54,3
білку	15,2	15,0

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка №: 10017162 Назва сорту ЕС Дома

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 29.11.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

04.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140229

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: аноціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3
3	Листок: за розміром	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	дрібні	3
7	Листок: форма у поперечному перерізі	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	загострена	8
9	Листок: наявність вушок	помірні	5
10	Листок: крила	відсутні або слабо виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабка	3
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: за щільністю	середньої щільності	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцевидні	2
17	Язичкові квітки: за положенням	плескаті	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: за кольором	помірно жовті	3
20	Трубчасті квітки: за кольором	оранжеві	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначалась	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Зовнішні листки обгортки: за формою	також чітко видовжені, але й чітко округлі	2
25	Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки	середня	5
26	Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку	помірний	5
27	Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за природною висотою	середня	5
29	Рослина: галуження (за винятком галуження, викликаного умовами середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначалась	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначалась	0
32	Кошик: положення	обернене донизу разом із легким викривленням стебла	7
33	Кошик: розмір	маленький	3
34	Кошик: форма з боку сім'янок	злегка випукла	4
35	Сім'янка: за розміром	середня	5
36	Сім'янка: за формою	широкояйцеподібна	3
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: за основним кольором	чорна	7
39	Сім'янка: смугастість на краях	слабка	2
40	Сім'янка: смугастість між краями	слабка	2
41	Сім'янка: колір смужок	сірий	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість до вовчка (<i>Orobanche cumana</i> , раса E)	стійкий	1
44	Стійкість до <i>Plasmodiophora Halstedii</i>	відсутня	1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	С	Значення Л	П
Урожайність, ц/га	23,8	26,8	
Гарантована різниця, ц/га	1,2	2,4	
Гарантована різниця, %	5,3	10	

Стійкість до вилягання, бал	9	8,8
Діаметр кошика, см.	16,3	19,1
Маса 1000 сім'янок, г.	58,1	61,3
Стійкість до ураження, бал		
гнилями	8,7	8,5
вовчком	8,8	9
Вихід олії кг/га	1522	1405
Вміст, %		
жиру	52,5	52,6
білку	16,2	16,1

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка №: 10017207 Назва сорту Естрада

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 03.12.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

17.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140375

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: аноціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
3	Листок: за розміром	малий	3
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	світле	3
5	Листок: пухирчастість	відсутня або дуже слабка	1
6	Листок: зубці	дрібні	3
7	Листок: форма у поперечному перерізі	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	загострена	8
9	Листок: наявність вушок	великі	7
10	Листок: крила	відсутні або слабо виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабка	3
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: за щільністю	щільні	7
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцевидні	2
17	Язичкові квітки: за положенням	плескаті	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: за кольором	помірно жовті	3
20	Трубчасті квітки: за кольором	оранжеві	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначалась	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Зовнішні листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1
25	Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки	середня	5
26	Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку	помірний	5
27	Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або злегка охоплює	1
28	Рослина: за природною висотою	середня	5
29	Рослина: галушення (за винятком галушення, викликаного умовами середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галушення (як для 29)	ознака не визначалась	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначалась	0
32	Кошик: положення	обернене донизу разом із легким викривленням стебла	7
33	Кошик: розмір	маленький	3
34	Кошик: форма з боку сім'янок	злегка випукла	4
35	Сім'янка: за розміром	середня	5
36	Сім'янка: за формою	широкоюйцеподібна	3
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3
38	Сім'янка: за основним кольором	чорна	7
39	Сім'янка: смугастість на краях	слабка	2
40	Сім'янка: смугастість між краями	слабка	2
41	Сім'янка: колір смужок	сірий	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість до вовчка (<i>Orobanche cumana</i> , раса E)	стійкий	1
44	Стійкість до <i>Plasmodiophora Halstedii</i>	відсутня	1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	С	Значення Л	П
Урожайність, ц/га	25,2	29,0	
Гарантована різниця, ц/га	1,8	2,5	
Гарантована різниця, %	7,7	9,4	
Стійкість до вилягання, бал	8,9	8,8	

Діаметр кошика, см.	16,8	17,7
Маса 1000 сім'янок, г.	54,1	52,1
Стійкість до ураження, бал		
гнилями	8,7	8,3
вовчком	8,9	9
Вихід олії кг/га	1664	1414
Вміст, %		
жиру	51,1	50,8
білку	16,1	16,0

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка №: 10017187 Назва сорту Златсон

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 30.11.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

13.03.2014

Свідчення про державну реєстрацію № 140298

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: аноціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
3	Листок: за розміром	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
5	Листок: пухирчастість	відсутня або дуже слабка	1
6	Листок: зубці	окремі або дуже дрібні	1
7	Листок: форма у поперечному перерізі	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6
9	Листок: наявність вушок	помірні	5
10	Листок: крила	слабо виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	на рівні	5
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабка	3
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: за щільністю	середньої щільності	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцевидні	2
17	Язичкові квітки: за положенням	зігнуті за довжиною	2
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: за кольором	помірно жовті	3
20	Трубчасті квітки: за кольором	оранжеві	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначалась	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Зовнішні листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1
25	Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки	коротка	3
26	Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку	помірний	5
27	Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за природною висотою	середня	5
29	Рослина: галуження (за винятком галуження, викликаного умовами середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначалась	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначалась	0
32	Кошик: положення	напівобернене донизу разом із стеблом	5
33	Кошик: розмір	середній	5
34	Кошик: форма з боку сім'янок	сильно випукла	5
35	Сім'янка: за розміром	середня	5
36	Сім'янка: за формою	широкояйцеподібна	3
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: за основним кольором	чорна	7
39	Сім'янка: смугастість на краях	відсутня або дуже слабка	1
40	Сім'янка: смугастість між краями	відсутня або дуже слабка	1
41	Сім'янка: колір смужок	сірий	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість до вовчка (<i>Orobanche cumana</i> , раса E)	стійкий	1
44	Стійкість до <i>Plasmodiophora Halstedii</i>	відсутня	1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	С	Значення Л	П
Урожайність, ц/га	23,8	25,4	
Гарантована різниця, ц/га	1,2	1	
Гарантована різниця, %	5,3	4	

Стійкість до вилягання, бал	8,8	8,6
Діаметр кошика, см.	16,4	17,6
Маса 1000 сім'янок, г.	52,0	54,2
Стійкість до ураження, бал		
гнилями	8,7	8,3
вовчком	8,8	9
Вихід олії кг/га	1257	1359
Вміст, %		
жиру	49,0	49,7
білку	16,6	16,4

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка №: 10017082 Назва сорту Крессідія

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 10.11.2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

17.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140373

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: аноціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3
3	Листок: за розміром	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	дрібні	3
7	Листок: форма у поперечному перерізі	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6
9	Листок: наявність вушок	помірні	5
10	Листок: крила	слабко виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабка	3
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: за щільністю	щільні	7
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцевидні	2
17	Язичкові квітки: за положенням	плескаті	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: за кольором	помірно жовті	3
20	Трубчасті квітки: за кольором	оранжеві	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначалась	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Зовнішні листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1
25	Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки	довга	7
26	Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку	помірний	5
27	Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або злегка охоплює	1
28	Рослина: за природною висотою	середня	5
29	Рослина: галуження (за винятком галуження, викликаного умовами середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначалась	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначалась	0
32	Кошик: положення	обернене донизу разом із сильним викривленням стебла	8
33	Кошик: розмір	маленький	3
34	Кошик: форма з боку сім'янок	злегка випукла	4
35	Сім'янка: за розміром	середня	5
36	Сім'янка: за формою	вузькояйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: за основним кольором	чорна	7
39	Сім'янка: смугастість на краях	дуже сильна	3
40	Сім'янка: смугастість між краями	відсутня або дуже слабка	1
41	Сім'янка: колір смужок	сірий	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість до вовчка (<i>Orobanche cumana</i> , раса E)	стійкий	1
44	Стійкість до <i>Plasmodiophora Halstedii</i>	відсутня	1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	С	Значення Л	П
Урожайність, ц/га	25,3	28,9	
Гарантована різниця, ц/га	0,7	1,4	
Гарантована різниця, %	3	5,1	

Стійкість до вилягання, бал	8,9	8,8
Діаметр кошика, см.	17,5	19,5
Маса 1000 сім'янок, г.	53,7	51,0
Стійкість до ураження, бал		
гнилями	8,8	8,1
вовчком	9	9
Вихід олії кг/га	1519	1487
Вміст, %		
жиру	52,4	52,3
білку	15,4	15,5

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка №: 09017245 Назва сорту КС 104

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 30.11.2009

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

21.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140415

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: аноціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
3	Листок: за розміром	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	дрібні	3
7	Листок: форма у поперечному перерізі	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6
9	Листок: наявність вушок	помірні	5
10	Листок: крила	відсутні або слабо виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабка	3
14	Час цвітіння	ранній	3
15	Язичкові квітки: за щільністю	середньої щільності	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцевидні	2
17	Язичкові квітки: за положенням	плескаті	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7
19	Язичкові квітки: за кольором	оранжево-жовті	4
20	Трубчасті квітки: за кольором	оранжеві	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначалась	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Зовнішні листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1
25	Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки	середня	5
26	Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку	помірний	5
27	Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика	дуже охоплює	3
28	Рослина: за природною висотою	середня	5
29	Рослина: галуження (за винятком галуження, викликаного умовами середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначалась	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначалась	0
32	Кошик: положення	обернене донизу разом із легким викривленням стебла	7
33	Кошик: розмір	середній	5
34	Кошик: форма з боку сім'янок	злегка випукла	4
35	Сім'янка: за розміром	середня	5
36	Сім'янка: за формою	широкояйцеподібна	3
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: за основним кольором	чорна	7
39	Сім'янка: смугастість на краях	слабка	2
40	Сім'янка: смугастість між краями	відсутня або дуже слабка	1
41	Сім'янка: колір смужок	сірий	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість до вовчка (<i>Orobanche cumana</i> , раса E)	ознака не визначалась	0
44	Стійкість до <i>Plasmodiophora Halstedii</i>	ознака не визначалась	0

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	С	Значення Л	П
Урожайність, ц /га	23,5	26,8	
Гарантована різниця, ц / га	0	1,9	
Гарантована різниця, %	0	8	

Стійкість до вилягання, бал	9	9
Діаметр кошика, см	16,6	17,6
Маса 1000 сім'янок, г	56,5	61,5
Стійкість до ураження, бал		
гнилями	8,9	8,7
вовчком	8,9	9
Вихід олії, кг / га	1345	1158
Вміст, %		
жиру	49,0	48,7
білку	16,8	17,1

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка №: 09017269 Назва сорту КС105

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 16.12.2009

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

21.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140416

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: аноціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
3	Листок: за розміром	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
5	Листок: пухирчастість	відсутня або дуже слабка	1
6	Листок: зубці	дрібні	3
7	Листок: форма у поперечному перерізі	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	загострена	8
9	Листок: наявність вушок	помірні	5
10	Листок: крила	відсутні або слабо виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабка	3
14	Час цвітіння	ранній	3
15	Язичкові квітки: за щільністю	щільні	7
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцевидні	2
17	Язичкові квітки: за положенням	зігнуті за довжиною	2
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: за кольором	оранжево-жовті	4
20	Трубчасті квітки: за кольором	оранжеві	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначалась	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Зовнішні листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1
25	Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки	середня	5
25	Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки	середня	5
26	Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку	помірний	5
27	Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика	дуже охоплює	3
28	Рослина: за природною висотою	середня	5
29	Рослина: галушення (за винятком галушення, викликаного умовами середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галушення (як для 29)	ознака не визначалась	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначалась	0
32	Кошик: положення	обернене донизу разом із легким викривленням стебла	7
33	Кошик: розмір	середній	5
34	Кошик: форма з боку сім'янок	плеската	3
36	Сім'янка: за формою	широкояйцеподібна	3
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: за основним кольором	чорна	7
39	Сім'янка: смугастість на краях	дуже сильна	3
40	Сім'янка: смугастість між краями	відсутня або дуже слабка	1
41	Сім'янка: колір смужок	сірий	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість до вовчка (<i>Orobanchе cumana</i> , раса E)	ознака не визначалась	0
44	Стійкість до <i>Plasmodiо Halstedii</i>	ознака не визначалась	0

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	С	Значення Л	П
Урожайність, ц / га	23,8	25,3	
Гарантована різниця, ц / га	0	0,4	
Гарантована різниця, %	0	2	
Стійкість до вилягання, бал	8,9	8,8	

Діаметр кошика, см	16,8	17,1
Маса 1000 сім'янок, г	56,6	62,3
Стійкість до ураження, бал		
гнилями	8,9	8,5
вовчком	8,9	8,8
Вихід олії, кг / га	1375	1164
Вміст, %		
жиру	51,0	50,1
білку	16,1	16,9

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка №: 10017081 Назва сорту КСФ 10113

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 10.11.2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

04.03.2014

Свідство про державну реєстрацію № 140080

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: аноціанове забарвлення	відсутнє	1
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначалась	0
3	Листок: за розміром	великий	7
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	світле	3
5	Листок: пухирчастість	відсутня або дуже слабка	1
6	Листок: зубці	дрібні	3
7	Листок: форма у поперечному перерізі	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	загострена	8
9	Листок: наявність вушок	помірні	5
10	Листок: крила	відсутні або слабо виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабка	3
14	Час цвітіння	ранній	3
15	Язичкові квітки: за щільністю	щільні	7
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцевидні	2
17	Язичкові квітки: за положенням	плескаті	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7
19	Язичкові квітки: за кольором	помірно жовті	3
20	Трубчасті квітки: за кольором	оранжеві	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначалась	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Зовнішні листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1
25	Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки	середня	5
26	Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку	помірний	5
27	Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або злегка охоплює	1
28	Рослина: за природною висотою	середня	5
29	Рослина: галушення (за винятком галушення, викликаного умовами середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галушення (як для 29)	ознака не визначалась	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначалась	0
32	Кошик: положення	обернене донизу разом із легким викривленням стебла	7
33	Кошик: розмір	середній	5
34	Кошик: форма з боку сім'янок	злегка випукла	4
35	Сім'янка: за розміром	середня	5
36	Сім'янка: за формою	широкояйцеподібна	3
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: за основним кольором	чорна	7
39	Сім'янка: смугастість на краях	дуже сильна	3
40	Сім'янка: смугастість між краями	відсутня або дуже слабка	1
41	Сім'янка: колір смужок	сірий	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість до вовчка (<i>Orobanche cumana</i> , раса E)	толерантний	2
44	Стійкість до <i>Plasmodiophora Halstedii</i>	відсутня	1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	С	Значення Л	П
Урожайність, ц/га	25,2	28,8	
Гарантована різниця, ц/га	0,6	1,3	
Гарантована різниця, %	2,4	5	
Стійкість до вилягання, бал	8,9	8,8	

Діаметр кошика, см.	16,4	18,3
Маса 1000 сім'янок, г.	51,0	53,7
Стійкість до ураження, бал		
гнилями	8,8	8,0
вовчком	8,6	8,8
Вихід олії кг/га	1493	1383
Вміст, %		
жиру	51,7	51,0
білку	16,0	15,9

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка №: 10017083 Назва сорту КСФ 10116

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 10.11.2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

03.03.2014

Свідство про державну реєстрацію № 140081

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: аноціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7
3	Листок: за розміром	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	помірні	5
7	Листок: форма у поперечному перерізі	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6
9	Листок: наявність вушок	помірні	5
10	Листок: крила	відсутні або слабо виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	відсутня або дуже слабка	1
14	Час цвітіння	ранній	3
15	Язичкові квітки: за щільністю	середньої щільності	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцевидні	2
17	Язичкові квітки: за положенням	плескаті	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7
19	Язичкові квітки: за кольором	оранжево-жовті	4
20	Трубчасті квітки: за кольором	оранжеві	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначалась	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Зовнішні листки обгортки: за формою	також чітко видовжені, але й чітко округлі	2
25	Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки	коротка	3
26	Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку	помірний	5
27	Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за природною висотою	середня	5
29	Рослина: галузнення (за винятком галузнення, викликаного умовами середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галузнення (як для 29)	ознака не визначалась	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначалась	0
32	Кошик: положення	напівобернене донизу разом із прямим стеблом	4
33	Кошик: розмір	великий	7
34	Кошик: форма з боку сім'янок	сильно випукла	5
35	Сім'янка: за розміром	середня	5
36	Сім'янка: за формою	широкояйцеподібна	3
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3
38	Сім'янка: за основним кольором	чорна	7
39	Сім'янка: смугастість на краях	дуже сильна	3
40	Сім'янка: смугастість між краями	слабка	2
41	Сім'янка: колір смужок	сірий	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість до вовчка (<i>Orobanche cumana</i> , раса E)	стійкий	1
44	Стійкість до <i>Plasmodiophora Halstedii</i>	відсутня	1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	23,6	28,1	
Гарантована різниця, ц/га	0,2	1,6	

Гарантована різниця, %	1	6,0
Стійкість до вилягання, бал	9	8,7
Діаметр кошика, см.	16,6	16,9
Маса 1000 сім'янок, г.	59,3	56,1
Стійкість до ураження, бал		
гнилями	8,8	8,1
вовчком	8,5	9
Вихід олії кг/га	1390	1291
Вміст, %		
жиру	50,7	50,3
білку	16,2	16,1

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка №: 10017084 Назва сорту КСФ 11902

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 10.11.2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

04.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140082

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: аноціанове забарвлення	відсутнє	1
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначалась	0
3	Листок: за розміром	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	помірні	5
7	Листок: форма у поперечному перерізі	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	загострена	8
9	Листок: наявність вушок	великі	7
10	Листок: крила	слабко виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабка	3
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: за щільністю	середньої щільності	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцевидні	2
17	Язичкові квітки: за положенням	зігнуті за довжиною	2
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: за кольором	помірно жовті	3
20	Трубчасті квітки: за кольором	оранжеві	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначалась	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Зовнішні листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1
25	Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки	коротка	3
26	Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку	помірний	5
27	Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за природною висотою	низька	3
29	Рослина: галушення (за винятком галушення, викликаного умовами середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галушення (як для 29)	ознака не визначалась	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначалась	0
32	Кошик: положення	напівобернене донизу разом із прямим стеблом	4
33	Кошик: розмір	маленький	3
34	Кошик: форма з боку сім'янок	злегка випукла	4
35	Сім'янка: за розміром	середня	5
36	Сім'янка: за формою	вузькоюйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: за основним кольором	чорна	7
39	Сім'янка: смугастість на краях	дуже сильна	3
40	Сім'янка: смугастість між краями	відсутня або дуже слабка	1
41	Сім'янка: колір смужок	сірий	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість до вовчка (<i>Orobanchе cumana</i> , раса E)	толерантний	2
44	Стійкість до <i>Plasmopara Halstedii</i>	відсутня	1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	С	Значення Л	П
Урожайність, ц/га	22,7	28,3	
Гарантована різниця, ц/га	-0,7	1,8	
Гарантована різниця, %	-3	6,8	
Стійкість до вилягання, бал	9	8,3	

Діаметр кошика, см.	16,0	17,2
Маса 1000 сім'янок, г.	51,8	50,7
Стійкість до ураження, бал		
гнилями	8,9	8
вовчком	8,2	8,8
Вихід олії кг/га	1288	1326
Вміст, %		
жиру	50,6	49,8
білку	16,2	16,0

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка №: 10017134 Назва сорту ЛГ5400ХО

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 25.11.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

06.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140228

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: аноціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7
3	Листок: за розміром	малий	3
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	дрібні	3
7	Листок: форма у поперечному перерізі	слабко увігнута	2
8	Листок: форма верхівки	загострена	8
9	Листок: наявність вушок	великі	7
10	Листок: крила	відсутні або слабко виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	відсутня або дуже слабка	1
14	Час цвітіння	ранній	3
15	Язичкові квітки: за щільністю	щільні	7
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцевидні	2
17	Язичкові квітки: за положенням	плескаті	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: за кольором	помірно жовті	3
20	Трубчасті квітки: за кольором	оранжеві	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначалась	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Зовнішні листки обгортки: за формою	також чітко видовжені, але й чітко округлі	2
25	Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки	коротка	3
26	Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку	помірний	5
27	Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за природною висотою	середня	5
29	Рослина: галуження (за винятком галуження, викликаного умовами середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначалась	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначалась	0
32	Кошик: положення	напівобернене донизу разом із прямим стеблом	4
33	Кошик: розмір	середній	5
34	Кошик: форма з боку сім'янок	злегка випукла	4
35	Сім'янка: за розміром	середня	5
36	Сім'янка: за формою	широкояйцеподібна	3
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	товста	7
38	Сім'янка: за основним кольором	чорна	7
39	Сім'янка: смугастість на краях	відсутня або дуже слабка	1
40	Сім'янка: смугастість між краями	відсутня або дуже слабка	1
41	Сім'янка: колір смужок	сірий	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість до вовчка (<i>Orobanche cumana</i> , раса E)	стійкий	1
44	Стійкість до <i>Plasmodiophora Halstedii</i>	відсутня	1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	22,7	29,6	
Гарантована різниця, ц/га	0	7	
Гарантована різниця, %	0	30,9	

Стійкість до вилягання, бал	9	9
Діаметр кошика, см.	16,4	17,6
Маса 1000 сім'янок, г.	58,1	68,4
Стійкість до ураження, бал		
гнилями	8,9	8,7
вовчком	8,7	9
Вихід олії кг/га	1240	1390
Вміст, %		
жиру	49,0	50,0
білку	16,9	16,7

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка №: 10017038 Назва сорту МАС 82А

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 07.10.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

17.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140365

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: аноціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3
3	Листок: за розміром	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	помірні	5
7	Листок: форма у поперечному перерізі	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	загострена	8
9	Листок: наявність вушок	помірні	5
10	Листок: крила	відсутні або слабо виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабка	3
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: за щільністю	середньої щільності	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцевидні	2
17	Язичкові квітки: за положенням	плескаті	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: за кольором	помірно жовті	3
20	Трубчасті квітки: за кольором	оранжеві	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначалась	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Зовнішні листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1
25	Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки	середня	5
26	Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку	помірний	5
27	Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або злегка охоплює	1
28	Рослина: за природною висотою	середня	5
29	Рослина: галушення (за винятком галушення, викликаного умовами середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галушення (як для 29)	ознака не визначалась	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначалась	0
32	Кошик: положення	напівобернене донизу разом із стеблом	5
33	Кошик: розмір	маленький	3
34	Кошик: форма з боку сім'янок	сильно випукла	5
35	Сім'янка: за розміром	середня	5
36	Сім'янка: за формою	вузькоюйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: за основним кольором	чорна	7
39	Сім'янка: смугастість на краях	дуже сильна	3
40	Сім'янка: смугастість між краями	відсутня або дуже слабка	1
41	Сім'янка: колір смужок	сірий	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість до вовчка (<i>Orobanche cumana</i> , раса E)	стійкий	1
44	Стійкість до <i>Plasmodium Halstedii</i>	відсутня	1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	С	Значення Л	П
Урожайність, ц/га	23,6	28,3	
Гарантована різниця, ц/га	0,2	1,8	
Гарантована різниця, %	1	6,8	
Стійкість до вилягання, бал	8,7	8,7	

Діаметр кошика, см.	16,1	17,0
Маса 1000 сім'янок, г.	56,6	56,3
Стійкість до ураження, бал		
гнилями	8,7	8,3
вовчком	9	8,8
Вихід олії кг/га	1450	1498
Вміст, %		
жиру	54,6	53,0
білку	15,4	15,2

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.
Заявка №: 10017039 **Назва сорту** МАС 871Р

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

17.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140366

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: аноціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
3	Листок: за розміром	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	помірні	5
7	Листок: форма у поперечному перерізі	слабко увігнута	2
8	Листок: форма верхівки	загострена	8
9	Листок: наявність вушок	великі	7
10	Листок: крила	відсутні або слабко виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабка	3
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: за щільністю	середньої щільності	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцевидні	2
17	Язичкові квітки: за положенням	плескаті	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: за кольором	помірно жовті	3
20	Трубчасті квітки: за кольором	оранжеві	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначалась	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Зовнішні листки обгортки: за формою	чітко округлі	3
25	Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки	коротка	3
26	Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку	помірний	5
27	Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за природною висотою	середня	5
29	Рослина: галушення (за винятком галушення, викликаного умовами середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галушення (як для 29)	ознака не визначалась	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначалась	0
32	Кошик: положення	напівобернене донизу разом із прямим стеблом	4
33	Кошик: розмір	маленький	3
34	Кошик: форма з боку сім'янок	сильно випукла	5
35	Сім'янка: за розміром	середня	5
36	Сім'янка: за формою	вузькоюйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: за основним кольором	сіра	3
39	Сім'янка: смугастість на краях	відсутня або дуже слабка	1
40	Сім'янка: смугастість між краями	відсутня або дуже слабка	1
41	Сім'янка: колір смужок	сірий	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість до вовчка (<i>Orobanche cumana</i> , раса E)	толерантний	2
44	Стійкість до <i>Plasmopara Halstedii</i>	відсутня	1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	С	Значення Л	П
Урожайність, ц/га	24,3	28,6	
Гарантована різниця, ц/га	0,9	2,1	
Гарантована різниця, %	4	7,9	
Стійкість до вилягання, бал	8,9	8,5	

Діаметр кошика, см.	16,5	17,1
Маса 1000 сім'янок, г.	54,1	56,2
Стійкість до ураження, бал		
гнилями	8,7	8,1
вовчком	9	9
Вихід олії кг/га	1439	1510
Вміст, %		
жиру	52,8	53,6
білку	15,4	15,2

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка №: 10017148 Назва сорту Мілан

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 25.11.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

26.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140421

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: аноціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
3	Листок: за розміром	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	дрібні	3
7	Листок: форма у поперечному перерізі	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	загострена	8
9	Листок: наявність вушок	помірні	5
10	Листок: крила	слабко виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабка	3
14	Час цвітіння	дуже ранній	1
15	Язичкові квітки: за щільністю	середньої щільності	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцевидні	2
17	Язичкові квітки: за положенням	хвилясті (закручені)	3
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: за кольором	оранжево-жовті	4
20	Трубчасті квітки: за кольором	оранжеві	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначалась	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Зовнішні листки обгортки: за формою	також чітко видовжені, але й чітко округлі	2
25	Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки	середня	5
26	Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку	світлий	3
27	Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика	дуже охоплює	3
28	Рослина: за природною висотою	низька	3
29	Рослина: галуження (за винятком галуження, викликаного умовами середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначалась	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначалась	0
32	Кошик: положення	напівобернене донизу разом із стеблом	5
33	Кошик: розмір	середній	5
34	Кошик: форма з боку сім'янок	плеската	3
35	Сім'янка: за розміром	велика	7
36	Сім'янка: за формою	вузькояйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: за основним кольором	чорна	7
39	Сім'янка: смугастість на краях	дуже сильна	3
40	Сім'янка: смугастість між краями	відсутня або дуже слабка	1
41	Сім'янка: колір смужок	сірий	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість до вовчка (<i>Orobanche cumana</i> , раса E)	стійкий	1
44	Стійкість до <i>Plasmodiophora Halstedii</i>	відсутня	1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	С	Значення Л	П
Урожайність, ц/га	20,0	24,3	
Гарантована різниця, ц/га	-1,5	1,2	
Гарантована різниця, %	-6,9	5,2	

Стійкість до вилягання, бал	8,9	8,8
Діаметр кошика, см.	15,8	17,8
Маса 1000 сім'янок, г.	63,3	72,2
Стійкість до ураження, бал		
гнилями	8,7	8,2
вовчком	8,9	9
Вихід олії кг/га	1240	1310
Вміст, %		
жиру	48,5	49,0
білку	18,1	17,1

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка №: 08017098 **Назва сорту** Наполі

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

13.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140297

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: аноціанове забарвлення	відсутнє	1
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначалась	0
3	Листок: за розміром	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
5	Листок: пухирчастість	відсутня або дуже слабка	1
6	Листок: зубці	дрібні	3
7	Листок: форма у поперечному перерізі	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до округлої	7
9	Листок: наявність вушок	помірні	5
10	Листок: крила	відсутні або слабо виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабка	3
14	Час цвітіння	ранній	3
15	Язичкові квітки: за щільністю	середньої щільності	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцевидні	2
17	Язичкові квітки: за положенням	зігнуті за довжиною	2
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: за кольором	помірно жовті	3
20	Трубчасті квітки: за кольором	оранжеві	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначалась	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Зовнішні листки обгортки: за формою	також чітко видовжені, але й чітко округлі	2
25	Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки	довга	7
26	Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку	помірний	5
27	Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за природною висотою	середня	5
29	Рослина: галузнення (за винятком галузнення, викликаного умовами середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галузнення (як для 29)	ознака не визначалась	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначалась	0
32	Кошик: положення	напівобернене донизу разом із стеблом	5
33	Кошик: розмір	середній	5
34	Кошик: форма з боку сім'янок	злегка випукла	4
35	Сім'янка: за розміром	середня	5
36	Сім'янка: за формою	вузькояйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: за основним кольором	чорна	7
39	Сім'янка: смугастість на краях	слабка	2
40	Сім'янка: смугастість між краями	слабка	2
41	Сім'янка: колір смужок	сірий	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість до вовчка (<i>Orobanchе cumanа</i> , раса E)	стійкий	1
44	Стійкість до <i>Plasmodiа Halstedii</i>	відсутня	1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	С	Значення Л	П
Урожайність, ц/га	25,6	27,0	
Гарантована різниця, ц/га	3,5	2,1	
Гарантована різниця, %	16	8	

Стійкість до вилягання, бал	8,9	9
Діаметр кошика, см.	17,1	17,3
Маса 1000 сім'янок, г.	58,4	62,7
Стійкість до ураження, бал		
гнилями	8,9	8,4
вовчком	9	9
Вихід олії кг/га	1611	1362
Вміст, %		
жиру	52,8	51,2
білку	14,7	15,5

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка №: 10017037 Назва сорту НК Ададжіо

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 02.08.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

03.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140079

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: аноціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
3	Листок: за розміром	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	дрібні	3
7	Листок: форма у поперечному перерізі	слабко увігнута	2
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6
9	Листок: наявність вушок	великі	7
10	Листок: крила	відсутні або слабко виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабка	3
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: за щільністю	щільні	7
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцевидні	2
17	Язичкові квітки: за положенням	плескаті	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: за кольором	помірно жовті	3
20	Трубчасті квітки: за кольором	оранжеві	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначалась	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Зовнішні листки обгортки: за формою	чітко округлі	3
25	Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки	коротка	3
26	Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку	помірний	5
27	Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за природною висотою	середня	5
29	Рослина: галуження (за винятком галуження, викликаного умовами середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначалась	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначалась	0
32	Кошик: положення	обернене донизу разом із легким викривленням стебла	7
33	Кошик: розмір	середній	5
34	Кошик: форма з боку сім'янок	злегка випукла	4
35	Сім'янка: за розміром	середня	5
36	Сім'янка: за формою	широкояйцеподібна	3
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: за основним кольором	чорна	7
39	Сім'янка: смугастість на краях	дуже сильна	3
40	Сім'янка: смугастість між краями	відсутня або дуже слабка	1
41	Сім'янка: колір смужок	сірий	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість до вовчка (<i>Orobanche cumana</i> , раса E)	стійкий	1
44	Стійкість до <i>Plasmodiophora Halstedii</i>	відсутня	1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	С	Значення Л	П
Урожайність, ц/га	25,2	34,1	
Гарантована різниця, ц/га	0,6	6,6	
Гарантована різниця, %	2,4	24	

Стійкість до вилягання, бал	9	8,7
Діаметр кошика, см.	15,8	19,0
Маса 1000 сім'янок, г.	55,8	59,4
Стійкість до ураження, бал		
гнилями	8,8	8,5
вовчком	9	9
Вихід олії кг/га	1604	1508
Вміст, %		
жиру	50,0	51,3
білку	16,4	16,0

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка №: 10017074 Назва сорту НС ФЕЛІКС

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 03.11.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

14.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140371

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: аноціанове забарвлення	відсутнє	1
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначалась	0
3	Листок: за розміром	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
5	Листок: пухирчастість	помірна	5
6	Листок: зубці	дрібні	3
7	Листок: форма у поперечному перерізі	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6
9	Листок: наявність вушок	помірні	5
10	Листок: крила	слабо виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабка	3
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: за щільністю	середньої щільності	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцевидні	2
17	Язичкові квітки: за положенням	зігнуті за довжиною	2
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: за кольором	помірно жовті	3
20	Трубчасті квітки: за кольором	оранжеві	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначалась	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Зовнішні листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1
25	Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки	коротка	3
26	Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку	помірний	5
27	Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика	дуже охоплює	3
28	Рослина: за природною висотою	середня	5
29	Рослина: галуження (за винятком галуження, викликаного умовами середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначалась	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначалась	0
32	Кошик: положення	обернене донизу разом із легким викривленням стебла	7
33	Кошик: розмір	середній	5
34	Кошик: форма з боку сім'янок	злегка випукла	4
35	Сім'янка: за розміром	середня	5
36	Сім'янка: за формою	вузькояйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: за основним кольором	чорна	7
39	Сім'янка: смугастість на краях	слабка	2
40	Сім'янка: смугастість між краями	відсутня або дуже слабка	1
41	Сім'янка: колір смужок	сірий	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість до вовчка (<i>Orobanche cumana</i> , раса E)	стійкий	1
44	Стійкість до <i>Plasmodiophora Halstedii</i>	відсутня	1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	С	Значення Л	П
Урожайність, ц/га	22,7	25,3	
Гарантована різниця, ц/га	0	1,3	
Гарантована різниця, %	0	5,3	

Стійкість до вилягання, бал	8,9	7,9
Діаметр кошика, см.	17,2	18,3
Маса 1000 сім'янок, г.	52,5	55,3
Стійкість до ураження, бал		
гнилями	8,9	7,9
вовчком	8,5	9
Вихід олії кг/га	1547	1412
Вміст, %		
жиру	54,4	54,0
білку	15,2	15,0

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка №: 10017070 Назва сорту НС Х 187

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 03.11.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

14.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140367

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: аноціанове забарвлення	відсутнє	1
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначалась	0
3	Листок: за розміром	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
5	Листок: пухирчастість	відсутня або дуже слабка	1
6	Листок: зубці	дрібні	3
7	Листок: форма у поперечному перерізі	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5
9	Листок: наявність вушок	великі	7
10	Листок: крила	відсутні або слабо виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабка	3
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: за щільністю	середньої щільності	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцевидні	2
17	Язичкові квітки: за положенням	плескаті	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: за кольором	помірно жовті	3
20	Трубчасті квітки: за кольором	оранжеві	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначалась	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Зовнішні листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1
25	Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки	середня	5
26	Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку	помірний	5
27	Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за природною висотою	середня	5
29	Рослина: галушення (за винятком галушення, викликаного умовами середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галушення (як для 29)	ознака не визначалась	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначалась	0
32	Кошик: положення	напівобернене донизу разом із стеблом	5
33	Кошик: розмір	маленький	3
34	Кошик: форма з боку сім'янок	злегка випукла	4
35	Сім'янка: за розміром	середня	5
36	Сім'янка: за формою	широкояйцеподібна	3
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: за основним кольором	чорна	7
39	Сім'янка: смугастість на краях	слабка	2
40	Сім'янка: смугастість між краями	відсутня або дуже слабка	1
41	Сім'янка: колір смужок	сірий	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість до вовчка (<i>Orobanche cumana</i> , раса E)	стійкий	1
44	Стійкість до <i>Plasmodiophora Halstedii</i>	відсутня	1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	С	Значення Л	П
Урожайність, ц/га	23,5	27,0	
Гарантована різниця, ц/га	0,9	2,6	
Гарантована різниця, %	4	11	
Стійкість до вилягання, бал	8,9	8,8	

Діаметр кошика, см.	16,1	17,6
Маса 1000 сім'янок, г.	56,6	59,8
Стійкість до ураження, бал		
гнилями	8,9	8,1
вовчком	8,1	8,9
Вихід олії кг/га	1405	1342
Вміст, %		
жиру	51,0	51,2
білку	16,4	16,1

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.
Заявка №: 10017071 **Назва сорту** НС X 195

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 03.11.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

14.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140368

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: аноціанове забарвлення	відсутнє	1
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначалась	0
3	Листок: за розміром	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
5	Листок: пухирчастість	помірна	5
6	Листок: зубці	дрібні	3
7	Листок: форма у поперечному перерізі	слабко увігнута	2
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6
9	Листок: наявність вушок	великі	7
10	Листок: крила	відсутні або слабко виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	відсутня або дуже слабка	1
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: за щільністю	щільні	7
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцевидні	2
17	Язичкові квітки: за положенням	плескаті	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7
19	Язичкові квітки: за кольором	помірно жовті	3
20	Трубчасті квітки: за кольором	оранжеві	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначалась	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Зовнішні листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1
25	Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки	коротка	3
26	Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку	помірний	5
27	Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за природною висотою	середня	5
29	Рослина: галуження (за винятком галуження, викликаного умовами середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначалась	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначалась	0
32	Кошик: положення	обернене донизу разом із легким викривленням стебла	7
33	Кошик: розмір	середній	5
34	Кошик: форма з боку сім'янок	сильно випукла	5
35	Сім'янка: за розміром	середня	5
36	Сім'янка: за формою	вузькоюйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: за основним кольором	чорна	7
39	Сім'янка: смугастість на краях	дуже сильна	3
40	Сім'янка: смугастість між краями	відсутня або дуже слабка	1
41	Сім'янка: колір смужок	сірий	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість до вовчка (<i>Orobanche cumana</i> , раса E)	стійкий	1
44	Стійкість до <i>Plasmodiophora Halstedii</i>	відсутня	1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	С	Значення Л	П
Урожайність, ц/га	22,5	26,9	
Гарантована різниця, ц/га	0	2,5	
Гарантована різниця, %	0	10,2	

Стійкість до вилягання, бал	8,6	8,8
Діаметр кошика, см.	16,2	18,1
Маса 1000 сім'янок, г.	55,6	62,2
Стійкість до ураження, бал		
гнилями	8,9	8,1
вовчком	8,6	9
Вихід олії кг/га	1359	1356
Вміст, %		
жиру	50,4	50,2
білку	16,6	16,7

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.
Заявка №: 10017072 **Назва сорту** НС Х 6341

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 03.11.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

14.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140369

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: аноціанове забарвлення	відсутнє	1
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначалась	0
3	Листок: за розміром	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
5	Листок: пухирчастість	відсутня або дуже слабка	1
6	Листок: зубці	окремі або дуже дрібні	1
7	Листок: форма у поперечному перерізі	слабко увігнута	2
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6
9	Листок: наявність вушок	помірні	5
10	Листок: крила	відсутні або слабко виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	відсутня або дуже слабка	1
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: за щільністю	щільні	7
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцевидні	2
17	Язичкові квітки: за положенням	плескаті	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: за кольором	помірно жовті	3
20	Трубчасті квітки: за кольором	оранжеві	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначалась	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Зовнішні листки обгортки: за формою	також чітко видовжені, але й чітко округлі	2
25	Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки	середня	5
26	Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку	помірний	5
27	Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за природною висотою	середня	5
29	Рослина: галузнення (за винятком галузнення, викликаного умовами середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галузнення (як для 29)	ознака не визначалась	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначалась	0
32	Кошик: положення	напівобернене донизу разом із стеблом	5
33	Кошик: розмір	маленький	3
34	Кошик: форма з боку сім'янок	злегка випукла	4
35	Сім'янка: за розміром	середня	5
36	Сім'янка: за формою	вузькояйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: за основним кольором	чорна	7
39	Сім'янка: смугастість на краях	слабка	2
40	Сім'янка: смугастість між краями	відсутня або дуже слабка	1
41	Сім'янка: колір смужок	сірий	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість до вовчка (<i>Orobanche cumana</i> , раса E)	стійкий	1
44	Стійкість до <i>Plasmodiophora Halstedii</i>	відсутня	1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	22,4	25,6	
Гарантована різниця, ц/га	-0,2	1,2	

Гарантована різниця, %	-1	5,0
Стійкість до вилягання, бал	8,9	8,6
Діаметр кошика, см.	17,5	19,8
Маса 1000 сім'янок, г.	54,4	57,3
Стійкість до ураження, бал		
гнилями	8,8	8,1
вовчком	8,8	9
Вихід олії кг/га	1333	1408
Вміст, %		
жиру	48,5	49,5
білку	17,6	17,5

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.
Заявка №: 10017073 Назва сорту НС Х 6343

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 03.11.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

14.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140370

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: аноціанове забарвлення	відсутнє	1
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначалась	0
3	Листок: за розміром	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
5	Листок: пухирчастість	відсутня або дуже слабка	1
6	Листок: зубці	дрібні	3
7	Листок: форма у поперечному перерізі	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	загострена	8
9	Листок: наявність вушок	великі	7
10	Листок: крила	відсутні або слабо виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	відсутня або дуже слабка	1
14	Час цвітіння	пізній	7
15	Язичкові квітки: за щільністю	щільні	7
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцевидні	2
17	Язичкові квітки: за положенням	плескаті	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: за кольором	помірно жовті	3
20	Трубчасті квітки: за кольором	оранжеві	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначалась	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Зовнішні листки обгортки: за формою	також чітко видовжені, але й чітко округлі	2
25	Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки	коротка	3
26	Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку	помірний	5
27	Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або злегка охоплює	1
28	Рослина: за природною висотою	середня	5
29	Рослина: галузнення (за винятком галузнення, викликаного умовами середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галузнення (як для 29)	ознака не визначалась	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначалась	0
32	Кошик: положення	напівобернене донизу разом із стеблом	5
33	Кошик: розмір	маленький	3
34	Кошик: форма з боку сім'янок	злегка випукла	4
35	Сім'янка: за розміром	середня	5
36	Сім'янка: за формою	широкояйцеподібна	3
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: за основним кольором	чорна	7
39	Сім'янка: смугастість на краях	дуже сильна	3
40	Сім'янка: смугастість між краями	відсутня або дуже слабка	1
41	Сім'янка: колір смужок	сірий	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість до вовчка (<i>Orobanchе cumanа</i> , раса E)	стійкий	1
44	Стійкість до <i>Plasmodiа Halstedii</i>	відсутня	1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	С	Значення Л	П
Урожайність, ц/га	22,4	25,9	
Гарантована різниця, ц/га	-0,2	1,5	
Гарантована різниця, %	-1	6,1	

Стійкість до вилягання, бал	8,9	8,8
Діаметр кошика, см.	17,9	18,9
Маса 1000 сім'янок, г.	50,2	53,5
Стійкість до ураження, бал		
гнилями	8,7	7,9
вовчком	8,7	8,9
Вихід олії кг/га	1361	1304
Вміст, %		
жиру	48,3	48,0
білку	17,4	17,6

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.
Заявка №: 10017075 **Назва сорту** НС Х 6593

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 03.11.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

14.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140372

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: аноціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3
3	Листок: за розміром	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
5	Листок: пухирчастість	помірна	5
6	Листок: зубці	дрібні	3
7	Листок: форма у поперечному перерізі	слабко увігнута	2
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6
9	Листок: наявність вушок	великі	7
10	Листок: крила	відсутні або слабко виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабка	3
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: за щільністю	щільні	7
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцевидні	2
17	Язичкові квітки: за положенням	плескаті	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: за кольором	помірно жовті	3
20	Трубчасті квітки: за кольором	оранжеві	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначалась	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Зовнішні листки обгортки: за формою	також чітко видовжені, але й чітко округлі	2
25	Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки	коротка	3
26	Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку	помірний	5
27	Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за природною висотою	середня	5
29	Рослина: галузнення (за винятком галузнення, викликаного умовами середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галузнення (як для 29)	ознака не визначалась	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначалась	0
32	Кошик: положення	напівобернене донизу разом із стеблом	5
33	Кошик: розмір	середній	5
34	Кошик: форма з боку сім'янок	злегка випукла	4
35	Сім'янка: за розміром	середня	5
36	Сім'янка: за формою	вузькояйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: за основним кольором	чорна	7
39	Сім'янка: смугастість на краях	слабка	2
40	Сім'янка: смугастість між краями	відсутня або дуже слабка	1
41	Сім'янка: колір смужок	сірий	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість до вовчка (<i>Orobanche cumana</i> , раса E)	стійкий	1
44	Стійкість до <i>Plasmodiophora Halstedii</i>	відсутня	1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	С	Значення Л	П
Урожайність, ц/га	22,9	27,2	
Гарантована різниця, ц/га	0,3	2,8	

Гарантована різниця, %	1,3	11,5
Стійкість до вилягання, бал	8,6	8,8
Діаметр кошика, см.	15,7	17,5
Маса 1000 сім'янок, г.	51,4	54,9
Стійкість до ураження, бал		
гнилями	8,7	8,2
вовчком	8,9	9
Вихід олії кг/га	1501	1482
Вміст, %		
жиру	53,6	53,6
білку	15,7	15,4

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.
Заявка №: 10017208 **Назва сорту** Пактера

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 03.12.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

03.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140086

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: аноціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
3	Листок: за розміром	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	дрібні	3
7	Листок: форма у поперечному перерізі	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	загострена	8
9	Листок: наявність вушок	великі	7
10	Листок: крила	слабко виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабка	3
14	Час цвітіння	ранній	3
15	Язичкові квітки: за щільністю	щільні	7
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцевидні	2
17	Язичкові квітки: за положенням	плескаті	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: за кольором	помірно жовті	3
20	Трубчасті квітки: за кольором	оранжеві	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначалась	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Зовнішні листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1
25	Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки	середня	5
26	Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку	помірний	5
27	Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або злегка охоплює	1
28	Рослина: за природною висотою	середня	5
29	Рослина: галушення (за винятком галушення, викликаного умовами середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галушення (як для 29)	ознака не визначалась	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначалась	0
32	Кошик: положення	обернене донизу разом із легким викривленням стебла	7
33	Кошик: розмір	середній	5
34	Кошик: форма з боку сім'янок	сильно випукла	5
35	Сім'янка: за розміром	середня	5
36	Сім'янка: за формою	широкоюйцеподібна	3
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: за основним кольором	чорна	7
39	Сім'янка: смугастість на краях	слабка	2
40	Сім'янка: смугастість між краями	відсутня або дуже слабка	1
41	Сім'янка: колір смужок	сірий	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість до вовчка (<i>Orobanche cumana</i> , раса E)	стійкий	1
44	Стійкість до <i>Plasmodiophora Halstedii</i>	відсутня	1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	С	Значення Л	П
Урожайність, ц/га	24,5	28,1	
Гарантована різниця, ц/га	1,1	1,6	
Гарантована різниця, %	4,7	6	
Стійкість до вилягання, бал	8,9	8,8	

Діаметр кошика, см.	17,9	18,3
Маса 1000 сім'янок, г.	54,3	52,6
Стійкість до ураження, бал		
гнилями	8,9	8,3
вовчком	8,8	9
Вихід олії кг/га	1429	1383
Вміст, %		
жиру	50,5	50,0
білку	17,0	17,1

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.
Заявка №: 10017144 **Назва сорту** Равенна

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 25.11.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

26.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140418

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: аноціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
3	Листок: за розміром	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	світле	3
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	окремі або дуже дрібні	1
7	Листок: форма у поперечному перерізі	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6
9	Листок: наявність вушок	помірні	5
10	Листок: крила	відсутні або слабо виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	відсутня або дуже слабка	1
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: за щільністю	щільні	7
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцевидні	2
17	Язичкові квітки: за положенням	плескаті	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: за кольором	помірно жовті	3
20	Трубчасті квітки: за кольором	оранжеві	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначалась	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Зовнішні листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1
25	Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки	середня	5
26	Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку	світлий	3
27	Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за природною висотою	низька	3
29	Рослина: галузнення (за винятком галузнення, викликаного умовами середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галузнення (як для 29)	ознака не визначалась	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначалась	0
32	Кошик: положення	напівобернене донизу разом із стеблом	5
33	Кошик: розмір	середній	5
34	Кошик: форма з боку сім'янок	злегка увігнута	2
35	Сім'янка: за розміром	середня	5
36	Сім'янка: за формою	широкояйцеподібна	3
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: за основним кольором	чорна	7
39	Сім'янка: смугастість на краях	слабка	2
40	Сім'янка: смугастість між краями	відсутня або дуже слабка	1
41	Сім'янка: колір смужок	сірий	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість до вовчка (<i>Orobanche cumana</i> , раса E)	стійкий	1
44	Стійкість до <i>Plasmodiophora Halstedii</i>	відсутня	1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	С	Значення Л	П
Урожайність, ц/га	25,1	25,9	
Гарантована різниця, ц/га	2,5	1,5	
Гарантована різниця, %	11,1	6,1	

Стійкість до вилягання, бал	9	9
Діаметр кошика, см.	15,8	16,4
Маса 1000 сім'янок, г.	64,5	65,1
Стійкість до ураження, бал		
гнилями	8,8	7,9
вовчком	8,9	9
Вихід олії кг/га	1460	1305
Вміст, %		
жиру	50,8	50,4
білку	16,4	16,2

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка №: 10017209 Назва сорту Санай МР

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 03.12.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

04.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140087

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: аноціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3
3	Листок: за розміром	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	дрібні	3
7	Листок: форма у поперечному перерізі	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6
9	Листок: наявність вушок	помірні	5
10	Листок: крила	слабо виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	на рівні	5
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабка	3
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: за щільністю	середньої щільності	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцевидні	2
17	Язичкові квітки: за положенням	хвилясті (закручені)	3
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: за кольором	помірно жовті	3
20	Трубчасті квітки: за кольором	оранжеві	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначалась	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Зовнішні листки обгортки: за формою	також чітко видовжені, але й чітко округлі	2
25	Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки	середня	5
26	Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку	помірний	5
27	Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика	дуже охоплює	3
28	Рослина: за природною висотою	середня	5
29	Рослина: галуження (за винятком галуження, викликаного умовами середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначалась	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначалась	0
32	Кошик: положення	обернене донизу разом із легким викривленням стебла	7
33	Кошик: розмір	середній	5
34	Кошик: форма з боку сім'янок	сильно випукла	5
35	Сім'янка: за розміром	середня	5
36	Сім'янка: за формою	широкояйцеподібна	3
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: за основним кольором	чорна	7
39	Сім'янка: смугастість на краях	слабка	2
40	Сім'янка: смугастість між краями	відсутня або дуже слабка	1
41	Сім'янка: колір смужок	сірий	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість до вовчка (<i>Orobanche cumana</i> , раса E)	толерантний	2
44	Стійкість до <i>Plasmodiophora Halstedii</i>	відсутня	1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	25,9	27,6	
Гарантована різниця, ц/га	1,3	0	

Гарантована різниця, %	5,3	0
Стійкість до вилягання, бал	8,9	8,8
Діаметр кошика, см.	17,6	17,4
Маса 1000 сім'янок, г.	56,1	55,7
Стійкість до ураження, бал		
гнилями	8,8	7,8
вовчком	8,8	9
Вихід олії кг/га	1366	1256
Вміст, %		
жиру	48,2	48,1
білку	17,2	17,2

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка №: 10017205 Назва сорту Санбро МР

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 03.12.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

03.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140084

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: аноціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3
3	Листок: за розміром	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	дрібні	3
7	Листок: форма у поперечному перерізі	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6
9	Листок: наявність вушок	помірні	5
10	Листок: крила	слабко виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	на рівні	5
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабка	3
14	Час цвітіння	ранній	3
15	Язичкові квітки: за щільністю	середньої щільності	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцевидні	2
17	Язичкові квітки: за положенням	хвилясті (закручені)	3
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: за кольором	помірно жовті	3
20	Трубчасті квітки: за кольором	оранжеві	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначалась	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Зовнішні листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1
25	Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки	довга	7
26	Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку	помірний	5
27	Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за природною висотою	середня	5
29	Рослина: галуження (за винятком галуження, викликаного умовами середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначалась	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначалась	0
32	Кошик: положення	обернене донизу разом із легким викривленням стебла	7
33	Кошик: розмір	середній	5
34	Кошик: форма з боку сім'янок	злегка випукла	4
35	Сім'янка: за розміром	середня	5
36	Сім'янка: за формою	широкояйцеподібна	3
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: за основним кольором	чорна	7
39	Сім'янка: смугастість на краях	слабка	2
40	Сім'янка: смугастість між краями	відсутня або дуже слабка	1
41	Сім'янка: колір смужок	сірий	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість до вовчка (<i>Orobanche cumana</i> , раса E)	стійкий	1
44	Стійкість до <i>Plasmodiophora Halstedii</i>	відсутня	1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	С	Значення Л	П
Урожайність, ц/га	25,1	27,0	
Гарантована різниця, ц/га	2,5	2,6	
Гарантована різниця, %	11,1	11	

Стійкість до вилягання, бал	8,8	9
Діаметр кошика, см.	16,7	19,4
Маса 1000 сім'янок, г.	54,9	55,5
Стійкість до ураження, бал		
гнилями	8,9	8,3
вовчком	8,8	9
Вихід олії кг/га	1343	1289
Вміст, %		
жиру	50,3	50,1
білку	17,0	16,9

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка №: 10017210 Назва сорту СИ Еденіс

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 03.12.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

03.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140088

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: аноціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3
3	Листок: за розміром	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
5	Листок: пухирчастість	відсутня або дуже слабка	1
6	Листок: зубці	окремі або дуже дрібні	1
7	Листок: форма у поперечному перерізі	слабко увігнута	2
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5
9	Листок: наявність вушок	помірні	5
10	Листок: крила	слабко виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабка	3
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: за щільністю	щільні	7
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцевидні	2
17	Язичкові квітки: за положенням	плескаті	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: за кольором	помірно жовті	3
20	Трубчасті квітки: за кольором	оранжеві	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначалась	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Зовнішні листки обгортки: за формою	також чітко видовжені, але й чітко округлі	2
25	Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки	середня	5
26	Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку	помірний	5
27	Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за природною висотою	середня	5
29	Рослина: галузнення (за винятком галузнення, викликаного умовами середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галузнення (як для 29)	ознака не визначалась	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначалась	0
32	Кошик: положення	обернене донизу разом із сильним викривленням стебла	8
33	Кошик: розмір	середній	5
34	Кошик: форма з боку сім'янок	злегка випукла	4
35	Сім'янка: за розміром	середня	5
36	Сім'янка: за формою	вузькояйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: за основним кольором	чорна	7
39	Сім'янка: смугастість на краях	слабка	2
40	Сім'янка: смугастість між краями	відсутня або дуже слабка	1
41	Сім'янка: колір смужок	сірий	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість до вовчка (<i>Orobanche cumana</i> , раса E)	стійкий	1
44	Стійкість до <i>Plasmodiophora Halstedii</i>	відсутня	1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	С	Значення Л	П
Урожайність, ц/га	24,7	30,9	
Гарантована різниця, ц/га	1,3	4,4	
Гарантована різниця, %	5,6	16,6	

Стійкість до вилягання, бал	8,9	8,8
Діаметр кошика, см.	16,5	18,7
Маса 1000 сім'янок, г.	57,5	58,0
Стійкість до ураження, бал		
гнилями	8,7	8,5
вовчком	8,9	9
Вихід олії кг/га	1483	1520
Вміст, %		
жиру	51,1	50,8
білку	16,4	16,2

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.
Заявка №: 10017206 **Назва сорту** СИ Сабтіл

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 03.12.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

05.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140085

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: аноціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3
3	Листок: за розміром	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
5	Листок: пухирчастість	відсутня або дуже слабка	1
6	Листок: зубці	дрібні	3
7	Листок: форма у поперечному перерізі	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	загострена	8
9	Листок: наявність вушок	великі	7
10	Листок: крила	відсутні або слабо виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабка	3
14	Час цвітіння	ранній	3
15	Язичкові квітки: за щільністю	середньої щільності	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцевидні	2
17	Язичкові квітки: за положенням	плескаті	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: за кольором	помірно жовті	3
20	Трубчасті квітки: за кольором	оранжеві	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначалась	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Зовнішні листки обгортки: за формою	також чітко видовжені, але й чітко округлі	2
25	Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки	середня	5
26	Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку	помірний	5
27	Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або злегка охоплює	1
28	Рослина: за природною висотою	низька	3
29	Рослина: галузнення (за винятком галузнення, викликаного умовами середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галузнення (як для 29)	ознака не визначалась	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначалась	0
32	Кошик: положення	напівобернене донизу разом із прямим стеблом	4
33	Кошик: розмір	маленький	3
34	Кошик: форма з боку сім'янок	злегка випукла	4
35	Сім'янка: за розміром	середня	5
36	Сім'янка: за формою	вузькояйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: за основним кольором	чорна	7
39	Сім'янка: смугастість на краях	слабка	2
40	Сім'янка: смугастість між краями	відсутня або дуже слабка	1
41	Сім'янка: колір смужок	сірий	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість до вовчка (<i>Orobanche cumana</i> , раса E)	стійкий	1
44	Стійкість до <i>Plasmodiophora Halstedii</i>	відсутня	1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	С	Значення Л	П
Урожайність, ц/га	25,1	28,4	
Гарантована різниця, ц/га	0,4	0,9	
Гарантована різниця, %	1,6	3,3	

Стійкість до вилягання, бал	9	9
Діаметр кошика, см.	16,0	18,6
Маса 1000 сім'янок, г.	55,2	52,8
Стійкість до ураження, бал		
гнилями	8,8	7,9
вовчком	8,8	9
Вихід олії кг/га	1548	1467
Вміст, %		
жиру	53,3	52,6
білку	15,2	14,9

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка №: 08017104 Назва сорту Торо

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

17.03.2014

Свідчення про державну реєстрацію № 140363

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: аноціанове забарвлення	відсутнє	1
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначалась	0
3	Листок: за розміром	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
5	Листок: пухирчастість	помірна	5
6	Листок: зубці	помірні	5
7	Листок: форма у поперечному перерізі	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6
9	Листок: наявність вушок	помірні	5
10	Листок: крила	слабо виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабка	3
14	Час цвітіння	ранній	3
15	Язичкові квітки: за щільністю	щільні	7
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцевидні	2
17	Язичкові квітки: за положенням	плескаті	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: за кольором	помірно жовті	3
20	Трубчасті квітки: за кольором	оранжеві	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначалась	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Зовнішні листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1
25	Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки	коротка	3
26	Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку	помірний	5
27	Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за природною висотою	середня	5
29	Рослина: галузнення (за винятком галузнення, викликаного умовами середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галузнення (як для 29)	ознака не визначалась	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначалась	0
32	Кошик: положення	напівобернене донизу разом із стеблом	5
33	Кошик: розмір	середній	5
34	Кошик: форма з боку сім'янок	сильно випукла	5
35	Сім'янка: за розміром	середня	5
36	Сім'янка: за формою	широкояйцеподібна	3
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	товста	7
38	Сім'янка: за основним кольором	чорна	7
39	Сім'янка: смугастість на краях	дуже сильна	3
40	Сім'янка: смугастість між краями	відсутня або дуже слабка	1
41	Сім'янка: колір смужок	сірий	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість до вовчка (<i>Orobanche cumana</i> , раса E)	ознака не визначалась	0
44	Стійкість до <i>Plasmodiophora Halstedii</i>	ознака не визначалась	0

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	С	Значення Л	П
Урожайність, ц/га	28,2	30,9	
Гарантована різниця, ц/га	6,1	6,0	
Гарантована різниця, %	28	24	

Стійкість до вилягання, бал	8,9	9
Діаметр кошика, см.	18,1	18,5
Маса 1000 сім'янок, г.	62,0	59,2
Стійкість до ураження, бал		
гнилями	8,7	8,7
вовчком	9	9
Вихід олії кг/га	1595	1312
Вміст, %		
жиру	51,2	50,4
білку	15,0	15,4

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка №: 08017103 Назва сорту Трансол

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

03.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140077

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: аноціанове забарвлення	відсутнє	1
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначалась	0
3	Листок: за розміром	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	окремі або дуже дрібні	1
7	Листок: форма у поперечному перерізі	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	загострена	8
9	Листок: наявність вушок	великі	7
10	Листок: крила	відсутні або слабо виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	відсутня або дуже слабка	1
14	Час цвітіння	ранній	3
15	Язичкові квітки: за щільністю	щільні	7
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцевидні	2
17	Язичкові квітки: за положенням	хвилясті (закручені)	3
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7
19	Язичкові квітки: за кольором	помірно жовті	3
20	Трубчасті квітки: за кольором	оранжеві	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначалась	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Зовнішні листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1
25	Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки	середня	5
26	Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку	помірний	5
27	Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за природною висотою	середня	5
29	Рослина: галушення (за винятком галушення, викликаного умовами середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галушення (як для 29)	ознака не визначалась	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначалась	0
32	Кошик: положення	обернене донизу разом із прямим стеблом	6
33	Кошик: розмір	маленький	3
34	Кошик: форма з боку сім'янок	сильно випукла	5
35	Сім'янка: за розміром	середня	5
36	Сім'янка: за формою	вузькояйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: за основним кольором	чорна	7
39	Сім'янка: смугастість на краях	слабка	2
40	Сім'янка: смугастість між краями	відсутня або дуже слабка	1
41	Сім'янка: колір смужок	сірий	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість до вовчка (<i>Orobanche cumana</i> , раса E)	стійкий	1
44	Стійкість до <i>Plasmodiophora Halstedii</i>	відсутня	1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	С	Значення Л	П
Урожайність, ц/га	23,7	27,6	
Гарантована різниця, ц / га	0,2	2,1	
Гарантована різниця, %	1	8	
Стійкість до вилягання, бал	8,9	8,6	

Діаметр кошика, см.	16,9	18,4
Маса 1000 сім'янок, см.	53,4	56,2
Стійкість до ураження, бал		
гнилями	8,7	8,8
вовчком	8,2	9
Вихід олії кг/га	1498	1363
Вміст, %		
жиру	51,0	50,4
білку	15,5	16,0

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка №: 10017146 Назва сорту Флоренція

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 25.11.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

26.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140419

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: аноціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
3	Листок: за розміром	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
5	Листок: пухирчастість	відсутня або дуже слабка	1
6	Листок: зубці	окремі або дуже дрібні	1
7	Листок: форма у поперечному перерізі	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6
9	Листок: наявність вушок	помірні	5
10	Листок: крила	відсутні або слабо виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабка	3
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: за щільністю	щільні	7
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцевидні	2
17	Язичкові квітки: за положенням	плескаті	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: за кольором	помірно жовті	3
20	Трубчасті квітки: за кольором	оранжеві	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначалась	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Зовнішні листки обгортки: за формою	також чітко видовжені, але й чітко округлі	2
25	Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки	коротка	3
26	Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку	помірний	5
27	Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за природною висотою	середня	5
29	Рослина: галузнення (за винятком галузнення, викликаного умовами середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галузнення (як для 29)	ознака не визначалась	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначалась	0
32	Кошик: положення	обернене донизу разом із легким викривленням стебла	7
33	Кошик: розмір	середній	5
34	Кошик: форма з боку сім'янок	плеската	3
35	Сім'янка: за розміром	середня	5
36	Сім'янка: за формою	вузькояйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: за основним кольором	чорна	7
39	Сім'янка: смугастість на краях	дуже сильна	3
40	Сім'янка: смугастість між краями	слабка	2
41	Сім'янка: колір смужок	білий	1
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість до вовчка (<i>Orobanche cumana</i> , раса E)	стійкий	1
44	Стійкість до <i>Plasmodiophora Halstedii</i>	відсутня	1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	С	Значення Л	П
Урожайність, ц/га	25,3	27,0	
Гарантована різниця, ц/га	2,7	2,6	

Гарантована різниця, %	11,9	10,6
Стійкість до вилягання, бал	8,9	8,6
Діаметр кошика, см.	15,5	17,7
Маса 1000 сім'янок, г.	60,7	68,4
Стійкість до ураження, бал		
гнилями	8,7	7,9
вовчком	8,9	9
Вихід олії кг/га	1290	1355
Вміст, %		
жиру	48,8	49,5
білку	16,9	16,7

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка №: 09017327 Назва сорту Хайсан 204

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

27.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140417

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: аноціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3
3	Листок: за розміром	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	дрібні	3
7	Листок: форма у поперечному перерізі	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	загострена	8
9	Листок: наявність вушок	помірні	5
10	Листок: крила	відсутні або слабо виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабка	3
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: за щільністю	середньої щільності	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцевидні	2
17	Язичкові квітки: за положенням	зігнуті за довжиною	2
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: за кольором	помірно жовті	3
20	Трубчасті квітки: за кольором	оранжеві	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначалась	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Зовнішні листки обгортки: за формою	також чітко видовжені, але й чітко округлі	2
25	Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки	середня	5
26	Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку	помірний	5
27	Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за природною висотою	середня	5
29	Рослина: галузнення (за винятком галузнення, викликаного умовами середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галузнення (як для 29)	ознака не визначалась	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначалась	0
32	Кошик: положення	обернене донизу разом із сильним викривленням стебла	8
33	Кошик: розмір	середній	5
34	Кошик: форма з боку сім'янок	плеската	3
35	Сім'янка: за розміром	середня	5
36	Сім'янка: за формою	вузькоюйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: за основним кольором	чорна	7
39	Сім'янка: смугастість на краях	дуже сильна	3
40	Сім'янка: смугастість між краями	відсутня або дуже слабка	1
41	Сім'янка: колір смужок	сірий	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість до вовчка (<i>Orobanche cumana</i> , раса E)	ознака не визначалась	0
44	Стійкість до <i>Plasmodiophora Halstedii</i>	ознака не визначалась	0

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	С	Значення Л	П
Урожайність, ц/га	24,1	25,4	
Гарантована різниця, ц/га	2,6	2,3	
Гарантована різниця, %	12,1	9,9	

Стійкість до вилягання, бал	9	8,7
Діаметр кошика, см.	16,9	17,1
Маса 1000 сім'янок, г.	60,4	55,3
Стійкість до ураження, бал		
гнилями	8,7	7,8
вовчком	7,5	8,8
Вихід олії кг/га	1465	1280
Вміст, %		
жиру	49,8	49,7
білку	16,6	16,4

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка №: 10017149 Назва сорту Хайсан 231 КЛ ВО

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 26.11.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

03.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140422

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: аноціанове забарвлення	відсутнє	1
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначалась	0
3	Листок: за розміром	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
5	Листок: пухирчастість	помірна	5
6	Листок: зубці	помірні	5
7	Листок: форма у поперечному перерізі	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6
9	Листок: наявність вушок	помірні	5
10	Листок: крила	слабо виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабка	3
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: за щільністю	щільні	7
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцевидні	2
17	Язичкові квітки: за положенням	плескаті	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7
19	Язичкові квітки: за кольором	помірно жовті	3
20	Трубчасті квітки: за кольором	оранжеві	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначалась	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Зовнішні листки обгортки: за формою	також чітко видовжені, але й чітко округлі	2
25	Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки	коротка	3
26	Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку	помірний	5
27	Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або злегка охоплює	1
28	Рослина: за природною висотою	середня	5
29	Рослина: галузнення (за винятком галузнення, викликаного умовами середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галузнення (як для 29)	ознака не визначалась	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначалась	0
32	Кошик: положення	напівобернене донизу разом із прямим стеблом	4
33	Кошик: розмір	середній	5
34	Кошик: форма з боку сім'янок	злегка випукла	4
35	Сім'янка: за розміром	середня	5
36	Сім'янка: за формою	широкояйцеподібна	3
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: за основним кольором	чорна	7
39	Сім'янка: смугастість на краях	слабка	2
40	Сім'янка: смугастість між краями	відсутня або дуже слабка	1
41	Сім'янка: колір смужок	сірий	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість до вовчка (<i>Orobanche cumana</i> , раса E)	стійкий	1
44	Стійкість до <i>Plasmodiophora Halstedii</i>	відсутня	1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	23,5	23,7	
Гарантована різниця, ц/га	0,9	1,1	

Гарантована різниця, %	9	5
Стійкість до вилягання, бал	8,9	8,3
Діаметр кошика, см.	16,4	17,6
Маса 1000 сім'янок, г.	53,9	57,5
Стійкість до ураження, бал		
гнилями	8,8	7,9
вовчком	8,2	8,9
Вихід олії кг/га	1499	1348
Вміст, %		
жиру	53,0	53,2
білку	15,1	15,2

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка №: 10017085 Назва сорту Хіمالія КЛ

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 10.11.2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

17.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140374

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: аноціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3
3	Листок: за розміром	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	помірні	5
7	Листок: форма у поперечному перерізі	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	загострена	8
9	Листок: наявність вушок	великі	7
10	Листок: крила	слабко виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	відсутня або дуже слабка	1
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: за щільністю	середньої щільності	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцевидні	2
17	Язичкові квітки: за положенням	плескаті	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: за кольором	помірно жовті	3
20	Трубчасті квітки: за кольором	оранжеві	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначалась	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Зовнішні листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1
25	Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки	коротка	3
26	Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку	помірний	5
27	Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за природною висотою	низька	3
29	Рослина: галушення (за винятком галушення, викликаного умовами середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галушення (як для 29)	ознака не визначалась	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначалась	0
32	Кошик: положення	напівобернене донизу разом із стеблом	5
33	Кошик: розмір	великий	7
34	Кошик: форма з боку сім'янок	плеската	3
35	Сім'янка: за розміром	середня	5
36	Сім'янка: за формою	широкояйцеподібна	3
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3
38	Сім'янка: за основним кольором	чорна	7
39	Сім'янка: смугастість на краях	дуже сильна	3
40	Сім'янка: смугастість між краями	дуже сильна	3
41	Сім'янка: колір смужок	сірий	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість до вовчка (<i>Orobanche cumana</i> , раса E)	стійкий	1
44	Стійкість до <i>Plasmodiophora Halstedii</i>	відсутня	1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	С	Значення Л	П
Урожайність, ц/га	23,7	25,8	
Гарантована різниця, ц/га	1,1	3,2	
Гарантована різниця, %	5	14,2	
Стійкість до вилягання, бал	9	9	

Діаметр кошика, см.	16,9	17,0
Маса 1000 сім'янок, г.	51,3	54,2
Стійкість до ураження, бал		
гнилями	8,7	8,2
вовчком	8,2	8,8
Вихід олії кг/га	1235	1324
Вміст, %		
жиру	50,0	50,2
білку	16,9	16,8

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп

Вид: Сорго звичайне (двокольорове) Sorghum bicolor L.

Заявка №: 10064005 Назва сорту Арміда

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 29.11.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

04.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140247

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення колеоптиля	відсутнє або дуже слабке	1
2	Паросток: антоціанове забарвлення дорсального боку першого листка	відсутнє або дуже слабке	1
3	Паросток: антоціанове забарвлення піхви першого листка	відсутнє або дуже слабке	1
4	Листок: антоціанове забарвлення пластинки (стадія п'ятого листка)	відсутнє або дуже слабке	1
5	Рослина: час виявлення волоті (50% рослин з волоттю)	дуже ранній	1
6	Рослина: за висотою під час викидання волоті	дуже низька	1
7	Листок: зелене забарвлення пластинки (за викидання волоті)	дуже світле	1
8	Прапорцевий листок: поширення знебарвлення середньої жилки (як для 7)	відсутнє або дуже слабке	1
9	Прапорцевий листок: зелене забарвлення середньої жилки у порівнянні з пластинкою листка (якщо не знебарвлена, як для 7)	світліше	1
10	Прапорцевий листок: жовте забарвлення середньої жилки (як для 7)	відсутнє або дуже слабке	1
11	Колоскова луска: забарвлення під час цвітіння	зелене	1
12	Колоскова луска: антоціанове забарвлення (під час цвітіння)	відсутнє або дуже слабке	1
13	Колоскова луска: антоціанове забарвлення опушення (як для 12)	слабке	3
14	Нижня квіткова луска: розвиток остюка (як для 12)	відсутній або дуже слабкий	1
15	Приймочка: антоціанове забарвлення (як для 12)	слабке	3
16	Приймочка: жовте забарвлення (як для 12)	слабке	3
17	Приймочка: за довжиною (як для 12)	дуже коротка	1
18	Квітка: довжина разом з квітконіжкою (як для 12)	дуже коротка	1
19	Волоть: щільність в кінці цвітіння	пухка	3
20	Сухі тичинки: забарвлення (після цвітіння)	оранжево-червоне	4
21	Рослина: за висотою (за досягання)	низька	3
22	Стебло: за товщиною (верхньої третини рослини за досягання)	тонке	3
23	Листок: довжина пластинки третього листка від верхівки (за досягання)	короткий	3
24	Листок: ширина пластинки (як для 23)	вузька	3
25	Волоть: за довжиною без шийки (як для 23)	середня	5
26	Волоть: довжина гілочок (в середній третині волоті)	середні	5
27	Волоть: щільність (за досягання)	помірна	5
28	Волоть: форма (за досягання)	симетрична	3
29	Шийка волоті: видима довжина над піхвою (обгорткою) (як для 21)	коротка	3
30	Колоскова луска: забарвлення за досягання	світло-коричнєве	4
31	Колоскова луска: за довжиною (за досягання)	дуже довга	9
32	Зернівка: забарвлення після досягання	оранжево-червоне	6
33	Зернівки: маса 1000 шт.	середня	5
34	Зернівка: форма зі спинки	округла	7
35	Зернівка: форма у профіль	округла	7
36	Зернівка: розмір зародка	середній	5
37	Зернівка: поверхня, вкрита насінною шкіркою	середня	5
38	Зернівка: вміст таніну	ознака не визначалась	0
39	Зерно: структура ендосперму (в поздовжньому розрізі)	на 3/4 склоподібна	3
40	Зерно: забарвлення склоподібного ендосперму	біле	1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	С	Значення Л	П
Урожайність, ц/га	35,5	72,6	-
Гарантована різниця: ц/га	8,5	17,3	-
%	31,5	31,3	-
Вегетаційний період, днів	116	121	-
Висота рослин, см	103,0	113,4	-
Маса 1000 насінин, г	28,6	28,7	-
Стійкість до полягання, бал	8,9	9,0	-
Стійкість до осипання, бал	9,0	9,0	-
Стійкість до посухи, бал	7,7	9,0	-
Стійкість до пухирчастої сажки, бал	9,0	9,0	-

Стійкість до гельмінтоспоріозу, бал	9,0	9,0	-
Стійкість до кукурудзяного метелику, бал	9,0	9,0	-
Поникання волоті, бал	9,0	9,0	-
Вміст білка, %	12,0	9,4	-
Вміст крохмалю, %	74,0	76,2	-

Група стиглості: пізньостигла

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп

Вид: Сорго звичайне (двокольорове) Sorghum bicolor L.

Заявка №: 10064007 Назва сорту ЕС Арматан

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 29.11.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

06.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140248

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення колеоптиля	слабке	3
2	Паросток: антоціанове забарвлення дорсального боку першого листка	відсутнє або дуже слабке	1
3	Паросток: антоціанове забарвлення піхви першого листка	відсутнє або дуже слабке	1
4	Листок: антоціанове забарвлення пластинки (стадія п'ятого листка)	відсутнє або дуже слабке	1
5	Рослина: час виявлення волоті (50% рослин з волоттю)	середній	5
6	Рослина: за висотою під час викидання волоті	дуже низька	1
7	Листок: зелене забарвлення пластинки (за викидання волоті)	дуже світле	1
8	Прапорцевий листок: поширення знебарвлення середньої жилки (як для 7)	відсутнє або дуже слабке	1
9	Прапорцевий листок: зелене забарвлення середньої жилки у порівнянні з пластинкою листка (якщо не знебарвлена, як для 7)	світліше	1
10	Прапорцевий листок: жовте забарвлення середньої жилки (як для 7)	відсутнє або дуже слабке	1
11	Колоскова луска: забарвлення під час цвітіння	зелене	1
12	Колоскова луска: антоціанове забарвлення (під час цвітіння)	відсутнє або дуже слабке	1
13	Колоскова луска: антоціанове забарвлення опушення (як для 12)	відсутнє або дуже слабке	1
14	Нижня квіткова луска: розвиток остюка (як для 12)	відсутній або дуже слабкий	1
15	Приймочка: антоціанове забарвлення (як для 12)	відсутнє або дуже слабке	1
16	Приймочка: жовте забарвлення (як для 12)	відсутнє або дуже слабке	1
17	Приймочка: за довжиною (як для 12)	дуже коротка	1
18	Квітка: довжина разом з квітконіжкою (як для 12)	дуже коротка	1
19	Волоть: щільність в кінці цвітіння	пухка	3
20	Сухі тичинки: забарвлення (після цвітіння)	оранжеве	3
21	Рослина: за висотою (за досягання)	низька	3
22	Стебло: за товщиною (верхньої третини рослини за досягання)	тонке	3
23	Листок: довжина пластинки третього листка від верхівки (за досягання)	короткий	3
24	Листок: ширина пластинки (як для 23)	вузька	3
25	Волоть: за довжиною без шийки (як для 23)	середня	5
26	Волоть: довжина гілочок (в середній третині волоті)	середні	5
27	Волоть: щільність (за досягання)	помірна	5
28	Волоть: форма (за досягання)	симетрична	3
29	Шийка волоті: видима довжина над піхвою (обгорткою) (як для 21)	середня	5
30	Колоскова луска: забарвлення за досягання	світло-коричневе	4
31	Колоскова луска: за довжиною (за досягання)	коротка	3
32	Зернівка: забарвлення після досягання	оранжеве	5
33	Зернівки: маса 1000 шт.	середня	5
34	Зернівка: форма зі спинки	округла	7
35	Зернівка: форма у профіль	округла	7
36	Зернівка: розмір зародка	дуже малий	1
37	Зернівка: поверхня, вкрита насінною шкіркою	мала	3
38	Зернівка: вміст таніну	ознака не визначалась	0
39	Зерно: структура ендосперму (в поздовжньому розрізі)	на 3/4 склоподібна	3
40	Зерно: забарвлення склоподібного ендосперму	біле	1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	С	Значення Л	П
Урожайність, ц/га	31,7	66,1	-
Гарантована різниця: ц/га	4,7	10,8	-
%	17,4	19,5	-
Вегетаційний період, днів	122	133	-
Висота рослин, см	133,6	141,6	-
Маса 1000 насінин, г	25,7	27,5	-
Стійкість до полягання, бал	8,7	9,0	-
Стійкість до осипання, бал	9,0	9,0	-
Стійкість до посухи, бал	7,9	9,0	-
Стійкість до пухирчастої сажки, бал	9,0	9,0	-

Стійкість до гельмінтоспоріозу, бал	9,0	9,0	-
Стійкість до кукурудзяного метелику, бал	9,0	9,0	-
Поникання волоті, бал	8,9	9,0	-
Вміст білка, %	10,8	9,5	-
Вміст крохмалю, %	74,0	75,6	-

Група стиглості: пізньостигла

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп

Вид: Сорго звичайне (двокольорове) Sorghum bicolor L.

Заявка №: 09064009 Назва сорту KCC19

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

03.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140112

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення колеоптиля	відсутнє або дуже слабке	1
2	Паросток: антоціанове забарвлення дорсального боку першого листка	слабке	3
3	Паросток: антоціанове забарвлення піхви першого листка	сильне	7
4	Листок: антоціанове забарвлення пластинки (стадія п'ятого листка)	відсутнє або дуже слабке	1
5	Рослина: час виявлення волоті (50% рослин з волоттю)	дуже ранній	1
6	Рослина: за висотою під час викидання волоті	дуже низька	1
7	Листок: зелене забарвлення пластинки (за викидання волоті)	дуже темне	9
8	Прапорцевий листок: поширення знебарвлення середньої жилки (як для 7)	відсутнє або дуже слабке	1
9	Прапорцевий листок: зелене забарвлення середньої жилки у порівнянні з пластинкою листка (якщо не знебарвлена, як для 7)	світліше	1
10	Прапорцевий листок: жовте забарвлення середньої жилки (як для 7)	відсутнє або дуже слабке	1
11	Колоскова луска: забарвлення під час цвітіння	світло-зелене	2
12	Колоскова луска: антоціанове забарвлення (під час цвітіння)	відсутнє або дуже слабке	1
13	Колоскова луска: антоціанове забарвлення опушення (як для 12)	відсутнє або дуже слабке	1
14	Нижня квіткова луска: розвиток остюка (як для 12)	відсутній або дуже слабкий	1
15	Приймочка: антоціанове забарвлення (як для 12)	відсутнє або дуже слабке	1
16	Приймочка: жовте забарвлення (як для 12)	помірне	5
17	Приймочка: за довжиною (як для 12)	дуже довга	9
18	Квітка: довжина разом з квітконіжкою (як для 12)	дуже довга	9
19	Волоть: щільність в кінці цвітіння	щільна	7
20	Сухі тичинки: забарвлення (після цвітіння)	оранжево-червоне	4
21	Рослина: за висотою (за досягання)	дуже низька	1
22	Стебло: за товщиною (верхньої третини рослини за досягання)	тонке	3
23	Листок: довжина пластинки третього листка від верхівки (за досягання)	дуже короткий	1
24	Листок: ширина пластинки (як для 23)	вузька	3
25	Волоть: за довжиною без шийки (як для 23)	середня	5
26	Волоть: довжина гілочок (в середній третині волоті)	середні	5
27	Волоть: щільність (за досягання)	нешільна	3
28	Волоть: форма (за досягання)	симетрична	3
29	Шийка волоті: видима довжина над піхвою (обгорткою) (як для 21)	середня	5
30	Колоскова луска: забарвлення за досягання	чорне	7
31	Колоскова луска: за довжиною (за досягання)	середня	5
32	Зернівка: забарвлення після досягання	оранжево-червоне	6
33	Зернівки: маса 1000 шт.	велика	7
34	Зернівка: форма зі спинки	еліптична	5
35	Зернівка: форма у профіль	вузькоеліптична	3
36	Зернівка: розмір зародка	середній	5
37	Зернівка: поверхня, вкрита насінною шкіркою	мала	3
38	Зернівка: вміст таніну	ознака не визначалась	0
39	Зерно: структура ендосперму (в поздовжньому розрізі)	на 3/4 склоподібна	3
40	Зерно: забарвлення склоподібного ендосперму	жовте	3

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	С	Значення Л	П
Урожайність, ц/га	31,8	67,3	-
Гарантована різниця: ц/га	4,8	12,0	-
%	17,8	21,7	-
Вегетаційний період, днів	117	118	-
Висота рослин, см	103,8	111,4	-
Маса 1000 насінин, г	28,6	28,7	-
Стійкість до полягання, бал	8,6	9,0	-
Стійкість до осипання, бал	8,8	9,0	-
Стійкість до посухи, бал	7,9	9,0	-
Стійкість до пухирчастої сажки, бал	9,0	9,0	-

Стійкість до гельмінтоспороїзу, бал	9,0	9,0	-
Стійкість до кукурудзяного метелику, бал	9,0	9,0	-
Поникання волоті, бал	9,0	9,0	-
Вміст білка, %	12,0	10,0	-
Вміст крохмалю, %	75,2	76,4	-
Група стиглості: пізньостигла			

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп

Вид: Сорго звичайне (двокольорове) Sorghum bicolor L.

Заявка №: 09064008 Назва сорту KCC29

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

03.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140111

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення колеоптиля	відсутнє або дуже слабке	1
2	Паросток: антоціанове забарвлення дорсального боку першого листка	відсутнє або дуже слабке	1
3	Паросток: антоціанове забарвлення піхви першого листка	відсутнє або дуже слабке	1
4	Листок: антоціанове забарвлення пластинки (стадія п'ятого листка)	відсутнє або дуже слабке	1
5	Рослина: час виявлення волоті (50% рослин з волоттю)	дуже ранній	1
6	Рослина: за висотою під час викидання волоті	дуже низька	1
7	Листок: зелене забарвлення пластинки (за викидання волоті)	темне	7
8	Прапорцевий листок: поширення знебарвлення середньої жилки (як для 7)	слабке	3
9	Прапорцевий листок: зелене забарвлення середньої жилки у порівнянні з пластинкою листка (якщо не знебарвлена, як для 7)	світліше	1
10	Прапорцевий листок: жовте забарвлення середньої жилки (як для 7)	відсутнє або дуже слабке	1
11	Колоскова луска: забарвлення під час цвітіння	жовто-зелене	3
12	Колоскова луска: антоціанове забарвлення (під час цвітіння)	відсутнє або дуже слабке	1
13	Колоскова луска: антоціанове забарвлення опушення (як для 12)	відсутнє або дуже слабке	1
14	Нижня квіткова луска: розвиток остюка (як для 12)	відсутній або дуже слабкий	1
15	Приймочка: антоціанове забарвлення (як для 12)	відсутнє або дуже слабке	1
16	Приймочка: жовте забарвлення (як для 12)	сильне	7
17	Приймочка: за довжиною (як для 12)	середня	5
18	Квітка: довжина разом з квітконіжкою (як для 12)	дуже довга	9
19	Волоть: щільність в кінці цвітіння	щільна	7
20	Сухі тичинки: забарвлення (після цвітіння)	тьмяно-жовте	1
21	Рослина: за висотою (за досягання)	дуже низька	1
22	Стебло: за товщиною (верхньої третини рослини за досягання)	тонке	3
23	Листок: довжина пластинки третього листка від верхівки (за досягання)	короткий	3
24	Листок: ширина пластинки (як для 23)	вузька	3
25	Волоть: за довжиною без шийки (як для 23)	середня	5
26	Волоть: довжина гілочок (в середній третині волоті)	середні	5
27	Волоть: щільність (за досягання)	помірна	5
28	Волоть: форма (за досягання)	поникла	6
29	Шийка волоті: видима довжина над піхвою (обгорткою) (як для 21)	коротка	3
30	Колоскова луска: забарвлення за досягання	світло-коричневе	4
31	Колоскова луска: за довжиною (за досягання)	середня	5
32	Зернівка: забарвлення після досягання	світло-коричневе	7
33	Зернівки: маса 1000 шт.	велика	7
34	Зернівка: форма зі спинки	округла	7
35	Зернівка: форма у профіль	еліптична	5
36	Зернівка: розмір зародка	великий	7
37	Зернівка: поверхня, вкрита насінною шкіркою	середня	5
38	Зернівка: вміст таніну	ознака не визначалась	0
39	Зерно: структура ендосперму (в поздовжньому розрізі)	на 1/2 склоподібна	5
40	Зерно: забарвлення склоподібного ендосперму	світло-жовте	2

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	С	Значення Л	П
Урожайність, ц/га	35,9	74,1	-
Гарантована різниця: ц/га	8,9	18,8	-
%	33,0	34,0	-
Вегетаційний період, днів	116	120	-
Висота рослин, см	105,9	114,6	-
Маса 1000 насінин, г	27,4	31,7	-
Стійкість до полягання, бал	8,6	9,0	-
Стійкість до осипання, бал	8,8	9,0	-
Стійкість до посухи, бал	8,1	9,0	-
Стійкість до пухирчастої сажки, бал	9,0	9,0	-

Стійкість до гельмінтоспоріозу, бал	9,0	9,0	-
Стійкість до кукурудзяного метелику, бал	9,0	9,0	-
Поникання волоті, бал	8,9	9,0	-
Вміст білка, %	11,6	9,8	-
Вміст крохмалю, %	75,3	76,6	-

Група стиглості: пізньостигла

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп

Вид: Сорго звичайне (двокольорове) Sorghum bicolor L.

Заявка №: 10064004 Назва сорту МР Екліпс

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 29.11.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

27.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140423

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення колеоптиля	відсутнє або дуже слабке	1
2	Паросток: антоціанове забарвлення дорсального боку першого листка	відсутнє або дуже слабке	1
3	Паросток: антоціанове забарвлення піхви першого листка	відсутнє або дуже слабке	1
4	Листок: антоціанове забарвлення пластинки (стадія п'ятого листка)	відсутнє або дуже слабке	1
5	Рослина: час виявлення волоті (50% рослин з волоттю)	пізній	7
6	Рослина: за висотою під час викидання волоті	низька	3
7	Листок: зелене забарвлення пластинки (за викидання волоті)	темне	7
8	Прапорцевий листок: поширення знебарвлення середньої жилки (як для 7)	слабке	3
9	Прапорцевий листок: зелене забарвлення середньої жилки у порівнянні з пластинкою листка (якщо не знебарвлена, як для 7)	світліше	1
10	Прапорцевий листок: жовте забарвлення середньої жилки (як для 7)	відсутнє або дуже слабке	1
11	Колоскова луска: забарвлення під час цвітіння	жовто-зелене	3
12	Колоскова луска: антоціанове забарвлення (під час цвітіння)	відсутнє або дуже слабке	1
13	Колоскова луска: антоціанове забарвлення опушення (як для 12)	відсутнє або дуже слабке	1
14	Нижня квіткова луска: розвиток остюка (як для 12)	відсутній або дуже слабкий	1
15	Приймочка: антоціанове забарвлення (як для 12)	відсутнє або дуже слабке	1
16	Приймочка: жовте забарвлення (як для 12)	помірне	5
17	Приймочка: за довжиною (як для 12)	середня	5
18	Квітка: довжина разом з квітконіжкою (як для 12)	довга	7
19	Волоть: щільність в кінці цвітіння	щільна	7
20	Сухі тичинки: забарвлення (після цвітіння)	червоне	5
21	Рослина: за висотою (за досягання)	середня	5
22	Стебло: за товщиною (верхньої третини рослини за досягання)	середнє	5
23	Листок: довжина пластинки третього листка від верхівки (за досягання)	середній	5
24	Листок: ширина пластинки (як для 23)	середня	5
25	Волоть: за довжиною без шийки (як для 23)	середня	5
26	Волоть: довжина гілочок (в середній третині волоті)	середні	5
27	Волоть: щільність (за досягання)	щільна	7
28	Волоть: форма (за досягання)	ширша в нижній частині	4
29	Шийка волоті: видима довжина над піхвою (обгорткою) (як для 21)	довга	7
30	Колоскова луска: забарвлення за досягання	червоновувато-коричневе	5
31	Колоскова луска: за довжиною (за досягання)	коротка	3
32	Зернівка: забарвлення після досягання	червоно-коричневе	8
33	Зернівки: маса 1000 шт.	велика	7
34	Зернівка: форма зі спинки	еліптична	5
35	Зернівка: форма у профіль	вузькоеліптична	3
36	Зернівка: розмір зародка	малий	3
37	Зернівка: поверхня, вкрита насінною шкіркою	відсутня або дуже мала	1
38	Зернівка: вміст таніну	ознака не визначалась	0
39	Зерно: структура ендосперму (в поздовжньому розрізі)	на 1/2 склоподібна	5
40	Зерно: забарвлення склоподібного ендосперму	жовте	3

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	С	Значення Л	П
Урожайність, ц/га	38,0	69,1	-
Гарантована різниця: ц/га	11,0	13,8	-
%	40,7	25,0	-
Вегетаційний період, днів	121	127	-
Висота рослин, см	100,6	109,0	-
Маса 1000 насінин, г	28,1	30,0	-
Стійкість до полягання, бал	8,9	9,0	-
Стійкість до осипання, бал	8,9	9,0	-
Стійкість до посухи, бал	7,7	9,0	-
Стійкість до пухирчастої сажки, бал	9,0	9,0	-

Стійкість до гельмінтоспороїзу, бал	9,0	9,0	-
Стійкість до кукурудзяного метелику, бал	9,0	9,0	-
Поникання волоті, бал	8,9	9,0	-
Вміст білка, %	10,6	9,5	-
Вміст крохмалю, %	76,6	74,8	-

Група стиглості: пізньостиглий

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп

Вид: Соя культурна Glycine max (L.) Merr.

Заявка №: 10018005 Назва сорту Алігатор

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 25.11.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

04.03.2014

Свідчення про державну реєстрацію № 140249

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення забарвлення	вісутнє	1
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначалась	0
3	Рослина: тип росту	детермінантний	1
4	Рослина: форма росту	пряма	1
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричнєве	2
6	Рослина: за висотою	від середньої до високої	6
7	Листок: пухирчатість	помірна	5
8	Листок: форма бічного листочка (складного листка)	широко яйцевидна	4
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірне	5
13	Насіння: маса 1000 шт.	середня	5
14	Насінина: форма	округло-видовжена	5
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1
16	Насінина: забарвлення, викликане реакцією пероксидази в насінній оболонці	ознака не визначалась	0
17	Насінина: забарвлення рубчика	жовте	2
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	ознака не визначалась	0
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	ранній	3
20	Рослина: час достигання	ранній	3

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	17,1	23,5	21,8
Прибавка до національного стандарту, ц/га	-2,5	0,6	3,8
Прибавка до національного стандарту, %	-12,8	2,6	21,1
Прибавка до умовного стандарту, ц/га	-3,2	0,9	1,4
Прибавка до умовного стандарту, %	-16	4	7
Маса 1000 насінин, г	158,6	182,3	184,9
Висота рослин, см	70,2	68,8	75,6
Вегетаційний період, днів	111	119	127
Стійкість до вилягання, бал	9,0	9,0	8,8
Стійкість до осипання, бал	8,4	8,3	8,8
Стійкість до засухи, бал	7,7	8,6	8,9
Висота прикріплення нижнього бобу, см	10,2	10,1	14,1
Стійкість до пероноспорозу, бал	9,0	9,0	9,0
Стійкість до аскохітозу, бал	9,0	9,0	9,0
Стійкість до бактеріозу, бал	9,0	9,0	8,6
Стійкість до септоріозу, бал	9,0	9,0	9,0
Стійкість до фузаріозу, бал	9,0	9,0	9,0
Вміст білку, %	40,0	36,3	39,4
Вміст олії, %	21,4	23,2	21,6

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Полісся

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.

Заявка №: 10018017 **Назва сорту** Брюненсіс

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 30.11.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

14.03.2014

Свідчення про державну реєстрацію № 140355

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначалась	0
3	Рослина: тип росту	детермінантний	1
4	Рослина: форма росту	пряма	1
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2
6	Рослина: за висотою	середня	5
7	Листок: пухирчатість	слабка	3
8	Листок: форма бічного листочка (складного листка)	широко яйцевидна	4
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	темне	7
13	Насіння: маса 1000 шт.	середня	5
14	Насінина: форма	кулясто-плеската	2
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1
16	Насінина: забарвлення, викликане реакцією пероксидази в насінній оболонці	ознака не визначалась	0
17	Насінина: забарвлення рубчика	світло-коричневе	3
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	ознака не визначалась	0
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	середній	5
20	Рослина: час достигання	середній	5

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	22,8	26,3	21,8
Прибавка до національного стандарту, ц/га	3,2	3,4	3,8
Прибавка до національного стандарту, %	16,3	14,8	21,1
Прибавка до умовного стандарту, ц/га	2,4	3,7	1,4
Прибавка до умовного стандарту, %	12	16	7
Маса 1000 насінин, г	153,7	170,5	177,4
Висота рослин, см	73,3	77,3	81,7
Вегетаційний період, днів	103	114	130
Стійкість до вилягання, бал	9,0	8,9	8,6
Стійкість до осипання, бал	8,3	8,6	8,9
Стійкість до засухи, бал	8,2	8,5	9,0
Висота прикріплення нижнього бобу, см	10,2	10,8	14,4
Стійкість до пероноспорозу, бал	9,0	9,0	9,0
Стійкість до аскохітозу, бал	9,0	9,0	9,0
Стійкість до бактеріозу, бал	9,0	9,0	8,6
Стійкість до септоріозу, бал	9,0	9,0	9,0
Стійкість до фузаріозу, бал	9,0	9,0	9,0
Вміст білку, %	40,8	39,3	41,3
Вміст олії, %	20,0	20,5	19,2

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп, Полісся

Вид: Соя культурна Glycine max (L.) Merr.

Заявка №: 10018014 Назва сорту Галлек

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

04.03.2014

Свідчення про державну реєстрацію № 140118

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3
3	Рослина: тип росту	детермінантний	1
4	Рослина: форма росту	пряма	1
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2
6	Рослина: за висотою	середня	5
7	Листок: пухирчатість	помірна	5
8	Листок: форма бічного листочка (складного листка)	загостреноїцевидна	3
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	світле	3
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірне	5
13	Насіння: маса 1000 шт.	середня	5
14	Насінина: форма	куляста	1
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1
16	Насінина: забарвлення, викликане реакцією пероксидази в насінній оболонці	ознака не визначалась	0
17	Насінина: забарвлення рубчика	жовте	2
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	як у насінної оболонки	1
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	середній	5
20	Рослина: час достигання	середній	5

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	20,7	24,2	21,2
Прибавка до національного стандарту, ц/га	1,1	1,3	3,2
Прибавка до національного стандарту, %	5,6	5,7	17,8
Прибавка до умовного стандарту, ц/га	0,3	1,6	0,8
Прибавка до умовного стандарту, %	2	7	4
Маса 1000 насінин, г	157,1	175,0	184,8
Висота рослин, см	74,3	73,3	79,1
Вегетаційний період, днів	102	114	127
Стійкість до вилягання, бал	8,7	8,6	8,8
Стійкість до осипання, бал	8,5	8,3	8,8
Стійкість до засухи, бал	8,0	8,3	9,0
Висота прикріплення нижнього бобу, см	12,3	11,9	13,4
Стійкість до пероноспорозу, бал	9,0	9,0	9,0
Стійкість до аскохітозу, бал	9,0	9,0	9,0
Стійкість до бактеріозу, бал	9,0	9,0	9,0
Стійкість до септоріозу, бал	9,0	9,0	9,0
Стійкість до фузаріозу, бал	9,0	9,0	9,0
Вміст білку, %	40,7	38,4	40,7
Вміст олії, %	21,0	21,8	20,4

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп, Полісся

Вид: Соя культурна Glycine max (L.) Merr.

Заявка №: 08018016 Назва сорту Кардифф

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

26.02.2014

Свідчення про державну реєстрацію № 140114

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3
3	Рослина: тип росту	від напівдетермінантного до індетермінантного	3
4	Рослина: форма росту	пряма	1
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричнєве	2
6	Рослина: за висотою	висока	7
7	Листок: пухирчатість	помірна	5
8	Листок: форма бічного листочка (складного листка)	загостреноїцевидна	3
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірне	5
13	Насіння: маса 1000 шт.	середня	5
14	Насінина: форма	кулясто-плеската	2
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1
16	Насінина: забарвлення, викликане реакцією пероксидази в насінній оболонці	ознака не визначалась	0
17	Насінина: забарвлення рубчика	жовте	2
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	як у насінної оболонки	1
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	від дуже раннього до раннього	2
20	Рослина: час досягання	від дуже раннього до раннього	2

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	С	Значення Л	П
Урожайність, ц/га	21,3	23,4	
Прибавка до національного стандарту, ц/га	3,6	1,9	
Прибавка до національного стандарту, %	16,7	8,6	
Прибавка до умовного стандарту, ц/га	0,3	1,7	
Прибавка до умовного стандарту, %	2	8	
Маса 1000 насінин, г	155,4	172,4	
Висота рослин, см	76,9	80,1	
Вегетаційний період, днів	119	124	
Стійкість до вилягання, бал	9,0	8,9	
Стійкість до осипання, бал	8,6	8,0	
Стійкість до засухи, бал	8,5	8,3	
Висота прикріплення нижнього бобу, см	10,9	11,7	
Стійкість до пероноспорозу, бал	9,0	9,0	
Стійкість до аскохітозу, бал	9,0	9,0	
Стійкість до бактеріозу, бал	9,0	9,0	
Стійкість до септоріозу, бал	9,0	9,0	
Стійкість до фузаріозу, бал	9,0	9,0	
Вміст білку, %	39,3	39,6	
Вміст олії, %	20,7	20,9	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп

Вид: Соя культурна Glycine max (L.) Merr.
Заявка №: 08018015 Назва сорту Кент

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

26.02.2014

Свідство про державну реєстрацію № 140113

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3
3	Рослина: тип росту	детермінантний	1
4	Рослина: форма росту	пряма	1
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричнєве	2
6	Рослина: за висотою	від низької до середньої	4
7	Листок: пухирчатість	помірна	5
8	Листок: форма бічного листочка (складного листка)	широко яйцевидна	4
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірне	5
13	Насіння: маса 1000 шт.	середня	5
14	Насінина: форма	округло-видовжена	5
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1
16	Насінина: забарвлення, викликане реакцією пероксидази в насінній оболонці	ознака не визначалась	0
17	Насінина: забарвлення рубчика	жовте	2
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	як у насінної оболонки	1
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	середній	5
20	Рослина: час достигання	середній	5

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	19,1	20,4	
Прибавка до національного стандарту, ц/га	1,4	-1,2	
Прибавка до національного стандарту, %	7,6	-5,3	
Прибавка до умовного стандарту, ц/га	-1,9	-1,2	
Прибавка до умовного стандарту, %	-9	-6	
Маса 1000 насінин, г	155,8/	159,6	
Висота рослин, см	73,7	77,8	
Вегетаційний період, днів	117	132	
Стійкість до вилягання, бал	9,0	8,9	
Стійкість до осипання, бал	9,0	8,2	
Стійкість до засухи, бал	8,1	8,0	
Висота прикріплення нижнього бобу, см	9,7	11,7	
Стійкість до пероноспорозу, бал	9,0	9,0	
Стійкість до аскохітозу, бал	9,0	9,0	
Стійкість до бактеріозу, бал	9,0	9,0	
Стійкість до септоріозу, бал	9,0	9,0	
Стійкість до фузаріозу, бал	9,0	9,0	
Вміст білку, %	39,5	39,5	
Вміст олії, %	21,4	21,2	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ

Вид: Соя культурна Glycine max (L.) Merr.

Заявка №: 10018015 Назва сорту Опалін

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 30.11.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

04.03.2014

Свідчення про державну реєстрацію № 140119

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3
3	Рослина: тип росту	детермінантний	1
4	Рослина: форма росту	пряма	1
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2
6	Рослина: за висотою	середня	5
7	Листок: пухирчатість	слабка	3
8	Листок: форма бічного листочка (складного листка)	широко яйцевидна	4
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	світле	3
13	Насіння: маса 1000 шт.	середня	5
14	Насіння: форма	округло-видовжена	5
15	Насіння: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1
16	Насіння: забарвлення, викликане реакцією пероксидази в насінній оболонці	ознака не визначалась	0
17	Насіння: забарвлення рубчика	жовте	2
18	Насіння: забарвлення сім'янки рубчика	як у насінній оболонки	1
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	від раннього до середнього	4
20	Рослина: час достигання	від раннього до середнього	4

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	15,6	22,6	21,4
Прибавка до національного стандарту, ц/га	-2,4	-0,7	3,4
Прибавка до національного стандарту, %	-13,3	-3,0	18,9
Прибавка до умовного стандарту, ц/га	-4,9	0,7	-0,6
Прибавка до умовного стандарту, %	-24	3	-3
Маса 1000 насінин, г	147,2	168,6	172,7
Висота рослин, см	73,3	81,5	90,9
Вегетаційний період, днів	107	120	132
Стійкість до вилягання, бал	8,7	8,8	8,7
Стійкість до осипання, бал	7,3	7,9	9,0
Стійкість до засухи, бал	7,7	8,2	9,0
Висота прикріплення нижнього бобу, см	10,5	12,0	15,6
Стійкість до пероноспорозу, бал	9,0	9,0	9,0
Стійкість до аскохітозу, бал	9,0	9,0	9,0
Стійкість до бактеріозу, бал	9,0	9,0	9,0
Стійкість до септоріозу, бал	9,0	9,0	9,0
Стійкість до фузаріозу, бал	9,0	9,0	9,0
Вміст білку, %	38,3	37,0	38,5
Вміст олії, %	21,4	21,8	21,3

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Полісся

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.
Заявка №: 10018007 **Назва сорту** Опус

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 29.11.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

14.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140354

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	середня	5
3	Рослина: тип росту	детермінантний	1
4	Рослина: форма росту	пряма	1
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричнєве	2
6	Рослина: за висотою	від середньої до високої	6
7	Листок: пухирчатість	помірна	5
8	Листок: форма бічного листочка (складного листка)	загостреноїцеvidна	3
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірне	5
13	Насіння: маса 1000 шт.	середня	5
14	Насінина: форма	округло-видовжена	5
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1
16	Насінина: забарвлення, викликане реакцією пероксидази в насінній оболонці	ознака не визначалась	0
17	Насінина: забарвлення рубчика	жовте	2
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	як у насінної оболонки	1
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	від раннього до середнього	4
20	Рослина: час достигання	ранній	3

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	19,7	24,5	22,5
Прибавка до національного стандарту, ц/га	0,1	1,6	4,5
Прибавка до національного стандарту, %	0,5	7,0	25,0
Прибавка до умовного стандарту, ц/га	-0,6	1,9	2,1
Прибавка до умовного стандарту, %	-3	8	10
Маса 1000 насінин, г	163,5	172,8	175,8
Висота рослин, см	73,3	75,5	85,6
Вегетаційний період, днів	111	119	129
Стійкість до вилягання, бал	9,0	8,9	8,5
Стійкість до осипання, бал	8,6	8,7	8,5
Стійкість до засухи, бал	7,7	8,7	8,9
Висота прикріплення нижнього бобу, см	9,9	10,9	14,0
Стійкість до пероноспорозу, бал	9,0	9,0	9,0
Стійкість до аскохітозу, бал	9,0	9,0	9,0
Стійкість до бактеріозу, бал	9,0	9,0	9,0
Стійкість до септоріозу, бал	9,0	9,0	9,0
Стійкість до фузаріозу, бал	9,0	9,0	9,0
Вміст білку, %	42,9	40,2	42,8
Вміст олії, %	19,3	20,3	19,5

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп, Полісся

Вид: Соя культурна Glycine max (L.) Merr.

Заявка №: 10018011 Назва сорту Сігалія

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 29.11.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

04.03.2014

Свідство про державну реєстрацію № 140115

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	дуже слабка	1
3	Рослина: тип росту	детермінантний	1
4	Рослина: форма росту	пряма	1
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричнєве	2
6	Рослина: за висотою	від середньої до високої	6
7	Листок: пухирчатість	слабка	3
8	Листок: форма бічного листочка (складного листка)	загостреноїцевидна	3
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірне	5
13	Насіння: маса 1000 шт.	середня	5
14	Насіння: форма	кулясто-плеската	2
15	Насіння: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1
16	Насіння: забарвлення, викликане реакцією пероксидази в насінній оболонці	ознака не визначалась	0
17	Насіння: забарвлення рубчика	чорне	6
18	Насіння: забарвлення сім'янки рубчика	як у насінній оболонки	1
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	від середнього до пізнього	6
20	Рослина: час достигання	від середнього до пізнього	6

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	20,8	24,8	
Прибавка до національного стандарту, ц/га	4,7	3,1	
Прибавка до національного стандарту, %	29,2	14,3	
Прибавка до умовного стандарту, ц/га	1,2	4,2	
Прибавка до умовного стандарту, %	6	20	
Маса 1000 насінин, г	166,7	183,0	
Висота рослин, см	77,1	80,3	
Вегетаційний період, днів	118	129	
Стійкість до вилягання, бал	9,0	8,8	
Стійкість до осипання, бал	9,0	8,7	
Стійкість до засухи, бал	8,3	8,5	
Висота прикріплення нижнього бобу, см	12,3	12,9	
Стійкість до пероноспорозу, бал	9,0	9,0	
Стійкість до аскохітозу, бал	9,0	9,0	
Стійкість до бактеріозу, бал	9,0	9,0	
Стійкість до септоріозу, бал	9,0	9,0	
Стійкість до фузаріозу, бал	9,0	9,0	
Вміст білку, %	38,6	38,7	
Вміст олії, %	21,4	21,5	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп

Вид: Соя культурна Glycine max (L.) Merr.

Заявка №: 10018012 Назва сорту Сінара

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 29.11.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

04.03.2014

Свідчення про державну реєстрацію № 140116

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	дуже слабка	1
3	Рослина: тип росту	індетермінантний	4
4	Рослина: форма росту	пряма	1
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричнєве	2
6	Рослина: за висотою	від середньої до високої	6
7	Листок: пухирчатість	помірна	5
8	Листок: форма бічного листочка (складного листка)	загостреноїцевидна	3
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірне	5
13	Насіння: маса 1000 шт.	середня	5
14	Насіння: форма	округло-видовжена	5
15	Насіння: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1
16	Насіння: забарвлення, викликане реакцією пероксидази в насінній оболонці	ознака не визначалась	0
17	Насіння: забарвлення рубчика	чорне	6
18	Насіння: забарвлення сім'янки рубчика	як у насінній оболонки	1
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	від середнього до пізнього	6
20	Рослина: час достигання	від середнього до пізнього	6

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	19,1	24,7	
Прибавка до національного стандарту, ц/га	3,0	3,0	
Прибавка до національного стандарту, %	18,6	13,8	
Прибавка до умовного стандарту, ц/га	-0,4	4,1	
Прибавка до умовного стандарту, %	-2	20	
Маса 1000 насінин, г	165,8	183,7	
Висота рослин, см	78,1	79,7	
Вегетаційний період, днів	122	133	
Стійкість до вилягання, бал	9,0	8,9	
Стійкість до осипання, бал	9,0	8,7	
Стійкість до засухи, бал	8,3	8,4	
Висота прикріплення нижнього бобу, см	10,0	11,7	
Стійкість до пероноспорозу, бал	9,0	9,0	
Стійкість до аскохітозу, бал	9,0	9,0	
Стійкість до бактеріозу, бал	9,0	9,0	
Стійкість до септоріозу, бал	9,0	9,0	
Стійкість до фузаріозу, бал	9,0	9,0	
Вміст білку, %	39,0	38,0	
Вміст олії, %	21,0	21,8	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп

Вид: Соя культурна Glycine max (L.) Merr.

Заявка №: 10018013 Назва сорту Султана

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 29.11.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

04.03.2014

Свідство про державну реєстрацію № 140117

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	дуже слабка	1
3	Рослина: тип росту	індетермінантний	4
4	Рослина: форма росту	пряма	1
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2
6	Рослина: за висотою	від низької до середньої	4
7	Листок: пухирчатість	слабка	3
8	Листок: форма бічного листочка (складного листка)	загостреноїцевидна	3
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірне	5
13	Насіння: маса 1000 шт.	середня	5
14	Насінина: форма	округло-видовжена	5
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1
16	Насінина: забарвлення, викликане реакцією пероксидази в насінній оболонці	ознака не визначалась	0
17	Насінина: забарвлення рубчика	світло-коричневе	3
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	як у насінної оболонки	1
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	ранній	3
20	Рослина: час достигання	ранній	3

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	18,1	23,8	
Прибавка до національного стандарту, ц/га	2,0	2,1	
Прибавка до національного стандарту, %	12,4	9,7	
Прибавка до умовного стандарту, ц/га	-1,5	3,2	
Прибавка до умовного стандарту, %	-8	16	
Маса 1000 насінин, г	164,4	174,7	
Висота рослин, см	65,8	66,3	
Вегетаційний період, днів	115	122	
Стійкість до вилягання, бал	9,0	9,0	
Стійкість до осипання, бал	8,4	8,1	
Стійкість до засухи, бал	8,2	8,5	
Висота прикріплення нижнього бобу, см	8,9	10,4	
Стійкість до пероноспорозу, бал	9,0	9,0	
Стійкість до аскохітозу, бал	9,0	9,0	
Стійкість до бактеріозу, бал	9,0	9,0	
Стійкість до септоріозу, бал	9,0	9,0	
Стійкість до фузаріозу, бал	9,0	9,0	
Вміст білку, %	41,5	38,7	
Вміст олії, %	20,4	22,2	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп

Вид: Тритикале (яре) Triticosecale Witt.

Заявка №: 10011001 Назва сорту Лебідь харківський

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 05.11.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

13.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140309

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: за плоідністю	гексаплоїд	6
2	Колеоптіль: антоціанове забарвлення	помірне	5
3	Рослина: форма куща	напівпрямий	3
4	Рослина: частота рослин з похилими прапорцевими листками	середня кількість	5
5	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	слабке	3
6	Початок колосіння (перший колосок помітний у 50% рослин)	середнє	5
7	Прапорцевий листок: сизий наліт на піхві	помірний	5
8	Остюки: антоціанове забарвлення	слабке	3
9	Пиляки: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
10	Прапорцевий листок: довжина листкової пластинки	дуже коротка	1
11	Прапорцевий листок: ширина листкової пластинки	вузька	3
12	Колос: сизий наліт	помірний	5
13	Стебло: інтенсивність опушення верхнього (підколосового) міжвузля	дуже сильне	9
14	Рослина: висота (разом зі стеблом, колосом та остюками)	дуже низька	1
15	Колос: розміщення остюків	за всією довжиною	3
16	Остюки: довжина відносно колосу	короткі	3
17	Нижня колоскова луска: довжина кільового зубця (колосок із середньої третини колоса)	середній	5
18	Нижня колоскова луска: розмір другого зубця (як для 17)	відсутній або дуже малий	1
19	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні (як для 17)	відсутнє	1
20	Соломина: виповнення у поперечному розрізі (між основою колосу і верхнім вузлом)	середньо-виповнена	5
21	Колос: за кольором	сіро-димчастий	2
22	Колос: за щільністю	нещільний	3
23	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	5
24	Колос: за шириною (вигляд збоку)	середній	5
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	ознака не визначена	0
26	Тип розвитку	ярий	3
27	Колос: за формою	пірамідальний	1
28	Колос: наявність остюків	наявні	9
29	Вісь колосу: за міцністю	гнучка	9
30	Колосок: кількість квіток	мало	3
31	Колосок: плідність квіток	плідні	1
32	Зернівка: за формою	видовжена	5
33	Зернівка: за кольором	світло-коричнева	3
34	Зернівка: характер поверхні	слабко зморшкувата	7
35	Зернівка: за крупністю	середня	5
36	Колос: положення в просторі	прямий	1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	С	Значення Л	П
Урожайність, ц/га	18,4	28,1	30,8
Гарантоване відхилення:			
ц/га	1,2	-2,8	2
%	6,9	-9	6,9
Вегетаційний період, дн	81	91	89
Висота рослин, см	82	83	88
Маса 1000 зерн., г	37,7	38,5	42,3
Стійкість до, бал			
полягання	8,8	8,7	8,7
осипання	9,0	8,9	8,8
посухи	6,9	7,8	7,9
борошнистої роси	9,0	9,0	9,0
гнилей кореневих	9,0	9,0	9,0
бурої іржі	9,0	9,0	9,0

фузаріозу	9,0	9,0	9,0
Вміст білку, %	13,8	15,0	14,2
Напряв використання	зерно	зерно	зерно

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Полісся

Вид: Ячмінь звичайний (ярий) *Hordeum vulgare* L.

Заявка №: 10012029 Назва сорту Аграрій

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 30.11.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

13.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140311

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: габітус	напівпрямий	3
2	Нижні листки: опушення піхви	відсутнє	1
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	наявне	9
4	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	помірне	5
5	Рослина: частота рослин з викривленим прапорцевим листком	багато	7
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7
7	Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середнє	5
8	Остюки: наявність антоціанового забарвлення кінчиків	наявне	9
9	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків	слабке	3
10	Колос: восковий наліт	помірний	5
11	Колос: положення у просторі	напівпряме	3
12	Рослина: за висотою (стебло, колос з остюками)	середня	5
13	Колос: кількість рядів	два	1
14	Колос: форма	циліндрична	5
15	Колос: за щільністю	нещільний	3
16	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	2
17	Остюки: за довжиною (порівняно з колосом)	довші	3
18	Стрижень колосу: довжина першого сегменту	середній	5
19	Стрижень колоса: вигин першого сегмента	помірний	5
20	Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)	від паралельного до ледь відхиленого	2
21	Середній колосок: довжина колоскової луски і остюка відносно зернівки	рівна	2
22	Зернівка: довжина волосків основної щетинки	короткі	1
23	Зернівка: наявність плівки	наявна	9
24	Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски	помірне	5
25	Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски	відсутнє або дуже слабке	1
26	Зернівка: опушення вентральної боріздки	відсутнє	1
27	Зернівка: розташування лодикул	охоплююче	2
28	Зернівка: забарвлення алеїронового шару	біляста	1
29	Тип розвитку	ярий	3
30	Колос: остюки	наявні	9
31	Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення	остюки	5
32	Зернівка: форма	видовжено-еліптична	5
33	Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски	тонкозморшківата	1
34	Тільки для пливчастих сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски	відсутнє	9
35	Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка	поступовий	2
36	Вушка: форма верхівки	шилоподібна	3
37	Вушка: охоплення соломини	повне	2
38	Язичок: ступінь виявлення	середній	5
39	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса і верхнім вузлом)	слабко виповнена	3
40	Рослина: утворення пилку (чоловіча стерильність)	наявна	9

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	С	Значення Л	П
Урожайність, ц/га	31	42,7	35,1
Гарантована прибавка, ц/га	3,6	2,8	1,3
%	13,1	7	3,8
Вегетаційний період, дн.	81	80	85
Висота рослин, см	55,2	63,0	61,8
Маса 1000 насінин, г	39,3	43,3	43,2
Стійкість до:			
- вилягання	8,9	8,3	8,5
- осипання	9,0	8,6	8,7
- посухи	7,2	7,9	8,6

- гельмінтоспориозу	8,3	8,3	7,6
- сажки	8,7	8,9	8,7
- борошнистої роси	8,4	8,5	7,9
Якісні характеристики:			
- вміст білку, %	14,0	13,6	12,8
- вирівняність зерна, %	86,3	94,9	93,7

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп, Полісся

Вид: Ячмінь звичайний (ярий) *Hordeum vulgare* L.

Заявка №: 10012026 Назва сорту Алегро

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 30.11.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

13.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140310

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: габітус	напівпрямий	3
2	Нижні листки: опушення піхви	відсутнє	1
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	наявне	9
4	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	помірне	5
5	Рослина: частота рослин з викривленим прапорцевим листком	середньо	5
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7
7	Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середнє	5
8	Остюки: наявність антоціанового забарвлення кінчиків	наявне	9
9	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків	слабке	3
10	Колос: восковий наліт	сильний	7
11	Колос: положення у просторі	напівпряме	3
12	Рослина: за висотою (стебло, колос з остюками)	середня	5
13	Колос: кількість рядів	два	1
14	Колос: форма	циліндрична	5
15	Колос: за щільністю	нещільний	3
16	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	2
17	Остюки: за довжиною (порівняно з колосом)	довші	3
18	Стрижень колосу: довжина першого сегменту	середній	5
19	Стрижень колоса: вигин першого сегмента	помірний	5
20	Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)	відхилене	3
21	Середній колосок: довжина колоскової луски і остюка відносно зернівки	рівна	2
22	Зернівка: довжина волосків основної щетинки	довгі	2
23	Зернівка: наявність плівки	наявна	9
24	Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски	слабке	3
25	Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски	відсутнє або дуже слабке	1
26	Зернівка: опушення вентральної борізки	відсутнє	1
27	Зернівка: розташування лодикул	охоплююче	2
28	Зернівка: забарвлення алеїронового шару	слабко забарвлена	2
29	Тип розвитку	ярий	3
30	Колос: остюки	наявні	9
31	Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення	остюки	5
32	Зернівка: форма	видовжено-еліптична	5
33	Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски	тонкозморшківата	1
34	Тільки для плівчастих сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски	відсутнє	9
35	Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка	поступовий	2
36	Вушка: форма верхівки	загострена	2
37	Вушка: охоплення соломини	повне	2
38	Язичок: ступінь виявлення	середній	5
39	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса і верхнім вузлом)	слабко виповнена	3
40	Рослина: утворення пилку (чоловіча стерильність)	наявна	9

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц / га	30	41,2	35
Гарантована прибавка, ц / га	2,6	1,3	1,2
%	9,4	3,2	3,5
Вегетаційний період, дн.	81	80	84
Висота рослин, см	57,9	62	66,1
Маса 1000 насінин, г	43,1	46,7	46,0
Стійкість до :			
- вилягання	9,0	8,2	8,5
- осипання	9,0	8,6	8,8
- посухи	7,4	7,7	8,5
- гельмінтоспороїзу	8,3	8,1	7,7

- сажки	9,0	9,0	8,6
- борошнистої роси	8,4	8,5	7,6
Якісні характеристики:			
- вміст білку, %	14,5	14,1	13,5
- вирівняність зерна, %	94,2	97,9	96,0

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп, Полісся

Вид: Ячмінь звичайний (ярий) *Hordeum vulgare* L.
Заявка №: 10012012 **Назва сорту** Барвистий

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 24.11.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

27.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140424

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: габітус	напівпрямий	3
2	Нижні листки: опушення піхви	відсутнє	1
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	наявне	9
4	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	помірне	5
5	Рослина: частота рослин з викривленим прапорцевим листком	середньо	5
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7
7	Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середнє	5
8	Остюки: наявність антоціанового забарвлення кінчиків	наявне	9
9	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків	помірне	5
10	Колос: восковий наліт	сильний	7
11	Колос: положення у просторі	горизонтальне	5
12	Рослина: за висотою (стебло, колос з остюками)	середня	5
13	Колос: кількість рядів	два	1
14	Колос: форма	циліндрична	5
15	Колос: за щільністю	нещільний	3
16	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	2
17	Остюки: за довжиною (порівняно з колосом)	довші	3
18	Стрижень колосу: довжина першого сегменту	довгий	7
19	Стрижень колоса: вигин першого сегмента	помірний	5
20	Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)	від паралельного до ледь відхиленого	2
21	Середній колосок: довжина колоскової луски і остюка відносно зернівки	рівна	2
22	Зернівка: довжина волосків основної щетинки	короткі	1
23	Зернівка: наявність плівки	наявна	9
24	Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски	слабке	3
25	Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски	відсутнє або дуже слабке	1
26	Зернівка: опушення вентральної боріздки	відсутнє	1
27	Зернівка: розташування лодикул	охоплююче	2
28	Зернівка: забарвлення алеїронового шару	слабко забарвлена	2
29	Тип розвитку	ярий	3
30	Колос: остюки	наявні	9
31	Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення	остюки	5
32	Зернівка: форма	видовжено-еліптична	5
33	Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски	тонкозморшківата	1
34	Тільки для пливчастих сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски	відсутнє	9
35	Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка	поступовий	2
36	Вушка: форма верхівки	загострена	2
37	Вушка: охоплення соломини	повне	2
38	Язичок: ступінь виявлення	середній	5
39	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса і верхнім вузлом)	слабко виповнена	3
40	Рослина: утворення пилку (чоловіча стерильність)	наявна	9

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	С	Значення Л	П
Урожайність, ц / га	29	43,2	33,9
Гарантована прибавка, ц / га	1,6	3,3	0,1
%	5,8	8,2	0,2
Вегетаційний період, дн.	81	81	85
Висота рослин, см	56,3	65,1	64,9
Маса 1000 насінин, г	40,5	44,4	43,4
Стійкість до :			
- вилягання	9,0	8,5	8,5
- осипання	8,9	8,7	8,7
- посухи	7,3	8,0	8,4

- гельмінтоспориозу	8,2	8,3	7,4
- сажки	8,8	8,9	8,5
- борошнистої роси	8,8	8,1	7,5
Якісні характеристики:			
- вміст білку, %	13,6	13,3	13,4
- вирівняність зерна, %	91,0	96,8	95,3

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп, Полісся

Вид: Ячмінь звичайний (ярий) *Hordeum vulgare* L.

Заявка №: 09012020 Назва сорту Натасія

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 01.12.2009

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

17.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140357

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: габітус	напівпрямий	3
2	Нижні листки: опушення піхви	відсутнє	1
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	наявне	9
4	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	помірне	5
5	Рослина: частота рослин з викривленим прапорцевим листком	мало	3
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7
7	Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середнє	5
8	Остюки: наявність антоціанового забарвлення кінчиків	наявне	9
9	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків	слабке	3
10	Колос: восковий наліт	сильний	7
11	Колос: положення у просторі	напівпряме	3
12	Рослина: за висотою (стебло, колос з остюками)	середня	5
13	Колос: кількість рядів	два	1
14	Колос: форма	циліндрична	5
15	Колос: за щільністю	нещільний	3
16	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	2
17	Остюки: за довжиною (порівняно з колосом)	довші	3
18	Стрижень колосу: довжина першого сегменту	короткий	3
19	Стрижень колоса: вигин першого сегмента	помірний	5
20	Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)	відхилене	3
21	Середній колосок: довжина колоскової луски і остюка відносно зернівки	довша	3
22	Зернівка: довжина волосків основної щетинки	довгі	2
23	Зернівка: наявність плівки	наявна	9
24	Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски	слабке	3
25	Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски	відсутнє або дуже слабке	1
26	Зернівка: опушення вентральної борідки	відсутнє	1
27	Зернівка: розташування лодикул	охоплююче	2
28	Зернівка: забарвлення алеїронового шару	біляста	1
29	Тип розвитку	ярий	3
30	Колос: остюки	наявні	9
31	Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення	остюки	5
32	Зернівка: форма	видовжено-еліптична	5
33	Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски	тонкозморшкувата	1
34	Тільки для плівчастих сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски	відсутнє	9
35	Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка	поступовий	2
36	Вушка: форма верхівки	загострена	2
37	Вушка: охоплення соломини	повне	2
38	Язичок: ступінь виявлення	середній	5
39	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса і верхнім вузлом)	слабко виповнена	3
40	Рослина: утворення пилку (чоловіча стерильність)	наявна	9

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц / га	29,3	42,7	36,6
Гарантована прибавка, ц / га	1,9	2,8	2,8
%	6,9	7	8,2
Вегетаційний період, дн.	81	82	86
Висота рослин, см	56,7	62,5	62,5
Маса 1000 насінин, г	44,3	47,5	46,6
Стійкість до :			
- вилягання	8,9	8,8	8,5
- осипання	9,0	8,6	8,7
- посухи	7,0	7,7	8,3
- гельмінтоспороїзу	8,3	8,1	7,7

- сажки	9,0	9,0	8,7
- борошнистої роси	8,4	8,7	7,9
Якісні характеристики:			
- вміст білку, %	13,2	13,0	12,9
- вирівняність зерна, %	96,9	98,8	97,6

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп

Вид: Вербя прутувидна *Salix viminalis* L.

Заявка №: 13373002 **Назва сорту** Вільгельм

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.02.2014 **Патент №:** 140001

Дата пріоритету 22.11.2013

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.02.2014

Свідчення про державну реєстрацію № 140002

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: стать	дводомна чоловіча	2
2	Рослина: час появи листків	середній	5
3	Головний пагін: за формою	прямий	1
4	Головний пагін: колір (з-під сонячного боку у середній третині)	світло-сірий	5
5	Головний пагін: опушення	відсутнє або дуже слабке	1
6	Головний пагін: проявлення сочевичок	помірне	5
7	Головний пагін: колір листової бруньки	помірно зелений	2
8	Головний пагін: опушення листової бруньки	відсутнє або дуже слабке	1
9	Головний пагін: кількість гілок завдовжки понад 5 см	середня кількість	5
10	Гілка: кут між першими 5 см гілки і головним пагоном у середній третині	середній	5
11	Гілка: положення	пряме	1
12	Гілка: колір (з-під сонячного боку)	жовто-зелений	1
13	Листкова пластинка: довжина середньої жилки	довга	7
14	Листкова пластинка: за шириною	вузька	3
15	Листкова пластинка: місце найбільшої ширини	нижче середини	1
16	Листкова пластинка: форма основи	гостра	2
17	Листкова пластинка: колір верхнього боку	помірно зелений	3
18	Листкова пластинка: опушення верхнього боку	відсутнє або дуже слабке	1
19	Листкова пластинка: опушення нижнього боку	слабке	3
20	Черешок: за довжиною	короткий	3
21	Черешок: колір верхнього боку	жовто-сірий	1
22	Прилисток: за довжиною	дуже короткий	1
23	Прилисток: тип	тип 2	2

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

*Урожайність сирової біомаси 60,0 т/га, вихід сухої речовини 30,0 т/га. Термін використання плантації 20 років, періодичність збирання сировини 3 роки. Вихід енергії 576,0 ГДж/га, енергетичні витрати на виробництво за рік 29,0 ГДж/га, теплотворність пального 19,2 МДж/кг, зольність пального 1,6%.

*Дані заявника

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Степ

Вид: Виноград справжній Vitis vinifera L.

Заявка №: 12073002 **Назва сорту** Мальбек

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

20.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140376

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Час розгортання бруньок (розгорнулось 50 % бруньок на 50 % рослин)	середній	5
2	Молодий пагін: відкритість верхівки	повністю відкрита	5
3	Молодий пагін: густота прилеглих волосків на верхівці	помірні	5
4	Молодий пагін: антоціанове забарвлення прилеглих волосків на верхівці	слабке	3
5	Молодий пагін: густота прямих волосків на верхівці	слабке	3
6	Молодий листок: колір верхнього боку пластинки	зелений	2
7	Молодий листок: густота прилеглих волосків між жилками на нижньому боці пластинки	помірні	5
8	Молодий листок: густота прямих волосків на жилках із нижнього боку пластинки	густі	7
9	Пагін: положення в просторі	напівпряме	3
10	Пагін: колір дорсального боку міжвузлів	зелений	1
11	Пагін: колір вентрального боку міжвузлів	зелений	1
12	Пагін: колір дорсального боку вузлів	зелений	1
13	Пагін: колір вентрального боку вузлів	зелений	1
14	Пагін: густота прямих волосків на міжвузлях	відсутні або дуже рідкі	1
15	Пагін: довжина вусяків	середні	5
16	Квітка: статеві органи	добре розвинені тичинки і добре розвинена маточка	3
17	Розвинений листок: за розміром пластинки	середній	5
18	Розвинений листок: форма пластинки	п'ятикутна	3
19	Розвинений листок: пухирчатість верхнього боку пластинки	помірна	5
20	Розвинений листок: кількість лопатей	три	2
21	Розвинений листок: глибина листкових вирізів (між лопатями листка)	неглибокі	3
22	Лише сорти з лопатевими листками. Розвинений листок: розташування лопатей верхніх листкових вирізів	відкрите	1
23	Розвинений листок: розташування лопатей біля черешка	широко відкрите	2
24	Розвинений листок: довжина зубців	короткі	3
25	Розвинений листок: відношення довжини до ширини зубців	мале	3
26	Розвинений листок: форма зубців	поєднання зубців із обома прямолінійними боками та обома випуклими	5
27	Розвинений листок: антоціанове забарвлення головних жилок на верхньому боці пластинки	слабке	3
28	Розвинений листок: густота прилеглих волосків між жилками з нижнього боку пластинки	помірні	5
29	Розвинений листок: густота прямих волосків на жилках з нижнього боку пластинки	рідкі	3
30	Розвинений листок: довжина черешка порівняно із головною жилкою	однакові	3
31	Час початку достигання ягід	середній	5
32	Гроно: за розміром (без ніжки)	середнє	5
33	Гроно: за щільністю	середнє	5
34	Гроно: довжина ніжки первинного грона	коротка	3
35	Ягода: за розміром	середня	5
36	Ягода: форма	куляста	2
37	Ягода: колір шкірки (без воскового нальоту)	блакитно-чорний	9
38	Ягода: відокремлюваність від плодоніжки (легкість відривання)	порівняно легко	2
39	Ягода: товщина шкірки	середня	2
40	Ягода: антоціанове забарвлення м'якоті	відсутнє або дуже слабке	1
41	Ягода: твердість м'якоті	м'яка або твердувата	1
42	Ягода: особливий аромат	відсутній	1
43	Ягода: формування насіння	повноцінне	3
44	Здерев'янілий пагін: основне забарвлення	оранжево-коричнєве	2

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожайність 147 ц/га. Середній урожай з куща 3,8 кг. Середня маса 100 ягід 255 г. Рівень підмерзання бруньок та лози 4 - 6 балів, стійкість до посухи 5 балів. Стійкість до ураження сірою гниллю – 7 балів, міддю та оїдіумом 5, до пошкодження листокрутною 5

балів, філоксерою 3. Напрямок використання технічний. Група стиглості середня.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Степ

Вид: Виноград справжній Vitis vinifera L.

Заявка №: 13304001 **Назва сорту** Каберне Фран

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

20.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140377

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Час розгортання бруньок (розгорнулось 50 % бруньок на 50 % рослин)	середній	5
2	Молодий пагін: відкритість верхівки	повністю відкрита	5
3	Молодий пагін: густота прилеглих волосків на верхівці	помірні	5
4	Молодий пагін: антоціанове забарвлення прилеглих волосків на верхівці	слабке	3
5	Молодий пагін: густота прямих волосків на верхівці	слабке	3
6	Молодий листок: колір верхнього боку пластинки	світлий мідно-червоний	4
7	Молодий листок: густота прилеглих волосків між жилками на нижньому боці пластинки	помірні	5
8	Молодий листок: густота прямих волосків на жилках із нижнього боку пластинки	відсутні або дуже рідкі	1
9	Пагін: положення в просторі	горизонтальне	5
10	Пагін: колір дорсального боку міжвузлів	зелений і червоний	2
11	Пагін: колір вентрального боку міжвузлів	зелений і червоний	2
12	Пагін: колір дорсального боку вузлів	зелений і червоний	2
13	Пагін: колір вентрального боку вузлів	зелений і червоний	2
14	Пагін: густота прямих волосків на міжвузлях	відсутні або дуже рідкі	1
15	Пагін: довжина вусяків	довгі	7
16	Квітка: статеві органи	добре розвинені тичинки і добре розвинена маточка	3
17	Розвинений листок: за розміром пластинки	середній	5
18	Розвинений листок: форма пластинки	п'ятикутна	3
19	Розвинений листок: пухирчатість верхнього боку пластинки	сильна	7
20	Розвинений листок: кількість лопатей	сім	4
21	Розвинений листок: глибина листкових вирізів (між лопатями листка)	середні	5
22	Лише сорти з лопатевими листками. Розвинений листок: розташування лопатей верхніх листкових вирізів	відкрите	1
23	Розвинений листок: розташування лопатей біля черешка	перекриваються	7
24	Розвинений листок: довжина зубців	середні	5
25	Розвинений листок: відношення довжини до ширини зубців	мале	3
26	Розвинений листок: форма зубців	обидва боки випуклі	3
27	Розвинений листок: антоціанове забарвлення головних жилок на верхньому боці пластинки	відсутнє або дуже слабке	1
28	Розвинений листок: густота прилеглих волосків між жилками з нижнього боку пластинки	помірні	5
29	Розвинений листок: густота прямих волосків на жилках з нижнього боку пластинки	відсутні або дуже рідкі	1
30	Розвинений листок: довжина черешка порівняно із головною жилкою	трохи довший	4
31	Час початку достигання ягід	середній	5
32	Гроно: за розміром (без ніжки)	середнє	5
33	Гроно: за щільністю	щільне	7
34	Гроно: довжина ніжки первинного грона	середня	5
35	Ягода: за розміром	середня	5
36	Ягода: форма	широкоеліптична	3
37	Ягода: колір шкірки (без воскового нальоту)	блакитно-чорний	9
38	Ягода: відокремлюваність від плодоніжки (легкість відривання)	порівняно легко	2
39	Ягода: товщина шкірки	товста	3
40	Ягода: антоціанове забарвлення м'якоті	відсутнє або дуже слабке	1
41	Ягода: твердість м'якоті	м'яка або твердувата	1
42	Ягода: особливий аромат	інший, ніж вище-перераховані	5
43	Ягода: формування насіння	повноцінне	3
44	Здерев'янілий пагін: основне забарвлення	темно-коричневе	3

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожайність 148 ц/га. Середній урожай з куща 6,7 кг. Середня маса 100 ягід 183 г. Рівень підмерзання бруньок та лози 5 - 5,5 балів, стійкість до посухи 5 балів. Стійкість до ураження сірою гниллю, міддю та оїдіумом 7 балів, до пошкодження листокрутою 7 балів, філоксерою 3. Напрямок використання технічний. Група стиглості середньопізня.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
Степ

Вид: Виноград справжній Vitis vinifera L.

Заявка №: 13304002 **Назва сорту** Гренаш чорний

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

20.03.2014

Свідчення про державну реєстрацію № 140378

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Час розгортання бруньок (розгорнулось 50 % бруньок на 50 % рослин)	середній	5
2	Молодий пагін: відкритість верхівки	повністю відкрита	5
3	Молодий пагін: густота прилеглих волосків на верхівці	рідкі	3
4	Молодий пагін: антоціанове забарвлення прилеглих волосків на верхівці	відсутнє або дуже слабке	1
5	Молодий пагін: густота прямих волосків на верхівці	слабке	3
6	Молодий листок: колір верхнього боку пластинки	зелений із антоціановими плямами	3
7	Молодий листок: густота прилеглих волосків між жилками на нижньому боці пластинки	відсутні або дуже рідкі	1
8	Молодий листок: густота прямих волосків на жилках із нижнього боку пластинки	відсутні або дуже рідкі	1
9	Пагін: положення в просторі	горизонтальне	5
10	Пагін: колір дорсального боку міжвузлів	зелений і червоний	2
11	Пагін: колір вентрального боку міжвузлів	зелений	1
12	Пагін: колір дорсального боку вузлів	зелений і червоний	2
13	Пагін: колір вентрального боку вузлів	зелений	1
14	Пагін: густота прямих волосків на міжвузлях	відсутні або дуже рідкі	1
15	Пагін: довжина вусиків	середні	5
16	Квітка: статеві органи	добре розвинені тичинки і добре розвинена маточка	3
17	Розвинений листок: за розміром пластинки	великий	7
18	Розвинений листок: форма пластинки	п'ятикутна	3
19	Розвинений листок: пухирчатість верхнього боку пластинки	слабка	3
20	Розвинений листок: кількість лопатей	п'ять	3
21	Розвинений листок: глибина листкових вирізів (між лопатями листка)	середні	5
22	Лише сорти з лопатевими листками. Розвинений листок: розташування лопатей верхніх листкових вирізів	слабко перекриваються	3
23	Розвинений листок: розташування лопатей біля черешка	широко відкрите	2
24	Розвинений листок: довжина зубців	середні	5
25	Розвинений листок: відношення довжини до ширини зубців	середнє	5
26	Розвинений листок: форма зубців	поєднання зубців із обома прямолінійними боками та обома випуклими	5
27	Розвинений листок: антоціанове забарвлення головних жилок на верхньому боці пластинки	відсутнє або дуже слабке	1
28	Розвинений листок: густота прилеглих волосків між жилками з нижнього боку пластинки	відсутні або дуже рідкі	1
29	Розвинений листок: густота прямих волосків на жилках з нижнього боку пластинки	відсутні або дуже рідкі	1
30	Розвинений листок: довжина черешка порівняно із головною жилкою	трохи коротший	2
31	Час початку досягання ягід	середній	5
32	Гроно: за розміром (без ніжки)	середнє	5
33	Гроно: за щільністю	щільне	7
34	Гроно: довжина ніжки первинного грона	середня	5
35	Ягода: за розміром	середня	5
36	Ягода: форма	широкоеліптична	3
37	Ягода: колір шкірки (без воскового нальоту)	блакитно-чорний	9
38	Ягода: відокремлюваність від плодоніжки (легкість відривання)	порівняно легко	2
39	Ягода: товщина шкірки	середня	2
40	Ягода: антоціанове забарвлення м'якоті	відсутнє або дуже слабке	1
41	Ягода: твердість м'якоті	м'яка або твердувата	1
42	Ягода: особливий аромат	інший, ніж вище-перераховані	5
43	Ягода: формування насіння	повноцінне	3
44	Здерев'янілий пагін: основне забарвлення	темно-коричнє	3

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

*Урожайність 118 ц/га. Середній урожай з куща 5,4 кг. Середня маса 100 ягід 248 г. Рівень підмерзання бруньок 7,2, лози - 5 балів,

стійкість до посухи 5 балів. Стійкість до сірої гнилі, мілдью та оїдіуму 5 балів, до пошкодження листокруткою 5 балів, філоксерою 3. Напрямок використання технічний. Група стиглості середня.

*Дані заявника

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
Степ

Вид: Виноград справжній Vitis vinifera L.

Заявка №: 13304003 **Назва сорту** Анчеллотта червона

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

20.03.2014

Свідство про державну реєстрацію № 140379

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Час розгортання бруньок (розгорнулось 50 % бруньок на 50 % рослин)	середній	5
2	Молодий пагін: відкритість верхівки	повністю відкрита	5
3	Молодий пагін: густота прилеглих волосків на верхівці	помірні	5
4	Молодий пагін: антоціанове забарвлення прилеглих волосків на верхівці	слабке	3
5	Молодий пагін: густота прямих волосків на верхівці	слабке	3
6	Молодий листок: колір верхнього боку пластинки	зелений із антоціановими плямами	3
7	Молодий листок: густота прилеглих волосків між жилками на нижньому боці пластинки	помірні	5
8	Молодий листок: густота прямих волосків на жилках із нижнього боку пластинки	рідкі	3
9	Пагін: положення в просторі	напівпохиле	7
10	Пагін: колір дорсального боку міжвузлів	червоний	3
11	Пагін: колір вентрального боку міжвузлів	зелений і червоний	2
12	Пагін: колір дорсального боку вузлів	червоний	3
13	Пагін: колір вентрального боку вузлів	зелений і червоний	2
14	Пагін: густота прямих волосків на міжвузлях	відсутні або дуже рідкі	1
15	Пагін: довжина вусиків	довгі	7
16	Квітка: статеві органи	добре розвинені тичинки і добре розвинена маточка	3
17	Розвинений листок: за розміром пластинки	середній	5
18	Розвинений листок: форма пластинки	п'ятикутна	3
19	Розвинений листок: пухирчатість верхнього боку пластинки	помірна	5
20	Розвинений листок: кількість лопатей	сім	4
21	Розвинений листок: глибина листкових вирізів (між лопатями листка)	глибокі	7
22	Лише сорти з лопатевими листками. Розвинений листок: розташування лопатей верхніх листкових вирізів	відкрите	1
23	Розвинений листок: розташування лопатей біля черешка	широко відкрите	2
24	Розвинений листок: довжина зубців	довгі	7
25	Розвинений листок: відношення довжини до ширини зубців	велике	7
26	Розвинений листок: форма зубців	поєднання зубців із обома прямолінійними боками та обома випуклими	5
27	Розвинений листок: антоціанове забарвлення головних жилок на верхньому боці пластинки	слабке	3
28	Розвинений листок: густота прилеглих волосків між жилками з нижнього боку пластинки	помірні	5
29	Розвинений листок: густота прямих волосків на жилках з нижнього боку пластинки	помірні	5
30	Розвинений листок: довжина черешка порівняно із головною жилкою	трохи коротший	2
31	Час початку досягання ягід	середній	5
32	Гроно: за розміром (без ніжки)	середнє	5
33	Гроно: за щільністю	середнє	5
34	Гроно: довжина ніжки первинного грона	середня	5
35	Ягода: за розміром	середня	5
36	Ягода: форма	широкоеліптична	3
37	Ягода: колір шкірки (без воскового нальоту)	блакитно-чорний	9
38	Ягода: відокремлюваність від плодоніжки (легкість відривання)	порівняно легко	2
39	Ягода: товщина шкірки	середня	2
40	Ягода: антоціанове забарвлення м'якоті	відсутнє або дуже слабке	1
41	Ягода: твердість м'якоті	м'яка або твердувата	1
42	Ягода: особливий аромат	інший, ніж вище-перераховані	5
43	Ягода: формування насіння	повноцінне	3
44	Здерев'янілий пагін: основне забарвлення	червонувато-коричнєве	4

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

*Урожайність 125 ц/га. Середній урожай з куща 5,6 кг. Середня маса 100 ягід 165 г. Рівень підмерзання бруньок 7, лози - 5 балів,

стійкість до посухи 5 балів. Стійкість до ураження сірою гниллю, міддю та оїдіумом 5 балів, до пошкодження листокруткою 5 балів, філоксерою 3. Напрямок використання технічний. Група стиглості середня.

*Дані заявника

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Степ

Вид: Виноград справжній Vitis vinifera L.

Заявка №: 13304004 **Назва сорту** Совіньон блан

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

20.03.2014

Свідчення про державну реєстрацію № 140380

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Час розгортання бруньок (розгорнулось 50 % бруньок на 50 % рослин)	середній	5
2	Молодий пагін: відкритість верхівки	повністю відкрита	5
3	Молодий пагін: густота прилеглих волосків на верхівці	густі	7
4	Молодий пагін: антоціанове забарвлення прилеглих волосків на верхівці	слабке	3
5	Молодий пагін: густота прямих волосків на верхівці	слабке	3
6	Молодий листок: колір верхнього боку пластинки	зелений із антоціановими плямами	3
7	Молодий листок: густота прилеглих волосків між жилками на нижньому боці пластинки	густі	7
8	Молодий листок: густота прямих волосків на жилках із нижнього боку пластинки	рідкі	3
9	Пагін: положення в просторі	напівпряме	3
10	Пагін: колір дорсального боку міжвузлів	зелений і червоний	2
11	Пагін: колір вентрального боку міжвузлів	зелений	1
12	Пагін: колір дорсального боку вузлів	зелений і червоний	2
13	Пагін: колір вентрального боку вузлів	зелений	1
14	Пагін: густота прямих волосків на міжвузлях	відсутні або дуже рідкі	1
15	Пагін: довжина вусиків	середні	5
16	Квітка: статеві органи	добре розвинені тичинки і добре розвинена маточка	3
17	Розвинений листок: за розміром пластинки	середній	5
18	Розвинений листок: форма пластинки	округла	4
19	Розвинений листок: пухирчатість верхнього боку пластинки	помірна	5
20	Розвинений листок: кількість лопатей	п'ять	3
21	Розвинений листок: глибина листкових вирізів (між лопатями листка)	середні	5
22	Лише сорти з лопатевими листками. Розвинений листок: розташування лопатей верхніх листкових вирізів	закрите	2
23	Розвинений листок: розташування лопатей біля черешка	закрите	5
24	Розвинений листок: довжина зубців	середні	5
25	Розвинений листок: відношення довжини до ширини зубців	мале	3
26	Розвинений листок: форма зубців	обидва боки випуклі	3
27	Розвинений листок: антоціанове забарвлення головних жилок на верхньому боці пластинки	відсутнє або дуже слабке	1
28	Розвинений листок: густота прилеглих волосків між жилками з нижнього боку пластинки	помірні	5
29	Розвинений листок: густота прямих волосків на жилках з нижнього боку пластинки	рідкі	3
30	Розвинений листок: довжина черешка порівняно із головною жилкою	трохи довший	4
31	Час початку досягання ягід	середній	5
32	Гроно: за розміром (без ніжки)	середнє	5
33	Гроно: за щільністю	дуже щільне	9
34	Гроно: довжина ніжки первинного грона	коротка	3
35	Ягода: за розміром	середня	5
36	Ягода: форма	широкоеліптична	3
37	Ягода: колір шкірки (без воскового нальоту)	зелений	1
38	Ягода: відокремлюваність від плодоніжки (легкість відривання)	порівняно легко	2
39	Ягода: товщина шкірки	середня	2
40	Ягода: антоціанове забарвлення м'якоті	відсутнє або дуже слабке	1
41	Ягода: твердість м'якоті	м'яка або твердувата	1
42	Ягода: особливий аромат	інший, ніж вище-перераховані	5
43	Ягода: формування насіння	повноцінне	3
44	Здерев'янілий пагін: основне забарвлення	червонувато-коричнє	4

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожайність 116 ц/га. Середній урожай з кушта 5,2 кг. Середня маса 100 ягід 165 г. Рівень підмерзання бруньок 6, лози - 5 балів, стійкість до посухи 5 балів. Стійкість до ураження сірою гниллю та оїдіумом 5 балів, мілдью - 7, до пошкодження листокруткою 5 балів, філоксерою 3. Напрямок використання технічний. Група стиглості середня.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
Степ

Вид: Груша звичайна *Pyrus communis* L.

Заявка №: 11076001 **Назва сорту** Новосадівська

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 18.07.2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

19.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140314

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Дерево: за силою росту	слабке	3
2	Дерево: розгалуження	помірне	5
3	Дерево: габітус (форма крони)	напіврозлоге	3
4	Однорічний пагін: за формою	прямий	1
5	Однорічний пагін: за довжиною міжвузлів	середні	5
6	Однорічний пагін: колір з-під сонячного боку	сіро-зелений	1
7	Однорічний пагін: кількість сочевичок	середня кількість	5
8	Однорічний пагін: форма верхівок вегетативних бруньок	гостра	1
9	Однорічний пагін: розташування вегетативних бруньок стосовно пагона	відхилені	3
10	Однорічний пагін: розмір листової подушечки	середній	5
11	Молодий пагін: антоціанове забарвлення верхівки (у період інтенсивного росту)	відсутнє або дуже слабке	1
12	Молодий пагін: інтенсивність опушення верхньої третини	слабка	3
13	Листкова пластинка: положення стосовно пагона	відхилене	1
14	Листкова пластинка: за довжиною	довга	7
15	Листкова пластинка: за шириною	середня	5
16	Листкова пластинка: відношення довжина / ширина	середнє	5
17	Листкова пластинка: форма основи	тупа	3
18	Листкова пластинка: форма верхівки (не враховуючи кінчика)	гостра	1
19	Листкова пластинка: довжина кінчика	середній	5
20	Листкова пластинка: надрізи країв (верхньої половини)	тупозагублені	3
21	Листкова пластинка: глибина надрізів країв	мала (мілка)	3
22	Листкова пластинка: вигин центральної жилки	помірний	5
23	Черешок: за довжиною	довгий	7
24	Прилистки: наявність	відсутні	1
25	Прилистки: відстань від основи черешка	ознака не визначалась	0
26	Пагін: розташування квіткової бруньки	головним чином на шпорцях	1
27	Квіткова брунька: за довжиною	середня	5
28	Чашолисток: за довжиною	середній	5
29	Чашолисток: за положенням відносно віночка	горизонтальний	2
30	Пелюстка: положення пелюсток	відокремлені	1
31	Приймочка: розташування відносно пиляків	на рівні	2
32	Квітка: розмір пелюстки	середній	5
33	Квітка: форма пелюстки (за виключенням нігтики)	яйцевидна	3
34	Квітка: форма основи пелюстки (як для 33)	округла	2
35	Квітка: довжина нігтики	середній	5
36	Нестиглий плід: колір чашолистків	зелено-коричневий	2
37	Плід: за довжиною	середній	5
38	Плід: максимальний діаметр	великий	7
39	Плід: відношення довжина / діаметр	дуже мале	1
40	Плід: місце максимального діаметра	ближче до чашечки	2
41	Плід: за розміром	великий	7
42	Плід: симетричність (у поздовжньому розрізі)	симетричний	1
43	Плід: профіль боків	опуклий	3
44	Плід: основний колір шкірки	жовтий	4
45	Плід: відносне поширення основного кольору	мале	3
46	Плід: відтінок основного кольору	рожево-червоний	3
47	Плід: відносне поширення червоно-коричневого кольору довкола чашолистків	відсутнє або дуже слабке	1
48	Плід: відносне поширення червоно-коричневого кольору на щічках	відсутнє або дуже слабке	1
49	Плід: відносне поширення червоно-коричневого кольору довкола плодоніжки	відсутнє або дуже мале	1
50	Плід: довжина плодоніжки	середня	5
51	Плід: товщина плодоніжки	товста	7
52	Плід: викривлення плодоніжки	відсутнє або дуже слабке	1
53	Плід: положення плодоніжки відносно верхівки плоду	пряме	1

54	Плід: заглиблення лійки плодоніжки	мілке	3
55	Плід: положення чашолистків (за досягання)	розкриті	3
56	Плід основа блюдця (як для 55)	наявна	9
57	Плід: заглиблення блюдця (як для 55)	середнє	5
58	Плід: ширина блюдця (як для 55)	середня	5
59	Плід: форма зони довкола блюдця	рельєфна	3
60	Плід: структура м'якоті	слабкозерниста	3
61	Плід: твердість м'якоті	м'яка	3
62	Плід: за соковитістю	дуже соковитий	9
63	Зернятка: за формою	яйцеподібні	2
64	Час початку цвітіння	середній	5
65	Час збиральної стиглості	середній	5

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

* Середня урожайність 290 ц/га, середній урожай з дерева 23 кг. Зимостійкість та посухостійкість 8 балів. Ураженість паршею 1 бал, пошкодження плодожеркою – 3 бали. Вміст сухої речовини у плоді 25,1%, загального цукру – 13,4%, вітаміну С 7,6 мг %, загальна кислотність – 0,27%.

* Дані заявника.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Степ, Лісостеп

Вид: Житняк гребінчастий *Agropyron pectinatum* (Bieb.) Beauv.

Заявка №: 11500001 **Назва сорту** Яструбинівський

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 21.03.2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

14.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140315

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Плоїдність	диплоїд	2
2	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
3	Листок: восковий наліт	відсутній	1
4	Листок: за шириною	середній	5
5	Листок: за довжиною	середній	5
6	Рослина: тип куща (I-ий рік вегетації)	проміжний	2
7	Рослина: схильність до колосіння (у перший період вегетації)	мала	3
8	Рослина: природна висота основної маси листя	середня	5
9	Рослина: тип куща (II-ий рік вегетації)	розлогий	3
10	Рослина: кущіння	помірне	5
11	Рослина: довжина найдовшого стебла	середнє	5
12	Стебло: довжина верхнього міжвузля	довге	7
13	Прапорцевий листок: за довжиною	середній	5
14	Прапорцевий листок: за шириною	середній	5
15	Колос: за довжиною	довгий	7
16	Колос: за шириною	середній	5
17	Колос: щільність	нещільний	3
18	Колос: за формою	яйцеподібно-видовжений	9
19	Колос: опушення	відсутнє	1
20	Рослина: час колосіння	помірний	5

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Висота рослин 60,2 см. Урожайність насіння (за стандартної вологості 14 %) - 0,52 т/га. Збір сухої речовини в середньому за рік використання 6,3 т/га. Вміст білка 14,8%, вміст клітковини 25,9%. Від висіву до збиральної стиглості (відновлення весняної вегетації) 126 днів. Маса 1000 насінин 2,12 г. Зимостійкість, посухостійкість 9 балів. Стійкість до обсіпання 8 балів.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Степ, Лісостеп, Полісся

Вид: Капуста броколі Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. cymosa Duch.

Заявка №: 12028009 **Назва сорту** Нексос

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

17.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140320

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: кількість стебел	одне	1
2	Рослина: за висотою (за збирання)	середня	5
3	Листок: за положенням (на початку формування головки)	горизонтальний	5
4	Листок: за довжиною	довгий	7
5	Листок: за шириною	широкий	7
6	Листок: кількість часток	мало	3
7	Листкова пластинка: забарвлення	блакитно-зелене	3
8	Листкова пластинка: інтенсивність забарвлення	темне	7
9	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
10	Листкова пластинка: хвилястість країв	помірна	5
11	Листкова пластинка: зубчастість країв	слабка	3
12	Листкова пластинка: пухирчастість	відсутня або дуже слабка	1
13	Черешок: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
14	Черешок: за довжиною	довгий	7
15	Головка: довжина галузок від основи (не враховуючи стебло)	середні	5
16	Головка: за розміром	маленька	3
17	Головка: форма у поздовжньому розрізі	кругла	1
18	Головка: забарвлення	блакитно-зелене	4
19	Головка: інтенсивність забарвлення	помірне	5
20	Головка: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
21	Головка: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
22	Головка: горбкуватість	помірна	5
23	Головка: структура тканини	помірна	5
24	Головка: за щільністю	помірна	5
25	Головка: покривний листок	відсутній	1
26	Рослина: вторинні головки (за збирання)	наявні	9
27	Рослина: опуклість вторинних головок (як для озн. 26)	слабка	3
28	Квітка: забарвлення	біле	1
29	Квітка: інтенсивність жовтого забарвлення	ознака не визначається	0
30	Час достигання (50% рослин)	середній	5
31	Час початку цвітіння (50% рослин мають щонайменше 10% квіток)	середній	5
32	Чоловіча стерильність	відсутня	1

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарний урожай 30 т./га. Тривалість періоду до достигання 75 діб.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Закритий ґрунт

Вид: Капуста брюссельська *Brassica oleracea* L. var. *gemmifera* DC.

Заявка №: 11149001 **Назва сорту** Ірен

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

27.12.2013

Свідоцтво про державну реєстрацію № 130497

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: за висотою	середня	5
2	Рослина: тенденція до формування головки	ознака не визначалась	0
3	Листкова пластинка: за розміром	середня	5
4	Листкова пластинка: за довжиною	ознака не визначалась	0
5	Листкова пластинка: забарвлення	блакитно-зелене	2
6	Листкова пластинка: інтенсивність забарвлення	ознака не визначалась	0
7	Листкова пластинка: наявність воскового нальоту	помірний	5
8	Листкова пластинка: здатність приймати форму чашки	ознака не визначалась	0
9	Листкова пластинка: пухирчастість	слабка	3
10	Листкова пластинка: відблиск краю	ознака не визначалась	0
11	Черешок: положення	горизонтальний	5
12	Черешок: довжина у порівнянні з листковою пластинкою	довший	7
13	Черешок: антоціанове забарвлення	ознака не визначалась	0
14	Плід: форма у поздовжньому розрізі	округла	4
15	Плід: забарвлення	ознака не визначалась	0
16	Плід: інтенсивність забарвлення	ознака не визначалась	0
17	Плід: щільність за збиральною стиглістю	ознака не визначалась	0
18	Стебло: розміщення плодів	ознака не визначалась	0
19	Час збиральної стиглості	ознака не визначалась	0
20	Зовнішній вигляд колони плодів	ознака не визначалась	0
21	Чоловіча стерильність	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність 28 т/га. Період від повних сходів до початку достигання 135 діб. Тривалість періоду плодоношення 23 діб; Вміст сухої речовини 20,5%. Вміст загального цукру 6,1%. Вміст вітаміну С 29,1мг%. Вміст білку 5,1%. Ураженість хворобами: бактеріозом судинним 3%, слизовим 3%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Степ, Лісостеп, Полісся

Вид: Капуста кольрабі Brassica oleracea L. var. gongylodes L.

Заявка №: 11105001 **Назва сорту** Колібрі

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

27.12.2013

Свідоцтво про державну реєстрацію № 130498

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення сім'ядолей	відсутнє	1
2	Паросток: інтенсивність зеленого забарвлення сім'ядолей	ознака не визначається	0
3	Черешок: перехрещування	ознака не визначалась	0
4	Черешок: за довжиною	середній	5
5	Черешок: за товщиною	ознака не визначалась	0
6	Черешок: за положенням у просторі	ознака не визначалась	0
8	Листкова пластинка: за довжиною	ознака не визначалась	0
9	Листкова пластинка: за шириною	ознака не визначалась	0
10	Листкова пластинка: форма верхівки	округла	4
11	Листкова пластинка: розділення на частки стосовно центральної жилки (в нижній частині листка)	ознака не визначалась	0
12	Листкова пластинка: кількість часток (у верхній частині листка)	ознака не визначалась	0
13	Листкова пластинка: глибина розчленування (у верхній частині листка)	ознака не визначалась	0
14	Листкова пластинка: форма поперечного перерізу	опукла	3
15	Листкова пластинка: пухирчатість	помірна	5
16	Листкова пластинка: восковість	помірна	5
17	Листкова пластинка: відтінок зеленого кольору	відсутній	1
18	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	світле	3
19	Стеблоплід: кількість внутрішніх листків	ознака не визначалась	0
20	Стеблоплід: колір шкірки	ознака не визначалась	0
21	Стеблоплід: форма у поздовжньому розрізі	ознака не визначалась	0
22	Стеблоплід: форма верхівки	рівна	5
23	Рослина: початок збиральної стиглості	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність 20 т/га. Період від повних сходів до початку достигання 70 діб. Вміст сухої речовини 9,2%. Вміст загального цукру 8%. Вміст вітаміну С 62мг%. Лежкість 5 балів. Ураженість хворобами: бактеріозом судинним 1%, слизовим 1%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Степ, Лісостеп, Полісся

Вид: Капуста кольрабі Brassica oleracea L. var. gongylodes L.

Заявка №: 11105002 **Назва сорту** Коріст

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

27.12.2013

Свідоцтво про державну реєстрацію № 130499

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення сім'ядолей	відсутнє	1
2	Паросток: інтенсивність зеленого забарвлення сім'ядолей	ознака не визначалась	0
3	Черешок: перехрещування	ознака не визначалась	0
4	Черешок: за довжиною	середній	5
5	Черешок: за товщиною	ознака не визначалась	0
6	Черешок: за положенням у просторі	ознака не визначалась	0
7	Листкова пластинка: за положенням у просторі	напівпряма	3
8	Листкова пластинка: за довжиною	ознака не визначалась	0
9	Листкова пластинка: за шириною	ознака не визначалась	0
10	Листкова пластинка: форма верхівки	ознака не визначалась	0
11	Листкова пластинка: розділення на частки стосовно центральної жилки (в нижній частині листка)	ознака не визначалась	0
12	Листкова пластинка: кількість часток (у верхній частині листка)	ознака не визначалась	0
13	Листкова пластинка: глибина розчленування (у верхній частині листка)	ознака не визначалась	0
14	Листкова пластинка: форма поперечного перерізу	опукла	3
15	Листкова пластинка: пухирчатість	слабка	3
16	Листкова пластинка: восковість	помірна	5
17	Листкова пластинка: відтінок зеленого кольору	сіруватий	2
18	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	світле	3
19	Стеблоплід: кількість внутрішніх листків	ознака не визначалась	0
20	Стеблоплід: колір шкірки	ознака не визначалась	0
21	Стеблоплід: форма у поздовжньому розрізі	ознака не визначалась	0
22	Стеблоплід: форма верхівки	рівна	5
23	Рослина: початок збиральної стиглості	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність 20 т/га. Період від повних сходів до початку достигання 65 діб. Вміст сухої речовини 10,1%. Вміст загального цукру 8%. Вміст вітаміну С 65мг%. Лежкість 5 балів. Ураженість хворобами: бактеріозом судинним 1%, слизовим 1%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Степ, Лісостеп, Полісся

Вид: Капуста пекинська Brassica rapa L. var. pekinensis (Lour.) Kitam.

Заявка №: 11152003 **Назва сорту** Білі F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 28.09.2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

27.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140383

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: габітус	ознака не визначалась	0
2	Рослина: за висотою	середня	5
3	Листок: за довжиною	ознака не визначалась	0
4	Зовнішній листок: за максимальною шириною	ознака не визначалась	0
5	Зовнішній листок: форма (до стадії стиглості)	ознака не визначалась	0
6	Зовнішній листок: форма верхівки	ознака не визначалась	0
7	Зовнішній листок: пухирчатість	середня	5
8	Зовнішній листок: розмір пухирців	середні	5
9	Зовнішній листок: колір	сіро-зелений	3
10	Тільки сорти із зеленими зовнішніми листками: інтенсивність зеленого забарвлення	світле	3
11	Зовнішній листок: антоціанове збарвлення	ознака не визначалась	0
12	Зовнішній листок: ступінь глянуватості	ознака не визначалась	0
13	Зовнішній листок: опушеність (нижнього боку)	ознака не визначалась	0
14	Зовнішній листок: форма поздовжнього розрізу (крім основи листка)	увігнутий	1
15	Зовнішній листок: ступінь хвилястості краю	слабка	3
16	Зовнішній листок: надрізи краю	відсутні	1
17	Зовнішній листок: ступінь зубчастості краю основи	ознака не визначалась	0
18	Зовнішній листок: форма поперечного перерізу головної жилки (середина)	ознака не визначалась	0
19	Зовнішній листок: довжина головної жилки	ознака не визначалась	0
20	Зовнішній листок: ширина головної жилки (біля основи)	ознака не визначалась	0
21	Зовнішній листок: колір головної жилки	ознака не визначалась	0
22	Головка: за висотою	низька	3
23	Головка: за максимальною шириною	середня	5
24	Головка: форма поздовжнього розрізу	ознака не визначалась	0
25	Головка: тип покриття	напіввідкрита	2
26	Тільки сорти з закритою головою Верхівка: ступінь перекривання листків	ознака не визначається	0
27	Головка: колір верхівки	зелений	4
28	Тільки сорти із зеленою верхівкою Головка: інтенсивність зеленого забарвлення	середнє	5
29	Головка: ступінь пухирчастості на покривному листку	ознака не визначалась	0
30	Головка: забарвлення внутрішньої частини	жовта	2
31	Головка: за щільністю (під час досягання)	щільна	7
32	Головка: форма кінчика внутрішнього стебла (під час досягання)	ознака не визначалась	0
33	Рослина: час досягання	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Період від повних сходів до початку досягання 60 діб. Діб до досягання 67. Період плодоношення 15 діб. Вміст сухої речовини 15%. Вміст загального цукру 9%. Вміст вітаміну С 14мг%. Ураженість хворобами: бактеріозом судинним 5%, слизовим 5%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Закритий ґрунт

Вид: Капуста пекинська Brassica rapa L. var. pekinensis (Lour.) Kitam.

Заявка №: 11152004 **Назва сорту** Саммер Хайленд F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 28.09.2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

27.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140384

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: габітус	ознака не визначалась	0
2	Рослина: за висотою	середня	5
3	Листок: за довжиною	ознака не визначалась	0
4	Зовнішній листок: за максимальною шириною	середній	5
5	Зовнішній листок: форма (до стадії стиглості)	ознака не визначалась	0
6	Зовнішній листок: форма верхівки	ознака не визначалась	0
7	Зовнішній листок: пухирчатість	середня	5
8	Зовнішній листок: розмір пухирців	середні	5
9	Зовнішній листок: колір	сіро-зелений	3
10	Тільки сорти із зеленими зовнішніми листками: інтенсивність зеленого забарвлення	світле	3
11	Зовнішній листок: антоціанове збарвлення	ознака не визначалась	0
12	Зовнішній листок: ступінь глянуватості	ознака не визначалась	0
13	Зовнішній листок: опушеність (нижнього боку)	ознака не визначалась	0
14	Зовнішній листок: форма поздовжнього розрізу (крім основи листка)	увігнутий	1
15	Зовнішній листок: ступінь хвилястості краю	слабка	3
16	Зовнішній листок: надрізи краю	ознака не визначалась	0
17	Зовнішній листок: ступінь зубчастості краю основи	ознака не визначалась	0
18	Зовнішній листок: форма поперечного перерізу головної жилки (середина)	ознака не визначалась	0
19	Зовнішній листок: довжина головної жилки	ознака не визначалась	0
20	Зовнішній листок: ширина головної жилки (біля основи)	ознака не визначалась	0
21	Зовнішній листок: колір головної жилки	ознака не визначалась	0
22	Головка: за висотою	низька	3
23	Головка: за максимальною шириною	середня	5
24	Головка: форма поздовжнього розрізу	ознака не визначалась	0
25	Головка: тип покриття	напіввідкрита	2
26	Тільки сорти з закритою головою Верхівка: ступінь перекривання листків	ознака не визначається	0
27	Головка: колір верхівки	зелений	4
28	Тільки сорти із зеленою верхівкою Головка: інтенсивність зеленого забарвлення	середнє	5
29	Головка: ступінь пухирчастості на покривному листку	ознака не визначалась	0
30	Головка: забарвлення внутрішньої частини	білувата	1
31	Головка: за щільністю (під час достигання)	дуже пухка	1
32	Головка: форма кінчика внутрішнього стебла (під час достигання)	ознака не визначалась	0
33	Рослина: час достигання	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Період від повних сходів до початку достигання 62 діб. Діб до достигання 68. Період плодоношення 15 діб. Вміст сухої речовини 12%. Вміст загального цукру 8%. Вміст вітаміну С 13мг%. Ураженість хворобами: бактеріозом судинним 5%, слизовим 5%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Закритий ґрунт

Вид: Лядвенець рогатий *Lotus corniculatus* L.

Заявка №: 11119001 **Назва сорту** Терцій

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 21.03.2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

14.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140346

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Схильність до цвітіння	від малої до середньої	4
2	Рослина: габітус	напівстоячий	3
3	Рослина: природна висота (висота основної зеленої маси)	середня	5
4	Рослина: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
5	Час початку цвітіння	пізній	7
6	Час повного цвітіння	пізній	7
7	Період від початку до повного цвітіння	тривалий	7
8	Стебло: за типом	висхідне	5
9	Стебло: волоски у середній частині	наявні	9
10	Стебло: за довжиною	довге	7
11	Стебло: за товщиною	середнє	5
12	Листок: довжина середнього листочка	середній	5
13	Листок: ширина середнього листочка	вузький	3
14	Листок: форма середнього листочка	еліптичний	3
15	Листок: наявність волосків	наявні	9
16	Суцвіття: кількість квіток	середня кількість	5
17	Прилистки: розмір відносно листочків	однакові	5
18	Квітка: забарвлення	жовто-оранжеве	2
19	Квітка: характер пелюстки чашечки	прилягаючі	1
20	Квітка: опушеність чашечки	відсутня	1
21	Квітка: довжина зубців чашечки	середні	5
22	Квітка: довжина чашечки	середня	5
23	Рослина: габітус	напіврозлогий	7
24	Рослина: природна висота (висота основної зеленої маси)	висока	7
25	Рослина: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
26	Біб: форма зубчика	гостра	3
27	Біб: за довжиною	довгий	7
28	Біб: інтенсивність бурого забарвлення	помірне	5
29	Насіння: форма	округла	1
30	Насіння: за кольором	темно-коричневе	2

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Висота рослин 70 см. Урожайність насіння (за стандартної вологості 14 %) - 0,4 т/га. Урожайність зеленої маси/збір сухої речовини 9,5, т/га. Вміст білка 21,5%, вміст клітковини 23,4%. Період від сівби (відновлення весняної вегетації) до збиральної стиглості 124 діб. Маса 1000 насінин 8г. Стійкість до вилягання 8 балів, до обсіпання 7. Зимостійкість 8, посухостійкість 9 балів.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Степ, Лісостеп, Полісся

Вид: Лядвенець рогатий *Lotus corniculatus* L.

Заявка №: 11119002 **Назва сорту** Гелон

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 05.04.2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

27.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140402

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Схильність до цвітіння	від малої до середньої	4
2	Рослина: габітус	розлогий	9
3	Рослина: природна висота (висота основної зеленої маси)	висока	7
4	Рослина: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
5	Час початку цвітіння	пізній	7
6	Час повного цвітіння	пізній	7
7	Період від початку до повного цвітіння	середній	5
8	Стебло: за типом	висхідне	5
9	Стебло: волоски у середній частині	наявні	9
10	Стебло: за довжиною	довге	7
11	Стебло: за товщиною	середнє	5
12	Листок: довжина середнього листочка	довгий	7
13	Листок: ширина середнього листочка	вузький	3
14	Листок: форма середнього листочка	обернено-яйцевидний	5
15	Листок: наявність волосків	наявні	9
16	Суцвіття: кількість квіток	середня кількість	5
17	Прилистки: розмір відносно листочків	однакові	5
18	Квітка: забарвлення	жовте	1
19	Квітка: характер пелюстки чашечки	прилягаючі	1
20	Квітка: опушеність чашечки	відсутня	1
21	Квітка: довжина зубців чашечки	середні	5
22	Квітка: довжина чашечки	середня	5
23	Рослина: габітус	напіврозлогий	7
24	Рослина: природна висота (висота основної зеленої маси)	висока	7
25	Рослина: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
26	Біб: форма зубчика	гостра	3
27	Біб: за довжиною	довгий	7
28	Біб: інтенсивність бурого забарвлення	помірне	5
29	Насіння: форма	овально-куляста	2
30	Насіння: за кольором	чорне	6

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Висота рослин 67,4 см. Урожайність насіння (за стандартної вологості 14 %) - 0,42 т/га. Урожайність зеленої маси/збір сухої речовини 9,7, т/га. Вміст білка 21,8% , вміст клітковини 23,4%. Період від сівби (відновлення весняної вегетації) до збиральної стиглості 136 діб. Маса 1000 насінин 1,25 г. Стійкість до вилягання, до обсіпання 7 балів. Зимостійкість, посухостійкість 9 балів.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Степ, Лісостеп, Полісся

Вид: Мітлиця тонка *Agrostis tenuis* Sibth.

Заявка №: 11294001 **Назва сорту** Юнона

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 22.11.2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

27.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140403

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Плоїдність	диплоїд	2
2	Рослина: тип куща (восени в рік сівби)	проміжний	5
3	Рослина: кущ за шириною (як для 2)	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення (як для 2)	світле	3
5	Листок: за шириною (як для 2)	від вузького до середнього	4
6	Рослина: схильність до утворення суцвіть у рік сівби	середня	5
7	Час початку весняного відростання	середній	5
8	Час появи суцвіть	середній	5
9	Прапорцевий листок: за довжиною (у фазі появи волоті)	середній	5
10	Прапорцевий листок: за шириною (як для 9)	середній	5
11	Рослина: довжина найдовшого стебла (включно суцвіття за повного виявлення)	коротке	3
12	Стебло: довжина верхнього міжвузля (як для 11)	від середнього до довгого	6
13	Суцвіття: за довжиною (як для 11)	коротке	3

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожайність насіння (за стандартної вологості 14 %) - 0,54 т/га. Період від сівби (відновлення весняної вегетації) до збиральної стиглості 95 діб.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Степ, Лісостеп, Полісся

Вид: Перець однорічний (солодкий) *Capsicum annuum* L.

Заявка №: 09037017 **Назва сорту** Арістотель X3P F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

24.02.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140064

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилія	відсутнє	1
2	Рослина: габітус	прямий	1
3	Рослина: довжина головного стебла	середнє	5
4	Рослина: укорочені міжвузля (у верхній частині)	відсутні	1
5	Тільки для сортів з укороченими міжвузлями. Рослина: кількість міжвузлів між першою квіткою та укороченими міжвузлями (тест на рослинах без чеканки)	ознака не визначається	0
6	Тільки для сортів без укорочених пагонів. Рослина: довжина міжвузлів (на пагонах I-го порядку)	середні	5
7	Рослина: антоціанове забарвлення вузлів	наявне	9
8	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення вузлів	слабке	3
9	Стебло: опушення вузлів	слабке	3
10	Рослина: за висотою	висока	7
11	Листок: довжина пластинки	довга	7
12	Листок: ширина пластинки	широка	7
13	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
14	Листок: за формою	овальний	2
15	Листок: хвилястість краю	відсутня або дуже слабка	1
16	Листок: пухирчастість	слабка	3
17	Листок: форма в поперечному перерізі	помірно увігнута	3
18	Листок: глянуватість	помірна	5
19	Квітконіжка: положення	похиле	2
20	Квітка: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє	1
21	Плід: забарвлення (перед досяганням)	зелене	3
22	Плід: інтенсивність забарвлення (перед досяганням)	темне	7
23	Плід: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
24	Плід: положення у просторі	поникле	3
25	Плід: за довжиною	середній	5
26	Плід: діаметр	середній	5
27	Плід: відношення довжина/діаметр	мале	3
28	Плід: форма у поздовжньому розрізі	квадратна	4
29	Плід: форма поперечного перерізу (на рівні плаценти)	кругла	3
30	Плід: хвилястість перикарпу у базальній частині	сильна	7
31	Плід: хвилястість перикарпу (базальну частину не беруть до уваги)	сильна	7
32	Плід: структура поверхні	гладенька або злегка зморшувата	1
33	Плід: забарвлення (за досягання)	червоне	3
34	Плід: інтенсивність забарвлення (за досягання)	темне	7
35	Плід: глянуватість	сильна	7
36	Плід: порожнина у плодоніжці	відсутня	1
37	Плід: глибина порожнини у плодоніжці	ознака не визначається	0
38	Плід: форма верхівки	притиснута	4
39	Плід: глибина борозенок між частками	глибокі	7
40	Плід: кількість часток	три-чотири	4
41	Плід: товщина м'якоті	середня	5
42	Плодоніжка: за довжиною	довга	7
43	Плодоніжка: за товщиною	товста	7
44	Чашечка: за характером виявлення	необгортаюча	1
45	Плід: капсидин у плаценті	відсутній	1
46	Час початку цвітіння (перша квітка на другому квітковому вузлі)	середній	5
47	Час досягання	середній	5
48,1	Стійкість до Tobamovirus: Стійкість до Tobamovirus: Патотип 0 (Tobacco MosaicVirus (0))	ознака не визначалась	0
48,2	Стійкість до Tobamovirus: Патотип 1-2 (Tomato MosaicVirus (1-2))	ознака не визначалась	0
48,3	Стійкість до Tobamovirus: Патотип 1-2-3 (Pepper Mild Mottle Virus (1-2-3))	ознака не визначалась	0
49,1	Стійкість до Potato Virus: Патотип 0	ознака не визначалась	0

49,2	Стійкість до Potato Virus: Патотип 1	ознака не визначалась	0
49,3	Стійкість до Potato Virus: Патотип 1 – 2	ознака не визначалась	0
50	Стійкість до Phytophthora capsici	ознака не визначалась	0
51	Стійкість до Cucumber Mosaic Virus (CMV)	ознака не визначалась	0
52	Стійкість до Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV)	ознака не визначалась	0
53	Стійкість до Xanthomonas campestris pv. Vesicatoria	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарний урожай 690 т/га., Середня маса плоду 350г. Днів до достигання - 110. Суха речовина 6,21 %. Загальний цукор 2,36%. Вітамін С 175мг/%. Товщина стінки плоду 9 мм.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Степ, Лісостеп, Полісся

Вид: Перець однорічний (солодкий) *Capsicum annuum* L.

Заявка №: 09037019 **Назва сорту** Притавіт F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

24.02.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140065

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилія	наявне	9
2	Рослина: габітус	прямий	1
3	Рослина: довжина головного стебла	середнє	5
4	Рослина: укорочені міжвузля (у верхній частині)	наявні	9
5	Тільки для сортів з укороченими міжвузлями. Рослина: кількість міжвузлів між першою квіткою та укороченими міжвузлями (тест на рослинах без чеканки)	одне або три	2
6	Тільки для сортів без укорочених пагонів. Рослина: довжина міжвузлів (на пагонах I-го порядку)	ознака не визначається	0
7	Рослина: антоціанове забарвлення вузлів	наявне	9
8	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення вузлів	помірне	5
9	Стебло: опушення вузлів	слабке	3
10	Рослина: за висотою	дуже висока	9
11	Листок: довжина пластинки	довга	7
12	Листок: ширина пластинки	широка	7
13	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
14	Листок: за формою	овальний	2
15	Листок: хвилястість краю	відсутня або дуже слабка	1
16	Листок: пухирчастість	помірна	5
17	Листок: форма в поперечному перерізі	плоска	5
18	Листок: глянуватість	сильна	7
19	Квітконіжка: положення	пряме	1
20	Квітка: антоціанове забарвлення пиляків	наявне	9
21	Плід: забарвлення (перед досяганням)	зелене	3
22	Плід: інтенсивність забарвлення (перед досяганням)	помірне	5
23	Плід: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
24	Плід: положення у просторі	поникле	3
25	Плід: за довжиною	середній	5
26	Плід: діаметр	середній	5
27	Плід: відношення довжина/діаметр	мале	3
28	Плід: форма у поздовжньому розрізі	сплюснена	1
29	Плід: форма поперечного перерізу (на рівні плаценти)	кругла	3
30	Плід: хвилястість перикарпу у базальній частині	сильна	7
31	Плід: хвилястість перикарпу (базальну частину не беруть до уваги)	помірна	5
32	Плід: структура поверхні	гладенька або злегка зморшкувата	1
33	Плід: забарвлення (за досягання)	червоне	3
34	Плід: інтенсивність забарвлення (за досягання)	помірне	5
35	Плід: глянуватість	слабка	3
36	Плід: порожнина у плодоніжці	відсутня	1
37	Плід: глибина порожнини у плодоніжці	ознака не визначається	0
38	Плід: форма верхівки	дуже притиснута	5
39	Плід: глибина борозенок між частками	глибокі	7
40	Плід: кількість часток	три-чотири	4
41	Плід: товщина м'якоті	середня	5
42	Плодоніжка: за довжиною	середня	5
43	Плодоніжка: за товщиною	товста	7
44	Чашечка: за характером виявлення	необгортаюча	1
45	Плід: капсидин у плаценті	відсутній	1
46	Час початку цвітіння (перша квітка на другому квітковому вузлі)	ранній	3
47	Час досягання	ранній	3
48,1	Стійкість до Tobamovirus: Стійкість до Tobamovirus: Патотип 0 (Tobacco MosaicVirus (0))	ознака не визначалась	0
48,2	Стійкість до Tobamovirus: Патотип 1-2 (Tomato MosaicVirus (1-2))	ознака не визначалась	0
48,3	Стійкість до Tobamovirus: Патотип 1-2-3 (Pepper Mild Mottle Virus (1-2-3))	ознака не визначалась	0
49,1	Стійкість до Potato Virus: Патотип 0	ознака не визначалась	0

49,2	Стійкість до Potato Virus: Патотип 1	ознака не визначалась	0
49,3	Стійкість до Potato Virus: Патотип 1 – 2	ознака не визначалась	0
50	Стійкість до Phytophthora capsici	ознака не визначалась	0
51	Стійкість до Cucumber Mosaic Virus (CMV)	ознака не визначалась	0
52	Стійкість до Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV)	ознака не визначалась	0
53	Стійкість до Xanthomonas campestris pv. Vesicatoria	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарний урожай 574 т/га. Середня маса плоду 170г. Днів до достигання - 107. Суха речовина 9,6 %. Загальний цукор 5,3%. Вітамін С 196мг/%. Товщина стінки плоду 7мм.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Степ, Лісостеп, Полісся

Вид: Перець однорічний (солодкий) Capsicum annuum L.

Заявка №: 09037021 Назва сорту Флексум F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

24.02.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140066

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилія	наявне	9
2	Рослина: габітус	прямий	1
3	Рослина: довжина головного стебла	коротке	3
4	Рослина: укорочені міжвузля (у верхній частині)	наявні	9
5	Тільки для сортів з укороченими міжвузлями. Рослина: кількість міжвузлів між першою квіткою та укороченими міжвузлями (тест на рослинах без чеканки)	більше трьох	3
6	Тільки для сортів без укорочених пагонів. Рослина: довжина міжвузлів (на пагонах I-го порядку)	ознака не визначається	0
7	Рослина: антоціанове забарвлення вузлів	наявне	9
8	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення вузлів	помірне	5
9	Стебло: опушення вузлів	слабке	3
10	Рослина: за висотою	висока	7
11	Листок: довжина пластинки	довга	7
12	Листок: ширина пластинки	широка	7
13	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
14	Листок: за формою	ланцетний	1
15	Листок: хвилястість краю	слабка	3
16	Листок: пухирчастість	слабка	3
17	Листок: форма в поперечному перерізі	плоска	5
18	Листок: глянуватість	сильна	7
19	Квітконіжка: положення	пряме	1
20	Квітка: антоціанове забарвлення пиляків	наявне	9
21	Плід: забарвлення (перед досяганням)	зеленувато-біле	1
22	Плід: інтенсивність забарвлення (перед досяганням)	світле	3
23	Плід: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
24	Плід: положення у просторі	пряме	1
25	Плід: за довжиною	середній	5
26	Плід: діаметр	середній	5
27	Плід: відношення довжина/діаметр	середнє	5
28	Плід: форма у поздовжньому розрізі	трикутна	7
29	Плід: форма поперечного перерізу (на рівні плаценти)	кругла	3
30	Плід: хвилястість перикарпу у базальній частині	слабка	3
31	Плід: хвилястість перикарпу (базальну частину не беруть до уваги)	слабка	3
32	Плід: структура поверхні	гладенька або злегка зморшкувата	1
33	Плід: забарвлення (за досягання)	червоне	3
34	Плід: інтенсивність забарвлення (за досягання)	помірне	5
35	Плід: глянуватість	сильна	7
36	Плід: порожнина у плодоніжці	відсутня	1
37	Плід: глибина порожнини у плодоніжці	ознака не визначається	0
38	Плід: форма верхівки	загострена	2
39	Плід: глибина борозенок між частками	мілкі	3
40	Плід: кількість часток	три-чотири	4
41	Плід: товщина м'якоті	середня	5
42	Плодоніжка: за довжиною	середня	5
43	Плодоніжка: за товщиною	середня	5
44	Чашечка: за характером виявлення	необгортаюча	1
45	Плід: капсидин у плаценті	відсутній	1
46	Час початку цвітіння (перша квітка на другому квітковому вузлі)	ранній	3
47	Час досягання	середній	5
48,1	Стійкість до Tobamovirus: Стійкість до Tobamovirus: Патотип 0 (Tobacco MosaicVirus (0))	ознака не визначалась	0
48,2	Стійкість до Tobamovirus: Патотип 1-2 (Tomato MosaicVirus (1-2))	ознака не визначалась	0
48,3	Стійкість до Tobamovirus: Патотип 1-2-3 (Pepper Mild Mottle Virus (1-2-3))	ознака не визначалась	0
49,1	Стійкість до Potato Virus: Патотип 0	ознака не визначалась	0

49,2	Стійкість до Potato Virus: Патотип 1	ознака не визначалась	0
49,3	Стійкість до Potato Virus: Патотип 1 – 2	ознака не визначалась	0
50	Стійкість до Phytophthora capsici	ознака не визначалась	0
51	Стійкість до Cucumber Mosaic Virus (CMV)	ознака не визначалась	0
52	Стійкість до Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV)	ознака не визначалась	0
53	Стійкість до Xanthomonas campestris pv. Vesicatoria	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарний урожай 580т/га. Середня маса плоду 110г. Днів до досягання - 100. Товщина стінки плоду 8мм. Суха речовина 6,29%. Загальний цукор 3,1%. Вітамін С 120 мг/%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Степ, Лісостеп, Полісся

Вид: Перець однорічний (солодкий) *Capsicum annuum* L.

Заявка №: 09037022 **Назва сорту** Джипсі F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

24.02.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140067

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилія	наявне	9
2	Рослина: габітус	напівпрямий	2
3	Рослина: довжина головного стебла	середнє	5
4	Рослина: укорочені міжвузля (у верхній частині)	наявні	9
5	Тільки для сортів з укороченими міжвузлями. Рослина: кількість міжвузлів між першою квіткою та укороченими міжвузлями (тест на рослинах без чеканки)	більше трьох	3
6	Тільки для сортів без укорочених пагонів. Рослина: довжина міжвузлів (на пагонах I-го порядку)	ознака не визначається	0
7	Рослина: антоціанове забарвлення вузлів	наявне	9
8	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення вузлів	сильне	7
9	Стебло: опушення вузлів	помірне	5
10	Рослина: за висотою	висока	7
11	Листок: довжина пластинки	середня	5
12	Листок: ширина пластинки	середня	5
13	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
14	Листок: за формою	овальний	2
15	Листок: хвилястість краю	відсутня або дуже слабка	1
16	Листок: пухирчастість	слабка	3
17	Листок: форма в поперечному перерізі	помірно увігнута	3
18	Листок: глянуватість	помірна	5
19	Квітконіжка: положення	пряме	1
20	Квітка: антоціанове забарвлення пелюstk	наявне	9
21	Плід: забарвлення (перед досяганням)	зеленувато-біле	1
22	Плід: інтенсивність забарвлення (перед досяганням)	світле	3
23	Плід: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
24	Плід: положення у просторі	поникле	3
25	Плід: за довжиною	середній	5
26	Плід: діаметр	малий	3
27	Плід: відношення довжина/діаметр	середнє	5
28	Плід: форма у поздовжньому розрізі	трикутна	7
29	Плід: форма поперечного перерізу (на рівні плаценти)	кругла	3
30	Плід: хвилястість перикарпу у базальній частині	слабка	3
31	Плід: хвилястість перикарпу (базальну частину не беруть до уваги)	помірна	5
32	Плід: структура поверхні	гладенька або злегка зморшкувата	1
33	Плід: забарвлення (за досягання)	червоне	3
34	Плід: інтенсивність забарвлення (за досягання)	помірне	5
35	Плід: глянуватість	помірна	5
36	Плід: порожнина у плодоніжці	відсутня	1
37	Плід: глибина порожнини у плодоніжці	ознака не визначається	0
38	Плід: форма верхівки	загострена	2
39	Плід: глибина борозенок між частками	мілкі	3
40	Плід: кількість часток	три-чотири	4
41	Плід: товщина м'якоті	середня	5
42	Плодоніжка: за довжиною	середня	5
43	Плодоніжка: за товщиною	середня	5
44	Чашечка: за характером виявлення	необгортаюча	1
45	Плід: капсидин у плаценті	відсутній	1
46	Час початку цвітіння (перша квітка на другому квітковому вузлі)	ранній	3
47	Час досягання	середній	5
48,1	Стійкість до Tobamovirus: Стійкість до Tobamovirus: Патотип 0 (Tobacco MosaicVirus (0))	ознака не визначалась	0
48,2	Стійкість до Tobamovirus: Патотип 1-2 (Tomato MosaicVirus (1-2))	ознака не визначалась	0
48,3	Стійкість до Tobamovirus: Патотип 1-2-3 (Pepper Mild Mottle Virus (1-2-3))	ознака не визначалась	0
49,1	Стійкість до Potato Virus: Патотип 0	ознака не визначалась	0

49,2	Стійкість до Potato Virus: Патотип 1	ознака не визначалась	0
49,3	Стійкість до Potato Virus: Патотип 1 – 2	ознака не визначалась	0
50	Стійкість до Phytophthora capsici	ознака не визначалась	0
51	Стійкість до Cucumber Mosaic Virus (CMV)	ознака не визначалась	0
52	Стійкість до Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV)	ознака не визначалась	0
53	Стійкість до Xanthomonas campestris pv. Vesicatoria	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарний урожай 520 т/га. Середня маса плоду 125г. Днів до достигання - 95. Суха речовина 7,15 %. Загальний цукор 3,87%. Вітамін С 115мг/%. Клітковина 2,5%. Товщина стінки плоду 4,5мм.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Степ, Лісостеп, Полісся

Вид: Перець однорічний (солодкий) Capsicum annuum L.

Заявка №: 09037024 Назва сорту Етеле

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 30.11.2009

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

17.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140348

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилля	наявне	9
2	Рослина: габітус	ознака не визначалась	0
3	Рослина: довжина головного стебла	середнє	5
4	Рослина: укорочені міжвузля (у верхній частині)	наявні	9
5	Тільки для сортів з укороченими міжвузлями. Рослина: кількість міжвузлів між першою квіткою та укороченими міжвузлями (тест на рослинах без чеканки)	одне або три	2
6	Тільки для сортів без укорочених пагонів. Рослина: довжина міжвузлів (на пагонах I-го порядку)	ознака не визначається	0
7	Рослина: антоціанове забарвлення вузлів	наявне	9
8	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення вузлів	помірне	5
9	Стебло: опушення вузлів	ознака не визначалась	0
10	Рослина: за висотою	ознака не визначалась	0
11	Листок: довжина пластинки	середня	5
12	Листок: ширина пластинки	широка	7
13	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	світле	3
14	Листок: за формою	ознака не визначалась	0
15	Листок: хвилястість краю	ознака не визначалась	0
16	Листок: пухирчастість	слабка	3
17	Листок: форма в поперечному перерізі	ознака не визначалась	0
18	Листок: глянуватість	ознака не визначалась	0
19	Квітконіжка: положення	похиле	2
20	Квітка: антоціанове забарвлення пелюstk	ознака не визначалась	0
21	Плід: забарвлення (перед досяганням)	зеленувато-біле	1
22	Плід: інтенсивність забарвлення (перед досяганням)	світле	3
23	Плід: антоціанове забарвлення	ознака не визначалась	0
24	Плід: положення у просторі	поникле	3
25	Плід: за довжиною	середній	5
26	Плід: діаметр	малий	3
27	Плід: відношення довжина/діаметр	середнє	5
28	Плід: форма у поздовжньому розрізі	трикутна	7
29	Плід: форма поперечного перерізу (на рівні плаценти)	кругла	3
30	Плід: хвилястість перикарпу у базальній частині	слабка	3
31	Плід: хвилястість перикарпу (базальну частину не беруть до уваги)	ознака не визначалась	0
32	Плід: структура поверхні	гладенька або злегка зморшкувата	1
33	Плід: забарвлення (за досягання)	червоне	3
34	Плід: інтенсивність забарвлення (за досягання)	світле	3
35	Плід: глянуватість	помірна	5
36	Плід: порожнина у плодоніжці	відсутня	1
37	Плід: глибина порожнини у плодоніжці	ознака не визначається	0
38	Плід: форма верхівки	дуже притиснута	5
39	Плід: глибина борозенок між частками	мілкі	3
40	Плід: кількість часток	переважно три	3
41	Плід: товщина м'якоті	тонка	3
42	Плодоніжка: за довжиною	середня	5
43	Плодоніжка: за товщиною	середня	5
44	Чашечка: за характером виявлення	необгортаюча	1
45	Плід: капсидин у плаценті	відсутній	1
46	Час початку цвітіння (перша квітка на другому квітковому вузлі)	середній	5
47	Час досягання	середній	5
48,1	Стійкість до Tobamovirus: Стійкість до Tobamovirus: Патотип 0 (Tobacco MosaicVirus (0))	ознака не визначалась	0
48,2	Стійкість до Tobamovirus: Патотип 1-2 (Tomato MosaicVirus (1-2))	ознака не визначалась	0
48,3	Стійкість до Tobamovirus: Патотип 1-2-3 (Pepper Mild Mottle Virus (1-2-3))	ознака не визначалась	0
49,1	Стійкість до Potato Virus: Патотип 0	ознака не визначалась	0

49,2	Стійкість до Potato Virus: Патотип 1	ознака не визначалась	0
49,3	Стійкість до Potato Virus: Патотип 1 – 2	ознака не визначалась	0
50	Стійкість до Phytophthora capsici	ознака не визначалась	0
51	Стійкість до Cucumber Mosaic Virus (CMV)	ознака не визначалась	0
52	Стійкість до Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV)	ознака не визначалась	0
53	Стійкість до Xanthomonas campestris pv. Vesicatoria	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна врожайність 550 т./га. Середня маса плоду 120 г. Вміст сухої речовини 10,5%. Тривалість періоду до досягання 130 діб.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Степ, Лісостеп, Полісся

Вид: Перець однорічний (солодкий) *Capsicum annuum* L.

Заявка №: 11037007 **Назва сорту** Турбін

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

27.12.2013

Свідоцтво про державну реєстрацію № 130500

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилія	наявне	9
2	Рослина: габітус	прямий	1
3	Рослина: довжина головного стебла	середнє	5
4	Рослина: укорочені міжвузля (у верхній частині)	відсутні	1
5	Тільки для сортів з укороченими міжвузлями. Рослина: кількість міжвузлів між першою квіткою та укороченими міжвузлями (тест на рослинах без чеканки)	ознака не визначається	0
6	Тільки для сортів без укорочених пагонів. Рослина: довжина міжвузлів (на пагонах I-го порядку)	середні	5
7	Рослина: антоціанове забарвлення вузлів	наявне	9
8	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення вузлів	дуже сильне	9
9	Стебло: опушення вузлів	ознака не визначалась	0
10	Рослина: за висотою	ознака не визначалась	0
11	Листок: довжина пластинки	довга	7
12	Листок: ширина пластинки	середня	5
13	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
14	Листок: за формою	ознака не визначалась	0
15	Листок: хвилястість краю	ознака не визначалась	0
16	Листок: пухирчастість	помірна	5
17	Листок: форма в поперечному перерізі	ознака не визначалась	0
18	Листок: глянуватість	ознака не визначалась	0
19	Квітконіжка: положення	ознака не визначалась	0
20	Квітка: антоціанове забарвлення пиляків	ознака не визначалась	0
21	Плід: забарвлення (перед досяганням)	ознака не визначалась	0
22	Плід: інтенсивність забарвлення (перед досяганням)	ознака не визначалась	0
23	Плід: антоціанове забарвлення	ознака не визначалась	0
24	Плід: положення у просторі	горизонтальне	2
25	Плід: за довжиною	середній	5
26	Плід: діаметр	великий	7
27	Плід: відношення довжина/діаметр	середнє	5
28	Плід: форма у поздовжньому розрізі	округла	2
29	Плід: форма поперечного перерізу (на рівні плаценти)	ознака не визначалась	0
30	Плід: хвилястість перикарпу у базальній частині	слабка	3
31	Плід: хвилястість перикарпу (базальну частину не беруть до уваги)	ознака не визначалась	0
32	Плід: структура поверхні	дуже зморшкувата	3
33	Плід: забарвлення (за досягання)	жовте	1
34	Плід: інтенсивність забарвлення (за досягання)	світле	3
35	Плід: глянуватість	помірна	5
36	Плід: порожнина у плодоніжці	ознака не визначалась	0
37	Плід: глибина порожнини у плодоніжці	глибока	7
38	Плід: форма верхівки	ознака не визначалась	0
39	Плід: глибина борозенок між частками	ознака не визначалась	0
40	Плід: кількість часток	переважно дві	1
41	Плід: товщина м'якоті	ознака не визначалась	0
42	Плодоніжка: за довжиною	ознака не визначалась	0
43	Плодоніжка: за товщиною	середня	5
44	Чашечка: за характером виявлення	ознака не визначалась	0
45	Плід: капсидин у плаценті	наявний	9
46	Час початку цвітіння (перша квітка на другому квітковому вузлі)	середній	5
47	Час досягання	ознака не визначалась	0
48,1	Стійкість до Tobamovirus: Стійкість до Tobamovirus: Патотип 0 (Tobacco MosaicVirus (0))	ознака не визначалась	0
48,2	Стійкість до Tobamovirus: Патотип 1-2 (Tomato MosaicVirus (1-2))	ознака не визначалась	0
48,3	Стійкість до Tobamovirus: Патотип 1-2-3 (Pepper Mild Mottle Virus (1-2-3))	ознака не визначалась	0
49,1	Стійкість до Potato Virus: Патотип 0	ознака не визначалась	0

49,2	Стійкість до Potato Virus: Патотип 1	ознака не визначалась	0
49,3	Стійкість до Potato Virus: Патотип 1 – 2	ознака не визначалась	0
50	Стійкість до Phytophthora capsici	ознака не визначалась	0
51	Стійкість до Cucumber Mosaic Virus (CMV)	ознака не визначалась	0
52	Стійкість до Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV)	ознака не визначалась	0
53	Стійкість до Xanthomonas campestris pv. Vesicatoria	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарний урожай 40 т/га. Середня маса плоду 130г. Дів до досягання - 80. Суха речовина 10,3 %. Загальний цукор 6,8%. Вітамін С 290мг/%. Клітковина 0,1%. Товщина стінки плоду 5мм. Ураження хворобами: антракнозом - 4 %, гниллю верхівковою - 3 %.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Степ, Лісостеп, Полісся

Вид: Перець однорічний (солодкий) *Capsicum annuum* L.

Заявка №: 13113001 **Назва сорту** Лотта

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

07.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140213

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилія	відсутнє	1
2	Рослина: габітус	напівпрямий	2
3	Рослина: довжина головного стебла	середнє	5
4	Рослина: укорочені міжвузля (у верхній частині)	відсутні	1
5	Тільки для сортів з укороченими міжвузлями. Рослина: кількість міжвузлів між першою квіткою та укороченими міжвузлями (тест на рослинах без чеканки)	ознака не визначається	0
6	Тільки для сортів без укорочених пагонів. Рослина: довжина міжвузлів (на пагонах I-го порядку)	короткі	3
7	Рослина: антоціанове забарвлення вузлів	наявне	9
8	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення вузлів	помірне	5
9	Стебло: опушення вузлів	відсутнє або дуже слабке	1
10	Рослина: за висотою	середня	5
11	Листок: довжина пластинки	середня	5
12	Листок: ширина пластинки	середня	5
13	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
14	Листок: за формою	ланцетний	1
15	Листок: хвилястість краю	помірна	5
16	Листок: пухирчастість	слабка	3
17	Листок: форма в поперечному перерізі	помірно увігнута	3
18	Листок: глянуватість	помірна	5
19	Квітконіжка: положення	похиле	2
20	Квітка: антоціанове забарвлення пиляків	наявне	9
21	Плід: забарвлення (перед досяганням)	зеленувато-біле	1
22	Плід: інтенсивність забарвлення (перед досяганням)	помірне	5
23	Плід: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
24	Плід: положення у просторі	поникле	3
25	Плід: за довжиною	короткий	3
26	Плід: діаметр	великий	7
27	Плід: відношення довжина/діаметр	середнє	5
28	Плід: форма у поздовжньому розрізі	трикутна	7
29	Плід: форма поперечного перерізу (на рівні плаценти)	трикутна	2
30	Плід: хвилястість перикарпу у базальній частині	відсутня або дуже слабка	1
31	Плід: хвилястість перикарпу (базальну частину не беруть до уваги)	відсутня або дуже слабка	1
32	Плід: структура поверхні	гладенька або злегка зморшувата	1
33	Плід: забарвлення (за досягання)	червоне	3
34	Плід: інтенсивність забарвлення (за досягання)	помірне	5
35	Плід: глянуватість	сильна	7
36	Плід: порожнина у плодоніжці	відсутня	1
37	Плід: глибина порожнини у плодоніжці	ознака не визначається	0
38	Плід: форма верхівки	загострена	2
39	Плід: глибина борозенок між частками	милкі	3
40	Плід: кількість часток	переважно три	3
41	Плід: товщина м'якоті	середня	5
42	Плодоніжка: за довжиною	середня	5
43	Плодоніжка: за товщиною	середня	5
44	Чашечка: за характером виявлення	необгортаюча	1
45	Плід: капсидин у плаценті	відсутній	1
46	Час початку цвітіння (перша квітка на другому квітковому вузлі)	середній	5
47	Час досягання	ранній	3
48,1	Стійкість до Tobamovirus: Стійкість до Tobamovirus: Патотип 0 (Tobacco MosaicVirus (0))	наявна	9
48,2	Стійкість до Tobamovirus: Патотип 1-2 (Tomato MosaicVirus (1-2))	наявна	9
48,3	Стійкість до Tobamovirus: Патотип 1-2-3 (Pepper Mild Mottle Virus (1-2-3))	відсутня	1
49,1	Стійкість до Potato Virus: Патотип 0	відсутня	1

49,2	Стійкість до Potato Virus: Патотип 1	відсутня	1
49,3	Стійкість до Potato Virus: Патотип 1 – 2	відсутня	1
50	Стійкість до Phytophthora capsici	відсутня	1
51	Стійкість до Cucumber Mosaic Virus (CMV)	відсутня	1
52	Стійкість до Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV)	відсутня	1
53	Стійкість до Xanthomonas campestris pv. Vesicatoria	наявна	9

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна врожайність 18 т./га. Середня маса плоду 150 г. Вміст сухої речовини 8,4%. Тривалість періоду до досягання 124 доби.
Товщина стінки плоду 5 мм.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Закритий ґрунт

Вид: Перець однорічний (солодкий) *Capsicum annuum* L.

Заявка №: 13113002 **Назва сорту** Ведрана

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

07.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140214

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилія	наявне	9
2	Рослина: габітус	напівпрямий	2
3	Рослина: довжина головного стебла	середнє	5
4	Рослина: укорочені міжвузля (у верхній частині)	відсутні	1
5	Тільки для сортів з укороченими міжвузлями. Рослина: кількість міжвузлів між першою квіткою та укороченими міжвузлями (тест на рослинах без чеканки)	ознака не визначається	0
6	Тільки для сортів без укорочених пагонів. Рослина: довжина міжвузлів (на пагонах I-го порядку)	короткі	3
7	Рослина: антоціанове забарвлення вузлів	наявне	9
8	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення вузлів	сильне	7
9	Стебло: опушення вузлів	помірне	5
10	Рослина: за висотою	середня	5
11	Листок: довжина пластинки	середня	5
12	Листок: ширина пластинки	середня	5
13	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
14	Листок: за формою	овальний	2
15	Листок: хвилястість краю	слабка	3
16	Листок: пухирчастість	дуже слабка	1
17	Листок: форма в поперечному перерізі	помірно увігнута	3
18	Листок: глянуватість	слабка	3
19	Квітконіжка: положення	похиле	2
20	Квітка: антоціанове забарвлення пиляків	наявне	9
21	Плід: забарвлення (перед досяганням)	зелене	3
22	Плід: інтенсивність забарвлення (перед досяганням)	помірне	5
23	Плід: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
24	Плід: положення у просторі	поникле	3
25	Плід: за довжиною	середній	5
26	Плід: діаметр	середній	5
27	Плід: відношення довжина/діаметр	мале	3
28	Плід: форма у поздовжньому розрізі	серцевидна	3
29	Плід: форма поперечного перерізу (на рівні плаценти)	трикутна	2
30	Плід: хвилястість перикарпу у базальній частині	відсутня або дуже слабка	1
31	Плід: хвилястість перикарпу (базальну частину не беруть до уваги)	відсутня або дуже слабка	1
32	Плід: структура поверхні	злегка зморшкувата	2
33	Плід: забарвлення (за досягання)	червоне	3
34	Плід: інтенсивність забарвлення (за досягання)	помірне	5
35	Плід: глянуватість	помірна	5
36	Плід: порожнина у плодоніжці	наявна	9
37	Плід: глибина порожнини у плодоніжці	мілка	3
38	Плід: форма верхівки	притиснута	4
39	Плід: глибина борозенок між частками	помірні	5
40	Плід: кількість часток	три-чотири	4
41	Плід: товщина м'якоті	товста	7
42	Плодоніжка: за довжиною	середня	5
43	Плодоніжка: за товщиною	середня	5
44	Чашечка: за характером виявлення	необгортаюча	1
45	Плід: капсидин у плаценті	відсутній	1
46	Час початку цвітіння (перша квітка на другому квітковому вузлі)	ранній	3
47	Час досягання	пізній	7
48,1	Стійкість до Tobamovirus: Стійкість до Tobamovirus: Патотип 0 (Tobacco MosaicVirus (0))	наявна	9
48,2	Стійкість до Tobamovirus: Патотип 1-2 (Tomato MosaicVirus (1-2))	наявна	9
48,3	Стійкість до Tobamovirus: Патотип 1-2-3 (Pepper Mild Mottle Virus (1-2-3))	відсутня	1
49,1	Стійкість до Potato Virus: Патотип 0	відсутня	1

49,2	Стійкість до Potato Virus: Патотип 1	відсутня	1
49,3	Стійкість до Potato Virus: Патотип 1 – 2	відсутня	1
50	Стійкість до Phytophthora capsici	відсутня	1
51	Стійкість до Cucumber Mosaic Virus (CMV)	наявна	9
52	Стійкість до Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV)	відсутня	1
53	Стійкість до Xanthomonas campestris pv. Vesicatoria	відсутня	1

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна врожайність 22 т./га. Середня маса плоду 200 г. Вміст сухої речовини 8,6%. Тривалість періоду до достигання 147 діб.
Товщина стінки плоду 7 мм.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Закритий ґрунт

Вид: Перець однорічний (солодкий) *Capsicum annuum* L.

Заявка №: 13113003 **Назва сорту** Яніка

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

07.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140215

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилія	відсутнє	1
2	Рослина: габітус	розлогий	3
3	Рослина: довжина головного стебла	середнє	5
4	Рослина: укорочені міжвузля (у верхній частині)	наявні	9
5	Тільки для сортів з укороченими міжвузлями. Рослина: кількість міжвузлів між першою квіткою та укороченими міжвузлями (тест на рослинах без чеканки)	більше трьох	3
6	Тільки для сортів без укорочених пагонів. Рослина: довжина міжвузлів (на пагонах I-го порядку)	ознака не визначається	0
7	Рослина: антоціанове забарвлення вузлів	наявне	9
8	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення вузлів	дуже сильне	9
9	Стебло: опушення вузлів	помірне	5
10	Рослина: за висотою	висока	7
11	Листок: довжина пластинки	дуже довга	9
12	Листок: ширина пластинки	широка	7
13	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
14	Листок: за формою	овальний	2
15	Листок: хвилястість краю	помірна	5
16	Листок: пухирчастість	сильна	7
17	Листок: форма в поперечному перерізі	помірно увігнута	3
18	Листок: глянуватість	сильна	7
19	Квітконіжка: положення	пряме	1
20	Квітка: антоціанове забарвлення пелюstk	наявне	9
21	Плід: забарвлення (перед досяганням)	зелене	3
22	Плід: інтенсивність забарвлення (перед досяганням)	темне	7
23	Плід: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
24	Плід: положення у просторі	поникле	3
25	Плід: за довжиною	середній	5
26	Плід: діаметр	малий	3
27	Плід: відношення довжина/діаметр	дуже велике	9
28	Плід: форма у поздовжньому розрізі	трикутна	7
29	Плід: форма поперечного перерізу (на рівні плаценти)	кругла	3
30	Плід: хвилястість перикарпу у базальній частині	слабка	3
31	Плід: хвилястість перикарпу (базальну частину не беруть до уваги)	відсутня або дуже слабка	1
32	Плід: структура поверхні	гладенька або злегка зморшкувата	1
33	Плід: забарвлення (за досягання)	червоне	3
34	Плід: інтенсивність забарвлення (за досягання)	помірне	5
35	Плід: глянуватість	помірна	5
36	Плід: порожнина у плодоніжці	відсутня	1
37	Плід: глибина порожнини у плодоніжці	ознака не визначається	0
38	Плід: форма верхівки	загострена	2
39	Плід: глибина борозенок між частками	відсутні або дуже мілкі	1
40	Плід: кількість часток	три-чотири	4
41	Плід: товщина м'якоті	середня	5
42	Плодоніжка: за довжиною	довга	7
43	Плодоніжка: за товщиною	тонка	3
44	Чашечка: за характером виявлення	необгортаюча	1
45	Плід: капсидин у плаценті	відсутній	1
46	Час початку цвітіння (перша квітка на другому квітковому вузлі)	ранній	3
47	Час досягання	середній	5
48,1	Стійкість до Tobamovirus: Стійкість до Tobamovirus: Патотип 0 (Tobacco MosaicVirus (0))	наявна	9
48,2	Стійкість до Tobamovirus: Патотип 1-2 (Tomato MosaicVirus (1-2))	наявна	9
48,3	Стійкість до Tobamovirus: Патотип 1-2-3 (Pepper Mild Mottle Virus (1-2-3))	відсутня	1
49,1	Стійкість до Potato Virus: Патотип 0	відсутня	1

49,2	Стійкість до Potato Virus: Патотип 1	відсутня	1
49,3	Стійкість до Potato Virus: Патотип 1 – 2	відсутня	1
50	Стійкість до Phytophthora capsici	відсутня	1
51	Стійкість до Cucumber Mosaic Virus (CMV)	відсутня	1
52	Стійкість до Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV)	відсутня	1
53	Стійкість до Xanthomonas campestris pv. Vesicatoria	відсутня	1

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна врожайність 12 т./га. Середня маса плоду 140 г. Вміст сухої речовини 7,6%. Тривалість періоду до достигання 124 доби.
Товщина стінки плоду 5 мм.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Закритий ґрунт

Вид: Перець однорічний (солодкий) *Capsicum annuum* L.

Заявка №: 13113004 **Назва сорту** Катан

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

07.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140216

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилія	відсутнє	1
3	Рослина: довжина головного стебла	середнє	5
4	Рослина: укорочені міжвузля (у верхній частині)	наявні	9
5	Тільки для сортів з укороченими міжвузлями. Рослина: кількість міжвузлів між першою квіткою та укороченими міжвузлями (тест на рослинах без чеканки)	більше трьох	3
6	Тільки для сортів без укорочених пагонів. Рослина: довжина міжвузлів (на пагонах I-го порядку)	ознака не визначається	0
7	Рослина: антоціанове забарвлення вузлів	наявне	9
8	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення вузлів	дуже слабке	1
9	Стебло: опушення вузлів	сильне	7
10	Рослина: за висотою	дуже висока	9
11	Листок: довжина пластинки	дуже довга	9
12	Листок: ширина пластинки	широка	7
13	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	дуже темне	9
14	Листок: за формою	овальний	2
15	Листок: хвилястість краю	слабка	3
16	Листок: пухирчастість	помірна	5
17	Листок: форма в поперечному перерізі	плоска	5
18	Листок: глянуватість	сильна	7
19	Квітконіжка: положення	пряме	1
20	Квітка: антоціанове забарвлення пиляків	наявне	9
21	Плід: забарвлення (перед досяганням)	зелене	3
22	Плід: інтенсивність забарвлення (перед досяганням)	темне	7
23	Плід: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
24	Плід: положення у просторі	поникле	3
25	Плід: за довжиною	довгий	7
26	Плід: діаметр	дуже великий	9
27	Плід: відношення довжина/діаметр	дуже велике	9
28	Плід: форма у поздовжньому розрізі	прямокутна	5
29	Плід: форма поперечного перерізу (на рівні плаценти)	кругла	3
30	Плід: хвилястість перикарпу у базальній частині	дуже сильна	9
31	Плід: хвилястість перикарпу (базальну частину не беруть до уваги)	сильна	7
32	Плід: структура поверхні	гладенька або злегка зморшувата	1
33	Плід: забарвлення (за досягання)	червоне	3
34	Плід: інтенсивність забарвлення (за досягання)	темне	7
35	Плід: глянуватість	помірна	5
36	Плід: порожнина у плодоніжці	відсутня	1
37	Плід: глибина порожнини у плодоніжці	ознака не визначається	0
38	Плід: форма верхівки	дуже притиснута	5
39	Плід: глибина борозенок між частками	глибокі	7
40	Плід: кількість часток	три-чотири	4
41	Плід: товщина м'якоті	середня	5
42	Плодоніжка: за довжиною	дуже довга	9
43	Плодоніжка: за товщиною	товста	7
44	Чашечка: за характером виявлення	необгортаюча	1
45	Плід: капсидин у плаценті	відсутній	1
46	Час початку цвітіння (перша квітка на другому квітковому вузлі)	пізній	7
47	Час досягання	пізній	7
48,1	Стійкість до Tobamovirus: Стійкість до Tobamovirus: Патотип 0 (Tobacco MosaicVirus (0))	відсутня	1
48,2	Стійкість до Tobamovirus: Патотип 1-2 (Tomato MosaicVirus (1-2))	наявна	9
48,3	Стійкість до Tobamovirus: Патотип 1-2-3 (Pepper Mild Mottle Virus (1-2-3))	відсутня	1
49,1	Стійкість до Potato Virus: Патотип 0	відсутня	1
49,2	Стійкість до Potato Virus: Патотип 1	відсутня	1

49,3	Стійкість до Potato Virus: Патотип 1 – 2	відсутня	1
50	Стійкість до Phytophthora capsici	відсутня	1
51	Стійкість до Cucumber Mosaic Virus (CMV)	відсутня	1
52	Стійкість до Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV)	відсутня	1
53	Стійкість до Xanthomonas campestris pv. Vesicatoria	відсутня	1

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна врожайність 16 т./га. Середня маса плоду 200 г. Вміст сухої речовини 7,9%. Тривалість періоду до досягання 112 діб.
Товщина стінки плоду 6 мм.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Закритий ґрунт

Вид: Троянда Rosa L.

Заявка №: 12246002

Назва сорту Шісеколд

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 16.01.2012

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

17.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140356

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: тип росту	ознака не визначається	0
2	Рослина: габітус (за винятком плетистих сортів)	ознака не визначається	0
3	Рослина: за висотою (під час другої хвилі цвітіння)	низька	3
4	Молодий пагін: антоціанове забарвлення	наявне	9
5	Молодий пагін: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7
6	Стебло: кількість шипів (за винятком дуже малих і тоненьких, як волосина)	багато	7
7	Шипи: домінуючий колір	червонуватий	3
8	Листок: за довжиною	довгий	7
9	Листок: інтенсивність зеленого кольору	помірне	5
10	Листок: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
11	Листок: глянець верхнього боку	помірний	5
12	Листкова пластинка: хвилястість краю	слабка	3
13	Кінцевий листочок: форма пластинки	еліптична	2
14	Кінцевий листочок: форма основи пластинки	заокруглена	3
15	Кінцевий листочок: форма верхівки пластинки	гостра	2
16	Квітконосний пагін: квітучі бічні пагони	ознака не визначається	0
17	Квітконосний пагін: кількість бічних пагонів з квітками	ознака не визначається	0
18	Тільки для сортів з неквітучими бічними пагонами. Квітконосний пагін: кількість квіток	ознака не визначається	0
19	Тільки для сортів з квітучими бічними пагонами. Квітконосний пагін: кількість квіток на пагоні	ознака не визначається	0
20	Бутон: форма у поздовжньому розрізі	ознака не визначається	0
21	Квітка: за повнотою	повна	3
22	Квітка: кількість пелюсток	багато	7
23	Квітка: група кольору	біла	1
24	Квітка: колір середини	ознака не визначається	0
25	Квітка: щільність пелюсток	ознака не визначається	0
26	Квітка: за діаметром	велика	7
27	Квітка: форма	зіркоподібна	3
28	Квітка: за профілем верхньої частини	плескато-випукла	2
29	Квітка: за профілем нижньої частини	плескато-випукла	3
30	Квітка: аромат	відсутній або дуже слабкий	1
31	Чашолисток: членування	дуже сильне	9
32	Пелюстка: послідовне відкривання	наявне	9
33	Пелюстка: форма	обернено-еліптична	2
34	Пелюстка: зубчастість	помірна	5
35	Пелюстка: закрутка країв	сильне	7
36	Пелюстка: хвилястість	слабка	3
37	Пелюстка: за розміром	велика	7
38	Пелюстка: за довжиною	довга	7
39	Пелюстка: за шириною	широка	7
40	Пелюстка: кількість кольорів на внутрішньому боці (за виключенням плями на основі)	один	1
41	Тільки для сортів з одним кольором на внутрішньому боці пелюстки. Пелюстка: розміщення кольору (за виключенням плями на основі)	рівномірний	2
42	Пелюстка основний колір на внутрішньому боці (основний колір з найбільшою площею зайнятої поверхні)	білий	1
43	Для сортів з двома або більше кольорами з внутрішнього боку пелюстки: Пелюстка: вторинний колір (за виключенням плями на основі)	ознака не визначається	0
44	Тільки для сортів з двома або більше кольорами з внутрішнього боку. Пелюстка: третинний колір (за виключенням плями на основі)	ознака не визначається	0
45	Тільки для різнокольорових сортів. Пелюстка: розташування вторинного кольору на внутрішньому боці	ознака не визначається	0
46	Тільки для різнокольорових сортів. Пелюстка: розташування третинного кольору на внутрішньому боці	ознака не визначається	0
47	Пелюстка: пляма на основі з внутрішнього боку	відсутня	1

48	Пелюстка: розмір плям на основі з внутрішнього боку	ознака не визначається	0
49	Пелюстка: колір плям на основі з внутрішнього боку	ознака не визначається	0
50	Пелюстка: основний колір зовнішнього боку (тільки якщо чітко відрізняється від забарвлення внутрішнього боку)	ознака не визначається	0
51	Зовнішня тичинка : домінуючий колір тичинкової нитки	світло-жовтий	3
52	Оплодень: за розміром (пелюстки обпали)	ознака не визначається	0
53	Плід (гіпантій): форма поздовжнього розрізу	ознака не визначається	0
54	Плід (гіпантій): колір під час достигання	ознака не визначається	0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

* Висота рослини 100 см. Період від початку вегетації до початку цвітіння 75 днів, тривалість вегетаційного періоду 1825, тривалість збереження декоративної зрізки 12 днів.

* Дані заявника.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Закритий ґрунт

Вид: Цибуля порей *Allium porrum* L.

Заявка №: 11175002 **Назва сорту** Джампер

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

27.12.2013

Свідоцтво про державну реєстрацію № 130501

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: за висотою	ознака не визначалась	0
2	Листки: положення у просторі	пряме	1
3	Листкова пластинка: вигин	помірний	5
4	Листкова пластинка: за довжиною	коротка	3
5	Листкова пластинка: за шириною	широка	7
6	Листкова пластинка: забарвлення	ознака не визначалась	0
7	Листкова пластинка: інтенсивність забарвлення	темне	7
8	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення	ознака не визначалась	0
9	Листкова пластинка: восковий наліт	помірний	5
10	Рослина: за довжиною	ознака не визначалась	0
11	Стебло: за довжиною	середнє	5
12	Стебло: за діаметром	середнє	5
13	Стебло: відношення довжина/діаметр	мале	3
14	Стебло: формування цибулини	ознака не визначалась	0
15	Стебло: звуження до основи	ознака не визначалась	0
16	Обгортка суцвіття: за довжиною	ознака не визначалась	0
17	Квітка: чоловіча стерильність	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність 85 т/га, Товарна врожайність 65 т/га. Тривалість вегетації 84 діб. Вміст вітаміну С 87 мг%. Сухої речовини в цибулині 16,1%. Загального цукру 8,9%. Ураження хворобами: плямистостями- 2 %, гниллю верхівковою - 2 %. Пошкодженнями шкідниками: цибулевою мухою – 2%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Степ, Лісостеп, Полісся

Вид: Лілійник *Nemerocallis* L.

Заявка №: 11236002 Назва сорту Стожари

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 29.11.2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

14.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140345

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Плодюність	тетраплоїдна	4
2	Рослина: за життєвою формою	міцно спляча	1
3	Рослина: час початку вегетації	середній	5
4	Рослина: за висотою	середня	5
6	Листок: положення у просторі	пониклий біля верхівки	2
7	Листок: за довжиною	середній	5
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: за забарвленням	помірно-зелений	2
10	Квітконос: розташування відносно листків	виступаючий над листками	2
11	Квітконос: залистяність	наявна	9
14	Суцвіття: за довжиною	коротке	3
15	Час цвітіння, місяць	середній	4
16	Рослина: тип цвітіння	звичайний	1
17	Рослина: характер цвітіння	денне	1
18	Рослина: тривалість цвітіння	тривале	7
19	Квітка: кількість на рослині	багато	7
20	Квітка: кількість відкритих на рослині	багато	7
21	Квітка: діаметр	велика	7
22	Квітка: за типом	проста	1
23	Лише для сортів з простою квіткою: Квітка: за формою	зіркоподібна	3
24	Квітка: забарвлення (кольорова група)	жовта	2
25	Квітка: за розподілом забарвлення на частках оцвіттини	однокольорова	1
26	Квітка: основний колір внутрішнього боку внутрішньої пелюстки	жовто-помаранчевий	13
27	Квітка: основний колір зовнішнього боку внутрішньої пелюстки	жовто-помаранчевий	13
28	Квітка: основний колір внутрішнього боку зовнішньої пелюстки	жовто-помаранчевий	13
29	Квітка: основний колір зовнішнього боку зовнішньої пелюстки	жовто-помаранчевий	13
32	Квітка: основний колір рисунка на частках оцвіттини	ознака не визначалась	0
33	Квітка: вторинний колір Лише для змішаних та багатокольорових сортів за розподілом забарвлення квіток	ознака не визначається	0
34	Квітка: третинний колір Лише для змішаних та багатокольорових сортів за розподілом забарвлення квіток	ознака не визначається	0
35	Квітка: перший колір Лише для двотонових, оберненодвотонових, двокольорових та оберненодвокольорових сортів	ознака не визначається	0
38	Оцвіттина: розташування часток	дотичні	3
39	Оцвіттина: розташування внутрішніх часток відносно площини квітки	відігнуті донизу	3
40	Оцвіттина: розташування зовнішніх часток відносно площини квітки	горизонтальні	2
41	Квітка: форма верхівки внутрішньої пелюстки	загострена	1
42	Квітка: форма верхівки зовнішньої пелюстки	стисла з перетяжкою	2
43	Квітка: характер краю внутрішньої пелюстки	рівний	1
44	Квітка: характер краю зовнішньої пелюстки	хвилястий	2
45	Квітка: поверхня внутрішньої пелюстки	зморшувата	2
46	Квітка: поверхня зовнішньої пелюстки	рівна	1
49	Пилок: за кольором	помаранчевий	3
50	Плід: частота зав'язування плодів	низька	3
51	Рослина: тривалість вегетаційного періоду	середній	5

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

*Висота рослин – 85см. Зимостійкість - 9 балів. Період від початку вегетації до початку цвітіння 130 днів, тривалість вегетаційного періоду 230 днів, тривалість цвітіння – 45днів.

*Дані заявника.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Полісся, Лісостеп

Вид: Суріпиця звичайна (озима) *Barbarea vulgaris* R. Br.

Заявка №: 09145001 **Назва сорту** Раміра

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 16.12.2009

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

20.01.2014

Свідчення про державну реєстрацію № 140250

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насінина: ерукова кислота	наявна	9
2	Плоїдність	диплоїд	2
3	Паросток: за довжиною сім'ядольного листочка	середня	5
4	Паросток: за шириною сім'ядольного листочка	середня	5
5	Листок: положення в просторі	розлоге	3
6	Листок: вигин верхівки	помірний	5
7	Листок: інтенсивність зеленого кольору	помірний	5
8	Листок: тип	розчленований	2
9	Лише для сортів із розчленованими листками: листок: кількість часток	середня кількість	5
10	Листок: хвилястість краю	помірна	5
11	Листок: зубчастість краю	помірна	5
12	Листок: за довжиною (пластинка з черешком)	середній	5
13	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5
14	Схильність до формування суцвіть у рік сівби; озимі типи у весняних випробуваннях	слабка	3
15	Схильність до формування суцвіть у рік сівби; випробування ярих типів за пізньолітньої сівби	слабка	3
16	Час цвітіння (50% рослин зі щонайменше однією відкритою квіткою)	ранній	3
17	Квітка: колір пелюстки	лимонно-жовтий	1
18	Квітка: довжина пелюстки	середня	5
19	Квітка: ширина пелюстки	середня	5
20	Квітка: здатність до утворення пилку	наявна	9
21	Рослина: за загальною довжиною разом з бічними пагонами	середня	5
22	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою і носиком)	середній	5
23	Стручок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5
24	Стручок: довжина носика	довгий	7
25	Стручок: довжина плодоніжки	середня	5
26	Насіння: частота насінин з жовтим забарвленням	відсутнє або дуже рідко	1

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Висота рослин 120-130 см. Урожайність насіння 3,0-3,5 т/га. Урожайність зеленої маси (сухої речовини) 27-32 т/га. Вміст олії 35-40%. Вегетаційний період 265-270 діб. Маса 1000 насінин 2,3-2,4г. Зимостійкість, посухостійкість 8 балів. Стійкість до вилягання, до обсіпання 7 балів.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Степ, Лісостеп, Полісся

Вид: Баклажан *Solanum melongena* L.

Заявка №: 09022004 **Назва сорту** Ітака F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

24.02.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140001

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилля	відсутнє	1
2	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилля	ознака не визначається	0
3	Рослина: габітус	напівпрямий	3
4	Рослина: за висотою	висока	7
5	Рослина: за довжиною стебла (від сім'ядольного вузла до 1-ої квітки)	довга	7
6	Стебло: антоціанове забарвлення	наявне	9
7	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірне	5
8	Стебло: опушення	помірне	5
9	Листкова пластинка: за розміром	середня	5
10	Листкова пластинка: хвилястість краю	помірна	5
11	Листкова пластинка: пухирчастість	відсутня або дуже слабка	1
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	світле	3
13	Суцвіття: кількість квіток	від одної до трьох	1
14	Квітка: за розміром	середня	5
15	Квітка: інтенсивність пурпурового забарвлення	помірне	5
16	Плід: за довжиною	середній	5
17	Плід: за діаметром	малий	3
18	Плід: відношення довжина / діаметр	велике	7
19	Плід: основна форма	грушоподібна	4
20	Плід: розмір рубця маточки	малий	3
21	Плід: форма верхівки	приплюснута	2
22	Плід: глибина зазублення	ознака не визначалась	0
23	Лише для сортів з циліндричними плодами: Плід: вигин	ознака не визначається	0
24	Плід: забарвлення шкірки у товарній стиглості	фіолетове	3
25	Лише для сортів із зеленим і фіолетовим забарвленням шкірки: Плід: інтенсивність забарвлення шкірки (як для 24)	темне	7
26	Плід: глянуватість (як для 24)	сильна	7
27	Плід: плямистість	відсутня	1
28	Плід: смугастість	відсутня	1
29	Плід: випуклість смуг	ознака не визначалась	0
30	Плід: щільність смуг	ознака не визначалась	0
31	Плід: ребристість	відсутня або дуже слабка	1
32	Плід: довжина квітконіжки	коротка	3
33	Плід: антоціанове забарвлення під чашечкою	відсутнє	1
34	Плід: інтенсивність антоціанового забарвлення під чашечкою	ознака не визначається	0
35	Плід: розмір чашечки	велика	7
36	Плід: антоціанове забарвлення чашечки	відсутнє	1
37	Плід: інтенсивність антоціанового забарвлення чашечки	ознака не визначається	0
38	Плід: шипуватість чашечки	відсутня або дуже слабка	1
39	Плід: зморшуватість чашечки	дуже слабка	1
40	Плід: забарвлення м'якоті	зеленувате	2
41	Плід: забарвлення шкірки за фізіологічної стиглості	вохристе	3
42	Час початку цвітіння	середній	5
43	Час фізіологічної стиглості	ранній	3

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Тривалість вегетації 105діб. Вміст сухої речовини в плодах 8,5%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Степ, Лісостеп, Полісся

Вид: Диня звичайна Cucumis melo L.

Заявка №: 11025002 Назва сорту Оксана

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

07.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140127

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: довжина гіпокотилу (фаза першого справжнього листка)	середній	5
2	Паросток: розмір сім'ядоль (як для 1)	великі	7
3	Паросток: інтенсивність зеленого забарвлення сім'ядолей (як для 1)	помірне	5
4	Листкова пластинка: за розміром	середня	5
5	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
6	Листкова пластинка: вираженість лопатей	помірна	5
7	Листкова пластинка: довжина центральної лопаті	середня	5
8	Листкова пластинка: зубчастість країв	помірна	5
9	Листкова пластинка: пухирчастість	помірна	5
10	Черешок: положення (у фазі 3-х листків)	напівпряме	5
11	Черешок: за довжиною	довгий	7
12	Квітка: за статтю (за повного цвітіння)	моноеційні	1
13	Молодий плід: відтінок зеленого забарвлення шкірки	зелене	3
14	Молодий плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки	темне	7
15	Молодий плід: щільність цяток	щільні	7
16	Молодий плід: розмір цяток	середні	5
17	Молодий плід: відмінність забарвлення цяток і основного забарвлення	помірна	5
18	Молодий плід: вираженість забарвлення жолобків	відсутнє або дуже слабке	1
19	Молодий плід: інтенсивність забарвлення жолобків	ознака не визначалась	0
20	Молодий плід: довжина плодоніжки	середня	5
21	Плід: товщина плодоніжки (на відстані 1 см від плоду)	товста	7
22	Молодий плід: поширення темної плями навколо плодоніжки	мале	3
23	Плід: зміна забарвлення шкірки від молодого плоду до стиглого	на пізніх стадіях розвитку плоду	2
24	Плід: за довжиною	довгий	7
25	Плід: діаметр	середній	5
26	Плід: відношення довжини до діаметра	від середнього до великого	6
27	Плід: місце найбільшого діаметра	у центрі	2
28	Плід: форма поздовжнього розрізу	широкоеліптична	3
29	Плід: основне забарвлення шкірки за досягання	жовте	2
30	Плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки за досягання	помірне	5
31	Плід: відтінок основного забарвлення шкірки за досягання	вохристий	5
32	Плід: щільність розміщення цяток	відсутні або дуже рідкі	1
33	Плід: розмір цяток	ознака не визначалась	0
34	Плід: забарвлення цяток	ознака не визначалась	0
35	Плід: інтенсивність забарвлення цяток	ознака не визначалась	0
36	Плід: щільність розміщення плям	відсутні або дуже рідкі	1
37	Плід: розмір плям	ознака не визначалась	0
38	Плід: бородавки	відсутні	1
39	Плід: міцність прикріплення плодоніжки до стиглого плоду	дуже слабка	1
40	Плід: форма основи	заокруглена	2
41	Плід: форма верхівки	заокруглена	2
42	Плід: розмір маточкового рубця	середній	5
43	Плід: борізки	відсутні або дуже слабо виражені	1
44	Плід: ширина боріздов	ознака не визначалась	0
45	Плід: глибина боріздов	ознака не визначалась	0
46	Плід: забарвлення боріздов	ознака не визначалась	0
47	Плід: зморшкуватість поверхні	слабка	3
48	Плід: коркове утворення	наявне	9
49	Плід: товщина коркового шару	тонкий	3
50	Плід: візерунок коркового утворення	лише сіткою	5
51	Плід: щільність візерунку коркового утворення	щільний	7
52	Плід: темп зміни забарвлення шкірки плоду від технічної стиглості до біологічної	повільна	3
53	Плід: товщина м'якоті в поздовжньому розрізі (в місці максимального діаметра плоду)	середня	5

54	Плід: основне забарвлення м'якоті	оранжеве	5
55	Лише для сортів з оранжевим забарвленням м'якоті. Плід: інтенсивність оранжевого забарвлення м'якоті	світле	3
56	Лише для сортів із забарвленням іншим, ніж оранжеве. Плід: вторинний оранжево-рожевий колір м'якоті	ознака не визначається	0
57	Плід: консистенція м'якоті	м'яка	3
58	Лише для сортів, що змінюють забарвлення шкірки плоду від технічної до біологічної стиглості. Плід: відтінок забарвлення шкірки (за біологічної стиглості)	оранжево-жовтий	2
59	Лише для сортів, що змінюють забарвлення шкірки плоду від технічної до біологічної стиглості з жовтим або оранжево-жовтим забарвленням шкірки. Плід: інтенсивність жовтого забарвлення шкірки (за біологічної стиглості)	ознака не визначається	0
60	Насінина: за довжиною	середня	5
61	Насінина: за шириною	середня	5
62	Насінина: форма	не подібна до форми кедрового горішка	1
63	Насінина: забарвлення	кремово-жовте	2
64	Лише для сортів з кремово-жовтим забарвленням насіння. Насінина: інтенсивність забарвлення	помірне	5
65	Час цвітіння чоловічих квіток	середній	5
66	Час цвітіння жіночих квіток	ранній	3
67	Час достигання	ранній	3
68	Термін зберігання плоду	короткий	3
69,1	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>Melonis</i> : Paca 0	ознака не визначалась	0
69,2	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>Melonis</i> : Paca 1	ознака не визначалась	0
69,3	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>Melonis</i> : Paca 2	ознака не визначалась	0
69,4	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>Melonis</i> : Паси 1-2	ознака не визначалась	0
70,1	Стійкість до <i>Sphaerotheca fuliginea</i> (<i>Podosphaera xanthii</i>) (борошнистої роси): Paca 1	ознака не визначалась	0
70,2	Стійкість до <i>Sphaerotheca fuliginea</i> (<i>Podosphaera xanthii</i>) (борошнистої роси): Paca 2	ознака не визначалась	0
70,3	Стійкість до <i>Sphaerotheca fuliginea</i> (<i>Podosphaera xanthii</i>) (борошнистої роси): Paca 5	ознака не визначалась	0
71	Стійкість до <i>Erysiphe cichoracearum</i> (<i>Golovinomyces cichoracearum</i>), Paca 1 (борошнистої роси) сприйнятливий	ознака не визначалась	0
72	Стійкість до колоній <i>Aphis gossypii</i>	ознака не визначалась	0
73	Стійкість до штаму F вірусу жовтої мозаїки цукіні	ознака не визначалась	0
74,1	Стійкість до кільчастого вірусу папайї (PRSV): Paca GVA	ознака не визначалась	0
74,2	Стійкість до кільчастого вірусу папайї (PRSV): Paca E2	ознака не визначалась	0
75	Стійкість до раси E8 вірусу некротичної плямистості дині (MNSV)	ознака не визначалась	0
76	Стійкість до вірусу мозаїки огірка (CMV)	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальний урожай 65 т/га; період від повних сходів до першого збору 70 днів; період від садіння 30-ти денної розсади до останнього збирання плодів 80 днів; Вміст: сухої речовини у плоді – 15,2 %, загального цукру - 13,6 %.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Степ, Лісостеп

Вид: Диня звичайна Cucumis melo L.

Заявка №: 10025002 Назва сорту Фантазія

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 26.02.2014 Патент №: 140002

Дата пріоритету 22.04.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

09.01.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140003

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: довжина гіпокотилу (фаза першого справжнього листка)	середній	5
2	Паросток: розмір сім'ядоль (як для 1)	великі	7
3	Паросток: інтенсивність зеленого забарвлення сім'ядолей (як для 1)	слабке	3
4	Листкова пластинка: за розміром	середня	5
5	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
6	Листкова пластинка: вираженість лопатей	слабка	3
7	Листкова пластинка: довжина центральної лопаті	середня	5
8	Листкова пластинка: зубчастість країв	слабка	3
9	Листкова пластинка: пухирчастість	помірна	5
10	Черешок: положення (у фазі 3-х листків)	пряме	3
11	Черешок: за довжиною	середній	5
12	Квітка: за статтю (за повного цвітіння)	андромонеційні	2
13	Молодий плід: відтінок зеленого забарвлення шкірки	жовтувато-зелене	2
14	Молодий плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки	дуже слабке	1
15	Молодий плід: щільність цяток	щільні	7
16	Молодий плід: розмір цяток	малі	3
17	Молодий плід: відмінність забарвлення цяток і основного забарвлення	сильна	7
18	Молодий плід: вираженість забарвлення жолобків	відсутнє або дуже слабке	1
19	Молодий плід: інтенсивність забарвлення жолобків	ознака не визначалась	0
20	Молодий плід: довжина плодоніжки	коротка	3
21	Плід: товщина плодоніжки (на відстані 1 см від плоду)	середня	5
22	Молодий плід: поширення темної плями навколо плодоніжки	відсутня або дуже мале	1
23	Плід: зміна забарвлення шкірки від молодого плоду до стиглого	на пізніх стадіях розвитку плоду	2
24	Плід: за довжиною	короткий	3
25	Плід: діаметр	малий	3
26	Плід: відношення довжини до діаметра	дуже мале	1
27	Плід: місце найбільшого діаметра	у центрі	2
28	Плід: форма поздовжнього розрізу	кругла	4
29	Плід: основне забарвлення шкірки за досягання	жовте	2
30	Плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки за досягання	темне	7
31	Плід: відтінок основного забарвлення шкірки за досягання	оранжевий	4
32	Плід: щільність розміщення цяток	відсутні або дуже рідкі	1
33	Плід: розмір цяток	ознака не визначалась	0
34	Плід: забарвлення цяток	ознака не визначалась	0
35	Плід: інтенсивність забарвлення цяток	ознака не визначалась	0
36	Плід: щільність розміщення плям	відсутні або дуже рідкі	1
37	Плід: розмір плям	ознака не визначалась	0
38	Плід: бородавки	відсутні	1
39	Плід: міцність прикріплення плодоніжки до стиглого плоду	сильна	7
40	Плід: форма основи	плеската	3
41	Плід: форма верхівки	плеската	3
42	Плід: розмір маточкового рубця	середній	5
43	Плід: борізки	слабко виражені	2
44	Плід: ширина боріздов	вузькі	3
45	Плід: глибина боріздов	дуже мілкі	1
46	Плід: забарвлення боріздов	жовте	2
47	Плід: зморшкуватість поверхні	відсутня або дуже слабка	1
48	Плід: коркове утворення	наявне	9
49	Плід: товщина коркового шару	середній	5
50	Плід: візерунок коркового утворення	лише лініями	3
51	Плід: щільність візерунку коркового утворення	рідкий	3
52	Плід: темп зміни забарвлення шкірки плоду від технічної стиглості до біологічної	помірна	5
53	Плід: товщина м'якоті в поздовжньому розрізі (в місці максимального діаметра плоду)	середня	5

54	Плід: основне забарвлення м'якоті	зеленувато-біле	2
55	Лише для сортів з оранжевим забарвленням м'якоті. Плід: інтенсивність оранжевого забарвлення м'якоті	ознака не визначається	0
56	Лише для сортів із забарвленням іншим, ніж оранжеве. Плід: вторинний оранжево-рожевий колір м'якоті	відсутній або дуже слабкий	1
57	Плід: консистенція м'якоті	середня	5
58	Лише для сортів, що змінюють забарвлення шкірки плоду від технічної до біологічної стиглості. Плід: відтінок забарвлення шкірки (за біологічної стиглості)	ознака не визначається	0
59	Лише для сортів, що змінюють забарвлення шкірки плоду від технічної до біологічної стиглості з жовтим або оранжево-жовтим забарвленням шкірки. Плід: інтенсивність жовтого забарвлення шкірки (за біологічної стиглості)	ознака не визначається	0
60	Насіннина: за довжиною	середня	5
61	Насіннина: за шириною	середня	5
62	Насіннина: форма	не подібна до форми кедрового горішка	1
63	Насіннина: забарвлення	кремово-жовте	2
64	Лише для сортів з кремово-жовтим забарвленням насіння. Насіннина: інтенсивність забарвлення	світле	3
65	Час цвітіння чоловічих квіток	середній	5
66	Час цвітіння жіночих квіток	середній	5
67	Час достигання	середній	5
68	Термін зберігання плоду	тривалий	7
69,1	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>Melonis</i> : Paca 0	ознака не визначалась	0
69,2	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>Melonis</i> : Paca 1	ознака не визначалась	0
69,3	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>Melonis</i> : Paca 2	ознака не визначалась	0
69,4	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>Melonis</i> : Паси 1-2	ознака не визначалась	0
70,1	Стійкість до <i>Sphaerotheca fuliginea</i> (<i>Podosphaera xanthii</i>) (борошнистої роси): Paca 1	ознака не визначалась	0
70,2	Стійкість до <i>Sphaerotheca fuliginea</i> (<i>Podosphaera xanthii</i>) (борошнистої роси): Paca 2	ознака не визначалась	0
70,3	Стійкість до <i>Sphaerotheca fuliginea</i> (<i>Podosphaera xanthii</i>) (борошнистої роси): Paca 5	ознака не визначалась	0
71	Стійкість до <i>Erysiphe cichoracearum</i> (<i>Golovinomyces cichoracearum</i>), Paca 1 (борошнистої роси) сприйнятливий	ознака не визначалась	0
72	Стійкість до колоній <i>Aphis gossypii</i>	ознака не визначалась	0
73	Стійкість до штаму F вірусу жовтої мозаїки цукіні	ознака не визначалась	0
74,1	Стійкість до кільчастого вірусу папайї (PRSV): Paca GVA	ознака не визначалась	0
74,2	Стійкість до кільчастого вірусу папайї (PRSV): Paca E2	ознака не визначалась	0
75	Стійкість до раси E8 вірусу некротичної плямистості дині (MNSV)	ознака не визначалась	0
76	Стійкість до вірусу мозаїки огірка (CMV)	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальний урожай 15,7 т/га; період від повних сходів до першого збору 60 днів; період від садіння 30-ти денної розсади до останнього збирання плодів 22 днів; ураженість борошнистою росою – 0,6 %, бактеріозом – 2,0%, Вміст: сухої речовини у плоді – 14,6 %, загального цукру – 12,6 %.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Степ

Вид: Кабачок Cucurbita pepo L. var. giromontia Duch.

Заявка №: 09026006 Назва сорту Амьяд F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

24.02.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140005

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: форма сім'ядолей	еліптична	2
2	Паросток: інтенсивність зеленого забарвлення сім'ядолей	світле	3
3	Паросток: форма поперечного перерізу сім'ядолі	випукла	3
4	Рослина: габітус	кущовий	1
5	Рослина: галуження	відсутнє	1
6	Рослина: галуження стебла	ознака не визначалась	0
7	Тільки для кущових сортів. Рослина: положення черешка (за виключенням нижніх зовнішніх листків)	від прямого до напівпрямого	2
8	Стебло: забарвлення	цілком зелене	1
9	Стебло: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
10	Стебло: крапчастість	відсутня	1
11	Стебло: вусики	відсутні або рудиментарні	1
12	Листкова пластинка: за розміром	середня	5
13	Листкова пластинка: розсіченість	ознака не визначалась	0
14	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	темне	7
15	Листкова пластинка: срібляста плямистість	наявна	9
16	Листкова пластинка: поверхня, охоплена сріблястою плямистістю	середня	5
17	Черешок: за довжиною	середній	5
18	Черешок: кількість шипів	середня кількість	5
19	Жіноча квітка: кільце всередині віночка	наявне	9
20	Жіноча квітка: забарвлення кільця всередині віночка	зелене	2
21	Лише сорти з зеленим забарвленням кільця всередині віночка. Жіноча квітка: інтенсивність забарвлення	помірне	5
22	Чоловіча квітка: вираження кільця всередині віночка	наявне	9
23	Чоловіча квітка: забарвлення кільця всередині віночка	жовте і зелене	3
24	Лише сорти з зеленим забарвленням кільця всередині віночка. Чоловіча квітка: інтенсивність забарвлення кільця всередині віночка	ознака не визначається	0
25	Лише сорти типу цукіні. Молодий плід: відношення довжини до максимального діаметра	середнє	5
26	Лише сорти типу цукіні та цукіні кулястого. Молодий плід: переважна форма	конічно-еліптична	3
27	Молодий плід: основне забарвлення шкірки (за винятком забарвлення ребер або борозенок)	частково біле і частково зелене	6
28	Лише сорти з жовтим забарвленням шкірки. Молодий плід: інтенсивність жовтого забарвлення шкірки (як для 27)	ознака не визначається	0
29	Лише сорти із зеленим забарвленням шкірки. Молодий плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки (як для 27)	помірне	5
30	Плід: переважна форма	дископодібна	1
31,1	Лише сорти типу патисон. Плід: за довжиною	ознака не визначається	0
31,2	Лише сорти типу жолудь. Плід: за довжиною	ознака не визначається	0
31,3	Лише сорти типу з шийкою. Плід: за довжиною	ознака не визначається	0
31,4	Лише сорти типу цукіні. Плід: за довжиною	середній	5
32,1	Лише сорти типу патисон. Плід: максимальний діаметр	ознака не визначається	0
32,2	Лише сорти типу жолудь. Плід: максимальний діаметр	ознака не визначається	0
32,3	Лише сорти типу цукіні. Плід: максимальний діаметр	середній	5
33,1	Лише сорти типу патисон. Плід: відношення довжини до найбільшого діаметра	ознака не визначається	0
33,2	Лише сорти типу жолудь. Плід: відношення довжини до найбільшого діаметра	ознака не визначається	0
33,3	Лише сорти типу цукіні. Плід: відношення довжини до найбільшого діаметра	мале	3
34,1	Лише сорти типу гарбуз. Плід: за розміром	ознака не визначається	0
34,2	Лише сорти типу Rondini. Плід: за розміром	ознака не визначається	0
35	Лише сорти типу мініатюрний гарбуз. Плід: форма плодоніжки	ознака не визначається	0
36	Лише сорти типу патисон. Плід: вираженість екваторіального краю	ознака не визначається	0
37	Лише сорти типу патисон. Плід: позиція (положення) екваторіального краю	ознака не визначається	0
38	Лише сорти типу патисон. Плід: форма плодоніжки	ознака не визначається	0
39	Лише сорти типу патисон. Плід: форма маточкового кінця	ознака не визначається	0
40	Лише сорти типу жолудь. Плід: положення найбільшого діаметра	ознака не визначається	0

41	Лише сорти типу жолудь. Плід: форма плодоніжки	ознака не визначається	0
42	Лише сорти типу з шийкою. Плід: довжина шийки	ознака не визначається	0
43	Лише сорти типу з шийкою. Плід: відношення діаметра шийки до найбільшого діаметра	ознака не визначається	0
44	Лише сорти типу з шийкою. Плід: викривлення шийки	відсутнє	1
45	Лише сорти типу з шийкою і цукіні. Плід: форма маточкового кінця	округла	1
46	Плід: борозенки	відсутні	1
47	Плід: глибина борозенок	ознака не визначалась	0
48	Плід: ребра	наявні	9
49	Плід: ступінь виявлення ребер	дуже слабо	1
50	Плід: основне забарвлення шкірки (забарвлення плям, крапок, смужок і смуг не брати до уваги)	кремове	2
51	Лише сорти з жовтим забарвленням шкірки. Плід: інтенсивність жовтого забарвлення шкірки (як для 50)	ознака не визначається	0
52	Лише сорти з жовтим забарвленням шкірки. Плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки (як для 50)	ознака не визначається	0
53	Лише сорти з основним подвійним забарвленням шкірки. Плід: поширення зеленого забарвлення	ознака не визначається	0
54	Плід: смужки на гранях	наявні	9
55	Плід: колір смужок на гранях	жовті	2
56	Плід: забарвлення ребер відносно основного забарвлення шкірки (як для 50)	темніше	2
57	Плід: плямистість	наявна	9
58	Плід: переважний розмір плям	малі	3
59	Плід: вторинне зелене забарвлення між ребрами (плями до уваги не беруть)	відсутнє	1
60	Плід: інтенсивність вторинного зеленого забарвлення між ребрами	ознака не визначалась	0
61	Плід: поширення вторинного зеленого забарвлення між ребрами	ознака не визначалась	0
62	Плід: бородавки на шкірці	відсутні	1
63	Плід: кількість бородавок на шкірці	ознака не визначалась	0
64	Плід: розмір квіткового рубця	великий	7
65	Плід: довжина плодоніжки	середня	5
66	Плід: забарвлення плодоніжки	зелене	2
67	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плодоніжки	темне	7
68	Плід: крапчастість (плямистість) плодоніжки	наявна	9
69	Стиглий плід: основне забарвлення шкірки (забарвлення крапок, плям, смуг і смужечок не брати до уваги)	кремове	3
70	Стиглий плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (лише жовтого чи оранжевого)	помірне	5
71	Стиглий плід: вторинне забарвлення (як для 69)	білуватє	1
72	Стиглий плід: зелений відтінок (лише білого і кремового)	відсутній	1
73	Стиглий плід: переважаючий зелений відтінок (як для 72)	ознака не визначалась	0
74	Стиглий плід: забарвлення м'якоті	кремове	1
75	Стиглий плід: здерев'яніння шкірки	відсутнє	1
76	Стиглий плід: структура м'якоті	не волокниста	1
77	Насінина: за розміром	середня	5
78	Насінина: форма	еліптична	5
79	Насінина: лушпиння	наявне	9
80	Насінина: наявне лушпиння	повністю розвинене	2
81	Насіння: за кольором	кремове	2

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Група стиглості – 620. Тривалість періоду до настання технічної стиглості – 48 діб. Вміст сухої речовини – 4,2%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Степ, Лісостеп, Полісся

Вид: Кабачок Cucurbita pepo L.var. giromontia Duch.

Заявка №: 09026005 Назва сорту Голд Раш F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

24.02.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140004

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: форма сім'ядолей	вузькоеліптична	1
2	Паросток: інтенсивність зеленого забарвлення сім'ядолей	світле	3
3	Паросток: форма поперечного перерізу сім'ядолі	випукла	3
4	Рослина: габітус	кущовий	1
5	Рослина: галуження	відсутнє	1
6	Рослина: галуження стебла	ознака не визначалась	0
7	Тільки для кущових сортів. Рослина: положення черешка (за виключенням нижніх зовнішніх листків)	від прямого до напівпрямого	2
8	Стебло: забарвлення	цілком зелене	1
9	Стебло: інтенсивність зеленого забарвлення	темне	7
10	Стебло: крапчастість	відсутня	1
11	Стебло: вусики	відсутні або рудиментарні	1
12	Листкова пластинка: за розміром	середня	5
13	Листкова пластинка: розсіченість	глибока	7
14	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	темне	7
15	Листкова пластинка: срібляста плямистість	наявна	9
16	Листкова пластинка: поверхня, охоплена сріблястою плямистістю	середня	5
17	Черешок: за довжиною	середній	5
18	Черешок: кількість шипів	кілька	3
19	Жіноча квітка: кільце всередині віночка	відсутнє	1
20	Жіноча квітка: забарвлення кільця всередині віночка	ознака не визначалась	0
21	Лише сорти з зеленим забарвленням кільця всередині віночка. Жіноча квітка: інтенсивність забарвлення	ознака не визначається	0
22	Чоловіча квітка: вираження кільця всередині віночка	наявне	9
23	Чоловіча квітка: забарвлення кільця всередині віночка	жовте і зелене	3
24	Лише сорти з зеленим забарвленням кільця всередині віночка. Чоловіча квітка: інтенсивність забарвлення кільця всередині віночка	ознака не визначається	0
25	Лише сорти типу цукіні. Молодий плід: відношення довжини до максимального діаметра	велике	7
26	Лише сорти типу цукіні та цукіні кулястого. Молодий плід: переважна форма	циліндрична	5
27	Молодий плід: основне забарвлення шкірки (за винятком забарвлення ребер або борозенок)	жовте	3
28	Лише сорти з жовтим забарвленням шкірки. Молодий плід: інтенсивність жовтого забарвлення шкірки (як для 27)	темне	7
29	Лише сорти із зеленим забарвленням шкірки. Молодий плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки (як для 27)	ознака не визначається	0
30	Плід: переважна форма	циліндрична	9
31,1	Лише сорти типу патисон. Плід: за довжиною	ознака не визначається	0
31,2	Лише сорти типу жолудь. Плід: за довжиною	ознака не визначається	0
31,3	Лише сорти типу з шийкою. Плід: за довжиною	ознака не визначається	0
31,4	Лише сорти типу цукіні. Плід: за довжиною	середній	5
32,1	Лише сорти типу патисон. Плід: максимальний діаметр	ознака не визначається	0
32,2	Лише сорти типу жолудь. Плід: максимальний діаметр	ознака не визначається	0
32,3	Лише сорти типу цукіні. Плід: максимальний діаметр	середній	5
33,1	Лише сорти типу патисон. Плід: відношення довжини до найбільшого діаметра	ознака не визначається	0
33,2	Лише сорти типу жолудь. Плід: відношення довжини до найбільшого діаметра	ознака не визначається	0
33,3	Лише сорти типу цукіні. Плід: відношення довжини до найбільшого діаметра	середнє	5
34,1	Лише сорти типу гарбуз. Плід: за розміром	ознака не визначається	0
34,2	Лише сорти типу Rondini. Плід: за розміром	ознака не визначається	0
35	Лише сорти типу мініатюрний гарбуз. Плід: форма плодоніжки	ознака не визначається	0
36	Лише сорти типу патисон. Плід: вираженість екваторіального краю	ознака не визначається	0
37	Лише сорти типу патисон. Плід: позиція (положення) екваторіального краю	ознака не визначається	0
38	Лише сорти типу патисон. Плід: форма плодоніжки	ознака не визначається	0
39	Лише сорти типу патисон. Плід: форма маточкового кінця	ознака не визначається	0
40	Лише сорти типу жолудь. Плід: положення найбільшого діаметра	ознака не визначається	0

41	Лише сорти типу жолудь. Плід: форма плодоніжки	ознака не визначається	0
42	Лише сорти типу з шийкою. Плід: довжина шийки	ознака не визначається	0
43	Лише сорти типу з шийкою. Плід: відношення діаметра шийки до найбільшого діаметра	ознака не визначається	0
44	Лише сорти типу з шийкою. Плід: викривлення шийки	відсутнє	1
45	Лише сорти типу з шийкою і цукіні. Плід: форма маточкового кінця	округла	1
46	Плід: борозенки	відсутні	1
47	Плід: глибина борозенок	ознака не визначалась	0
48	Плід: ребра	наявні	9
49	Плід: ступінь виявлення ребер	слабко	3
50	Плід: основне забарвлення шкірки (забарвлення плям, крапок, смужок і смуг не брати до уваги)	жовте	3
51	Лише сорти з жовтим забарвленням шкірки. Плід: інтенсивність жовтого забарвлення шкірки (як для 50)	дуже темне	9
52	Лише сорти з жовтим забарвленням шкірки. Плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки (як для 50)	ознака не визначається	0
53	Лише сорти з основним подвійним забарвленням шкірки. Плід: поширення зеленого забарвлення	ознака не визначається	0
54	Плід: смужки на гранях	відсутні	1
55	Плід: колір смужок на гранях	ознака не визначалась	0
56	Плід: забарвлення ребер відносно основного забарвлення шкірки (як для 50)	однакове	1
57	Плід: плямистість	відсутня	1
58	Плід: переважний розмір плям	ознака не визначалась	0
59	Плід: вторинне зелене забарвлення між ребрами (плями до уваги не беруть)	відсутнє	1
60	Плід: інтенсивність вторинного зеленого забарвлення між ребрами	ознака не визначалась	0
61	Плід: поширення вторинного зеленого забарвлення між ребрами	ознака не визначалась	0
62	Плід: бородавки на шкірці	відсутні	1
63	Плід: кількість бородавок на шкірці	ознака не визначалась	0
64	Плід: розмір квіткового рубця	великий	7
65	Плід: довжина плодоніжки	середня	5
66	Плід: забарвлення плодоніжки	частково жовте і частково зелене	3
67	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плодоніжки	темне	7
68	Плід: крапчастість (плямистість) плодоніжки	наявна	9
69	Стиглий плід: основне забарвлення шкірки (забарвлення крапок, плям, смуг і смужечок не брати до уваги)	оранжеве	5
70	Стиглий плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (лише жовтого чи оранжевого)	світле	3
71	Стиглий плід: вторинне забарвлення (як для 69)	ознака не визначалась	0
72	Стиглий плід: зелений відтінок (лише білого і кремового)	ознака не визначається	0
73	Стиглий плід: переважаючий зелений відтінок (як для 72)	ознака не визначалась	0
74	Стиглий плід: забарвлення м'якоті	оранжеве	3
75	Стиглий плід: здерев'яніння шкірки	наявне	9
76	Стиглий плід: структура м'якоті	не волокниста	1
77	Насінина: за розміром	середня	5
78	Насінина: форма	широкоеліптична	7
79	Насінина: лушпиння	наявне	9
80	Насінина: наявне лушпиння	повністю розвинене	2
81	Насіння: за кольором	білуваті	1

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарний урожай – 470 т/га. Тривалість періоду до настання технічної стиглості – 48 діб. Вміст сухої речовини – 3,9%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Степ, Лісостеп, Полісся

Вид: Кавун звичайний *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai

Заявка №: 09027017 **Назва сорту** Колізей F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

07.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140128

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Плодюність	диплоїд	2
2	Сім'ядолі: форма	еліптична	2
3	Сім'ядолі: за розміром	малі	3
4	Сім'ядолі: інтенсивність зеленого забарвлення	світле	3
5	Сім'ядолі: наявність плям	відсутні	1
6	Рослина: довжина міжвузлів	середні	5
7	Листкова пластинка: за довжиною (на повністю розвиненому 3-му листку)	середня	5
8	Листкова пластинка: за шириною	середня	5
9	Листкова пластинка: відношення довжина/ширина	середнє	5
10	Листкова пластинка: забарвлення	сіро-зелене	3
11	Листкова пластинка: інтенсивність забарвлення	помірне	5
12	Листок: ступінь розсіченості (вище першої квітки)	помірна	5
13	Листкова пластинка: глибина розсіченості краю листка (листок з центральної третини рослини вище першої квітки)	середня	5
14	Листкова пластинка: пухирчастість (на 10-15 листках)	помірна	5
15	Листкова пластинка: мармуровість	відсутня або слабка	1
16	Черешок: за довжиною	довгий	7
17	Зав'язь: за розміром (під час цвітіння)	середня	5
18	Зав'язь: опушення	помірне	5
19	Плід: маса	дуже велика	9
20	Плід: форма поздовжнього розрізу	еліптична	3
21	Плід: основний колір шкірки	зелений	2
22	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки	від дуже світлого до світлого	2
23	Плід: розмір сліду прикріплення плодоніжки	середній	5
24	Плід: увігнутість основи	мілька	3
25	Плід: форма апікальної частини	від плескатої до заокругленої	2
26	Плід: заглиблення верхівки	мільке	3
27	Плід: розмір рубця маточки	маленький	3
28	Плід: поширення борозенок	відсутні	1
29	Плід: ступінь борозенчастості	відсутня	3
30	Плід: смуги	наявні	9
31	Плід: характер смуг	чітко визначені	2
32	Плід: інтенсивність забарвлення смуг	темне	7
33	Плід: ширина смуг	широкі	7
34	Плід: інтенсивність мармуровості	слабка	3
35	Плід: товщина зовнішнього шару оплодня	середній	5
36	Плід: основне забарвлення м'якоті	рожеве	4
37	Плід: інтенсивність основного забарвлення м'якоті	темне	7
38	Плід: твердість м'якоті	м'яка	3
39	Плід: кількість насінин	середня кількість	2
40	Сім'янка: за розміром	середня	5
41	Насіннина: основний колір оболонки	кремовий	2
42	Насіннина: вторинний колір оболонки	наявний	9
43	Насіннина: характер розміщення вторинного кольору оболонки	крапками і плямами	2
44	Насіннина: відношення зони рисунка до основного забарвлення	мале	3
45	Сім'янка: плями біля рубця	наявні	9
46	Початок цвітіння жіночих квіток (у 50% рослин не менше 1 жіночої квітки)	ранній	3
47	Початок достигання (у 50% рослин не менше одного стиглого плоду)	ранній	3
48,1	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>niveum</i> (E.F. Smith) Snyder et Hansen: Paca 0	ознака не визначалась	0
48,2	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>niveum</i> (E.F. Smith) Snyder et Hansen: Paca 1	ознака не визначалась	0
48,3	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>niveum</i> (E.F. Smith) Snyder et Hansen: Paca 2	ознака не визначалась	0
49,1	Стійкість до <i>Colletotrichum lagenarium</i> (passerini) Ellis et Halsted: Paca 1	ознака не визначалась	0
49,2	Стійкість до <i>Colletotrichum lagenarium</i> (passerini) Ellis et Halsted: Paca 2	ознака не визначалась	0
49,3	Стійкість до <i>Colletotrichum lagenarium</i> (passerini) Ellis et Halsted: Paca 3	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальний урожай 84 т/га; період від повних сходів до першого збору 80 днів; період від садіння 30-ти денної розсади до останнього збирання 50 діб ; плодоношення 10 днів; вміст сухої речовини – 9,3 %; вміст загального цукру – 7,5 %.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Степ, Лісостеп, Полісся

Вид: Кавун звичайний *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai

Заявка №: 09027018 **Назва сорту** Меланія F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

24.02.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140006

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Плодюність	диплоїд	2
2	Сім'ядолі: форма	еліптична	2
3	Сім'ядолі: за розміром	середні	5
4	Сім'ядолі: інтенсивність зеленого забарвлення	світле	3
5	Сім'ядолі: наявність плям	відсутні	1
6	Рослина: довжина міжвузлів	середні	5
7	Листкова пластинка: за довжиною (на повністю розвиненому 3-му листку)	довга	7
8	Листкова пластинка: за шириною	середня	5
9	Листкова пластинка: відношення довжина/ширина	середнє	5
10	Листкова пластинка: забарвлення	сіро-зелене	3
11	Листкова пластинка: інтенсивність забарвлення	помірне	5
12	Листок: ступінь розсіченості (вище першої квітки)	помірна	5
13	Листкова пластинка: глибина розсіченості краю листка (листок з центральної третини рослини вище першої квітки)	глибока	7
14	Листкова пластинка: пухирчастість (на 10-15 листках)	помірна	5
15	Листкова пластинка: мармуровість	відсутня або слабка	1
16	Черешок: за довжиною	довгий	7
17	Зав'язь: за розміром (під час цвітіння)	середня	5
18	Зав'язь: опушення	помірне	5
19	Плід: маса	дуже велика	9
20	Плід: форма поздовжнього розрізу	циліндрична	4
21	Плід: основний колір шкірки	зелений	2
22	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки	світле	3
23	Плід: розмір сліду прикріплення плодоніжки	маленький	3
24	Плід: увігнутість основи	мілька	3
25	Плід: форма апікальної частини	заокруглена	3
26	Плід: заглиблення верхівки	середнє	5
27	Плід: розмір рубця маточки	маленький	3
28	Плід: поширення борозенок	відсутні	1
29	Плід: ступінь борозенчастості	відсутня	3
30	Плід: смуги	наявні	9
31	Плід: характер смуг	чітко визначені	2
32	Плід: інтенсивність забарвлення смуг	темне	7
33	Плід: ширина смуг	середні	5
34	Плід: інтенсивність мармуровості	слабка	3
35	Плід: товщина зовнішнього шару оплодня	середній	5
36	Плід: основне забарвлення м'якоті	рожеве	4
37	Плід: інтенсивність основного забарвлення м'якоті	темне	7
38	Плід: твердість м'якоті	м'яка	3
39	Плід: кількість насінин	середня кількість	2
40	Сім'янка: за розміром	середня	5
41	Насіннина: основний колір оболонки	кремовий	2
42	Насіннина: вторинний колір оболонки	наявний	9
43	Насіннина: характер розміщення вторинного кольору оболонки	крапками і плямами	2
44	Насіннина: відношення зони рисунка до основного забарвлення	середнє	5
45	Сім'янка: плями біля рубця	відсутні	1
46	Початок цвітіння жіночих квіток (у 50% рослин не менше 1 жіночої квітки)	ранній	3
47	Початок достигання (у 50% рослин не менше одного стиглого плоду)	ранній	3
48,1	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>niveum</i> (E.F. Smith) Snyder et Hansen: Paca 0	ознака не визначалась	0
48,2	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>niveum</i> (E.F. Smith) Snyder et Hansen: Paca 1	ознака не визначалась	0
48,3	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>niveum</i> (E.F. Smith) Snyder et Hansen: Paca 2	ознака не визначалась	0
49,1	Стійкість до <i>Colletotrichum lagenarium</i> (passerini) Ellis et Halsted: Paca 1	ознака не визначалась	0
49,2	Стійкість до <i>Colletotrichum lagenarium</i> (passerini) Ellis et Halsted: Paca 2	ознака не визначалась	0
49,3	Стійкість до <i>Colletotrichum lagenarium</i> (passerini) Ellis et Halsted: Paca 3	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальний урожай 85 т/га; період від повних сходів до першого збору 82 днів; період від садіння 30-ти денної розсади до останнього збирання 50 діб; вміст сухої речовини – 9,7 %; вміст загального цукру – 7,2 %.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Степ, Лісостеп, Полісся

Вид: Кавун звичайний *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai

Заявка №: 11027002 **Назва сорту** Соренто F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

26.02.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140008

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Плодюність	диплоїд	2
2	Сім'ядолі: форма	еліптична	2
3	Сім'ядолі: за розміром	великі	7
4	Сім'ядолі: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
5	Сім'ядолі: наявність плям	відсутні	1
6	Рослина: довжина міжвузлів	короткі	3
7	Листкова пластинка: за довжиною (на повністю розвиненому 3-му листку)	середня	5
8	Листкова пластинка: за шириною	середня	5
9	Листкова пластинка: відношення довжина/ширина	середнє	5
10	Листкова пластинка: забарвлення	сіро-зелене	3
11	Листкова пластинка: інтенсивність забарвлення	помірне	5
12	Листок: ступінь розсіченості (вище першої квітки)	сильна	7
13	Листкова пластинка: глибина розсіченості краю листка (листок з центральної третини рослини вище першої квітки)	глибока	7
14	Листкова пластинка: пухирчастість (на 10-15 листках)	сильна	7
15	Листкова пластинка: мармуровість	сильна	3
16	Черешок: за довжиною	середній	5
17	Зав'язь: за розміром (під час цвітіння)	середня	5
18	Зав'язь: опушення	помірне	5
19	Плід: маса	від середньої до великої	6
20	Плід: форма поздовжнього розрізу	широкоеліптична	2
21	Плід: основний колір шкірки	зелений	2
22	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки	від світлого до помірного	4
23	Плід: розмір сліду прикріплення плодоніжки	маленький	3
24	Плід: увігнутість основи	мілька	3
25	Плід: форма апікальної частини	від плескатої до заокругленої	2
26	Плід: заглиблення верхівки	мільке	3
27	Плід: розмір рубця маточки	маленький	3
28	Плід: поширення борозенок	відсутні	1
29	Плід: ступінь борозенчастості	відсутня	3
30	Плід: смуги	наявні	9
31	Плід: характер смуг	чітко визначені	2
32	Плід: інтенсивність забарвлення смуг	помірне	5
33	Плід: ширина смуг	середні	5
34	Плід: інтенсивність мармуровості	слабка	3
35	Плід: товщина зовнішнього шару оплодня	середній	5
36	Плід: основне забарвлення м'якоті	рожеве	4
37	Плід: інтенсивність основного забарвлення м'якоті	темне	7
38	Плід: твердість м'якоті	м'яка	3
39	Плід: кількість насінин	середня кількість	2
40	Сім'янка: за розміром	велика	7
41	Насіннина: основний колір оболонки	червоно-коричневий	5
42	Насіннина: вторинний колір оболонки	відсутній	1
43	Насіннина: характер розміщення вторинного кольору оболонки	ознака не визначалась	0
44	Насіннина: відношення зони рисунка до основного забарвлення	ознака не визначається	0
45	Сім'янка: плями біля рубця	відсутні	1
46	Початок цвітіння жіночих квіток (у 50% рослин не менше 1 жіночої квітки)	ранній	3
47	Початок достигання (у 50% рослин не менше одного стиглого плоду)	ранній	3
48,1	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>niveum</i> (E.F. Smith) Snyder et Hansen: Paca 0	ознака не визначалась	0
48,2	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>niveum</i> (E.F. Smith) Snyder et Hansen: Paca 1	ознака не визначалась	0
48,3	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>niveum</i> (E.F. Smith) Snyder et Hansen: Paca 2	ознака не визначалась	0
49,1	Стійкість до <i>Colletotrichum lagenarium</i> (passerini) Ellis et Halsted: Paca 1	ознака не визначалась	0
49,2	Стійкість до <i>Colletotrichum lagenarium</i> (passerini) Ellis et Halsted: Paca 2	ознака не визначалась	0
49,3	Стійкість до <i>Colletotrichum lagenarium</i> (passerini) Ellis et Halsted: Paca 3	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна урожайність 70 т./га. Період від повних сходів до першого збирання 90 діб. Вміст сухої речовини в плоді 5 %. Вміст загального цукру 11,5%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Лісостеп, Полісся

Вид: Кавун звичайний *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai

Заявка №: 09027019 **Назва сорту** Фенвей F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

24.02.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140007

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Плодючість	триплоїд	3
2	Сім'ядолі: форма	еліптична	2
3	Сім'ядолі: за розміром	малі	3
4	Сім'ядолі: інтенсивність зеленого забарвлення	світле	3
5	Сім'ядолі: наявність плям	відсутні	1
6	Рослина: довжина міжвузлів	короткі	3
7	Листкова пластинка: за довжиною (на повністю розвиненому 3-му листку)	довга	7
8	Листкова пластинка: за шириною	широка	7
9	Листкова пластинка: відношення довжина/ширина	мале	3
10	Листкова пластинка: забарвлення	сіро-зелене	3
11	Листкова пластинка: інтенсивність забарвлення	сильне	7
12	Листок: ступінь розсіченості (вище першої квітки)	помірна	5
13	Листкова пластинка: глибина розсіченості краю листка (листок з центральної третини рослини вище першої квітки)	глибока	7
14	Листкова пластинка: пухирчастість (на 10-15 листках)	сильна	7
15	Листкова пластинка: мармуровість	відсутня або слабка	1
16	Черешок: за довжиною	середній	5
17	Зав'язь: за розміром (під час цвітіння)	середня	5
18	Зав'язь: опушення	слабке	3
19	Плід: маса	від малої до середньої	4
20	Плід: форма поздовжнього розрізу	округла	1
21	Плід: основний колір шкірки	зелений	2
22	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки	темне	7
23	Плід: розмір сліду прикріплення плодоніжки	середній	5
24	Плід: увігнутість основи	мілька	3
25	Плід: форма апікальної частини	заокруглена	3
26	Плід: заглиблення верхівки	мільке	3
27	Плід: розмір рубця маточки	середній	5
28	Плід: поширення борозенок	відсутні	1
29	Плід: ступінь борозенчастості	відсутня	3
30	Плід: смуги	наявні	9
31	Плід: характер смуг	розсіяні	1
32	Плід: інтенсивність забарвлення смуг	темне	7
33	Плід: ширина смуг	вузькі	3
34	Плід: інтенсивність мармуровості	слабка	3
35	Плід: товщина зовнішнього шару оплодня	середній	5
36	Плід: основне забарвлення м'якоті	пурпурове	5
37	Плід: інтенсивність основного забарвлення м'якоті	помірне	5
38	Плід: твердість м'якоті	м'яка	3
39	Плід: кількість насінин	відсутні або мало	1
40	Сім'янка: за розміром	ознака не визначалась	0
41	Насіннина: основний колір оболонки	ознака не визначається	0
42	Насіннина: вторинний колір оболонки	ознака не визначається	0
43	Насіннина: характер розміщення вторинного кольору оболонки	ознака не визначалась	0
44	Насіннина: відношення зони рисунка до основного забарвлення	ознака не визначається	0
45	Сім'янка: плями біля рубця	ознака не визначалась	0
46	Початок цвітіння жіночих квіток (у 50% рослин не менше 1 жіночої квітки)	середній	5
47	Початок достигання (у 50% рослин не менше одного стиглого плоду)	середній	5
48,1	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>niveum</i> (E.F. Smith) Snyder et Hansen: Paca 0	ознака не визначалась	0
48,2	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>niveum</i> (E.F. Smith) Snyder et Hansen: Paca 1	ознака не визначалась	0
48,3	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>niveum</i> (E.F. Smith) Snyder et Hansen: Paca 2	ознака не визначалась	0
49,1	Стійкість до <i>Colletotrichum lagenarium</i> (passerini) Ellis et Halsted: Paca 1	ознака не визначалась	0
49,2	Стійкість до <i>Colletotrichum lagenarium</i> (passerini) Ellis et Halsted: Paca 2	ознака не визначалась	0
49,3	Стійкість до <i>Colletotrichum lagenarium</i> (passerini) Ellis et Halsted: Paca 3	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальний урожай 56 т/га; період від повних сходів до першого збору 63 днів; період від садіння 30-ти денної розсади до останнього збирання 45 діб; вміст сухої речовини – 9,4 %; вміст загального цукру – 8,2 %.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Степ, Лісостеп, Полісся

Вид: Капуста білоголова *Brassica oleracea* L. var. alba DC.

Заявка №: 12028007 **Назва сорту** Артікус

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

17.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140318

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: за висотою	висока	7
1,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0
1,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0
2,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: найбільший діаметр (разом із зовнішніми листками)	великий	7
2,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0
2,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0
3	Рослина: довжина зовнішнього качана	короткий	3
4	Рослина: положення зовнішніх листків	напівпрямостоячі	3
5,1	Лише для сортів капусти білоголової. Зовнішній листок: за розміром	великий	7
5,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: за розміром	ознака не визначається	0
5,3	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: за розміром	ознака не визначається	0
6	Зовнішній листок: форма пластинки	широкояйцевидна	2
7	Зовнішній листок: профіль верхньої частини пластинки	плаский	2
8,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	відсутня або дуже слабка	1
8,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	ознака не визначається	0
9,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: розмір пухирів	ознака не визначається	0
9,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір пухирів	ознака не визначається	0
10	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: гофрованість	ознака не визначається	0
11	Зовнішній листок: колір (з восковим нальотом)	зелений	2
12	Зовнішній листок: інтенсивність забарвлення	помірне	5
13	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: зеленкуватість	ознака не визначається	0
14	Зовнішній листок: восковий наліт	помірний	5
15	Зовнішній листок: ступінь хвилястості краю	слабка	3
16	Зовнішній листок: вигин краю	відсутній	1
17	Головка: форма поздовжнього розтину	округла	3
18	Головка: форма основи поздовжнього розтину	округла	1
19	Головка: за довжиною	середня	5
20	Головка: за діаметром	середня	5
21	Головка: розміщення найбільшого діаметра	посередині	2
22	Головка: ступінь покриття	покрита	3
23	Лише для сортів капусти савойської. Головка: пухирчастість покривного листка	ознака не визначається	0
24	Головка: вигин краю покривного листка	відсутній	1
25	Головка: забарвлення покривного листка	зелене	2
26	Головка: інтенсивність забарвлення покривного листка	світле	3
27	Лише сорти капусти білоголової і савойської Головка: антоціанове забарвлення покривних листків	відсутнє або дуже слабке	1
28	Головка: внутрішнє забарвлення	білувате	1
29	Лише сорти капусти червоноголової. Головка: інтенсивність зовнішнього забарвлення	ознака не визначається	0
30	Головка: за щільністю	середня	5
31	Головка: внутрішня структура	середня	5
32	Головка: довжина внутрішнього качана відносно довжини головки	середня	5
33,1	Лише сорти капусти білоголової. Час збиральної стиглості	пізній	7
33,2	Лише сорти капусти червоноголової. Час збиральної стиглості	ознака не визначається	0
33,3	Лише сорти капусти савойської. Час збиральної стиглості	ознака не визначається	0
34	Час розтріскування головки після досягання	пізній	7
35	Чоловіча стерильність	наявна	9
36	Стійкість до раси 1 <i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>Conglutinans</i>	наявна	9

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна урожайність 80 т./га., період від сівби до початку достигання 140 діб.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
Закритий ґрунт

Вид: Капуста білоголова *Brassica oleracea* L. var. alba DC.

Заявка №: 11028019 **Назва сорту** Байонет F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

05.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140135

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: за висотою	середня	5
1,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0
1,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0
2,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: найбільший діаметр (разом із зовнішніми листками)	малий	3
2,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0
2,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0
3	Рослина: довжина зовнішнього качана	короткий	3
4	Рослина: положення зовнішніх листків	сланкі	5
5,1	Лише для сортів капусти білоголової. Зовнішній листок: за розміром	малий	3
5,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: за розміром	ознака не визначається	0
5,3	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: за розміром	ознака не визначається	0
6	Зовнішній листок: форма пластинки	оберненояйцевидна	5
7	Зовнішній листок: профіль верхньої частини пластинки	увігнутий	1
8,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	відсутня або дуже слабка	1
8,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	ознака не визначається	0
9,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: розмір пухирів	малі	3
9,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір пухирів	ознака не визначається	0
10	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: гофрованість	слабка	3
11	Зовнішній листок: колір (з восковим нальотом)	сіро-зелений	3
12	Зовнішній листок: інтенсивність забарвлення	ознака не визначалась	0
13	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: зеленкуватість	ознака не визначається	0
14	Зовнішній листок: восковий наліт	слабкий	3
15	Зовнішній листок: ступінь хвилястості краю	відсутня або дуже слабка	1
16	Зовнішній листок: вигин краю	наявний	9
17	Головка: форма поздовжнього розтину	широкоеліптична	4
18	Головка: форма основи поздовжнього розтину	округла	1
19	Головка: за довжиною	коротка	3
20	Головка: за діаметром	маленька	3
21	Головка: розміщення найбільшого діаметра	посередині	2
22	Головка: ступінь покриття	покрита	3
23	Лише для сортів капусти савойської. Головка: пухирчастість покривного листка	ознака не визначається	0
24	Головка: вигин краю покривного листка	наявний	9
25	Головка: забарвлення покривного листка	сіро-зелене	3
26	Головка: інтенсивність забарвлення покривного листка	помірне	5
27	Лише сорти капусти білоголової і савойської Головка: антоціанове забарвлення покривних листків	відсутнє або дуже слабе	1
28	Головка: внутрішнє забарвлення	жовтувате	2
29	Лише сорти капусти червоноголової. Головка: інтенсивність зовнішнього забарвлення	ознака не визначається	0
30	Головка: за щільністю	середня	5
31	Головка: внутрішня структура	середня	5
32	Головка: довжина внутрішнього качана відносно довжини головки	коротка	3
33,1	Лише сорти капусти білоголової. Час збиральної стиглості	ранній	3
33,2	Лише сорти капусти червоноголової. Час збиральної стиглості	ознака не визначається	0
33,3	Лише сорти капусти савойської. Час збиральної стиглості	ознака не визначається	0
34	Час розтріскування головки після досягання	пізній	7
35	Чоловіча стерильність	ознака не визначалась	0
36	Стійкість до раси 1 <i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>Conglutinans</i>	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна урожайність 60 т./га., період від сівби до початку достигання 73 доби.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
Степ, Лісостеп, Полісся

Вид: Капуста білоголова *Brassica oleracea* L. var. alba DC.

Заявка №: 10028002 **Назва сорту** Браксан F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

06.03.2014

Свідчення про державну реєстрацію № 140129

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: за висотою	висока	7
1,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0
1,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0
2,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: найбільший діаметр (разом із зовнішніми листками)	малий	3
2,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0
2,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0
3	Рослина: довжина зовнішнього качана	короткий	3
4	Рослина: положення зовнішніх листків	сланкі	5
5,1	Лише для сортів капусти білоголової. Зовнішній листок: за розміром	великий	7
5,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: за розміром	ознака не визначається	0
5,3	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: за розміром	ознака не визначається	0
6	Зовнішній листок: форма пластинки	поперечноширокоеліптична	4
7	Зовнішній листок: профіль верхньої частини пластинки	плаский	2
8,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	сильна	3
8,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	ознака не визначається	0
9,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: розмір пухирів	великі	7
9,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір пухирів	ознака не визначається	0
10	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: гофрованість	ознака не визначається	0
11	Зовнішній листок: колір (з восковим нальотом)	зелений	2
12	Зовнішній листок: інтенсивність забарвлення	помірне	5
13	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: зеленкуватість	ознака не визначається	0
14	Зовнішній листок: восковий наліт	помірний	5
15	Зовнішній листок: ступінь хвилястості краю	помірна	5
16	Зовнішній листок: вигин краю	наявний	9
17	Головка: форма поздовжнього розтину	округла	3
18	Головка: форма основи поздовжнього розтину	округла	1
19	Головка: за довжиною	коротка	3
20	Головка: за діаметром	маленька	3
21	Головка: розміщення найбільшого діаметра	посередині	2
22	Головка: ступінь покриття	покрита	3
23	Лише для сортів капусти савойської. Головка: пухирчастість покривного листка	ознака не визначається	0
24	Головка: вигин краю покривного листка	наявний	9
25	Головка: забарвлення покривного листка	зелене	2
26	Головка: інтенсивність забарвлення покривного листка	світле	3
27	Лише сорти капусти білоголової і савойської Головка: антоціанове забарвлення покривних листків	відсутнє або дуже слабке	1
28	Головка: внутрішнє забарвлення	білувате	1
29	Лише сорти капусти червоноголової. Головка: інтенсивність зовнішнього забарвлення	ознака не визначається	0
30	Головка: за щільністю	дуже щільна	9
31	Головка: внутрішня структура	тонка	3
32	Головка: довжина внутрішнього качана відносно довжини головки	середня	5
33,1	Лише сорти капусти білоголової. Час збиральної стиглості	пізній	7
33,2	Лише сорти капусти червоноголової. Час збиральної стиглості	ознака не визначається	0
33,3	Лише сорти капусти савойської. Час збиральної стиглості	ознака не визначається	0
34	Час розтріскування головки після досягання	середній	5
35	Чоловіча стерильність	ознака не визначалась	0
36	Стійкість до раси 1 <i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>Conglutinans</i>	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна урожайність 120 т./га., період від сівби до початку достигання 85 діб.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
Степ, Лісостеп, Полісся

Вид: Капуста білоголова *Brassica oleracea* L. var. alba DC.

Заявка №: 08028011 **Назва сорту** Василина

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

19.03.2014

Свідчення про державну реєстрацію № 140316

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: за висотою	висока	7
1,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0
1,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0
2,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: найбільший діаметр (разом із зовнішніми листками)	середній	5
2,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0
2,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0
3	Рослина: довжина зовнішнього качана	короткий	3
4	Рослина: положення зовнішніх листків	сланкі	5
5,1	Лише для сортів капусти білоголової. Зовнішній листок: за розміром	великий	7
5,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: за розміром	ознака не визначається	0
5,3	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: за розміром	ознака не визначається	0
6	Зовнішній листок: форма пластинки	оберненояйцевидна	5
7	Зовнішній листок: профіль верхньої частини пластинки	плаский	2
8,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	сильна	3
8,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	ознака не визначається	0
9,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: розмір пухирів	малі	3
9,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір пухирів	ознака не визначається	0
10	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: гофрованість	ознака не визначається	0
11	Зовнішній листок: колір (з восковим нальотом)	сіро-зелений	3
12	Зовнішній листок: інтенсивність забарвлення	помірне	5
13	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: зеленкуватість	ознака не визначається	0
14	Зовнішній листок: восковий наліт	помірний	5
15	Зовнішній листок: ступінь хвилястості краю	помірна	5
16	Зовнішній листок: вигин краю	наявний	9
17	Головка: форма поздовжнього розтину	поперечно-еліптична	2
18	Головка: форма основи поздовжнього розтину	округла	1
19	Головка: за довжиною	коротка	3
20	Головка: за діаметром	середня	5
21	Головка: розміщення найбільшого діаметра	посередині	2
22	Головка: ступінь покриття	покрита	3
23	Лише для сортів капусти савойської. Головка: пухирчастість покривного листка	ознака не визначається	0
24	Головка: вигин краю покривного листка	наявний	9
25	Головка: забарвлення покривного листка	зелене	2
26	Головка: інтенсивність забарвлення покривного листка	помірне	5
27	Лише сорти капусти білоголової і савойської Головка: антоціанове забарвлення покривних листків	відсутнє або дуже слабке	1
28	Головка: внутрішнє забарвлення	білувате	1
29	Лише сорти капусти червоноголової. Головка: інтенсивність зовнішнього забарвлення	ознака не визначається	0
30	Головка: за щільністю	щільна	7
31	Головка: внутрішня структура	середня	5
32	Головка: довжина внутрішнього качана відносно довжини головки	довга	7
33,1	Лише сорти капусти білоголової. Час збиральної стиглості	пізній	7
33,2	Лише сорти капусти червоноголової. Час збиральної стиглості	ознака не визначається	0
33,3	Лише сорти капусти савойської. Час збиральної стиглості	ознака не визначається	0
34	Час розтріскування головки після досягання	пізній	7
35	Чоловіча стерильність	ознака не визначалась	0
36	Стійкість до раси 1 <i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>Conglutinans</i>	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність 75 т/га. Період від повних сходів до початку достигання 171 діб. Вміст сухої речовини 8,56%. Вміст загального цукру 4,14%. Вміст вітаміну С 38,74мг%. Лежкість 8 балів.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
Лісостеп, Полісся

Вид: Капуста білоголова *Brassica oleracea* L. var. alba DC.

Заявка №: 10028003 **Назва сорту** Веронор F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

04.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140011

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: за висотою	середня	5
1,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0
1,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0
2,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: найбільший діаметр (разом із зовнішніми листками)	малий	3
2,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0
2,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0
3	Рослина: довжина зовнішнього качана	короткий	3
4	Рослина: положення зовнішніх листків	сланкі	5
5,1	Лише для сортів капусти білоголової. Зовнішній листок: за розміром	малий	3
5,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: за розміром	ознака не визначається	0
5,3	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: за розміром	ознака не визначається	0
6	Зовнішній листок: форма пластинки	оберненояйцевидна	5
7	Зовнішній листок: профіль верхньої частини пластинки	увігнутий	1
8,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	відсутня або дуже слабка	1
8,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	ознака не визначається	0
9,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: розмір пухирів	малі	3
9,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір пухирів	ознака не визначається	0
10	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: гофрованість	ознака не визначається	0
11	Зовнішній листок: колір (з восковим нальотом)	сіро-зелений	3
12	Зовнішній листок: інтенсивність забарвлення	помірне	5
13	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: зеленкуватість	ознака не визначається	0
14	Зовнішній листок: восковий наліт	слабкий	3
15	Зовнішній листок: ступінь хвилястості краю	слабка	3
16	Зовнішній листок: вигин краю	відсутній	1
17	Головка: форма поздовжнього розтину	округла	3
18	Головка: форма основи поздовжнього розтину	округла	1
19	Головка: за довжиною	коротка	3
20	Головка: за діаметром	маленька	3
21	Головка: розміщення найбільшого діаметра	посередині	2
22	Головка: ступінь покриття	частково покрита	2
23	Лише для сортів капусти савойської. Головка: пухирчастість покривного листка	ознака не визначається	0
24	Головка: вигин краю покривного листка	наявний	9
25	Головка: забарвлення покривного листка	зелене	2
26	Головка: інтенсивність забарвлення покривного листка	помірне	5
27	Лише сорти капусти білоголової і савойської Головка: антоціанове забарвлення покривних листків	відсутнє або дуже слабке	1
28	Головка: внутрішнє забарвлення	білувате	1
29	Лише сорти капусти червоноголової. Головка: інтенсивність зовнішнього забарвлення	ознака не визначається	0
30	Головка: за щільністю	щільна	7
31	Головка: внутрішня структура	тонка	3
32	Головка: довжина внутрішнього качана відносно довжини головки	середня	5
33,1	Лише сорти капусти білоголової. Час збирання стиглості	ранній	3
33,2	Лише сорти капусти червоноголової. Час збирання стиглості	ознака не визначається	0
33,3	Лише сорти капусти савойської. Час збирання стиглості	ознака не визначається	0
34	Час розтріскування головки після досягання	середній	5
35	Чоловіча стерильність	ознака не визначалась	0
36	Стійкість до раси 1 <i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>Conglutinans</i>	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна урожайність 85 т./га., період від сівби до початку достигання 48 діб.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
Закритий ґрунт

Вид: Капуста білоголова *Brassica oleracea* L. var. alba DC.

Заявка №: 11028025 **Назва сорту** Джетодор F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

26.02.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140137

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: за висотою	середня	5
1,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0
1,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0
2,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: найбільший діаметр (разом із зовнішніми листками)	малий	3
2,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0
2,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0
3	Рослина: довжина зовнішнього качана	короткий	3
4	Рослина: положення зовнішніх листків	сланкі	5
5,1	Лише для сортів капусти білоголової. Зовнішній листок: за розміром	малий	3
5,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: за розміром	ознака не визначається	0
5,3	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: за розміром	ознака не визначається	0
6	Зовнішній листок: форма пластинки	оберненоїцевида	5
7	Зовнішній листок: профіль верхньої частини пластинки	плаский	2
8,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	відсутня або дуже слабка	1
8,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	ознака не визначається	0
9,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: розмір пухирів	малі	3
9,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір пухирів	ознака не визначається	0
10	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: гофрованість	ознака не визначається	0
11	Зовнішній листок: колір (з восковим нальотом)	сіро-зелений	3
12	Зовнішній листок: інтенсивність забарвлення	світле	3
13	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: зеленкуватість	ознака не визначається	0
14	Зовнішній листок: восковий наліт	слабкий	3
15	Зовнішній листок: ступінь хвилястості краю	слабка	3
16	Зовнішній листок: вигин краю	наявний	9
17	Головка: форма поздовжнього розтину	широкоеліптична	4
18	Головка: форма основи поздовжнього розтину	округла	1
19	Головка: за довжиною	коротка	3
20	Головка: за діаметром	маленька	3
21	Головка: розміщення найбільшого діаметра	ближче до верхівки	1
22	Головка: ступінь покриття	частково покрита	2
23	Лише для сортів капусти савойської. Головка: пухирчастість покривного листка	ознака не визначається	0
24	Головка: вигин краю покривного листка	наявний	9
25	Головка: забарвлення покривного листка	сіро-зелене	3
26	Головка: інтенсивність забарвлення покривного листка	помірне	5
27	Лише сорти капусти білоголової і савойської Головка: антоціанове забарвлення покривних листків	відсутнє або дуже слабке	1
28	Головка: внутрішнє забарвлення	жовтувате	2
29	Лише сорти капусти червоноголової. Головка: інтенсивність зовнішнього забарвлення	ознака не визначається	0
30	Головка: за щільністю	середня	5
31	Головка: внутрішня структура	середня	5
32	Головка: довжина внутрішнього качана відносно довжини головки	середня	5
33,1	Лише сорти капусти білоголової. Час збиральної стиглості	ранній	3
33,2	Лише сорти капусти червоноголової. Час збиральної стиглості	ознака не визначається	0
33,3	Лише сорти капусти савойської. Час збиральної стиглості	ознака не визначається	0
34	Час розтріскування головки після досягання	середній	5
35	Чоловіча стерильність	ознака не визначалась	0
36	Стійкість до раси 1 <i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>Conglutinans</i>	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна урожайність 60 т./га., період від сівби до початку достигання 80 діб.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
Лісостеп, Полісся

Вид: Капуста білоголова *Brassica oleracea* L. var. alba DC.

Заявка №: 10028005 **Назва сорту** Джубілі F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

05.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140131

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: за висотою	дуже висока	9
1,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0
1,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0
2,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: найбільший діаметр (разом із зовнішніми листками)	малий	3
2,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0
2,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0
3	Рослина: довжина зовнішнього качана	короткий	3
4	Рослина: положення зовнішніх листків	напівпрямостоячі	3
5,1	Лише для сортів капусти білоголової. Зовнішній листок: за розміром	середній	5
5,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: за розміром	ознака не визначається	0
5,3	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: за розміром	ознака не визначається	0
6	Зовнішній листок: форма пластинки	поперечноширокоеліптична	4
7	Зовнішній листок: профіль верхньої частини пластинки	плаский	2
8,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	відсутня або дуже слабка	1
8,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	ознака не визначається	0
9,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: розмір пухирів	малі	3
9,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір пухирів	ознака не визначається	0
10	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: гофрованість	ознака не визначається	0
11	Зовнішній листок: колір (з восковим нальотом)	сіро-зелений	3
12	Зовнішній листок: інтенсивність забарвлення	помірне	5
13	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: зеленкуватість	ознака не визначається	0
14	Зовнішній листок: восковий наліт	помірний	5
15	Зовнішній листок: ступінь хвилястості краю	слабка	3
16	Зовнішній листок: вигин краю	наявний	9
17	Головка: форма поздовжнього розтину	округла	3
18	Головка: форма основи поздовжнього розтину	округла	1
19	Головка: за довжиною	коротка	3
20	Головка: за діаметром	маленька	3
21	Головка: розміщення найбільшого діаметра	посередині	2
22	Головка: ступінь покриття	покрита	3
23	Лише для сортів капусти савойської. Головка: пухирчастість покривного листка	ознака не визначається	0
24	Головка: вигин краю покривного листка	наявний	9
25	Головка: забарвлення покривного листка	зелене	2
26	Головка: інтенсивність забарвлення покривного листка	помірне	5
27	Лише сорти капусти білоголової і савойської Головка: антоціанове забарвлення покривних листків	відсутнє або дуже слабке	1
28	Головка: внутрішнє забарвлення	білувате	1
29	Лише сорти капусти червоноголової. Головка: інтенсивність зовнішнього забарвлення	ознака не визначається	0
30	Головка: за щільністю	дуже щільна	9
31	Головка: внутрішня структура	тонка	3
32	Головка: довжина внутрішнього качана відносно довжини головки	середня	5
33,1	Лише сорти капусти білоголової. Час збиральної стиглості	пізній	7
33,2	Лише сорти капусти червоноголової. Час збиральної стиглості	ознака не визначається	0
33,3	Лише сорти капусти савойської. Час збиральної стиглості	ознака не визначається	0
34	Час розтріскування головки після досягання	пізній	7
35	Чоловіча стерильність	ознака не визначалась	0
36	Стійкість до раси 1 <i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>Conglutinans</i>	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність 62 т/га. Період від повних сходів до початку достигання 120 діб. Вміст сухої речовини 7,5%. Вміст загального цукру 4,2%. Вміст вітаміну С 46мг%. Лежкість 2 балів. Ураженість хворобами: бактеріозом слизовим – 1%, бактеріозом судинним –

1%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
Степ, Лісостеп, Полісся

Вид: Капуста білоголова *Brassica oleracea* L. var. alba DC.

Заявка №: 09028027

Назва сорту Зеніт F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

24.02.2014

Свідчення про державну реєстрацію № 140009

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: за висотою	низька	3
1,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0
1,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0
2,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: найбільший діаметр (разом із зовнішніми листками)	малий	3
2,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0
2,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0
3	Рослина: довжина зовнішнього качана	короткий	3
4	Рослина: положення зовнішніх листків	сланкі	5
5,1	Лише для сортів капусти білоголової. Зовнішній листок: за розміром	малий	3
5,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: за розміром	ознака не визначається	0
5,3	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: за розміром	ознака не визначається	0
6	Зовнішній листок: форма пластинки	оберненояйцевидна	5
7	Зовнішній листок: профіль верхньої частини пластинки	плаский	2
8,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	відсутня або дуже слабка	1
8,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	ознака не визначається	0
9,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: розмір пухирів	малі	3
9,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір пухирів	ознака не визначається	0
10	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: гофрованість	ознака не визначається	0
11	Зовнішній листок: колір (з восковим нальотом)	сіро-зелений	3
12	Зовнішній листок: інтенсивність забарвлення	помірне	5
13	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: зеленкуватість	ознака не визначається	0
14	Зовнішній листок: восковий наліт	слабкий	3
15	Зовнішній листок: ступінь хвилястості краю	слабка	3
16	Зовнішній листок: вигин краю	відсутній	1
17	Головка: форма поздовжнього розтину	широкоеліптична	4
18	Головка: форма основи поздовжнього розтину	округла	1
19	Головка: за довжиною	коротка	3
20	Головка: за діаметром	маленька	3
21	Головка: розміщення найбільшого діаметра	посередині	2
22	Головка: ступінь покриття	частково покрита	2
23	Лише для сортів капусти савойської. Головка: пухирчастість покривного листка	ознака не визначається	0
24	Головка: вигин краю покривного листка	відсутній	1
25	Головка: забарвлення покривного листка	жовто-зелене	1
26	Головка: інтенсивність забарвлення покривного листка	світле	3
27	Лише сорти капусти білоголової і савойської Головка: антоціанове забарвлення покривних листків	відсутнє або дуже слабе	1
28	Головка: внутрішнє забарвлення	жовтувате	2
29	Лише сорти капусти червоноголової. Головка: інтенсивність зовнішнього забарвлення	ознака не визначається	0
30	Головка: за щільністю	щільна	7
31	Головка: внутрішня структура	тонка	3
32	Головка: довжина внутрішнього качана відносно довжини головки	середня	5
33,1	Лише сорти капусти білоголової. Час збиральної стиглості	ранній	3
33,2	Лише сорти капусти червоноголової. Час збиральної стиглості	ознака не визначається	0
33,3	Лише сорти капусти савойської. Час збиральної стиглості	ознака не визначається	0
34	Час розтріскування головки після досягання	пізній	7
35	Чоловіча стерильність	ознака не визначалась	0
36	Стійкість до раси 1 <i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>Conglutinans</i>	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність 86 т/га. Період від повних сходів до початку достигання 90 діб. Вміст сухої речовини 8,6%. Вміст загального цукру 4,2%. Вміст вітаміну С 56мг%. Вміст білка 1,6%. Лежкість 8,3 балів.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
Степ, Лісостеп, Полісся

Вид: Капуста білоголова *Brassica oleracea* L. var. alba DC.

Заявка №: 11028020 **Назва сорту** Карафлекс F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

05.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140136

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: за висотою	висока	7
1,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0
1,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0
2,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: найбільший діаметр (разом із зовнішніми листками)	малий	3
2,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0
2,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0
3	Рослина: довжина зовнішнього качана	короткий	3
4	Рослина: положення зовнішніх листків	напівпрямостоячі	3
5,1	Лише для сортів капусти білоголової. Зовнішній листок: за розміром	середній	5
5,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: за розміром	ознака не визначається	0
5,3	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: за розміром	ознака не визначається	0
6	Зовнішній листок: форма пластинки	еліптична	1
7	Зовнішній листок: профіль верхньої частини пластинки	плаский	2
8,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	відсутня або дуже слабка	1
8,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	ознака не визначається	0
9,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: розмір пухирів	малі	3
9,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір пухирів	ознака не визначається	0
10	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: гофрованість	ознака не визначається	0
11	Зовнішній листок: колір (з восковим нальотом)	зелений	2
12	Зовнішній листок: інтенсивність забарвлення	помірне	5
13	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: зеленкуватість	ознака не визначається	0
14	Зовнішній листок: восковий наліт	помірний	5
15	Зовнішній листок: ступінь хвилястості краю	слабка	3
16	Зовнішній листок: вигин краю	наявний	9
17	Головка: форма поздовжнього розтину	широкояйцевидна	6
18	Головка: форма основи поздовжнього розтину	округла	1
19	Головка: за довжиною	коротка	3
20	Головка: за діаметром	маленька	3
21	Головка: розміщення найбільшого діаметра	посередині	2
22	Головка: ступінь покриття	непокрита	1
23	Лише для сортів капусти савойської. Головка: пухирчастість покривного листка	ознака не визначається	0
24	Головка: вигин краю покривного листка	наявний	9
25	Головка: забарвлення покривного листка	жовто-зелене	1
26	Головка: інтенсивність забарвлення покривного листка	світле	3
27	Лише сорти капусти білоголової і савойської Головка: антоціанове забарвлення покривних листків	відсутнє або дуже слабке	1
28	Головка: внутрішнє забарвлення	жовтувате	2
29	Лише сорти капусти червоноголової. Головка: інтенсивність зовнішнього забарвлення	ознака не визначається	0
30	Головка: за щільністю	середня	5
31	Головка: внутрішня структура	середня	5
32	Головка: довжина внутрішнього качана відносно довжини головки	коротка	3
33,1	Лише сорти капусти білоголової. Час збиральної стиглості	середній	5
33,2	Лише сорти капусти червоноголової. Час збиральної стиглості	ознака не визначається	0
33,3	Лише сорти капусти савойської. Час збиральної стиглості	ознака не визначається	0
34	Час розтріскування головки після досягання	середній	5
35	Чоловіча стерильність	ознака не визначалась	0
36	Стійкість до раси 1 <i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>Conglutinans</i>	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна урожайність 60 т./га., період від сівби до початку достигання 76 доби.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
Степ, Лісостеп, Полісся

Вид: Капуста білоголова *Brassica oleracea* L. var. alba DC.

Заявка №: 11028016 **Назва сорту** Кебтон

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

06.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140133

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: за висотою	дуже висока	9
1,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0
1,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0
2,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: найбільший діаметр (разом із зовнішніми листками)	малий	3
2,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0
2,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0
3	Рослина: довжина зовнішнього качана	короткий	3
4	Рослина: положення зовнішніх листків	сланкі	5
5,1	Лише для сортів капусти білоголової. Зовнішній листок: за розміром	середній	5
5,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: за розміром	ознака не визначається	0
5,3	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: за розміром	ознака не визначається	0
6	Зовнішній листок: форма пластинки	поперечноширокоеліптична	4
7	Зовнішній листок: профіль верхньої частини пластинки	увігнутий	1
8,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	відсутня або дуже слабка	1
8,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	ознака не визначається	0
9,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: розмір пухирів	малі	3
9,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір пухирів	ознака не визначається	0
10	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: гофрованість	ознака не визначається	0
11	Зовнішній листок: колір (з восковим нальотом)	зелений	2
12	Зовнішній листок: інтенсивність забарвлення	помірне	5
13	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: зеленкуватість	ознака не визначається	0
14	Зовнішній листок: восковий наліт	помірний	5
15	Зовнішній листок: ступінь хвилястості краю	помірна	5
16	Зовнішній листок: вигин краю	наявний	9
17	Головка: форма поздовжнього розтину	округла	3
18	Головка: форма основи поздовжнього розтину	округла	1
19	Головка: за довжиною	коротка	3
20	Головка: за діаметром	маленька	3
21	Головка: розміщення найбільшого діаметра	посередині	2
22	Головка: ступінь покриття	частково покрита	2
23	Лише для сортів капусти савойської. Головка: пухирчастість покривного листка	ознака не визначається	0
24	Головка: вигин краю покривного листка	наявний	9
25	Головка: забарвлення покривного листка	зелене	2
26	Головка: інтенсивність забарвлення покривного листка	помірне	5
27	Лише сорти капусти білоголової і савойської Головка: антоціанове забарвлення покривних листків	слабке	3
28	Головка: внутрішнє забарвлення	білувате	1
29	Лише сорти капусти червоноголової. Головка: інтенсивність зовнішнього забарвлення	ознака не визначається	0
30	Головка: за щільністю	середня	5
31	Головка: внутрішня структура	середня	5
32	Головка: довжина внутрішнього качана відносно довжини головки	середня	5
33,1	Лише сорти капусти білоголової. Час збиральної стиглості	пізній	7
33,2	Лише сорти капусти червоноголової. Час збиральної стиглості	ознака не визначається	0
33,3	Лише сорти капусти савойської. Час збиральної стиглості	ознака не визначається	0
34	Час розтріскування головки після досягання	пізній	7
35	Чоловіча стерильність	ознака не визначалась	0
36	Стійкість до раси 1 <i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>Conglutinans</i>	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна урожайність 60 т./га., період від сівби до початку достигання 127 діб.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
Степ, Лісостеп, Полісся

Вид: Капуста білоголова *Brassica oleracea* L. var. alba DC.

Заявка №: 11028009 **Назва сорту** Орієнта F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 18.04.2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

17.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140317

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: за висотою	висока	7
1,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0
1,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0
2,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: найбільший діаметр (разом із зовнішніми листками)	середній	5
2,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0
2,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0
3	Рослина: довжина зовнішнього качана	довгий	7
4	Рослина: положення зовнішніх листків	напівпрямостоячі	3
5,1	Лише для сортів капусти білоголової. Зовнішній листок: за розміром	великий	7
5,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: за розміром	ознака не визначається	0
5,3	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: за розміром	ознака не визначається	0
6	Зовнішній листок: форма пластинки	еліптична	1
7	Зовнішній листок: профіль верхньої частини пластинки	увігнутий	1
8,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	ознака не визначається	0
8,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	ознака не визначається	0
9,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: розмір пухирів	середні	5
9,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір пухирів	ознака не визначається	0
10	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: гофрованість	ознака не визначається	0
11	Зовнішній листок: колір (з восковим нальотом)	зелений	2
12	Зовнішній листок: інтенсивність забарвлення	помірне	5
13	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: зеленкуватість	ознака не визначається	0
14	Зовнішній листок: восковий наліт	помірний	5
15	Зовнішній листок: ступінь хвилястості краю	помірна	5
16	Зовнішній листок: вигин краю	відсутній	1
17	Головка: форма поздовжнього розтину	ознака не визначалась	0
18	Головка: форма основи поздовжнього розтину	рівна	2
19	Головка: за довжиною	довга	7
20	Головка: за діаметром	середня	5
21	Головка: розміщення найбільшого діаметра	ближче до основи	3
22	Головка: ступінь покриття	частково покрита	2
23	Лише для сортів капусти савойської. Головка: пухирчастість покривного листка	ознака не визначається	0
24	Головка: вигин краю покривного листка	відсутній	1
25	Головка: забарвлення покривного листка	зелене	2
26	Головка: інтенсивність забарвлення покривного листка	помірне	5
27	Лише сорти капусти білоголової і савойської Головка: антоціанове забарвлення покривних листків	слабке	3
28	Головка: внутрішнє забарвлення	білувате	1
29	Лише сорти капусти червоноголової. Головка: інтенсивність зовнішнього забарвлення	ознака не визначається	0
30	Головка: за щільністю	середня	5
31	Головка: внутрішня структура	середня	5
32	Головка: довжина внутрішнього качана відносно довжини головки	коротка	3
33,1	Лише сорти капусти білоголової. Час збирання стиглості	середній	5
33,2	Лише сорти капусти червоноголової. Час збирання стиглості	ознака не визначається	0
33,3	Лише сорти капусти савойської. Час збирання стиглості	ознака не визначається	0
34	Час розтріскування головки після досягання	середній	5
35	Чоловіча стерильність	ознака не визначалась	0
36	Стійкість до раси 1 <i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>Conglutinans</i>	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Тривалість вегетації 75 діб. Ураженість хворобами: бактеріозом слизовим 3%, бактеріозом судинним 2%. Вміст сухої речовини 15%. Вміст загального цукру 12%. Вміст вітаміну С 23 мг%. Лежкість 7 балів.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
Закритий ґрунт

Вид: Капуста білоголова *Brassica oleracea* L. var. alba DC.

Заявка №: 09028028 **Назва сорту** PX 05843338 F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

24.02.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140010

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: за висотою	дуже висока	9
1,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0
1,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0
2,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: найбільший діаметр (разом із зовнішніми листками)	середній	5
2,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0
2,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0
3	Рослина: довжина зовнішнього качана	короткий	3
4	Рослина: положення зовнішніх листків	сланкі	5
5,1	Лише для сортів капусти білоголової. Зовнішній листок: за розміром	середній	5
5,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: за розміром	ознака не визначається	0
5,3	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: за розміром	ознака не визначається	0
6	Зовнішній листок: форма пластинки	еліптична	1
7	Зовнішній листок: профіль верхньої частини пластинки	увігнутий	1
8,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	ознака не визначається	0
9,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: розмір пухирів	середні	5
9,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір пухирів	ознака не визначається	0
10	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: гофрованість	ознака не визначається	0
11	Зовнішній листок: колір (з восковим нальотом)	сіро-зелений	3
12	Зовнішній листок: інтенсивність забарвлення	помірне	5
13	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: зеленкуватість	ознака не визначається	0
14	Зовнішній листок: восковий наліт	сильний	7
15	Зовнішній листок: ступінь хвилястості краю	помірна	5
16	Зовнішній листок: вигин краю	наявний	9
17	Головка: форма позовжнього розтину	поперечно-вузькоеліптична	1
18	Головка: форма основи позовжнього розтину	рівна	2
19	Головка: за довжиною	коротка	3
20	Головка: за діаметром	середня	5
21	Головка: розміщення найбільшого діаметра	посередині	2
22	Головка: ступінь покриття	частково покрита	2
23	Лише для сортів капусти савойської. Головка: пухирчастість покривного листка	ознака не визначається	0
24	Головка: вигин краю покривного листка	наявний	9
25	Головка: забарвлення покривного листка	жовто-зелене	1
26	Головка: інтенсивність забарвлення покривного листка	світле	3
27	Лише сорти капусти білоголової і савойської. Головка: антоціанове забарвлення покривних листків	відсутнє або дуже слабке	1
28	Головка: внутрішнє забарвлення	білувате	1
29	Лише сорти капусти червоноголової. Головка: інтенсивність зовнішнього забарвлення	ознака не визначається	0
30	Головка: за щільністю	щільна	7
31	Головка: внутрішня структура	середня	5
32	Головка: довжина внутрішнього качана відносно довжини головки	середня	5
33,1	Лише сорти капусти білоголової. Час збиральної стиглості	ознака не визначається	0
33,2	Лише сорти капусти червоноголової. Час збиральної стиглості	ознака не визначається	0
33,3	Лише сорти капусти савойської. Час збиральної стиглості	дуже пізній	9
34	Час розтріскування головки після досягання	середній	5
35	Чоловіча стерильність	ознака не визначалась	0
36	Стійкість до раси 1 <i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>Conglutinans</i>	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність 90 т/га; Період від повних сходів до початку достигання 127 діб; Вміст сухої речовини 8,2%; Вміст загального цукру 4,8%; Вміст вітаміну С 65мг%; Вміст білка 1,35% Лежкість 8,5 балів .

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Степ, Лісостеп, Полісся

Вид: Капуста білоголова *Brassica oleracea* L. var. alba DC.

Заявка №: 11028017 **Назва сорту** Сінтекс

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

06.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140134

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: за висотою	середня	5
1,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0
1,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0
2,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: найбільший діаметр (разом із зовнішніми листками)	малий	3
2,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0
2,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0
3	Рослина: довжина зовнішнього качана	короткий	3
4	Рослина: положення зовнішніх листків	напівпрямостоячі	3
5,1	Лише для сортів капусти білоголової. Зовнішній листок: за розміром	малий	3
5,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: за розміром	ознака не визначається	0
5,3	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: за розміром	ознака не визначається	0
6	Зовнішній листок: форма пластинки	оберненояйцевидна	5
7	Зовнішній листок: профіль верхньої частини пластинки	увігнутий	1
8,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	відсутня або дуже слабка	1
8,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	ознака не визначається	0
9,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: розмір пухирів	малі	3
9,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір пухирів	ознака не визначається	0
10	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: гофрованість	ознака не визначається	0
11	Зовнішній листок: колір (з восковим нальотом)	сіро-зелений	3
12	Зовнішній листок: інтенсивність забарвлення	помірне	5
13	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: зеленкуватість	ознака не визначається	0
14	Зовнішній листок: восковий наліт	помірний	5
15	Зовнішній листок: ступінь хвилястості краю	помірна	5
16	Зовнішній листок: вигин краю	відсутній	1
17	Головка: форма поздовжнього розтину	округла	3
18	Головка: форма основи поздовжнього розтину	округла	1
19	Головка: за довжиною	коротка	3
20	Головка: за діаметром	маленька	3
21	Головка: розміщення найбільшого діаметра	ближче до верхівки	1
22	Головка: ступінь покриття	покрита	3
23	Лише для сортів капусти савойської. Головка: пухирчастість покривного листка	ознака не визначається	0
24	Головка: вигин краю покривного листка	наявний	9
25	Головка: забарвлення покривного листка	зелене	2
26	Головка: інтенсивність забарвлення покривного листка	помірне	5
27	Лише сорти капусти білоголової і савойської Головка: антоціанове забарвлення покривних листків	відсутнє або дуже слабке	1
28	Головка: внутрішнє забарвлення	білувате	1
29	Лише сорти капусти червоноголової. Головка: інтенсивність зовнішнього забарвлення	ознака не визначається	0
30	Головка: за щільністю	щільна	7
31	Головка: внутрішня структура	тонка	3
32	Головка: довжина внутрішнього качана відносно довжини головки	середня	5
33,1	Лише сорти капусти білоголової. Час збиральної стиглості	пізній	7
33,2	Лише сорти капусти червоноголової. Час збиральної стиглості	ознака не визначається	0
33,3	Лише сорти капусти савойської. Час збиральної стиглості	ознака не визначається	0
34	Час розтріскування головки після досягання	пізній	7
35	Чоловіча стерильність	ознака не визначалась	0
36	Стійкість до раси 1 <i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>Conglutinans</i>	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна урожайність 60 т./га., період від сівби до початку достигання 83 діб.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
Степ, Лісостеп, Полісся

Вид: Капуста білоголова *Brassica oleracea* L. var. alba DC.

Заявка №: 12028008 **Назва сорту** Хіпо

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

17.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140319

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: за висотою	висока	7
1,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0
1,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0
2,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: найбільший діаметр (разом із зовнішніми листками)	великий	7
2,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0
2,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0
3	Рослина: довжина зовнішнього качана	середній	5
4	Рослина: положення зовнішніх листків	напівпрямостоячі	3
5,1	Лише для сортів капусти білоголової. Зовнішній листок: за розміром	великий	7
5,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: за розміром	ознака не визначається	0
5,3	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: за розміром	ознака не визначається	0
6	Зовнішній листок: форма пластинки	поперечноширокоеліптична	4
7	Зовнішній листок: профіль верхньої частини пластинки	плаский	2
8,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	відсутня або дуже слабка	1
8,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	ознака не визначається	0
9,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: розмір пухирів	ознака не визначається	0
9,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір пухирів	ознака не визначається	0
10	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: гофрованість	ознака не визначається	0
11	Зовнішній листок: колір (з восковим нальотом)	жовто-зелений	1
12	Зовнішній листок: інтенсивність забарвлення	помірне	5
13	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: зеленкуватість	ознака не визначається	0
14	Зовнішній листок: восковий наліт	слабкий	3
15	Зовнішній листок: ступінь хвилястості краю	слабка	3
16	Зовнішній листок: вигин краю	відсутній	1
17	Головка: форма поздовжнього розтину	округла	3
18	Головка: форма основи поздовжнього розтину	рівна	2
19	Головка: за довжиною	довга	7
20	Головка: за діаметром	середня	5
21	Головка: розміщення найбільшого діаметра	посередині	2
22	Головка: ступінь покриття	покрита	3
23	Лише для сортів капусти савойської. Головка: пухирчастість покривного листка	ознака не визначається	0
24	Головка: вигин краю покривного листка	відсутній	1
25	Головка: забарвлення покривного листка	зелене	2
26	Головка: інтенсивність забарвлення покривного листка	помірне	5
27	Лише сорти капусти білоголової і савойської Головка: антоціанове забарвлення покривних листків	відсутнє або дуже слабке	1
28	Головка: внутрішнє забарвлення	жовтувате	2
29	Лише сорти капусти червоноголової. Головка: інтенсивність зовнішнього забарвлення	ознака не визначається	0
30	Головка: за щільністю	середня	5
31	Головка: внутрішня структура	середня	5
32	Головка: довжина внутрішнього качана відносно довжини головки	середня	5
33,1	Лише сорти капусти білоголової. Час збиральної стиглості	пізній	7
33,2	Лише сорти капусти червоноголової. Час збиральної стиглості	ознака не визначається	0
33,3	Лише сорти капусти савойської. Час збиральної стиглості	ознака не визначається	0
34	Час розтріскування головки після досягання	пізній	7
35	Чоловіча стерильність	наявна	9
36	Стійкість до раси 1 <i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>Conglutinans</i>	наявна	9

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна урожайність 60 т./га., період від сівби до початку досягання 90 діб.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
Закритий ґрунт

Вид: Капуста білоголова *Brassica oleracea* L. var. alba DC.

Заявка №: 10028004 **Назва сорту** Циклон F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

05.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140130

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: за висотою	дуже висока	9
1,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0
1,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0
2,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: найбільший діаметр (разом із зовнішніми листками)	малий	3
2,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0
2,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0
3	Рослина: довжина зовнішнього качана	короткий	3
4	Рослина: положення зовнішніх листків	сланкі	5
5,1	Лише для сортів капусти білоголової. Зовнішній листок: за розміром	середній	5
5,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: за розміром	ознака не визначається	0
5,3	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: за розміром	ознака не визначається	0
6	Зовнішній листок: форма пластинки	оберненояйцевидна	5
7	Зовнішній листок: профіль верхньої частини пластинки	увігнутий	1
8,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	відсутня або дуже слабка	1
8,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	ознака не визначається	0
9,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: розмір пухирів	малі	3
9,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір пухирів	ознака не визначається	0
10	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: гофрованість	ознака не визначається	0
11	Зовнішній листок: колір (з восковим нальотом)	сіро-зелений	3
12	Зовнішній листок: інтенсивність забарвлення	помірне	5
13	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: зеленкуватість	ознака не визначається	0
14	Зовнішній листок: восковий наліт	помірний	5
15	Зовнішній листок: ступінь хвилястості краю	помірна	5
16	Зовнішній листок: вигин краю	наявний	9
17	Головка: форма поздовжнього розтину	широкоеліптична	4
18	Головка: форма основи поздовжнього розтину	округла	1
19	Головка: за довжиною	коротка	3
20	Головка: за діаметром	маленька	3
21	Головка: розміщення найбільшого діаметра	посередині	2
22	Головка: ступінь покриття	частково покрита	2
23	Лише для сортів капусти савойської. Головка: пухирчастість покривного листка	ознака не визначається	0
24	Головка: вигин краю покривного листка	наявний	9
25	Головка: забарвлення покривного листка	зелене	2
26	Головка: інтенсивність забарвлення покривного листка	помірне	5
27	Лише сорти капусти білоголової і савойської Головка: антоціанове забарвлення покривних листків	відсутнє або дуже слабке	1
28	Головка: внутрішнє забарвлення	жовтувате	2
29	Лише сорти капусти червоноголової. Головка: інтенсивність зовнішнього забарвлення	ознака не визначається	0
30	Головка: за щільністю	дуже щільна	9
31	Головка: внутрішня структура	тонка	3
32	Головка: довжина внутрішнього качана відносно довжини головки	середня	5
33,1	Лише сорти капусти білоголової. Час збирання стиглості	пізній	7
33,2	Лише сорти капусти червоноголової. Час збирання стиглості	ознака не визначається	0
33,3	Лише сорти капусти савойської. Час збирання стиглості	ознака не визначається	0
34	Час розтріскування головки після досягання	пізній	7
35	Чоловіча стерильність	ознака не визначалась	0
36	Стійкість до раси 1 <i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>Conglutinans</i>	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність 60 т/га. Період від повних сходів до початку достигання 100 діб. Вміст сухої речовини 7,6%. Вміст загального цукру 4,2%. Вміст вітаміну С 46мг%. Лежкість 2 балів. Ураженість хворобами: бактеріозом слизовим– 1%, бактеріозом

судинним—1%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
Степ, Лісостеп, Полісся

Вид: Капуста білоголова *Brassica oleracea* L. var. alba DC.

Заявка №: 11028015 **Назва сорту** Чекмейт

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

06.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140132

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: за висотою	середня	5
1,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0
1,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0
2,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: найбільший діаметр (разом із зовнішніми листками)	малий	3
2,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0
2,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0
3	Рослина: довжина зовнішнього качана	короткий	3
4	Рослина: положення зовнішніх листків	сланкі	5
5,1	Лише для сортів капусти білоголової. Зовнішній листок: за розміром	малий	3
5,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: за розміром	ознака не визначається	0
5,3	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: за розміром	ознака не визначається	0
6	Зовнішній листок: форма пластинки	оберненояйцевидна	5
7	Зовнішній листок: профіль верхньої частини пластинки	увігнутий	1
8,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	відсутня або дуже слабка	1
8,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	ознака не визначається	0
9,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: розмір пухирів	середні	5
9,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір пухирів	ознака не визначається	0
10	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: гофрованість	ознака не визначається	0
11	Зовнішній листок: колір (з восковим нальотом)	сіро-зелений	3
12	Зовнішній листок: інтенсивність забарвлення	світле	3
13	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: зеленкуватість	ознака не визначається	0
14	Зовнішній листок: восковий наліт	помірний	5
15	Зовнішній листок: ступінь хвилястості краю	помірна	5
16	Зовнішній листок: вигин краю	наявний	9
17	Головка: форма поздовжнього розтину	широкоеліптична	4
18	Головка: форма основи поздовжнього розтину	округла	1
19	Головка: за довжиною	коротка	3
20	Головка: за діаметром	маленька	3
21	Головка: розміщення найбільшого діаметра	посередині	2
22	Головка: ступінь покриття	частково покрита	2
23	Лише для сортів капусти савойської. Головка: пухирчастість покривного листка	ознака не визначається	0
24	Головка: вигин краю покривного листка	наявний	9
25	Головка: забарвлення покривного листка	зелене	2
26	Головка: інтенсивність забарвлення покривного листка	помірне	5
27	Лише сорти капусти білоголової і савойської. Головка: антоціанове забарвлення покривних листків	відсутнє або дуже слабке	1
28	Головка: внутрішнє забарвлення	жовтувате	2
29	Лише сорти капусти червоноголової. Головка: інтенсивність зовнішнього забарвлення	ознака не визначається	0
30	Головка: за щільністю	щільна	7
31	Головка: внутрішня структура	середня	5
32	Головка: довжина внутрішнього качана відносно довжини головки	середня	5
33,1	Лише сорти капусти білоголової. Час збиральної стиглості	ранній	3
33,2	Лише сорти капусти червоноголової. Час збиральної стиглості	ознака не визначається	0
33,3	Лише сорти капусти савойської. Час збиральної стиглості	ознака не визначається	0
34	Час розтріскування головки після досягання	пізній	7
35	Чоловіча стерильність	ознака не визначалась	0
36	Стійкість до раси 1 <i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>Conglutinans</i>	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна урожайність 60 т./га., період від сівби до початку достигання 67 діб.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
Степ, Лісостеп, Полісся

Вид: Капуста цвітня Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis

Заявка №: 11029009 **Назва сорту** Аероспейс F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

04.03.2014

Свідчення про державну реєстрацію № 140015

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Сіянець: антоціанове забарвлення гіпокотіля	наявне	9
2	Рослина: за висотою (за збирання)	середня	5
3	Зовнішнє стебло: за довжиною (до місця прикріплення першого листка)	середнє	5
4	Листок: положення	напівпрямий	3
5	Листок: за довжиною	короткий	3
6	Листок: за шириною	середній	5
7	Листок: відношення ширина/довжина	середнє	5
8	Листок: часточковість	наявна	9
9	Листок: забарвлення (з восковим нальотом, якщо є)	сіро-зелене	2
10	Листок: інтенсивність забарвлення (з восковим нальотом, якщо є)	світле	3
11	Листок: закручування верхівки	відсутнє або дуже слабке	1
12	Листок: форма поперечного перерізу	увігнута	1
13	Листок: пухирчатість	слабка	3
14	Листок: зморшкуватість біля головної жилки	слабка	3
15	Листок: хвилястість краю	слабка	3
16	Головка: покриття внутрішніми листками	відкрита	1
17	Головка: за висотою	середня	5
18	Головка: за діаметром	середня	5
19	Головка: форма поздовжнього розрізу	широко-еліптична	2
20	За винятком сортів з трикутною головою: Головка: утворення склепіння	помірне	5
21	Головка: забарвлення	білувате	1
22	Головка: горбкуватість	помірна	5
23	Головка: текстура	ніжна	3
24	Головка: антоціанове забарвлення після збиральної стиглості	відсутнє	1
25	Квітка: забарвлення	ознака не визначалась	0
26	Час достигання за весняного садіння	ранній	3
27	Час достигання за літнього садіння	ознака не визначалась	0
28	Чоловіча стерильність	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна урожайність 21 т./га. Період плодоношення 55 діб.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Лісостеп, Полісся

Вид: Капуста цвітня Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis

Заявка №: 11029008 **Назва сорту** Альдрін F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

04.03.2014

Свідчення про державну реєстрацію № 140014

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Сіянець: антоціанове забарвлення гіпокотилля	наявне	9
2	Рослина: за висотою (за збирання)	низька	3
3	Зовнішнє стебло: за довжиною (до місця прикріплення першого листка)	коротке	3
4	Листок: положення	напівпрямий	3
5	Листок: за довжиною	короткий	3
6	Листок: за шириною	середній	5
7	Листок: відношення ширина/довжина	середнє	5
8	Листок: часточковість	відсутня	1
9	Листок: забарвлення (з восковим нальотом, якщо є)	сіро-зелене	2
10	Листок: інтенсивність забарвлення (з восковим нальотом, якщо є)	світле	3
11	Листок: закручування верхівки	відсутнє або дуже слабке	1
12	Листок: форма поперечного перерізу	увігнута	1
13	Листок: пухирчатість	слабка	3
14	Листок: зморшкуватість біля головної жилки	слабка	3
15	Листок: хвилястість краю	слабка	3
16	Головка: покриття внутрішніми листками	частково покрита	2
17	Головка: за висотою	середня	5
18	Головка: за діаметром	середня	5
19	Головка: форма поздовжнього розрізу	широко-еліптична	2
20	За винятком сортів з трикутною головою: Головка: утворення склепіння	помірне	5
21	Головка: забарвлення	білувате	1
22	Головка: горбкуватість	помірна	5
23	Головка: текстура	ніжна	3
24	Головка: антоціанове забарвлення після збиральної стиглості	відсутнє	1
25	Квітка: забарвлення	ознака не визначалась	0
26	Час достигання за весняного садіння	від раннього до середнього	4
27	Час достигання за літнього садіння	ознака не визначалась	0
28	Чоловіча стерильність	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна урожайність 20 т./га. Період плодоношення 60 діб.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Лісостеп, Полісся

Вид: Капуста цвітна Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis

Заявка №: 11029005 **Назва сорту** Балбоа F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

05.03.2014

Свідчення про державну реєстрацію № 140141

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Сіянець: антоціанове забарвлення гіпокотіля	наявне	9
2	Рослина: за висотою (за збирання)	низька	3
3	Зовнішнє стебло: за довжиною (до місця прикріплення першого листка)	коротке	3
4	Листок: положення	напівпрямий	3
5	Листок: за довжиною	короткий	3
6	Листок: за шириною	середній	5
7	Листок: відношення ширина/довжина	середнє	5
8	Листок: часточковість	відсутня	1
9	Листок: забарвлення (з восковим нальотом, якщо є)	сіро-зелене	2
10	Листок: інтенсивність забарвлення (з восковим нальотом, якщо є)	помірне	5
11	Листок: закручування верхівки	відсутнє або дуже слабке	1
12	Листок: форма поперечного перерізу	увігнута	1
13	Листок: пухирчатість	слабка	3
14	Листок: зморшкуватість біля головної жилки	відсутня або дуже слабка	1
15	Листок: хвилястість краю	помірна	5
16	Головка: покриття внутрішніми листками	покрита	3
17	Головка: за висотою	середня	5
18	Головка: за діаметром	середня	5
19	Головка: форма поздовжнього розрізу	округла	1
20	За винятком сортів з трикутною головою: Головка: утворення склепіння	помірне	5
21	Головка: забарвлення	білувате	1
22	Головка: горбкуватість	помірна	5
23	Головка: текстура	ніжна	3
24	Головка: антоціанове забарвлення після збиральної стиглості	відсутнє	1
25	Квітка: забарвлення	ознака не визначалась	0
26	Час достигання за весняного садіння	від пізнього до дуже пізнього	8
27	Час достигання за літнього садіння	ознака не визначалась	0
28	Чоловіча стерильність	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна урожайність 50 т./га. Період від повних сходів до початку достигання 89 діб.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Степ, Лісостеп, Полісся

Вид: Капуста цвітня Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis

Заявка №: 13101001 **Назва сорту** Ванза

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

07.03.2014

Свідчення про державну реєстрацію № 140142

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Сіянець: антоціанове забарвлення гіпокотилля	відсутнє	1
2	Рослина: за висотою (за збирання)	низька	3
3	Зовнішнє стебло: за довжиною (до місця прикріплення першого листка)	коротке	3
4	Листок: положення	прямий	1
5	Листок: за довжиною	короткий	3
6	Листок: за шириною	вузький	3
7	Листок: відношення ширина/довжина	середнє	5
8	Листок: часточковість	відсутня	1
9	Листок: забарвлення (з восковим нальотом, якщо є)	сіро-зелене	2
10	Листок: інтенсивність забарвлення (з восковим нальотом, якщо є)	помірне	5
11	Листок: закручування верхівки	слабке	3
12	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	2
13	Листок: пухирчатість	слабка	3
14	Листок: зморшкуватість біля головної жилки	слабка	3
15	Листок: хвилястість краю	слабка	3
16	Головка: покриття внутрішніми листками	відкрита	1
17	Головка: за висотою	низька	3
18	Головка: за діаметром	мала	3
19	Головка: форма поздовжнього розрізу	вузько-еліптична	4
20	За винятком сортів з трикутною головою: Головка: утворення склепіння	слабке	3
21	Головка: забарвлення	жовте	2
22	Головка: горбкуватість	слабка	3
23	Головка: текстура	ніжна	3
24	Головка: антоціанове забарвлення після збиральної стиглості	наявне	9
25	Квітка: забарвлення	ознака не визначалась	0
26	Час достигання за весняного садіння	дуже ранній	1
27	Час достигання за літнього садіння	ознака не визначалась	0
28	Чоловіча стерильність	відсутня	1

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна урожайність 7,2 т./га. Період від повних сходів до початку достигання 78 діб. Період плодоношення 120 діб.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Закритий ґрунт

Вид: Капуста цвітня Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis

Заявка №: 11029002 **Назва сорту** Вероніка F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

05.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140138

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Сіянець: антоціанове забарвлення гіпокотіля	наявне	9
2	Рослина: за висотою (за збирання)	низька	3
3	Зовнішнє стебло: за довжиною (до місця прикріплення першого листка)	довге	7
4	Листок: положення	прямий	1
5	Листок: за довжиною	короткий	3
6	Листок: за шириною	вузький	3
7	Листок: відношення ширина/довжина	мале	3
8	Листок: часточковість	відсутня	1
9	Листок: забарвлення (з восковим нальотом, якщо є)	блакитно-зелене	3
10	Листок: інтенсивність забарвлення (з восковим нальотом, якщо є)	помірне	5
11	Листок: закручування верхівки	відсутнє або дуже слабке	1
12	Листок: форма поперечного перерізу	увігнута	1
13	Листок: пухирчатість	слабка	3
14	Листок: зморшкуватість біля головної жилки	відсутня або дуже слабка	1
15	Листок: хвилястість краю	відсутня або дуже слабка	1
16	Головка: покриття внутрішніми листками	відкрита	1
17	Головка: за висотою	середня	5
18	Головка: за діаметром	середня	5
19	Головка: форма поздовжнього розрізу	трикутна	5
20	За винятком сортів з трикутною головою: Головка: утворення склепіння	ознака не визначалась	0
21	Головка: забарвлення	зелене	4
22	Головка: горбкуватість	дуже сильна	9
23	Головка: текстура	груба	7
24	Головка: антоціанове забарвлення після збиральної стиглості	відсутнє	1
25	Квітка: забарвлення	ознака не визначалась	0
26	Час достигання за весняного садіння	середній	5
27	Час достигання за літнього садіння	ознака не визначалась	0
28	Чоловіча стерильність	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна урожайність 50 т./га. Період від повних сходів до початку достигання 91 діб.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Степ, Лісостеп, Полісся

Вид: Капуста цвітня Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis

Заявка №: 09029005 **Назва сорту** Кердос F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

24.02.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140013

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Сіянець: антоціанове забарвлення гіпокотилля	наявне	9
2	Рослина: за висотою (за збирання)	дуже низька	1
3	Зовнішнє стебло: за довжиною (до місця прикріплення першого листка)	середнє	5
4	Листок: положення	напівпрямий	3
5	Листок: за довжиною	короткий	3
6	Листок: за шириною	середній	5
7	Листок: відношення ширина/довжина	ознака не визначалась	0
8	Листок: часточковість	наявна	9
9	Листок: забарвлення (з восковим нальотом, якщо є)	сіро-зелене	2
10	Листок: інтенсивність забарвлення (з восковим нальотом, якщо є)	помірне	5
11	Листок: закручування верхівки	слабке	3
12	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	2
13	Листок: пухирчатість	слабка	3
14	Листок: зморшкуватість біля головної жилки	слабка	3
15	Листок: хвилястість краю	слабка	3
16	Головка: покриття внутрішніми листками	відкрита	1
17	Головка: за висотою	середня	5
18	Головка: за діаметром	середня	5
19	Головка: форма поздовжнього розрізу	еліптична	3
20	За винятком сортів з трикутною головою: Головка: утворення склепіння	помірне	5
21	Головка: забарвлення	жовте	2
22	Головка: горбкуватість	помірна	5
23	Головка: текстура	помірна	5
24	Головка: антоціанове забарвлення після збиральної стиглості	відсутнє	1
25	Квітка: забарвлення	ознака не визначалась	0
26	Час достигання за весняного садіння	від раннього до середнього	4
27	Час достигання за літнього садіння	від раннього до середнього осіннього типу	4
28	Чоловіча стерильність	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність 25 т/га. Період від повних сходів до початку достигання 110 діб. Період плодоношення 15 діб. Вміст сухої речовини 8,97%. Вміст загального цукру 2,99%. Вміст вітаміну С 89,7 мг%. Вміст білка 2,2%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Степ, Лісостеп, Полісся

Вид: Капуста цвітня Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis

Заявка №: 13101002 **Назва сорту** Місора

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

07.03.2014

Свідчення про державну реєстрацію № 140143

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Сіянець: антоціанове забарвлення гіпокотилля	відсутнє	1
2	Рослина: за висотою (за збирання)	дуже низька	1
3	Зовнішнє стебло: за довжиною (до місця прикріплення першого листка)	коротке	3
4	Листок: положення	прямий	1
5	Листок: за довжиною	короткий	3
6	Листок: за шириною	вузький	3
7	Листок: відношення ширина/довжина	середнє	5
8	Листок: часточковість	відсутня	1
9	Листок: забарвлення (з восковим нальотом, якщо є)	сіро-зелене	2
10	Листок: інтенсивність забарвлення (з восковим нальотом, якщо є)	помірне	5
11	Листок: закручування верхівки	слабке	3
12	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	2
13	Листок: пухирчатість	слабка	3
14	Листок: зморшкуватість біля головної жилки	слабка	3
15	Листок: хвилястість краю	слабка	3
16	Головка: покриття внутрішніми листками	відкрита	1
17	Головка: за висотою	низька	3
18	Головка: за діаметром	мала	3
19	Головка: форма поздовжнього розрізу	вузько-еліптична	4
20	За винятком сортів з трикутною головою: Головка: утворення склепіння	слабке	3
21	Головка: забарвлення	жовте	2
22	Головка: горбкуватість	помірна	5
23	Головка: текстура	ніжна	3
24	Головка: антоціанове забарвлення після збиральної стиглості	наявне	9
25	Квітка: забарвлення	ознака не визначалась	0
26	Час достигання за весняного садіння	дуже ранній	1
27	Час достигання за літнього садіння	ознака не визначалась	0
28	Чоловіча стерильність	відсутня	1

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна урожайність 8,9 т./га. Період від повних сходів до початку достигання 86 діб. Період плодоношення 134 доби.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Закритий ґрунт

Вид: Капуста цвітня Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis

Заявка №: 11029003 **Назва сорту** Овієдо F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

05.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140139

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Сіянець: антоціанове забарвлення гіпокотіля	наявне	9
2	Рослина: за висотою (за збирання)	дуже низька	1
3	Зовнішнє стебло: за довжиною (до місця прикріплення першого листка)	середнє	5
4	Листок: положення	напівпрямий	3
5	Листок: за довжиною	короткий	3
6	Листок: за шириною	вузький	3
7	Листок: відношення ширина/довжина	середнє	5
8	Листок: часточковість	відсутня	1
9	Листок: забарвлення (з восковим нальотом, якщо є)	сіро-зелене	2
10	Листок: інтенсивність забарвлення (з восковим нальотом, якщо є)	світле	3
11	Листок: закручування верхівки	відсутнє або дуже слабке	1
12	Листок: форма поперечного перерізу	увігнута	1
13	Листок: пухирчатість	слабка	3
14	Листок: зморшкуватість біля головної жилки	слабка	3
15	Листок: хвилястість краю	слабка	3
16	Головка: покриття внутрішніми листками	частково покрита	2
17	Головка: за висотою	низька	3
18	Головка: за діаметром	середня	5
19	Головка: форма поздовжнього розрізу	широко-еліптична	2
20	За винятком сортів з трикутною головою: Головка: утворення склепіння	помірне	5
21	Головка: забарвлення	білувате	1
22	Головка: горбкуватість	помірна	5
23	Головка: текстура	помірна	5
24	Головка: антоціанове забарвлення після збиральної стиглості	відсутнє	1
25	Квітка: забарвлення	ознака не визначалась	0
26	Час достигання за весняного садіння	дуже ранній	1
27	Час достигання за літнього садіння	ознака не визначалась	0
28	Чоловіча стерильність	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна урожайність 50 т./га. Період від повних сходів до початку достигання 66 діб.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Степ, Лісостеп, Полісся

Вид: Капуста цвітня Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis

Заявка №: 11029004 **Назва сорту** Старгейт F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

05.03.2014

Свідчення про державну реєстрацію № 140140

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Сіянець: антоціанове забарвлення гіпокотіля	наявне	9
2	Рослина: за висотою (за збирання)	дуже низька	1
3	Зовнішнє стебло: за довжиною (до місця прикріплення першого листка)	коротке	3
4	Листок: положення	напівпрямий	3
5	Листок: за довжиною	короткий	3
6	Листок: за шириною	вузький	3
7	Листок: відношення ширина/довжина	середнє	5
8	Листок: часточковість	відсутня	1
9	Листок: забарвлення (з восковим нальотом, якщо є)	сіро-зелене	2
10	Листок: інтенсивність забарвлення (з восковим нальотом, якщо є)	світле	3
11	Листок: закручування верхівки	відсутнє або дуже слабке	1
12	Листок: форма поперечного перерізу	увігнута	1
13	Листок: пухирчатість	слабка	3
14	Листок: зморшкуватість біля головної жилки	слабка	3
15	Листок: хвилястість краю	слабка	3
16	Головка: покриття внутрішніми листками	відкрита	1
17	Головка: за висотою	середня	5
18	Головка: за діаметром	середня	5
19	Головка: форма поздовжнього розрізу	округла	1
20	За винятком сортів з трикутною головою: Головка: утворення склепіння	помірне	5
21	Головка: забарвлення	білувате	1
22	Головка: горбкуватість	слабка	3
23	Головка: текстура	ніжна	3
24	Головка: антоціанове забарвлення після збиральної стиглості	відсутнє	1
25	Квітка: забарвлення	ознака не визначалась	0
26	Час достигання за весняного садіння	від дуже раннього до раннього	2
27	Час достигання за літнього садіння	ознака не визначалась	0
28	Чоловіча стерильність	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна урожайність 50 т./га. Період від повних сходів до початку достигання 72 доби.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Степ, Лісостеп, Полісся

Вид: Капуста цвітня Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis

Заявка №: 09029004 **Назва сорту** Фрідом F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

24.02.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140012

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Сіянець: антоціанове забарвлення гіпокотилля	наявне	9
2	Рослина: за висотою (за збирання)	низька	3
3	Зовнішнє стебло: за довжиною (до місця прикріплення першого листка)	середнє	5
4	Листок: положення	напівпрямий	3
5	Листок: за довжиною	короткий	3
6	Листок: за шириною	середній	5
7	Листок: відношення ширина/довжина	ознака не визначалась	0
8	Листок: часточковість	наявна	9
9	Листок: забарвлення (з восковим нальотом, якщо є)	сіро-зелене	2
10	Листок: інтенсивність забарвлення (з восковим нальотом, якщо є)	помірне	5
11	Листок: закручування верхівки	слабке	3
12	Листок: форма поперечного перерізу	увігнута	1
13	Листок: пухирчатість	слабка	3
14	Листок: зморшкуватість біля головної жилки	відсутня або дуже слабка	1
15	Листок: хвилястість краю	слабка	3
16	Головка: покриття внутрішніми листками	відкрита	1
17	Головка: за висотою	середня	5
18	Головка: за діаметром	середня	5
19	Головка: форма поздовжнього розрізу	вузько-еліптична	4
20	За винятком сортів з трикутною головою: Головка: утворення склепіння	помірне	5
21	Головка: забарвлення	білувате	1
22	Головка: горбкуватість	помірна	5
23	Головка: текстура	помірна	5
24	Головка: антоціанове забарвлення після збиральної стиглості	відсутнє	1
25	Квітка: забарвлення	ознака не визначалась	0
26	Час достигання за весняного садіння	ранній	3
27	Час достигання за літнього садіння	ранній осінній тип	3
28	Чоловіча стерильність	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність 23 т/га. Період від повних сходів до початку достигання 105 діб. Період плодоношення 12 діб. Вміст сухої речовини 11,6%. Вміст загального цукру 2,89%. Вміст вітаміну С 103,9 мг%. Вміст білка 2,6%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Степ, Лісостеп, Полісся

Вид: Капуста червоноголова *Brassica oleracea* L. var. *rubra* DC.

Заявка №: 11030003 **Назва сорту** Клімаро F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

05.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140145

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0
1,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: за висотою	середня	5
1,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0
2,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: найбільший діаметр (разом із зовнішніми листками)	ознака не визначається	0
2,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	середній	5
2,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0
3	Рослина: довжина зовнішнього качана	середній	5
4	Рослина: положення зовнішніх листків	пряmostoячі	1
5,1	Лише для сортів капусти білоголової. Зовнішній листок: за розміром	ознака не визначається	0
5,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: за розміром	середній	5
5,3	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: за розміром	ознака не визначається	0
6	Зовнішній листок: форма пластинки	оберненояйцевидна	5
7	Зовнішній листок: профіль верхньої частини пластинки	увігнутий	1
8,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	відсутня або дуже слабка	1
8,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	ознака не визначається	0
9,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: розмір пухирів	малі	3
9,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір пухирів	ознака не визначається	0
10	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: гофрованість	ознака не визначається	0
11	Зовнішній листок: колір (з восковим нальотом)	сіро-зелений	3
12	Зовнішній листок: інтенсивність забарвлення	світле	3
13	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: зеленкуватість	наявна	9
14	Зовнішній листок: восковий наліт	помірний	5
15	Зовнішній листок: ступінь хвилястості краю	помірна	5
16	Зовнішній листок: вигин краю	наявний	9
17	Головка: форма поздовжнього розтину	широкообернено-яйцевидна	5
18	Головка: форма основи поздовжнього розтину	округла	1
19	Головка: за довжиною	середня	5
20	Головка: за діаметром	середня	5
21	Головка: розміщення найбільшого діаметра	ближче до верхівки	1
22	Головка: ступінь покриття	частково покрита	2
23	Лише для сортів капусти савойської. Головка: пухирчастість покривного листка	ознака не визначається	0
24	Головка: вигин краю покривного листка	наявний	9
25	Головка: забарвлення покривного листка	сіро-зелене	3
26	Головка: інтенсивність забарвлення покривного листка	помірне	5
27	Лише сорти капусти білоголової і савойської Головка: антоціанове забарвлення покривних листків	ознака не визначається	0
28	Головка: внутрішнє забарвлення	фіолетове	4
29	Лише сорти капусти червоноголової. Головка: інтенсивність зовнішнього забарвлення	помірне	5
30	Головка: за щільністю	середня	5
31	Головка: внутрішня структура	середня	5
32	Головка: довжина внутрішнього качана відносно довжини головки	довга	7
33,1	Лише сорти капусти білоголової. Час збиральної стиглості	ознака не визначається	0
33,2	Лише сорти капусти червоноголової. Час збиральної стиглості	середній	5
33,3	Лише сорти капусти савойської. Час збиральної стиглості	ознака не визначається	0
34	Час розтріскування головки після досягання	пізній	7
35	Чоловіча стерильність	ознака не визначалась	0
36	Стійкість до раси 1 <i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>Conglutinans</i>	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна урожайність 75 т./га. Період від повних сходів до початку досягання 120 діб.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
Степ, Лісостеп, Полісся

Вид: Капуста червоноголова *Brassica oleracea* L. var. *rubra* DC.

Заявка №: 11030002 **Назва сорту** Ранчеро F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

05.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140144

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0
1,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: за висотою	середня	5
1,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0
2,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: найбільший діаметр (разом із зовнішніми листками)	ознака не визначається	0
2,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	середній	5
2,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0
3	Рослина: довжина зовнішнього качана	короткий	3
4	Рослина: положення зовнішніх листків	напівпрямостоячі	3
5,1	Лише для сортів капусти білоголової. Зовнішній листок: за розміром	ознака не визначається	0
5,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: за розміром	середній	5
5,3	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: за розміром	ознака не визначається	0
6	Зовнішній листок: форма пластинки	оберненояйцевидна	5
7	Зовнішній листок: профіль верхньої частини пластинки	увігнутий	1
8,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	відсутня або дуже слабка	1
8,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	ознака не визначається	0
9,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: розмір пухирів	малі	3
9,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір пухирів	ознака не визначається	0
10	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: гофрованість	ознака не визначається	0
11	Зовнішній листок: колір (з восковим нальотом)	фіолетовий	5
12	Зовнішній листок: інтенсивність забарвлення	помірне	5
13	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: зеленкуватість	наявна	9
14	Зовнішній листок: восковий наліт	помірний	5
15	Зовнішній листок: ступінь хвилястості краю	слабка	3
16	Зовнішній листок: вигин краю	наявний	9
17	Головка: форма поздовжнього розтину	широкоеліптична	4
18	Головка: форма основи поздовжнього розтину	округла	1
19	Головка: за довжиною	середня	5
20	Головка: за діаметром	середня	5
21	Головка: розміщення найбільшого діаметра	посередині	2
22	Головка: ступінь покриття	частково покрита	2
23	Лише для сортів капусти савойської. Головка: пухирчастість покривного листка	ознака не визначається	0
24	Головка: вигин краю покривного листка	наявний	9
25	Головка: забарвлення покривного листка	фіолетове	5
26	Головка: інтенсивність забарвлення покривного листка	помірне	5
27	Лише сорти капусти білоголової і савойської Головка: антоціанове забарвлення покривних листків	ознака не визначається	0
28	Головка: внутрішнє забарвлення	фіолетове	4
29	Лише сорти капусти червоноголової. Головка: інтенсивність зовнішнього забарвлення	помірне	5
30	Головка: за щільністю	середня	5
31	Головка: внутрішня структура	середня	5
32	Головка: довжина внутрішнього качана відносно довжини головки	довга	7
33,1	Лише сорти капусти білоголової. Час збиральної стиглості	ознака не визначається	0
33,2	Лише сорти капусти червоноголової. Час збиральної стиглості	середній	5
33,3	Лише сорти капусти савойської. Час збиральної стиглості	ознака не визначається	0
34	Час розтріскування головки після досягання	ранній	3
35	Чоловіча стерильність	ознака не визначалась	0
36	Стійкість до раси 1 <i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>Conglutinans</i>	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна урожайність 75 т./га. Період від повних сходів до початку досягання 92 доби.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
Степ, Лісостеп, Полісся

Вид: Квасоля звичайна (зернова) Phaseolus vulgaris L.

Заявка №: 11087001 Назва сорту Галактика

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 10.03.2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

27.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140389

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: антоціанове забарвлення гіпокотіля	відсутнє	1
2	Рослина: інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотіля	ознака не визначається	0
3	Рослина: тип росту	кущовий	1
4	Виткі сорти. Рослина: архітектоніка	ознака не визначається	0
5	Кущові сорти. Рослина: тип росту	сланкий	2
6	Кущові сорти. Рослина: за висотою	середня	5
7	Виткі сорти. Рослина: початок завивання (80% рослин)	ознака не визначається	0
8	Виткі сорти. Рослина: швидкість завивання	ознака не визначається	0
9	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
10	Листок: зморшкуватість	помірна	5
11	Верхівковий листочок: за розміром	великий	7
12	Верхівковий листочок: форма	від трикутної до округлої	2
14	Кущові сорти. Суцвіття: положення (за повного цвітіння)	переважно в листках	1
15	Квітка: розмір приквітка	середній	5
16	Квітка: колір паруса	рожевий	3
17	Квітка: колір крил	рожевий	3
18	Кущові сорти. Біб: за довжиною (за виключенням гачка)	середній	5
19	Виткі сорти. Біб: за довжиною (як для 18)	ознака не визначається	0
20	Біб: за шириною	середній	5
21	Біб: за товщиною	помірний	5
22	Біб: форма поперечного перерізу (через насінину)	округла	4
23	Біб: відношення товщини до ширини	середнє	5
24	Біб: основний колір	зелений	2
25	Біб: інтенсивність основного кольору	помірний	5
26	Біб: вторинний колір	наявний	9
27	Біб: колір вторинного забарвлення	фіолетовий	3
28	Біб: щільність плям вторинного кольору	помірної щільності	5
29	Біб: волокнистість вентрального (черевного) шва	наявна	9
30	Біб: ступінь вигину	слабкий	3
31	Біб: форма вигину	увігнута	1
32	Біб: форма верхівки (за виключенням гачка)	тупа	3
33	Біб: довжина гачка	довгий	7
34	Біб: вигин гачка	відсутній або дуже слабкий	1
35	Біб: характер поверхні	зморшкувата	3
37	Насіння: маса 1000 насінин	середня	5
38	Насінина: форма поздовжнього розтину	нирковидна	4
39	Сорти з ниркоподібним насінням. Насінина: ступінь вигину	слабкий	3
40	Насінина: форма поперечного перерізу	вузькоеліптична	2
41	Насінина: поперечний переріз за шириною	середній	5
42	Насінина: за довжиною	середня	5
43	Насінина: кількість кольорів	два	2
44	Насінина: основний колір (найбільша зона)	фіолетовий	8
45	Насінина: вторинний колір	коричневий	4
46	Насінина: розподіл переважаючого вторинного кольору	пістрявий	3
47	Насінина: жилкування	слабке	3
48	Час цвітіння (50% рослин мають щонайменше одну квітку)	дуже ранній	1
49,1	Стійкість до антракнозу квасолі (Colletotrichum lindemuthianum): Paca 6	ознака не визначалась	0
49,2	Стійкість до антракнозу квасолі (Colletotrichum lindemuthianum): Paca Kappa	ознака не визначалась	0
50	Стійкість до вірусної мозаїки квасолі Bean Common Mosaic Necrosis Virus (BCMNV)	ознака не визначалась	0
51	Стійкість до кутастої бактеріальної плямистості (Pseudomonas syringae pv. phaseolicola): Paca 6	ознака не визначалась	0
52	Стійкість до звичайної плямистості квасолі (Xanthomonas campestris pv. phaseoli), ізолят 422	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожайність зерна (за стандартної вологості 14%) 24,5 т./га. Тривалість вегетації рослин 88 діб. Стійкість до вилягання 9 балів. Висота прикріплення нижнього бобу 16 см. Вміст сирого протеїну 21%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Лісостеп

Вид: Квасоля звичайна (овочева) *Phaseolus vulgaris* L.

Заявка №: 10087003 **Назва сорту** Палаті

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

03.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140019

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: антоціанове забарвлення гіпокотилі	відсутнє	1
2	Рослина: інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилі	ознака не визначається	0
3	Рослина: тип росту	кущовий	1
4	Виткі сорти. Рослина: архітектоніка	ознака не визначається	0
5	Кущові сорти. Рослина: тип росту	не сланкий	1
6	Кущові сорти. Рослина: за висотою	низька	3
7	Виткі сорти. Рослина: початок завивання (80% рослин)	ознака не визначається	0
8	Виткі сорти. Рослина: швидкість завивання	ознака не визначається	0
9	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	темне	7
10	Листок: зморшкуватість	помірна	5
11	Верхівковий листочок: за розміром	малий	3
12	Верхівковий листочок: форма	від трикутної до округлої	2
13	Верхівковий листочок: довжина верхівки	довга	3
14	Кущові сорти. Суцвіття: положення (за повного цвітіння)	переважно в листках	1
15	Квітка: розмір приквітка	малий	3
16	Квітка: колір паруса	білий	1
17	Квітка: колір крил	білий	1
18	Кущові сорти. Біб: за довжиною (за виключенням гачка)	довгий	7
19	Виткі сорти. Біб: за довжиною (як для 18)	ознака не визначається	0
20	Біб: за шириною	вузький	3
21	Біб: за товщиною	тонкий	3
22	Біб: форма поперечного перерізу (через насінину)	округла	4
23	Біб: відношення товщини до ширини	середнє	5
24	Біб: основний колір	зелений	2
25	Біб: інтенсивність основного кольору	помірний	5
26	Біб: вторинний колір	відсутній	1
27	Біб: колір вторинного забарвлення	ознака не визначається	0
28	Біб: щільність плям вторинного кольору	ознака не визначається	0
29	Біб: волокнистість вентрального (черевного) шва	відсутня	1
30	Біб: ступінь вигину	слабкий	3
31	Біб: форма вигину	увігнута	1
32	Біб: форма верхівки (за виключенням гачка)	загострена	1
33	Біб: довжина гачка	короткий	3
34	Біб: вигин гачка	слабкий	3
35	Біб: характер поверхні	зморшкувата	3
36	Біб: звуження (в сухому стані)	сильне	3
37	Насіння: маса 1000 насінин	дуже низька	1
38	Насінина: форма поздовжнього розтину	нирковидна	4
39	Сорти з ниркоподібним насінням. Насінина: ступінь вигину	слабкий	3
40	Насінина: форма поперечного перерізу	еліптична	3
41	Насінина: поперечний переріз за шириною	вузький	3
42	Насінина: за довжиною	коротка	3
43	Насінина: кількість кольорів	один	1
44	Насінина: основний колір (найбільша зона)	білий	1
45	Насінина: вторинний колір	ознака не визначається	0
46	Насінина: розподіл переважаючого вторинного кольору	ознака не визначається	0
47	Насінина: жилкування	помірне	5
48	Час цвітіння (50% рослин мають щонайменше одну квітку)	ранній	3
49,1	Стійкість до антракнозу квасолі (<i>Colletotrichum lindemuthianum</i>): Paca 6	ознака не визначалась	0
49,2	Стійкість до антракнозу квасолі (<i>Colletotrichum lindemuthianum</i>): Paca Kappa	ознака не визначалась	0
50	Стійкість до вірусної мозаїки квасолі Bean Common Mosaic Necrosis Virus (BCMNV)	ознака не визначалась	0
51	Стійкість до кутастої бактеріальної плямистості (<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>phaseolicola</i>): Paca 6	ознака не визначалась	0

52	Стійкість до звичайної плямистості квасолі (<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>phaseoli</i>), ізолят 422	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожайність зерна (за стандартом вологості 14 %) 70 т./га. Тривалість вегетації рослин 70 діб. Маса 100 бобів 120 г. Вміст сирого протеїну 75 %.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Степ, Лісостеп, Полісся

Вид: Кукурудза цукрова Zea mays L. ssp. saccharata Sturt.

Заявка №: 10032005 Назва сорту GCC 1477 F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

04.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140058

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3
6	Листок: положення пластинки у просторі	помірно похиле	5
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	великий	7
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	сильно похиле	7
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	відсутнє або дуже слабке	1
18	Волоть: щільність розташування колосків	нещільне	3
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	довга	7
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	середня	5
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5
28	Качан: за довжиною	середній	5
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	одне	1
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	темний	7
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	довга	7
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	середня	5
36	Качан: тип зернівки	цукровий	6
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	сильна	5
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовто-оранжевий	4
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	ознака не визначається	0
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна врожайність 180 т./га.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Степ, Лісостеп, Полісся

Вид: Кукурудза цукрова Zea mays L. ssp. saccharata Sturt.

Заявка №: 10032011 **Назва сорту** МС 12

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 27.12.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

13.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140291

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	помірно похиле	5
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	від дуже раннього до раннього	2
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	помірно похиле	5
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	відсутнє або дуже слабке	1
18	Волоть: щільність розташування колосків	щільне	7
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	довга	7
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	короткий	3
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	одне	1
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	помірний	5
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	довга	7
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	середня	5
36	Качан: тип зернівки	цукровий	6
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	сильна	5
38	Качан: колір верхівок зернівок	оранжевий	5
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	ознака не визначається	0
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1

За інформацією наданою заявником:

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Степ, Лісостеп, Полісся

Вид: Кукурудза цукрова Zea mays L. ssp. saccharata Sturt.

Заявка №: 10032012 Назва сорту МС 401

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 27.12.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

13.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140292

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
8	Волоть: час цвітіння	дуже ранній	1
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	середня кількість	5
15	Качан: час появи шовку	ранній	3
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	відсутнє або дуже слабке	1
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	довга	7
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	середня	5
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5
28	Качан: за довжиною	короткий	3
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	одне	1
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	темний	7
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	середня	5
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	середня	5
36	Качан: тип зернівки	цукровий	6
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	сильна	5
38	Качан: колір верхівок зернівок	коричнюватий	9
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	ознака не визначається	0
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1

За інформацією наданою заявником:

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Степ, Лісостеп, Полісся

Вид: Кукурудза цукрова Zea mays L. ssp. saccharata Sturt.

Заявка №: 10032001 **Назва сорту** Світстар F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

04.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140055

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
8	Волоть: час цвітіння	від дуже раннього до раннього	2
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	помірно похиле	5
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	середній	5
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	відсутнє або дуже слабке	1
18	Волоть: щільність розташування колосків	щільне	7
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	довга	7
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	короткий	3
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	одне	1
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	темний	7
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	коротка	3
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	середня	5
36	Качан: тип зернівки	цукровий	6
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	помірна	3
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовтий	3
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	ознака не визначається	0
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна урожайність 180 т./га.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Степ, Лісостеп, Полісся

Вид: Кукурудза цукрова Zea mays L. ssp. saccharata Sturt.

Заявка №: 10032013 Назва сорту Соло F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 27.12.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

13.03.2014

Свідчення про державну реєстрацію № 140293

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	помірно похиле	5
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
8	Волоть: час цвітіння	від дуже раннього до раннього	2
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	середня кількість	5
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
18	Волоть: щільність розташування колосків	щільне	7
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	довга	7
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	короткий	3
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	одне	1
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	темний	7
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	коротка	3
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	середня	5
36	Качан: тип зернівки	цукровий	6
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	помірна	3
38	Качан: колір верхівок зернівок	оранжевий	5
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	ознака не визначається	0
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1

За інформацією наданою заявником:

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Степ, Лісостеп, Полісся

Вид: Кукурудза цукрова Zea mays L. ssp. saccharata Sturt.

Заявка №: 10032003 **Назва сорту** Старшайн F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

04.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140056

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
8	Волоть: час цвітіння	дуже ранній	1
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	ранній	3
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	відсутнє або дуже слабке	1
18	Волоть: щільність розташування колосків	щільне	7
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	довга	7
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	короткий	3
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	одне	1
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	помірний	5
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	середня	5
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	середня	5
36	Качан: тип зернівки	цукровий	6
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	помірна	3
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовто-оранжевий	4
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	ознака не визначається	0
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна врожайність 205 т./га.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Степ, Лісостеп, Полісся

Вид: Кукурудза цукрова Zea mays L. ssp. saccharata Sturt.

Заявка №: 10032004 Назва сорту Шайнрок F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

04.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140057

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	помірно похиле	5
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
8	Волоть: час цвітіння	середній	5
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	помірно похиле	5
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	відсутнє або дуже слабке	1
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	довга	7
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	середня	5
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	короткий	3
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	одне	1
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	помірний	5
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	середня	5
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	середня	5
36	Качан: тип зернівки	цукровий	6
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	слабка	1
38	Качан: колір верхівок зернівок	оранжевий	5
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	ознака не визначається	0
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна врожайність 185 т./га.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Степ, Лісостеп, Полісся

Вид: Морква *Daucus carota* L.

Заявка №: 09034010

Назва сорту Карболі

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

24.02.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140060

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Листки: ширина розетки	вузька	3
2	Листок: за положенням у просторі	горизонтальний	5
3	Листок: за довжиною (разом із черешком)	короткий	3
4	Листок: розсіченість	тонка	3
5	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	світле	3
6	Листок: антоціанове забарвлення черешка	відсутнє	1
7	Коренеплід: за довжиною	дуже довгий	9
8	Коренеплід: за шириною	середній	5
9	Коренеплід: відношення довжина/ширина	мале	3
10	Коренеплід: форма у поздовжньому розрізі	вузькотрикутна	4
11	Сорти оцінені в проміжку 4 і 6 для ознаки 10: Коренеплід: тенденція до конічної форми	ознака не визначалась	0
12	Коренеплід: форма плеча	округла	3
13	Коренеплід: форма кінчика (повністю сформований)	сильно загострена	3
14	Коренеплід: колір поверхні	оранжевий	3
15	За винятком сортів з білим зовнішнім забарвленням коренеплоду. Коренеплід: інтенсивність забарвлення поверхні	сильна	7
16	Коренеплід: антоціанове забарвлення поверхні плеча	наявне	9
17	Коренеплід: розмір зеленого забарвлення поверхні плеча	відсутній або дуже малий	1
18	Коренеплід: наявність борозенок на поверхні	слабко виражені	3
19	Коренеплід: діаметр серцевини відносно загального діаметра	середній	5
20	Коренеплід: забарвлення серцевини	оранжеве	3
21	За винятком сортів з білою серцевиною. Коренеплід: інтенсивність забарвлення серцевини	сильне	7
22	Коренеплід: забарвлення шкірки	оранжеве	3
23	За винятком сортів з білою шкіркою. Коренеплід: інтенсивність забарвлення шкірки	помірне	5
24	Коренеплід: забарвлення серцевини порівняно із забарвленням шкірки	темніша	3
25	Коренеплід: зелене забарвлення внутрішньої частини верхівки (у повздовжньому розрізі)	відсутнє або дуже слабке	1
26	Коренеплід: надземна частина	відсутня або дуже мала	1
27	Тільки сорти з тупими верхівками. Коренеплід: час розвитку заокругленої верхівки	ознака не визначається	0
28	Коренеплід: час забарвлення верхівки	середній	5
29	Рослина: тенденція до стрілкування	ознака не визначалась	0
30	Рослина: висота першого зонтика під час його цвітіння	ознака не визначалась	0
31	Рослина: частка рослин з чоловічою стерильністю	ознака не визначалась	0
32	Рослина: тип чоловічої стерильності	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Тривалість періоду до досягання 128 діб. Вміст сухої речовини 11,6 %. Вміст загального цукру 6,66%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Степ, Лісостеп, Полісся

Вид: Морква *Daucus carota* L.

Заявка №: 09034009 **Назва сорту** Карведжо

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

24.02.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140059

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Листки: ширина розетки	вузька	3
2	Листок: за положенням у просторі	горизонтальний	5
3	Листок: за довжиною (разом із черешком)	короткий	3
4	Листок: розсіченість	тонка	3
5	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
6	Листок: антоціанове забарвлення черешка	відсутнє	1
7	Коренеплід: за довжиною	дуже довгий	9
8	Коренеплід: за шириною	середній	5
9	Коренеплід: відношення довжина/ширина	мале	3
10	Коренеплід: форма у поздовжньому розрізі	вузькотрикутна	4
11	Сорти оцінені в проміжку 4 і 6 для ознаки 10: Коренеплід: тенденція до конічної форми	ознака не визначалась	0
12	Коренеплід: форма плеча	округла	3
13	Коренеплід: форма кінчика (повністю сформований)	тупа	1
14	Коренеплід: колір поверхні	оранжевий	3
15	За винятком сортів з білим зовнішнім забарвленням коренеплоду. Коренеплід: інтенсивність забарвлення поверхні	сильна	7
16	Коренеплід: антоціанове забарвлення поверхні плеча	відсутнє	1
17	Коренеплід: розмір зеленого забарвлення поверхні плеча	малий	3
18	Коренеплід: наявність борозенок на поверхні	слабко виражені	3
19	Коренеплід: діаметр серцевини відносно загального діаметра	великий	7
20	Коренеплід: забарвлення серцевини	оранжеве	3
21	За винятком сортів з білою серцевиною. Коренеплід: інтенсивність забарвлення серцевини	сильне	7
22	Коренеплід: забарвлення шкірки	оранжеве	3
23	За винятком сортів з білою шкіркою. Коренеплід: інтенсивність забарвлення шкірки	сильне	7
24	Коренеплід: забарвлення серцевини порівняно із забарвленням шкірки	темніша	3
25	Коренеплід: зелене забарвлення внутрішньої частини верхівки (у повздовжньому розрізі)	слабке	3
26	Коренеплід: надземна частина	мала	3
27	Тільки сорти з тупими верхівками. Коренеплід: час розвитку заокругленої верхівки	ознака не визначається	0
28	Коренеплід: час забарвлення верхівки	середній	5
29	Рослина: тенденція до стрілкування	ознака не визначалась	0
30	Рослина: висота першого зонтика під час його цвітіння	ознака не визначалась	0
31	Рослина: частка рослин з чоловічою стерильністю	ознака не визначалась	0
32	Рослина: тип чоловічої стерильності	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Тривалість періоду до досягання 125 діб. Вміст сухої речовини 11,1 %. Вміст загального цукру 6,07%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Степ, Лісостеп, Полісся

Вид: Морква *Daucus carota* L.

Заявка №: 10034002 **Назва сорту** Кардіф F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

05.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140207

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Листки: ширина розетки	середня	5
2	Листок: за положенням у просторі	горизонтальний	5
3	Листок: за довжиною (разом із черешком)	довгий	7
4	Листок: розсіченість	тонка	3
5	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
6	Листок: антоціанове забарвлення черешка	відсутнє	1
7	Коренеплід: за довжиною	середній	5
8	Коренеплід: за шириною	широкий	7
9	Коренеплід: відношення довжина/ширина	велике	7
10	Коренеплід: форма у поздовжньому розрізі	майже трикутна	3
11	Сорти оцінені в проміжку 4 і 6 для ознаки 10: Коренеплід: тенденція до конічної форми	ознака не визначалась	0
12	Коренеплід: форма плеча	округла	3
13	Коренеплід: форма кінчика (повністю сформований)	ледь загострена	2
14	Коренеплід: колір поверхні	оранжевий	3
15	За винятком сортів з білим зовнішнім забарвленням коренеплоду. Коренеплід: інтенсивність забарвлення поверхні	помірна	5
16	Коренеплід: антоціанове забарвлення поверхні плеча	наявне	9
17	Коренеплід: розмір зеленого забарвлення поверхні плеча	малий	3
18	Коренеплід: наявність борозенок на поверхні	помірно виражені	5
19	Коренеплід: діаметр серцевини відносно загального діаметра	дуже великий	9
20	Коренеплід: забарвлення серцевини	оранжеве	3
21	За винятком сортів з білою серцевиною. Коренеплід: інтенсивність забарвлення серцевини	сильне	7
22	Коренеплід: забарвлення шкірки	оранжеве	3
23	За винятком сортів з білою шкіркою. Коренеплід: інтенсивність забарвлення шкірки	помірне	5
24	Коренеплід: забарвлення серцевини порівняно із забарвленням шкірки	темніша	3
25	Коренеплід: зелене забарвлення внутрішньої частини верхівки (у повздовжньому розрізі)	відсутнє або дуже слабке	1
26	Коренеплід: надземна частина	мала	3
27	Тільки сорти з тупими верхівками. Коренеплід: час розвитку заокругленої верхівки	ознака не визначається	0
28	Коренеплід: час забарвлення верхівки	середній	5
29	Рослина: тенденція до стрілкування	середня	5
30	Рослина: висота першого зонтика під час його цвітіння	середній	5
31	Рослина: частка рослин з чоловічою стерильністю	ознака не визначалась	0
32	Рослина: тип чоловічої стерильності	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Тривалість періоду до досягання 131 діб. Вміст сухої речовини 7,7 %. Вміст загального цукру 5.0%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Степ, Лісостеп, Полісся

Вид: Морква *Daucus carota* L.

Заявка №: 10034001 Назва сорту Кордоба F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 30.11.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

05.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140206

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Листки: ширина розетки	широка	7
2	Листок: за положенням у просторі	горизонтальний	5
3	Листок: за довжиною (разом із черешком)	довгий	7
4	Листок: розсіченість	помірна	5
5	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
6	Листок: антоціанове забарвлення черешка	відсутнє	1
7	Коренеплід: за довжиною	середній	5
8	Коренеплід: за шириною	широкий	7
9	Коренеплід: відношення довжина/ширина	середнє	5
10	Коренеплід: форма у поздовжньому розрізі	майже трикутна	3
11	Сорти оцінені в проміжку 4 і 6 для ознаки 10: Коренеплід: тенденція до конічної форми	ознака не визначалась	0
12	Коренеплід: форма плеча	плеската	1
13	Коренеплід: форма кінчика (повністю сформований)	сильно загострена	3
14	Коренеплід: колір поверхні	оранжевий	3
15	За винятком сортів з білим зовнішнім забарвленням коренеплоду. Коренеплід: інтенсивність забарвлення поверхні	помірна	5
16	Коренеплід: антоціанове забарвлення поверхні плеча	відсутнє	1
17	Коренеплід: розмір зеленого забарвлення поверхні плеча	малий	3
18	Коренеплід: наявність борозенок на поверхні	помірно виражені	5
19	Коренеплід: діаметр серцевини відносно загального діаметра	великий	7
20	Коренеплід: забарвлення серцевини	оранжеве	3
21	За винятком сортів з білою серцевиною. Коренеплід: інтенсивність забарвлення серцевини	помірне	5
22	Коренеплід: забарвлення шкірки	оранжеве	3
23	За винятком сортів з білою шкіркою. Коренеплід: інтенсивність забарвлення шкірки	помірне	5
24	Коренеплід: забарвлення серцевини порівняно із забарвленням шкірки	однакова	2
25	Коренеплід: зелене забарвлення внутрішньої частини верхівки (у повздовжньому розрізі)	слабке	3
26	Коренеплід: надземна частина	мала	3
27	Тільки сорти з тупими верхівками. Коренеплід: час розвитку заокругленої верхівки	ознака не визначається	0
28	Коренеплід: час забарвлення верхівки	ранній	3
29	Рослина: тенденція до стрілкування	слабка	3
30	Рослина: висота першого зонтика під час його цвітіння	ознака не визначалась	0
31	Рослина: частка рослин з чоловічою стерильністю	ознака не визначалась	0
32	Рослина: тип чоловічої стерильності	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Тривалість періоду до досягання 120 діб. Вміст сухої речовини 8,0 %

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Степ, Лісостеп, Полісся

Вид: Морква *Daucus carota* L.

Заявка №: 11034002 Назва сорту Люсія F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 18.04.2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

17.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140347

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Листки: ширина розетки	середня	5
2	Листок: за положенням у просторі	напівпрямий	3
3	Листок: за довжиною (разом із черешком)	середній	5
4	Листок: розсіченість	тонка	3
5	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
6	Листок: антоціанове забарвлення черешка	відсутнє	1
7	Коренеплід: за довжиною	довгий	7
8	Коренеплід: за шириною	середній	5
9	Коренеплід: відношення довжина/ширина	середнє	5
10	Коренеплід: форма у поздовжньому розрізі	округла	1
11	Сорти оцінені в проміжку 4 і 6 для ознаки 10: Коренеплід: тенденція до конічної форми	ознака не визначалась	0
12	Коренеплід: форма плеча	плескато-округла	2
13	Коренеплід: форма кінчика (повністю сформований)	ледь загострена	2
14	Коренеплід: колір поверхні	оранжевий	3
15	За винятком сортів з білим зовнішнім забарвленням коренеплоду. Коренеплід: інтенсивність забарвлення поверхні	сильна	7
16	Коренеплід: антоціанове забарвлення поверхні плеча	відсутнє	1
17	Коренеплід: розмір зеленого забарвлення поверхні плеча	відсутній або дуже малий	1
18	Коренеплід: наявність борозенок на поверхні	відсутні або слабо виражені	1
19	Коренеплід: діаметр серцевини відносно загального діаметра	малий	3
20	Коренеплід: забарвлення серцевини	оранжеве	3
21	За винятком сортів з білою серцевиною. Коренеплід: інтенсивність забарвлення серцевини	сильне	7
22	Коренеплід: забарвлення шкірки	оранжеве	3
23	За винятком сортів з білою шкіркою. Коренеплід: інтенсивність забарвлення шкірки	сильне	7
24	Коренеплід: забарвлення серцевини порівняно із забарвленням шкірки	світліша	1
25	Коренеплід: зелене забарвлення внутрішньої частини верхівки (у поздовжньому розрізі)	відсутнє або дуже слабке	1
26	Коренеплід: надземна частина	мала	3
27	Тільки сорти з тупими верхівками. Коренеплід: час розвитку заокругленої верхівки	ознака не визначається	0
28	Коренеплід: час забарвлення верхівки	середній	5
29	Рослина: тенденція до стрілкування	слабка	3
30	Рослина: висота першого зонтика під час його цвітіння	середній	5
31	Рослина: частка рослин з чоловічою стерильністю	відсутні або дуже мало	1
32	Рослина: тип чоловічої стерильності	коричневі пиляки	1

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Тривалість вегетації 85 діб. Ураженість хворобами: гниллю сухою 3%, альтернаріозом 3%, гниллю білою 3%, гниллю бактеріальною мокрою 3%. Вміст сухої речовини 9%, загального цукру 8%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Закритий ґрунт

Вид: Морква *Daucus carota* L.

Заявка №: 11034014 **Назва сорту** Ньюкасл F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

05.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140208

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Листки: ширина розетки	середня	5
2	Листок: за положенням у просторі	горизонтальний	5
3	Листок: за довжиною (разом із черешком)	середній	5
4	Листок: розсіченість	помірна	5
5	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
6	Листок: антоціанове забарвлення черешка	відсутнє	1
7	Коренеплід: за довжиною	середній	5
8	Коренеплід: за шириною	середній	5
9	Коренеплід: відношення довжина/ширина	середнє	5
10	Коренеплід: форма у поздовжньому розрізі	вузькотрикутна	4
11	Сорти оцінені в проміжку 4 і 6 для ознаки 10: Коренеплід: тенденція до конічної форми	сильна	7
12	Коренеплід: форма плеча	плеската	1
13	Коренеплід: форма кінчика (повністю сформований)	сильно загострена	3
14	Коренеплід: колір поверхні	оранжевий	3
15	За винятком сортів з білим зовнішнім забарвленням коренеплоду. Коренеплід: інтенсивність забарвлення поверхні	помірна	5
16	Коренеплід: антоціанове забарвлення поверхні плеча	наявне	9
17	Коренеплід: розмір зеленого забарвлення поверхні плеча	відсутній або дуже малий	1
18	Коренеплід: наявність борозенок на поверхні	слабко виражені	3
19	Коренеплід: діаметр серцевини відносно загального діаметра	середній	5
20	Коренеплід: забарвлення серцевини	оранжеве	3
21	За винятком сортів з білою серцевиною. Коренеплід: інтенсивність забарвлення серцевини	помірне	5
22	Коренеплід: забарвлення шкірки	оранжеве	3
23	За винятком сортів з білою шкіркою. Коренеплід: інтенсивність забарвлення шкірки	помірне	5
24	Коренеплід: забарвлення серцевини порівняно із забарвленням шкірки	темніша	3
25	Коренеплід: зелене забарвлення внутрішньої частини верхівки (у повздовжньому розрізі)	слабке	3
26	Коренеплід: надземна частина	мала	3
27	Тільки сорти з тупими верхівками. Коренеплід: час розвитку заокругленої верхівки	ознака не визначається	0
28	Коренеплід: час забарвлення верхівки	ознака не визначалась	0
29	Рослина: тенденція до стрілкування	ознака не визначалась	0
30	Рослина: висота першого зонтика під час його цвітіння	ознака не визначалась	0
31	Рослина: частка рослин з чоловічою стерильністю	ознака не визначалась	0
32	Рослина: тип чоловічої стерильності	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Тривалість періоду до досягання 110 діб. Вміст сухої речовини 17,6 %

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Степ, Лісостеп, Полісся

Вид: Морква *Daucus carota* L.

Заявка №: 09034012 **Назва сорту** Санта Круз F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

24.02.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140061

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Листки: ширина розетки	середня	5
2	Листок: за положенням у просторі	горизонтальний	5
3	Листок: за довжиною (разом із черешком)	середній	5
4	Листок: розсіченість	помірна	5
5	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
6	Листок: антоціанове забарвлення черешка	відсутнє	1
7	Коренеплід: за довжиною	довгий	7
8	Коренеплід: за шириною	середній	5
9	Коренеплід: відношення довжина/ширина	середнє	5
10	Коренеплід: форма у поздовжньому розрізі	майже трикутна	3
11	Сорти оцінені в проміжку 4 і 6 для ознаки 10: Коренеплід: тенденція до конічної форми	ознака не визначалась	0
12	Коренеплід: форма плеча	округла	3
13	Коренеплід: форма кінчика (повністю сформований)	сильно загострена	3
14	Коренеплід: колір поверхні	оранжевий	3
15	За винятком сортів з білим зовнішнім забарвленням коренеплоду. Коренеплід: інтенсивність забарвлення поверхні	сильна	7
16	Коренеплід: антоціанове забарвлення поверхні плеча	наявне	9
17	Коренеплід: розмір зеленого забарвлення поверхні плеча	відсутній або дуже малий	1
18	Коренеплід: наявність борозенок на поверхні	відсутні або слабо виражені	1
19	Коренеплід: діаметр серцевини відносно загального діаметра	великий	7
20	Коренеплід: забарвлення серцевини	оранжеве	3
21	За винятком сортів з білою серцевиною. Коренеплід: інтенсивність забарвлення серцевини	сильне	7
22	Коренеплід: забарвлення шкірки	оранжеве	3
23	За винятком сортів з білою шкіркою. Коренеплід: інтенсивність забарвлення шкірки	помірне	5
24	Коренеплід: забарвлення серцевини порівняно із забарвленням шкірки	темніша	3
25	Коренеплід: зелене забарвлення внутрішньої частини верхівки (у повздовжньому розрізі)	слабке	3
26	Коренеплід: надземна частина	мала	3
27	Тільки сорти з тупими верхівками. Коренеплід: час розвитку заокругленої верхівки	ознака не визначається	0
28	Коренеплід: час забарвлення верхівки	ознака не визначалась	0
29	Рослина: тенденція до стрілкування	ознака не визначалась	0
30	Рослина: висота першого зонтика під час його цвітіння	ознака не визначалась	0
31	Рослина: частка рослин з чоловічою стерильністю	ознака не визначалась	0
32	Рослина: тип чоловічої стерильності	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Тривалість періоду до досягання 110 діб. Вміст сухої речовини 12,1 %. Вміст загального цукру 7,17%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Степ, Лісостеп, Полісся

Вид: Огірок посівний *Cucumis sativus* L.

Заявка №: 13110004 **Назва сорту** Дерія

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

07.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140211

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Сім'ядолі: гіркота	відсутня	1
2	Рослина: тип росту	індетермінантний	2
3	Рослина: загальна довжина перших 15 міжвузлів	короткі	3
4	Листкова пластинка: положення у просторі	висхідне	1
5	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5
6	Листкова пластинка: відношення довжина верхньої лопаті / довжина пластинки	помірне	5
7	Листкова пластинка: форма верхівки верхньої лопаті	прямокутна	2
8	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	темне	7
9	Листкова пластинка: пухирчатість	помірна	5
10	Листок: хвилястість країв	помірна	2
11	Листкова пластинка: зубчастість країв	помірна	5
12	Час розвитку жіночих квіток (80% рослин з щонайменше однією жіночою квіткою)	середній	5
13	Рослина: виявлення статі	гіномоноєційність	3
14	Рослина: кількість жіночих квіток на вузлі	переважно 2	3
15	Зав'язь: забарвлення зовнішнього покриву	біле	1
16	Партенокарпія	наявна	9
17	Плід: за довжиною	короткий	3
18	Плід: діаметр	малий	3
19	Плід: відношення довжина/діаметр	мале	3
20	Плід: відношення діаметра насінної камери до діаметра плоду	велике	7
21	Плід: форма поперечного перерізу	від округлої до кутастої	2
22	Плід: форма основи плоду	тупа	3
23	Лише для сортів із шийкою. Плід: довжина шийки	ознака не визначається	0
24	Плід: форма верхівки	тупа	2
25	Плід: основне забарвлення шкірки у фазі технічної стиглості	зелене	3
26	За винятком білих сортів: Плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (як для 25)	помірне	5
27	Плід: ребристість	відсутня або слабка	1
28	Плід: шви	наявні	9
29	Плід: зморшкуватість	відсутня	1
30	Плід: зморшкуватості	ознака не визначається	0
31	Плід: тип покриву	лише шипики	3
32	Плід: щільність покриву	помірний	5
33	Лише сорти з білою зав'яззю (ozn. 15): Плід: забарвлення зав'язі	біле	1
34	Плід: горбочки	наявні	9
35	Плід: розмір горбочків	малі	3
36	Плід: довжина смужок	відсутні або дуже короткі	1
37	Плід: плямистість	відсутня	1
38	Плід: характер поширення плям	ознака не визначалась	0
39	Плід: довжина плям відносно довжини плоду	ознака не визначалась	0
40	Плід: щільність плям	ознака не визначалась	0
41	Плід: наліт	слабкий	3
42	Плід: довжина плодоніжки	коротка	3
43	Плід: основний колір шкірки у фазі фізіологічної стиглості	жовтий	2
44	Стійкість до 1) <i>Cladosporium cucumerinum</i>	наявна	9
45	Стійкість до звичайної мозаїки огірка (<i>Cucumis Mosaic Virus</i> (CMV))	помірно стійкий	2
46	Стійкість до борошнистої роси (<i>Podosphaera xanthii</i>)	високо стійкий	3
47	Стійкість до несправжньої борошнистої роси (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	сприйнятливий	1
48	Стійкість до бурої плямистості (<i>Corynespora melonis</i>)	відсутня	1
49	Стійкість до вірусу пожовтіння судин огірка (CVYV)	наявна	9
50	Стійкість до вірусу жовтої мозаїки кабачка (ZYMV)	відсутня	1

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна урожайність 32 т./га. Тривалість періоду від повних сходів до початку споживчої стиглості 66 діб. Період плодоношення 205 діб. Вміст сухої речовини в плоді 4,1 %.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Закритий ґрунт

Вид: Огірок посівний *Cucumis sativus* L.

Заявка №: 12035007 **Назва сорту** ЕПСІЛОН

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

03.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140063

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Сім'ядолі: гіркота	наявна	9
2	Рослина: тип росту	індетермінантний	2
3	Рослина: загальна довжина перших 15 міжвузлів	середні	5
4	Листкова пластинка: положення у просторі	висхідне	1
5	Листкова пластинка: за довжиною	довга	7
6	Листкова пластинка: відношення довжина верхньої лопаті / довжина пластинки	мале	3
7	Листкова пластинка: форма верхівки верхньої лопаті	прямокутна	2
8	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	світле	3
9	Листкова пластинка: пухирчатість	помірна	5
10	Листок: хвилястість країв	відсутня або слабка	1
11	Листкова пластинка: зубчастість країв	дуже слабка	1
12	Час розвитку жіночих квіток (80% рослин з щонайменше однією жіночою квіткою)	пізній	7
13	Рослина: виявлення статі	гіномоноєційність	3
14	Рослина: кількість жіночих квіток на вузлі	переважно 1	1
15	Зав'язь: забарвлення зовнішнього покриву	біле	1
16	Партенокарпія	наявна	9
17	Плід: за довжиною	середній	5
18	Плід: діаметр	середній	5
19	Плід: відношення довжина/діаметр	середнє	5
20	Плід: відношення діаметра насінної камери до діаметра плоду	середнє	5
21	Плід: форма поперечного перерізу	кустаста	3
22	Плід: форма основи плоду	гостра	2
23	Лише для сортів із шийкою. Плід: довжина шийки	ознака не визначається	0
24	Плід: форма верхівки	гостра	1
25	Плід: основне забарвлення шкірки у фазі технічної стиглості	зелене	3
26	За винятком білих сортів: Плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (як для 25)	темне	7
27	Плід: ребристість	помірна	2
28	Плід: шви	наявні	9
29	Плід: зморшкуватість	наявна	9
30	Плід: зморшкуватості	слабка	3
31	Плід: тип покриву	лише шипики	3
32	Плід: щільність покриву	помірний	5
33	Лише сорти з білою зав'яззю (ozn. 15): Плід: забарвлення зав'язі	біле	1
34	Плід: горбочки	наявні	9
35	Плід: розмір горбочків	середні	5
36	Плід: довжина смужок	короткі	3
37	Плід: плямистість	відсутня	1
38	Плід: характер поширення плям	ознака не визначалась	0
39	Плід: довжина плям відносно довжини плоду	ознака не визначалась	0
40	Плід: щільність плям	ознака не визначалась	0
41	Плід: наліт	слабкий	3
42	Плід: довжина плодоніжки	коротка	3
43	Плід: основний колір шкірки у фазі фізіологічної стиглості	зелений	3
44	Стійкість до 1) <i>Cladosporium cucumerinum</i>	ознака не визначалась	0
45	Стійкість до звичайної мозаїки огірка (<i>Cucumis Mosaic Virus</i> (CMV))	ознака не визначалась	0
46	Стійкість до борошнистої роси (<i>Podosphaera xanthii</i>)	ознака не визначалась	0
47	Стійкість до несправжньої борошнистої роси (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	ознака не визначалась	0
48	Стійкість до бурої плямистості (<i>Corynespora melonis</i>)	ознака не визначалась	0
49	Стійкість до вірусу пожовтіння судин огірка (CVYV)	ознака не визначалась	0
50	Стійкість до вірусу жовтої мозаїки кабачка (ZYMV)	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна урожайність 120 т./га. Тривалість періоду від повних сходів до початку споживчої стиглості 16 діб. Період плодоношення 90 діб. Вміст сухої речовини в плоді 5 %.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
Закритий ґрунт

Вид: Огірок посівний *Cucumis sativus* L.

Заявка №: 09035012 **Назва сорту** Магдалена F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

24.02.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140062

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Сім'ядолі: гіркота	відсутня	1
2	Рослина: тип росту	індетермінантний	2
3	Рослина: загальна довжина перших 15 міжвузлів	середні	5
4	Листкова пластинка: положення у просторі	висхідне	1
5	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5
6	Листкова пластинка: відношення довжина верхньої лопаті / довжина пластинки	помірне	5
7	Листкова пластинка: форма верхівки верхньої лопаті	прямокутна	2
8	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	світле	3
9	Листкова пластинка: пухирчатість	помірна	5
10	Листок: хвилястість країв	помірна	2
11	Листкова пластинка: зубчастість країв	слабка	3
12	Час розвитку жіночих квіток (80% рослин з щонайменше однією жіночою квіткою)	ранній	3
13	Рослина: виявлення статі	гіномоноєційність	3
14	Рослина: кількість жіночих квіток на вузлі	переважно 1	1
15	Зав'язь: забарвлення зовнішнього покриву	біле	1
16	Партенокарпія	наявна	9
17	Плід: за довжиною	короткий	3
18	Плід: діаметр	середній	5
19	Плід: відношення довжина/діаметр	мале	3
20	Плід: відношення діаметра насінної камери до діаметра плоду	середнє	5
21	Плід: форма поперечного перерізу	кугаста	3
22	Плід: форма основи плоду	тупа	3
23	Лише для сортів із шийкою. Плід: довжина шийки	ознака не визначається	0
24	Плід: форма верхівки	округла	3
25	Плід: основне забарвлення шкірки у фазі технічної стиглості	зелене	3
26	За винятком білих сортів: Плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (як для 25)	помірне	5
27	Плід: ребристість	помірна	2
28	Плід: шви	наявні	9
29	Плід: зморшкуватість	наявна	9
30	Плід: зморшкуватості	помірна	5
31	Плід: тип покриву	лише шипики	3
32	Плід: щільність покриву	нещільний	3
33	Лише сорти з білою зав'яззю (ozn. 15): Плід: забарвлення зав'язі	біле	1
34	Плід: горбочки	наявні	9
35	Плід: розмір горбочків	малі	3
36	Плід: довжина смужок	середні	5
37	Плід: плямистість	наявна	9
38	Плід: характер поширення плям	переважно смугами	2
39	Плід: довжина плям відносно довжини плоду	виключаючи місце навколо плодоніжки	4
40	Плід: щільність плям	нещільно	3
41	Плід: наліт	відсутній або дуже слабкий	1
42	Плід: довжина плодоніжки	середня	5
43	Плід: основний колір шкірки у фазі фізіологічної стиглості	жовтий	2
44	Стійкість до 1) <i>Cladosporium cucumerinum</i>	ознака не визначалась	0
45	Стійкість до звичайної мозаїки огірка (<i>Cucumis Mosaic Virus (CMV)</i>)	ознака не визначалась	0
46	Стійкість до борошнистої роси (<i>Podosphaera xanthii</i>)	ознака не визначалась	0
47	Стійкість до несправжньої борошнистої роси (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	ознака не визначалась	0
48	Стійкість до бурої плямистості (<i>Corynespora melonis</i>)	ознака не визначалась	0
49	Стійкість до вірусу пожовтіння судин огірка (<i>CVYV</i>)	ознака не визначалась	0
50	Стійкість до вірусу жовтої мозаїки кабачка (<i>ZYMV</i>)	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність 78 т/га. Тривалість періоду від повних сходів до першого збирання 52 діб. Тривалість періоду плодоношення 90 діб. Вміст сухої речовини в плодах 6,0%

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
Степ, Лісостеп, Полісся

Вид: Огірок посівний *Cucumis sativus* L.

Заявка №: 13110002 **Назва сорту** Седрік

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

07.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140209

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Сім'ядолі: гіркота	відсутня	1
2	Рослина: тип росту	індетермінантний	2
3	Рослина: загальна довжина перших 15 міжвузлів	довгі	7
4	Листкова пластинка: положення у просторі	горизонтальне	2
5	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5
6	Листкова пластинка: відношення довжина верхньої лопаті / довжина пластинки	мале	3
7	Листкова пластинка: форма верхівки верхньої лопаті	прямокутна	2
8	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
9	Листкова пластинка: пухирчатість	слабка	3
10	Листок: хвилястість країв	відсутня або слабка	1
11	Листкова пластинка: зубчастість країв	дуже слабка	1
12	Час розвитку жіночих квіток (80% рослин з щонайменше однією жіночою квіткою)	ранній	3
13	Рослина: виявлення статі	андромонециїсність	2
14	Рослина: кількість жіночих квіток на вузлі	переважно 2	3
15	Зав'язь: забарвлення зовнішнього покриву	біле	1
16	Партеокарпія	наявна	9
17	Плід: за довжиною	середній	5
18	Плід: діаметр	малий	3
19	Плід: відношення довжина/діаметр	велике	7
20	Плід: відношення діаметра насінної камери до діаметра плоду	середнє	5
21	Плід: форма поперечного перерізу	округла	1
22	Плід: форма основи плоду	тупа	3
23	Лише для сортів із шийкою. Плід: довжина шийки	ознака не визначається	0
24	Плід: форма верхівки	округла	3
25	Плід: основне забарвлення шкірки у фазі технічної стиглості	зелене	3
26	За винятком білих сортів: Плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (як для 25)	темне	7
27	Плід: ребристість	відсутня або слабка	1
28	Плід: шви	відсутні	1
29	Плід: зморшкуватість	відсутня	1
30	Плід: зморшкуватості	ознака не визначається	0
31	Плід: тип покриву	лише шипики	3
32	Плід: щільність покриву	помірний	5
33	Лише сорти з білою зав'яззю (ozn. 15): Плід: забарвлення зав'язі	біле	1
34	Плід: горбочки	наявні	9
35	Плід: розмір горбочків	малі	3
36	Плід: довжина смужок	відсутні або дуже короткі	1
37	Плід: плямистість	відсутня	1
38	Плід: характер поширення плям	ознака не визначалась	0
39	Плід: довжина плям відносно довжини плоду	ознака не визначалась	0
40	Плід: щільність плям	ознака не визначалась	0
41	Плід: наліт	відсутній або дуже слабкий	1
42	Плід: довжина плодоніжки	середня	5
43	Плід: основний колір шкірки у фазі фізіологічної стиглості	жовтий	2
44	Стійкість до 1) <i>Cladosporium cucumerinum</i>	наявна	9
45	Стійкість до звичайної мозаїки огірка (<i>Cucumis Mosaic Virus</i> (CMV))	високо стійкий	3
46	Стійкість до борошнистої роси (<i>Podosphaera xanthii</i>)	високо стійкий	3
47	Стійкість до несправжньої борошнистої роси (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	сприйнятливий	1
48	Стійкість до бурої плямистості (<i>Corynespora melonis</i>)	відсутня	1
49	Стійкість до вірусу пожовтіння судин огірка (CVYV)	наявна	9
50	Стійкість до вірусу жовтої мозаїки кабачка (ZYMV)	відсутня	1

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна урожайність 36 т./га. Тривалість періоду від повних сходів до початку споживчої стиглості 62 доби. Вміст сухої речовини в плоді 3,6 %.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
Закритий ґрунт

Вид: Огірок посівний *Cucumis sativus* L.

Заявка №: 13110003 **Назва сорту** Сігурд

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

07.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140210

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Сім'ядолі: гіркота	відсутня	1
2	Рослина: тип росту	індетермінантний	2
3	Рослина: загальна довжина перших 15 міжвузлів	короткі	3
4	Листкова пластинка: положення у просторі	горизонтальне	2
5	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5
6	Листкова пластинка: відношення довжина верхньої лопаті / довжина пластинки	помірне	5
7	Листкова пластинка: форма верхівки верхньої лопаті	тупа	3
8	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
9	Листкова пластинка: пухирчатість	слабка	3
10	Листок: хвилястість країв	відсутня або слабка	1
11	Листкова пластинка: зубчастість країв	дуже слабка	1
12	Час розвитку жіночих квіток (80% рослин з щонайменше однією жіночою квіткою)	середній	5
13	Рослина: виявлення статі	гіномоноєційність	3
14	Рослина: кількість жіночих квіток на вузлі	переважно 1	1
15	Зав'язь: забарвлення зовнішнього покриву	біле	1
16	Партенокарпія	наявна	9
17	Плід: за довжиною	короткий	3
18	Плід: діаметр	середній	5
19	Плід: відношення довжина/діаметр	середнє	5
20	Плід: відношення діаметра насінної камери до діаметра плоду	середнє	5
21	Плід: форма поперечного перерізу	від округлої до кутастої	2
22	Плід: форма основи плоду	гостра	2
23	Лише для сортів із шийкою. Плід: довжина шийки	ознака не визначається	0
24	Плід: форма верхівки	тупа	2
25	Плід: основне забарвлення шкірки у фазі технічної стиглості	зелене	3
26	За винятком білих сортів: Плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (як для 25)	помірне	5
27	Плід: ребристість	відсутня або слабка	1
28	Плід: шви	відсутні	1
29	Плід: зморшуватість	відсутня	1
30	Плід: зморшуватості	ознака не визначається	0
31	Плід: тип покриву	лише шипики	3
32	Плід: щільність покриву	щільний	7
33	Лише сорти з білою зав'яззю (ozn. 15): Плід: забарвлення зав'язі	біле	1
34	Плід: горбочки	наявні	9
35	Плід: розмір горбочків	середні	5
36	Плід: довжина смужок	середні	5
37	Плід: плямистість	наявна	9
38	Плід: характер поширення плям	рівномірно поширені	3
39	Плід: довжина плям відносно довжини плоду	виключаючи місце навколо плодоніжки	4
40	Плід: щільність плям	нешільно	3
41	Плід: наліт	відсутній або дуже слабкий	1
42	Плід: довжина плодоніжки	середня	5
43	Плід: основний колір шкірки у фазі фізіологічної стиглості	жовтий	2
44	Стійкість до 1) <i>Cladosporium cucumerinum</i>	наявна	9
45	Стійкість до звичайної мозаїки огірка (<i>Cucumis Mosaic Virus</i> (CMV))	помірно стійкий	2
46	Стійкість до борошнистої роси (<i>Podosphaera xanthii</i>)	помірно стійкий	2
47	Стійкість до несправжньої борошнистої роси (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	сприйнятливий	1
48	Стійкість до бурої плямистості (<i>Corynespora melonis</i>)	відсутня	1
49	Стійкість до вірусу пожовтіння судин огірка (CVYV)	наявна	9
50	Стійкість до вірусу жовтої мозаїки кабачка (ZYMV)	відсутня	1

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна урожайність 32 т./га. Тривалість періоду від повних сходів до початку споживчої стиглості 67 діб. Вміст сухої речовини в плоді 3,8 %.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
Закритий ґрунт

Вид: Огірок посівний *Cucumis sativus* L.

Заявка №: 13110005 **Назва сорту** Тумі

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

07.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140212

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Сім'ядолі: гіркота	відсутня	1
2	Рослина: тип росту	індетермінантний	2
3	Рослина: загальна довжина перших 15 міжвузлів	короткі	3
4	Листкова пластинка: положення у просторі	горизонтальне	2
5	Листкова пластинка: за довжиною	коротка	3
6	Листкова пластинка: відношення довжина верхньої лопаті / довжина пластинки	мале	3
7	Листкова пластинка: форма верхівки верхньої лопаті	прямокутна	2
8	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	темне	7
9	Листкова пластинка: пухирчатість	відсутня або дуже слабка	1
10	Листок: хвилястість країв	відсутня або слабка	1
11	Листкова пластинка: зубчастість країв	слабка	3
12	Час розвитку жіночих квіток (80% рослин з щонайменше однією жіночою квіткою)	середній	5
13	Рослина: виявлення статі	гіномоноєційність	3
14	Рослина: кількість жіночих квіток на вузлі	переважно 2	3
15	Зав'язь: забарвлення зовнішнього покриву	біле	1
16	Партенокарпія	наявна	9
17	Плід: за довжиною	короткий	3
18	Плід: діаметр	середній	5
19	Плід: відношення довжина/діаметр	середнє	5
20	Плід: відношення діаметра насінної камери до діаметра плоду	середнє	5
21	Плід: форма поперечного перерізу	округла	1
22	Плід: форма основи плоду	тупа	3
23	Лише для сортів із шийкою. Плід: довжина шийки	ознака не визначається	0
24	Плід: форма верхівки	округла	3
25	Плід: основне забарвлення шкірки у фазі технічної стиглості	зелене	3
26	За винятком білих сортів: Плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (як для 25)	темне	7
27	Плід: ребристість	відсутня або слабка	1
28	Плід: шви	відсутні	1
29	Плід: зморшкуватість	відсутня	1
30	Плід: зморшкуватості	ознака не визначається	0
31	Плід: тип покриву	лише шипики	3
32	Плід: щільність покриву	помірний	5
33	Лише сорти з білою зав'яззю (ozn. 15): Плід: забарвлення зав'язі	біле	1
34	Плід: горбочки	наявні	9
35	Плід: розмір горбочків	середні	5
36	Плід: довжина смужок	відсутні або дуже короткі	1
37	Плід: плямистість	відсутня	1
38	Плід: характер поширення плям	ознака не визначалась	0
39	Плід: довжина плям відносно довжини плоду	ознака не визначалась	0
40	Плід: щільність плям	ознака не визначалась	0
41	Плід: наліт	відсутній або дуже слабкий	1
42	Плід: довжина плодоніжки	середня	5
43	Плід: основний колір шкірки у фазі фізіологічної стиглості	жовтий	2
44	Стійкість до 1) <i>Cladosporium cucumerinum</i>	наявна	9
45	Стійкість до звичайної мозаїки огірка (<i>Cucumis Mosaic Virus</i> (CMV))	помірно стійкий	2
46	Стійкість до борошнистої роси (<i>Podosphaera xanthii</i>)	помірно стійкий	2
47	Стійкість до несправжньої борошнистої роси (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	сприйнятливий	1
48	Стійкість до бурої плямистості (<i>Corynespora melonis</i>)	відсутня	1
49	Стійкість до вірусу пожовтіння судин огірка (CVYV)	наявна	9
50	Стійкість до вірусу жовтої мозаїки кабачка (ZYMV)	відсутня	1

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна урожайність 34 т./га. Тривалість періоду від повних сходів до початку споживчої стиглості 61 доба. Період плодоношення 207 діб. Вміст сухої речовини в плоді 4,0 %.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
Закритий ґрунт

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.

Заявка №: 13115012 **Назва сорту** Афамія

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

07.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140221

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилія	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2
3	Тільки детермінантні сорти: Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	ознака не визначається	0
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	помірне	5
5	Тільки індетермінантні сорти: Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	середнє	5
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	горизонтальний	5
7	Листок: за довжиною	середній	5
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
12	Листок: глянуватість (як для 6)	помірна	5
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	помірна	5
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	середні	5
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	горизонтальне	5
16	Суцвіття: інтенсивність галуження (другої і третьої китиці)	в основному 1 гілка	1
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	наявна	9
18	Квітка: опушення приймочки	наявне	9
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки)	середня	5
22	Плід: за розміром	великий	7
23	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє	5
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	округла	3
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	слабка	3
26	Плід: форма поперечного перерізу	крутляста	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	помірне	5
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	середній	5
29	Плід: розмір квіткового рубця	маленький	3
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3
31	Плід: розмір плаценти у поперечному перерізі	середній	5
32	Плід: за товщиною перикарпу	товстий	7
33	Плід: кількість камер	чотири, п'ять або шість	4
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1
35	Плід: розмір зеленого плеча (як для 34)	ознака не визначається	0
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (як для 34)	ознака не визначається	0
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (як для 34)	ознака не визначалась	0
38	Плід: колір за досягання	червоний	5
39	Плід: колір м'якоті (як для 38)	червоний	5
40	Плід: за твердістю	твердий	7
41	Плід: строк лежкості	помірний	5
42	Час цвітіння	середній	5
43	Час досягання	середній	5
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	помірний	5
45	Наявність сріблястості	відсутня	1
46	Стійкість до <i>Meloidogyne incognita</i>	наявна	9
47	Стійкість до <i>Verticillium dahliae</i> : Paca 0	наявна	9
48,1	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>Lycopersici</i> : Paca 0	наявна	9
48,2	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>Lycopersici</i> : Paca 1	наявна	9
49	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>radicis lycopersici</i>	наявна	9
50,1	Стійкість до <i>Cladosporium fulvum</i> : Paca 0	відсутня	1
50,2	Стійкість до <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи А	відсутня	1

50,3	Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи В	відсутня	1
50,4	Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи С	відсутня	1
50,5	Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи D	відсутня	1
50,6	Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи Е	відсутня	1
51,1	Стійкість до Tomato Mosaic Virus: Патотипу 0	наявна	9
51,2	Стійкість до Mosaic Virus: Патотипу 1	наявна	9
51,3	Стійкість до Mosaic Virus: Патотипу 2	наявна	9
51,4	Стійкість до Mosaic Virus: Патотипу 1 - 2	наявна	9
52	Стійкість до Phytophthora infestans	відсутня	1
53	Стійкість до Pyrenochaeta lycopersici	відсутня	1
54	Стійкість до Stemphylium spp.	відсутня	1
55	Стійкість до Pseudomonas syringae pv. Tomato	відсутня	1
56	Стійкість до Ralstonia solanacearum	відсутня	1
57	Стійкість до Tomato Yellow Leaf Curl Virus	відсутня	1
58	Стійкість до Tomato Spotted Wilt Virus	наявна	9
59	Стійкість до Leveillula taurica	відсутня	1
60	Стійкість до Oidium lycopersicum	відсутня	1

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Маса товарного плоду 270 г. Період від повних сходів до початку дозрівання 102 діб. Період плодоношення 207 діб. Вміст сухої речовини в плоді 6%. Вміст загального цукру 14%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Закритий ґрунт

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.

Заявка №: 09040055 **Назва сорту** Велоз F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

24.02.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140069

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилія	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	детермінантний	1
3	Тільки детермінантні сорти: Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	середня кількість	5
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	помірне	5
5	Тільки індетермінантні сорти: Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	ознака не визначається	0
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	горизонтальний	5
7	Листок: за довжиною	середній	5
8	Листок: за шириною	широкий	7
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
12	Листок: глянуватість (як для 6)	слабка	3
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	помірна	5
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	малі	3
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	піднесене	3
16	Суцвіття: інтенсивність галуження (другої і третьої китиці)	середня кількість	2
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення приймочки	відсутнє або дуже слабке	1
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки)	середня	5
22	Плід: за розміром	великий	7
23	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє	5
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	оберненояцевидна	8
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	слабка	3
26	Плід: форма поперечного перерізу	кругlastа	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	милке	3
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	середній	5
29	Плід: розмір квіткового рубця	дуже маленький	1
30	Плід: форма кінця плоду	гостра	5
31	Плід: розмір плаценти у поперечному перерізі	середній	5
32	Плід: за товщиною перикарпу	середній	5
33	Плід: кількість камер	три-чотири	3
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1
35	Плід: розмір зеленого плеча (як для 34)	ознака не визначається	0
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (як для 34)	ознака не визначається	0
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (як для 34)	помірне	5
38	Плід: колір за досягання	червоний	5
39	Плід: колір м'якоті (як для 38)	червоний	5
40	Плід: за твердістю	твердий	7
41	Плід: строк лежкості	тривалий	7
42	Час цвітіння	середній	5
43	Час досягання	середній	5
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	низький	3
45	Наявність сріблястості	відсутня	1
46	Стійкість до <i>Meloidogyne incognita</i>	ознака не визначалась	0
47	Стійкість до <i>Verticillium dahliae</i> : Paca 0	ознака не визначалась	0
48,1	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>Lycopersici</i> : Paca 0	ознака не визначалась	0
48,2	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>Lycopersici</i> : Paca 1	ознака не визначалась	0
49	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>radicis lycopersici</i>	ознака не визначалась	0
50,1	Стійкість до <i>Cladosporium fulvum</i> : Paca 0	ознака не визначалась	0
50,2	Стійкість до <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи А	ознака не визначалась	0

50,3	Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи В	ознака не визначалась	0
50,4	Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи С	ознака не визначалась	0
50,5	Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи D	ознака не визначалась	0
50,6	Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи Е	ознака не визначалась	0
51,1	Стійкість до Tomato Mosaic Virus: Патотипу 0	ознака не визначалась	0
51,2	Стійкість до Mosaic Virus: Патотипу 1	ознака не визначалась	0
51,3	Стійкість до Mosaic Virus: Патотипу 2	ознака не визначалась	0
51,4	Стійкість до Mosaic Virus: Патотипу 1 - 2	ознака не визначалась	0
52	Стійкість до Phytophthora infestans	ознака не визначалась	0
53	Стійкість до Pyrenochaeta lycopersici	ознака не визначалась	0
54	Стійкість до Stemphylium spp.	ознака не визначалась	0
55	Стійкість до Pseudomonas syringae pv. Tomato	ознака не визначалась	0
56	Стійкість до Ralstonia solanacearum	ознака не визначалась	0
57	Стійкість до Tomato Yellow Leaf Curl Virus	ознака не визначалась	0
58	Стійкість до Tomato Spotted Wilt Virus	ознака не визначалась	0
59	Стійкість до Leveillula taurica	ознака не визначалась	0
60	Стійкість до Oidium lycopersicum	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна урожайність – 90 т/га; маса товарного плоду - 100 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 107 днів; період плодоношення -35 днів; вміст сухої речовини в плоді - 5,0%; вміст загального цукру – 3,0 %; вміст вітаміну С – 28,2 мг%; загальна кислотність – 0,6%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Степ, Лісостеп, Полісся

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.

Заявка №: 13115013 Назва сорту Дімероза

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

07.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140222

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилія	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2
3	Тільки детермінантні сорти: Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	ознака не визначається	0
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	відсутнє або дуже слабе	1
5	Тільки індетермінантні сорти: Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	коротке	3
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	горизонтальний	5
7	Листок: за довжиною	довгий	7
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	світле	3
12	Листок: глянуватість (як для 6)	помірна	5
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	помірна	5
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	середні	5
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	горизонтальне	5
16	Суцвіття: інтенсивність галузнення (другої і третьої китиці)	середня кількість	2
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	наявна	9
18	Квітка: опушення приймочки	наявне	9
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки)	середня	5
22	Плід: за розміром	великий	7
23	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє	5
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	округла	3
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	слабка	3
26	Плід: форма поперечного перерізу	крутляста	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	мільке	3
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	середній	5
29	Плід: розмір квіткового рубця	маленький	3
30	Плід: форма кінця плоду	від плескатої до гострої	4
31	Плід: розмір плаценти у поперечному перерізі	середній	5
32	Плід: за товщиною перикарпу	товстий	7
33	Плід: кількість камер	чотири, п'ять або шість	4
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1
35	Плід: розмір зеленого плеча (як для 34)	ознака не визначається	0
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (як для 34)	ознака не визначається	0
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (як для 34)	ознака не визначалась	0
38	Плід: колір за досягання	рожевий	4
39	Плід: колір м'якоті (як для 38)	рожевий	4
40	Плід: за твердістю	помірний	5
41	Плід: строк лежкості	короткий	3
42	Час цвітіння	середній	5
43	Час досягання	ранній	3
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	помірний	5
45	Наявність сріблястості	відсутня	1
46	Стійкість до <i>Meloidogyne incognita</i>	відсутня	1
47	Стійкість до <i>Verticillium dahliae</i> : Paca 0	наявна	9
48,1	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>Lycopersici</i> : Paca 0	наявна	9
48,2	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>Lycopersici</i> : Paca 1	наявна	9
49	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>radicis lycopersici</i>	відсутня	1
50,1	Стійкість до <i>Cladosporium fulvum</i> : Paca 0	наявна	9
50,2	Стійкість до <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи А	наявна	9

50,3	Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи В	наявна	9
50,4	Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи С	наявна	9
50,5	Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи D	наявна	9
50,6	Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи Е	наявна	9
51,1	Стійкість до Tomato Mosaic Virus: Патотипу 0	наявна	9
51,2	Стійкість до Mosaic Virus: Патотипу 1	наявна	9
51,3	Стійкість до Mosaic Virus: Патотипу 2	наявна	9
51,4	Стійкість до Mosaic Virus: Патотипу 1 - 2	наявна	9
52	Стійкість до Phytophthora infestans	відсутня	1
53	Стійкість до Pyrenochaeta lycopersici	відсутня	1
54	Стійкість до Stemphylium spp.	відсутня	1
55	Стійкість до Pseudomonas syringae pv. Tomato	відсутня	1
56	Стійкість до Ralstonia solanacearum	відсутня	1
57	Стійкість до Tomato Yellow Leaf Curl Virus	наявна	9
58	Стійкість до Tomato Spotted Wilt Virus	наявна	9
59	Стійкість до Leveillula taurica	відсутня	1
60	Стійкість до Oidium lycopersicum	відсутня	1

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Маса товарного плоду 240 г. Період від повних сходів до початку дозрівання 91 діб. Період плодоношення 213 діб. Вміст сухої речовини в плоді 5,7%. Вміст загального цукру 12%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Закритий ґрунт

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.

Заявка №: 09040060 Назва сорту Дочет F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

24.02.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140074

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотіля	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	детермінантний	1
3	Тільки детермінантні сорти: Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	середня кількість	5
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	відсутнє або дуже слабе	1
5	Тільки індетермінантні сорти: Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	ознака не визначається	0
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	горизонтальний	5
7	Листок: за довжиною	середній	5
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: за розсіченістю	перистий	1
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	світле	3
12	Листок: глянуватість (як для 6)	слабка	3
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	слабка	3
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	малі	3
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	піднесене	3
16	Суцвіття: інтенсивність галузнення (другої і третьої китиці)	багато	3
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення приймочки	відсутнє або дуже слабе	1
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	відсутній	1
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки)	ознака не визначається	0
22	Плід: за розміром	середній	5
23	Плід: відношення довжини до діаметра	дуже велике	9
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	циліндрична	5
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	відсутня або дуже слабка	1
26	Плід: форма поперечного перерізу	крутляста	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	відсутнє або дуже мілке	1
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	маленький	3
29	Плід: розмір квіткового рубця	дуже маленький	1
30	Плід: форма кінця плоду	гостра	5
31	Плід: розмір плаценти у поперечному перерізі	маленький	3
32	Плід: за товщиною перикарпу	середній	5
33	Плід: кількість камер	тільки 2	1
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1
35	Плід: розмір зеленого плеча (як для 34)	ознака не визначається	0
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (як для 34)	ознака не визначається	0
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (як для 34)	помірне	5
38	Плід: колір за досягання	червоний	5
39	Плід: колір м'якоті (як для 38)	червоний	5
40	Плід: за твердістю	твердий	7
41	Плід: строк лежкості	тривалий	7
42	Час цвітіння	ранній	3
43	Час досягання	ранній	3
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	низький	3
45	Наявність сріблястості	відсутня	1
46	Стійкість до <i>Meloidogyne incognita</i>	ознака не визначалась	0
47	Стійкість до <i>Verticillium dahliae</i> : Paca 0	ознака не визначалась	0
48,1	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>Lycopersici</i> : Paca 0	ознака не визначалась	0
48,2	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>Lycopersici</i> : Paca 1	ознака не визначалась	0
49	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>radicis lycopersici</i>	ознака не визначалась	0
50,1	Стійкість до <i>Cladosporium fulvum</i> : Paca 0	ознака не визначалась	0
50,2	Стійкість до <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи А	ознака не визначалась	0

50,3	Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи В	ознака не визначалась	0
50,4	Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи С	ознака не визначалась	0
50,5	Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи D	ознака не визначалась	0
50,6	Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи Е	ознака не визначалась	0
51,1	Стійкість до Tomato Mosaic Virus: Патотипу 0	ознака не визначалась	0
51,2	Стійкість до Mosaic Virus: Патотипу 1	ознака не визначалась	0
51,3	Стійкість до Mosaic Virus: Патотипу 2	ознака не визначалась	0
51,4	Стійкість до Mosaic Virus: Патотипу 1 - 2	ознака не визначалась	0
52	Стійкість до Phytophthora infestans	ознака не визначалась	0
53	Стійкість до Pyrenochaeta lycopersici	ознака не визначалась	0
54	Стійкість до Stemphylium spp.	ознака не визначалась	0
55	Стійкість до Pseudomonas syringae pv. Tomato	ознака не визначалась	0
56	Стійкість до Ralstonia solanacearum	ознака не визначалась	0
57	Стійкість до Tomato Yellow Leaf Curl Virus	ознака не визначалась	0
58	Стійкість до Tomato Spotted Wilt Virus	ознака не визначалась	0
59	Стійкість до Leveillula taurica	ознака не визначалась	0
60	Стійкість до Oidium lycopersicum	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна урожайність – 98 т/га; маса товарного плоду - 85 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 104 днів; період плодоношення - 58 днів; вміст сухої речовини в плоді - 5,9%; вміст загального цукру – 3,1 %; вміст вітаміну С – 19,8 мг%; загальна кислотність – 0,58%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Степ, Лісостеп, Полісся

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.

Заявка №: 13115016 **Назва сорту** Кібо

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

07.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140225

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилія	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2
3	Тільки детермінантні сорти: Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	ознака не визначається	0
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	відсутнє або дуже слабке	1
5	Тільки індетермінантні сорти: Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	середнє	5
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	похилий	7
7	Листок: за довжиною	середній	5
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
12	Листок: глянуватість (як для 6)	помірна	5
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	помірна	5
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	середні	5
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	горизонтальне	5
16	Суцвіття: інтенсивність галуження (другої і третьої китиці)	в основному 1 гілка	1
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	наявна	9
18	Квітка: опушення приймочки	відсутнє або дуже слабке	1
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	відсутній	1
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки)	ознака не визначається	0
22	Плід: за розміром	великий	7
23	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє	5
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	округла	3
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	відсутня або дуже слабка	1
26	Плід: форма поперечного перерізу	крутляста	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	помірне	5
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	маленький	3
29	Плід: розмір квіткового рубця	дуже маленький	1
30	Плід: форма кінця плоду	від заглибленої до плескатої	2
31	Плід: розмір плаценти у поперечному перерізі	середній	5
32	Плід: за товщиною перикарпу	ознака не визначалась	0
33	Плід: кількість камер	чотири, п'ять або шість	4
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	ознака не визначалась	0
35	Плід: розмір зеленого плеча (як для 34)	ознака не визначається	0
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (як для 34)	ознака не визначається	0
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (як для 34)	ознака не визначалась	0
38	Плід: колір за досягання	рожевий	4
39	Плід: колір м'якоті (як для 38)	рожевий	4
40	Плід: за твердістю	твердий	7
41	Плід: строк лежкості	помірний	5
42	Час цвітіння	пізній	7
43	Час досягання	середній	5
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	низький	3
45	Наявність сріблястості	наявна	9
46	Стійкість до <i>Meloidogyne incognita</i>	відсутня	1
47	Стійкість до <i>Verticillium dahliae</i> : Paca 0	наявна	9
48,1	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>Lycopersici</i> : Paca 0	наявна	9
48,2	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>Lycopersici</i> : Paca 1	наявна	9
49	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>radicis lycopersici</i>	наявна	9
50,1	Стійкість до <i>Cladosporium fulvum</i> : Paca 0	відсутня	1
50,2	Стійкість до <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи А	відсутня	1

50,3	Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи В	відсутня	1
50,4	Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи С	відсутня	1
50,5	Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи D	відсутня	1
50,6	Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи Е	відсутня	1
51,1	Стійкість до Tomato Mosaic Virus: Патотипу 0	відсутня	1
51,2	Стійкість до Mosaic Virus: Патотипу 1	відсутня	1
51,3	Стійкість до Mosaic Virus: Патотипу 2	відсутня	1
51,4	Стійкість до Mosaic Virus: Патотипу 1 - 2	відсутня	1
52	Стійкість до Phytophthora infestans	відсутня	1
53	Стійкість до Pyrenochaeta lycopersici	відсутня	1
54	Стійкість до Stemphylium spp.	відсутня	1
55	Стійкість до Pseudomonas syringae pv. Tomato	відсутня	1
56	Стійкість до Ralstonia solanacearum	відсутня	1
57	Стійкість до Tomato Yellow Leaf Curl Virus	відсутня	1
58	Стійкість до Tomato Spotted Wilt Virus	відсутня	1
59	Стійкість до Leveillula taurica	відсутня	1
60	Стійкість до Oidium lycopersicum	відсутня	1

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Маса товарного плоду 200 г. Період від повних сходів до початку дозрівання 110 діб. Період плодоношення 190 діб. Вміст сухої речовини в плоді 5,1%. Вміст загального цукру 3,5%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Закритий ґрунт

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.

Заявка №: 13115015 **Назва сорту** Кітарту

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

07.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140224

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилія	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2
3	Тільки детермінантні сорти: Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	ознака не визначається	0
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	відсутнє або дуже слабке	1
5	Тільки індетермінантні сорти: Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	середнє	5
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	горизонтальний	5
7	Листок: за довжиною	довгий	7
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	великий	7
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	темне	7
12	Листок: глянуватість (як для 6)	помірна	5
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	сильна	7
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	великі	7
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	піднесене	3
16	Суцвіття: інтенсивність галузнення (другої і третьої китиці)	в основному 1 гілка	1
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	наявна	9
18	Квітка: опушення приймочки	відсутнє або дуже слабке	1
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки)	середня	5
22	Плід: за розміром	середній	5
23	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє	5
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	округла	3
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	відсутня або дуже слабка	1
26	Плід: форма поперечного перерізу	крутляста	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	помірне	5
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	середній	5
29	Плід: розмір квіткового рубця	дуже маленький	1
30	Плід: форма кінця плоду	від заглибленої до плескатої	2
31	Плід: розмір плаценти у поперечному перерізі	середній	5
32	Плід: за товщиною перикарпу	ознака не визначалась	0
33	Плід: кількість камер	чотири, п'ять або шість	4
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	ознака не визначалась	0
35	Плід: розмір зеленого плеча (як для 34)	ознака не визначається	0
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (як для 34)	ознака не визначається	0
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (як для 34)	ознака не визначалась	0
38	Плід: колір за досягання	рожевий	4
39	Плід: колір м'якоті (як для 38)	рожевий	4
40	Плід: за твердістю	твердий	7
41	Плід: строк лежкості	помірний	5
42	Час цвітіння	пізній	7
43	Час досягання	середній	5
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	помірний	5
45	Наявність сріблястості	наявна	9
46	Стійкість до <i>Meloidogyne incognita</i>	відсутня	1
47	Стійкість до <i>Verticillium dahliae</i> : Paca 0	наявна	9
48,1	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>Lycopersici</i> : Paca 0	наявна	9
48,2	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>Lycopersici</i> : Paca 1	наявна	9
49	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>radicis lycopersici</i>	наявна	9
50,1	Стійкість до <i>Cladosporium fulvum</i> : Paca 0	відсутня	1
50,2	Стійкість до <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи А	відсутня	1

50,3	Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи В	відсутня	1
50,4	Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи С	відсутня	1
50,5	Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи D	відсутня	1
50,6	Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи Е	відсутня	1
51,1	Стійкість до Tomato Mosaic Virus: Патотипу 0	відсутня	1
51,2	Стійкість до Mosaic Virus: Патотипу 1	відсутня	1
51,3	Стійкість до Mosaic Virus: Патотипу 2	відсутня	1
51,4	Стійкість до Mosaic Virus: Патотипу 1 - 2	відсутня	1
52	Стійкість до Phytophthora infestans	відсутня	1
53	Стійкість до Pyrenochaeta lycopersici	відсутня	1
54	Стійкість до Stemphylium spp.	відсутня	1
55	Стійкість до Pseudomonas syringae pv. Tomato	наявна	9
56	Стійкість до Ralstonia solanacearum	відсутня	1
57	Стійкість до Tomato Yellow Leaf Curl Virus	відсутня	1
58	Стійкість до Tomato Spotted Wilt Virus	наявна	9
59	Стійкість до Leveillula taurica	відсутня	1
60	Стійкість до Oidium lycopersicum	відсутня	1

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Маса товарного плоду 210 г. Період плодоношення 185 діб. Вміст сухої речовини в плоді 5,1%. Вміст загального цукру 3,7%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Закритий ґрунт

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.

Заявка №: 11040024 Назва сорту Мерліс

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 30.11.2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

07.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140218

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилія	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2
3	Тільки детермінантні сорти: Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	ознака не визначається	0
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	відсутнє або дуже слабе	1
5	Тільки індетермінантні сорти: Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	середнє	5
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	горизонтальний	5
7	Листок: за довжиною	середній	5
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
12	Листок: глянуватість (як для 6)	слабка	3
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	слабка	3
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	малі	3
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	піднесене	3
16	Суцвіття: інтенсивність галуження (другої і третьої китиці)	в основному 1 гілка	1
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	наявна	9
18	Квітка: опушення приймочки	наявне	9
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	відсутній	1
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки)	ознака не визначається	0
22	Плід: за розміром	середній	5
23	Плід: відношення довжини до діаметра	маленьке	3
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	плескато-округла	2
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	слабка	3
26	Плід: форма поперечного перерізу	кругlastа	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	помірне	5
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	середній	5
29	Плід: розмір квіткового рубця	середній	5
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3
31	Плід: розмір плаценти у поперечному перерізі	великий	7
32	Плід: за товщиною перикарпу	середній	5
33	Плід: кількість камер	три-чотири	3
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1
35	Плід: розмір зеленого плеча (як для 34)	ознака не визначається	0
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (як для 34)	ознака не визначається	0
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (як для 34)	світле	3
38	Плід: колір за досягання	червоний	5
39	Плід: колір м'якоті (як для 38)	червоний	5
40	Плід: за твердістю	твердий	7
41	Плід: строк лежкості	ознака не визначалась	0
42	Час цвітіння	середній	5
43	Час досягання	пізній	7
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	ознака не визначалась	0
45	Наявність сріблястості	ознака не визначалась	0
46	Стійкість до <i>Meloidogyne incognita</i>	відсутня	1
47	Стійкість до <i>Verticillium dahliae</i> : Paca 0	наявна	9
48,1	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>Lycopersici</i> : Paca 0	наявна	9
48,2	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>Lycopersici</i> : Paca 1	наявна	9
49	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>radicis lycopersici</i>	наявна	9
50,1	Стійкість до <i>Cladosporium fulvum</i> : Paca 0	ознака не визначалась	0
50,2	Стійкість до <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи А	наявна	9

50,3	Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи В	наявна	9
50,4	Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи С	наявна	9
50,5	Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи D	наявна	9
50,6	Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи Е	наявна	9
51,1	Стійкість до Tomato Mosaic Virus: Патотипу 0	ознака не визначалась	0
51,2	Стійкість до Mosaic Virus: Патотипу 1	ознака не визначалась	0
51,3	Стійкість до Mosaic Virus: Патотипу 2	ознака не визначалась	0
51,4	Стійкість до Mosaic Virus: Патотипу 1 - 2	ознака не визначалась	0
52	Стійкість до Phytophthora infestans	ознака не визначалась	0
53	Стійкість до Pyrenochaeta lycopersici	ознака не визначалась	0
54	Стійкість до Stemphylium spp.	ознака не визначалась	0
55	Стійкість до Pseudomonas syringae pv. Tomato	ознака не визначалась	0
56	Стійкість до Ralstonia solanacearum	ознака не визначалась	0
57	Стійкість до Tomato Yellow Leaf Curl Virus	відсутня	1
58	Стійкість до Tomato Spotted Wilt Virus	ознака не визначалась	0
59	Стійкість до Leveillula taurica	ознака не визначалась	0
60	Стійкість до Oidium lycopersicum	наявна	9

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Маса товарного плоду 130 г. Період від повних сходів до початку дозрівання 71 діб. Період плодоношення 64 доби. Вміст сухої речовини в плоді 6%. Вміст загального цукру 3,3%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Закритий ґрунт

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.

Заявка №: 08040067 **Назва сорту** Миролюбівський

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

19.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140349

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилія	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	детермінантний	1
3	Тільки детермінантні сорти: Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	середня кількість	5
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	відсутнє або дуже слабке	1
5	Тільки індетермінантні сорти: Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	ознака не визначається	0
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	піднесений	3
7	Листок: за довжиною	довгий	7
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: за розсіченістю	перистий	1
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	малий	3
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
12	Листок: глянуватість (як для 6)	слабка	3
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	помірна	5
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	малі	3
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	піднесене	3
16	Суцвіття: інтенсивність галузнення (другої і третьої китиці)	в основному 1 гілка	1
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення приймочки	відсутнє або дуже слабке	1
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки)	середня	5
22	Плід: за розміром	середній	5
23	Плід: відношення довжини до діаметра	дуже велике	9
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	циліндрична	5
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	відсутня або дуже слабка	1
26	Плід: форма поперечного перерізу	крутляста	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	відсутнє або дуже мілке	1
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	малий	3
29	Плід: розмір квіткового рубця	дуже малий	1
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3
31	Плід: розмір плаценти у поперечному перерізі	малий	3
32	Плід: за товщиною перикарпу	середній	5
33	Плід: кількість камер	два-три	2
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	наявне	9
35	Плід: розмір зеленого плеча (як для 34)	середній	5
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (як для 34)	помірне	5
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (як для 34)	помірне	5
38	Плід: колір за досягання	оранжевий	3
39	Плід: колір м'якоті (як для 38)	оранжевий	3
40	Плід: за твердістю	м'який	3
41	Плід: строк лежкості	помірний	5
42	Час цвітіння	середній	5
43	Час досягання	середній	5
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	помірний	5
45	Наявність сріблястості	відсутня	1
46	Стійкість до <i>Meloidogyne incognita</i>	ознака не визначалась	0
47	Стійкість до <i>Verticillium dahliae</i> : Paca 0	ознака не визначалась	0
48,1	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>Lycopersici</i> : Paca 0	ознака не визначалась	0
48,2	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>Lycopersici</i> : Paca 1	ознака не визначалась	0
49	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>radicis lycopersici</i>	ознака не визначалась	0
50,1	Стійкість до <i>Cladosporium fulvum</i> : Paca 0	ознака не визначалась	0
50,2	Стійкість до <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи А	ознака не визначалась	0

50,3	Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи В	ознака не визначалась	0
50,4	Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи С	ознака не визначалась	0
50,5	Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи D	ознака не визначалась	0
50,6	Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи Е	ознака не визначалась	0
51,1	Стійкість до Tomato Mosaic Virus: Патотипу 0	ознака не визначалась	0
51,2	Стійкість до Mosaic Virus: Патотипу 1	ознака не визначалась	0
51,3	Стійкість до Mosaic Virus: Патотипу 2	ознака не визначалась	0
51,4	Стійкість до Mosaic Virus: Патотипу 1 - 2	ознака не визначалась	0
52	Стійкість до Phytophthora infestans	ознака не визначалась	0
53	Стійкість до Pyrenochaeta lycopersici	ознака не визначалась	0
54	Стійкість до Stemphylium spp.	ознака не визначалась	0
55	Стійкість до Pseudomonas syringae pv. Tomato	ознака не визначалась	0
56	Стійкість до Ralstonia solanacearum	ознака не визначалась	0
57	Стійкість до Tomato Yellow Leaf Curl Virus	ознака не визначалась	0
58	Стійкість до Tomato Spotted Wilt Virus	ознака не визначалась	0
59	Стійкість до Leveillula taurica	ознака не визначалась	0
60	Стійкість до Oidium lycopersicum	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна урожайність – 67 т/га; маса товарного плоду - 90г; період від повних сходів до початку дозрівання - 106 днів; період плодоношення - 66 днів; вміст сухої речовини в плоді – 6,8%; вміст загального цукру – 3,47 %; вміст вітаміну С – 33,2 мг%; вміст каротину – 4,32мг%; загальна кислотність – 0,52%. Ураженість хворобами: вірусними хворобами – 1%, макроспоріозом - 1%, фітофторозом - 1 %.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Степ, Лісостеп, Полісся

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.

Заявка №: 12040010 **Назва сорту** Мішель F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

17.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140350

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилія	відсутнє	1
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2
3	Тільки детермінантні сорти: Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	ознака не визначається	0
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	відсутнє або дуже слабке	1
5	Тільки індетермінантні сорти: Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	середнє	5
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	горизонтальний	5
7	Листок: за довжиною	довгий	7
8	Листок: за шириною	широкий	7
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	великий	7
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
12	Листок: глянуватість (як для 6)	слабка	3
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	слабка	3
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	малі	3
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	піднесене	3
16	Суцвіття: інтенсивність галузнення (другої і третьої китиці)	багато	3
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення приймочки	відсутнє або дуже слабке	1
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки)	середня	5
22	Плід: за розміром	великий	7
23	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє	5
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	плескато-округла	2
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	помірна	5
26	Плід: форма поперечного перерізу	кругlastа	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	м'яке	3
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	маленький	3
29	Плід: розмір квіткового рубця	маленький	3
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3
31	Плід: розмір плаценти у поперечному перерізі	середній	5
32	Плід: за товщиною перикарпу	тонкий	3
33	Плід: кількість камер	чотири, п'ять або шість	4
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	наявне	9
35	Плід: розмір зеленого плеча (як для 34)	ознака не визначається	0
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (як для 34)	ознака не визначається	0
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (як для 34)	світле	3
38	Плід: колір за досягання	червоний	5
39	Плід: колір м'якоті (як для 38)	червоний	5
40	Плід: за твердістю	твердий	7
41	Плід: строк лежкості	тривалий	7
42	Час цвітіння	ранній	3
43	Час досягання	ранній	3
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	помірний	5
45	Наявність сріблястості	відсутня	1
46	Стійкість до <i>Meloidogyne incognita</i>	наявна	9
47	Стійкість до <i>Verticillium dahliae</i> : Paca 0	наявна	9
48,1	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>Lycopersici</i> : Paca 0	наявна	9
48,2	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>Lycopersici</i> : Paca 1	наявна	9
49	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>radicis lycopersici</i>	наявна	9
50,1	Стійкість до <i>Cladosporium fulvum</i> : Paca 0	ознака не визначалась	0
50,2	Стійкість до <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи А	ознака не визначалась	0

50,3	Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи В	ознака не визначалась	0
50,4	Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи С	ознака не визначалась	0
50,5	Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи D	ознака не визначалась	0
50,6	Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи Е	ознака не визначалась	0
51,1	Стійкість до Tomato Mosaic Virus: Патотипу 0	наявна	9
51,2	Стійкість до Mosaic Virus: Патотипу 1	наявна	9
51,3	Стійкість до Mosaic Virus: Патотипу 2	наявна	9
51,4	Стійкість до Mosaic Virus: Патотипу 1 - 2	наявна	9
52	Стійкість до Phytophthora infestans	наявна	9
53	Стійкість до Pyrenochaeta lycopersici	наявна	9
54	Стійкість до Stemphylium spp.	наявна	9
55	Стійкість до Pseudomonas syringae pv. Tomato	наявна	9
56	Стійкість до Ralstonia solanacearum	ознака не визначалась	0
57	Стійкість до Tomato Yellow Leaf Curl Virus	ознака не визначалась	0
58	Стійкість до Tomato Spotted Wilt Virus	ознака не визначалась	0
59	Стійкість до Leveillula taurica	ознака не визначалась	0
60	Стійкість до Oidium lycopersicum	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Маса товарного плоду 220 г. Період від повних сходів до початку дозрівання 70 діб. Період плодоношення 75 діб. Вміст сухої речовини в плоді 12%. Вміст загального цукру 4,7%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Закритий ґрунт

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.

Заявка №: 09040061 Назва сорту Монті F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

24.02.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140075

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилія	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	детермінантний	1
3	Тільки детермінантні сорти: Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	середня кількість	5
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	відсутнє або дуже слабке	1
5	Тільки індетермінантні сорти: Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	ознака не визначається	0
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	похилий	7
7	Листок: за довжиною	довгий	7
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	великий	7
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
12	Листок: глянсуватість (як для 6)	слабка	3
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	помірна	5
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	середні	5
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	піднесене	3
16	Суцвіття: інтенсивність галузнення (другої і третьої китиці)	в основному 1 гілка	1
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення приймочки	відсутнє або дуже слабке	1
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	відсутній	1
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки)	ознака не визначається	0
22	Плід: за розміром	середній	5
23	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє	5
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	еліптична	6
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	слабка	3
26	Плід: форма поперечного перерізу	крутляста	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	мільке	3
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	маленький	3
29	Плід: розмір квіткового рубця	дуже маленький	1
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3
31	Плід: розмір плаценти у поперечному перерізі	середній	5
32	Плід: за товщиною перикарпу	середній	5
33	Плід: кількість камер	дві-три	2
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1
35	Плід: розмір зеленого плеча (як для 34)	ознака не визначається	0
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (як для 34)	ознака не визначається	0
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (як для 34)	помірне	5
38	Плід: колір за досягання	червоний	5
39	Плід: колір м'якоті (як для 38)	червоний	5
40	Плід: за твердістю	твердий	7
41	Плід: строк лежкості	тривалий	7
42	Час цвітіння	середній	5
43	Час досягання	середній	5
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	помірний	5
45	Наявність сріблястості	відсутня	1
46	Стійкість до <i>Meloidogyne incognita</i>	ознака не визначалась	0
47	Стійкість до <i>Verticillium dahliae</i> : Paca 0	ознака не визначалась	0
48,1	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>Lycopersici</i> : Paca 0	ознака не визначалась	0
48,2	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>Lycopersici</i> : Paca 1	ознака не визначалась	0
49	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>radicis lycopersici</i>	ознака не визначалась	0
50,1	Стійкість до <i>Cladosporium fulvum</i> : Paca 0	ознака не визначалась	0
50,2	Стійкість до <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи А	ознака не визначалась	0

50,3	Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи В	ознака не визначалась	0
50,4	Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи С	ознака не визначалась	0
50,5	Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи D	ознака не визначалась	0
50,6	Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи Е	ознака не визначалась	0
51,1	Стійкість до Tomato Mosaic Virus: Патотипу 0	ознака не визначалась	0
51,2	Стійкість до Mosaic Virus: Патотипу 1	ознака не визначалась	0
51,3	Стійкість до Mosaic Virus: Патотипу 2	ознака не визначалась	0
51,4	Стійкість до Mosaic Virus: Патотипу 1 - 2	ознака не визначалась	0
52	Стійкість до Phytophthora infestans	ознака не визначалась	0
53	Стійкість до Pyrenochaeta lycopersici	ознака не визначалась	0
54	Стійкість до Stemphylium spp.	ознака не визначалась	0
55	Стійкість до Pseudomonas syringae pv. Tomato	ознака не визначалась	0
56	Стійкість до Ralstonia solanacearum	ознака не визначалась	0
57	Стійкість до Tomato Yellow Leaf Curl Virus	ознака не визначалась	0
58	Стійкість до Tomato Spotted Wilt Virus	ознака не визначалась	0
59	Стійкість до Leveillula taurica	ознака не визначалась	0
60	Стійкість до Oidium lycopersicum	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна урожайність – 110 т/га; маса товарного плоду - 90 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 110 днів; період плодоношення - 49 днів; вміст сухої речовини в плоді – 5,6%; вміст загального цукру – 3,6 %; вміст вітаміну С – 26,0 мг%; загальна кислотність – 0,48%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Степ, Лісостеп, Полісся

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.

Заявка №: 08040061 **Назва сорту** Пандароза

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

07.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140217

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилія	відсутнє	1
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2
3	Тільки детермінантні сорти: Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	ознака не визначається	0
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	відсутнє або дуже слабе	1
5	Тільки індетермінантні сорти: Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	коротке	3
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	горизонтальний	5
7	Листок: за довжиною	середній	5
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
12	Листок: глянуватість (як для 6)	помірна	5
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	помірна	5
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	малі	3
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	горизонтальне	5
16	Суцвіття: інтенсивність галуження (другої і третьої китиці)	в основному 1 гілка	1
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	наявна	9
18	Квітка: опушення приймочки	відсутнє або дуже слабе	1
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	відсутній	1
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки)	ознака не визначається	0
22	Плід: за розміром	великий	7
23	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє	5
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	плескато-округла	2
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	помірна	5
26	Плід: форма поперечного перерізу	кругlastа	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	помірне	5
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	середній	5
29	Плід: розмір квіткового рубця	середній	5
30	Плід: форма кінця плоду	від заглибленої до плескатої	2
31	Плід: розмір плаценти у поперечному перерізі	середній	5
32	Плід: за товщиною перикарпу	середній	5
33	Плід: кількість камер	більше шести	5
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	наявне	9
35	Плід: розмір зеленого плеча (як для 34)	середній	5
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (як для 34)	помірне	5
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (як для 34)	помірне	5
38	Плід: колір за досягання	рожевий	4
39	Плід: колір м'якоті (як для 38)	рожевий	4
40	Плід: за твердістю	помірний	5
41	Плід: строк лежкості	помірний	5
42	Час цвітіння	середній	5
43	Час досягання	середній	5
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	помірний	5
45	Наявність сріблястості	наявна	9
46	Стійкість до <i>Meloidogyne incognita</i>	ознака не визначалась	0
47	Стійкість до <i>Verticillium dahliae</i> : Paca 0	ознака не визначалась	0
48,1	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>Lycopersici</i> : Paca 0	ознака не визначалась	0
48,2	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>Lycopersici</i> : Paca 1	ознака не визначалась	0
49	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>radicis lycopersici</i>	ознака не визначалась	0
50,1	Стійкість до <i>Cladosporium fulvum</i> : Paca 0	ознака не визначалась	0
50,2	Стійкість до <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи А	ознака не визначалась	0

50,3	Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи В	ознака не визначалась	0
50,4	Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи С	ознака не визначалась	0
50,5	Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи D	ознака не визначалась	0
50,6	Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи Е	ознака не визначалась	0
51,1	Стійкість до Tomato Mosaic Virus: Патотипу 0	ознака не визначалась	0
51,2	Стійкість до Mosaic Virus: Патотипу 1	ознака не визначалась	0
51,3	Стійкість до Mosaic Virus: Патотипу 2	ознака не визначалась	0
51,4	Стійкість до Mosaic Virus: Патотипу 1 - 2	ознака не визначалась	0
52	Стійкість до Phytophthora infestans	ознака не визначалась	0
53	Стійкість до Pyrenochaeta lycopersici	ознака не визначалась	0
54	Стійкість до Stemphylium spp.	ознака не визначалась	0
55	Стійкість до Pseudomonas syringae pv. Tomato	ознака не визначалась	0
56	Стійкість до Ralstonia solanacearum	ознака не визначалась	0
57	Стійкість до Tomato Yellow Leaf Curl Virus	ознака не визначалась	0
58	Стійкість до Tomato Spotted Wilt Virus	ознака не визначалась	0
59	Стійкість до Leveillula taurica	ознака не визначалась	0
60	Стійкість до Oidium lycopersicum	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Маса товарного плоду - 190 г, період від повних сходів до початку дозрівання, днів - 112, вміст, сухої речовини в плоді - 5,5%, вміст загального цукру 2,5 %, вміст вітаміну С -13,5 мг %, загальна кислотність - 0,5 %.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Закритий ґрунт

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.

Заявка №: 12040011 **Назва сорту** Пінк Буш F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

17.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140351

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилія	відсутнє	1
2	Рослина: тип розвитку	детермінантний	1
3	Тільки детермінантні сорти: Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	декілька	3
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	відсутнє або дуже слабке	1
5	Тільки індетермінантні сорти: Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	ознака не визначається	0
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	піднесений	3
7	Листок: за довжиною	довгий	7
8	Листок: за шириною	широкий	7
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	великий	7
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
12	Листок: глянсуватість (як для 6)	помірна	5
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	слабка	3
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	малі	3
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	піднесене	3
16	Суцвіття: інтенсивність галузнення (другої і третьої китиці)	середня кількість	2
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення приймочки	відсутнє або дуже слабке	1
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки)	коротка	3
22	Плід: за розміром	великий	7
23	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє	5
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	плескато-округла	2
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	помірна	5
26	Плід: форма поперечного перерізу	кругlastа	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	милке	3
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	середній	5
29	Плід: розмір квіткового рубця	маленький	3
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3
31	Плід: розмір плаценти у поперечному перерізі	середній	5
32	Плід: за товщиною перикарпу	тонкий	3
33	Плід: кількість камер	більше шести	5
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1
35	Плід: розмір зеленого плеча (як для 34)	ознака не визначається	0
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (як для 34)	ознака не визначається	0
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (як для 34)	помірне	5
38	Плід: колір за досягання	рожевий	4
39	Плід: колір м'якоті (як для 38)	рожевий	4
40	Плід: за твердістю	твердий	7
41	Плід: строк лежкості	тривалий	7
42	Час цвітіння	ранній	3
43	Час досягання	ранній	3
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	низький	3
45	Наявність сріблястості	відсутня	1
46	Стійкість до <i>Meloidogyne incognita</i>	наявна	9
47	Стійкість до <i>Verticillium dahliae</i> : Paca 0	наявна	9
48,1	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>Lycopersici</i> : Paca 0	наявна	9
48,2	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>Lycopersici</i> : Paca 1	наявна	9
49	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>radicis lycopersici</i>	наявна	9
50,1	Стійкість до <i>Cladosporium fulvum</i> : Paca 0	ознака не визначалась	0
50,2	Стійкість до <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи А	ознака не визначалась	0

50,3	Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи В	ознака не визначалась	0
50,4	Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи С	ознака не визначалась	0
50,5	Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи D	ознака не визначалась	0
50,6	Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи Е	ознака не визначалась	0
51,1	Стійкість до Tomato Mosaic Virus: Патотипу 0	наявна	9
51,2	Стійкість до Mosaic Virus: Патотипу 1	наявна	9
51,3	Стійкість до Mosaic Virus: Патотипу 2	наявна	9
51,4	Стійкість до Mosaic Virus: Патотипу 1 - 2	наявна	9
52	Стійкість до Phytophthora infestans	наявна	9
53	Стійкість до Pyrenochaeta lycopersici	наявна	9
54	Стійкість до Stemphylium spp.	наявна	9
55	Стійкість до Pseudomonas syringae pv. Tomato	наявна	9
56	Стійкість до Ralstonia solanacearum	ознака не визначалась	0
57	Стійкість до Tomato Yellow Leaf Curl Virus	ознака не визначалась	0
58	Стійкість до Tomato Spotted Wilt Virus	ознака не визначалась	0
59	Стійкість до Leveillula taurica	ознака не визначалась	0
60	Стійкість до Oidium lycopersicum	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Маса товарного плоду 210 г. Період від повних сходів до початку дозрівання 65 діб. Період плодоношення 70 діб. Вміст сухої речовини в плоді 20%. Вміст загального цукру 20%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Закритий ґрунт

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.

Заявка №: 09040057 **Назва сорту** ПС 02431185 F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

24.02.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140071

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилія	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	детермінантний	1
3	Тільки детермінантні сорти: Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	середня кількість	5
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	відсутнє або дуже слабке	1
5	Тільки індетермінантні сорти: Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	ознака не визначається	0
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	горизонтальний	5
7	Листок: за довжиною	середній	5
8	Листок: за шириною	широкий	7
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	великий	7
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
12	Листок: глянсуватість (як для 6)	слабка	3
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	помірна	5
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	середні	5
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	піднесене	3
16	Суцвіття: інтенсивність галузнення (другої і третьої китиці)	в основному 1 гілка	1
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення приймочки	відсутнє або дуже слабке	1
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	відсутній	1
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки)	ознака не визначається	0
22	Плід: за розміром	середній	5
23	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє	5
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	еліптична	6
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	слабка	3
26	Плід: форма поперечного перерізу	кругlastа	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	милке	3
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	маленький	3
29	Плід: розмір квіткового рубця	дуже маленький	1
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3
31	Плід: розмір плаценти у поперечному перерізі	середній	5
32	Плід: за товщиною перикарпу	середній	5
33	Плід: кількість камер	дві-три	2
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1
35	Плід: розмір зеленого плеча (як для 34)	ознака не визначається	0
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (як для 34)	ознака не визначається	0
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (як для 34)	помірне	5
38	Плід: колір за досягання	червоний	5
39	Плід: колір м'якоті (як для 38)	червоний	5
40	Плід: за твердістю	твердий	7
41	Плід: строк лежкості	тривалий	7
42	Час цвітіння	середній	5
43	Час досягання	середній	5
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	помірний	5
45	Наявність сріблястості	відсутня	1
46	Стійкість до <i>Meloidogyne incognita</i>	ознака не визначалась	0
47	Стійкість до <i>Verticillium dahliae</i> : Paca 0	ознака не визначалась	0
48,1	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>Lycopersici</i> : Paca 0	ознака не визначалась	0
48,2	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>Lycopersici</i> : Paca 1	ознака не визначалась	0
49	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>radicis lycopersici</i>	ознака не визначалась	0
50,1	Стійкість до <i>Cladosporium fulvum</i> : Paca 0	ознака не визначалась	0
50,2	Стійкість до <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи А	ознака не визначалась	0

50,3	Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи В	ознака не визначалась	0
50,4	Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи С	ознака не визначалась	0
50,5	Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи D	ознака не визначалась	0
50,6	Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи Е	ознака не визначалась	0
51,1	Стійкість до Tomato Mosaic Virus: Патотипу 0	ознака не визначалась	0
51,2	Стійкість до Mosaic Virus: Патотипу 1	ознака не визначалась	0
51,3	Стійкість до Mosaic Virus: Патотипу 2	ознака не визначалась	0
51,4	Стійкість до Mosaic Virus: Патотипу 1 - 2	ознака не визначалась	0
52	Стійкість до Phytophthora infestans	ознака не визначалась	0
53	Стійкість до Pyrenochaeta lycopersici	ознака не визначалась	0
54	Стійкість до Stemphylium spp.	ознака не визначалась	0
55	Стійкість до Pseudomonas syringae pv. Tomato	ознака не визначалась	0
56	Стійкість до Ralstonia solanacearum	ознака не визначалась	0
57	Стійкість до Tomato Yellow Leaf Curl Virus	ознака не визначалась	0
58	Стійкість до Tomato Spotted Wilt Virus	ознака не визначалась	0
59	Стійкість до Leveillula taurica	ознака не визначалась	0
60	Стійкість до Oidium lycopersicum	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна урожайність – 110 т/га; маса товарного плоду - 85 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 105 днів; період плодоношення - 57 днів; вміст сухої речовини в плоді - 6,0%; вміст загального цукру – 3,0 %; вміст вітаміну С – 28, мг%; загальна кислотність – 0,6%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Степ, Лісостеп, Полісся

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.

Заявка №: 09040058 **Назва сорту** Пулпрекс F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

24.02.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140072

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилія	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	детермінантний	1
3	Тільки детермінантні сорти: Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	декілька	3
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	відсутнє або дуже слабе	1
5	Тільки індетермінантні сорти: Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	ознака не визначається	0
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	похилий	7
7	Листок: за довжиною	середній	5
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
12	Листок: глянуватість (як для 6)	слабка	3
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	слабка	3
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	малі	3
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	піднесене	3
16	Суцвіття: інтенсивність галузнення (другої і третьої китиці)	в основному 1 гілка	1
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення приймочки	відсутнє або дуже слабе	1
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки)	середня	5
22	Плід: за розміром	середній	5
23	Плід: відношення довжини до діаметра	велике	7
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	циліндрична	5
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	відсутня або дуже слабка	1
26	Плід: форма поперечного перерізу	крутляста	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	мільке	3
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	маленький	3
29	Плід: розмір квіткового рубця	дуже маленький	1
30	Плід: форма кінця плоду	від плескатої до гострої	4
31	Плід: розмір плаценти у поперечному перерізі	середній	5
32	Плід: за товщиною перикарпу	середній	5
33	Плід: кількість камер	тільки 2	1
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1
35	Плід: розмір зеленого плеча (як для 34)	ознака не визначається	0
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (як для 34)	ознака не визначається	0
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (як для 34)	помірне	5
38	Плід: колір за досягання	червоний	5
39	Плід: колір м'якоті (як для 38)	червоний	5
40	Плід: за твердістю	помірний	5
41	Плід: строк лежкості	помірний	5
42	Час цвітіння	ранній	3
43	Час досягання	ранній	3
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	низький	3
45	Наявність сріблястості	наявна	9
46	Стійкість до <i>Meloidogyne incognita</i>	ознака не визначалась	0
47	Стійкість до <i>Verticillium dahliae</i> : Paca 0	ознака не визначалась	0
48,1	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>Lycopersici</i> : Paca 0	ознака не визначалась	0
48,2	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>Lycopersici</i> : Paca 1	ознака не визначалась	0
49	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>radicis lycopersici</i>	ознака не визначалась	0
50,1	Стійкість до <i>Cladosporium fulvum</i> : Paca 0	ознака не визначалась	0
50,2	Стійкість до <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи А	ознака не визначалась	0

50,3	Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи В	ознака не визначалась	0
50,4	Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи С	ознака не визначалась	0
50,5	Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи D	ознака не визначалась	0
50,6	Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи Е	ознака не визначалась	0
51,1	Стійкість до Tomato Mosaic Virus: Патотипу 0	ознака не визначалась	0
51,2	Стійкість до Mosaic Virus: Патотипу 1	ознака не визначалась	0
51,3	Стійкість до Mosaic Virus: Патотипу 2	ознака не визначалась	0
51,4	Стійкість до Mosaic Virus: Патотипу 1 - 2	ознака не визначалась	0
52	Стійкість до Phytophthora infestans	ознака не визначалась	0
53	Стійкість до Pyrenochaeta lycopersici	ознака не визначалась	0
54	Стійкість до Stemphylium spp.	ознака не визначалась	0
55	Стійкість до Pseudomonas syringae pv. Tomato	ознака не визначалась	0
56	Стійкість до Ralstonia solanacearum	ознака не визначалась	0
57	Стійкість до Tomato Yellow Leaf Curl Virus	ознака не визначалась	0
58	Стійкість до Tomato Spotted Wilt Virus	ознака не визначалась	0
59	Стійкість до Leveillula taurica	ознака не визначалась	0
60	Стійкість до Oidium lycopersicum	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна урожайність – 95 т/га; маса товарного плоду - 80 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 111 днів; період плодоношення - 61 днів; вміст сухої речовини в плоді - 6,0%; вміст загального цукру – 3,5 %; вміст вітаміну С – 26,0 мг%; загальна кислотність – 0,48%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Степ, Лісостеп, Полісся

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.

Заявка №: 08040062 Назва сорту Розаліса F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

24.02.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140068

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилія	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	детермінантний	1
3	Тільки детермінантні сорти: Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	середня кількість	5
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	відсутнє або дуже слабке	1
5	Тільки індетермінантні сорти: Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	ознака не визначається	0
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	горизонтальний	5
7	Листок: за довжиною	середній	5
8	Листок: за шириною	вузький	3
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
12	Листок: глянуватість (як для 6)	слабка	3
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	слабка	3
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	малі	3
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	горизонтальне	5
16	Суцвіття: інтенсивність галуження (другої і третьої китиці)	в основному 1 гілка	1
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення приймочки	відсутнє або дуже слабке	1
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки)	середня	5
22	Плід: за розміром	середній	5
23	Плід: відношення довжини до діаметра	маленьке	3
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	плескато-округла	2
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	помірна	5
26	Плід: форма поперечного перерізу	кругlastа	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	помірне	5
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	середній	5
29	Плід: розмір квіткового рубця	середній	5
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3
31	Плід: розмір плаценти у поперечному перерізі	маленький	3
32	Плід: за товщиною перикарпу	середній	5
33	Плід: кількість камер	чотири, п'ять або шість	4
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1
35	Плід: розмір зеленого плеча (як для 34)	ознака не визначається	0
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (як для 34)	ознака не визначається	0
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (як для 34)	світле	3
38	Плід: колір за досягання	червоний	5
39	Плід: колір м'якоті (як для 38)	червоний	5
40	Плід: за твердістю	м'який	3
41	Плід: строк лежкості	короткий	3
42	Час цвітіння	середній	5
43	Час досягання	середній	5
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	помірний	5
45	Наявність сріблястості	наявна	9
46	Стійкість до <i>Meloidogyne incognita</i>	ознака не визначалась	0
47	Стійкість до <i>Verticillium dahliae</i> : Paca 0	ознака не визначалась	0
48,1	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>Lycopersici</i> : Paca 0	ознака не визначалась	0
48,2	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>Lycopersici</i> : Paca 1	ознака не визначалась	0
49	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>radicis lycopersici</i>	ознака не визначалась	0
50,1	Стійкість до <i>Cladosporium fulvum</i> : Paca 0	ознака не визначалась	0
50,2	Стійкість до <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи А	ознака не визначалась	0

50,3	Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи В	ознака не визначалась	0
50,4	Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи С	ознака не визначалась	0
50,5	Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи D	ознака не визначалась	0
50,6	Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи Е	ознака не визначалась	0
51,1	Стійкість до Tomato Mosaic Virus: Патотипу 0	ознака не визначалась	0
51,2	Стійкість до Mosaic Virus: Патотипу 1	ознака не визначалась	0
51,3	Стійкість до Mosaic Virus: Патотипу 2	ознака не визначалась	0
51,4	Стійкість до Mosaic Virus: Патотипу 1 - 2	ознака не визначалась	0
52	Стійкість до Phytophthora infestans	ознака не визначалась	0
53	Стійкість до Pyrenochaeta lycopersici	ознака не визначалась	0
54	Стійкість до Stemphylium spp.	ознака не визначалась	0
55	Стійкість до Pseudomonas syringae pv. Tomato	ознака не визначалась	0
56	Стійкість до Ralstonia solanacearum	ознака не визначалась	0
57	Стійкість до Tomato Yellow Leaf Curl Virus	ознака не визначалась	0
58	Стійкість до Tomato Spotted Wilt Virus	ознака не визначалась	0
59	Стійкість до Leveillula taurica	ознака не визначалась	0
60	Стійкість до Oidium lycopersicum	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна урожайність – 400т/га; маса товарного плоду - 190 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 112 днів; період плодоношення - 154 днів; вміст сухої речовини в плоді – 5,5%; вміст загального цукру – 2,5 %; вміст вітаміну С – 13,5 мг%; загальна кислотність – 0,5%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Степ, Лісостеп, Полісся

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.

Заявка №: 11040015 Назва сорту Сафаікс F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

03.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140076

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотіля	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	детермінантний	1
3	Тільки детермінантні сорти: Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	середня кількість	5
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	відсутнє або дуже слабке	1
5	Тільки індетермінантні сорти: Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	ознака не визначається	0
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	піднесений	3
7	Листок: за довжиною	середній	5
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: за розсіченістю	перистий	1
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	темне	7
12	Листок: глянуватість (як для 6)	помірна	5
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	помірна	5
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	середні	5
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	піднесене	3
16	Суцвіття: інтенсивність галузнення (другої і третьої китиці)	багато	3
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	наявна	9
18	Квітка: опушення приймочки	відсутнє або дуже слабке	1
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	відсутній	1
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки)	ознака не визначається	0
22	Плід: за розміром	середній	5
23	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє	5
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	еліптична	6
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	слабка	3
26	Плід: форма поперечного перерізу	крутляста	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	мільке	3
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	середній	5
29	Плід: розмір квіткового рубця	дуже маленький	1
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3
31	Плід: розмір плаценти у поперечному перерізі	середній	5
32	Плід: за товщиною перикарпу	середній	5
33	Плід: кількість камер	дві-три	2
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1
35	Плід: розмір зеленого плеча (як для 34)	ознака не визначається	0
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (як для 34)	ознака не визначається	0
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (як для 34)	ознака не визначалась	0
38	Плід: колір за досягання	червоний	5
39	Плід: колір м'якоті (як для 38)	червоний	5
40	Плід: за твердістю	помірний	5
41	Плід: строк лежкості	помірний	5
42	Час цвітіння	середній	5
43	Час досягання	середній	5
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	низький	3
45	Наявність сріблястості	наявна	9
46	Стійкість до <i>Meloidogyne incognita</i>	ознака не визначалась	0
47	Стійкість до <i>Verticillium dahliae</i> : Paca 0	ознака не визначалась	0
48,1	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>Lycopersici</i> : Paca 0	ознака не визначалась	0
48,2	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>Lycopersici</i> : Paca 1	ознака не визначалась	0
49	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>radicis lycopersici</i>	ознака не визначалась	0
50,1	Стійкість до <i>Cladosporium fulvum</i> : Paca 0	ознака не визначалась	0
50,2	Стійкість до <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи А	ознака не визначалась	0

50,3	Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи В	ознака не визначалась	0
50,4	Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи С	ознака не визначалась	0
50,5	Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи D	ознака не визначалась	0
50,6	Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи Е	ознака не визначалась	0
51,1	Стійкість до Tomato Mosaic Virus: Патотипу 0	ознака не визначалась	0
51,2	Стійкість до Mosaic Virus: Патотипу 1	ознака не визначалась	0
51,3	Стійкість до Mosaic Virus: Патотипу 2	ознака не визначалась	0
51,4	Стійкість до Mosaic Virus: Патотипу 1 - 2	ознака не визначалась	0
52	Стійкість до Phytophthora infestans	ознака не визначалась	0
53	Стійкість до Pyrenochaeta lycopersici	ознака не визначалась	0
54	Стійкість до Stemphylium spp.	ознака не визначалась	0
55	Стійкість до Pseudomonas syringae pv. Tomato	ознака не визначалась	0
56	Стійкість до Ralstonia solanacearum	ознака не визначалась	0
57	Стійкість до Tomato Yellow Leaf Curl Virus	ознака не визначалась	0
58	Стійкість до Tomato Spotted Wilt Virus	ознака не визначалась	0
59	Стійкість до Leveillula taurica	ознака не визначалась	0
60	Стійкість до Oidium lycopersicum	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна урожайність 176 т./га. Маса товарного плоду 160 г. Період від повних сходів до початку дозрівання 95 діб. Період плодоношення 130 діб. Вміст сухої речовини в плоді 5,3%. Вміст загального цукру 3,9%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Закритий ґрунт

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.

Заявка №: 11040027 Назва сорту Старбак

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 30.11.2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

07.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140220

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилія	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2
3	Тільки детермінантні сорти: Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	ознака не визначається	0
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	відсутнє або дуже слабке	1
5	Тільки індетермінантні сорти: Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	середнє	5
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	горизонтальний	5
7	Листок: за довжиною	середній	5
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	великий	7
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
12	Листок: глянуватість (як для 6)	помірна	5
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	помірна	5
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	середні	5
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	піднесене	3
16	Суцвіття: інтенсивність галузнення (другої і третьої китиці)	в основному 1 гілка	1
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	наявна	9
18	Квітка: опушення приймочки	наявне	9
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки)	коротка	3
22	Плід: за розміром	дуже великий	9
23	Плід: відношення довжини до діаметра	маленьке	3
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	плескато-округла	2
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	помірна	5
26	Плід: форма поперечного перерізу	кругlastа	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	помірне	5
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	середній	5
29	Плід: розмір квіткового рубця	середній	5
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3
31	Плід: розмір плаценти у поперечному перерізі	великий	7
32	Плід: за товщиною перикарпу	товстий	7
33	Плід: кількість камер	чотири, п'ять або шість	4
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1
35	Плід: розмір зеленого плеча (як для 34)	ознака не визначається	0
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (як для 34)	ознака не визначається	0
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (як для 34)	світле	3
38	Плід: колір за досягання	червоний	5
39	Плід: колір м'якоті (як для 38)	червоний	5
40	Плід: за твердістю	твердий	7
41	Плід: строк лежкості	ознака не визначалась	0
42	Час цвітіння	пізній	7
43	Час досягання	дуже пізній	9
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	ознака не визначалась	0
45	Наявність сріблястості	ознака не визначалась	0
46	Стійкість до <i>Meloidogyne incognita</i>	відсутня	1
47	Стійкість до <i>Verticillium dahliae</i> : Paca 0	наявна	9
48,1	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>Lycopersici</i> : Paca 0	наявна	9
48,2	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>Lycopersici</i> : Paca 1	наявна	9
49	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>radicis lycopersici</i>	ознака не визначалась	0
50,1	Стійкість до <i>Cladosporium fulvum</i> : Paca 0	ознака не визначалась	0
50,2	Стійкість до <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи А	наявна	9

50,3	Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи В	наявна	9
50,4	Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи С	наявна	9
50,5	Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи D	наявна	9
50,6	Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи Е	наявна	9
51,1	Стійкість до Tomato Mosaic Virus: Патотипу 0	відсутня	1
51,2	Стійкість до Mosaic Virus: Патотипу 1	відсутня	1
51,3	Стійкість до Mosaic Virus: Патотипу 2	відсутня	1
51,4	Стійкість до Mosaic Virus: Патотипу 1 - 2	ознака не визначалась	0
52	Стійкість до Phytophthora infestans	ознака не визначалась	0
53	Стійкість до Pyrenochaeta lycopersici	ознака не визначалась	0
54	Стійкість до Stemphylium spp.	ознака не визначалась	0
55	Стійкість до Pseudomonas syringae pv. Tomato	ознака не визначалась	0
56	Стійкість до Ralstonia solanacearum	ознака не визначалась	0
57	Стійкість до Tomato Yellow Leaf Curl Virus	ознака не визначалась	0
58	Стійкість до Tomato Spotted Wilt Virus	ознака не визначалась	0
59	Стійкість до Leveillula taurica	ознака не визначалась	0
60	Стійкість до Oidium lycopersicum	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Маса товарного плоду 250 г. Період від повних сходів до початку дозрівання 70 діб. Період плодоношення 71 доба. Вміст сухої речовини в плоді 6%. Вміст загального цукру 3,8%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Закритий ґрунт

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.

Заявка №: 09040059 **Назва сорту** Таня F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

24.02.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140073

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилія	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	детермінантний	1
3	Тільки детермінантні сорти: Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	середня кількість	5
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	відсутнє або дуже слабке	1
5	Тільки індетермінантні сорти: Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	ознака не визначається	0
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	піднесений	3
7	Листок: за довжиною	довгий	7
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
12	Листок: глянсуватість (як для 6)	слабка	3
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	слабка	3
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	малі	3
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	піднесене	3
16	Суцвіття: інтенсивність галуження (другої і третьої китиці)	багато	3
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення приймочки	відсутнє або дуже слабке	1
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки)	коротка	3
22	Плід: за розміром	великий	7
23	Плід: відношення довжини до діаметра	велике	7
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	округла	3
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	помірна	5
26	Плід: форма поперечного перерізу	кругlastа	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	помірне	5
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	середній	5
29	Плід: розмір квіткового рубця	дуже маленький	1
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3
31	Плід: розмір плаценти у поперечному перерізі	середній	5
32	Плід: за товщиною перикарпу	середній	5
33	Плід: кількість камер	чотири, п'ять або шість	4
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1
35	Плід: розмір зеленого плеча (як для 34)	ознака не визначається	0
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (як для 34)	ознака не визначається	0
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (як для 34)	помірне	5
38	Плід: колір за досягання	червоний	5
39	Плід: колір м'якоті (як для 38)	червоний	5
40	Плід: за твердістю	твердий	7
41	Плід: строк лежкості	тривалий	7
42	Час цвітіння	середній	5
43	Час досягання	середній	5
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	помірний	5
45	Наявність сріблястості	відсутня	1
46	Стійкість до <i>Meloidogyne incognita</i>	ознака не визначалась	0
47	Стійкість до <i>Verticillium dahliae</i> : Paca 0	ознака не визначалась	0
48,1	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>Lycopersici</i> : Paca 0	ознака не визначалась	0
48,2	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>Lycopersici</i> : Paca 1	ознака не визначалась	0
49	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>radicis lycopersici</i>	ознака не визначалась	0
50,1	Стійкість до <i>Cladosporium fulvum</i> : Paca 0	ознака не визначалась	0
50,2	Стійкість до <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи А	ознака не визначалась	0

50,3	Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи В	ознака не визначалась	0
50,4	Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи С	ознака не визначалась	0
50,5	Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи D	ознака не визначалась	0
50,6	Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи Е	ознака не визначалась	0
51,1	Стійкість до Tomato Mosaic Virus: Патотипу 0	ознака не визначалась	0
51,2	Стійкість до Mosaic Virus: Патотипу 1	ознака не визначалась	0
51,3	Стійкість до Mosaic Virus: Патотипу 2	ознака не визначалась	0
51,4	Стійкість до Mosaic Virus: Патотипу 1 - 2	ознака не визначалась	0
52	Стійкість до Phytophthora infestans	ознака не визначалась	0
53	Стійкість до Pyrenochaeta lycopersici	ознака не визначалась	0
54	Стійкість до Stemphylium spp.	ознака не визначалась	0
55	Стійкість до Pseudomonas syringae pv. Tomato	ознака не визначалась	0
56	Стійкість до Ralstonia solanacearum	ознака не визначалась	0
57	Стійкість до Tomato Yellow Leaf Curl Virus	ознака не визначалась	0
58	Стійкість до Tomato Spotted Wilt Virus	ознака не визначалась	0
59	Стійкість до Leveillula taurica	ознака не визначалась	0
60	Стійкість до Oidium lycopersicum	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна урожайність – 88,9 т/га; маса товарного плоду - 220 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 75 днів; період плодоношення - 62 днів; вміст сухої речовини в плоді - 6,8%; вміст загального цукру – 4,5 %; вміст вітаміну С – 24,2 мг%; загальна кислотність – 0,56%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Степ, Лісостеп, Полісся

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.

Заявка №: 13115014 Назва сорту Фізума

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

07.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140223

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилія	відсутнє	1
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2
3	Тільки детермінантні сорти: Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	ознака не визначається	0
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	відсутнє або дуже слабке	1
5	Тільки індетермінантні сорти: Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	середнє	5
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	горизонтальний	5
7	Листок: за довжиною	середній	5
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
12	Листок: глянуватість (як для 6)	помірна	5
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	помірна	5
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	середні	5
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	горизонтальне	5
16	Суцвіття: інтенсивність галуження (другої і третьої китиці)	в основному 1 гілка	1
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	наявна	9
18	Квітка: опушення приймочки	наявне	9
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки)	середня	5
22	Плід: за розміром	великий	7
23	Плід: відношення довжини до діаметра	маленьке	3
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	плескато-округла	2
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	помірна	5
26	Плід: форма поперечного перерізу	кругlastа	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	милке	3
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	середній	5
29	Плід: розмір квіткового рубця	середній	5
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3
31	Плід: розмір плаценти у поперечному перерізі	великий	7
32	Плід: за товщиною перикарпу	товстий	7
33	Плід: кількість камер	чотири, п'ять або шість	4
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1
35	Плід: розмір зеленого плеча (як для 34)	ознака не визначається	0
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (як для 34)	ознака не визначається	0
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (як для 34)	ознака не визначалась	0
38	Плід: колір за досягання	червоний	5
39	Плід: колір м'якоті (як для 38)	червоний	5
40	Плід: за твердістю	твердий	7
41	Плід: строк лежкості	помірний	5
42	Час цвітіння	середній	5
43	Час досягання	середній	5
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	помірний	5
45	Наявність сріблястості	наявна	9
46	Стійкість до <i>Meloidogyne incognita</i>	відсутня	1
47	Стійкість до <i>Verticillium dahliae</i> : Paca 0	наявна	9
48,1	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>Lycopersici</i> : Paca 0	наявна	9
48,2	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>Lycopersici</i> : Paca 1	наявна	9
49	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>radicis lycopersici</i>	наявна	9
50,1	Стійкість до <i>Cladosporium fulvum</i> : Paca 0	наявна	9
50,2	Стійкість до <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи А	наявна	9

50,3	Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи В	наявна	9
50,4	Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи С	наявна	9
50,5	Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи D	наявна	9
50,6	Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи Е	наявна	9
51,1	Стійкість до Tomato Mosaic Virus: Патотипу 0	наявна	9
51,2	Стійкість до Mosaic Virus: Патотипу 1	наявна	9
51,3	Стійкість до Mosaic Virus: Патотипу 2	наявна	9
51,4	Стійкість до Mosaic Virus: Патотипу 1 - 2	наявна	9
52	Стійкість до Phytophthora infestans	відсутня	1
53	Стійкість до Pyrenochaeta lycopersici	відсутня	1
54	Стійкість до Stemphylium spp.	відсутня	1
55	Стійкість до Pseudomonas syringae pv. Tomato	відсутня	1
56	Стійкість до Ralstonia solanacearum	відсутня	1
57	Стійкість до Tomato Yellow Leaf Curl Virus	відсутня	1
58	Стійкість до Tomato Spotted Wilt Virus	відсутня	1
59	Стійкість до Leveillula taurica	відсутня	1
60	Стійкість до Oidium lycopersicum	наявна	9

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Маса товарного плоду 220 г. Період від повних сходів до початку дозрівання 93 доби. Період плодоношення 225 діб. Вміст сухої речовини в плоді 6,1%. Вміст загального цукру 14%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Закритий ґрунт

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.

Заявка №: 11040026 Назва сорту Форонті

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 30.11.2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

07.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140219

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилія	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2
3	Тільки детермінантні сорти: Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	ознака не визначається	0
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	відсутнє або дуже слабе	1
5	Тільки індетермінантні сорти: Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	середнє	5
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	похилий	7
7	Листок: за довжиною	середній	5
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	великий	7
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
12	Листок: глянсуватість (як для 6)	помірна	5
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	помірна	5
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	середні	5
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	піднесене	3
16	Суцвіття: інтенсивність галузнення (другої і третьої китиці)	в основному 1 гілка	1
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	наявна	9
18	Квітка: опушення приймочки	наявне	9
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки)	коротка	3
22	Плід: за розміром	великий	7
23	Плід: відношення довжини до діаметра	маленьке	3
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	плескато-округла	2
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	слабка	3
26	Плід: форма поперечного перерізу	кругlastа	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	помірне	5
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	середній	5
29	Плід: розмір квіткового рубця	середній	5
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3
31	Плід: розмір плаценти у поперечному перерізі	великий	7
32	Плід: за товщиною перикарпу	товстий	7
33	Плід: кількість камер	більше шести	5
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1
35	Плід: розмір зеленого плеча (як для 34)	ознака не визначається	0
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (як для 34)	ознака не визначається	0
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (як для 34)	світле	3
38	Плід: колір за досягання	червоний	5
39	Плід: колір м'якоті (як для 38)	червоний	5
40	Плід: за твердістю	твердий	7
41	Плід: строк лежкості	ознака не визначалась	0
42	Час цвітіння	пізній	7
43	Час досягання	пізній	7
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	ознака не визначалась	0
45	Наявність сріблястості	ознака не визначалась	0
46	Стійкість до <i>Meloidogyne incognita</i>	відсутня	1
47	Стійкість до <i>Verticillium dahliae</i> : Paca 0	наявна	9
48,1	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>Lycopersici</i> : Paca 0	наявна	9
48,2	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>Lycopersici</i> : Paca 1	наявна	9
49	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>radicis lycopersici</i>	наявна	9
50,1	Стійкість до <i>Cladosporium fulvum</i> : Paca 0	ознака не визначалась	0
50,2	Стійкість до <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи А	наявна	9

50,3	Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи В	наявна	9
50,4	Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи С	наявна	9
50,5	Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи D	наявна	9
50,6	Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи Е	наявна	9
51,1	Стійкість до Tomato Mosaic Virus: Патотипу 0	наявна	9
51,2	Стійкість до Mosaic Virus: Патотипу 1	наявна	9
51,3	Стійкість до Mosaic Virus: Патотипу 2	наявна	9
51,4	Стійкість до Mosaic Virus: Патотипу 1 - 2	ознака не визначалась	0
52	Стійкість до Phytophthora infestans	ознака не визначалась	0
53	Стійкість до Pyrenochaeta lycopersici	ознака не визначалась	0
54	Стійкість до Stemphylium spp.	ознака не визначалась	0
55	Стійкість до Pseudomonas syringae pv. Tomato	ознака не визначалась	0
56	Стійкість до Ralstonia solanacearum	ознака не визначалась	0
57	Стійкість до Tomato Yellow Leaf Curl Virus	відсутня	1
58	Стійкість до Tomato Spotted Wilt Virus	відсутня	1
59	Стійкість до Leveillula taurica	ознака не визначалась	0
60	Стійкість до Oidium lycopersicum	наявна	9

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Маса товарного плоду 275 г. Період від повних сходів до початку дозрівання 83 доби. Період плодоношення 71 доба. Вміст сухої речовини в плоді 5%. Вміст загального цукру 3,1%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Закритий ґрунт

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.

Заявка №: 09040056 Назва сорту Хердон F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

24.02.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140070

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилія	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	детермінантний	1
3	Тільки детермінантні сорти: Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	середня кількість	5
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	відсутнє або дуже слабе	1
5	Тільки індетермінантні сорти: Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	ознака не визначається	0
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	піднесений	3
7	Листок: за довжиною	середній	5
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	маленький	3
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
12	Листок: глянсуватість (як для 6)	слабка	3
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	слабка	3
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	малі	3
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	піднесене	3
16	Суцвіття: інтенсивність галуження (другої і третьої китиці)	в основному 1 гілка	1
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення приймочки	відсутнє або дуже слабе	1
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки)	середня	5
22	Плід: за розміром	великий	7
23	Плід: відношення довжини до діаметра	дуже велике	9
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	циліндрична	5
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	відсутня або дуже слабка	1
26	Плід: форма поперечного перерізу	крутляста	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	мільке	3
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	маленький	3
29	Плід: розмір квіткового рубця	дуже маленький	1
30	Плід: форма кінця плоду	гостра	5
31	Плід: розмір плаценти у поперечному перерізі	середній	5
32	Плід: за товщиною перикарпу	середній	5
33	Плід: кількість камер	тільки 2	1
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1
35	Плід: розмір зеленого плеча (як для 34)	ознака не визначається	0
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (як для 34)	ознака не визначається	0
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (як для 34)	помірне	5
38	Плід: колір за досягання	червоний	5
39	Плід: колір м'якоті (як для 38)	червоний	5
40	Плід: за твердістю	помірний	5
41	Плід: строк лежкості	помірний	5
42	Час цвітіння	середній	5
43	Час досягання	середній	5
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	низький	3
45	Наявність сріблястості	наявна	9
46	Стійкість до <i>Meloidogyne incognita</i>	ознака не визначалась	0
47	Стійкість до <i>Verticillium dahliae</i> : Paca 0	ознака не визначалась	0
48,1	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>Lycopersici</i> : Paca 0	ознака не визначалась	0
48,2	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>Lycopersici</i> : Paca 1	ознака не визначалась	0
49	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>radicis lycopersici</i>	ознака не визначалась	0
50,1	Стійкість до <i>Cladosporium fulvum</i> : Paca 0	ознака не визначалась	0
50,2	Стійкість до <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи А	ознака не визначалась	0

50,3	Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи В	ознака не визначалась	0
50,4	Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи С	ознака не визначалась	0
50,5	Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи D	ознака не визначалась	0
50,6	Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи Е	ознака не визначалась	0
51,1	Стійкість до Tomato Mosaic Virus: Патотипу 0	ознака не визначалась	0
51,2	Стійкість до Mosaic Virus: Патотипу 1	ознака не визначалась	0
51,3	Стійкість до Mosaic Virus: Патотипу 2	ознака не визначалась	0
51,4	Стійкість до Mosaic Virus: Патотипу 1 - 2	ознака не визначалась	0
52	Стійкість до Phytophthora infestans	ознака не визначалась	0
53	Стійкість до Pyrenochaeta lycopersici	ознака не визначалась	0
54	Стійкість до Stemphylium spp.	ознака не визначалась	0
55	Стійкість до Pseudomonas syringae pv. Tomato	ознака не визначалась	0
56	Стійкість до Ralstonia solanacearum	ознака не визначалась	0
57	Стійкість до Tomato Yellow Leaf Curl Virus	ознака не визначалась	0
58	Стійкість до Tomato Spotted Wilt Virus	ознака не визначалась	0
59	Стійкість до Leveillula taurica	ознака не визначалась	0
60	Стійкість до Oidium lycopersicum	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна урожайність – 93 т/га; маса товарного плоду - 95г; період від повних сходів до початку дозрівання - 121 днів; період плодоношення - 55 днів; вміст сухої речовини в плоді - 6,3%; вміст загального цукру – 3,1 %; вміст вітаміну С – 15,6 мг%; загальна кислотність – 0,57%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Степ, Лісостеп, Полісся

Вид: Редька посівна (редиска) *Raphanus sativus* L. var. *sativus*

Заявка №: 12038003 **Назва сорту** Глоріет

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

17.03.2014

Свідчення про державну реєстрацію № 140352

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Плодючість	диплоїд	2
2	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилі	відсутнє	1
3	Сім'ядолі: за розміром	середні	5
4	Листкова розетка: за шириною зростання біля основи	вузька	3
5	Листок: положення у просторі	висхідне	1
6	Листок: за довжиною	довгий	7
7	Листкова пластинка: за формою	оберненояйцевидна	3
8	Листкова пластинка: форма верхівки	округла	2
9	Листкова пластинка: відтінок зеленого кольору	відсутній	1
10	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого кольору	помірна	5
11	Листкова пластинка: кількість лопатей	мало	3
12	Листкова пластинка: надрізи країв	відсутні	1
13	Листкова пластинка: глибина розрізів краю	ознака не визначалась	0
14	Листкова пластинка: опушення	слабке	3
15	Черешок: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
16	Черешок: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
17	Коренеплід: за товщиною, см	середній	5
18	Коренеплід: товщина головного кореня	середній	5
19	Коренеплід: за формою	округлий	2
20	Коренеплід: форма верхівки	плеската	2
21	Коренеплід: форма основи	плеската	5
22	Коренеплід: забарвлення шкірки	однокольорове	1
23	Коренеплід: забарвлення верхньої частини	червоне	3
24	Коренеплід: характер виявлення червоного кольору у верхній частині	яскраво-червоний (кольору кіноварі)	1
25	Лише для двокольорових сортів. Коренеплід: розмір білої верхівки	ознака не визначається	0
26	Коренеплід: товщина кори	тонка	3
27	Коренеплід: забарвлення м'якоті	напівпрозоре біле	1
28	Час достигання	дуже ранній	1
29	Коренеплід: здатність до утворення дупла	відсутня або дуже слабка	1

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна врожайність 15 т./га. Середня маса плоду 8 г. Тривалість періоду до достигання 27 діб. Вміст сухої речовини 5%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Закритий ґрунт

Вид: Редька посівна (редиска) *Raphanus sativus* L. var. *sativus*

Заявка №: 11038005 **Назва сорту** Ролекс F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

05.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140226

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Плодюність	диплоїд	2
2	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилія	наявне	9
3	Сім'ядолі: за розміром	малі	3
4	Листкова розетка: за шириною зростання біля основи	вузька	3
5	Листок: положення у просторі	напіввисхідне	3
6	Листок: за довжиною	короткий	3
7	Листкова пластинка: за формою	оберненояйцевидна	3
8	Листкова пластинка: форма верхівки	округла	2
9	Листкова пластинка: відтінок зеленого кольору	жовтуватий	2
10	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого кольору	сильна	7
11	Листкова пластинка: кількість лопатей	мало	3
12	Листкова пластинка: надрізи країв	наявні	9
13	Листкова пластинка: глибина розрізів краю	неглибокі	3
14	Листкова пластинка: опушення	помірне	5
15	Черешок: антоціанове забарвлення	наявне	9
16	Черешок: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
17	Коренеплід: за товщиною, см	середній	5
18	Коренеплід: товщина головного кореня	тонкий	3
19	Коренеплід: за формою	округлий	2
20	Коренеплід: форма верхівки	плеската	2
21	Коренеплід: форма основи	округла	4
22	Коренеплід: забарвлення шкірки	однокольорове	1
23	Коренеплід: забарвлення верхньої частини	червоне	3
24	Коренеплід: характер виявлення червоного кольору у верхній частині	багряний	2
25	Лише для двокольорових сортів. Коренеплід: розмір білої верхівки	ознака не визначається	0
26	Коренеплід: товщина кори	середня	5
27	Коренеплід: забарвлення м'якоті	матове біле	2
28	Час достигання	ранній	3
29	Коренеплід: здатність до утворення дупла	відсутня або дуже слабка	1

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна урожайність 27 т./га. Середня маса плоду 25г. Вміст сухої речовини 5,6%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Степ, Лісостеп, Полісся

Вид: Цибуля городня Allium sera L.

Заявка №: 11041020 **Назва сорту** Айсперл F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

05.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140257

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: кількість листків на псевдостеблі	середня кількість	5
2	Листя: положення	напівпряме	3
3	Листя: восковий наліт	слабкий	3
4	Листя: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
5	Листя: зігнутість	сильна	3
6,1	Тільки цибулевi сорти. Листок: за довжиною	середній	5
6,2	Тільки сорти шалот. Листок: за довжиною	ознака не визначається	0
7,1	Тільки цибулевi сорти. Листок: діаметр	середній	5
7,2	Тільки сорти шалот. Листок: діаметр	ознака не визначається	0
8	Тільки цибулевi сорти. Несправжнє стебло: за довжиною (до найвищого зеленого листка)	коротке	3
9	Тільки цибулевi сорти. Несправжнє стебло: діаметр (посередині довжини)	середній	5
10	Тільки сорти, що розмножуються насінням. Цибулина: тенденція до розщеплення на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулини)	відсутня або дуже слабка	1
11	Цибулина: ступінь розщеплення на цибулинки (із сухою шкіркою навколо кожної цибулини)	відсутнє або дуже слабе	1
12,1	Тільки цибулевi сорти. Цибулина: за розміром	велика	7
12,2	Тільки сорти шалот. Цибулина: за розміром	ознака не визначається	0
13,1	Тільки цибулевi сорти. Цибулина: за висотою	висока	7
13,2	Тільки сорти шалот. Цибулина: за висотою	ознака не визначається	0
14,1	Тільки цибулевi сорти. Цибулина: діаметр	середній	5
14,2	Тільки сорти шалот. Цибулина: діаметр	ознака не визначається	0
15,1	Тільки цибулевi сорти. Цибулина: відношення висоти до діаметра	середнє	5
15,2	Тільки сорти шалот. Цибулина: відношення висота /діаметр	ознака не визначається	0
16	Цибулина/цибулінка: позиція максимального діаметра	посередині	2
17	Цибулина/цибулінка: ширина шийки	середня	5
18	Цибулина/ цибулінка: форма (у поздовжньому розрізі)	широкояйцевидна	5
19	Тільки цибулевi сорти. Цибулина: форма верхівки стебла (як для 18)	округла	4
20	Цибулина/цибулінка: форма основи (як для 18)	плеската	2
21	Цибулина/цибулінка: міцність тримання сухої шкірки після збирання	слабка	3
22	Цибулина/цибулінка: товщина сухої шкірки	тонка	3
23	Цибулина/цибулінка: основний колір сухої шкірки	білий	1
24	За винятком сортів з білою сухою шкіркою. Цибулина/цибулінка: інтенсивність основного забарвлення сухої шкірки	ознака не визначається	0
25	Цибулина/цибулінка: відтінок забарвлення сухої шкірки	сіруватий	2
26	Цибулина/цибулінка: забарвлення соковитих лусок	зеленувате	2
27	Цибулина/цибулінка: кількість точок зростання на кг	мало	3
28	Цибулина/цибулінка: вміст сухої речовини	середній	5
29	Тільки цибулевi сорти. Тенденція до стрілкування за весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1
30	Тільки цибулевi сорти. Час стрілкування за весняної сівби	ознака не визначається	0
31	Тільки цибулевi сорти. Тенденція до стрілкування за сівби восени	відсутня або дуже слабка	1
32	Тільки цибулевi сорти. Час стрілкування за сівби восени	ознака не визначається	0
33	Тільки цибулевi сорти. Час збиральної стиглості за сівби восени (листя обпало на 80% рослин)	ознака не визначається	0
34,1	Тільки цибулевi сорти. Час збиральної стиглості за весняної сівби (як для 33)	ранній	3
34,2	Тільки сорти шалот. Час збиральної стиглості (як для 33)	ознака не визначається	0
35	Час проростання за зберігання цибулин	ранній	3
36	Чоловіча стерильність	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна урожайність 65 т./га. Тривалість вегетації рослин 160 діб.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Степ, Лісостеп, Полісся

Вид: Цибуля городня Allium sera L.

Заявка №: 11041015 **Назва сорту** Вайт Вінг F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

05.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140253

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: кількість листків на псевдостеблі	середня кількість	5
2	Листя: положення	від прямого до напівпрямого	2
3	Листя: восковий наліт	слабкий	3
4	Листя: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
5	Листя: зігнутість	помірна	2
6,1	Тільки цибулеві сорти. Листок: за довжиною	дуже довгий	9
6,2	Тільки сорти шалот. Листок: за довжиною	ознака не визначається	0
7,1	Тільки цибулеві сорти. Листок: діаметр	середній	5
7,2	Тільки сорти шалот. Листок: діаметр	ознака не визначається	0
8	Тільки цибулеві сорти. Несправжнє стебло: за довжиною (до найвищого зеленого листка)	коротке	3
9	Тільки цибулеві сорти. Несправжнє стебло: діаметр (посередині довжини)	середній	5
10	Тільки сорти, що розмножуються насінням. Цибулина: тенденція до розщеплення на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулини)	відсутня або дуже слабка	1
11	Цибулина: ступінь розщеплення на цибулинки (із сухою шкіркою навколо кожної цибулини)	відсутнє або дуже слабе	1
12,1	Тільки цибулеві сорти. Цибулина: за розміром	середня	5
12,2	Тільки сорти шалот. Цибулина: за розміром	ознака не визначається	0
13,1	Тільки цибулеві сорти. Цибулина: за висотою	середня	5
13,2	Тільки сорти шалот. Цибулина: за висотою	ознака не визначається	0
14,1	Тільки цибулеві сорти. Цибулина: діаметр	середній	5
14,2	Тільки сорти шалот. Цибулина: діаметр	ознака не визначається	0
15,1	Тільки цибулеві сорти. Цибулина: відношення висоти до діаметра	мале	3
15,2	Тільки сорти шалот. Цибулина: відношення висота /діаметр	ознака не визначається	0
16	Цибулина/цибулінка: позиція максимального діаметра	посередині	2
17	Цибулина/цибулінка: ширина шийки	середня	5
18	Цибулина/ цибулінка: форма (у поздовжньому розрізі)	широкоеліптична	3
19	Тільки цибулеві сорти. Цибулина: форма верхівки стебла (як для 18)	злегка спадаюча	5
20	Цибулина/цибулінка: форма основи (як для 18)	округла	3
21	Цибулина/цибулінка: міцність тримання сухої шкірки після збирання	слабка	3
22	Цибулина/цибулінка: товщина сухої шкірки	тонка	3
23	Цибулина/цибулінка: основний колір сухої шкірки	білий	1
24	За винятком сортів з білою сухою шкіркою. Цибулина/цибулінка: інтенсивність основного забарвлення сухої шкірки	ознака не визначається	0
25	Цибулина/цибулінка: відтінок забарвлення сухої шкірки	сіруватий	2
26	Цибулина/цибулінка: забарвлення соковитих лусок	зеленувате	2
27	Цибулина/цибулінка: кількість точок зростання на кг	мало	3
28	Цибулина/цибулінка: вміст сухої речовини	низький	3
29	Тільки цибулеві сорти. Тенденція до стрілкування за весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1
30	Тільки цибулеві сорти. Час стрілкування за весняної сівби	ознака не визначається	0
31	Тільки цибулеві сорти. Тенденція до стрілкування за сівби восени	ознака не визначається	0
32	Тільки цибулеві сорти. Час стрілкування за сівби восени	ознака не визначається	0
33	Тільки цибулеві сорти. Час збиральної стиглості за сівби восени (листя обпало на 80% рослин)	ознака не визначається	0
34,1	Тільки цибулеві сорти. Час збиральної стиглості за весняної сівби (як для 33)	ранній	3
34,2	Тільки сорти шалот. Час збиральної стиглості (як для 33)	ознака не визначається	0
35	Час проростання за зберігання цибулин	ранній	3
36	Чоловіча стерильність	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна урожайність 55 т./га. Тривалість вегетації рослин 145 діб.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Степ, Лісостеп, Полісся

Вид: Цибуля городня Allium sera L.

Заявка №: 11041016 **Назва сорту** Катінка F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

05.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140254

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: кількість листків на псевдостеблі	середня кількість	5
2	Листя: положення	від прямого до напівпрямого	2
3	Листя: восковий наліт	відсутній або дуже слабкий	1
4	Листя: інтенсивність зеленого забарвлення	світле	3
5	Листя: зігнутість	помірна	2
6,1	Тільки цибулеві сорти. Листок: за довжиною	середній	5
6,2	Тільки сорти шалот. Листок: за довжиною	ознака не визначається	0
7,1	Тільки цибулеві сорти. Листок: діаметр	середній	5
7,2	Тільки сорти шалот. Листок: діаметр	ознака не визначається	0
8	Тільки цибулеві сорти. Несправжнє стебло: за довжиною (до найвищого зеленого листка)	коротке	3
9	Тільки цибулеві сорти. Несправжнє стебло: діаметр (посередині довжини)	середній	5
10	Тільки сорти, що розмножуються насінням. Цибулина: тенденція до розщеплення на цибулини (з сухою шкіркою навколо кожної цибулини)	відсутня або дуже слабка	1
11	Цибулина: ступінь розщеплення на цибулини (із сухою шкіркою навколо кожної цибулини)	відсутнє або дуже слабе	1
12,1	Тільки цибулеві сорти. Цибулина: за розміром	велика	7
12,2	Тільки сорти шалот. Цибулина: за розміром	ознака не визначається	0
13,1	Тільки цибулеві сорти. Цибулина: за висотою	висока	7
13,2	Тільки сорти шалот. Цибулина: за висотою	ознака не визначається	0
14,1	Тільки цибулеві сорти. Цибулина: діаметр	великий	7
14,2	Тільки сорти шалот. Цибулина: діаметр	ознака не визначається	0
15,1	Тільки цибулеві сорти. Цибулина: відношення висоти до діаметра	середнє	5
15,2	Тільки сорти шалот. Цибулина: відношення висота /діаметр	ознака не визначається	0
16	Цибулина/цибулинка: позиція максимального діаметра	посередині	2
17	Цибулина/цибулинка: ширина шийки	вузька	3
18	Цибулина/ цибулинка: форма (у поздовжньому розрізі)	округла	4
19	Тільки цибулеві сорти. Цибулина: форма верхівки стебла (як для 18)	злегка опукла	3
20	Цибулина/цибулинка: форма основи (як для 18)	округла	3
21	Цибулина/цибулинка: міцність тримання сухої шкірки після збирання	помірна	5
22	Цибулина/цибулинка: товщина сухої шкірки	тонка	3
23	Цибулина/цибулинка: основний колір сухої шкірки	коричневий	5
24	За винятком сортів з білою сухою шкіркою. Цибулина/цибулинка: інтенсивність основного забарвлення сухої шкірки	помірне	5
25	Цибулина/цибулинка: відтінок забарвлення сухої шкірки	жовтуватий	4
26	Цибулина/цибулинка: забарвлення соковитих лусок	зеленувате	2
27	Цибулина/цибулинка: кількість точок зростання на кг	мало	3
28	Цибулина/цибулинка: вміст сухої речовини	низький	3
29	Тільки цибулеві сорти. Тенденція до стрілкування за весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1
30	Тільки цибулеві сорти. Час стрілкування за весняної сівби	ознака не визначається	0
31	Тільки цибулеві сорти. Тенденція до стрілкування за сівби восени	відсутня або дуже слабка	1
32	Тільки цибулеві сорти. Час стрілкування за сівби восени	ознака не визначається	0
33	Тільки цибулеві сорти. Час збиральної стиглості за сівби восени (листя обпало на 80% рослин)	ознака не визначається	0
34,1	Тільки цибулеві сорти. Час збиральної стиглості за весняної сівби (як для 33)	ранній	3
34,2	Тільки сорти шалот. Час збиральної стиглості (як для 33)	ознака не визначається	0
35	Час проростання за зберігання цибулин	середній	5
36	Чоловіча стерильність	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна урожайність 65 т./га. Тривалість вегетації рослин 170 діб.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Степ, Лісостеп, Полісся

Вид: Цибуля городня Allium sera L.

Заявка №: 11041019 **Назва сорту** Ред Рум F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

05.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140256

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: кількість листків на псевдостеблі	середня кількість	5
2	Листя: положення	напівпряме	3
3	Листя: восковий наліт	слабкий	3
4	Листя: інтенсивність зеленого забарвлення	світле	3
5	Листя: зігнутість	сильна	3
6,1	Тільки цибулеві сорти. Листок: за довжиною	середній	5
6,2	Тільки сорти шалот. Листок: за довжиною	ознака не визначається	0
7,1	Тільки цибулеві сорти. Листок: діаметр	середній	5
7,2	Тільки сорти шалот. Листок: діаметр	ознака не визначається	0
8	Тільки цибулеві сорти. Несправжнє стебло: за довжиною (до найвищого зеленого листка)	коротке	3
9	Тільки цибулеві сорти. Несправжнє стебло: діаметр (посередині довжини)	середній	5
10	Тільки сорти, що розмножуються насінням. Цибулина: тенденція до розщеплення на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулини)	відсутня або дуже слабка	1
11	Цибулина: ступінь розщеплення на цибулинки (із сухою шкіркою навколо кожної цибулини)	відсутнє або дуже слабе	1
12,1	Тільки цибулеві сорти. Цибулина: за розміром	велика	7
12,2	Тільки сорти шалот. Цибулина: за розміром	ознака не визначається	0
13,1	Тільки цибулеві сорти. Цибулина: за висотою	висока	7
13,2	Тільки сорти шалот. Цибулина: за висотою	ознака не визначається	0
14,1	Тільки цибулеві сорти. Цибулина: діаметр	великий	7
14,2	Тільки сорти шалот. Цибулина: діаметр	ознака не визначається	0
15,1	Тільки цибулеві сорти. Цибулина: відношення висоти до діаметра	середнє	5
15,2	Тільки сорти шалот. Цибулина: відношення висота /діаметр	ознака не визначається	0
16	Цибулина/цибулінка: позиція максимального діаметра	посередині	2
17	Цибулина/цибулінка: ширина шийки	широка	7
18	Цибулина/ цибулінка: форма (у поздовжньому розрізі)	округла	4
19	Тільки цибулеві сорти. Цибулина: форма верхівки стебла (як для 18)	округла	4
20	Цибулина/цибулінка: форма основи (як для 18)	округла	3
21	Цибулина/цибулінка: міцність тримання сухої шкірки після збирання	слабка	3
22	Цибулина/цибулінка: товщина сухої шкірки	середня	5
23	Цибулина/цибулінка: основний колір сухої шкірки	червоний	7
24	За винятком сортів з білою сухою шкіркою. Цибулина/цибулінка: інтенсивність основного забарвлення сухої шкірки	сильне	7
25	Цибулина/цибулінка: відтінок забарвлення сухої шкірки	пурпуровий	8
26	Цибулина/цибулінка: забарвлення соковитих лусок	червонувате	3
27	Цибулина/цибулінка: кількість точок зростання на кг	багато	7
28	Цибулина/цибулінка: вміст сухої речовини	низький	3
29	Тільки цибулеві сорти. Тенденція до стрілкування за весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1
30	Тільки цибулеві сорти. Час стрілкування за весняної сівби	ознака не визначається	0
31	Тільки цибулеві сорти. Тенденція до стрілкування за сівби восени	відсутня або дуже слабка	1
32	Тільки цибулеві сорти. Час стрілкування за сівби восени	ознака не визначається	0
33	Тільки цибулеві сорти. Час збиральної стиглості за сівби восени (листя обпало на 80% рослин)	середній	5
34,1	Тільки цибулеві сорти. Час збиральної стиглості за весняної сівби (як для 33)	ранній	3
34,2	Тільки сорти шалот. Час збиральної стиглості (як для 33)	ознака не визначається	0
35	Час проростання за зберігання цибулин	середній	5
36	Чоловіча стерильність	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна урожайність 65 т./га. Тривалість вегетації рослин 165 діб.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Степ, Лісостеп, Полісся

Вид: Цибуля городня Allium sera L.

Заявка №: 10041005 **Назва сорту** Стур ВС 20

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

05.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140252

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: кількість листків на псевдостеблі	середня кількість	5
2	Листя: положення	від прямого до напівпрямого	2
3	Листя: восковий наліт	помірний	5
4	Листя: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
5	Листя: зігнутість	помірна	2
6,1	Тільки цибулеві сорти. Листок: за довжиною	довгий	7
6,2	Тільки сорти шалот. Листок: за довжиною	ознака не визначається	0
7,1	Тільки цибулеві сорти. Листок: діаметр	середній	5
7,2	Тільки сорти шалот. Листок: діаметр	ознака не визначається	0
8	Тільки цибулеві сорти. Несправжнє стебло: за довжиною (до найвищого зеленого листка)	середнє	5
9	Тільки цибулеві сорти. Несправжнє стебло: діаметр (посередині довжини)	середній	5
10	Тільки сорти, що розмножуються насінням. Цибулина: тенденція до розщеплення на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулини)	відсутня або дуже слабка	1
11	Цибулина: ступінь розщеплення на цибулинки (із сухою шкіркою навколо кожної цибулини)	відсутнє або дуже слабе	1
12,1	Тільки цибулеві сорти. Цибулина: за розміром	середня	5
12,2	Тільки сорти шалот. Цибулина: за розміром	ознака не визначається	0
13,1	Тільки цибулеві сорти. Цибулина: за висотою	середня	5
13,2	Тільки сорти шалот. Цибулина: за висотою	ознака не визначається	0
14,1	Тільки цибулеві сорти. Цибулина: діаметр	середній	5
14,2	Тільки сорти шалот. Цибулина: діаметр	ознака не визначається	0
15,1	Тільки цибулеві сорти. Цибулина: відношення висоти до діаметра	середнє	5
15,2	Тільки сорти шалот. Цибулина: відношення висота /діаметр	ознака не визначається	0
16	Цибулина/цибулінка: позиція максимального діаметра	посередині	2
17	Цибулина/цибулінка: ширина шийки	середня	5
18	Цибулина/ цибулінка: форма (у поздовжньому розрізі)	округла	4
19	Тільки цибулеві сорти. Цибулина: форма верхівки стебла (як для 18)	злегка опукла	3
20	Цибулина/цибулінка: форма основи (як для 18)	округла	3
21	Цибулина/цибулінка: міцність тримання сухої шкірки після збирання	помірна	5
22	Цибулина/цибулінка: товщина сухої шкірки	товста	7
23	Цибулина/цибулінка: основний колір сухої шкірки	коричневий	5
24	За винятком сортів з білою сухою шкіркою. Цибулина/цибулінка: інтенсивність основного забарвлення сухої шкірки	помірне	5
25	Цибулина/цибулінка: відтінок забарвлення сухої шкірки	коричнюватий	5
26	Цибулина/цибулінка: забарвлення соковитих лусок	зеленувате	2
27	Цибулина/цибулінка: кількість точок зростання на кг	дуже мало	1
28	Цибулина/цибулінка: вміст сухої речовини	середній	5
29	Тільки цибулеві сорти. Тенденція до стрілкування за весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1
30	Тільки цибулеві сорти. Час стрілкування за весняної сівби	ознака не визначається	0
31	Тільки цибулеві сорти. Тенденція до стрілкування за сівби восени	відсутня або дуже слабка	1
32	Тільки цибулеві сорти. Час стрілкування за сівби восени	ознака не визначається	0
33	Тільки цибулеві сорти. Час збиральної стиглості за сівби восени (листя обпало на 80% рослин)	середній	5
34,1	Тільки цибулеві сорти. Час збиральної стиглості за весняної сівби (як для 33)	середній	5
34,2	Тільки сорти шалот. Час збиральної стиглості (як для 33)	ознака не визначається	0
35	Час проростання за зберігання цибулин	середній	5
36	Чоловіча стерильність	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна урожайність 61 т./га. Тривалість вегетації рослин 190 діб.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Степ, Лісостеп, Полісся

Вид: Цибуля городня Allium sera L.

Заявка №: 11041021 Назва сорту: Хієло

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

05.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140258

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: кількість листків на псевдостеблі	середня кількість	5
2	Листя: положення	пряме	1
3	Листя: восковий наліт	слабкий	3
4	Листя: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
5	Листя: зігнутість	помірна	2
6,1	Тільки цибулеві сорти. Листок: за довжиною	довгий	7
6,2	Тільки сорти шалот. Листок: за довжиною	ознака не визначається	0
7,1	Тільки цибулеві сорти. Листок: діаметр	середній	5
7,2	Тільки сорти шалот. Листок: діаметр	ознака не визначається	0
8	Тільки цибулеві сорти. Несправжнє стебло: за довжиною (до найвищого зеленого листка)	коротке	3
9	Тільки цибулеві сорти. Несправжнє стебло: діаметр (посередині довжини)	середній	5
10	Тільки сорти, що розмножуються насінням. Цибулина: тенденція до розщеплення на цибулини (з сухою шкіркою навколо кожної цибулини)	відсутня або дуже слабка	1
11	Цибулина: ступінь розщеплення на цибулини (із сухою шкіркою навколо кожної цибулини)	відсутнє або дуже слабе	1
12,1	Тільки цибулеві сорти. Цибулина: за розміром	середня	5
12,2	Тільки сорти шалот. Цибулина: за розміром	ознака не визначається	0
13,1	Тільки цибулеві сорти. Цибулина: за висотою	середня	5
13,2	Тільки сорти шалот. Цибулина: за висотою	ознака не визначається	0
14,1	Тільки цибулеві сорти. Цибулина: діаметр	середній	5
14,2	Тільки сорти шалот. Цибулина: діаметр	ознака не визначається	0
15,1	Тільки цибулеві сорти. Цибулина: відношення висоти до діаметра	мале	3
15,2	Тільки сорти шалот. Цибулина: відношення висота /діаметр	ознака не визначається	0
16	Цибулина/цибулинка: позиція максимального діаметра	посередині	2
17	Цибулина/цибулинка: ширина шийки	середня	5
18	Цибулина/ цибулинка: форма (у поздовжньому розрізі)	округла	4
19	Тільки цибулеві сорти. Цибулина: форма верхівки стебла (як для 18)	округла	4
20	Цибулина/цибулинка: форма основи (як для 18)	округла	3
21	Цибулина/цибулинка: міцність тримання сухої шкірки після збирання	слабка	3
22	Цибулина/цибулинка: товщина сухої шкірки	тонка	3
23	Цибулина/цибулинка: основний колір сухої шкірки	білий	1
24	За винятком сортів з білою сухою шкіркою. Цибулина/цибулинка: інтенсивність основного забарвлення сухої шкірки	ознака не визначається	0
25	Цибулина/цибулинка: відтінок забарвлення сухої шкірки	відсутній	1
26	Цибулина/цибулинка: забарвлення соковитих лусок	зеленувате	2
27	Цибулина/цибулинка: кількість точок зростання на кг	мало	3
28	Цибулина/цибулинка: вміст сухої речовини	низький	3
29	Тільки цибулеві сорти. Тенденція до стрілкування за весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1
30	Тільки цибулеві сорти. Час стрілкування за весняної сівби	ознака не визначається	0
31	Тільки цибулеві сорти. Тенденція до стрілкування за сівби восени	відсутня або дуже слабка	1
32	Тільки цибулеві сорти. Час стрілкування за сівби восени	ознака не визначається	0
33	Тільки цибулеві сорти. Час збиральної стиглості за сівби восени (листя обпало на 80% рослин)	ранній	3
34,1	Тільки цибулеві сорти. Час збиральної стиглості за весняної сівби (як для 33)	ранній	3
34,2	Тільки сорти шалот. Час збиральної стиглості (як для 33)	ознака не визначається	0
35	Час проростання за зберігання цибулин	ранній	3
36	Чоловіча стерильність	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна урожайність 45 т./га. Тривалість вегетації рослин 165 діб.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Степ, Лісостеп, Полісся

Вид: Цибуля городня Allium sera L.

Заявка №: 10041003 **Назва сорту** Центуріон F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 30.11.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

05.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140251

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: кількість листків на псевдостеблі	середня кількість	5
2	Листя: положення	напівпряме	3
3	Листя: восковий наліт	помірний	5
4	Листя: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
5	Листя: зігнутість	сильна	3
6,1	Тільки цибулеві сорти. Листок: за довжиною	середній	5
6,2	Тільки сорти шалот. Листок: за довжиною	ознака не визначається	0
7,1	Тільки цибулеві сорти. Листок: діаметр	середній	5
7,2	Тільки сорти шалот. Листок: діаметр	ознака не визначається	0
8	Тільки цибулеві сорти. Несправжнє стебло: за довжиною (до найвищого зеленого листка)	середнє	5
9	Тільки цибулеві сорти. Несправжнє стебло: діаметр (посередині довжини)	середній	5
10	Тільки сорти, що розмножуються насінням. Цибулина: тенденція до розщеплення на цибулини (з сухою шкіркою навколо кожної цибулини)	відсутня або дуже слабка	1
11	Цибулина: ступінь розщеплення на цибулини (із сухою шкіркою навколо кожної цибулини)	відсутнє або дуже слабе	1
12,1	Тільки цибулеві сорти. Цибулина: за розміром	середня	5
12,2	Тільки сорти шалот. Цибулина: за розміром	ознака не визначається	0
13,1	Тільки цибулеві сорти. Цибулина: за висотою	середня	5
13,2	Тільки сорти шалот. Цибулина: за висотою	ознака не визначається	0
14,1	Тільки цибулеві сорти. Цибулина: діаметр	малий	3
14,2	Тільки сорти шалот. Цибулина: діаметр	ознака не визначається	0
15,1	Тільки цибулеві сорти. Цибулина: відношення висоти до діаметра	середнє	5
15,2	Тільки сорти шалот. Цибулина: відношення висота /діаметр	ознака не визначається	0
16	Цибулина/цибулинка: позиція максимального діаметра	посередині	2
17	Цибулина/цибулинка: ширина шийки	середня	5
18	Цибулина/ цибулинка: форма (у поздовжньому розрізі)	округла	4
19	Тільки цибулеві сорти. Цибулина: форма верхівки стебла (як для 18)	злегка опукла	3
20	Цибулина/цибулинка: форма основи (як для 18)	округла	3
21	Цибулина/цибулинка: міцність тримання сухої шкірки після збирання	помірна	5
22	Цибулина/цибулинка: товщина сухої шкірки	середня	5
23	Цибулина/цибулинка: основний колір сухої шкірки	коричневий	5
24	За винятком сортів з білою сухою шкіркою. Цибулина/цибулинка: інтенсивність основного забарвлення сухої шкірки	помірне	5
25	Цибулина/цибулинка: відтінок забарвлення сухої шкірки	коричнюватий	5
26	Цибулина/цибулинка: забарвлення соковитих лусок	зеленувате	2
27	Цибулина/цибулинка: кількість точок зростання на кг	дуже мало	1
28	Цибулина/цибулинка: вміст сухої речовини	середній	5
29	Тільки цибулеві сорти. Тенденція до стрілкування за весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1
30	Тільки цибулеві сорти. Час стрілкування за весняної сівби	ознака не визначається	0
31	Тільки цибулеві сорти. Тенденція до стрілкування за сівби восени	відсутня або дуже слабка	1
32	Тільки цибулеві сорти. Час стрілкування за сівби восени	ознака не визначається	0
33	Тільки цибулеві сорти. Час збиральної стиглості за сівби восени (листя обпало на 80% рослин)	середній	5
34,1	Тільки цибулеві сорти. Час збиральної стиглості за весняної сівби (як для 33)	середній	5
34,2	Тільки сорти шалот. Час збиральної стиглості (як для 33)	ознака не визначається	0
35	Час проростання за зберігання цибулин	середній	5
36	Чоловіча стерильність	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна урожайність 58 т./га. Тривалість вегетації рослин 190 діб.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Степ, Лісостеп, Полісся

Вид: Цибуля городня Allium sera L.

Заявка №: 11041017 **Назва сорту** Шерман F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

05.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140255

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: кількість листків на псевдостеблі	середня кількість	5
2	Листя: положення	від прямого до напівпрямого	2
3	Листя: восковий наліт	слабкий	3
4	Листя: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
5	Листя: зігнутість	помірна	2
6,1	Тільки цибулеві сорти. Листок: за довжиною	середній	5
6,2	Тільки сорти шалот. Листок: за довжиною	ознака не визначається	0
7,1	Тільки цибулеві сорти. Листок: діаметр	середній	5
7,2	Тільки сорти шалот. Листок: діаметр	ознака не визначається	0
8	Тільки цибулеві сорти. Несправжнє стебло: за довжиною (до найвищого зеленого листка)	коротке	3
9	Тільки цибулеві сорти. Несправжнє стебло: діаметр (посередині довжини)	середній	5
10	Тільки сорти, що розмножуються насінням. Цибулина: тенденція до розщеплення на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулини)	відсутня або дуже слабка	1
11	Цибулина: ступінь розщеплення на цибулинки (із сухою шкіркою навколо кожної цибулини)	відсутнє або дуже слабе	1
12,1	Тільки цибулеві сорти. Цибулина: за розміром	середня	5
12,2	Тільки сорти шалот. Цибулина: за розміром	ознака не визначається	0
13,1	Тільки цибулеві сорти. Цибулина: за висотою	середня	5
13,2	Тільки сорти шалот. Цибулина: за висотою	ознака не визначається	0
14,1	Тільки цибулеві сорти. Цибулина: діаметр	середній	5
14,2	Тільки сорти шалот. Цибулина: діаметр	ознака не визначається	0
15,1	Тільки цибулеві сорти. Цибулина: відношення висоти до діаметра	мале	3
15,2	Тільки сорти шалот. Цибулина: відношення висота /діаметр	ознака не визначається	0
16	Цибулина/цибулінка: позиція максимального діаметра	посередині	2
17	Цибулина/цибулінка: ширина шийки	вузька	3
18	Цибулина/ цибулінка: форма (у поздовжньому розрізі)	округла	4
19	Тільки цибулеві сорти. Цибулина: форма верхівки стебла (як для 18)	округла	4
20	Цибулина/цибулінка: форма основи (як для 18)	округла	3
21	Цибулина/цибулінка: міцність тримання сухої шкірки після збирання	помірна	5
22	Цибулина/цибулінка: товщина сухої шкірки	тонка	3
23	Цибулина/цибулінка: основний колір сухої шкірки	коричневий	5
24	За винятком сортів з білою сухою шкіркою. Цибулина/цибулінка: інтенсивність основного забарвлення сухої шкірки	помірне	5
25	Цибулина/цибулінка: відтінок забарвлення сухої шкірки	коричнюватий	5
26	Цибулина/цибулінка: забарвлення соковитих лусок	зеленувате	2
27	Цибулина/цибулінка: кількість точок зростання на кг	дуже мало	1
28	Цибулина/цибулінка: вміст сухої речовини	низький	3
29	Тільки цибулеві сорти. Тенденція до стрілкування за весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1
30	Тільки цибулеві сорти. Час стрілкування за весняної сівби	ознака не визначається	0
31	Тільки цибулеві сорти. Тенденція до стрілкування за сівби восени	відсутня або дуже слабка	1
32	Тільки цибулеві сорти. Час стрілкування за сівби восени	ознака не визначається	0
33	Тільки цибулеві сорти. Час збиральної стиглості за сівби восени (листя обпало на 80% рослин)	ознака не визначається	0
34,1	Тільки цибулеві сорти. Час збиральної стиглості за весняної сівби (як для 33)	ранній	3
34,2	Тільки сорти шалот. Час збиральної стиглості (як для 33)	ознака не визначається	0
35	Час проростання за зберігання цибулин	середній	5
36	Чоловіча стерильність	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна урожайність 65 т./га. Тривалість вегетації рослин 163 доби.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Степ, Лісостеп, Полісся

Вид: Жито посівне (озиме) - батьківський компонент *Secale cereale* L.

Заявка №: 10003005 **Назва сорту** 961358Б

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 09.06.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

13.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140265

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: плоідність	диплоїд	2
2	Зернівка: колір алеїронового шару	світлий	1
3	Колеоптіль: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильне	7
4	Колеоптіль: за довжиною	середній	5
5	Прапорцевий листок: довжина піхви	коротка	3
6	Прапорцевий листок: довжина пластинки	коротка	3
7	Рослина: габітус	напіврозлогий	5
8	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний	5
9	Початок колосіння	середнє	5
10	Підпрапорцевий листок: довжина пластинки	коротка	3
11	Підпрапорцевий листок: ширина пластинки	дуже вузька	1
12	Колос: сизий наліт	помірний	5
13	Соломина: опушення під колосом	помірне	5
14	Рослина: за висотою (разом з колосом і остюками)	низька	3
15	Соломина: відстань між верхнім вузлом та колосом	коротка	3
16	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	5
17	Колос: за щільністю	дуже нещільний	1
18	Колос: положення в просторі	горизонтальний	5
19	Зернівки: маса 1000 шт.	середня	5
20	Зернівка: за довжиною	середня	5
21	Зернівка: забарвлення у фенолі	помірне	5
22	Тип розвитку	озимий	1

Вид: Жито посівне (озиме) - батьківський компонент *Secale cereale* L.

Заявка №: 10003007 **Назва сорту** 120337Б

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 29.06.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

13.03.2014

Свідчення про державну реєстрацію № 140267

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: плоідність	диплоїд	2
2	Зернівка: колір алеїронового шару	світлий	1
3	Колеоптіль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірне	5
4	Колеоптіль: за довжиною	середній	5
5	Прапорцевий листок: довжина піхви	дуже коротка	1
6	Прапорцевий листок: довжина пластинки	коротка	3
7	Рослина: габітус	напіврозлогий	5
8	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7
9	Початок колосіння	середнє	5
10	Підпрапорцевий листок: довжина пластинки	коротка	3
11	Підпрапорцевий листок: ширина пластинки	дуже вузька	1
12	Колос: сизий наліт	помірний	5
13	Соломина: опушення під колосом	помірне	5
14	Рослина: за висотою (разом з колосом і остюками)	низька	3
15	Соломина: відстань між верхнім вузлом та колосом	середня	5
16	Колос: за довжиною (без остюків)	короткий	3
17	Колос: за щільністю	дуже нещільний	1
18	Колос: положення в просторі	напівпрямий	3
19	Зернівки: маса 1000 шт.	низька	3
20	Зернівка: за довжиною	середня	5
21	Зернівка: забарвлення у фенолі	дуже темне	9
22	Тип розвитку	озимий	1

Вид: Жито посівне (озиме) - батьківський компонент Secale cereale L.

Заявка №: 10003006 **Назва сорту** Діхар

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 14.06.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

13.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140266

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: плоідність	диплоїд	2
2	Зернівка: колір алеїронового шару	світлий	1
3	Колеоптіль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірне	5
4	Колеоптіль: за довжиною	середній	5
5	Прапорцевий листок: довжина піхви	дуже коротка	1
6	Прапорцевий листок: довжина пластинки	коротка	3
7	Рослина: габітус	напіврозлогий	5
8	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7
9	Початок колосіння	середнє	5
10	Підпрапорцевий листок: довжина пластинки	коротка	3
11	Підпрапорцевий листок: ширина пластинки	дуже вузька	1
12	Колос: сизий наліт	помірний	5
13	Соломина: опушення під колосом	помірне	5
14	Рослина: за висотою (разом з колосом і остюками)	низька	3
15	Соломина: відстань між верхнім вузлом та колосом	середня	5
16	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	5
17	Колос: за щільністю	дуже нещільний	1
18	Колос: положення в просторі	горизонтальний	5
19	Зернівки: маса 1000 шт.	середня	5
20	Зернівка: за довжиною	середня	5
21	Зернівка: забарвлення у фенолі	дуже темне	9
22	Тип розвитку	озимий	1

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.

Заявка №: 11004074 Назва сорту 1032 НС

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 04.11.2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

17.03.2014

Свідчення про державну реєстрацію № 140339

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	великий	7
6	Листок: положення пластинки у просторі	помірно похиле	5
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
8	Волоть: час цвітіння	пізній	7
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	пізній	7
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	довга	7
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5
28	Качан: за довжиною	довгий	7
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	зубоподібний	4
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовтий	3
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	оранжевий	5
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	дуже сильне	9

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.

Заявка №: 11004057 Назва сорту 11C0201

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 19.09.2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

06.03.2014

Свідчення про державну реєстрацію № 140199

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	від пізнього до дуже пізнього	8
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	від пізнього до дуже пізнього	8
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	довга	7
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	дуже коротка	1
28	Качан: за довжиною	довгий	7
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	циліндрична	3
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	зубоподібний	4
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовтий	3
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	оранжевий	5
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.

Заявка №: 11004058 Назва сорту 11C0201 CCR2151

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 19.09.2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

06.03.2014

Свідчення про державну реєстрацію № 140200

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	пізній	7
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	великий	7
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	пізній	7
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	довга	7
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	дуже коротка	1
28	Качан: за довжиною	короткий	3
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	циліндрична	3
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	зубовий	5
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовтий	3
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	оранжевий	5
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.

Заявка №: 11004072 Назва сорту 123098 НС

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 04.11.2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

17.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140337

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	сильна	3
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
8	Волоть: час цвітіння	від пізнього до дуже пізнього	8
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мало	1
15	Качан: час появи шовку	від пізнього до дуже пізнього	8
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	відсутнє або дуже слабке	1
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	довга	7
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	середня	5
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	дуже довгий	9
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	зубоподібний	4
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовтий	3
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	оранжевий	5
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.

Заявка №: 12004018 Назва сорту 155P680

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 03.02.2012

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

04.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140053

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мало	1
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3
18	Волоть: щільність розташування колосків	нещільне	3
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	коротка	3
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	дуже коротка	1
28	Качан: за довжиною	середній	5
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5
30	Качан: форма	циліндрична	3
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	кременистий	1
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	оранжевий	5
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	оранжевий	5
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.

Заявка №: 11004075 Назва сорту 191 НС

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 04.11.2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

17.03.2014

Свідчення про державну реєстрацію № 140340

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	пізній	7
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	пізній	7
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	середня	5
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	довгий	7
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	зубоподібний	4
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовтий	3
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	оранжевий	5
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	дуже сильне	9

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.

Заявка №: 11004079 Назва сорту 200023 НС

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 04.11.2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

17.03.2014

Свідчення про державну реєстрацію № 140344

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	сильне	7
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	великий	7
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	довга	7
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	середня	5
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	довгий	7
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	зубоподібний	4
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовтий	3
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	оранжевий	5
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	дуже сильне	9

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.

Заявка №: 10004116

Назва сорту 200024 НС

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 15.11.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

14.03.2014

Свідчення про державну реєстрацію № 140332

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	сильне	7
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	довга	7
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5
28	Качан: за довжиною	довгий	7
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	зубоподібний	4
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовтий	3
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	оранжевий	5
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	дуже сильне	9

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.

Заявка №: 10004122 Назва сорту 230174 НС

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 15.11.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

14.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140335

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	світле	1
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	пізній	7
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	пізній	7
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	довга	7
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	середня	5
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5
28	Качан: за довжиною	короткий	3
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовтий	3
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	жовто-оранжевий	4
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.

Заявка №: 11004078

Назва сорту 230177 НС

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 04.11.2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

17.03.2014

Свідчення про державну реєстрацію № 140343

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	темне	3
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
8	Волоть: час цвітіння	пізній	7
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	великий	7
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	пізній	7
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	довга	7
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	довгий	7
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовто-оранжевий	4
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	оранжевий	5
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.

Заявка №: 11004077 Назва сорту 240311 НС

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 04.11.2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

17.03.2014

Свідчення про державну реєстрацію № 140342

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	темне	3
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	середня	5
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	довгий	7
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовтий	3
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	жовто-оранжевий	4
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.

Заявка №: 12004024 Назва сорту 266ФА069

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 03.02.2012

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

04.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140054

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
8	Волоть: час цвітіння	від пізнього до дуже пізнього	8
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	дуже великий	9
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	від пізнього до дуже пізнього	8
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	коротка	3
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3
26	Листок: ширина пластинки	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	середній	5
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	велика	7
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовтий	3
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	жовто-оранжевий	4
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.

Заявка №: 12004014 Назва сорту 284K817

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 03.02.2012

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

04.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140052

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	великий	7
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	довга	7
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	середня	5
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	середній	5
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовто-оранжевий	4
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	оранжевий	5
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.

Заявка №: 10004082 Назва сорту 291Г752

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 13.10.2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

04.03.2014

Свідчення про державну реєстрацію № 140041

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	світле	1
4	Листок: хвилястість краю пластинки	сильна	3
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	помірно похиле	5
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7
18	Волоть: щільність розташування колосків	щільне	7
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	довга	7
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5
28	Качан: за довжиною	середній	5
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовто-оранжевий	4
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	оранжевий	5
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.

Заявка №: 10004119 Назва сорту 316342 НС

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 15.11.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

14.03.2014

Свідчення про державну реєстрацію № 140334

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	темне	3
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	від пізнього до дуже пізнього	8
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мало	1
15	Качан: час появи шовку	від пізнього до дуже пізнього	8
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабе	1
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	відсутнє або дуже слабе	1
18	Волоть: щільність розташування колосків	нещільне	3
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	довга	7
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	середня	5
27	Качан: ніжка за довжиною	дуже коротка	1
28	Качан: за довжиною	середній	5
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовтий	3
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	жовто-оранжевий	4
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.

Заявка №: 10004118 Назва сорту 323289 НС

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 15.11.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

14.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140333

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	від пізнього до дуже пізнього	8
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	сильне	7
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабе	1
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	від пізнього до дуже пізнього	8
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабе	1
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	дуже сильне	9
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	дуже довга	9
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	середня	5
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	довгий	7
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	зубоподібний	4
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовтий	3
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	жовтувато-білий	2
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.

Заявка №: 11004073 Назва сорту 4641 НС

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 04.11.2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

17.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140338

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	темне	3
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	великий	7
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	сильне	7
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	довга	7
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	дуже коротка	1
28	Качан: за довжиною	середній	5
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	зубовий	5
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовтий	3
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	оранжевий	5
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.

Заявка №: 12004012 Назва сорту 465Ц653

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 03.02.2012

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

04.03.2014

Свідчення про державну реєстрацію № 140051

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	світле	1
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
8	Волоть: час цвітіння	від пізнього до дуже пізнього	8
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	від пізнього до дуже пізнього	8
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3
18	Волоть: щільність розташування колосків	нещільне	3
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	довга	7
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	довга	7
28	Качан: за довжиною	середній	5
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовтий	3
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	оранжевий	5
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.

Заявка №: 12004010

Назва сорту 493E747

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 03.02.2012

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

04.03.2014

Свідчення про державну реєстрацію № 140050

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	дуже сильне	9
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	великий	7
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	середня	5
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3
26	Листок: ширина пластинки	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5
28	Качан: за довжиною	середній	5
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5
30	Качан: форма	циліндрична	3
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовто-оранжевий	4
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	оранжевий	5
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.

Заявка №: 11004071 Назва сорту 71 НС

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 04.11.2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

17.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140336

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	від округлої до лопатоподібної	4
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	від пізнього до дуже пізнього	8
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	сильне	7
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	дуже малий	1
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	від пізнього до дуже пізнього	8
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	довга	7
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	дуже коротка	1
28	Качан: за довжиною	довгий	7
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	циліндрична	3
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовтий	3
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	жовто-оранжевий	4
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.

Заявка №: 11004076

Назва сорту 731 НС

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 04.11.2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

17.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140341

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	пізній	7
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	сильне	7
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	великий	7
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	помірно похиле	5
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	пізній	7
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
18	Волоть: щільність розташування колосків	щільне	7
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	довга	7
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3
26	Листок: ширина пластинки	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	середній	5
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	зубоподібний	4
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовто-оранжевий	4
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	оранжевий	5
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.

Заявка №: 10004186 Назва сорту 87ІНІІ

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 29.11.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

06.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140172

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	сильне	7
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	помірно похиле	5
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	середня	5
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5
28	Качан: за довжиною	середній	5
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5
30	Качан: форма	циліндрична	3
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	зубовий	5
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовтий	3
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	жовто-оранжевий	4
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.

Заявка №: 10004191 Назва сорту A00363

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 29.11.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

06.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140177

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	довга	7
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5
28	Качан: за довжиною	довгий	7
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	зубоподібний	4
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовтий	3
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	оранжевий	5
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.

Заявка №: 10004189 Назва сорту B61093

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 29.11.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

06.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140175

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	від пізнього до дуже пізнього	8
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	сильне	7
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	від пізнього до дуже пізнього	8
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	довга	7
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	довгий	7
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовто-оранжевий	4
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	оранжевий	5
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.

Заявка №: 10004185 Назва сорту ВР0773

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 29.11.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

06.03.2014

Свідчення про державну реєстрацію № 140171

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	темне	3
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	помірно похиле	5
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мало	1
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	дуже довга	9
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3
26	Листок: ширина пластинки	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5
28	Качан: за довжиною	довгий	7
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	зубоподібний	4
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовтий	3
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	жовто-оранжевий	4
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.

Заявка №: 10004192 Назва сорту Дж3134з

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 29.11.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

06.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140178

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	пізній	7
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	сильне	7
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	сильне	7
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	дуже великий	9
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	середня кількість	5
15	Качан: час появи шовку	пізній	7
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	довга	7
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	довгий	7
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовто-оранжевий	4
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	оранжевий	5
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.

Заявка №: 10004193 Назва сорту Дж9960з

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 29.11.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

06.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140179

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	сильно похиле	7
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
8	Волоть: час цвітіння	середній	5
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	сильне	7
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	ознака не визначалась	0
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	поникле	9
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	середній	5
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	сильне	7
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	середнє	5
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	сильне	7
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	довга	7
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	довгий	7
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5
30	Качан: форма	конусна	1
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	кременистий	1
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовто-оранжевий	4
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	жовто-оранжевий	4
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.

Заявка №: 10004155 Назва сорту ЕГ2123

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 25.11.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

04.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140170

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	помірне	5
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	сильне	7
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мало	1
15	Качан: час появи шовку	ранній	3
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	довга	7
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	середній	5
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	кременистий	1
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовто-оранжевий	4
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	жовто-оранжевий	4
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.

Заявка №: 10004154 Назва сорту EC3504

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 25.11.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

04.03.2014

Свідчення про державну реєстрацію № 140169

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабе	1
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	довга	7
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	короткий	3
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	зубоподібний	4
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовтий	3
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	жовтий	3
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.

Заявка №: 13909002 Назва сорту K10

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 21.03.2014 Патент №: 140009

Дата пріоритету 30.01.2013

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

13.03.2014

Свідчення про державну реєстрацію № 140313

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	ознака не визначалась	0
4	Листок: хвилястість краю пластинки	ознака не визначалась	0
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	ранній	3
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	дуже сильне	9
18	Волоть: щільність розташування колосків	щільне	7
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	ознака не визначалась	0
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	дуже довга	9
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5
28	Качан: за довжиною	довгий	7
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	зубоподібний	4
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовтий	3
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	оранжевий	5
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.

Заявка №: 13909001 Назва сорту K248

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 21.03.2014 Патент №: 140008

Дата пріоритету 30.01.2013

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

13.03.2014

Свідчення про державну реєстрацію № 140312

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	ознака не визначалась	0
4	Листок: хвилястість краю пластинки	ознака не визначалась	0
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	помірно похиле	5
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
8	Волоть: час цвітіння	середній	5
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	середній	5
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	ознака не визначалась	0
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	довга	7
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	середній	5
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовтий	3
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	жовто-оранжевий	4
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.

Заявка №: 09004759

Назва сорту KB5Г0874

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 01.12.2009

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

13.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140276

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	темне	3
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	середній	5
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мало	1
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	відсутнє або дуже слабке	1
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	довга	7
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	дуже коротка	1
28	Качан: за довжиною	середній	5
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	зубоподібний	4
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовтий	3
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	жовто-оранжевий	4
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.

Заявка №: 09004750

Назва сорту KB7X022

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 01.12.2009

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

13.03.2014

Свідчення про державну реєстрацію № 140273

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	пізній	7
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	дуже великий	9
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мало	1
15	Качан: час появи шовку	пізній	7
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	довга	7
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	середній	5
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовто-оранжевий	4
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	оранжевий	5
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.

Заявка №: 10004065 Назва сорту KB7X1013

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 13.10.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

13.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140279

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	темне	3
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	пізній	7
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мало	1
15	Качан: час появи шовку	пізній	7
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	довга	7
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3
26	Листок: ширина пластинки	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	середній	5
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	зубовий	5
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовтий	3
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	червоно-оранжевий	6
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.

Заявка №: 09004749

Назва сорту KB9Ф604

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 01.12.2009

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

13.03.2014

Свідчення про державну реєстрацію № 140272

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	пізній	7
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	дуже сильне	9
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	пізній	7
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	довга	7
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3
26	Листок: ширина пластинки	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	довгий	7
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	оранжевий	5
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	червоно-оранжевий	6
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.

Заявка №: 09004756

Назва сорту KB9X1018

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 01.12.2009

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

13.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140275

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
8	Волоть: час цвітіння	пізній	7
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	дуже великий	9
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	пізній	7
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
18	Волоть: щільність розташування колосків	нещільне	3
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	довга	7
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5
28	Качан: за довжиною	довгий	7
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	циліндрична	3
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	зубоподібний	4
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовтий	3
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	жовто-оранжевий	4
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.

Заявка №: 10004063

Назва сорту KB9X1024

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 13.10.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

13.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140277

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	темне	3
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	пізній	7
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	пізній	7
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	довга	7
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	середній	5
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовтий	3
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	жовто-оранжевий	4
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.

Заявка №: 10004070

Назва сорту KBCEK 009

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 13.10.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

13.03.2014

Свідчення про державну реєстрацію № 140282

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	дуже ранній	1
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	сильне	7
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	сильне	7
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мало	1
15	Качан: час появи шовку	дуже ранній	1
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	сильне	7
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	дуже сильне	9
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	середня	5
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	середній	5
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	кременистий	1
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	оранжевий	5
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	жовто-оранжевий	4
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.

Заявка №: 10004066 Назва сорту KBCEK 011

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 13.10.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

13.03.2014

Свідчення про державну реєстрацію № 140280

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	темне	3
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	дуже ранній	1
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	помірне	5
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабе	1
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	дуже ранній	1
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	сильне	7
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	довга	7
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	середня	5
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	середній	5
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	конусна	1
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	кременистий	1
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	оранжевий	5
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	оранжевий	5
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабе	1

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.

Заявка №: 09004757

Назва сорту KBCEK 015

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 01.12.2009

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

17.03.2014

Свідчення про державну реєстрацію № 140330

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	від дуже раннього до раннього	2
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	дуже сильне	9
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	сильне	7
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мало	1
15	Качан: час появи шовку	від дуже раннього до раннього	2
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	сильне	7
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	сильне	7
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	довга	7
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	дуже коротка	1
28	Качан: за довжиною	короткий	3
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	кременистий	1
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовто-оранжевий	4
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	жовто-оранжевий	4
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабе	1

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.

Заявка №: 10004064 Назва сорту KBCEK 507

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 13.10.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

13.03.2014

Свідчення про державну реєстрацію № 140278

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	темне	3
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	помірно похиле	5
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	помірно похиле	5
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мало	1
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	довга	7
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	короткий	3
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовтий	3
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	червоно-оранжевий	6
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.

Заявка №: 10004069 Назва сорту KBCEK 509

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 13.10.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

13.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140281

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	темне	3
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	помірно похиле	5
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3
18	Волоть: щільність розташування колосків	щільне	7
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	довга	7
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	короткий	3
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	зубоподібний	4
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовто-оранжевий	4
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	червоний	7
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.

Заявка №: 09004755

Назва сорту KBCEK 510

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 01.12.2009

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

13.03.2014

Свідчення про державну реєстрацію № 140274

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	сильне	7
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	довга	7
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	дуже коротка	1
28	Качан: за довжиною	короткий	3
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	циліндрична	3
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	зубовий	5
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовтий	3
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	жовто-оранжевий	4
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.

Заявка №: 09004758

Назва сорту KBCEK 511

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 01.12.2009

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

17.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140331

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
8	Волоть: час цвітіння	середній	5
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	сильне	7
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	великий	7
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	середній	5
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	довга	7
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5
28	Качан: за довжиною	дуже короткий	1
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	циліндрична	3
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	зубоподібний	4
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовтий	3
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	жовто-оранжевий	4
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.

Заявка №: 11004048 Назва сорту ЛВХ369

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 19.09.2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

06.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140191

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	сильне	7
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	середня	5
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	дуже вузька	1
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	середній	5
29	Качан: діаметр (посередині)	малий	3
30	Качан: форма	конусна	1
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	кременистий	1
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	оранжевий	5
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	оранжевий	5
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	дуже сильне	9

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.

Заявка №: 11004053

Назва сорту ЛДР1687

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 19.09.2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

06.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140195

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	помірно похиле	5
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	сильне	7
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	помірно похиле	5
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	середня	5
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	середня	5
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	довгий	7
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	зубоподібний	4
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовтий	3
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	оранжевий	5
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.

Заявка №: 11004046 Назва сорту ЛЖБ2661

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 19.09.2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

06.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140189

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	сильне	7
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	великий	7
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	ранній	3
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	дуже сильне	9
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
18	Волоть: щільність розташування колосків	щільне	7
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	середнє	5
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	довга	7
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	довгий	7
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	кременистий	1
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовто-оранжевий	4
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	жовто-оранжевий	4
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.
Заявка №: 10004224 Назва сорту ЛІМABO2 ЛІМАВВ26

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 30.11.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

06.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140184

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
8	Волоть: час цвітіння	середній	5
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	середній	5
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
18	Волоть: щільність розташування колосків	нещільне	3
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	дуже довга	9
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	довгий	7
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовтий	3
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	жовто-оранжевий	4
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	слабке	3

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.

Заявка №: 10004225 Назва сорту ЛІМЖАА845

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 30.11.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

06.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140185

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	темне	3
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	довга	7
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	середній	5
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовтий	3
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	жовто-оранжевий	4
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.

Заявка №: 10004223 Назва сорту ЛІМЖІЛ37

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 30.11.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

06.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140183

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	темне	3
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	великий	7
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	сильно похиле	7
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3
18	Волоть: щільність розташування колосків	щільне	7
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	довга	7
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	середній	5
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	циліндрична	3
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	зубоподібний	4
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовтий	3
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	жовтий	3
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.

Заявка №: 10004228 Назва сорту ЛІМЖМЛ26

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 30.11.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

06.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140204

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
8	Волоть: час цвітіння	пізній	7
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	пізній	7
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3
18	Волоть: щільність розташування колосків	щільне	7
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	дуже довга	9
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5
26	Листок: ширина пластинки	середня	5
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	довгий	7
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	зубоподібний	4
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовтий	3
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	жовто-оранжевий	4
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.

Заявка №: 10004229 Назва сорту ЛІМІЛ5420

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 30.11.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

06.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140188

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	довга	7
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	середня	5
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	довгий	7
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовто-оранжевий	4
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	жовто-оранжевий	4
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.

Заявка №: 11004189 Назва сорту ЛІМІВ821

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 24.11.2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

06.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140202

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	від округлої до лопатоподібної	4
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
8	Волоть: час цвітіння	пізній	7
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	великий	7
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мало	1
15	Качан: час появи шовку	пізній	7
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7
18	Волоть: щільність розташування колосків	щільне	7
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	довга	7
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	дуже коротка	1
28	Качан: за довжиною	довгий	7
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	зубоподібний	4
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовтий	3
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	жовто-оранжевий	4
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.

Заявка №: 11004190 Назва сорту ЛІМПЛН13

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 24.11.2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

06.03.2014

Свідчення про державну реєстрацію № 140203

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	дуже пізній	9
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мало	1
15	Качан: час появи шовку	дуже пізній	9
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	відсутнє або дуже слабке	1
18	Волоть: щільність розташування колосків	нещільне	3
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	довга	7
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5
28	Качан: за довжиною	середній	5
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовтий	3
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	жовто-оранжевий	4
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	слабке	3

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.
Заявка №: 10004222 Назва сорту ЛІМФВЕ32 ЛІМІВТ44

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 30.11.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

06.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140182

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мало	1
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	довга	7
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	середня	5
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	середній	5
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	оранжевий	5
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	оранжевий	5
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.

Заявка №: 10004227 Назва сорту ЛІМФДД514

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 30.11.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

06.03.2014

Свідчення про державну реєстрацію № 140187

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	помірно похиле	5
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	середній	5
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	сильне	7
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мало	1
15	Качан: час появи шовку	середній	5
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	дуже сильне	9
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	довга	7
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3
26	Листок: ширина пластинки	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	середній	5
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	оранжевий	5
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	оранжевий	5
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.

Заявка №: 10004226 Назва сорту ЛІМФМЖ841

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 30.11.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

06.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140186

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	середній	5
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	середній	5
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	довга	7
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	середній	5
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовтий	3
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	пурпуровий	8
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.

Заявка №: 11004049 Назва сорту ЛУХ431

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 19.09.2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

06.03.2014

Свідчення про державну реєстрацію № 140192

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	дуже пізній	9
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	помірне	5
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабе	1
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	дуже пізній	9
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3
18	Волоть: щільність розташування колосків	нещільне	3
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	довга	7
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	короткий	3
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовто-оранжевий	4
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	жовто-оранжевий	4
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.

Заявка №: 11004051 Назва сорту ЛФН1961

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 19.09.2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

06.03.2014

Свідчення про державну реєстрацію № 140194

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	від округлої до лопатоподібної	4
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	світле	1
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	від пізнього до дуже пізнього	8
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	від пізнього до дуже пізнього	8
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	дуже коротка	1
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	довга	7
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	довгий	7
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовто-оранжевий	4
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	червоно-оранжевий	6
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.

Заявка №: 11004050 **Назва сорту** ЛФР1941 ЛФР1944

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 19.09.2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

06.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140193

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	великий	7
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
8	Волоть: час цвітіння	від дуже раннього до раннього	2
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	сильне	7
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	великий	7
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	від дуже раннього до раннього	2
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	середнє	5
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	середнє	5
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	середня	5
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5
28	Качан: за довжиною	довгий	7
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	кременистий	1
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	оранжевий	5
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	оранжевий	5
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.

Заявка №: 10004188 Назва сорту МЕФ4505

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 29.11.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

06.03.2014

Свідчення про державну реєстрацію № 140174

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	середній	5
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	сильне	7
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	помірно похиле	5
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мало	1
15	Качан: час появи шовку	середній	5
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7
18	Волоть: щільність розташування колосків	нещільне	3
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	сильне	7
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	довга	7
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	середній	5
29	Качан: діаметр (посередині)	малий	3
30	Качан: форма	конусна	1
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	кременистий	1
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовто-оранжевий	4
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	жовто-оранжевий	4
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.

Заявка №: 10004205 Назва сорту МЕФ5298

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 29.11.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

06.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140181

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	від округлої до лопатоподібної	4
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	сильне	7
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	середня	5
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	довгий	7
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	циліндрична	3
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовто-оранжевий	4
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	оранжевий	5
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.

Заявка №: 10004242 Назва сорту Наташа М

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 30.11.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

13.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140283

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	темне	3
4	Листок: хвилястість краю пластинки	сильна	3
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	помірно похиле	5
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	ознака не визначалась	0
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	дуже довга	9
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	середня	5
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5
28	Качан: за довжиною	довгий	7
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	зубовий	5
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовтий	3
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	жовто-оранжевий	4
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.

Заявка №: 11004047 Назва сорту НП1739 ЛАН1503

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 19.09.2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

06.03.2014

Свідчення про державну реєстрацію № 140190

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3
2	Перший листок: форма верхівки	від округлої до лопатоподібної	4
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	помірно похиле	5
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабе	1
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабе	1
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	довга	7
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	середня	5
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5
28	Качан: за довжиною	середній	5
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	зубовий	5
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовтий	3
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	оранжевий	5
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.

Заявка №: 10004012 Назва сорту НП1914 С

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 19.05.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

06.03.2014

Свідчення про державну реєстрацію № 140167

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	дуже сильне	9
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	пізній	7
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	ознака не визначалась	0
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мало	1
15	Качан: час появи шовку	пізній	7
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	довга	7
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	середня	5
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	середній	5
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	зубоподібний	4
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовтий	3
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	жовто-оранжевий	4
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.

Заявка №: 11004102 Назва сорту НП1927НП1928

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 18.11.2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

04.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140046

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	від округлої до лопатоподібної	4
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	пізній	7
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	помірно похиле	5
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	пізній	7
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	середнє	5
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	довга	7
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	короткий	3
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовто-оранжевий	4
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	жовто-оранжевий	4
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.

Заявка №: 10004279 Назва сорту НР2171 С

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 03.12.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

05.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140205

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	дуже сильне	9
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	світле	1
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	пізній	7
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	ознака не визначалась	0
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	пізній	7
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	довга	7
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	середня	5
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	середній	5
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	зубоподібний	4
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовтий	3
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	жовто-оранжевий	4
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.

Заявка №: 10004013

Назва сорту НР2319 С

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 19.05.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

05.03.2014

Свідчення про державну реєстрацію № 140168

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	від округлої до лопатоподібної	4
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	від пізнього до дуже пізнього	8
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	ознака не визначалась	0
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	помірно похиле	5
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	від пізнього до дуже пізнього	8
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	сильне	7
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	довга	7
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	середня	5
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5
28	Качан: за довжиною	довгий	7
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	зубоподібний	4
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовтий	3
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	оранжевий	5
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.

Заявка №: 11004100 Назва сорту НПАФ3441

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 18.11.2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

04.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140045

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	темне	3
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	пізній	7
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	пізній	7
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	довга	7
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	середня	5
27	Качан: ніжка за довжиною	дуже коротка	1
28	Качан: за довжиною	довгий	7
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	зубоподібний	4
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовтий	3
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	жовто-оранжевий	4
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.

Заявка №: 11004098 Назва сорту НПВР0715НП1941

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 18.11.2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

04.03.2014

Свідчення про державну реєстрацію № 140043

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	темне	3
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
8	Волоть: час цвітіння	дуже ранній	1
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	помірне	5
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	дуже ранній	1
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	сильне	7
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	дуже довга	9
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	середня	5
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5
28	Качан: за довжиною	середній	5
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	кременистий	1
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	оранжевий	5
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	оранжевий	5
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.

Заявка №: 11004099 Назва сорту НПД2530НПД2534

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 18.11.2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

04.03.2014

Свідчення про державну реєстрацію № 140044

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	середній	5
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	сильне	7
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	середній	5
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	довга	7
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	середній	5
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	циліндрична	3
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовтий	3
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	жовто-оранжевий	4
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.

Заявка №: 11004096 Назва сорту НПД2598НПД2530

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 18.11.2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

04.03.2014

Свідчення про державну реєстрацію № 140042

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	сильна	3
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	помірно похиле	5
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	середній	5
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	сильне	7
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	помірно похиле	5
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	середній	5
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	дуже довга	9
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	довгий	7
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	зубоподібний	4
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовтий	3
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	жовто-оранжевий	4
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.

Заявка №: 11004107 Назва сорту НПД2819

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 18.11.2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

04.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140049

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	пізній	7
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	сильне	7
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	дуже великий	9
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	пізній	7
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	середнє	5
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	довга	7
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3
26	Листок: ширина пластинки	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	середній	5
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	циліндрична	3
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	зубовий	5
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовтий	3
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	оранжевий	5
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.

Заявка №: 11004106 Назва сорту НПД4820

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 18.11.2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

04.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140048

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	від пізнього до дуже пізнього	8
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	дуже великий	9
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	від пізнього до дуже пізнього	8
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
18	Волоть: щільність розташування колосків	щільне	7
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	довга	7
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3
26	Листок: ширина пластинки	середня	5
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	середній	5
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	циліндрична	3
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	зубовий	5
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовто-оранжевий	4
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	жовто-оранжевий	4
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.

Заявка №: 11004097 Назва сорту НПХ1759НПХ0643

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 18.11.2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

05.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140201

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	помірно похиле	5
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	від пізнього до дуже пізнього	8
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мало	1
15	Качан: час появи шовку	від пізнього до дуже пізнього	8
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	відсутнє або дуже слабке	1
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	довга	7
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5
28	Качан: за довжиною	короткий	3
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	зубоподібний	4
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовтий	3
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	оранжевий	5
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.

Заявка №: 11004103

Назва сорту НПНЮ1809

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 18.11.2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

04.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140047

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	сильно похиле	7
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	дуже сильне	9
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	середнє	5
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	середнє	5
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	середня	5
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	довгий	7
29	Качан: діаметр (посередині)	малий	3
30	Качан: форма	конусна	1
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	кременистий	1
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовто-оранжевий	4
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	жовто-оранжевий	4
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.

Заявка №: 10004187 Назва сорту НСЛ4011

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 29.11.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

06.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140173

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	великий	7
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3
18	Волоть: щільність розташування колосків	нещільне	3
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	довга	7
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3
26	Листок: ширина пластинки	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	середній	5
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовто-оранжевий	4
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	жовто-оранжевий	4
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.

Заявка №: 10004197 Назва сорту НСЛ506ВХС

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 29.11.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

06.03.2014

Свідчення про державну реєстрацію № 140180

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	сильне	7
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	великий	7
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	довга	7
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	дуже коротка	1
28	Качан: за довжиною	середній	5
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовто-оранжевий	4
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	жовто-оранжевий	4
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.

Заявка №: 11004301 Назва сорту ПХ13ЙЦ

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

27.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140395

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	помірно похиле	5
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	сильне	7
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	сильне	7
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	дуже великий	9
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	середня	5
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	середній	5
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	циліндрична	3
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	зубоподібний	4
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовтий	3
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	оранжевий	5
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.

Заявка №: 11004304 Назва сорту ПХ13ЦП

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

27.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140398

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	світле	1
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
18	Волоть: щільність розташування колосків	нещільне	3
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	довга	7
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5
28	Качан: за довжиною	середній	5
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовто-оранжевий	4
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	оранжевий	5
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.

Заявка №: 11004305 Назва сорту ПХ13ЦХ

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

27.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140399

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	ранній	3
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	середнє	5
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	довга	7
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	середня	5
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5
28	Качан: за довжиною	короткий	3
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовтий	3
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	оранжевий	5
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.

Заявка №: 11004307 Назва сорту ПХЗПР

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

27.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140401

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	помірне	5
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	великий	7
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	помірно похиле	5
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мало	1
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	середнє	5
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	сильне	7
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	довга	7
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5
28	Качан: за довжиною	середній	5
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	зубовий	5
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовтувато-білий	2
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	жовто-оранжевий	4
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.

Заявка №: 11004296

Назва сорту ПХВВБ

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

27.03.2014

Свідчення про державну реєстрацію № 140391

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	помірно похиле	5
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	середній	5
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	великий	7
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	середній	5
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	середня	5
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5
28	Качан: за довжиною	довгий	7
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	зубоподібний	4
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовтий	3
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	жовто-оранжевий	4
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.

Заявка №: 11004297 Назва сорту ПХВВХ

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

27.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140392

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	великий	7
6	Листок: положення пластинки у просторі	помірно похиле	5
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	сильне	7
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
18	Волоть: щільність розташування колосків	щільне	7
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	довга	7
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	середній	5
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	зубоподібний	4
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовтий	3
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	жовто-оранжевий	4
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	дуже сильне	9

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.

Заявка №: 11004294 Назва сорту ПХВНЙ

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

27.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140390

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	середній	5
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	великий	7
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мало	1
15	Качан: час появи шовку	середній	5
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	довга	7
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	короткий	3
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5
30	Качан: форма	циліндрична	3
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	зубоподібний	4
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовтий	3
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	оранжевий	5
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	дуже сильне	9

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.

Заявка №: 11004300 Назва сорту ПХІББ

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

27.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140394

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
8	Волоть: час цвітіння	середній	5
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	сильне	7
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мало	1
15	Качан: час появи шовку	середній	5
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	довга	7
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5
28	Качан: за довжиною	середній	5
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовтий	3
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	червоно-оранжевий	6
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.

Заявка №: 11004299 Назва сорту ПХРЦЕ

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

27.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140393

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3
2	Перший листок: форма верхівки	від округлої до лопатоподібної	4
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	довга	7
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	середня	5
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	довгий	7
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	зубоподібний	4
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовтий	3
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	жовто-оранжевий	4
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	дуже сильне	9

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.

Заявка №: 11004306

Назва сорту ПХХ2В

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

27.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140400

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	світле	1
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
8	Волоть: час цвітіння	середній	5
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	дуже сильне	9
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	великий	7
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	середній	5
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	довга	7
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	довгий	7
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5
30	Качан: форма	конусна	1
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	кременистий	1
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	оранжевий	5
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	оранжевий	5
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабе	1

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.

Заявка №: 11004303 Назва сорту ПХХЕН

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

27.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140397

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	помірно похиле	5
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	середній	5
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	сильне	7
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	дуже малий	1
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	середній	5
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	середня	5
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	дуже коротка	1
28	Качан: за довжиною	середній	5
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	зубовий	5
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовтий	3
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	оранжевий	5
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	дуже сильне	9

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.

Заявка №: 11004302 Назва сорту ПХХРЙ

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

27.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140396

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	пізній	7
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	пізній	7
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	довга	7
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5
28	Качан: за довжиною	довгий	7
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	циліндрична	3
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	зубоподібний	4
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовтий	3
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	оранжевий	5
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.

Заявка №: 11004054 Назва сорту СМС2156

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 19.09.2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

06.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140196

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	від пізнього до дуже пізнього	8
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	ознака не визначалась	0
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	від пізнього до дуже пізнього	8
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	відсутнє або дуже слабке	1
18	Волоть: щільність розташування колосків	нещільне	3
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	середня	5
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5
28	Качан: за довжиною	довгий	7
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовто-оранжевий	4
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	червоно-оранжевий	6
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.

Заявка №: 11004056

Назва сорту ССР1743

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 19.09.2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

06.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140198

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
8	Волоть: час цвітіння	пізній	7
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мало	1
15	Качан: час появи шовку	пізній	7
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	довга	7
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	середній	5
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5
30	Качан: форма	циліндрична	3
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовто-оранжевий	4
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	жовто-оранжевий	4
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	дуже сильне	9

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.

Заявка №: 11004055

Назва сорту ССР1745

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 19.09.2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

06.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140197

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	помірно похиле	5
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	пізній	7
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	великий	7
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	пізній	7
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
18	Волоть: щільність розташування колосків	нещільне	3
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	довга	7
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	середня	5
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5
28	Качан: за довжиною	середній	5
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовтий	3
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	оранжевий	5
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.

Заявка №: 10004190 Назва сорту T41863

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 29.11.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

06.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140176

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	дуже сильне	9
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3
6	Листок: положення пластинки у просторі	помірно похиле	5
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	пізній	7
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	сильне	7
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мало	1
15	Качан: час появи шовку	пізній	7
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	довга	7
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	середня	5
27	Качан: ніжка за довжиною	дуже коротка	1
28	Качан: за довжиною	довгий	7
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	зубоподібний	4
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовтий	3
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	оранжевий	5
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	слабке	3

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.

Заявка №: 12004030

Назва сорту ХА 402 МВ

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 06.02.2012

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

13.03.2014

Свідчення про державну реєстрацію № 140287

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	від округлої до лопатоподібної	4
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	сильна	3
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7
18	Волоть: щільність розташування колосків	нещільне	3
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	довга	7
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5
28	Качан: за довжиною	довгий	7
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовтий	3
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	жовто-оранжевий	4
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.

Заявка №: 12004029 Назва сорту ХА 408 МВ

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 06.02.2012

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

13.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140286

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	від пізнього до дуже пізнього	8
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабе	1
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабе	1
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	від пізнього до дуже пізнього	8
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабе	1
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабе	3
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	довга	7
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	середня	5
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5
28	Качан: за довжиною	довгий	7
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	зубоподібний	4
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовто-оранжевий	4
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	оранжевий	5
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.

Заявка №: 12004031 Назва сорту ХА 418 М

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 06.02.2012

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

13.03.2014

Свідчення про державну реєстрацію № 140288

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	лопатоподібна	5
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	середній	5
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	середній	5
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3
18	Волоть: щільність розташування колосків	щільне	7
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	довга	7
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5
28	Качан: за довжиною	короткий	3
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовто-оранжевий	4
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	оранжевий	5
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.

Заявка №: 10004245 Назва сорту Харківська 152 М

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 30.11.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

13.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140285

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	сильна	3
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	помірно похиле	5
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабе	1
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабе	1
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	середня кількість	5
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7
18	Волоть: щільність розташування колосків	щільне	7
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	довга	7
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	середній	5
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовтий	3
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	жовто-оранжевий	4
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.

Заявка №: 10004247 Назва сорту Харківська 215 М

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 30.11.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

13.03.2014

Свідчення про державну реєстрацію № 140290

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	ознака не визначалась	0
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	ознака не визначалась	0
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	довга	7
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	дуже коротка	1
28	Качан: за довжиною	короткий	3
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	зубоподібний	4
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовтий	3
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	жовто-оранжевий	4
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.

Заявка №: 12004032 Назва сорту Харківська 404 MB

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 06.02.2012

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

13.03.2014

Свідчення про державну реєстрацію № 140289

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	від округлої до лопатоподібної	4
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	середній	5
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	дуже сильне	9
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	великий	7
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	середня кількість	5
15	Качан: час появи шовку	середній	5
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабе	1
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7
18	Волоть: щільність розташування колосків	щільне	7
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	середнє	5
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	середня	5
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	середня	5
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	довгий	7
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовтий	3
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	оранжевий	5
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабе	1

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.

Заявка №: 10004244 Назва сорту Харківський 27 М

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 30.11.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

13.03.2014

Свідчення про державну реєстрацію № 140284

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	сильна	3
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	помірно похиле	5
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	сильне	7
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	ознака не визначалась	0
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	середня кількість	5
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	довга	7
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: ширина пластинки	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	довгий	7
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	зубоподібний	4
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовтий	3
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	оранжевий	5
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5

Вид: Ріпак (ярий) - батьківський компонент *Brassica napus* L. oleifera

Заявка №: 10016071 **Назва сорту** НППЦ ЗР 3709

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 01.12.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

12.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140296

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1
2	Сім'ядоля: за довжиною	довга	7
3	Сім'ядоля: за шириною	середня	5
4	Листок: інтенсивність зеленого кольору	помірний	5
5	Листок: наявність часток	наявні	9
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	мало	3
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	короткий	3
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	вузький	3
10	Сорти тільки з часточковими листками. Листок: довжина черешка	короткий	3
11	Рослина: час цвітіння	ранній	3
12	Квітка: колір пелюсток	жовтий	3
13	Квітка: довжина пелюсток	короткі	3
14	Квітка: ширина пелюсток	вузькі	3
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5
17	Рослина: загальна довжина (бічні пагони включно)	середня	5
18	Стручок: за довжиною (між ніжкою і зубцем)	середній	5
19	Стручок: довжина зубця	середній	5
20	Стручок: довжина ніжки	середня	5
21	Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби	ознака не визначається	0
22	Тенденція формування суцвіття в рік пізньолітньої сівби	відсутня або дуже слабка	1

Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка №: 12017022 **Назва сорту** 13K25

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 03.02.2012

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

04.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140104

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: аноціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабке	3
3	Листок: за розміром	малий	3
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	дрібні	3
7	Листок: форма у поперечному перерізі	слабко увігнута	2
8	Листок: форма верхівки	загострена	8
9	Листок: наявність вушок	великі	7
10	Листок: крила	відсутні або слабко виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабка	3
14	Час цвітіння	ранній	3
15	Язичкові квітки: за щільністю	нещільні	3
16	Язичкові квітки: за формою	веретинovidні	1
17	Язичкові квітки: за положенням	плоскі	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: за кольором	помірно-жовті	3
20	Трубчасті квітки: за кольором	оранжеві	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначалась	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Зовнішні листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1
25	Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки	середня	5
26	Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку	помірний	5
27	Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за природною висотою	низька	3
29	Рослина: галушення (за винятком галушення, викликаного умовами середовища)	наявне	9
30	Рослина: тип галушення (як для 29)	переважно біля верхівки	4
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	нижче	1
32	Кошик: положення	обернене донизу разом із прямим стеблом	6
33	Кошик: розмір	маленький	3
34	Кошик: форма з боку сім'янок	злегка випукла	4
35	Сім'янка: за розміром	середня	5
36	Сім'янка: за формою	видовжена	1
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: за основним кольором	чорна	7
39	Сім'янка: смугастість на краях	відсутня або дуже слабка	1
40	Сім'янка: смугастість між краями	відсутня або дуже слабка	1
41	Сім'янка: колір смужок	ознака не визначалась	0
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	наявна	9
43	Стійкість до вовчка (<i>Orobanchе cumana</i> , раса E)	стійкий	1
44	Стійкість до <i>Plasmopara Halstedii</i>	відсутня	1

Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка №: 12017023 **Назва сорту** 20M60

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 03.02.2012

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

04.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140105

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: аноціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабке	3
3	Листок: за розміром	малий	3
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	темне	7
5	Листок: пухирчастість	помірна	5
6	Листок: зубці	помірні	5
7	Листок: форма у поперечному перерізі	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6
9	Листок: наявність вушок	помірні	5
10	Листок: крила	слабо виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	відсутня або дуже слабка	1
14	Час цвітіння	ранній	3
15	Язичкові квітки: за щільністю	середньої щільності	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцевидні	2
17	Язичкові квітки: за положенням	дуже зігнуті у напрямку кошика	4
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: за кольором	помірно-жовті	3
20	Трубчасті квітки: за кольором	жовті	1
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначалась	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1
24	Зовнішні листки обгортки: за формою	також чітко видовжені, але й чітко округлі	2
25	Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки	коротка	3
26	Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку	помірний	5
27	Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за природною висотою	дуже низька	1
29	Рослина: галузнення (за винятком галузнення, викликаного умовами середовища)	наявне	9
30	Рослина: тип галузнення (як для 29)	лише біля основи	1
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	нижче	1
32	Кошик: положення	обернене донизу разом із прямим стеблом	6
33	Кошик: розмір	маленький	3
34	Кошик: форма з боку сім'янок	злегка випукла	4
35	Сім'янка: за розміром	середня	5
36	Сім'янка: за формою	вузькояйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3
38	Сім'янка: за основним кольором	чорна	7
39	Сім'янка: смугастість на краях	відсутня або дуже слабка	1
40	Сім'янка: смугастість між краями	відсутня або дуже слабка	1
41	Сім'янка: колір смужок	сірий	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість до вовчка (<i>Orobanche cumana</i> , раса E)	стійкий	1
44	Стійкість до <i>Plasmodiophora Halstedii</i>	відсутня	1

Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка №: 11017109 **Назва сорту** 37032IM

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 24.11.2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

06.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140241

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: аноціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірне	5
3	Листок: за розміром	малий	3
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	темне	7
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	дрібні	3
7	Листок: форма у поперечному перерізі	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5
9	Листок: наявність вушок	малі	3
10	Листок: крила	слабко виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірна	5
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: за щільністю	нещільні	3
16	Язичкові квітки: за формою	веретинovidні	1
17	Язичкові квітки: за положенням	плоскі	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: за кольором	помірно-жовті	3
20	Трубчасті квітки: за кольором	оранжеві	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначалась	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Зовнішні листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1
25	Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки	середня	5
26	Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку	помірний	5
27	Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика	дуже охоплює	3
28	Рослина: за природною висотою	дуже низька	1
29	Рослина: галушення (за винятком галушення, викликаного умовами середовища)	наявне	9
30	Рослина: тип галушення (як для 29)	переважно біля верхівки	4
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	нижче	1
32	Кошик: положення	обернене донизу разом із прямим стеблом	6
33	Кошик: розмір	маленький	3
34	Кошик: форма з боку сім'янок	злегка випукла	4
35	Сім'янка: за розміром	середня	5
36	Сім'янка: за формою	видовжена	1
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: за основним кольором	сіра	3
39	Сім'янка: смугастість на краях	відсутня або дуже слабка	1
40	Сім'янка: смугастість між краями	відсутня або дуже слабка	1
41	Сім'янка: колір смужок	ознака не визначалась	0
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість до вовчка (<i>Orobanche cumana</i> , раса E)	толерантний	2
44	Стійкість до <i>Plasmodiophora Halstedii</i>	відсутня	1

Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка №: 12017029 **Назва сорту** 63Г13

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 03.02.2012

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

04.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140110

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: аноціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабке	3
3	Листок: за розміром	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	помірні	5
7	Листок: форма у поперечному перерізі	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5
9	Листок: наявність вушок	помірні	5
10	Листок: крила	відсутні або слабо виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	сильна	7
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: за щільністю	середньої щільності	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцевидні	2
17	Язичкові квітки: за положенням	хвилясті	3
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: за кольором	помірно-жовті	3
20	Трубчасті квітки: за кольором	жовті	1
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначалась	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1
24	Зовнішні листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1
25	Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки	довга	7
26	Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку	світлий	3
27	Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за природною висотою	дуже низька	1
29	Рослина: галушення (за винятком галушення, викликаного умовами середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галушення (як для 29)	ознака не визначалась	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначалась	0
32	Кошик: положення	обернене донизу разом із прямим стеблом	6
33	Кошик: розмір	маленький	3
34	Кошик: форма з боку сім'янок	плеската	3
35	Сім'янка: за розміром	середня	5
36	Сім'янка: за формою	широкояйцеподібна	3
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: за основним кольором	чорна	7
39	Сім'янка: смугастість на краях	слабка	2
40	Сім'янка: смугастість між краями	відсутня або дуже слабка	1
41	Сім'янка: колір смужок	сірий	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість до вовчка (<i>Orobanche cumana</i> , раса E)	стійкий	1
44	Стійкість до <i>Plasmodiophora Halstedii</i>	відсутня	1

Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка №: 12017027 **Назва сорту** 72В13

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 03.02.2012

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

04.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140108

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: аноціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірне	5
3	Листок: за розміром	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	дрібні	3
7	Листок: форма у поперечному перерізі	слабко увігнута	2
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5
9	Листок: наявність вушок	помірні	5
10	Листок: крила	відсутні або слабко виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірна	5
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: за щільністю	середньої щільності	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцевидні	2
17	Язичкові квітки: за положенням	плоскі	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: за кольором	помірно-жовті	3
20	Трубчасті квітки: за кольором	оранжеві	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначалась	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Зовнішні листки обгортки: за формою	також чітко видовжені, але й чітко округлі	2
25	Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки	середня	5
26	Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку	помірний	5
27	Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за природною висотою	низька	3
29	Рослина: галуження (за винятком галуження, викликаного умовами середовища)	наявне	9
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	переважно біля верхівки	4
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	нижче	1
32	Кошик: положення	напівобернене донизу разом із прямим стеблом	4
33	Кошик: розмір	маленький	3
34	Кошик: форма з боку сім'янок	злегка випукла	4
35	Сім'янка: за розміром	середня	5
36	Сім'янка: за формою	вузькояйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: за основним кольором	чорна	7
39	Сім'янка: смугастість на краях	відсутня або дуже слабка	1
40	Сім'янка: смугастість між краями	відсутня або дуже слабка	1
41	Сім'янка: колір смужок	ознака не визначалась	0
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість до вовчка (<i>Orobanchе cumanа</i> , раса E)	толерантний	2
44	Стійкість до <i>Plasmopara Halstedii</i>	відсутня	1

Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка №: 12017028 **Назва сорту** A899

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 03.02.2012

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

05.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140109

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: аноціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабке	3
3	Листок: за розміром	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
5	Листок: пухирчастість	помірна	5
6	Листок: зубці	помірні	5
7	Листок: форма у поперечному перерізі	слабко увігнута	2
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до округлої	7
9	Листок: наявність вушок	великі	7
10	Листок: крила	слабко виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	тупий	3
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірна	5
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: за щільністю	середньої щільності	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцевидні	2
17	Язичкові квітки: за положенням	плоскі	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: за кольором	помірно-жовті	3
20	Трубчасті квітки: за кольором	оранжеві	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабке	3
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Зовнішні листки обгортки: за формою	також чітко видовжені, але й чітко округлі	2
25	Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки	середня	5
26	Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку	темний	7
27	Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за природною висотою	середня	5
29	Рослина: галуження (за винятком галуження, викликаного умовами середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначалась	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначалась	0
32	Кошик: положення	напівобернене донизу разом із стеблом	5
33	Кошик: розмір	середній	5
34	Кошик: форма з боку сім'янок	злегка випукла	4
35	Сім'янка: за розміром	середня	5
36	Сім'янка: за формою	вузькояйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: за основним кольором	чорна	7
39	Сім'янка: смугастість на краях	слабка	2
40	Сім'янка: смугастість між краями	відсутня або дуже слабка	1
41	Сім'янка: колір смужок	сірий	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість до вовчка (<i>Orobanche cumana</i> , раса E)	толерантний	2
44	Стійкість до <i>Plasmodiophora Halstedii</i>	відсутня	1

Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка №: 11017141 **Назва сорту** АД4027013

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 30.11.2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

04.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140099

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: аноціанове забарвлення	відсутнє	1
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначалась	0
3	Листок: за розміром	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
5	Листок: пухирчастість	відсутня або дуже слабка	1
6	Листок: зубці	дрібні	3
7	Листок: форма у поперечному перерізі	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4
9	Листок: наявність вушок	малі	3
10	Листок: крила	слабко виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірна	5
14	Час цвітіння	ранній	3
15	Язичкові квітки: за щільністю	нещільні	3
16	Язичкові квітки: за формою	веретинovidні	1
17	Язичкові квітки: за положенням	плоскі	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: за кольором	помірно-жовті	3
20	Трубчасті квітки: за кольором	оранжеві	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначалась	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1
24	Зовнішні листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1
25	Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки	середня	5
26	Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку	світлий	3
27	Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за природною висотою	низька	3
29	Рослина: галуження (за винятком галуження, викликаного умовами середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначалась	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначалась	0
32	Кошик: положення	напівобернене донизу разом із стеблом	5
33	Кошик: розмір	маленький	3
34	Кошик: форма з боку сім'янок	злегка випукла	4
35	Сім'янка: за розміром	середня	5
36	Сім'янка: за формою	широкояйцеподібна	3
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: за основним кольором	чорна	7
39	Сім'янка: смугастість на краях	дуже сильна	3
40	Сім'янка: смугастість між краями	слабка	2
41	Сім'янка: колір смужок	сірий	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість до вовчка (<i>Orobanche cumana</i> , раса E)	стійкий	1
44	Стійкість до <i>Plasmodiophora Halstedii</i>	відсутня	1

Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка №: 10017160 **Назва сорту** Б РО 013А

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 29.11.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

28.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140409

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: аноціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірне	5
3	Листок: за розміром	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
5	Листок: пухирчастість	помірна	5
6	Листок: зубці	помірні	5
7	Листок: форма у поперечному перерізі	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6
9	Листок: наявність вушок	великі	7
10	Листок: крила	відсутні або слабо виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірна	5
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: за щільністю	середньої щільності	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцевидні	2
17	Язичкові квітки: за положенням	зігнуті за довжиною	2
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: за кольором	помірно-жовті	3
20	Трубчасті квітки: за кольором	оранжеві	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначалась	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1
24	Зовнішні листки обгортки: за формою	також чітко видовжені, але й чітко округлі	2
25	Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки	коротка	3
26	Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку	помірний	5
27	Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за природною висотою	середня	5
29	Рослина: галузнення (за винятком галузнення, викликаного умовами середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галузнення (як для 29)	ознака не визначалась	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначалась	0
32	Кошик: положення	напівобернене донизу разом із стеблом	5
33	Кошик: розмір	середній	5
34	Кошик: форма з боку сім'янок	плеската	3
35	Сім'янка: за розміром	середня	5
36	Сім'янка: за формою	широкояйцеподібна	3
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: за основним кольором	чорна	7
39	Сім'янка: смугастість на краях	слабка	2
40	Сім'янка: смугастість між краями	відсутня або дуже слабка	1
41	Сім'янка: колір смужок	сірий	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість до вовчка (<i>Orobanche cumana</i> , раса E)	стійкий	1
44	Стійкість до <i>Plasmodiophora Halstedii</i>	відсутня	1

Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка №: 10017159 **Назва сорту** Б РО 0155А

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 29.11.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

21.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140408

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: аноціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірне	5
3	Листок: за розміром	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	темне	7
5	Листок: пухирчастість	помірна	5
6	Листок: зубці	помірні	5
7	Листок: форма у поперечному перерізі	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6
9	Листок: наявність вушок	помірні	5
10	Листок: крила	відсутні або слабо виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	відсутня або дуже слабка	1
14	Час цвітіння	ранній	3
15	Язичкові квітки: за щільністю	середньої щільності	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцевидні	2
17	Язичкові квітки: за положенням	плоскі	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: за кольором	помірно-жовті	3
20	Трубчасті квітки: за кольором	оранжеві	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабке	3
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Зовнішні листки обгортки: за формою	також чітко видовжені, але й чітко округлі	2
25	Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки	середня	5
26	Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку	помірний	5
27	Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за природною висотою	середня	5
29	Рослина: галузнення (за винятком галузнення, викликаного умовами середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галузнення (як для 29)	переважно біля верхівки	4
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	нижче	1
32	Кошик: положення	обернене донизу разом із легким викривленням стебла	7
33	Кошик: розмір	середній	5
34	Кошик: форма з боку сім'янок	сильно випукла	5
35	Сім'янка: за розміром	середня	5
36	Сім'янка: за формою	широкояйцеподібна	3
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: за основним кольором	чорна	7
39	Сім'янка: смугастість на краях	слабка	2
40	Сім'янка: смугастість між краями	слабка	2
41	Сім'янка: колір смужок	сірий	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість до вовчка (<i>Orobanche cumana</i> , раса E)	стійкий	1
44	Стійкість до <i>Plasmodiophora Halstedii</i>	відсутня	1

Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка №: 10017158 **Назва сорту** Б РО 017А

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 29.11.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

21.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140407

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: аноціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильне	7
3	Листок: за розміром	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
5	Листок: пухирчастість	помірна	5
6	Листок: зубці	дрібні	3
7	Листок: форма у поперечному перерізі	слабко увігнута	2
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до округлої	7
9	Листок: наявність вушок	великі	7
10	Листок: крила	відсутні або слабо виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабка	3
14	Час цвітіння	ранній	3
15	Язичкові квітки: за щільністю	середньої щільності	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцевидні	2
17	Язичкові квітки: за положенням	плоскі	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: за кольором	помірно-жовті	3
20	Трубчасті квітки: за кольором	оранжеві	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	помірне	5
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1
24	Зовнішні листки обгортки: за формою	також чітко видовжені, але й чітко округлі	2
25	Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки	середня	5
26	Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку	помірний	5
27	Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика	дуже охоплює	3
28	Рослина: за природною висотою	середня	5
29	Рослина: галуження (за винятком галуження, викликаного умовами середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначалась	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначалась	0
32	Кошик: положення	обернене донизу разом із легким викривленням стебла	7
33	Кошик: розмір	середній	5
34	Кошик: форма з боку сім'янок	плеската	3
35	Сім'янка: за розміром	середня	5
36	Сім'янка: за формою	вузькоюйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: за основним кольором	чорна	7
39	Сім'янка: смугастість на краях	відсутня або дуже слабка	1
40	Сім'янка: смугастість між краями	відсутня або дуже слабка	1
41	Сім'янка: колір смужок	сірий	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	наявна	9
43	Стійкість до вовчка (<i>Orobanche cumana</i> , раса E)	стійкий	1
44	Стійкість до <i>Plasmodiophora Halstedii</i>	відсутня	1

Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка №: 11017023 **Назва сорту** Б РО 03А

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 08.02.2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

13.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140412

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: аноціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильне	7
3	Листок: за розміром	малий	3
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	помірні	5
7	Листок: форма у поперечному перерізі	слабко увігнута	2
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5
9	Листок: наявність вушок	помірні	5
10	Листок: крила	відсутні або слабко виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	сильна	7
14	Час цвітіння	ранній	3
15	Язичкові квітки: за щільністю	середньої щільності	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцевидні	2
17	Язичкові квітки: за положенням	плоскі	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: за кольором	помірно-жовті	3
20	Трубчасті квітки: за кольором	оранжеві	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	помірне	5
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1
24	Зовнішні листки обгортки: за формою	чітко округлі	3
25	Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки	коротка	3
26	Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку	помірний	5
27	Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за природною висотою	середня	5
29	Рослина: галушення (за винятком галушення, викликаного умовами середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галушення (як для 29)	ознака не визначалась	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначалась	0
32	Кошик: положення	обернене донизу разом із легким викривленням стебла	7
33	Кошик: розмір	середній	5
34	Кошик: форма з боку сім'янок	плеската	3
35	Сім'янка: за розміром	середня	5
36	Сім'янка: за формою	вузькоюйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: за основним кольором	чорна	7
39	Сім'янка: смугастість на краях	відсутня або дуже слабка	1
40	Сім'янка: смугастість між краями	відсутня або дуже слабка	1
41	Сім'янка: колір смужок	сірий	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість до вовчка (<i>Orobanche cumana</i> , раса E)	толерантний	2
44	Стійкість до <i>Plasmodiophora Halstedii</i>	відсутня	1

Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка №: 11017027 **Назва сорту** Б РО 04А

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 08.02.2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

13.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140414

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: аноціанове забарвлення	відсутнє	1
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабке	3
3	Листок: за розміром	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
5	Листок: пухирчастість	сильна	7
6	Листок: зубці	дрібні	3
7	Листок: форма у поперечному перерізі	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6
9	Листок: наявність вушок	помірні	5
10	Листок: крила	відсутні або слабо виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабка	3
14	Час цвітіння	ранній	3
15	Язичкові квітки: за щільністю	середньої щільності	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцевидні	2
17	Язичкові квітки: за положенням	плоскі	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: за кольором	помірно-жовті	3
20	Трубчасті квітки: за кольором	оранжеві	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначалась	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1
24	Зовнішні листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1
25	Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки	коротка	3
26	Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку	помірний	5
27	Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за природною висотою	середня	5
29	Рослина: галуження (за винятком галуження, викликаного умовами середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначалась	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначалась	0
32	Кошик: положення	напівобернене донизу разом із стеблом	5
33	Кошик: розмір	середній	5
34	Кошик: форма з боку сім'янок	злегка випукла	4
35	Сім'янка: за розміром	середня	5
36	Сім'янка: за формою	широкояйцеподібна	3
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: за основним кольором	чорна	7
39	Сім'янка: смугастість на краях	слабка	2
40	Сім'янка: смугастість між краями	слабка	2
41	Сім'янка: колір смужок	сірий	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість до вовчка (<i>Orobanche cumana</i> , раса E)	стійкий	1
44	Стійкість до <i>Plasmodiophora Halstedii</i>	відсутня	1

Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка №: 11017066 **Назва сорту** БГ Н 1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 04.11.2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

17.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140360

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: аноціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірне	5
3	Листок: за розміром	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
5	Листок: пухирчастість	помірна	5
6	Листок: зубці	дрібні	3
7	Листок: форма у поперечному перерізі	слабко увігнута	2
8	Листок: форма верхівки	загострена	8
9	Листок: наявність вушок	великі	7
10	Листок: крила	відсутні або слабко виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірна	5
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: за щільністю	середньої щільності	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцевидні	2
17	Язичкові квітки: за положенням	плоскі	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: за кольором	помірно-жовті	3
20	Трубчасті квітки: за кольором	оранжеві	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	помірне	5
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1
24	Зовнішні листки обгортки: за формою	також чітко видовжені, але й чітко округлі	2
25	Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки	середня	5
26	Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку	помірний	5
27	Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за природною висотою	низька	3
29	Рослина: галуження (за винятком галуження, викликаного умовами середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначалась	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначалась	0
32	Кошик: положення	напівобернене донизу разом із прямим стеблом	4
33	Кошик: розмір	маленький	3
34	Кошик: форма з боку сім'янок	плеската	3
35	Сім'янка: за розміром	середня	5
36	Сім'янка: за формою	вузькояйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: за основним кольором	чорна	7
39	Сім'янка: смугастість на краях	відсутня або дуже слабка	1
40	Сім'янка: смугастість між краями	відсутня або дуже слабка	1
41	Сім'янка: колір смужок	ознака не визначалась	0
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	наявна	9
43	Стійкість до вовчка (<i>Orobanchе cumanа</i> , раса E)	толерантний	2
44	Стійкість до <i>Plasmodiоpara Halstedii</i>	відсутня	1

Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка №: 11017067 **Назва сорту** БГ Н 2

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 04.11.2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

17.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140361

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: аноціанове забарвлення	відсутнє	1
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначалась	0
3	Листок: за розміром	малий	3
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	окремі або дуже дрібні	1
7	Листок: форма у поперечному перерізі	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6
9	Листок: наявність вушок	помірні	5
10	Листок: крила	відсутні або слабо виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабка	3
14	Час цвітіння	ранній	3
15	Язичкові квітки: за щільністю	середньої щільності	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцевидні	2
17	Язичкові квітки: за положенням	зігнуті за довжиною	2
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: за кольором	оранжево-жовті	4
20	Трубчасті квітки: за кольором	оранжеві	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначалась	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1
24	Зовнішні листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1
25	Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки	середня	5
26	Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку	світлий	3
27	Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за природною висотою	низька	3
29	Рослина: галузнення (за винятком галузнення, викликаного умовами середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галузнення (як для 29)	ознака не визначалась	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначалась	0
32	Кошик: положення	вертикальне	3
33	Кошик: розмір	маленький	3
34	Кошик: форма з боку сім'янок	злегка випукла	4
35	Сім'янка: за розміром	середня	5
36	Сім'янка: за формою	широкояйцеподібна	3
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: за основним кольором	чорна	7
39	Сім'янка: смугастість на краях	слабка	2
40	Сім'янка: смугастість між краями	слабка	2
41	Сім'янка: колір смужок	сірий	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	наявна	9
43	Стійкість до вовчка (<i>Orobanche cumana</i> , раса E)	стійкий	1
44	Стійкість до <i>Plasmodiophora Halstedii</i>	відсутня	1

Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка №: 10017099 **Назва сорту** ЗЛ 0089В

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 11.11.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

20.01.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140091

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: аноціанове забарвлення	відсутнє	1
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначалась	0
3	Листок: за розміром	малий	3
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	світле	3
5	Листок: пухирчастість	відсутня або дуже слабка	1
6	Листок: зубці	окремі або дуже дрібні	1
7	Листок: форма у поперечному перерізі	слабко увігнута	2
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4
9	Листок: наявність вушок	помірні	5
10	Листок: крила	відсутні або слабо виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабка	3
14	Час цвітіння	ранній	3
15	Язичкові квітки: за щільністю	середньої щільності	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцевидні	2
17	Язичкові квітки: за положенням	плоскі	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	короткі	3
19	Язичкові квітки: за кольором	помірно-жовті	3
20	Трубчасті квітки: за кольором	жовті	1
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначалась	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Зовнішні листки обгортки: за формою	також чітко видовжені, але й чітко округлі	2
25	Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки	середня	5
26	Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку	помірний	5
27	Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за природною висотою	дуже низька	1
29	Рослина: галузнення (за винятком галузнення, викликаного умовами середовища)	наявне	9
30	Рослина: тип галузнення (як для 29)	за всією висотою	3
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	нижче	1
32	Кошик: положення	напівобернене донизу разом із стеблом	5
33	Кошик: розмір	маленький	3
34	Кошик: форма з боку сім'янок	злегка випукла	4
35	Сім'янка: за розміром	середня	5
36	Сім'янка: за формою	широкояйцеподібна	3
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3
38	Сім'янка: за основним кольором	чорна	7
39	Сім'янка: смугастість на краях	відсутня або дуже слабка	1
40	Сім'янка: смугастість між краями	відсутня або дуже слабка	1
41	Сім'янка: колір смужок	ознака не визначалась	0
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість до вовчка (<i>Orobanche cumana</i> , раса E)	стійкий	1
44	Стійкість до <i>Plasmodiophora Halstedii</i>	відсутня	1

Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка №: 10017104 **Назва сорту** ЗЛ 260В

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 11.11.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

20.01.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140092

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: аноціанове забарвлення	відсутнє	1
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначалась	0
3	Листок: за розміром	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
5	Листок: пухирчастість	помірна	5
6	Листок: зубці	помірні	5
7	Листок: форма у поперечному перерізі	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	загострена	8
9	Листок: наявність вушок	помірні	5
10	Листок: крила	відсутні або слабо виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабка	3
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: за щільністю	середньої щільності	5
16	Язичкові квітки: за формою	веретинovidні	1
17	Язичкові квітки: за положенням	плоскі	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: за кольором	помірно-жовті	3
20	Трубчасті квітки: за кольором	оранжеві	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначалась	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Зовнішні листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1
25	Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки	середня	5
26	Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку	помірний	5
27	Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за природною висотою	середня	5
29	Рослина: галушення (за винятком галушення, викликаного умовами середовища)	наявне	9
30	Рослина: тип галушення (як для 29)	лише на верхівці	5
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	на рівні	2
32	Кошик: положення	обернене донизу разом із прямим стеблом	6
33	Кошик: розмір	маленький	3
34	Кошик: форма з боку сім'янок	злегка випукла	4
35	Сім'янка: за розміром	середня	5
36	Сім'янка: за формою	вузькоюйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3
38	Сім'янка: за основним кольором	чорна	7
39	Сім'янка: смугастість на краях	дуже сильна	3
40	Сім'янка: смугастість між краями	дуже сильна	3
41	Сім'янка: колір смужок	сірий	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість до вовчка (<i>Orobanche cumana</i> , раса E)	толерантний	2
44	Стійкість до <i>Plasmopara Halstedii</i>	відсутня	1

Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка №: 11017065 **Назва сорту** ИМИ АБ 18

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 04.11.2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

17.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140359

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: аноціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильне	7
3	Листок: за розміром	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
5	Листок: пухирчастість	відсутня або дуже слабка	1
6	Листок: зубці	окремі або дуже дрібні	1
7	Листок: форма у поперечному перерізі	слабко увігнута	2
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6
9	Листок: наявність вушок	помірні	5
10	Листок: крила	відсутні або слабо виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	на рівні	5
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабка	3
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: за щільністю	середньої щільності	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцевидні	2
17	Язичкові квітки: за положенням	хвилясті	3
18	Язичкові квітки: за довжиною	короткі	3
19	Язичкові квітки: за кольором	помірно-жовті	3
20	Трубчасті квітки: за кольором	оранжеві	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	помірне	5
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1
24	Зовнішні листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1
25	Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки	середня	5
26	Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку	світлий	3
27	Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за природною висотою	низька	3
29	Рослина: галуження (за винятком галуження, викликаного умовами середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначалась	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначалась	0
32	Кошик: положення	напівобернене донизу разом із прямим стеблом	4
33	Кошик: розмір	маленький	3
34	Кошик: форма з боку сім'янок	сильно випукла	5
35	Сім'янка: за розміром	середня	5
36	Сім'янка: за формою	широкояйцеподібна	3
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: за основним кольором	сіра	3
39	Сім'янка: смугастість на краях	слабка	2
40	Сім'янка: смугастість між краями	слабка	2
41	Сім'янка: колір смужок	сірий	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість до вовчка (<i>Orobanche cumana</i> , раса E)	стійкий	1
44	Стійкість до <i>Plasmodiophora Halstedii</i>	відсутня	1

Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка №: 12017026 **Назва сорту** IP134PPO

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 03.02.2012

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

04.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140107

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: аноціанове забарвлення	відсутнє	1
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначалась	0
3	Листок: за розміром	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	дрібні	3
7	Листок: форма у поперечному перерізі	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до округлої	7
9	Листок: наявність вушок	великі	7
10	Листок: крила	відсутні або слабо виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	нижче	3
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірна	5
14	Час цвітіння	пізній	7
15	Язичкові квітки: за щільністю	середньої щільності	5
16	Язичкові квітки: за формою	веретинovidні	1
17	Язичкові квітки: за положенням	плоскі	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: за кольором	помірно-жовті	3
20	Трубчасті квітки: за кольором	оранжеві	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначалась	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Зовнішні листки обгортки: за формою	чітко округлі	3
25	Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки	коротка	3
26	Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку	помірний	5
27	Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за природною висотою	низька	3
29	Рослина: галушення (за винятком галушення, викликаного умовами середовища)	наявне	9
30	Рослина: тип галушення (як для 29)	лише на верхівці	5
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	нижче	1
32	Кошик: положення	обернене донизу разом із прямим стеблом	6
33	Кошик: розмір	маленький	3
34	Кошик: форма з боку сім'янок	деформована	6
35	Сім'янка: за розміром	дрібна	3
36	Сім'янка: за формою	вузькоюйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: за основним кольором	помірно-коричнева	5
39	Сім'янка: смугастість на краях	дуже сильна	3
40	Сім'янка: смугастість між краями	дуже сильна	3
41	Сім'янка: колір смужок	білий	1
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість до вовчка (<i>Orobanche cumana</i> , раса E)	толерантний	2
44	Стійкість до <i>Plasmodiophora Halstedii</i>	відсутня	1

Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка №: 10017092 **Назва сорту** Л13Б

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 11.11.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

20.01.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140090

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: аноціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірне	5
3	Листок: за розміром	малий	3
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
5	Листок: пухирчастість	відсутня або дуже слабка	1
6	Листок: зубці	дрібні	3
7	Листок: форма у поперечному перерізі	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5
9	Листок: наявність вушок	малі	3
10	Листок: крила	слабко виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	відсутня або дуже слабка	1
14	Час цвітіння	ранній	3
15	Язичкові квітки: за щільністю	середньої щільності	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцевидні	2
17	Язичкові квітки: за положенням	плоскі	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: за кольором	оранжево-жовті	4
20	Трубчасті квітки: за кольором	оранжеві	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначалась	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Зовнішні листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1
25	Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки	середня	5
26	Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку	помірний	5
27	Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за природною висотою	низька	3
29	Рослина: галушення (за винятком галушення, викликаного умовами середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галушення (як для 29)	ознака не визначалась	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначалась	0
32	Кошик: положення	напівобернене донизу разом із стеблом	5
33	Кошик: розмір	середній	5
34	Кошик: форма з боку сім'янок	злегка випукла	4
35	Сім'янка: за розміром	середня	5
36	Сім'янка: за формою	широкояйцеподібна	3
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	товста	7
38	Сім'янка: за основним кольором	чорна	7
39	Сім'янка: смугастість на краях	слабка	2
40	Сім'янка: смугастість між краями	відсутня або дуже слабка	1
41	Сім'янка: колір смужок	сірий	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість до вовчка (<i>Orobanche cumana</i> , раса E)	стійкий	1
44	Стійкість до <i>Plasmodiophora Halstedii</i>	відсутня	1

Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка №: 10017089 **Назва сорту** ЛВО 71В

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 11.11.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

20.01.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140089

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: аноціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірне	5
3	Листок: за розміром	малий	3
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	світле	3
5	Листок: пухирчастість	відсутня або дуже слабка	1
6	Листок: зубці	дрібні	3
7	Листок: форма у поперечному перерізі	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5
9	Листок: наявність вушок	малі	3
10	Листок: крила	відсутні або слабо виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабка	3
14	Час цвітіння	ранній	3
15	Язичкові квітки: за щільністю	щільні	7
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцевидні	2
17	Язичкові квітки: за положенням	плоскі	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: за кольором	помірно-жовті	3
20	Трубчасті квітки: за кольором	оранжеві	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначалась	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Зовнішні листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1
25	Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки	середня	5
26	Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку	помірний	5
27	Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за природною висотою	середня	5
29	Рослина: галушення (за винятком галушення, викликаного умовами середовища)	наявне	9
30	Рослина: тип галушення (як для 29)	переважно біля верхівки	4
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	нижче	1
32	Кошик: положення	напівобернене донизу разом із стеблом	5
33	Кошик: розмір	маленький	3
34	Кошик: форма з боку сім'янок	злегка випукла	4
35	Сім'янка: за розміром	середня	5
36	Сім'янка: за формою	вузькоюйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3
38	Сім'янка: за основним кольором	чорна	7
39	Сім'янка: смугастість на краях	дуже сильна	3
40	Сім'янка: смугастість між краями	слабка	2
41	Сім'янка: колір смужок	сірий	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість до вовчка (<i>Orobanchе cumana</i> , раса E)	стійкий	1
44	Стійкість до <i>Plasmopara Halstedii</i>	відсутня	1

Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка №: 11017110 **Назва сорту** ЛГ71234А

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 24.11.2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

06.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140242

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: аноціанове забарвлення	відсутнє	1
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначалась	0
3	Листок: за розміром	малий	3
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
5	Листок: пухирчастість	відсутня або дуже слабка	1
6	Листок: зубці	окремі або дуже дрібні	1
7	Листок: форма у поперечному перерізі	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5
9	Листок: наявність вушок	малі	3
10	Листок: крила	відсутні або слабо виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабка	3
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: за щільністю	нещільні	3
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцевидні	2
17	Язичкові квітки: за положенням	зігнуті за довжиною	2
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: за кольором	помірно-жовті	3
20	Трубчасті квітки: за кольором	жовті	1
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначалась	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1
24	Зовнішні листки обгортки: за формою	також чітко видовжені, але й чітко округлі	2
25	Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки	середня	5
26	Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку	помірний	5
27	Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за природною висотою	низька	3
29	Рослина: галуження (за винятком галуження, викликаного умовами середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначалась	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначалась	0
32	Кошик: положення	обернене донизу разом із прямим стеблом	6
33	Кошик: розмір	середній	5
34	Кошик: форма з боку сім'янок	сильно випукла	5
35	Сім'янка: за розміром	середня	5
36	Сім'янка: за формою	вузькояйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: за основним кольором	чорна	7
39	Сім'янка: смугастість на краях	слабка	2
40	Сім'янка: смугастість між краями	слабка	2
41	Сім'янка: колір смужок	сірий	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість до вовчка (<i>Orobanche cumana</i> , раса E)	толерантний	2
44	Стійкість до <i>Plasmodiophora Halstedii</i>	відсутня	1

Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка №: 11017009 **Назва сорту** Мх 524 Б

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 08.02.2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

13.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140301

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: аноціанове забарвлення	відсутнє	1
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначалась	0
3	Листок: за розміром	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
5	Листок: пухирчастість	помірна	5
6	Листок: зубці	окремі або дуже дрібні	1
7	Листок: форма у поперечному перерізі	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	загострена	8
9	Листок: наявність вушок	великі	7
10	Листок: крила	відсутні або слабо виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірна	5
14	Час цвітіння	ранній	3
15	Язичкові квітки: за щільністю	середньої щільності	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцевидні	2
17	Язичкові квітки: за положенням	плоскі	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: за кольором	помірно-жовті	3
20	Трубчасті квітки: за кольором	оранжеві	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначалась	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Зовнішні листки обгортки: за формою	також чітко видовжені, але й чітко округлі	2
25	Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки	середня	5
26	Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку	помірний	5
27	Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за природною висотою	дуже низька	1
29	Рослина: галуження (за винятком галуження, викликаного умовами середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначалась	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначалась	0
32	Кошик: положення	напівобернене донизу разом із стеблом	5
33	Кошик: розмір	маленький	3
34	Кошик: форма з боку сім'янок	злегка випукла	4
35	Сім'янка: за розміром	середня	5
36	Сім'янка: за формою	широкояйцеподібна	3
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: за основним кольором	чорна	7
39	Сім'янка: смугастість на краях	слабка	2
40	Сім'янка: смугастість між краями	слабка	2
41	Сім'янка: колір смужок	сірий	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість до вовчка (<i>Orobanche cumana</i> , раса E)	стійкий	1
44	Стійкість до <i>Plasmodiophora Halstedii</i>	відсутня	1

Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка №: 11017064 **Назва сорту** НС КОД 4

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 04.11.2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

17.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140358

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: аноціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабке	3
3	Листок: за розміром	малий	3
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
5	Листок: пухирчастість	помірна	5
6	Листок: зубці	дрібні	3
7	Листок: форма у поперечному перерізі	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	загострена	8
9	Листок: наявність вушок	помірні	5
10	Листок: крила	відсутні або слабо виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірна	5
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: за щільністю	щільні	7
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцевидні	2
17	Язичкові квітки: за положенням	хвилясті	3
18	Язичкові квітки: за довжиною	короткі	3
19	Язичкові квітки: за кольором	помірно-жовті	3
20	Трубчасті квітки: за кольором	оранжеві	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначалась	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1
24	Зовнішні листки обгортки: за формою	також чітко видовжені, але й чітко округлі	2
25	Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки	коротка	3
26	Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку	помірний	5
27	Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за природною висотою	низька	3
29	Рослина: галуження (за винятком галуження, викликаного умовами середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначалась	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначалась	0
32	Кошик: положення	напівобернене донизу разом із прямим стеблом	4
33	Кошик: розмір	маленький	3
34	Кошик: форма з боку сім'янок	злегка випукла	4
35	Сім'янка: за розміром	середня	5
36	Сім'янка: за формою	широкояйцеподібна	3
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: за основним кольором	чорна	7
39	Сім'янка: смугастість на краях	слабка	2
40	Сім'янка: смугастість між краями	слабка	2
41	Сім'янка: колір смужок	сірий	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість до вовчка (<i>Orobanche cumana</i> , раса E)	толерантний	2
44	Стійкість до <i>Plasmodiophora Halstedii</i>	відсутня	1

Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка №: 10017163 **Назва сорту** Р890ЖП

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 29.11.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

04.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140234

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: аноціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабке	3
3	Листок: за розміром	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	дрібні	3
7	Листок: форма у поперечному перерізі	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5
9	Листок: наявність вушок	малі	3
10	Листок: крила	відсутні або слабо виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірна	5
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: за щільністю	середньої щільності	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцевидні	2
17	Язичкові квітки: за положенням	плоскі	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: за кольором	світло-жовті	2
20	Трубчасті квітки: за кольором	оранжеві	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабке	3
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Зовнішні листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1
25	Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки	середня	5
26	Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку	помірний	5
27	Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за природною висотою	низька	3
29	Рослина: галушення (за винятком галушення, викликаного умовами середовища)	наявне	9
30	Рослина: тип галушення (як для 29)	переважно біля верхівки	4
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	на рівні	2
32	Кошик: положення	напівобернене донизу разом із стеблом	5
33	Кошик: розмір	маленький	3
34	Кошик: форма з боку сім'янок	сильно випукла	5
35	Сім'янка: за розміром	середня	5
36	Сім'янка: за формою	вузькоюйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: за основним кольором	чорна	7
39	Сім'янка: смугастість на краях	слабка	2
40	Сім'янка: смугастість між краями	відсутня або дуже слабка	1
41	Сім'янка: колір смужок	сірий	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість до вовчка (<i>Orobanche cumana</i> , раса E)	стійкий	1
44	Стійкість до <i>Plasmopara Halstedii</i>	відсутня	1

Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка №: 10017204 **Назва сорту** PXA OPO 7

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 02.12.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

27.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140410

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: аноціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабке	3
3	Листок: за розміром	малий	3
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	дрібні	3
7	Листок: форма у поперечному перерізі	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5
9	Листок: наявність вушок	помірні	5
10	Листок: крила	відсутні або слабо виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	відсутня або дуже слабка	1
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: за щільністю	середньої щільності	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцевидні	2
17	Язичкові квітки: за положенням	плоскі	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	короткі	3
19	Язичкові квітки: за кольором	помірно-жовті	3
20	Трубчасті квітки: за кольором	оранжеві	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначалась	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Зовнішні листки обгортки: за формою	також чітко видовжені, але й чітко округлі	2
25	Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки	середня	5
26	Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку	помірний	5
27	Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за природною висотою	низька	3
29	Рослина: галуження (за винятком галуження, викликаного умовами середовища)	наявне	9
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	лише на верхівці	5
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	нижче	1
32	Кошик: положення	обернене донизу разом із прямим стеблом	6
33	Кошик: розмір	маленький	3
34	Кошик: форма з боку сім'янок	злегка випукла	4
35	Сім'янка: за розміром	дрібна	3
36	Сім'янка: за формою	вузькояйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: за основним кольором	чорна	7
39	Сім'янка: смугастість на краях	слабка	2
40	Сім'янка: смугастість між краями	відсутня або дуже слабка	1
41	Сім'янка: колір смужок	сірий	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість до вовчка (<i>Orobanche cumana</i> , раса E)	стійкий	1
44	Стійкість до <i>Plasmodiophora Halstedii</i>	відсутня	1

Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка №: 11017024 **Назва сорту** РХА ПЕС 26Рф

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 08.02.2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

13.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140413

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: аноціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабке	3
3	Листок: за розміром	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	дрібні	3
7	Листок: форма у поперечному перерізі	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	загострена	8
9	Листок: наявність вушок	помірні	5
10	Листок: крила	відсутні або слабо виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірна	5
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: за щільністю	середньої щільності	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцевидні	2
17	Язичкові квітки: за положенням	плоскі	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: за кольором	помірно-жовті	3
20	Трубчасті квітки: за кольором	оранжеві	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабке	3
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Зовнішні листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1
25	Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки	середня	5
26	Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку	світлий	3
27	Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за природною висотою	середня	5
29	Рослина: галушення (за винятком галушення, викликаного умовами середовища)	наявне	9
30	Рослина: тип галушення (як для 29)	переважно біля верхівки	4
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	на рівні	2
32	Кошик: положення	напівобернене донизу разом із стеблом	5
33	Кошик: розмір	середній	5
34	Кошик: форма з боку сім'янок	плеската	3
35	Сім'янка: за розміром	середня	5
36	Сім'янка: за формою	вузькоюйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: за основним кольором	темно-коричнева	6
39	Сім'янка: смугастість на краях	відсутня або дуже слабка	1
40	Сім'янка: смугастість між краями	відсутня або дуже слабка	1
41	Сім'янка: колір смужок	ознака не визначалась	0
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	наявна	9
43	Стійкість до вовчка (<i>Orobanchе cumana</i> , раса E)	стійкий	1
44	Стійкість до <i>Plasmopara Halstedii</i>	відсутня	1

Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка №: 11017173 **Назва сорту** СА436Р

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 29.12.2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

04.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140103

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: аноціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірне	5
3	Листок: за розміром	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	помірні	5
7	Листок: форма у поперечному перерізі	слабко увігнута	2
8	Листок: форма верхівки	загострена	8
9	Листок: наявність вушок	великі	7
10	Листок: крила	відсутні або слабко виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабка	3
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: за щільністю	щільні	7
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюяцевидні	2
17	Язичкові квітки: за положенням	плоскі	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: за кольором	помірно-жовті	3
20	Трубчасті квітки: за кольором	оранжеві	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначалась	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Зовнішні листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1
25	Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки	середня	5
26	Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку	помірний	5
27	Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за природною висотою	низька	3
29	Рослина: галушення (за винятком галушення, викликаного умовами середовища)	наявне	9
30	Рослина: тип галушення (як для 29)	переважно біля верхівки	4
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	нижче	1
32	Кошик: положення	обернене донизу разом із прямим стеблом	6
33	Кошик: розмір	маленький	3
34	Кошик: форма з боку сім'янок	сильно випукла	5
35	Сім'янка: за розміром	дрібна	3
36	Сім'янка: за формою	широкоюяцеподібна	3
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: за основним кольором	чорна	7
39	Сім'янка: смугастість на краях	слабка	2
40	Сім'янка: смугастість між краями	відсутня або дуже слабка	1
41	Сім'янка: колір смужок	сірий	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість до вовчка (<i>Orobanchе cumana</i> , раса E)	стійкий	1
44	Стійкість до <i>Plasmopara Halstedii</i>	відсутня	1

Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка №: 11017112 **Назва сорту** CP98МЖ

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 24.11.2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

06.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140243

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: аноціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабке	3
3	Листок: за розміром	малий	3
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
5	Листок: пухирчастість	відсутня або дуже слабка	1
6	Листок: зубці	помірні	5
7	Листок: форма у поперечному перерізі	слабко увігнута	2
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4
9	Листок: наявність вушок	помірні	5
10	Листок: крила	відсутні або слабо виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірна	5
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: за щільністю	середньої щільності	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцевидні	2
17	Язичкові квітки: за положенням	плоскі	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: за кольором	помірно-жовті	3
20	Трубчасті квітки: за кольором	оранжеві	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначалась	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Зовнішні листки обгортки: за формою	також чітко видовжені, але й чітко округлі	2
25	Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки	середня	5
26	Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку	помірний	5
27	Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за природною висотою	низька	3
29	Рослина: галуження (за винятком галуження, викликаного умовами середовища)	наявне	9
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	переважно біля верхівки	4
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	нижче	1
32	Кошик: положення	вертикальне	3
33	Кошик: розмір	маленький	3
34	Кошик: форма з боку сім'янок	плеската	3
35	Сім'янка: за розміром	середня	5
36	Сім'янка: за формою	видовжена	1
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: за основним кольором	чорна	7
39	Сім'янка: смугастість на краях	дуже сильна	3
40	Сім'янка: смугастість між краями	слабка	2
41	Сім'янка: колір смужок	сірий	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість до вовчка (<i>Orobanche cumana</i> , раса E)	стійкий	1
44	Стійкість до <i>Plasmodiophora Halstedii</i>	відсутня	1

Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка №: 11017068 **Назва сорту** СУ Рф 49

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 04.11.2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

17.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140362

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: аноціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабке	3
3	Листок: за розміром	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	світле	3
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	дрібні	3
7	Листок: форма у поперечному перерізі	слабко увігнута	2
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5
9	Листок: наявність вушок	помірні	5
10	Листок: крила	відсутні або слабко виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабка	3
14	Час цвітіння	пізній	7
15	Язичкові квітки: за щільністю	середньої щільності	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцевидні	2
17	Язичкові квітки: за положенням	плоскі	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	короткі	3
19	Язичкові квітки: за кольором	помірно-жовті	3
20	Трубчасті квітки: за кольором	оранжеві	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	помірне	5
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Зовнішні листки обгортки: за формою	чітко округлі	3
25	Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки	середня	5
26	Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку	помірний	5
27	Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за природною висотою	низька	3
29	Рослина: галуження (за винятком галуження, викликаного умовами середовища)	наявне	9
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	нижче	1
32	Кошик: положення	напівобернене донизу разом із стеблом	5
33	Кошик: розмір	маленький	3
34	Кошик: форма з боку сім'янок	плеската	3
35	Сім'янка: за розміром	дрібна	3
36	Сім'янка: за формою	вузькоюйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: за основним кольором	сіра	3
39	Сім'янка: смугастість на краях	відсутня або дуже слабка	1
40	Сім'янка: смугастість між краями	відсутня або дуже слабка	1
41	Сім'янка: колір смужок	ознака не визначалась	0
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість до вовчка (<i>Orobanche cumana</i> , раса E)	стійкий	1
44	Стійкість до <i>Plasmopara Halstedii</i>	відсутня	1

Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка №: 10017132 **Назва сорту** СФ9074 МА

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 25.11.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

06.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140246

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: аноціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильне	7
3	Листок: за розміром	малий	3
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
5	Листок: пухирчастість	помірна	5
6	Листок: зубці	окремі або дуже дрібні	1
7	Листок: форма у поперечному перерізі	слабко увігнута	2
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до округлої	7
9	Листок: наявність вушок	помірні	5
10	Листок: крила	відсутні або слабко виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабка	3
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: за щільністю	середньої щільності	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцевидні	2
17	Язичкові квітки: за положенням	плоскі	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: за кольором	помірно-жовті	3
20	Трубчасті квітки: за кольором	оранжеві	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначалась	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1
24	Зовнішні листки обгортки: за формою	чітко округлі	3
25	Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки	коротка	3
26	Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку	помірний	5
27	Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика	дуже охоплює	3
28	Рослина: за природною висотою	низька	3
29	Рослина: галуження (за винятком галуження, викликаного умовами середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначалась	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначалась	0
32	Кошик: положення	напівобернене донизу разом із прямим стеблом	4
33	Кошик: розмір	маленький	3
34	Кошик: форма з боку сім'янок	злегка випукла	4
35	Сім'янка: за розміром	середня	5
36	Сім'янка: за формою	вузькоюйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: за основним кольором	чорна	7
39	Сім'янка: смугастість на краях	відсутня або дуже слабка	1
40	Сім'янка: смугастість між краями	відсутня або дуже слабка	1
41	Сім'янка: колір смужок	сірий	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість до вовчка (<i>Orobanchе cumana</i> , раса E)	стійкий	1
44	Стійкість до <i>Plasmopara Halstedii</i>	відсутня	1

Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка №: 10017177 **Назва сорту** Сх IP10 А

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 30.11.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

13.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140300

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: аноціанове забарвлення	відсутнє	1
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначалась	0
3	Листок: за розміром	малий	3
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
5	Листок: пухирчастість	помірна	5
6	Листок: зубці	помірні	5
7	Листок: форма у поперечному перерізі	слабко увігнута	2
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6
9	Листок: наявність вушок	великі	7
10	Листок: крила	відсутні або слабко виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірна	5
14	Час цвітіння	ранній	3
15	Язичкові квітки: за щільністю	середньої щільності	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцевидні	2
17	Язичкові квітки: за положенням	плоскі	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: за кольором	помірно-жовті	3
20	Трубчасті квітки: за кольором	оранжеві	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначалась	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1
24	Зовнішні листки обгортки: за формою	чітко округлі	3
25	Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки	середня	5
26	Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку	помірний	5
27	Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за природною висотою	низька	3
29	Рослина: галузнення (за винятком галузнення, викликаного умовами середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галузнення (як для 29)	ознака не визначалась	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначалась	0
32	Кошик: положення	напівобернене донизу разом із прямим стеблом	4
33	Кошик: розмір	маленький	3
34	Кошик: форма з боку сім'янок	злегка випукла	4
35	Сім'янка: за розміром	середня	5
36	Сім'янка: за формою	широкояйцеподібна	3
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: за основним кольором	чорна	7
39	Сім'янка: смугастість на краях	слабка	2
40	Сім'янка: смугастість між краями	відсутня або дуже слабка	1
41	Сім'янка: колір смужок	сірий	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість до вовчка (<i>Orobanche cumana</i> , раса E)	толерантний	2
44	Стійкість до <i>Plasmodiophora Halstedii</i>	відсутня	1

Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка №: 10017156 **Назва сорту** T75

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 29.11.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

21.01.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140097

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: аноціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірне	5
3	Листок: за розміром	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	світле	3
5	Листок: пухирчастість	відсутня або дуже слабка	1
6	Листок: зубці	дрібні	3
7	Листок: форма у поперечному перерізі	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	загострена	8
9	Листок: наявність вушок	помірні	5
10	Листок: крила	відсутні або слабо виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірна	5
14	Час цвітіння	ранній	3
15	Язичкові квітки: за щільністю	щільні	7
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцевидні	2
17	Язичкові квітки: за положенням	плоскі	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: за кольором	помірно-жовті	3
20	Трубчасті квітки: за кольором	оранжеві	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначалась	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Зовнішні листки обгортки: за формою	також чітко видовжені, але й чітко округлі	2
25	Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки	середня	5
26	Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку	помірний	5
27	Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або злегка охоплює	1
28	Рослина: за природною висотою	середня	5
29	Рослина: галуження (за винятком галуження, викликаного умовами середовища)	наявне	9
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	переважно біля верхівки	4
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	нижче	1
32	Кошик: положення	напівобернене донизу разом із стеблом	5
33	Кошик: розмір	маленький	3
34	Кошик: форма з боку сім'янок	злегка випукла	4
35	Сім'янка: за розміром	середня	5
36	Сім'янка: за формою	вузькояйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: за основним кольором	чорна	7
39	Сім'янка: смугастість на краях	слабка	2
40	Сім'янка: смугастість між краями	слабка	2
41	Сім'янка: колір смужок	сірий	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість до вовчка (<i>Orobanchе cumanа</i> , раса E)	стійкий	1
44	Стійкість до <i>Plasmodiophora Halstedii</i>	відсутня	1

Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка №: 10017157 **Назва сорту** T82

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 29.11.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

21.01.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140098

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: аноціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабке	3
3	Листок: за розміром	малий	3
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
5	Листок: пухирчастість	помірна	5
6	Листок: зубці	дрібні	3
7	Листок: форма у поперечному перерізі	слабко випукла	4
8	Листок: форма верхівки	загострена	8
9	Листок: наявність вушок	помірні	5
10	Листок: крила	слабко виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабка	3
14	Час цвітіння	ранній	3
15	Язичкові квітки: за щільністю	середньої щільності	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцевидні	2
17	Язичкові квітки: за положенням	плоскі	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: за кольором	помірно-жовті	3
20	Трубчасті квітки: за кольором	оранжеві	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначалась	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Зовнішні листки обгортки: за формою	також чітко видовжені, але й чітко округлі	2
25	Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки	коротка	3
26	Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку	помірний	5
27	Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або злегка охоплює	1
28	Рослина: за природною висотою	низька	3
29	Рослина: галуження (за винятком галуження, викликаного умовами середовища)	наявне	9
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	на рівні	2
32	Кошик: положення	напівобернене донизу разом із стеблом	5
33	Кошик: розмір	маленький	3
34	Кошик: форма з боку сім'янок	злегка випукла	4
35	Сім'янка: за розміром	середня	5
36	Сім'янка: за формою	вузькоюйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: за основним кольором	чорна	7
39	Сім'янка: смугастість на краях	відсутня або дуже слабка	1
40	Сім'янка: смугастість між краями	відсутня або дуже слабка	1
41	Сім'янка: колір смужок	ознака не визначалась	0
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість до вовчка (<i>Orobanchе cumanа</i> , раса E)	сприйнятливий	3
44	Стійкість до <i>Plasmopara Halstedii</i>	відсутня	1

Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка №: 11017040 **Назва сорту** ТРО2503

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 19.09.2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

06.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140237

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: аноціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабке	3
3	Листок: за розміром	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	темне	7
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	помірні	5
7	Листок: форма у поперечному перерізі	слабко увігнута	2
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6
9	Листок: наявність вушок	помірні	5
10	Листок: крила	відсутні або слабко виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	сильна	7
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: за щільністю	щільні	7
16	Язичкові квітки: за формою	широкояйцевидні	3
17	Язичкові квітки: за положенням	плоскі	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: за кольором	помірно-жовті	3
20	Трубчасті квітки: за кольором	оранжеві	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначалась	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Зовнішні листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1
25	Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки	середня	5
26	Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку	помірний	5
27	Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за природною висотою	низька	3
29	Рослина: галуження (за винятком галуження, викликаного умовами середовища)	наявне	9
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	на рівні	2
32	Кошик: положення	обернене донизу разом із прямим стеблом	6
33	Кошик: розмір	маленький	3
34	Кошик: форма з боку сім'янок	злегка випукла	4
35	Сім'янка: за розміром	середня	5
36	Сім'янка: за формою	видовжена	1
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3
38	Сім'янка: за основним кольором	чорна	7
39	Сім'янка: смугастість на краях	відсутня або дуже слабка	1
40	Сім'янка: смугастість між краями	відсутня або дуже слабка	1
41	Сім'янка: колір смужок	ознака не визначалась	0
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість до вовчка (<i>Orobanche cumana</i> , раса E)	стійкий	1
44	Стійкість до <i>Plasmodiophora Halstedii</i>	відсутня	1

Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка №: 11017037 **Назва сорту** ТРО2662

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

06.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140235

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: аноціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірне	5
3	Листок: за розміром	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	окремі або дуже дрібні	1
7	Листок: форма у поперечному перерізі	слабко увігнута	2
8	Листок: форма верхівки	вузькотрикутна	3
9	Листок: наявність вушок	помірні	5
10	Листок: крила	слабко виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабка	3
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: за щільністю	середньої щільності	5
16	Язичкові квітки: за формою	веретинovidні	1
17	Язичкові квітки: за положенням	зігнуті за довжиною	2
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: за кольором	помірно-жовті	3
20	Трубчасті квітки: за кольором	оранжеві	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначалась	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Зовнішні листки обгортки: за формою	також чітко видовжені, але й чітко округлі	2
25	Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки	коротка	3
26	Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку	помірний	5
27	Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика	дуже охоплює	3
28	Рослина: за природною висотою	низька	3
29	Рослина: галуження (за винятком галуження, викликаного умовами середовища)	наявне	9
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	нижче	1
32	Кошик: положення	напівобернене донизу разом із стеблом	5
33	Кошик: розмір	маленький	3
34	Кошик: форма з боку сім'янок	деформована	6
35	Сім'янка: за розміром	середня	5
36	Сім'янка: за формою	широкояйцеподібна	3
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: за основним кольором	чорна	7
39	Сім'янка: смугастість на краях	відсутня або дуже слабка	1
40	Сім'янка: смугастість між краями	відсутня або дуже слабка	1
41	Сім'янка: колір смужок	ознака не визначалась	0
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість до вовчка (<i>Orobanchе cumanа</i> , раса E)	толерантний	2
44	Стійкість до <i>Plasmodiа Halstedii</i>	відсутня	1

Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка №: 11017045 **Назва сорту** TPX3170

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 19.09.2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

06.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140240

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: аноціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірне	5
3	Листок: за розміром	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
5	Листок: пухирчастість	помірна	5
6	Листок: зубці	помірні	5
7	Листок: форма у поперечному перерізі	слабко увігнута	2
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6
9	Листок: наявність вушок	великі	7
10	Листок: крила	слабко виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	на рівні	5
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабка	3
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: за щільністю	середньої щільності	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцевидні	2
17	Язичкові квітки: за положенням	плоскі	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: за кольором	помірно-жовті	3
20	Трубчасті квітки: за кольором	оранжеві	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначалась	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Зовнішні листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1
25	Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки	коротка	3
26	Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку	помірний	5
27	Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за природною висотою	низька	3
29	Рослина: галуження (за винятком галуження, викликаного умовами середовища)	наявне	9
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	переважно біля верхівки	4
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	нижче	1
32	Кошик: положення	напівобернене донизу разом із стеблом	5
33	Кошик: розмір	маленький	3
34	Кошик: форма з боку сім'янок	злегка випукла	4
35	Сім'янка: за розміром	середня	5
36	Сім'янка: за формою	вузькоюйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: за основним кольором	сіра	3
39	Сім'янка: смугастість на краях	відсутня або дуже слабка	1
40	Сім'янка: смугастість між краями	відсутня або дуже слабка	1
41	Сім'янка: колір смужок	ознака не визначалась	0
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість до вовчка (<i>Orobanche cumana</i> , раса E)	стійкий	1
44	Стійкість до <i>Plasmodiophora Halstedii</i>	відсутня	1

Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка №: 11017041 **Назва сорту** ТФО2444

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 19.09.2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

06.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140238

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: аноціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабке	3
3	Листок: за розміром	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	дрібні	3
7	Листок: форма у поперечному перерізі	слабко увігнута	2
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6
9	Листок: наявність вушок	помірні	5
10	Листок: крила	слабко виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірна	5
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: за щільністю	середньої щільності	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцевидні	2
17	Язичкові квітки: за положенням	плоскі	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: за кольором	помірно-жовті	3
20	Трубчасті квітки: за кольором	оранжеві	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначалась	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1
24	Зовнішні листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1
25	Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки	коротка	3
26	Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку	помірний	5
27	Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за природною висотою	низька	3
29	Рослина: галуження (за винятком галуження, викликаного умовами середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначалась	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначалась	0
32	Кошик: положення	напівобернене донизу разом із стеблом	5
33	Кошик: розмір	середній	5
34	Кошик: форма з боку сім'янок	злегка випукла	4
35	Сім'янка: за розміром	середня	5
36	Сім'янка: за формою	широкояйцеподібна	3
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: за основним кольором	чорна	7
39	Сім'янка: смугастість на краях	слабка	2
40	Сім'янка: смугастість між краями	відсутня або дуже слабка	1
41	Сім'янка: колір смужок	коричневий	3
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість до вовчка (<i>Orobanche cumana</i> , раса E)	толерантний	2
44	Стійкість до <i>Plasmodiophora Halstedii</i>	відсутня	1

Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка №: 11017042 **Назва сорту** ТФО2880

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 19.09.2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

06.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140239

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: аноціанове забарвлення	відсутнє	1
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначалась	0
3	Листок: за розміром	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	світле	3
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	дрібні	3
7	Листок: форма у поперечному перерізі	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5
9	Листок: наявність вушок	малі	3
10	Листок: крила	слабко виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	відсутня або дуже слабка	1
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: за щільністю	щільні	7
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцевидні	2
17	Язичкові квітки: за положенням	плоскі	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: за кольором	помірно-жовті	3
20	Трубчасті квітки: за кольором	оранжеві	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначалась	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1
24	Зовнішні листки обгортки: за формою	також чітко видовжені, але й чітко округлі	2
25	Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки	середня	5
26	Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку	помірний	5
27	Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за природною висотою	низька	3
29	Рослина: галуження (за винятком галуження, викликаного умовами середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначалась	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначалась	0
32	Кошик: положення	обернене донизу разом із прямим стеблом	6
33	Кошик: розмір	маленький	3
34	Кошик: форма з боку сім'янок	злегка випукла	4
35	Сім'янка: за розміром	середня	5
36	Сім'янка: за формою	вузькояйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: за основним кольором	чорна	7
39	Сім'янка: смугастість на краях	відсутня або дуже слабка	1
40	Сім'янка: смугастість між краями	відсутня або дуже слабка	1
41	Сім'янка: колір смужок	сірий	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість до вовчка (<i>Orobanche cumana</i> , раса E)	толерантний	2
44	Стійкість до <i>Plasmodiophora Halstedii</i>	відсутня	1

Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка №: 11017039 **Назва сорту** ТФХ3175

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 19.09.2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

06.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140236

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: аноціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабке	3
3	Листок: за розміром	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	світле	3
5	Листок: пухирчастість	відсутня або дуже слабка	1
6	Листок: зубці	помірні	5
7	Листок: форма у поперечному перерізі	слабко увігнута	2
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5
9	Листок: наявність вушок	малі	3
10	Листок: крила	відсутні або слабко виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабка	3
14	Час цвітіння	пізній	7
15	Язичкові квітки: за щільністю	середньої щільності	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцевидні	2
17	Язичкові квітки: за положенням	плоскі	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: за кольором	помірно-жовті	3
20	Трубчасті квітки: за кольором	оранжеві	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначалась	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1
24	Зовнішні листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1
25	Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки	середня	5
26	Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку	помірний	5
27	Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за природною висотою	низька	3
29	Рослина: галушення (за винятком галушення, викликаного умовами середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галушення (як для 29)	ознака не визначалась	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначалась	0
32	Кошик: положення	напівобернене донизу разом із прямим стеблом	4
33	Кошик: розмір	маленький	3
34	Кошик: форма з боку сім'янок	злегка випукла	4
35	Сім'янка: за розміром	середня	5
36	Сім'янка: за формою	широкояйцеподібна	3
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: за основним кольором	чорна	7
39	Сім'янка: смугастість на краях	слабка	2
40	Сім'янка: смугастість між краями	відсутня або дуже слабка	1
41	Сім'янка: колір смужок	сірий	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість до вовчка (<i>Orobanche cumana</i> , раса E)	толерантний	2
44	Стійкість до <i>Plasmodiophora Halstedii</i>	відсутня	1

Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка №: 12017024 **Назва сорту** УК58

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 03.02.2012

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

04.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140106

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: аноціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірне	5
3	Листок: за розміром	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	дрібні	3
7	Листок: форма у поперечному перерізі	слабко увігнута	2
8	Листок: форма верхівки	загострена	8
9	Листок: наявність вушок	великі	7
10	Листок: крила	відсутні або слабко виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабка	3
14	Час цвітіння	пізній	7
15	Язичкові квітки: за щільністю	середньої щільності	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцевидні	2
17	Язичкові квітки: за положенням	хвилясті	3
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: за кольором	помірно-жовті	3
20	Трубчасті квітки: за кольором	оранжеві	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабке	3
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1
24	Зовнішні листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1
25	Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки	коротка	3
26	Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку	помірний	5
27	Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика	дуже охоплює	3
28	Рослина: за природною висотою	низька	3
29	Рослина: галушення (за винятком галушення, викликаного умовами середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галушення (як для 29)	ознака не визначалась	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначалась	0
32	Кошик: положення	напівобернене донизу разом із прямим стеблом	4
33	Кошик: розмір	середній	5
34	Кошик: форма з боку сім'янок	плеската	3
35	Сім'янка: за розміром	велика	7
36	Сім'янка: за формою	вузькоюйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: за основним кольором	сіра	3
39	Сім'янка: смугастість на краях	відсутня або дуже слабка	1
40	Сім'янка: смугастість між краями	відсутня або дуже слабка	1
41	Сім'янка: колір смужок	сірий	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість до вовчка (<i>Orobanchе cumana</i> , раса E)	стійкий	1
44	Стійкість до <i>Plasmodiо Halstedii</i>	відсутня	1

Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка №: 10017141 **Назва сорту** УН 1100 ХА

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 25.11.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

10.02.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140095

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: аноціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірне	5
3	Листок: за розміром	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
5	Листок: пухирчастість	помірна	5
6	Листок: зубці	дрібні	3
7	Листок: форма у поперечному перерізі	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6
9	Листок: наявність вушок	малі	3
10	Листок: крила	слабко виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабка	3
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: за щільністю	середньої щільності	5
16	Язичкові квітки: за формою	широкояйцевидні	3
17	Язичкові квітки: за положенням	хвилясті	3
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: за кольором	оранжеві	5
20	Трубчасті квітки: за кольором	оранжеві	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабке	3
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1
24	Зовнішні листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1
25	Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки	середня	5
26	Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку	світлий	3
27	Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за природною висотою	середня	5
29	Рослина: галуження (за винятком галуження, викликаного умовами середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначалась	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначалась	0
32	Кошик: положення	напівобернене донизу разом із прямим стеблом	4
33	Кошик: розмір	середній	5
34	Кошик: форма з боку сім'янок	злегка випукла	4
35	Сім'янка: за розміром	середня	5
36	Сім'янка: за формою	широкояйцеподібна	3
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: за основним кольором	чорна	7
39	Сім'янка: смугастість на краях	відсутня або дуже слабка	1
40	Сім'янка: смугастість між краями	відсутня або дуже слабка	1
41	Сім'янка: колір смужок	ознака не визначалась	0
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість до вовчка (<i>Orobanche cumana</i> , раса E)	стійкий	1
44	Стійкість до <i>Plasmodiophora Halstedii</i>	відсутня	1

Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка №: 10017140 **Назва сорту** УН 1220 ХА

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 25.11.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

10.02.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140094

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: аноціанове забарвлення	відсутнє	1
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначалась	0
3	Листок: за розміром	малий	3
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
5	Листок: пухирчастість	відсутня або дуже слабка	1
6	Листок: зубці	окремі або дуже дрібні	1
7	Листок: форма у поперечному перерізі	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6
9	Листок: наявність вушок	помірні	5
10	Листок: крила	відсутні або слабо виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабка	3
14	Час цвітіння	ранній	3
15	Язичкові квітки: за щільністю	середньої щільності	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцевидні	2
17	Язичкові квітки: за положенням	хвилясті	3
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: за кольором	помірно-жовті	3
20	Трубчасті квітки: за кольором	оранжеві	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначалась	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1
24	Зовнішні листки обгортки: за формою	також чітко видовжені, але й чітко округлі	2
25	Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки	середня	5
26	Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку	світлий	3
27	Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика	дуже охоплює	3
28	Рослина: за природною висотою	низька	3
29	Рослина: галузнення (за винятком галузнення, викликаного умовами середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галузнення (як для 29)	ознака не визначалась	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначалась	0
32	Кошик: положення	напівобернене донизу разом із стеблом	5
33	Кошик: розмір	маленький	3
34	Кошик: форма з боку сім'янок	плеската	3
35	Сім'янка: за розміром	середня	5
36	Сім'янка: за формою	широкояйцеподібна	3
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3
38	Сім'янка: за основним кольором	чорна	7
39	Сім'янка: смугастість на краях	відсутня або дуже слабка	1
40	Сім'янка: смугастість між краями	відсутня або дуже слабка	1
41	Сім'янка: колір смужок	ознака не визначалась	0
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість до вовчка (<i>Orobanche cumana</i> , раса E)	стійкий	1
44	Стійкість до <i>Plasmodiophora Halstedii</i>	відсутня	1

Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка №: 10017143 **Назва сорту** УН 1234 ХА

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 25.11.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

10.02.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140096

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: аноціанове забарвлення	відсутнє	1
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначалась	0
3	Листок: за розміром	малий	3
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
5	Листок: пухирчастість	помірна	5
6	Листок: зубці	окремі або дуже дрібні	1
7	Листок: форма у поперечному перерізі	сильно увігнута	1
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6
9	Листок: наявність вушок	помірні	5
10	Листок: крила	відсутні або слабо виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабка	3
14	Час цвітіння	ранній	3
15	Язичкові квітки: за щільністю	середньої щільності	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцевидні	2
17	Язичкові квітки: за положенням	хвилясті	3
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: за кольором	помірно-жовті	3
20	Трубчасті квітки: за кольором	оранжеві	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначалась	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1
24	Зовнішні листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1
25	Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки	коротка	3
26	Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку	темний	7
27	Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за природною висотою	середня	5
29	Рослина: галуження (за винятком галуження, викликаного умовами середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначалась	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначалась	0
32	Кошик: положення	напівобернене донизу разом із прямим стеблом	4
33	Кошик: розмір	середній	5
34	Кошик: форма з боку сім'янок	злегка випукла	4
35	Сім'янка: за розміром	середня	5
36	Сім'янка: за формою	видовжена	1
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: за основним кольором	чорна	7
39	Сім'янка: смугастість на краях	відсутня або дуже слабка	1
40	Сім'янка: смугастість між краями	відсутня або дуже слабка	1
41	Сім'янка: колір смужок	сірий	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	наявна	9
43	Стійкість до вовчка (<i>Orobanche cumana</i> , раса E)	толерантний	2
44	Стійкість до <i>Plasmodiophora Halstedii</i>	відсутня	1

Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка №: 10017139 **Назва сорту** УН 3502 ХА

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 25.11.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

10.02.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140093

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: аноціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабке	3
3	Листок: за розміром	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	дрібні	3
7	Листок: форма у поперечному перерізі	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6
9	Листок: наявність вушок	помірні	5
10	Листок: крила	відсутні або слабо виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабка	3
14	Час цвітіння	ранній	3
15	Язичкові квітки: за щільністю	середньої щільності	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцевидні	2
17	Язичкові квітки: за положенням	плоскі	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: за кольором	помірно-жовті	3
20	Трубчасті квітки: за кольором	оранжеві	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначалась	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1
24	Зовнішні листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1
25	Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки	середня	5
26	Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку	помірний	5
27	Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за природною висотою	низька	3
29	Рослина: галуження (за винятком галуження, викликаного умовами середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначалась	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначалась	0
32	Кошик: положення	напівобернене донизу разом із прямим стеблом	4
33	Кошик: розмір	середній	5
34	Кошик: форма з боку сім'янок	злегка випукла	4
35	Сім'янка: за розміром	середня	5
36	Сім'янка: за формою	широкояйцеподібна	3
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: за основним кольором	чорна	7
39	Сім'янка: смугастість на краях	слабка	2
40	Сім'янка: смугастість між краями	відсутня або дуже слабка	1
41	Сім'янка: колір смужок	сірий	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість до вовчка (<i>Orobanche cumana</i> , раса E)	стійкий	1
44	Стійкість до <i>Plasmodiophora Halstedii</i>	відсутня	1

Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка №: 11017114 **Назва сорту** Ф4АЕ1МА

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 24.11.2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

06.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140244

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: аноціанове забарвлення	відсутнє	1
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначалась	0
3	Листок: за розміром	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	темне	7
5	Листок: пухирчастість	відсутня або дуже слабка	1
6	Листок: зубці	помірні	5
7	Листок: форма у поперечному перерізі	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4
9	Листок: наявність вушок	малі	3
10	Листок: крила	слабо виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабка	3
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: за щільністю	нещільні	3
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцевидні	2
17	Язичкові квітки: за положенням	хвилясті	3
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: за кольором	помірно-жовті	3
20	Трубчасті квітки: за кольором	оранжеві	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначалась	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1
24	Зовнішні листки обгортки: за формою	також чітко видовжені, але й чітко округлі	2
25	Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки	середня	5
26	Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку	помірний	5
27	Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за природною висотою	низька	3
29	Рослина: галузнення (за винятком галузнення, викликаного умовами середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галузнення (як для 29)	ознака не визначалась	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначалась	0
32	Кошик: положення	напівобернене донизу разом із прямим стеблом	4
33	Кошик: розмір	середній	5
34	Кошик: форма з боку сім'янок	злегка випукла	4
35	Сім'янка: за розміром	середня	5
36	Сім'янка: за формою	широкоюйцеподібна	3
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: за основним кольором	чорна	7
39	Сім'янка: смугастість на краях	слабка	2
40	Сім'янка: смугастість між краями	відсутня або дуже слабка	1
41	Сім'янка: колір смужок	сірий	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	наявна	9
43	Стійкість до вовчка (<i>Orobanche cumana</i> , раса E)	стійкий	1
44	Стійкість до <i>Plasmodiophora Halstedii</i>	наявна	9

Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка №: 11017145 **Назва сорту** ФС73100

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 30.11.2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

04.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140102

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: аноціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабке	3
3	Листок: за розміром	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
5	Листок: пухирчастість	відсутня або дуже слабка	1
6	Листок: зубці	дрібні	3
7	Листок: форма у поперечному перерізі	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5
9	Листок: наявність вушок	помірні	5
10	Листок: крила	слабко виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	відсутня або дуже слабка	1
14	Час цвітіння	ранній	3
15	Язичкові квітки: за щільністю	середньої щільності	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцевидні	2
17	Язичкові квітки: за положенням	плоскі	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	короткі	3
19	Язичкові квітки: за кольором	помірно-жовті	3
20	Трубчасті квітки: за кольором	оранжеві	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначалась	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1
24	Зовнішні листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1
25	Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки	середня	5
26	Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку	світлий	3
27	Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за природною висотою	низька	3
29	Рослина: галушення (за винятком галушення, викликаного умовами середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галушення (як для 29)	ознака не визначалась	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначалась	0
32	Кошик: положення	напівобернене донизу разом із стеблом	5
33	Кошик: розмір	маленький	3
34	Кошик: форма з боку сім'янок	злегка випукла	4
35	Сім'янка: за розміром	середня	5
36	Сім'янка: за формою	вузькоюйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: за основним кольором	чорна	7
39	Сім'янка: смугастість на краях	слабка	2
40	Сім'янка: смугастість між краями	відсутня або дуже слабка	1
41	Сім'янка: колір смужок	сірий	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість до вовчка (<i>Orobanche cumana</i> , раса E)	стійкий	1
44	Стійкість до <i>Plasmodiophora Halstedii</i>	відсутня	1

Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка №: 11017143 **Назва сорту** ФС73700

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 30.11.2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

05.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140245

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: аноціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабке	3
3	Листок: за розміром	малий	3
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	темне	7
5	Листок: пухирчастість	помірна	5
6	Листок: зубці	дрібні	3
7	Листок: форма у поперечному перерізі	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6
9	Листок: наявність вушок	великі	7
10	Листок: крила	відсутні або слабо виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	на рівні	5
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабка	3
14	Час цвітіння	ранній	3
15	Язичкові квітки: за щільністю	середньої щільності	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцевидні	2
17	Язичкові квітки: за положенням	плоскі	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: за кольором	помірно-жовті	3
20	Трубчасті квітки: за кольором	оранжеві	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	помірне	5
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1
24	Зовнішні листки обгортки: за формою	також чітко видовжені, але й чітко округлі	2
25	Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки	коротка	3
26	Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку	світлий	3
27	Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за природною висотою	низька	3
29	Рослина: галузнення (за винятком галузнення, викликаного умовами середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галузнення (як для 29)	ознака не визначалась	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначалась	0
32	Кошик: положення	напівобернене донизу разом із стеблом	5
33	Кошик: розмір	маленький	3
34	Кошик: форма з боку сім'янок	деформована	6
35	Сім'янка: за розміром	середня	5
36	Сім'янка: за формою	вузькояйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: за основним кольором	чорна	7
39	Сім'янка: смугастість на краях	слабка	2
40	Сім'янка: смугастість між краями	відсутня або дуже слабка	1
41	Сім'янка: колір смужок	сірий	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість до вовчка (<i>Orobanche cumana</i> , раса E)	толерантний	2
44	Стійкість до <i>Plasmodiophora Halstedii</i>	відсутня	1

Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка №: 11017142 **Назва сорту** ФС73900

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 30.11.2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

04.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140100

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: аноціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірне	5
3	Листок: за розміром	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
5	Листок: пухирчастість	помірна	5
6	Листок: зубці	дрібні	3
7	Листок: форма у поперечному перерізі	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6
9	Листок: наявність вушок	помірні	5
10	Листок: крила	відсутні або слабо виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	на рівні	5
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірна	5
14	Час цвітіння	ранній	3
15	Язичкові квітки: за щільністю	середньої щільності	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцевидні	2
17	Язичкові квітки: за положенням	зігнуті за довжиною	2
18	Язичкові квітки: за довжиною	короткі	3
19	Язичкові квітки: за кольором	помірно-жовті	3
20	Трубчасті квітки: за кольором	оранжеві	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабке	3
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1
24	Зовнішні листки обгортки: за формою	також чітко видовжені, але й чітко округлі	2
25	Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки	коротка	3
26	Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку	помірний	5
27	Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика	дуже охоплює	3
28	Рослина: за природною висотою	низька	3
29	Рослина: галуження (за винятком галуження, викликаного умовами середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначалась	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначалась	0
32	Кошик: положення	напівобернене донизу разом із прямим стеблом	4
33	Кошик: розмір	маленький	3
34	Кошик: форма з боку сім'янок	злегка випукла	4
35	Сім'янка: за розміром	середня	5
36	Сім'янка: за формою	широкояйцеподібна	3
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: за основним кольором	чорна	7
39	Сім'янка: смугастість на краях	відсутня або дуже слабка	1
40	Сім'янка: смугастість між краями	відсутня або дуже слабка	1
41	Сім'янка: колір смужок	ознака не визначалась	0
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	наявна	9
43	Стійкість до вовчка (<i>Orobanche cumana</i> , раса E)	толерантний	2
44	Стійкість до <i>Plasmopara Halstedii</i>	наявна	9

Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка №: 11017144 **Назва сорту** ФС74400

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 30.11.2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

04.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140101

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: аноціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірне	5
3	Листок: за розміром	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
5	Листок: пухирчастість	помірна	5
6	Листок: зубці	дрібні	3
7	Листок: форма у поперечному перерізі	слабко увігнута	2
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6
9	Листок: наявність вушок	великі	7
10	Листок: крила	відсутні або слабко виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	на рівні	5
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабка	3
14	Час цвітіння	ранній	3
15	Язичкові квітки: за щільністю	середньої щільності	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцевидні	2
17	Язичкові квітки: за положенням	плоскі	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: за кольором	оранжево-жовті	4
20	Трубчасті квітки: за кольором	оранжеві	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначалась	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1
24	Зовнішні листки обгортки: за формою	також чітко видовжені, але й чітко округлі	2
25	Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки	коротка	3
26	Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку	помірний	5
27	Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика	дуже охоплює	3
28	Рослина: за природною висотою	дуже низька	1
29	Рослина: галуження (за винятком галуження, викликаного умовами середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначалась	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначалась	0
32	Кошик: положення	напівобернене донизу разом із прямим стеблом	4
33	Кошик: розмір	маленький	3
34	Кошик: форма з боку сім'янок	злегка випукла	4
35	Сім'янка: за розміром	середня	5
36	Сім'янка: за формою	широкояйцеподібна	3
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: за основним кольором	чорна	7
39	Сім'янка: смугастість на краях	слабка	2
40	Сім'янка: смугастість між краями	відсутня або дуже слабка	1
41	Сім'янка: колір смужок	сірий	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість до вовчка (<i>Orobanche cumana</i> , раса E)	толерантний	2
44	Стійкість до <i>Plasmodiophora Halstedii</i>	відсутня	1

Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка №: 11017021 **Назва сорту** X 1007 Б

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 08.02.2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

13.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140307

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: аноціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабке	3
3	Листок: за розміром	малий	3
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	окремі або дуже дрібні	1
7	Листок: форма у поперечному перерізі	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6
9	Листок: наявність вушок	великі	7
10	Листок: крила	відсутні або слабо виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	відсутня або дуже слабка	1
14	Час цвітіння	ранній	3
15	Язичкові квітки: за щільністю	середньої щільності	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцевидні	2
17	Язичкові квітки: за положенням	плоскі	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: за кольором	помірно-жовті	3
20	Трубчасті квітки: за кольором	оранжеві	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначалась	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Зовнішні листки обгортки: за формою	також чітко видовжені, але й чітко округлі	2
25	Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки	середня	5
26	Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку	світлий	3
27	Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за природною висотою	низька	3
29	Рослина: галузнення (за винятком галузнення, викликаного умовами середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галузнення (як для 29)	ознака не визначалась	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначалась	0
32	Кошик: положення	напівобернене донизу разом із прямим стеблом	4
33	Кошик: розмір	маленький	3
34	Кошик: форма з боку сім'янок	сильно випукла	5
35	Сім'янка: за розміром	середня	5
36	Сім'янка: за формою	широкояйцеподібна	3
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: за основним кольором	чорна	7
39	Сім'янка: смугастість на краях	відсутня або дуже слабка	1
40	Сім'янка: смугастість між краями	відсутня або дуже слабка	1
41	Сім'янка: колір смужок	ознака не визначалась	0
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	наявна	9
43	Стійкість до вовчка (<i>Orobanche cumana</i> , раса E)	стійкий	1
44	Стійкість до <i>Plasmopara Halstedii</i>	відсутня	1

Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка №: 11017011 **Назва сорту** X 1010 Б

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 08.02.2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

13.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140302

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: аноціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірне	5
3	Листок: за розміром	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	світле	3
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	дрібні	3
7	Листок: форма у поперечному перерізі	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5
9	Листок: наявність вушок	малі	3
10	Листок: крила	відсутні або слабо виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабка	3
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: за щільністю	щільні	7
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцевидні	2
17	Язичкові квітки: за положенням	хвилясті	3
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: за кольором	помірно-жовті	3
20	Трубчасті квітки: за кольором	оранжеві	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначалась	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1
24	Зовнішні листки обгортки: за формою	також чітко видовжені, але й чітко округлі	2
25	Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки	середня	5
26	Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку	помірний	5
27	Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або злегка охоплює	1
28	Рослина: за природною висотою	низька	3
29	Рослина: галуження (за винятком галуження, викликаного умовами середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначалась	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначалась	0
32	Кошик: положення	напівобернене донизу разом із стеблом	5
33	Кошик: розмір	маленький	3
34	Кошик: форма з боку сім'янок	сильно випукла	5
35	Сім'янка: за розміром	середня	5
36	Сім'янка: за формою	широкояйцеподібна	3
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: за основним кольором	чорна	7
39	Сім'янка: смугастість на краях	дуже сильна	3
40	Сім'янка: смугастість між краями	відсутня або дуже слабка	1
41	Сім'янка: колір смужок	сірий	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість до вовчка (<i>Orobanche cumana</i> , раса E)	стійкий	1
44	Стійкість до <i>Plasmodiophora Halstedii</i>	відсутня	1

Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка №: 11017013 **Назва сорту** X 2111 Б

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 08.02.2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

13.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140303

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: аноціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірне	5
3	Листок: за розміром	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	дрібні	3
7	Листок: форма у поперечному перерізі	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6
9	Листок: наявність вушок	помірні	5
10	Листок: крила	відсутні або слабо виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабка	3
14	Час цвітіння	ранній	3
15	Язичкові квітки: за щільністю	середньої щільності	5
16	Язичкові квітки: за формою	веретинovidні	1
17	Язичкові квітки: за положенням	плоскі	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: за кольором	помірно-жовті	3
20	Трубчасті квітки: за кольором	оранжеві	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначалась	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Зовнішні листки обгортки: за формою	також чітко видовжені, але й чітко округлі	2
25	Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки	середня	5
26	Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку	помірний	5
27	Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за природною висотою	низька	3
29	Рослина: галузнення (за винятком галузнення, викликаного умовами середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галузнення (як для 29)	ознака не визначалась	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначалась	0
32	Кошик: положення	напівобернене донизу разом із стеблом	5
33	Кошик: розмір	маленький	3
34	Кошик: форма з боку сім'янок	злегка випукла	4
35	Сім'янка: за розміром	середня	5
36	Сім'янка: за формою	широкоюйцеподібна	3
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: за основним кольором	чорна	7
39	Сім'янка: смугастість на краях	дуже сильна	3
40	Сім'янка: смугастість між краями	слабка	2
41	Сім'янка: колір смужок	сірий	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість до вовчка (<i>Orobanche cumana</i> , раса E)	толерантний	2
44	Стійкість до <i>Plasmopara Halstedii</i>	наявна	9

Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка №: 11017014 **Назва сорту** X 2122 Б

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 08.02.2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

13.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140304

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: аноціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірне	5
3	Листок: за розміром	малий	3
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	темне	7
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	помірні	5
7	Листок: форма у поперечному перерізі	слабко увігнута	2
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5
9	Листок: наявність вушок	помірні	5
10	Листок: крила	відсутні або слабко виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабка	3
14	Час цвітіння	ранній	3
15	Язичкові квітки: за щільністю	нещільні	3
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцевидні	2
17	Язичкові квітки: за положенням	зігнуті за довжиною	2
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: за кольором	помірно-жовті	3
20	Трубчасті квітки: за кольором	оранжеві	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначалась	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1
24	Зовнішні листки обгортки: за формою	чітко округлі	3
25	Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки	середня	5
26	Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку	помірний	5
27	Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за природною висотою	дуже низька	1
29	Рослина: галушення (за винятком галушення, викликаного умовами середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галушення (як для 29)	ознака не визначалась	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначалась	0
32	Кошик: положення	обернене донизу разом із легким викривленням стебла	7
33	Кошик: розмір	маленький	3
34	Кошик: форма з боку сім'янок	сильно випукла	5
35	Сім'янка: за розміром	середня	5
36	Сім'янка: за формою	широкояйцеподібна	3
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: за основним кольором	чорна	7
39	Сім'янка: смугастість на краях	слабка	2
40	Сім'янка: смугастість між краями	відсутня або дуже слабка	1
41	Сім'янка: колір смужок	сірий	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість до вовчка (<i>Orobanche cumana</i> , раса E)	стійкий	1
44	Стійкість до <i>Plasmodiophora Halstedii</i>	відсутня	1

Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка №: 11017016 **Назва сорту** X 503 Б

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 08.02.2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

13.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140305

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: аноціанове забарвлення	відсутнє	1
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначалась	0
3	Листок: за розміром	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
5	Листок: пухирчастість	помірна	5
6	Листок: зубці	грубі	7
7	Листок: форма у поперечному перерізі	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	загострена	8
9	Листок: наявність вушок	помірні	5
10	Листок: крила	відсутні або слабо виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	відсутня або дуже слабка	1
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: за щільністю	нещільні	3
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцевидні	2
17	Язичкові квітки: за положенням	плоскі	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: за кольором	помірно-жовті	3
20	Трубчасті квітки: за кольором	оранжеві	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначалась	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Зовнішні листки обгортки: за формою	також чітко видовжені, але й чітко округлі	2
25	Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки	середня	5
26	Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку	помірний	5
27	Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за природною висотою	дуже низька	1
29	Рослина: галуження (за винятком галуження, викликаного умовами середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначалась	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначалась	0
32	Кошик: положення	напівобернене донизу разом із стеблом	5
33	Кошик: розмір	маленький	3
34	Кошик: форма з боку сім'янок	сильно випукла	5
35	Сім'янка: за розміром	середня	5
36	Сім'янка: за формою	широкояйцеподібна	3
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: за основним кольором	чорна	7
39	Сім'янка: смугастість на краях	слабка	2
40	Сім'янка: смугастість між краями	слабка	2
41	Сім'янка: колір смужок	сірий	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість до вовчка (<i>Orobanche cumana</i> , раса E)	толерантний	2
44	Стійкість до <i>Plasmodiophora Halstedii</i>	відсутня	1

Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка №: 11017017 **Назва сорту** X 808 Б

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 08.02.2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

13.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140306

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: аноціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірне	5
3	Листок: за розміром	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
5	Листок: пухирчастість	відсутня або дуже слабка	1
6	Листок: зубці	дрібні	3
7	Листок: форма у поперечному перерізі	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5
9	Листок: наявність вушок	помірні	5
10	Листок: крила	слабко виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірна	5
14	Час цвітіння	ранній	3
15	Язичкові квітки: за щільністю	середньої щільності	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцевидні	2
17	Язичкові квітки: за положенням	плоскі	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: за кольором	помірно-жовті	3
20	Трубчасті квітки: за кольором	оранжеві	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначалась	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Зовнішні листки обгортки: за формою	також чітко видовжені, але й чітко округлі	2
25	Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки	середня	5
26	Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку	помірний	5
27	Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за природною висотою	низька	3
29	Рослина: галуження (за винятком галуження, викликаного умовами середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначалась	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначалась	0
32	Кошик: положення	напівобернене донизу разом із стеблом	5
33	Кошик: розмір	маленький	3
34	Кошик: форма з боку сім'янок	злегка випукла	4
35	Сім'янка: за розміром	середня	5
36	Сім'янка: за формою	широкояйцеподібна	3
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: за основним кольором	чорна	7
39	Сім'янка: смугастість на краях	слабка	2
40	Сім'янка: смугастість між краями	відсутня або дуже слабка	1
41	Сім'янка: колір смужок	сірий	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість до вовчка (<i>Orobanche cumana</i> , раса E)	толерантний	2
44	Стійкість до <i>Plasmodiophora Halstedii</i>	відсутня	1

Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка №: 11017022 **Назва сорту** X 809 Б

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 08.02.2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

13.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140308

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: аноціанове забарвлення	відсутнє	1
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначалась	0
3	Листок: за розміром	малий	3
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	дрібні	3
7	Листок: форма у поперечному перерізі	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6
9	Листок: наявність вушок	помірні	5
10	Листок: крила	відсутні або слабо виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабка	3
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: за щільністю	середньої щільності	5
16	Язичкові квітки: за формою	широкояйцевидні	3
17	Язичкові квітки: за положенням	плоскі	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: за кольором	помірно-жовті	3
20	Трубчасті квітки: за кольором	оранжеві	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначалась	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Зовнішні листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1
25	Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки	середня	5
26	Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку	помірний	5
27	Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за природною висотою	низька	3
29	Рослина: галуження (за винятком галуження, викликаного умовами середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначалась	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначалась	0
32	Кошик: положення	напівобернене донизу разом із прямим стеблом	4
33	Кошик: розмір	середній	5
34	Кошик: форма з боку сім'янок	злегка випукла	4
35	Сім'янка: за розміром	середня	5
36	Сім'янка: за формою	широкояйцеподібна	3
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: за основним кольором	чорна	7
39	Сім'янка: смугастість на краях	відсутня або дуже слабка	1
40	Сім'янка: смугастість між краями	відсутня або дуже слабка	1
41	Сім'янка: колір смужок	ознака не визначалась	0
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість до вовчка (<i>Orobanche cumana</i> , раса E)	стійкий	1
44	Стійкість до <i>Plasmodiophora Halstedii</i>	відсутня	1

Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка №: 10017213 **Назва сорту** ХАФЛ 54

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 03.12.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

27.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140411

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: аноціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірне	5
3	Листок: за розміром	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	дрібні	3
7	Листок: форма у поперечному перерізі	слабко увігнута	2
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5
9	Листок: наявність вушок	помірні	5
10	Листок: крила	відсутні або слабко виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабка	3
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: за щільністю	середньої щільності	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцевидні	2
17	Язичкові квітки: за положенням	плоскі	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: за кольором	помірно-жовті	3
20	Трубчасті квітки: за кольором	оранжеві	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначалась	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Зовнішні листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1
25	Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки	довга	7
26	Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку	помірний	5
27	Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або злегка охоплює	1
28	Рослина: за природною висотою	низька	3
29	Рослина: галушення (за винятком галушення, викликаного умовами середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галушення (як для 29)	ознака не визначалась	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначалась	0
32	Кошик: положення	обернене донизу разом із легким викривленням стебла	7
33	Кошик: розмір	середній	5
34	Кошик: форма з боку сім'янок	сильно випукла	5
35	Сім'янка: за розміром	середня	5
36	Сім'янка: за формою	вузькоюйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: за основним кольором	чорна	7
39	Сім'янка: смугастість на краях	слабка	2
40	Сім'янка: смугастість між краями	відсутня або дуже слабка	1
41	Сім'янка: колір смужок	сірий	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість до вовчка (<i>Orobanchе cumana</i> , раса E)	стійкий	1
44	Стійкість до <i>Plasmodium Halstedii</i>	відсутня	1

9. ВІДОМОСТІ ПРО ЗМІНУ НАЗВИ І / АБО АДРЕСИ ЮРИДИЧНОЇ АБО ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ

9. NOTIFICATIONS ON NAME AND/OR ADDRESS CHANGED FOR LEGAL OR PHYSICAL PERSON

Перелік сортів рослин, внесених до Реєстру заявок, правонаступником яких є Інститут зрощуваного землеробства Національної академії аграрних наук України (код 1698), відповідно до наказу Держветфітослужби України від 07.02.2014 року № 261

№ з/п	Культура Сгор	Назва сорту Variety denomination	Номер заявки Application number	Дата подання заявки Filing date of application
1.	Пшениця м'яка озима	Конка	№10007001	13.01.2009
2.	Пшениця м'яка озима	Бургунка	№11007037	25.07.2011
3.	Кукурудза звичайна	Каховський	№09004730	30.11.2009.
4.	Кукурудза звичайна	Скадовський	№09004729	30.11.2009
5.	Кострець безостий	Бакай	№10065001	30.11.2011
6.	Житняк гребінчастий	Жайворонок	№10500002	30.11.2010
7.	Грястиця збірна	Дарина	№10049001	30.11.2010
8.	Люцерна мінлива	Анжеліка	№10392002	30.11.2010
9.	Люцерна мінлива	Донечка	№10392001	30.11.2010
10.	Помідор їстівний	Кумач	№10040017	25.11.2010
11.	Соя культурна	Святогор	№10018023	30.11.2010
12.	Кукурудза звичайна	Чонгар	№10004261	30.11.2010
13.	Кукурудза звичайна	Інгульський	№10004262	30.11.2010
14.	Кукурудза звичайна	Генічеський	№10004273	30.11.2010
15.	Кукурудза звичайна	Тягинський	№10004265	30.11.2010
16.	Кукурудза звичайна	Арабат	№10004266	30.11.2010
17.	Кукурудза звичайна	Приморський	№10004271	30.11.2010
18.	Кукурудза звичайна -	Кр 221М	№11004001	11.01.2011
19.	Кукурудза звичайна	Кр9698	№10004263	30.11.2010
20.	Кукурудза звичайна - батьківська форма	X475	№10004272	30.11.2010
21.	Кукурудза звичайна - батьківські компоненти	ДК445	№10004267	30.11.2010
22.	Кукурудза звичайна - батьківські компоненти	X466MB	№10004274	30.11.2010
23.	Кукурудза звичайна - батьківські компоненти	K2421M	№10004275	30.11.2010
24.	Кукурудза звичайна - батьківські компоненти	ДК 257131	№10004264	30.11.2010
25.	Кукурудза звичайна - батьківські компоненти	ДК 205710M	№10004269	30.11.2010
26.	Кукурудза звичайна - батьківські компоненти	X417	№10004270	30.11.2010
27.	Кукурудза звичайна - батьківські компоненти	B73C	№10004268	30.11.2010
28.	Кукурудза звичайна – батьківські компоненти	X221	№11004035	19.05.2011
29.	Кукурудза звичайна – батьківські компоненти	ДК2221зм	№11004036	19.05.2011

Перелік сортів рослин, внесених до Реєстру заявок, правонаступником яких є Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України (код 1809) відповідно до наказу Держветфітослужби України від 03.03.2014 року № 350

Культура Crop	Назва сорту Variety denomination	Номер заявки Application number	Дата подання заявки Filing date of application
Люпин білий	Рапсодія	10055001	30.11.2010
Люпин жовтий	Ярило	10057001	30.11.2010

Перелік сортів рослин внесених до Реєстру заявок, правонаступником яких є Національний науковий центр «Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України» (код 1626) відповідно до наказу Держветфітослужби України від 07.02.2014 № 261

№ з/п	Культура Crop	Назва сорту Variety denomination	Номер заявки Application number	Дата подання заявки Filing date of application
1.	10046003	Дмитро	Буряк кормовий	30.11.2010
2.	09002003	Рута	Гречка їстівна	20.10.2009
3.	10002002	Надійна	Гречка їстівна	02.11.2010
4.	10002003	Ольга	Гречка їстівна	02.11.2010
5.	10003009	Вітвіцьке	Жито посівне озиме	02.09.2010
6.	09052003	Либідь	Конюшина лучна	15.12.2009
7.	10004289	Здвиж МВ	Кукурудза звичайна	06.12.2010
8.	10004290	Трубіж СВ	Кукурудза звичайна	06.12.2010
9.	10057002	Агат Полісся	Люпин жовтий	30.11.2010
10.	09006001	Чабанівське	Просо посівне	23.10.2009
11.	10006001	Заповітне	Просо посівне	10.11.2010
12.	09007036	Епілог	Пшениця м'яка озима	12.08.2009
13.	11007019	Черемшина	Пшениця м'яка яра	22.03.2011
14.	09016106	Мороз	Ріпак озимий	09.07.2009
15.	09016110	МВМ	Ріпак ярий	23.09.2009

10. СКОРОЧЕНІ НАЗВИ, СКОРОЧЕННЯ ТЕРМІНІВ, ЯКІ ВЖИТІ В БЮЛЕТЕНІ

10. SHORT NAMES, ABERRATIONS AS APPEARING IN THE BULLETIN

10.1. Перелік заявників, підтримувачів сортів, власників прав на сорти рослин

10.1. List of applicants, plant variety maintainers, plant variety rights owners

Код Code	Назва Name	Адреса Address
9	Товариство з обмеженою відповідальністю "Піонер Насіння Україна" Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidal'nistiu "Pioner Nasinnia Ukraina"	вул. Спаська 30а, м. Київ, 04070, Україна vul. Spas'ka 30a, m. Kyiv, 04070, Ukraina
16	Державна наукова установа Всеросійський науково-дослідний інститут олійних культур ім. В.С.Пустовойта (НВО) Derzhavna naukova ustanova Vserosiiskyi naukovodoslidnyi instytut oliinykh kul'tur im. V.S.Pustovoita (NVO)	Вул. Філатова, 17, м. Краснодар-38, Росія, 350038 Vul. Filatova, 17, m. Krasnodar-38, Rosiia, 350038
25	Державна наукова установа Краснодарський науково-дослідний інститут сільського господарства ім. П.П. Лук'яненка Derzhavna naukova ustanova Krasnodars'kyi naukovodoslidnyi instytut sil's'koho hospodarstva im. P.P. Luk'ianenka	П/в 12, м. Краснодар, Росія, 350012 P/v 12, m. Krasnodar, Rosiia, 350012
28	ЗАТ "Агриматко-Україна" ZAT "Ahrimatko-Ukraina"	08132, вул. Чорновола, 45, м. Вишневе, Київська обл. 08132, vul. Chornovola, 45, m. Vyshneve, Kyivs'ka obl.
49	Закрите акціонерне товариство Науково - виробнича фірма "Російські семена" Zakryte aksionerne tovarystvo Naukovo - vyrobnycha firma "Rosiiskie siemiena"	вул. Селезнівська 11а, стр. 2, м. Москва, 127030 vul. Seleznyvs'ka 11a, str. 2, m. Moskva, 127030
50	Спільне українсько-польське підприємство у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю "КРОКУС" Лтд Spil'ne ukrains'ko-pol's'ke pidpryemstvo u vyhladi tovarystva z obmezhenoiu vidpovidal'nistiu "KROKUS" Ltd	46020, м. Тернопіль, вул. Коновальця, 4 46020, m. Ternopil', vul. Konoval'tsia, 4
51	Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробнича фірма "Агронасіннясервіс" Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidal'nistiu "Naukovo-vyrobnycha firma "Ahronasinniaservis"	Вул. Воровського 65, м. Сімферополь, АР Крим, 95053 Vul. Vorovs'koho 65, m. Simferopol', AR Krym, 95053
83	Республіканське науково - дослідне унітарне підприємство "Інститут картоплярства Національної академії наук Білорусі" Respublikans'ke naukovo - doslidne unitarne pidpryemstvo "Instytut kartopliarstva Natsional'noi akademii nauk Bilorusi"	Вул. Ковальова 2а, с. Самохваловичі, Мінський р-н, 223013 Vul. Koval'ova 2a, s. Samokhvalovychi, Mins'kyi r-n, 223013
117	Приватна сільськогосподарська науково - виробнича фірма "Новий сад" Pryvatna sil's'kohospodars'ka naukovo - vyrobnycha firma "Novyi sad"	Вул. Тельмана, 2 Е, кв. 2, смт. Краснокутськ, Харківська обл., Україна, 62002 Vul. Tel'mana, 2 E, kv. 2, smt. Krasnokuts'k, Kharkivs'ka obl., Ukraina, 62002
122	ТОВ "Уніфер" TOV "Unifer"	Вул. Мелітопольська, 17б, м. Каховка, Херсонська обл., Україна, 74800 Vul. Melitopol's'ka, 17b, m. Kakhovka, Khersons'ka obl., Ukraina, 74800
142	Семенсес Прогрейн ІНК. Semenses Prograin INC.	Ранг Бас-Рів'єр НОРД, Сент-цезар, Квебек Rang Du Bas-de-la- Riviere NORD, St-Cesair, Quebec, J0L 1 T0
167	НДІ сільського господарства Центральних районів Нечорноземної зони NDI sil's'koho hospodarstva Tsentral'nykh raioniv Nechornozemnoi zony	П/в Немчиновка, Одинцовський р-н, Московська обл., Росія, 143013 P/v Niemchynovka, Odyntsovs'kyi r-n, Moskovs'ka obl., Rosiia, 143013
177	Ніжинський агротехнічний інститут Національного аграрного університету Nizhyns'kyi ahrotekhnichniy instytut Natsional'noho ahrarnoho universytetu	Вул. Шевченко, 10, м. Ніжин, Чернігівська обл., 16600 Vul. Shevchenko, 10, m. Nizhyn, Chernihivs'ka obl., 16600
181	Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю "Насіннева компанія "Маїс" Sil's'kohospodars'ke tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidal'nistiu "Nasinnieva kompaniia "Mais"	19635, с. Білозір'я, вул.Леніна, 2, Черкаського р-ну, Черкаської обл. 19635, s. Bilozir'ia, vul.Lenina, 2, Cherkas'koho r-nu, Cherkas'koi obl.
211	ВНДІ виноградарства і виноробства ім. Я.І. Потапенко VNDI vynohradarstva i vynorobstva im. IA.I. Potapenko	Пр. Платова, 166, м. Новочеркаськ, Ростовська обл., Росія, 346421 Pr. Platova, 166, m. Novocherkas'k, Rostovs'ka obl., Rosiia, 346421
212	Державна наукова установа Всеросійський науково - дослідний інститут зернових культур ім. І.Г.Калиненко Derzhavna naukova ustanova Vserosiiskyi naukovodoslidnyi instytut zernovykh kul'tur im. I.H.Kalynenko	Науковий городок, 3, м. Зерноград, Ростовська обл., Росія, 347740 Naukovyi horodok, 3, m. Zernograd, Rostovs'ka obl., Rosiia, 347740

Код Code	Назва Name	Адреса Adress
215	Вілморін Vilmorin S.A.	49250 La Menitre, Franse 49250 La Menitre, Franse
216	ДНУ "Донська дослідна станція ім. Л.А. Жданова Всеросійського науково-дослідного інституту олійних культур" DNU "Dons'ka doslidna stantsiia im. L.A. Zhdanova Vserosiis'koho naukovo-doslidnoho instytutu oliinykh kul'tur"	П/в Суходольськ, п. Опорний, Азовський р-н, Ростовська обл., Росія, 346754 P/v Sukhodol's'k, p. Oporny, Azovs'kyi r-n, Rostovs'ka obl., Rosiia, 346754
217	Донський зональний науково-дослідний інститут сільського господарства Dons'kyi zonal'nyi naukovo-doslidnyi instytut sil's'koho hospodarstva	Сел. Расвет, Аксайський р-н, Ростовська обл., Росія, 346714 Sel. Rasviet, Aksais'kyi r-n, Rostovs'ka obl., Rosiia, 346714
230	Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська насіннева компанія" Tovarystvo z obmezenoiu vidpovidal'nistiu "Ukrains'ka nasinnieva kompaniia"	Вул. Озерна 14 кв. 124, м. Київ, 04209 Vul. Ozerna 14 kv. 124, m. Kyiv, 04209
273	Мей Агро Тохумсулук Санаї ве Тісарет А.С May Agro Tohumculuk Sanayi ve Ticaret S.A	Саманлі Махалесі Ідітлер Кадесі № 28 Ілдірім 16280 Бурса, Туреччина Samanli Mahallesi Yigitler Caddesi No:28 Yildirim 16280 bursa turkey
302	Національний науковий центр "Інститут бджільництва ім. П.І.Прокоповича Української академії аграрних наук" Natsional'nyi naukovyi tsentr "Instytut bdzhil'nystva im. P.I.Prokopovycha Ukrain's'koi akademii ahrarnykh nauk"	03680, м.Київ, вул.акад.Заболотного, 19 03680, m.Kyiv, vul.akad.Zabolotnoho, 19
303	Ялтушківська дослідно-селекційна станція Інституту цукрових буряків Української академії аграрних наук Yaltushkivs'ka doslidno-selektsiina stantsiia Instytutu tsukrovyykh buriakiv Ukrain's'koi akademii ahrarnykh nauk	П/в Ялтушків, Барський р-н, Вінницька обл., 23021 P/v IAltushkiv, Bars'kyi r-n, Vinnyts'ka obl., 23021
304	Уладово-Ліулінецька дослідно-селекційна станція Інституту цукрових буряків Української академії аграрних наук Uladovo-Liulinets'ka doslidno-selektsiina stantsiia Instytutu tsukrovyykh buriakiv Ukrain's'koi akademii ahrarnykh nauk	П/в Жовтневе, Калинівський р-н, Вінницька обл., 22412 P/v Zhovtneve, Kalynivs'kyi r-n, Vinnyts'ka obl., 22412
305	Інститут кормів Української академії аграрних наук Instytut kormiv Ukrain's'koi akademii ahrarnykh nauk	21100, Проспект Юності, 16, м. Вінниця 21100, Prospekt IUnosti, 16, m. Vinnytsia
306	Вінницька державна сільськогосподарська дослідна станція Української академії аграрних наук Vinnyts'ka derzhavna sil's'kohospodars'ka doslidna stantsiia Ukrain's'koi akademii ahrarnykh nauk	23227, вул. Мічуріна, 1, с. Агрономічне, Вінницький р-н, Вінницька обл. 23227, vul. Michurina, 1, s. Ahronomichne, Vinnyts'kyi r-n, Vinnyts'ka obl.
307	Волинський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук Volyns'kyi instytut ahropromyslovoho vyrobnytstva Ukrains'koi akademii ahrarnykh nauk	с. Рокині, Луцький р-н, Волинська обл., 45626 s. Rokyni, Luts'kyi r-n, Volyns'ka obl., 45626
309	Луганський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук Luhans'kyi instytut ahropromyslovoho vyrobnytstva Ukrains'koi akademii ahrarnykh nauk	93733, вул. Октябрська, 14 с. Металіст, Слов'янськський р-н., Луганська обл., 93733, vul. Oktiabrs'ka, 14 s. Metalist, Slov'ianoserbs'kyi r-n., Luhans'ka obl.,
310	Дніпропетровська дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук Dnipropetrovs'ka doslidna stantsiia Instytutu ovochivnytstva i bashtannytstva Ukrain's'koi akademii ahrarnykh nauk	Вул. Дослідна, 1, п/в Олександрівка, Дніпропетровський р-н, Дніпропетровська обл., 52041 Vul. Doslidna, 1, p/v Oleksandrivka, Dnipropetrovs'kyi r-n, Dnipropetrovs'ka obl., 52041
311	Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук Instytut zernovoho hospodarstva Ukrain's'koi akademii ahrarnykh nauk	49027, вул. Дзержинського, 14, м. Дніпропетровськ 49027, vul. Dzerzhyns'koho, 14, m. Dnipropetrovs'k
312	Дніпропетровський державний аграрний університет Dnipropetrovs'kyi derzhavnyi ahrarnyi universytet	Вул. Ворошилова, 25, м. Дніпропетровськ, 49600 Vul. Voroshylova, 25, m. Dnipropetrovs'k, 49600
313	Донецька дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук Donets'ka doslidna stantsiia Instytutu ovochivnytstva i bashtannytstva Ukrain's'koi akademii ahrarnykh nauk	П/в Дослідне, Ясинуватський р-н., Донецька обл., 86081 P/v Doslidne, IAsynuvats'kyi r-n., Donets'ka obl., 86081
317	Донецький ботанічний сад Національної академії наук України Donets'kyi botanichnyi sad Natsional'noi akademii nauk Ukrainy	83053, Донецьк-59, пр-т. Ілліча, 110 83053, Donets'k-59, pr-t. Illich, 110

Код Code	Назва Name	Адреса Address
318	Інститут хмелярства Української академії аграрних наук Instytut khmeliarstva Ukrain's'koi akademii ahrarnykh nauk	Вул. Київська, 191, м. Житомир, 10000 Vul. Kyivs'ka, 191, m. Zhytomyr, 10000
319	Поліська дослідна станція ім. О. М. Засухіна Інституту картоплярства Української академії аграрних наук Polis'ka doslidna stantsiia im. O. M. Zasukhina Instytutu kartopliarstva Ukrain's'koi akademii ahrarnykh nauk	П/в Пересувне 2, Малинський р-н, Житомирська обл., 11605 P/v Peresuvne 2, Malyns'kyi r-n, Zhytomyrs'ka obl., 11605
320	Інститут сільського господарства Полісся Української академії аграрних наук Instytut sil's'koho hospodarstva Polissia Ukrain's'koi akademii ahrarnykh nauk	Вул. Київське шосе, 131, Житомир-7, 10007 Vul. Kyivs'ke shose, 131, Zhytomyr-7, 10007
325	Інститут зрошуваного садівництва ім. М.Ф. Сидоренка Української академії аграрних наук Instytut zroshuvanooho sadiivnytstva im. M.F. Sydorenka Ukrains'koi akademii ahrarnykh nauk	вул. Вакуленчука, 99, м. Мелітополь, Запорізька обл., 72311 vul. Vakulenchuka, 99, m. Melitopol', Zaporiz'ka obl., 72311
327	Розівська дослідна станція Інституту зернового господарства Української академії аграрних наук Rozivs'ka doslidna stantsiia Instytutu zernovoho hospodarstva Ukrain's'koi akademii ahrarnykh nauk	Вул. Академічна, 5, смт Розівка, Розівський р-н, Запорізька обл., 70304 Vul. Akademichna, 5, smt Rozivka, Rozivs'kyi r-n, Zaporiz'ka obl., 70304
328	Запорізький національний університет Zaporiz'kyi natsional'nyi universytet	Вул. Жуковського, 66, м. Запоріжжя, 69600 Vul. Zhukovs'koho, 66, m. Zaporizhzhia, 69600
329	Інститут олійних культур Української академії аграрних наук Instytut oliinykh kul'tur Ukrain's'koi akademii ahrarnykh nauk	70417, вул. Весняна, 1, с. Сонячне, Запорізький р-н, Запорізька обл. 70417, vul. Vesniana, 1, s. Soniachne, Zaporiz'kyi r-n, Zaporiz'ka obl.
330	Коломийська дослідна станція Івано-Франківського інституту агропромислового виробництва Української академії аграрних наук Kolomyis'ka doslidna stantsiia Ivano-Frankivs'koho instytutu ahropromysloвого vyrobnytstva Ukrain's'koi akademii ahrarnykh nauk	С. Пядики, Коломийський р-н, Івано-Франківська обл., 78254 S. Piadyky, Kolomyis'kyi r-n, Ivano-Frankivs'ka obl., 78254
332	Івано - Франківський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук Ivano - Frankivs'kyi instytut ahropromysloвого vyrobnytstva Ukrain's'koi akademii ahrarnykh nauk	Вул. Розумовського, 9а, м. Івано-Франківськ, 76028 Vul. Rozumovs'koho, 9a, m. Ivano-Frankivs'k, 76028
333	Інститут молекулярної біології і генетики Національної академії наук Instytut molekuliarnoi biolohii i henetyky Natsional'noi akademii nauk	Вул. Заболотного, 150, Київ, 03143 Vul. Zabolotnoho, 150, Kyiv, 03143
334	Інститут цукрових буряків Української академії аграрних наук Instytut tsukrovyykh buriakiv Ukrain's'koi akademii ahrarnykh nauk	Вул. Клінічна, 25, Київ, 03141 Vul. Klinichna, 25, Kyiv, 03141
335	Білоцерківська дослідно-селекційна станція ім. О.К. Коломійця Інституту цукрових буряків Української академії аграрних наук Bilotserkivs'ka doslidno-seleksiina stantsiia im. O.K. Kolomiiets' Instytutu tsukrovyykh buriakiv Ukrain's'koi akademii ahrarnykh nauk	П/в Мала Вільшанка, 1, Білоцерківський р-н, Київська обл., 09175 P/v Mala Vil'shanka, 1, Bilotserkivs'kyi r-n, Kyivs'ka obl., 09175
337	Київська дослідна станція Національного наукового центру "Інститут землеробства Української академії аграрних наук" Kyivs'ka doslidna stantsiia Natsional'noho naukovoho tsentru "Instytut zemlerobstva Ukrain's'koi akademii ahrarnykh nauk"	С. Литвинівка, Вишгородський р-н, Київська обл., 07334 S. Lytvynivka, Vyshhorods'kyi r-n, Kyivs'ka obl., 07334
339	Сквирська дослідна станція Інституту агроєкології Української академії аграрних наук Skvyrs'ka doslidna stantsiia Instytutu ahroekolohii Ukrain's'koi akademii ahrarnykh nauk	09000, вул. Селекційна, 1, м. Сквиря, Київська обл. 09000, vul. Seleksiina, 1, m. Skvyra, Kyivs'ka obl.
340	Синельниківська селекційно-дослідна станція Інституту зернового господарства Української академії аграрних наук Synel'nykivs'ka seleksiino-doslidna stantsiia Instytutu zernovoho hospodarstva Ukrain's'koi akademii ahrarnykh nauk	52523, вул. Бугаєнка, 3, п/в Раївка, Синельниківський р-н, Дніпропетровська обл., +38-05663-46-728 52523, vul. Buhaienka, 3, p/v Raivka, Synel'nykivs'kyi r-n, Dnipropetrovs'ka obl., +38-05663-46-728
341	Миронівський інститут пшениці ім. В.М. Ремесла Української академії аграрних наук Myronivs'kyi instytut pshenytsi im. V.M. Remesla Ukrain's'koi akademii ahrarnykh nauk	П/в Центральне, Миронівський р-н, Київська обл, 08853 P/v Tsentral'ne, Myronivs'kyi r-n, Kyivs'ka obl, 08853

Код Code	Назва Name	Адреса Adress
343	Київська дослідна станція Інституту овочівництва і баштництва Української академії аграрних наук Kyivs'ka doslidna stantsiia Instytutu ovochivnytstva i bashdannytstva Ukrain's'koi akademii ahrarnykh nauk	П/в Борова, Фастівський р-н, Київська обл., 08520 P/v Borova, Fastivs'kyi r-n, Kyivs'ka obl., 08520
344	Інститут садівництва Української академії аграрних наук Instytut sadivnytstva Ukrain's'koi akademii ahrarnykh nauk	03027, м.Київ, вул. Садова 6, смт. Новосілки 03027, m.Kyiv, vul. Sadova 6, smt. Novosilky
345	Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук" Natsional'nyi naukovyi tsentr "Instytut zemlerobstva Ukrain's'koi akademii ahrarnykh nauk"	08162, вул. Машинобудівників 2-б, смт. Чабани, Києво-Святошинський р-н, Київська обл. 08162, vul. Mashynobudivnykiv 2-b, smt. Chabany, Kyievo-Sviatoshyns'kyi r-n, Kyivs'ka obl.
347	Інститут картоплярства Української академії аграрних наук Instytut kartopliarstva Ukrain's'koi akademii ahrarnykh nauk	07853, вул. Чкалова, 22, смт. Немішаєво, Бородянський р-н, Київська обл. 07853, vul. Chkalova, 22, smt. Nemishaievo, Borodians'kyi r-n, Kyivs'ka obl.
348	Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук України Natsional'nyi botanichnyi sad im. M. M. Hryshka Natsional'noi akademii nauk Ukrainy	вул. Тімірязєвська, 1, м. Київ, 01014 vul. Timiriazievs'ka, 1, m. Kyiv, 01014
349	Відкрите акціонерне товариство "Терезине" Vidkryte aktsionerne tovarystvo "Terezyne"	П/в. Терезине, м. Біла Церква, Київська обл., 09133 тел. 6-55-12 факс 6-55-64 P/v. Terezyne, m. Bila Tserkva, Kyivs'ka obl., 09133 tel. 6-55-12 faks 6-55-64
350	Національний університет біоресурсів і природокористування України 0	03041, вул. Героїв оборони, 15, м. Київ 03041, vul. Heroiv oborony, 15, m. Kyiv
355	Інститут фізіології рослин і генетики Національної академії наук України Instytut fiziologii roslin i henetyky Natsional'noi akademii nauk Ukrainy	вул. Васильківська, 31/17, м. Київ, 03022 vul. Vasyli'kivs'ka, 31/17, m. Kyiv, 03022
356	Кіровоградський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук Kirovohrads'kyi instytut ahropromyslovoho vyrobnytstva Ukrain's'koi akademii ahrarnykh nauk	27602, вул. Центральна 2, п/в Сазонівка, м. Кіровоград 27602, vul. Tsentral'na 2, p/v Sazonivka, m. Kirovohrad
358	Кримський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук Kryms'kyi instytut ahropromyslovoho vyrobnytstva Ukrain's'koi akademii ahrarnykh nauk	П/в Клепініно, Красногвардійський р-н, Автономна Республіка Крим, 97010 P/v Klepinino, Krasnohvardiis'kyi r-n, Avtonomna Respublika Krym, 97010
359	Кримська дослідна станція садівництва Інституту садівництва Української академії аграрних наук Kryms'ka doslidna stantsiia sadivnytstva Instytutu sadivnytstva Ukrain's'koi akademii ahrarnykh nauk	97517, с. Маленьке, Сімферопольський р-н, Автономна Республіка Крим 97517, s. Malen'ke, Simferopol's'kyi r-n, Avtonomna Respublika Krym
361	Південний філіал Національного університету біоресурсів і природокористування України "Кримський агротехнологічний університет" Pivdennyi filial Natsional'noho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy "Kryms'kyi ahrotekhnolohichnyi universytet"	смт Аграрне, м. Сімферополь, Автономна Республіка Крим, 95492 smt Ahrarne, m. Simferopol', Avtonomna Respublika Krym, 95492
365	Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук Nikits'kyi botanichnyi sad - Natsional'nyi naukovyi tsentr Ukrain's'koi akademii ahrarnykh nauk	смт. Нікіта, м.Ялта, Автономна Республіка Крим, 98648 smt. Nikita, m.Ialta, Avtonomna Respublika Krym, 98648
366	Інститут ефіроолійних і лікарських рослин Української академії аграрних наук Instytut efirooliynykh i likars'kykh roslin Ukrain's'koi akademii ahrarnykh nauk	вул. Київська, 150, м. Сімферополь, Автономна Республіка Крим, 95493 тел. (0652) 267-007, факс (0652) 267-039 vul. Kyivs'ka, 150, m. Simferopol', Avtonomna Respublika Krym, 95493 tel. (0652) 267-007, faks (0652) 267-039
367	Моргун Володимир Васильович Morhun Volodymyr Vasyli'ovych	Вул. Стрітенська 17 кв. 6, м. Київ -25 Vul. Stritens'ka 17 kv. 6, m. Kyiv -25
375	Логвиненко Валентина Федорівна Lohvynenko Valentyna Fedorivna	Проспект Глушкова 32 кв. 116, м. Київ Prospekt Hlushkova 32 kv. 116, m. Kyiv
376	Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича агрокорпорація "Степова" Tovarystvo z обмеженоiu vidpovidal'nistiu naukovo-vyrobnycha ahrokorporatsiia "Stepova"	Вул. Ходарева 1а, с. Дерезувате, Синельниківський р-н, Дніпропетровська обл., 52523 тел./ факс 0562- 399-125; 0562 - 399-111 Vul. Khodarieva 1a, s. Derezuvate, Synel'nikivs'kyi r-n, Dnipropetrovs'ka obl., 52523 tel./ faks 0562- 399-125; 0562 - 399-111
378	Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннезнавства та сортовищів Української академії аграрних наук Selektsiino-henetychnyi instytut - Natsional'nyi tsentr nasinnieznavstva ta sortovyvchennia Ukrain's'koi akademii ahrarnykh nauk	65036, Овідіопольська дорога, 3, м. Одеса 65036, Ovidiopol's'ka doroha, 3, m. Odesa

Код Code	Назва Name	Адреса Adress
381	Одеський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук Odes'kyi instytut ahropromyslovoho vyrobnytstva Ukrains'koi akademii ahrarnykh nauk	Маякська дорога, 1, с. Хлібодарське, Біляївський р-н, Одеська обл., 67667 Maiaks'ka doroha, 1, s. Khllobodars'ke, Biliaivs'kyi r-n, Odes'ka obl., 67667
387	Полтавський інститут агропромислового виробництва ім. М.І. Вавилова Української академії аграрних наук Poltavs'kyi instytut ahropromyslovoho vyrobnytstva im. M.I. Vavilova Ukrains'koi akademii ahrarnykh nauk	Вул. Шведська, 86, Полтава, 36029 Vul. Shveds'ka, 86, Poltava, 36029
392	Сумський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук Sums'kyi instytut ahropromyslovoho vyrobnytstva Ukrains'koi akademii ahrarnykh nauk	42343, вул. Паркова,3, с. Сад, Сумський р-н., Сумська обл. 42343, vul. Parkova,3, s. Sad, Sums'kyi r-n., Sums'ka obl.
393	Інститут луб'яних культур Української академії аграрних наук Instytut lub'ianykh kul'tur Ukrains'koi akademii ahrarnykh nauk	Вул. Терещинків, 45, м. Глухів, Сумська обл., 41400 Vul. Tereshchynkiv, 45, m. Hlukhiv, Sums'ka obl., 41400
394	Іванівська дослідно-селекційна станція Інституту цукрових буряків Української академії аграрних наук Ivanivs'ka doslidno-selektsiina stantsiia Instytutu tsukrovyykh buriakiv Ukrains'koi akademii ahrarnykh nauk	П/в Сонячне, Охтирський р-н, Сумська обл., 42768 P/v Soniachne, Okhtyrs'kyi r-n, Sums'ka obl., 42768
395	Подільська дослідна станція Тернопільського інституту агропромислового виробництва Української академії аграрних наук Podil's'ka doslidna stantsiia Ternopil's'koho instytutu ahropromyslovoho vyrobnytstva Ukrains'koi akademii ahrarnykh nauk	Вул. Незалежності, 19, м. Хоростків, Гусятинський р-н, Тернопільська обл., 48240 тел. +38-03557-511-47 факс. +38-03557-511-31 Vul. Nezalezhnosti, 19, m. Khorostkiv, Husiatyns'kyi r-n, Ternopil's'ka obl., 48240 tel. +38-03557-511-47 faks. +38-03557-511-31
396	Українська дослідна станція тютюництва Тернопільського інституту агропромислового виробництва Української академії аграрних наук Ukrains'ka doslidna stantsiia tiutiunnytstva Ternopil's'koho instytutu ahropromyslovoho vyrobnytstva Ukrains'koi akademii ahrarnykh nauk	вул. І. Франка, 26, смт. Мельниця-Подільська, Борщівський р-н., Тернопільська обл., 48751 vul. I. Franka, 26, smt. Mel'nytsia-Podil's'ka, Borschivs'kyi r-n., Ternopil's'ka obl., 48751
399	Красноградська дослідна станція Інституту зернового господарства Української академії аграрних наук Krasnohads'ka doslidna stantsiia Instytutu zernovoho hospodarstva Ukrains'koi akademii ahrarnykh nauk	м. Красноград, Харківська обл., 63308 тел./факс. +38-057-44-93-145 m. Krasnohrad, Kharkivs'ka obl., 63308 tel./faks. +38-057-44-93-145
402	Інститут овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук Instytut ovochivnytstva i bashtannytstva Ukrains'koi akademii ahrarnykh nauk	62478, вул. Інститутська, 1, п/в Селекційний, Харківський р-н, Харківська обл. 62478, vul. Instytut's'ka, 1, p/v Seleksiyniy, Kharkivs'kyi r-n, Kharkivs'ka obl.
404	Інститут рослинництва ім. В.Я.Юр'єва Української академії аграрних наук Instytut roslynnytstva im. V.IA.IUr'ieva Ukrains'koi akademii ahrarnykh nauk	61060, Московський проспект, 142, м. Харків 61060, Moskovs'kyi prospekt, 142, m. Kharkiv
410	Інститут південного овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук Instytut pivdennoho ovochivnytstva i bashtannytstva Ukrains'koi akademii ahrarnykh nauk	Вул. Червоноармійська, 71, м. Гола Пристань, Херсонська обл., 75600 Vul. Chervonoarmiis'ka, 71, m. Hola Prystan', Khersons'ka obl., 75600
411	Інститут землеробства південного регіону Української академії аграрних наук Instytut zemlerobstva pivdennoho rehionu Ukrains'koi akademii ahrarnykh nauk	с. Наддніпрянське, м. Херсон, 73483 c. Naddnyprians'ke, m. Kherson, 73483
412	Інститут рису Української академії аграрних наук Instytut rysu Ukrains'koi akademii ahrarnykh nauk	75705, с. Антонівка, Скадовський р-н, Херсонська обл. 75705, s. Antonivka, Skadovs'kyi r-n, Khersons'ka obl.
414	Генічеська дослідна станція Інституту зернового господарства Української академії аграрних наук Heniches'ka doslidna stantsiia Instytutu zernovoho hospodarstva Ukrains'koi akademii ahrarnykh nauk	С. Новоолексіївка, 3, Генічеський р-н, Херсонська обл., 75560 тел. +38-05534- 255-83 S. Novooleksiivka, 3, Heniches'kyi r-n, Khersons'ka obl., 75560 tel. +38-05534-255- 83
416	Приватне підприємство "Наукова селекційно- насіницька фірма "Соевий вік" Privatne pidpriemstvo "Naukova selekciino - nasinnycka firma "Soiviy Vik"	25006, м. Кіровоград, вул. Мурманська, 29 "Г" 25006, m. Kirovohrad, vul. Murmans'ka, 29 "H"
417	Подільський державний аграрно-технічний університет Podil's'kyi derzhavnyi ahrarno-tekhnichnyi universytet	32316, вул. Шевченка 13, м. Кам'янець-Подільський, Хмельницька обл. 32316, vul. Shevchenka 13, m. Kam'ianets'-Podil's'kyi, Khmel'nyts'ka obl.
418	Хмельницький інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук Khmel'nyts'kyi instytut ahropromyslovoho vyrobnytstva Ukrains'koi akademii ahrarnykh nauk	31182, с. Самчики, Старокостянтинівський р-н, Хмельницька обл. 31182, s. Samchyky, Starokostiantynivs'kyi r-n, Khmel'nyts'ka obl.

Код Code	Назва Name	Адреса Adress
421	Інститут коренеплідних культур Української академії аграрних наук Instytut koreneplidnykh kul'tur Ukrain's'koi akademii ahrarnykh nauk	Вул. Інтернаціональна, 4, м. Умань, Черкаська обл., 20300 Vul. Internatsional'na, 4, m. Uman', Cherkas'ka obl., 20300
423	Науково-виробнича фірма "Геліо" Naukovo-vyrobnycha firma "Helio"	Вул.Карла Маркса,40,м. Вінниця,21034 Vul.Karla Marksa,40,m. Vinnytsia,21034
424	Інститут помології ім. Л.П. Симиренка Української академії аграрних наук Instytut pomolohii im. L.P. Symyrenka Ukrain's'koi akademii ahrarnykh nauk	С. Мліїв, Городищенський р-н, Черкаська обл., 19512 S. Mliiv, Horodyschens'kyi r-n, Cherkas'ka obl., 19512
425	Уманський державний аграрний університет Umans'kyi derzhavnyi ahrarnyi universytet	вул.Інтернаціональна, 1, П/в Софіївка, м. Умань, Черкаська обл., 20305 тел.+38-04744-34-163; факс: +38-04744-333-65 vul.Internatsional'na, 1, P/v Sofiivka, m. Uman', Cherkas'ka obl., 20305 tel.+38-04744-34-163; faks: +38-04744-333-65
427	Прилуцька дослідна станція Інституту ефіроолійних та лікарських рослин Української академії аграрних наук Pryluts'ka doslidna stantsiia Instytutu efirooliinykh ta likars'kykh roslin Ukrain's'koi akademii ahrarnykh nauk	Вул. Вавилова, 16, м. Прилуки, Чернігівська обл., 17500 Vul. Vavylava, 16, m. Pryluky, Chernihivs'ka obl., 17500
428	Закрите акціонерне товариство Науково-виробниче об'єднання "Чернігівеліткартопля" Zakryte aksionerne tovarystvo Naukovo-vyrobnyche ob'iednannia "Chernihivelitkartoplia"	Вул. Я. Лизогуба, 13, п/в Седнів, Чернігівський р-н, Чернігівська обл., 15522 Vul. IA. Lyzohuba, 13, p/v Sedniv, Chernihivs'kyi r-n, Chernihivs'ka obl., 15522
429	Чернігівський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук Chernihivs'kyi instytut ahropromyslovoho vyrobnytstva Ukrain's'koi akademii ahrarnykh nauk	с. Прогрес, Козелецький р-н, Чернігівська обл., 17035 s. Prohres, Kozelets'kyi r-n, Chernihivs'ka obl., 17035
430	Носівська селекційна дослідна станція Чернігівського інституту агропромислового виробництва Української академії аграрних наук Nosivs'ka selektsiina doslidna stantsiia Chernihivs'koho instytutu ahropromyslovoho vyrobnytstva Ukrain's'koi akademii ahrarnykh nauk	вул. Миру, 1, с. Дослідне, Носівський р-н, Чернігівська обл., 17131 vul. Myru, 1, s. Doslidne, Nosivs'kyi r-n, Chernihivs'ka obl., 17131
433	Придністровська дослідна станція садівництва Буковинського інституту агропромислового виробництва Української академії аграрних наук Prydnistrovs'ka doslidna stantsiia sadivnytstva Bukovyns'koho instytutu ahropromyslovoho vyrobnytstva Ukrain's'koi akademii ahrarnykh nauk	вул.Яблунівська, 1, м. Чернівці, 58013 vul.IAblunivs'ka, 1, m. Chernivtsi, 58013
435	Кравченко Владислав Андрійович Kravchenko Vladyslav Andriiovych	Вул. Полкова, 57, м. Київ, 04078 Vul. Polkova, 57, m. Kyiv, 04078
437	Монсанта Інтернешнл Сьорл Monsanto International Sarl	Ру дес Вігнеронс 1А, 1110, Моргес, Швейцарія Rue des Vignerons 1 A, 1110 Morges, Switzerland
440	Білецький Анатолій Семенович Bilets'kyi Anatolii Semenovich	Вул. Торговая 2 кв. 1, м. Луганськ, 91053 Vul. Torhovaia 2 kv. 1, m. Luhans'k, 91053
483	ТОВ "Ялтушківська ДСС" TOV "IAltushkivs'ka DSS"	Сел. Черешневе, Барський р-н, Вінницька обл., 23021, тел. (4341) -354-68 Sel. Cheresheve, Bars'kyi r-n, Vinnyts'ka obl., 23021, tel. (4341) -354-68
484	Розен Тантау. Матіас Тантау Нахфольгер Rosen Tantau. Mathias Tantau Nachfolger	Торнешер Бер 13, 25436, Уетерзен, Німеччина Torescher Weg 13, 25436 Uetersen, t. +49(0) 41-22-70-84
485	Коссад Семанс ЕС А Cussade Semences S A	З.І. Де Мо п/с 109 82303 Кассад Седекс Z.I.de Meaux, BR 109, 82303 Caussade Cedex
519	Осева ПРРО с.р.о.а Oseva PRO s.r.o.	Янковцова 18, 170 37 Прага Jankovcova 938/18. 170 37 Praha 7
520	Луганський національний аграрний університет Luhans'kyi natsional'nyi ahrarnyi universytet	М. Луганськ-8, 91008 M. Luhans'k-8, 91008
530	Товариство з обмеженою відповідальністю "Міжнародна насіннева компанія" Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidal'nistiu "Mizhnarodna nasinnieva kompaniia"	вул.Курчатова, 62 а, м. Рівне 33018 vul.Kurchatova, 62 a, m. Rivne 33018
538	Ситнік Ігор Данилович Sytnik Ihor Danylovych	Вул. Генерала Родимцева 3а кв. 45, м. Київ, 03041 Vul. Henerala Rodymtseva 3a kv. 45, m. Kyiv, 03041
539	Приватне науково-виробниче підприємство "Насіння" Privatne naukovo-vyrobnyche pidpriemstvo "Nasinnia"	вул.Інтернаціональна 4/6, м.Умань, Черкаська обл., 20300 vul.Internatsional'na 4/6, m.Uman', Cherkas'ka obl., 20300
585	Паришкура Володимир Іванович Paryshkura Volodymyr Ivanovich	вул.Борщова, 4/12, м.Чернігів, 14020 vul.Borschova, 4/12, m.Chernihiv, 14020

Код Code	Назва Name	Адреса Adress
586	Державне підприємство Дослідне господарство науково-дослідного інституту сільськогосподарської мікробіології Української академії аграрних наук Derzhavne pidpriemstvo Doslidne hospodarstvo naukovo-doslidnoho instytutu sil's'kohospodars'koi mikrobiolohii Ukrain's'koi akademii ahrarnykh nauk	вул.Малиновського, 43, м.Чернігів 14020 vul.Malynovs'koho, 43, m.Chernihiv 14020
600	Євро Грас Брідинг ГмбХ і Ко. КГ Euro Grass Breeding GmbH & Co. KG	вул. Вайсенбургер, 5 59557 Ліпштадт Weissenburger Stabe 5 59557 Lippstadt
647	Приватне підприємство "Агросвіт" Privatne pidpriemstvo "Ahrosvit"	вул. Горького, 40, м.Нова Каховка, Херсонська обл., 74907 vul. Hor'koho, 40, m.Nova Kakhovka, Khersons'ka obl., 74907
658	Шевченко Ігор Андрійович Shevchenko Ihor Andriiovych	вул.Гвардійців Широнінців, 18-Г кв.43, м.Харків, 61120 vul.Hvardiitsiv Shyronintsiv, 18-H kv.43, m.Kharkiv, 61120
686	Сіннер Брос & Бреснахан Sinner Bros & Bresnahan	П.О. 549, Каселтон, 58012, НД США Box 549, Casselton, 58012 ND, USA
687	Експериментальна станція Мінесоти Minnesota Agricultural Experimental Station	277 Кофі холл, 1420 Еклес Авеню, Сн.Полл Мінесота 55108 США 277 Coffey Hall, 1420 Eckles Ave St. Paul, MN 55108 USA
690	Просід Інк. Proseed Inc.	705 Е Брюстер, Харві Північна Дакота, 58341, США 705 E Brewster, Harvey, ND, USA
724	ДЛФ - Трифоліум А/С DLF - Trifolium A/S	9,Ny Qstergade DK 4000,Roskilde Denmark, Postbox 59 9,Ny Qstergade DK 4000,Roskilde Denmark, Postbox 59
736	Товариство з обмеженою відповідальністю "Всеукраїнський науковий інститут селекції (ВНІС)" Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidal'nistiu "Vseukrains'kyi naukovyi instytut selektsii (VNIS)"	вул. Ломоносова 30/2, кв. 36, Київ, Україна, 03022 vul. Lomonosova 30/2, kv. 36, Kyiv, Ukraina, 03022
740	Інносід Б.В. Innoseed B.V.	П.О.Вокс 10000, 5250 ГА Віймен, Голандія P.O. Box 10000, 5250 GA Viljmen, The Netherlands
741	Агріко Кооператив Б.А. Agrico Cooperative B.A.	П.О. Б. 70 8300 АБ Емелорд, Нідерланди P.O.B. 70, 8300 AB Emmeloord, The Netherlands
743	СесВандерхаве Н.Б./С.А. SesVanderhave N.B./C.A.	Індустріпарк, 15 В-3300, м.Тінен, Бельгія Industriepark Soldatenplein Z2 nr 15 3300 Tienen, Belgium tel. +32(0) 16 80 82 11 fex +32(0) 16 80 83 76
744	Монсанта Холланд Б.В. Monsanto Holland B.V.	Вестейнд 161, 1601ВМ, Ерхуїзен, (поштова адреса: Постбус 22, 1600АА, Енхуїзен) Westeinde 161, 1601BM Enkhuizen (mailing address: Postbus 22, 1600AA Enkhuizen)
749	Хайленд Сідс Томпсонс ЛТД HyLand Seeds Thompsons Ltd	2 Хайленд Драйв Бленхейм, Онтаріо, Канада, Н0Р1А0 2 HyLand Drive Blenheim, Ontario, Canada, N0P1A0
751	Бейо Заден Б.В. Bejo Zaden B.V.	П.О.Бокс 50, Трамбан 1, 1749 3Х Варменхьюзен, Голандія. P.O. Box 50, Trambaan 1, 1749 ZH Warmenhuizen, The Netherlands
753	Нунемс Б.В. Nunhems B.V.	П.О. Бокс 4005,6080 АА Хаєн, Голандія P.O. Box 4005,6080 AA Haelen, The Netherlands
758	Жемойда Віталій Леонідович Zhemoida Vitalii Leonidovich	Пров. Сільськогосподарський, 1, кв.29, Київ, Україна, 03041 Prov. Sil's'kohospodars'kyi, 1, kv.29, Kyiv, Ukraina, 03041
759	Хмарський Микола Іванович Khmars'kyi Mykola Ivanovich	Вул. Академіка Заболотного, 112, кв. 10, Київ, Україна, 03187 Vul. Akademika Zabolotnoho, 112, kv. 10, Kyiv, Ukraina, 03187
760	Калінчук Олег Іванович Kalinchuk Oleh Ivanovich	Вул. Калініна, 57, кв. 174, м. Черкаси, Україна, 18000 Vul. Kalinina, 57, kv. 174, m. Cherkasy, Ukraina, 18000
765	ТОВ агрофірма "Нібас" TOV ahrofirma "Nibas"	Вул. Польова 100-А,сmt Петропавлівка, Дніпропетрівська обл., Україна, 52700 Vul. Pol'ova 100-A,smt Petropavlivka, Dnipropetrivs'ka obl., Ukraina, 52700
767	Піонер Семена Холдінг ГезмбХ Pioneer Semena Holding GesmbH	Індустрігеланде, Піонерштрассе, А - 7111, Парндорф, Австрія. Industriegelände, Pioneerstrasse, A-7111 Parndorf, Austria
770	МТІ Маїс Технолоджіс Інтернейшнл ГмбХ MTI Maize Technologies International GmbH	Ludwig Boltzmann Strabe 2, 7100 Neusiedl am See (office@maizetec.com) Ludwig Boltzmann Strabe 2, 7100 Neusiedl am See (office@maizetec.com)
786	Товариство з обмеженою відповідальністю "Байер" Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidal'nistiu "Baier"	04071, м. Київ, вул. Верхній Вал, 4Б 04071, m. Kyiv, vul. Verkhniy Val, 4B
789	Харріс Моран Сідс Компані Harris Moran Seed Company	Модесто СА, 95352, США, поштова скринька 4938 Modesto, CA, 95352, USA, Post Office Box 4938
791	Товариство з обмеженою відповідальністю науково виробничий дорадчий центр "Сільський господар" Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidal'nistiu naukovo vyrobnychiy dorachchiy tsentr "Sil's'kyi hospodar"	23227, с.Агрономічне, вул.Мічуріна, 1, Вінницького р-ну, Вінницької обл. 23227, s.Ahronomichne, vul.Michurina, 1, Vinnyts'koho r-nu, Vinnyts'koi obl.
793	Лімагрейн Юроп Limagrain Europe	Ферме де Лстан БПЗ 77390 Вернуль Лстан Франція Ferme de l'Etang BP3 77 390 Verneuil l'Etang France

Код Code	Назва Name	Адреса Adress
796	CAC Флоримон Депре Вев е Фіс SAS Florimond Desprez Veuve et Fils	Б.П. 41. Капель, Темплев, Франція, 59242 B.P. 41 Cappelleville, Templeuve, France, 59242
798	Колодій Юрій Антонович Kolodii Iurii Antonovych	С. Хиночі, Володимирецький р-н, Рівненська обл., 34313 S. Khynochy, Volodymyrets'kyi r-n, Rivnens'ka obl., 34313
801	Ден Хартіг Б.В. Den Hartig B.V.	Продуктивех 2 8304, м.Еммелурд, Нідерланди Produktieweg 2, 8304 AV Emmeloord, NL
806	Євраліс Семанс Euralis Semences	Авеню Гастон Фоебус, 64231 Лескар Седекс, Франція Avenue Gaston Phoebus, 64231 Lescar Cedex, France
807	Дойче Заатфедерелунг АГ Deutsche Saatveredelung AG	Вайсенбургер штр. 5, 59557 Ліпштадт, Німеччина Weissenburger Str.5, 59557 Lippstadt, Germany
822	ТОВ Науково виробниче підприємство "Агрокапітал" TOV Naukovo vyrobnyche pidpriemstvo "Ahrokapital"	61057, м.Харків, пров.Театральний, 4 оф. 33 тел. +38-057-757-35-31 факс.+38-057-714-30-77 61057, m.Kharkiv, prov.Teatral'nyi, 4 of. 33 tel. +38-057-757-35-31 faks.+38-057-714-30-77
824	КВС Лохов ГмбХ KWS Lochow GmbH	Поштівх 1197, 29296 Берген, Болерзенер Вег 5, Д-29303 Берген, Німеччина Postfach 1197, 29296 Bergen, Bollersener Weg 5 D-29303 Bergen, Germany
825	П.Х. Петерсен Заатсукхт Лундегард P.Kh. Petersen Zaatsukht Lundeheard	Postfach 6 d 24976 Lundsgaard, Postlangballig Postfach 6 d 24976 Lundsgaard, Postlangballig, tel.463689-0
826	Пархоменко Анатолій Костянтинович Parkhomenko Anatolii Kostiantynovych	Вул. Родімцева 11, кв. 156, Київ, Україна, 03041 Vul. Rodimtseva 11, kv. 156, Kyiv, Ukraine, 03041
827	Криворізький ботанічний сад Національної академії наук України Kryvoriz'kyi botanichnyi sad Natsional'noi akademii nauk Ukrainy	50089, м.Кривий Ріг - 89, вул. Маршака, 50 50089, m.Kryvyi Rih - 89, vul. Marshaka, 50
829	Фр.Штрубе Заатсукхт КГ Золлінген Fr.Strube Saatucht KG Sollingen	Поштівх 1363, 38358 Шонінген, Німеччина. Postfach 1363, 38358 Schoningen, Germany
840	Енза Заден Біхір Б.В. Enza Zaden Bikhir B.V.	Халінг 1Е, 1602 ДБ, Енхуйзен, Нідерланди Haling, 1E, 1602 DB, ENKHUIZEN, The Netherlands
844	Монсанто Технологі ЛТД MONSANTO TECHNOLOGY LLC	800Н; бульвар Ліндберг, Сент Луїс, Міссурі, США, МО 636167 800 N.Lindbergh blvd. St. Louis Missouri MO 636167 St. Louis Missouri MO 636167
853	Приватний підприємець Медведєв Олександр Олександрович Privatnyi pidpriyemets' Medvediev Oleksandr Oleksandrovych	09210, вул. Стадіонна, 26, с.Стайки, Кагарлицький р-н, Київська обл. 09210, vul. Stadionna, 26, s.Staiky, Kaharlyts'kyi r-n, Kyivs'ka obl.
879	Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад Institute of Field and Vegetable Crops, Novi Sad	М. Горкого 30, 21000 Нові Сад, Сербія M.Gorkog 30, 21000 Novi Sad, Serbia
880	Селген, а.с. Selgen, a.s.	Янковцова 18, 170 37 Прага 7, Чеська Республіка Jankovcova 18, 170 37 Praha 7, Ceska republika
882	ПІТ СХРЬОРС ХОЛДІНГ БВ Piet Schreurs Holding BV	Hoofdweg 81,1424 PD De Kwakel,The Netherlands (NL) Hoofdweg 81,1424 PD De Kwakel,The Netherlands (NL)
883	Кваліті Кропс Агро СРЛ Quality Crops Agro S.R.L.	27 Попа Саву стріт, 011431, Бухарест Румунія 27 Popa Savu strit, 011431, Bukharest Rumuniia
884	Кутновська Годовла Бурака Цукрового Сп. з о.о. Kutnowska Godowla Buraka Cukrowego Sp. z o.o.	Вул. Чопіна 25, 99-300 Кутно, Польща Ul. Chopina 255, 99-300 Kutno, Poland
886	Науково-дослідний центр "Магроселект" Naukovo-doslidnyi tsentr "Mahroselekt"	Вул. Косеуцелор, 35, м. Сорока, Молдова, 3001 тел/факс (+373 230) 3-08-02 Vul. Koseutcelor, 35, m. Soroka, Moldova, 3001 tel/faks (+373 230) 3-08-02
887	Нікерсон - Цваан Б.В. Nickerson -Zwaan B.V.	А/с 1, 4410 АА, Рісланд, Голландія (Schanseind 27, 4921PM MADE P.O. Box 28, 4920 AA Made The Netherlands) Schanseind 27, 4921PM MADE P.O. Box 28, 4920 AA Made The Netherlands, tel:+31162-690-900, +31 162-680-970
888	Приватне мале підприємство "Тирас" Privatne male pidpriemstvo "Tyras"	Вул. Живова, 32, м. Тернопіль, Україна 46008, тел./факс +38-0352-23-50-22 Vul. Zhuyova, 32, m. Ternopil', Ukraina 46008, tel./faks +38-0352-23-50-22
893	Товариство з обмеженою відповідальністю "Агрофірма Гавриш" Tovarystvo z obmezhenoii vidpovidal'nistiu " Ahrofirma Havrysh"	103287, Москва, вул 2-а Хуторська, 11, стр.1. Росія 103287, Moskva, vul 2-a Khutors'ka, 11, str.1. Rosiia
898	Некомерційне партнерство "Науково-дослідний інститут овочівництва закритого ґрунту" Nekomertsiiine partnerstvo "Naukovo-doslidnyi instytut ovochivnytstva zakrytoho hruntu"	127287, м.Москва, 2-га Хутірська, буд. 11, с. 1 127287, m.Moskva, 2-ha Khutirs'ka, bud. 11, s. 1
900	Клоз Clause	Рюа Луїс Саліант, З.І. Ля Моте, 26800, Порт-Лес-Валанс, Франція Rue Louis Salliant, Z.I., La Motte, 26800, Portes-Les-Valence, France
912	Норддойче Пфланцензукт Ханс-Георг Лембке КГ Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG	24363, Хохенлігі, Хольцес, Німеччина 24363 Hohenlieth, Holtsee, Germany

Код Code	Назва Name	Адреса Adress
917	Державне підприємство "Проектно-конструкторський технологічний інститут "Плодмашпроект" Derzhavne pidpriemstvo "Proektno-konstruktors'kyi tekhnolohichnyi instytut "Plodmashproekt"	Вул. Київська/тг. Перемоги, 75/1, м. Сімферополь, Автономна Республіка Крим, Україна, 95017 Vul. Kyivs'ka/pt. Peremohy, 75/1, m. Simferopol', Avtonomna Respublika Krym, Ukraina, 95017
918	Дой Агросайенс ВмбХ Dow AgroSciences VmbH	Ноттендорфер Гассе, 11 1130 Відень Nottendorfer Gasse, 11 1130 Vienna
922	Закрите акціонерне товариство "Селена" Zakryte aksionerne tovarystvo "Selena"	65036, Овідіопольська дорога, 3, м. Одеса, Україна 65036, Ovidiopol's'ka doroha, 3, m. Odesa, Ukraina
924	Маїсадур Семанс Maisadour Semences	BP27 route de Saint Sever 40001 Mont de Marsan Cedex FRANCE BP27 route de Saint Sever 40001 Mont de Marsan Cedex FRANCE
926	Заатен-Уніон ГмбХ Saaten-Union GmbH	Ейзенштрассе 12, 30916 Ізернхаген ХБ, Німеччина Eisenstrasse 12, 30916 Isernhagen HB, Germany
934	Лімагрейн Адванта Ніделенд Б.В. Limagrain Advanta Nederland B.V.	п/с 139, 8200 АС Лелистуд, Нідерланди P.O. Box 1, 4410 AA Rilland Nederland
938	КВС ЗААТ АГ KWS SAAT AG	Грімзельштрассе 31, 37555 Айнбек, Німеччина Hrimzel'shtrasse 31, 37555 Ainbek, Nimechchyna
946	Осева Ексімпо Прага с.р.о. Oseva Eximpo Praha s.r.o.	Бженец 1436, 696 81 Годонін, Чеська Республіка Bzenec 1436, 696 81 Hodonin, Czech Republic
952	Мале підприємство "Нива 1" Male pidpriemstvo "Nyva 1"	вул.Сковороди, 1/3, м. Полтава, Україна, 36003 тел. +38-0532-50-23-51; факс. +38-0532-50-23-51 vul.Skovorody, 1/3, m. Poltava, Ukraina, 36003 tel. +38-0532-50-23-51; faks. +38-0532-50-23-51
957	Костюченко Віктор Іванович Kostiuchenko Viktor Ivanovych	Будинок 42, кв 10,с.Дослідне, Дніпропетровський р-н, Дніпропетровська обл., Україна, 52071 Budynok 42, kv 10,s.Doslidne, Dnipropetrovs'kyi r-n, Dnipropetrovs'ka obl., Ukraina, 52071
964	Приватне підприємство науково- дослідна селекційна станція "Наско" Pryvatne pidpriemstvo naukovo- doslidna selektsiina stantsiia "Nasko"	вул. Горького, 40, м.Нова Каховка, Херсонська обл., 74907 vul. Hor'koho, 40, m.Nova Kakhovka, Khersons'ka obl., 74907
966	Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича комерційна фірма "Селекта" Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidal'nistiu naukovo-vyrobnycha komertsiiina firma "Selekta"	49000, м. Дніпропетровськ, вул. Батумська 11 49000, m. Dnipropetrovs'k, vul. Batums'ka 11
983	Дікмманн ГмбХ і Ко. КГ Dieckmann GmbH & Co. KG	Кірххорстерштрассе, 16 Д - 31 688 Нінштедт Kirchhorster Str. 16, D - 31688 Nienstaedt
1010	Заявник не зареєстрований Applicant not registered	- -
1011	Норіка Нордрінг-Картофельзucht-унд Фермерунгс-ГмбХ Norika Nording-Kartoffelzucht-und Vermehrungs GmbH	Парквег 4, Д - 18190 Гросс Люзевиц, Німеччина Parkweg 4, D-18190 Gross Lusewitz, Germany
1013	Поп Врієнд Сідз Б.В. Pop Vriend Seeds B.V.	П.О.Бокс 52 16193 Г Андійк, Голандія P.O.Box 52 1619 ZG Andijk, Holland
1024	НВО "Еліта" Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук NVO "Elita" Instytutu roslynnytstva im. V.IA. Iur'ieva Ukrain's'koi akademii ahrarnykh nauk	Пр. Московський, 42, м. Харків, Україна, 61060 Pr. Moskovskiy, 42, m. Kharkiv, Ukraina, 61060
1025	Інститут захисту рослин Української академії аграрних наук Instytut zakhystu roslын Ukrain's'koi akademii ahrarnykh nauk	Вул. Васильківська, 33, Київ, Україна, 01033 Vul. Vasy'l'kivs'ka, 33, Kyiv, Ukraina, 01033
1031	Сидорчук Валерій Іванович Sydorchuk Valerii Ivanovych	Вул. Вокзальна, 3, кв. 57, м. Біла Церква, Київська обл., Україна тел.6-16-26 Vul. Vokzal'na, 3, kv. 57, m. Bila Tserkva, Kyivs'ka obl., Ukraina tel.6-16-26
1034	Заатбау Лінц рег.Ген.м.б.Х Saatbau Linz reg.Gen.m.b.H	Ширменштрассе 19, А - 4020 Лінц, Австрія Schirmerstrasse 19, A-4020 Linz, Austria
1037	Сеїет Плантефоредлінг І/С Sejet Planteforaedling I/S	Ноерремарксвей 67, 8700 Хорсенс, Данія Noerremarksvej 67, 8700 Horsens, Denmark
1039	Приватна фірма "Зернова компанія "Слав'янське поле" Pryvatna firma "Zernova kompaniia "Slav'ians'ke pole"	Україна, м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 56. Ukraina, m. Odesa, vul. V. Arnauts'ka, 56.
1041	ЗАТ "Агрофірма Насіння" ZAT "Ahrofirma Nasinnia"	Вул. Гоголя, 1, с. Абазівка, Полтавський р-н, Полтавська область, Україна, 38715 Vul. Hoholia, 1, s. Abazivka, Poltavs'kyi r-n, Poltavs'ka oblast', Ukraina, 38715
1042	ТОВ "Селекційна станція " ТСГА ім. М.М. Тимофієва TOV "Selektsiina stantsiia " TSHA im. M.M. Tymofieva	Вул. Пасична, 5, м. Москва, Росія, 127550 Vul. Pasychna, 5, m. Moskva, Rosiia, 127550
1044	Агрофірма "Наско" Ahrofirma "Nasko"	Вул. Володимирська 91, Київ, Україна, 03150 Vul. Volodymyrs'ka 91, Kyiv, Ukraina, 03150

Код Code	Назва Name	Адреса Adress
1048	Секобра Речерчес Secobra Recherches	Центр де Буа Енді - 78580 МОЛЬ, Франція Centre de Bois Henry - 78580 MAULE , France
1050	Сингента Сідз Б. В. Syngenta Seeds B. V.	Вештайнде 62/Постбус 2, НЛ - 1600 АА Енкхаїзен, Голландія. Westeinde 62/Postbus 2, NL - 1600 AA Enkhuizen, The Netherlands
1051	Акціонерне товариство "Українська соя" Aktционерne tovarystvo "Ukrains'ka soia"	Вул. Жуковського, 20, м. Одеса, Україна, 65036 Vul. Zhukovs'koho, 20, m. Odesa, Ukraina, 65036
1055	Піонер Хай-Бред Швіццерленд СА Pioner Hi-Bred Switzerland SA	Via Cantonale - Galleria 3, CH - 6928 Manno, Switzerland Via Cantonale - Galleria 3, CH - 6928 Manno, Switzerland, tel. +1515/2484800, fax +1515/2484999
1059	Луганський інститут селекції і технологій у формі товариства з обмеженою відповідальністю Luhans'kyi instytut selektsii i tekhnolohii u formi tovarystva z obmezhenoiu vidpovidal'nistiu	91490, м. Луганськ, с. Тепличне, вул. Степова, 11 91490, m. Luhans'k, s. Teplychne, vul. Stepova, 11
1067	Державне підприємство дослідне господарство "Новокаховське" Нікітського ботанічного саду Української академії аграрних наук - Національного наукового центру Derzhavne pidpriemstvo doslidne hospodarstvo "Novokakhovs'ke" Nikits'koho botanichnoho sadu Ukrain's'koi akademii ahrarnykh nauk - Natsional'noho naukovoho tsentru	Вул.Садова 1, с. Плодове, м. Нова Каховка, Україна, 74992 Vul.Sadova 1, s. Plodove, m. Nova Kakhovka, Ukraina, 74992
1068	Товариство з обмеженою відповідальністю, Науково-впроваджувальна фірма "Ампелос" Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidal'nistiu, Naukovo-vprovadzhuval'na firma "Ampelos"	Вул. Мухіна, 24, м. Ялта, Автономна Республіка Крим, 334203 Vul. Mukhina, 24, m. IAlta, Avtonomna Respublika Krym, 334203
1071	Підприємство городнього насінництва і розсади, "ЦНОС" Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkolkarstwa, "CNOS"	60-951 Познань, вул. Копаніна 28/32, Польща. 60-951 Poznan, Kopanina 28/32, Poland
1072	Краковська Ходовля і Насінництво Огородніче "Полан" Сп. з о.о. Krakowska Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze "Polan" Sp. z o.o.	30-130 Краков, вул. Ридля 53/55, Польща. 30-130 Krakow, ul. Rydla 53/55, Poland
1076	ДПДГ "Асканійське" Інституту олійних культур Української академії аграрних наук DPDH "Askaniis'ke" Instytutu oliynykh kul'tur Ukrain's'koi akademii ahrarnykh nauk	74862, вул. 40-річчя Перемоги 16, с. Тавричанка, Каховський р-он, Херсонська обл. 74862, vul. 40-richchia Peremohy 16, s. Tavrychanka, Kakhovs'kyi r-on, Khersons'ka obl.
1078	Товариство з обмеженою відповідальністю "Науковий інститут селекції" Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidal'nistiu "Naukovyi instytut selektsii"	вул. Миру, 19-б, кв. 42, м. Миколаїв, 54056 vul. Myru, 19-b, kv. 42, m. Mykolaiv, 54056
1081	Підприємство городнього насінництва і розсади Ожарув Мазовецькі (ПНОС) Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkolkarstwa (PNOS)	Вул. Жеромського 3, 05-850 Ожарув Мазовецькі, Польща. Ul.Zeromskiego 3, 05-850 Ozarow Mazowiecki, Poland
1083	Товариство з обмеженою відповідальністю Товариство з обмеженою відповідальністю "Технаука" Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidal'nistiu "Tekhnauka"	Вул. Степова 11а, с. Тепличне, м. Луганськ, Україна, 94490 Vul. Stepova 11a, s. Teplychne, m. Luhans'k, Ukraina, 94490
1084	ПлантіКо Годовля і Насенництво Огородніче Големб'єв Сполка з о.о. PlantiCo Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze GOLEBIEW SPOLKA Z O.O.	99-300 Кутно, Польща 99-300 Kutno, Poland
1091	Сидорчук Валерій Іванович Sydorchuk Valerii ivanovych	Кв. 57, 3, вул. Вокзальна, м. Біла Церква, Україна, 09100 Kv. 57, 3, vul. Vokzal'na, m. Bila Tserkva, Ukraina, 09100
1092	Синьогуб Сергій Васильович Syn'ohub Serhii Vasylovych	09100 м.Біла Церква, Київська обл., вул.Леваневського, 47/1, кв. 124, тел.7-62-28 09100 m.Bila Tserkva, Kyivs'ka obl., vul.Levanevs'koho, 47/1, kv. 124, tel.7-62-28
1093	Товариство з обмеженою відповідальністю "Незалежна аграрна індустрія" Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidal'nistiu "Nezalezhna ahrarna industriia"	Вул. Шушенська, 65, м. Запоріжжя, Україна, 69089 Vul. Shushens'ka, 65, m. Zaporizhzhia, Ukraina, 69089
1102	Рійк Цваан Велвер ГмбХ Rijk Zwaan Welver GmbH	Верлер штрассе, 1, Д - 59514, Вельвер, Німеччина Werler Strasse, 1, D-59514, Welwer, Germany
1106	Товариство з обмеженою відповідальністю "Рапсодія" Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidal'nistiu "Rapsodiia"	Немирівське шосе, 26, м. Вінниця, Україна., 23200 Nemyrivs'ke shose, 26, m. Vinnytsia, Ukraina., 23200
1107	Щербань Сергій Васильович Scherban`Serhii Vasylovych	69093, м. Запоріжжя, вул. Дегтярьова, б.б, кв.194. 69093, m. Zaporizhzhia, vul. Dehtiar'ova, b.6, kv.194.
1109	Черкаський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук Cherkas'kyi instytut ahropromysloвого vyrobnytstva Ukrain's'koi akademii ahrarnykh nauk	18015, вул. Пастерівська, 76, м. Черкаси, Україна, тел.: (80472) 31-40-52, e-mail: reg_centra_ck_apv@ukrt.ua 18015, vul. Pasterivs'ka, 76, m. Cherkasy, Ukraina, tel.: (80472) 31-40-52, e-mail: reg_centra_ck_apv@ukrt.ua

Код Code	Назва Name	Адреса Adress
1112	Науково-виробниче товариство з обмеженою відповідальністю "Агро-Інтер" Naukovo-vyrobnyche tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidal'nistiu "Ahro-Inter"	03680, вул. Героїв Оборони 10, Київ 03680, vul. Heroiv Oborony 10, Kyiv
1117	Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче мале підприємство "Антарія" Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidal'nistiu Naukovo-vyrobnyche male pidpriemstvo "Antariia"	Вул. Машинобудівників, 2-б, а/с 67, стм. Чабани, Києво-Святошинський р-н, Київська обл., Україна, 08162 Vul. Mashynobudivnykiv, 2-b, a/s 67, stm. Chabany, Kyievo-Sviatoshyns'kyi r-n, Kyivs'ka obl., Ukraina, 08162
1121	Товариство з обмеженою відповідальністю "Насіння Луганщини" Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidal'nistiu "Nasinnia Luhanschyny"	91055, м. Луганськ, вул. Куракіна, 4/83 91055, m. Luhans'k, vul. Kurakina, 4/83
1123	Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробнича фірма "Дріада, Лтд" Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidal'nistiu Naukovo-vyrobnycha firma "Driada, Ltd"	Вул. Розі Люксембург, 23, Херсон, Україна, 73006 Vul. Rozy Liuksemburh, 23, Kherson, Ukraina, 73006
1141	Товариство з обмеженою відповідальністю агрофірма "Сади України" Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidal'nistiu ahrofirma "Sady Ukrainy"	Вул. Акад. Проскури 1, м. Харків 61070, Україна Vul. Akad. Proskury 1, m. Kharkiv 61070, Ukraina
1149	Заатцхт Йозеф Бройн ГмбХ і Ко. КГ Saatzucht Josef Breun Gdbr	Амсельвеч 1-Д 91074 Герцогенаурах Amselweg 1-D 91074 Herzogenaurach, Germany
1163	Товариство з обмеженою відповідальністю "Свитязь" Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidal'nistiu "Svytiaz'"	Вул. Городоцька 174, м. Львів, 79022 тел. +38-032-240-99-70, факс.+38-032-240-39-94 Vul. Horodots'ka 174, m. L'viv, 79022 tel. +38-032-240-99-70, faks.+38-032-240-39-94
1169	Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково - виробнича фірма "Агротехнологія" Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidal'nistiu "Naukovo - vyrobnycha firma "Ahrotekhnolohiia"	Вул. Межева 1, смт Кушугум, Запорізький р-н, Запорізька обл., 70450 Vul. Mezheva 1, smt Kushuhum, Zaporiz'kyi r-n, Zaporiz'ka obl., 70450
1186	Майстер Андрій Миколайович Maister Andrii Mykolaiovych	с. Рокині Луцький р-н Волинська обл 45626 Україна s. Rokyni Luts'kyi r-n Volyns'ka obl 45626 Ukraina
1188	Майстер Ірина Іванівна Maister Iryna Ivanivna	с. Рокині Луцький р-н Волинська обл 45626 Україна s. Rokyni Luts'kyi r-n Volyns'ka obl 45626 Ukraina
1190	Завадська Ніна Іванівна Zavads'ka Nina Ivanivna	с. Рокині Луцький р-н Волинська обл 45626 Україна s. Rokyni Luts'kyi r-n Volyns'ka obl 45626 Ukraina
1192	Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича агрофірма "Землеробець" Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidal'nistiu naukovo-vyrobnycha ahrofirma "Zemlerobets'"	с. Полігон, Жовтневий р-н, Миколаївська обл., 57217 c. Polihon, Zhovtnevyi r-n, Mykolaivs'ka obl., 57217
1194	P2n R2n	Р'є Еміле Сінгла - Сіте де Бурран, п/я 3336, ФР 122033 Родез Седекс 9, Франція Avenue Saint Pierre, Site de Bourran? 12033 Rodez Cedex 9
1203	Фермерське господарство "Теософ" Fermers'ke hospodarstvo "Teosof"	с. Рознощенське, Ульяновський р-н, Кіровоградська обл., 26422 s. Roznoschens'ke, Ul'ianivs'kyi r-n, Kirovohrads'ka obl., 26422
1210	Іноземне Підприємство "НС СЕМЕ-УКРАЇНА" Inozemne Pidpriemstvo "NS SEME-UKRAINA"	64032, с. Красне, Кегичівський р-он., Харківська обл., Україна 64032, s. Krasne, Kehychivs'kyi r-on., Kharkivs'ka obl., Ukraina
1213	Рапс ГБР Заатцхт Лундсгаард Raps GbR Saatzucht Lundsgaard	Лундсгаард, 24977, Грундхоф Lundsgaard, 24977, Grundhof
1219	Сингента Кроп Протекшн АГ Syngenta Crop Protection AG	Шварцвальдальє 215, 4002 Базель, Швейцарія Schwarzwaldallee 215, 4002 Basel, Switzerland
1227	Палента Технологіс С.А. Palenta Technologies S.A.	J. Alfaro Avehue, the Century Tower, Seventh floor № 713, Panama, republic of Panama J. Alfaro Avehue, the Century Tower, Seventh floor № 713, Panama, republic of Panama
1245	ТОВ "Торговий дім "Насіння" TOV "Torhovyi dim "Nasinnia"	03141, м. Київ, вул. Клінічна, 25 03141, m. Kyiv, vul. Klinichna, 25
1253	Ходовля Рослін Смолице Сп.з.о.о Група ІХАР Hodowla Roslin Smolice Sp.z.o.o Grupa IHAR	Смолице 146, 63-740 Кобилін, Польща Smolitse 146, 63-740 Kobylin, Pol'sha
1267	Сарл Адрієн Момон і Сині Sarl Adrien Momont et Fils	вул. Мартинвал', 7 М.Мон Ен Певель-59246 vul. Martynval', 7 M.Mon En Pevel'-59246
1280	ТОВ "Хімагромаркетинг" TOV "Khimahromarketynh"	02160, м. Київ, пр-т. Возз'єднання 15 02160, m. Kyiv, pr-t. Vozz'iednannia 15
1302	Товариство з обмеженою відповідальністю "ВЕНС - ПЛІУС" Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidal'nistiu "VENS - PLIUS"	09034, Київська область, Сквирський р-он., с. Шамраївка, вул. Шкільна, 6 а 09034, Kyivs'ka oblast', Skvyrs'kyi r-on., s. Shamraivka, vul. Shkil'na, 6 a

Код Code	Назва Name	Адреса Adress
1304	Штрубе ГмбХ енд Ко. КГ Strube GmbH & Co. KG	Гауптшт., 1 38387 Зеллінген, Німеччина Hauptstr. 1 38387 Sollingen Germany
1310	Промо-Фрут АГ Promo-Fruit AG	Schluchewag 1, CH-8197 RAFZ, Switzerland Schluchewag 1, CH-8197 RAFZ, Switzerland
1329	Голден Вест Сід Болгарія ООО Golden West Seed Bulgaria Ltd.	вул. Христова ботев, 29, с. Борисово, обл. Русе, община Сливо Поле 29, Hristovo Botev str., v. Borisovo, area Rousse, com. Slivo Pole
1364	Михаць Остап Романович Mykhats' Ostop Romanovych	12450, Житомирська обл., Житомирський р-н., с. Городище, вул. Комсомольська, 24 12450, Zhytomyrs'ka obl., Zhytomyrs'kyi r-n., s. Horodysche, vul. Komsomol's'ka, 24
1368	Сумська дослідна станція садівництва Інституту садівництва Української академії аграрних наук Sums'ka doslidna stantsiia sadivnytstva Instytutu sadivnytstva Ukrain's'koi akademii ahrarnykh nauk	41663, с. Малий Самбір, Конотопський р-н., Сумська обл. 41663, s. Malyy Sambir, Konotops'kyi r-n., Sums'ka obl.
1390	Лімагрейн Централ Юроп Сіріалс, с.р.о. Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.	Praha 9 Kie, Podevorská 755/5, PSC 19800 Czech Republic, tel. :), fax: , e-mail: Oleg.Khekalo@limagrain.com Praha 9 Kie, Podevorská 755/5, PSC 19800 Czech Republic, tel. :), fax: , e-mail: Oleg.Khekalo@limagrain.com
1420	Сингента Сідз ЛТД Syngenta Seeds LTD	Маркет стейшн, Маркет райзен, Лінкольншир, ЛН 8 5 ЛЖ, Великобританія Market stainton, Market rasen, Lincolnshire, LN8 5LJ, GB
1435	Солтіс Soltis	Domaine de Sandreau, F-31700 Mondonville - France Domaine de Sandreau, F-31700 Mondonville - France
1447	Консорциум Дойчер Баумшулен ГмбХ Consortium Deutscher Baumschulen GmbH	Хауптштрассе 21, D-25474 Еллурбек, Німеччина Hauptstr. 21, D-25474 Ellerbek, Germany
1460	ТОВ "Дуна-р" Duna-r Kft.	1224, м. Будапешт, вул. ІХ, буд. 17 1224 Budapest, IX, u. 17, HUNGARY
1464	Пасіфік Сідс Пти Лтд Pacific Seeds Pty Ltd	268 Анзас Аве, Тоовоомба К 4350 Австралія 268 Anzac Ave, Toowoomba Q 4350 Australia
1466	Аванта Семілас САІК Advanta Semillas SAIC	Рута Нак. 33 Км 636 С.С. 559 (2600) Венадо Туерто (Аргентина) Ruta Nac. 33 Km 636 C.C. 559 (2600) Venado Tuerto, AR
1468	Ротару Тудор Григорович Rotaru Tudor Hryhorovych	Республіка Молдова, м. Белць, вул. Болгарська, 96/49 Respublyka Moldova, m. Bieltsy, vul. Bolhars'ka, 96/49
1472	Агроплант Б.В. Agroplant B.V.	а/с 12, 1670 АА Медемблік Нідерланди P.O. Box 12, 1670 AA Medemblik The Netherlands
1498	Пробстдорфер Заатцухт Гез.м.б.Х. енд КоКГ Probstdorfer Saatzzucht Ges.m.b.H & CoKG	Parkring 12, 1010 Vienna, Austria Parkring 12, 1010 Vienna, Austria
1508	Солана Гмбх унд Ко. КГ Solana GmbH & Co.KG	Альберт-Айнштайн-Рінг 5, 22761 Гамбург, Німеччина Albert-Einstein-Ring 5, 22761 Hamburg, Germany
1517	Товариство з обмеженою відповідальністю агрофірма "Українське насіння" Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidal'nistiu ahrofirma "Ukrains'ke nasinnia"	64032, Харківська область, Кегичівський район, с. Красне 64032, Kharkivs'ka oblast', Kehychivs'kyi raion, s. Krasne
1520	Аванта Сід Інтернешнал Advanta Seed International	Rogers House, 5 President John Kennedy St., Port-Louis, Mauritius Rogers House, 5 President John Kennedy St., Port-Louis, Mauritius
1533	Маральді Сементі Ді Даніеле Маральді MARALDI SEMENTI di Daniele Maraldi	VIA EMILIA 2625, 47521, CESENA FC ITALY VIA EMILIA 2625, 47521, CESENA FC ITALY
1539	Чорний Анатолій Гнатович Chornyi Anatolii Hnatovych	60022, с. Шилівці, Хотинський р-н, Чернівецька обл., вул. Хотинська, 2 60022, s. Shylivtsi, Khotyns'kyi r-n, Chernivets'ka obl., vul. Khotyns'ka, 2
1562	агри-Заатен ГмбХ agri-Saaten GmbH	Машвег 111, Німеччина - 49152 Бад Ессен Maschweg 111, D-49152 Bad Essen
1581	Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Національної академії аграрних наук України Instytut roslinnytstva im. V.IA. Iur'ieva Natsional'noi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	пр. Московський, 142, м. Харків, 61128, Україна pr. Moskovs'kyi, 142, m. Kharkiv, 61128, Ukraina
1585	Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Nikits'kyi botanichnyi sad - Natsional'nyi naukovyi tsentr	сmt. Нікіта, м.Ялта, Автономна Республіка Крим, 98648 smt. Nikita, m.Ialta, Avtonomna Respublika Krym, 98648
1591	Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насінництва та сортовивчення Selektsiino-henetychnyi instytut - Natsional'nyi tsentr nasinnieznavstva ta sortovyvchennia	Овідіопольська дорога, 3, м. Одеса, 65036 Ovidiopol's'ka doroha, 3, m. Odesa, 65036
1601	Інститут садівництва Національної академії аграрних наук України Instytut sadivnytstva Natsional'noi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	03027, м.Київ, смт. Новосілки, вул. Садова 23 03027, m.Kyiv, smt. Novosilky, vul. Sadova 23

Код Code	Назва Name	Адреса Adress
1605	Національний інститут винограду і вина "Магарач" Natsional'nyi instytut vynohradu i vyna "Maharach"	Вул. Кірова, 31, м. Ялта, Автономна Республіка Крим, Україна, 98600 Vul. Kirova, 31, m. Ialta, Avtonomna Respublika Krym, Ukraina, 98600
1607	Миколаївський інститут агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України Mykolaivs'kyi instytut ahropromyslovoho vyrobnytstva Natsional'noi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	57217, Миколаївська обл., Жовтневий р-н, с. Полігон, вул. Центральна, 17 57217, Mykolaivs'ka obl., Zhovtnevyi r-n, s. Polihon, vul. Tsentral'na, 17
1624	Донецька дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук України Donets'ka doslidna stantsiia Instytutu ovochivnytstva i bashtannytstva Natsional'noi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	П/в Опитне, Ясинуватський р-н., Донецька обл., 86081 P/v Opytne, IAsynuvats'kyi r-n., Donets'ka obl., 86081
1626	Національний науковий центр "Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України" Natsional'nyi naukovyi tsentr "Instytut zemlerobstva Natsional'noi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy"	вул. Машинобудівників 2-б, смт. Чабани, Києво-Святошинський район, Київська область, 08162 vul. Mashynobudivnykiv 2-b, smt. Chabany, Kyievo-Sviatoshyns'kyi raion, Kyivs'ka oblast', 08162
1635	Білоцерківська дослідно-селекційна станція Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України Bilotserkivs'ka doslidno-selektsiina stantsiia Instytutu bioenerhetychnykh kul'tur i tsukrovyykh buriakiv Natsional'noi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	п/в Мала Вільшанка 1, Білоцерківський р-н, Київська обл., 09176 p/v Mala Vil'shanka 1, Bilotserkivs'kyi r-n, Kyivs'ka obl., 09176
1650	Нонг Ву Біо Ко ЛТД Nong Woo Bio Co LTD	1197 - 4, Маїген 2 - Донг, Йонгтонг - Гу, Сувон, Г'юнггі - До, 443-372, Республіка Корея 1197 - 4, Maetan - 2 - Dong, Yeongtong - Gu, Suwon, Gyeonggi-Do, 443-372, Republic of Korea
1654	Медвідь Сергій Петрович Medvid' Serhii Petrovych	Вінницька обл., Вінницький р-н, с. бохоники, вул. Гніванське шосе, пров. Затишний, 3а Vinnyts'ka obl., Vinnyts'kyi r-n, s. bokhonyky, vul. Hnivans'ke shose, prov. Zatyshnyi, 3a
1669	Інститут кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України Instytut kormiv ta sil's'koho hospodarstva Podillia Natsional'noi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	21100, м. Вінниця, проспект Юності, 16 21100, m. Vinnytsia, prospekt IUnosti, 16
1671	Корпорація Сідс 2000 Seeds 2000, Inc.	США, Мінесота 56520, Брекенрідж, П.О.200, 115 3 вул. Норт Стріт 115 3rd St. N Breckenridge, MN, 56520 USA
1673	КВС Потейто Б.В KWS POPATO B.V	ПО Поштова скринька 1049, 8304 БД Еммелурд Нідерланди P.O. Box 1049, 8304 BD Emmeloord the Netherlands
1684	Інститут сільського господарства степової зони Національної академії аграрних наук України Instytut sil's'koho hospodarstva stepovoi zony Natsional'noi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	вул. Дзержинського, 14, м. Дніпропетровськ, Україна, 49600 vul. Dzerzhyns'koho, 14, m. Dnipropetrovs'k, Ukraina, 49600
1688	Піонер Оверсіз Корпорейшн Pioneer Overseas Corporation	7100 NW 62nd Avenue, Johnston, Iowa, USA 7100 NW 62nd Avenue, Johnston, Iowa, USA
1690	Піонер Хай-Бред Інтернешнл, Інк. Pioneer Hi-Bred International, Inc.	7100 NW 62nd Avenue, Johnston, Iowa, USA 7100 NW 62nd Avenue, Johnston, Iowa, USA
1694	Заатен Уніон Румунія Срл. SAATEN UNION Romania Srl.	Стр. Іон Лука Карагіале Нр.3, 020041 Бухарест, Румунія Str.Ion Luca Caragiale Nr. 3, 020041 Bucharest, Romania
1698	Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України Instytut zroshuvanoho zemlerobstva Natsional'noi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	73483, Херсонська обл., м. Херсон, Дніпровський район, сел. Наддніпрянське 73483, Khersons'ka obl., m. Kherson, Dniprovs'kyi raion, cel. Naddnyprians'ke
1702	Інститут олійних культур Національної академії аграрних наук України Instytut oliinykh kul'tur Natsional'noi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	70417, Запорізька обл., Запорізький р-н, с. Сонячне, вул. Інститутська, 1 70417, Zaporiz'ka obl., Zaporiz'kyi r-n, s. Soniachne, vul. Instytut's'ka, 1
1704	АГРЕЛІАНТ ГЕНЕТИКС Інк. AgRELIANT GENETICS Inc.	П.С. 1088, Чатем, Онтаріо Н7М 5Л6, КАНАДА P.O.Box 1088, Chatham, Ontario N7M 5L6, CANADA
1708	Дослідна станція "Маяк" Інституту овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук України Doslidna stantsiia "Maiak" Instytutu ovochivnytstva i bashtannytstva Natsional'noi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	Чернігівська обл., Ніжинський р-н, село Крути, вул. Незалежності, 39, Україна, 16645 Chernihivs'ka obl., Nizhyns'kyi r-n, selo Kruty, vul. Nezalezhnosti, 39, Ukraina, 16645
1719	Товариство з обмеженою відповідальністю "НУСІД СЕРБІЯ" Drustvo sa organicenom odgovornoscu "NUSEED SERBIA"	11000, Serbia, Belgrade, str. Cincar Jankova, 3 11000, Serbia, Belgrade, str. Cincar Jankova, 3

Код Code	Назва Name	Адреса Adress
1730	Рійк Цваан Заадтеелт ен Заадхандел Б.В. RIJK ZWAAN Zaadteelt en Zaadhandel B.V.	Бурхемеестер Крезеелаан 40, НЛ-2678 КХ, Де Лір, Нідерланди Burgemeester Crezeelaan 40, 2678 KX De Lier, the Netherlands
1740	Юксел Тохумчулук ЛТД Yuksel Tohumculuk LTD	Kursunlu Koyu, Madenler Mar. P.O. Box 47, Kiziltoprak - 07300 Antalya, Turkiye Kursunlu Koyu, Madenler Mar. P.O. Box 47, Kiziltoprak - 07300 Antalya, Turkiye
1745	Лантманнен СВ Сід АБ Lantmannen SW Seed AB	SE-268 81, Свалов, Швеція SE -268 81, Svalof, Sweden
1749	Товариство з обмеженою відповідальністю "Астарт-Селекція" Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidal'nistiu "Astarta-Selektsiia"	22000, вул. Привокзальна, 53, м. Хмільник, Хмільницький р-н, Вінницька обл. 22000, vul. Pryvokzal'na, 53, m. Khmil'nyk, Khmil'nyts'kyi r-n, Vinnyts'ka obl.
1761	КОДИСЕМ CODISEM	BP 2, 82440 CAYRAC FRANCE BP 2, 82440 CAYRAC FRANCE
1771	Приватне акціонерне товариство "Селена" Pryvatne aktsionerne tovarystvo "Selena"	Вул. Гаркавого, 5, с. Дачне, Біляївський район, Одеська обл., Україна, 67624 Vul. Harkavoho, 5, s. Dachne, Biliav's'kyi raion, Odes'ka obl., Ukraina, 67624
1787	Сі. Маєр Бі.Ві. C. Meijer B.V.	Стационсвег 18а, 4416 ПДж Круїнінген, Нідерланди Stationsweg 18a 4416 PJ Kruiningen The Netherlands
1789	Байєр КропСайєнс Рапс ГмбХ Bayer CropScience Raps GmbH	Streichmuehler Strasse 8, 24977 Grundhof, Germany Streichmuehler Strasse 8, 24977 Grundhof, Germany
1797	Секобра речерчєс С.А.С. Secobra recherches S.A.S.	Centre De Bois Henry, 78580 Maule, France Centre De Bois Henry, 78580 Maule, France
1807	Прикарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту сільського господарства Карпатського регіону Національної академії аграрних наук України Prykarpats'ka derzhavna sil's'kohospodars'ka doslidna stantsiia Instytutu sil's'koho hospodarstva Karpats'koho rehionu Natsional'noi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	76014, м. Івано-Франківськ, вул. Бандери, 21А 76014, m. Ivano-Frankiv's'k, vul. Bandery, 21A
1809	Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України Instytut sil's'kohospodars'koi mikrobiolohii ta ahropromysloвого vyrobnytstva Natsional'noi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	вул. Шевченка, 97, м. Чернігів, 14027 vul. Shevchenka, 97, m. Chernihiv, 14027
1811	Носівська селекційно-дослідна станція Інституту сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України Nosivs'ka selektsiino-doslidna stantsiia Instytutu sil's'kohospodars'koi mikrobiolohii ta ahropromysloвого vyrobnytstva Natsional'noi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	вул. Миру, 1, с. Дослідне, Носівський р-н, Чернігівська обл., 17131 vul. Myru, 1, s. Doslidne, Nosivs'kyi r-n, Chernihivs'ka obl., 17131
1817	ДЖОН ТЬОРНЕР СІД ДЕВЕЛОПМЕНТС JOHN TURNER SEED DEVELOPMENTS	22 Cromwell Road, United Kingdom - Ely - Cambridgeshire CB6 1AS 22 Cromwell Road, United Kingdom - Ely - Cambridgeshire CB6 1AS
1823	Товариство з обмеженою відповідальністю "НК ЕЛІТ" Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidal'nistiu "NK ELIT"	03164, Україна, м. Київ, вул. Олевська, будинок 3, корпус В 03164, Ukraina, m. Kyiv, vul. Olevs'ka, budynok 3, korpus V
1833	Саката Веджегеблз Еуроп С.А.С. SAKATA VEGETABLES EUROPE SAS	Домейн де Саблас, вул. Мулін, Ф-30620, Франція Domaine de sablas Rue du Moulin, 30620 UCHAUD France
1845	Агроген Agrogen	Zahradni Stree, fl № 1a. 664 41, city of Troubsko u Brna, Czech Republic Zahradni Stree, fl № 1a. 664 41, city of Troubsko u Brna, Czech Republic
1850	Мелітопольська дослідна станція садівництва імені М.Ф. Сидоренка Інституту садівництва Національної академії аграрних наук України Melitopol's'ka doslidna stantsiia sadivnytstva imeni M.F. Sydorenka Instytutu sadivnytstva Natsional'noi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	Вул. Вакуленчука, 99, м. Мелітополь, Запорізька обл., 72311, Україна Vul. Vakulenchuka, 99, m. Melitopol', Zaporiz'ka obl., 72311, Ukraina
1854	Державна установа Інститут сільського господарства степової зони Національної академії аграрних наук України Derzhavna ustanova Instytut sil's'koho hospodarstva stepovoi zony Natsional'noi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	вул. Дзержинського, 14, м. Дніпропетровськ, Україна, 49600 vul. Dzerzhyns'koho, 14, m. Dnipropetrovs'k, Ukraina, 49600
1867	Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-дослідний інститут аграрного бізнесу" Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidal'nistiu "Naukovodoslidnyi instytut ahrarnoho biznesu"	49051, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Калинова, 3 49051, Ukraina, m. Dnipropetrovs'k, vul. Kalynova, 3
1893	АСПІРІЯ СІДС ЕС.А. ASPRIA SEEDS S.A.	47, Grand-Rue, L 1661 Luxembourg 47, Grand-Rue, L 1661 Luxembourg

Код Code	Назва Name	Адреса Adress
1910	Парій Ярослав Федорович Parii IAroslav Fedorovych	вул. Ломоносова 75а, кв. 66, м. Київ, 03022 vul. Lomonosova 75a, kv. 66, m. Kyiv, 03022
1914	Товариство з обмеженою відповідальністю "ТерраВіта Україна" Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidal'nistiu "TerraVita Ukraina"	01033, м. Київ, вул. Володимирська, 81 Б, оф. 22 01033, m. Kyiv, vul. Volodymyrs'ka, 81 B, of. 22
1926	Товариство з обмеженою відповідальністю "Агрооптіма" Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidal'nistiu "Ahrooptyma"	67652, Одеська обл., Біляївський р-н, сільрада Усатівська, комплекс, 8 км + 100 м траси Одеса-Київ-Санкт-Петербург 67652, Odes'ka obl., Biliaivs'kyi r-n, sil'rada Usativs'ka, kompleks, 8 km + 100 m trasy Odesa-Kyiv-Sankt-Peterburh
1935	Волинська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту сільського господарства Західного Полісся Національної академії аграрних наук України Volyns'ka derzhavna sil's'kohospodars'ka doslidna stantsiia Instytutu sil's'koho hospodarstva Zakhidnoho Polissia Natsional'noi akademii ahrarykh nauk Ukrainy	вул. Шкільна 2, смт. Рокині, Луцький район, Волинська область, 45626, Україна vul. Shkil'na 2, smt. Rokyni, Luts'kyi raion, Volyns'ka oblast', 45626, Ukraina
1939	Дніпропетровська дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук України Dnipropetrovs'ka doslidna stantsiia Instytutu ovochivnytstva i bashtantnytstva Natsional'noi akademii ahrarykh nauk Ukrainy	вул. Опитна, 1, с. Олександрівка, Дніпропетровський р-н, Дніпропетровська обл., 52041 vul. Opytna, 1, s. Oleksandrivka, Dnipropetrovs'kyi r-n, Dnipropetrovs'ka obl., 52041
1940	Придніпровська дослідна станція садівництва Інституту садівництва Національної академії аграрних наук України Prydnistrovs'ka doslidna stantsiia sadivnytstva Instytutu sativnytstva Natsional'noi akademii ahrarykh nauk Ukrainy	вул. Яблунівська, 1, с. Годиїв, Сторожинецький район, Чернівецька обл., 59052 vul. IAblynivs'ka, 1, s. Hodyliv, Storozhynets'kyi raion, Chernivets'ka obl., 59052
1941	ПАНАМ ФРАНС САРЛ PANAM FRANCE SARL	F-31340 Villemur sur Tarn, 544 Route de Villebrumier F-31340 Villemur sur Tarn, 544 Route de Villebrumier
1943	Полтавська державна сільськогосподарська дослідна станція імені М.І. Вавилова Інституту свинарства і агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України Poltavs'ka derzhavna sil's'kohospodars'ka doslidna stantsiia imeni M.I. Vavilova Instytutu svynarstva i ahropromyslovoho vyrobnytstva Natsional'noi akademii ahrarykh nauk Ukrainy	вул. Шведська, 86, м Полтава, 36014 vul. Shveds'ka, 86, m Poltava, 36014
1944	Зе Нью Зеленд Інстітют фо Планта енд Фуд Рісеч Лімітед The New Zealand Institute for Plant and Food Research Limited	Mt Albert Research Centre 120 Mt Albert Road, Mt Albert Auckland 1025, New Zealand Mt Albert Research Centre 120 Mt Albert Road, Mt Albert Auckland 1025, New Zealand
1947	Юрепіен Віллов Брідінг АБ European Willow Breeding AB	Spannmalsgatan 28, SE-268 32 Svalov, Sweden Spannmalsgatan 28, SE-268 32 Svalov, Sweden
1951	Інститут огородництва Instytut Ogorodnictwa	96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, Polska 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, Polska
1952	Хазера Генетікс Лтд Hazera Genetics Ltd	79837, Israel, Berurim M.P. Shikmim 79837, Israel, Berurim M.P. Shikmim
1955	Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕНЕРГО АГРАР" Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidal'nistiu "ENERHO AHRAR"	Україна, 78200, Івано-Франківська область, м. Коломия, вул. О.Пушкіна, 6 Ukraina, 78200, Ivano-Frankivs'ka oblast', m. Kolomyia, vul. O.Pushkina, 6
1959	Сінгента Партісіпейшнз АГ Syngenta Participation AG	SCHWARZWALDALLEE 215, BASEL 4058, SWITZERLAND SCHWARZWALDALLEE 215, BASEL 4058, SWITZERLAND
1967	Прилуцька дослідна станція Нікітського ботанічного саду - Національного наукового центру Pryluts'ka doslidna stantsiia Nikits'koho botanichnoho sadu - Natsional'noho naukovoho tsentru	Вул. Вавілова, 16, м. Прилуки, Чернігівської обл., 17511 Vul. Vavilova, 16, m. Pryluky, Chernihivs'koi obl., 17511

10.2. Інші скорочені назви, скорочення термінів, які вжиті в Бюлетені

10.2. Others short names, aberrations as appearing in the Bulletin

У перекладі з української на англійську мову скорочень термінів у бюлетені використано загальновживані скорочення термінів Міжнародного союзу з охорони нових сортів рослин (UPOV). ПС – патент на сорт рослин (згідно з термінологією UPOV – права селекціонера), РС – державна реєстрація сорту рослин (згідно з термінологією UPOV – національний перелік), АС – авторське свідоцтво на сорт рослин.	The translation from Ukrainian to English of the aberrations in the Bulletin engaged common aberration of terms by the International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV). PBR – Plant Variety Patent (according to UPOV terminology – Plant Breeder’s Rights), NLI – Plant Variety State Registration (according to UPOV terminology – National Listing), AC – Plant Variety Authorship Certificate.
Скорочені назви, скорочення термінів, які вжиті в офіційних описах та показниках господарської придатності: П – Полісся, Л – Лісостеп, С – Степ, ЗГр – закритий ґрунт, гідроп – гідропоніка, ЗГр (СТ) – закритий ґрунт (скляна теплиця), ЗГр (ПТ) – закритий ґрунт (плівкова теплиця).	Short names, aberrations as appearing in the Descriptions and Indices of Value for Cultivation and Use: П – Woodlands, Л – Forest-Steppe, С – Steppe, ЗГр – covered ground, гідроп – hydroponics, ЗГр (СТ) – covered ground (glass greenhouse), ЗГр (ПТ) – covered ground (white plastic film greenhouse).

11. ІНШІ ВІДОМОСТІ
11. OTHER NOTIFICATIONS

11.1. Інші відомості Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України
11.1. Other notifications of the State veterinary and phytosanitary service of Ukraine

На підставі рішення Держветфітослужби зареєстровано Ліцензійний договір про передачу права на використання сорту малини Рафцакю номер патенту 130158, дата державної реєстрації прав на сорт 15.08.2013, відповідно до якого право на використання сорту передається ТОВ "Фрутек" (вул. Київська 2 а, с. Дорожне, Вінницький район, 23217). Вид ліцензії – виключна.

11.2. Інші відомості Українського інституту експертизи сортів рослин

11.2. Other notifications of the Ukrainian institute for plant variety examination

Робота методичної комісії Українського інституту експертизи сортів рослин

Activities of the Test Guidelines Committee of the Ukrainian institute for plant variety examination

Методична комісія Українського інституту експертизи сортів рослин **29 січня 2014 р.** у присутності Башкірової Н.В., Баликіної В.В., Гринів С.М., Києнко З.Б., Кондратенко Т.Є, Костенко Н.П., Краснопольського М.М., Лахтіонової С.О., Лещук Н.В., Матус В.М., Павлюк Н.В., Рахметова Д.Б. провела своє засідання за **ПОРЯДКОМ ДЕННИМ:**

1. Розгляд проекту методики на ВОС-тест для сортів китайбелії виноградолистої та адаптованих до вимог UPOV методик на ВОС-тест для сортів горошку посівного, кавуна звичайного, квасолі звичайної, костриці (6 видів), люцерни (за винятком посівної та мінливої), помідора їстівного, пшениці твердої, редьки посівної, редьки чорної та інших.
2. Розгляд Переліку сортів з еталонними ознаками салату посівного *Lactuca sativa* L.
3. Розгляд Переліку сортів з еталонними ознаками картоплі *Solanum tuberosum* L.
4. Розгляд форм ППП для сортів кормових, плодових та овочевих видів.
5. Розгляд Форми № 1 для сортів кормових видів.
6. Різне:
 - інформація щодо підготовки видань інформаційних матеріалів методичного забезпечення кваліфікаційної експертизи сортів рослин у 2014 р.;
 - питання щодо перевидання Методики проведення фітопатологічних дослідів за штучного зараження.

Схвалено:

- 1) проект Методики проведення експертизи сортів китайбелії виноградолистої (*Kitaibelia vitifolia* Willd.) на відмінність, однорідність і стабільність;
- 2) перелік сортів з еталонними ознаками салату посівного *Lactuca sativa* L.;
- 3) перелік сортів з еталонними ознаками картоплі *Solanum tuberosum* L.;
- 4) форми показників придатності сортів до поширення в Україні для агрусу звичайного, вики волохатої, вівса щетинистого, еспарцету виколистого, еспарцету закавказького, жита гірського, костриці Беккера, костриці тонколистої, люпину багаторічного, хризантеми садової;
- 5) форми № 1 для сортів кормових видів, а саме: грятиці збірної, еспарцету виколистого, конюшини білої, к. лучної (червоної), кострецю безостого, костриці лучної, к. очеретяної, к. велетенської, люцерни посівної, л. мінливої, пажитниці багаторічної, п. багатоквіткової, райграсу високого, тимофіївки лучної, т. степової.
- 6) перелік інформаційних матеріалів методичного забезпечення кваліфікаційної експертизи сортів рослин у 2014 р.;
- 7) створення координаційної групи з підготовки видань інформаційних матеріалів методичного забезпечення кваліфікаційної експертизи сортів рослин.

Методична комісія Українського інституту експертизи сортів рослин **26 лютого 2014 р.** в присутності Алейнікова І.М., Башкірової Н.В., Баликіної В.В., Васківської С.В., Воєводіна В.В., Гринів С.М., Каражбей Г.М., Києнко З.Б., Костенко Н.П., Краснопольського М.М., Лещук Н.В., Павлюк Н.В., Ткаченка В.М. провела своє засідання за **ПОРЯДКОМ ДЕННИМ:**

1. Розгляд нової редакції Методики проведення фітопатологічних досліджень за штучного зараження (видання друге). Рецензії наукових профільних установ НААН і НАН України.
2. Розгляд проектів Методик з експертизи на ВОС для сортів мирту звичайного, полину сантонінського, меліси лікарської (перегляд).

3. Розгляд і схвалення форм показників придатності сортів до поширення в Україні унабі справжнього (зізіфусу), полину кримського, полину сантонінного, мирту звичайного, полину-естрагону, ячменю звичайного різних напрямів використання, меліси лікарської (перегляд).

4. Різне:

- створення робочої групи для організації **круглого столу** «Новий формат програмного забезпечення експертизи з визначення показників придатності сортів до поширення в Україні»;
- схвалення Порядку денного для роботи **круглого столу** (18.03.14);
- обговорення списку запрошених;
- розгляд Картки закладу експертизи державної системи охорони прав на сорти рослин.

Схвалено:

1) внесення змін до Методики проведення експертизи сортів меліси лікарської (*Melissa officinalis* L.) на відмінність, однорідність і стабільність;

2) організаційні заходи щодо проведення круглого столу «Новий формат програмного забезпечення експертизи з визначення показників придатності сортів до поширення в Україні»

Методична комісія Українського інституту експертизи сортів рослин **27 березня 2014 р.** у присутності Алейнікова І.М., Башкірової Н.В., Баликіної В.В., Камінської Л.В., Києнко З.Б., Кондратенко Т.Є., Костенко Н.П., Краснопольського М.М., Лещук Н.В., Павлюк Н.В., Рубцової О.Л., Таганцової М.М. провела своє засідання за **ПОРЯДКОМ ДЕННИМ:**

1. Перегляд персонального складу Методичної комісії.
2. Розгляд проектів Методик з експертизи на ВОС для сортів мирту звичайного, полину.
3. Розгляд і схвалення форм показників придатності сортів до поширення в Україні дайкону, лавандину, меліси лікарської, мирту звичайного, монарди трубчастої, полину-естрагону, полину кримського, полину сантонінного, селери черешкової, унабі (зізіфусу).
4. Розгляд службової записки координаційної групи з підготовки видань інформаційних матеріалів методичного забезпечення кваліфікаційної експертизи сортів рослин щодо перегляду методик проведення експертизи на відмінність, однорідність і стабільність сортів рослин групи зернових.
5. Різне.

Схвалено:

1) методики ВОС-тест для сортів роду полин (*Artemisia* L.), мирту звичайного (*Myrtus communis* L.).

2) форми показників придатності сортів до поширення в Україні для меліси лікарської, мирту звичайного, полину-естрагону, полину кримського, полину сантонінського, унабі справжнього (зізіфусу);

3) зауваження та пропозиції до інформаційного видання Частини I Методик проведення експертизи сортів рослин на відмінність, однорідність і стабільність (ВОС-тест) для ботанічних таксонів групи зернових.

ОФІЦІЙНЕ ВИДАННЯ
OFFICIAL PUBLICATION

ОХОРОНА ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН

PLANT VARIETY RIGHTS PROTECTION

Бюлетень
BULLETIN

Відповідальний за випуск: Костенко Н.П.

Номер підготували: Баликіна В.В., Божок Ю.О., Васьківська С.В., Гринів С.М.,
Губкіна Л.О., Завальнюк О.І., Загинайло М.І., Линчак Н.Б.,
Ніколенко Н.Г., Рибіцький М.І., Симоненко В.А.,
Скоблікова С.М., Сонець Т.Д., Сучкова Ж.Е., Тиха Н.В.,
Федяй М.В., Якубенко Н.Б.

Офіційні описи та показники господарської придатності підготували: Баліцька Л.М., Безручко О.І., Везель Ю.О., Гринів С.М.,
Дем'яненко Л.В., Джулай Н.П., Жаркова О.Ю.,
Загинайло М.І., Камінська Л.В., Києнко З.Б.,
Лахтіонова С.О., Лисікова В.М., Лівандовський А.А.,
Лікар С.П., Матус В.М., Носуля А.М., Свинарчук О.В.,
Таганцова М.М., Уліч Л.І., Шпак З.С., Юшкевич М.С.