

УДК 634.21

Код UPOV: PRUNU_ARM

**Методика
проведення експертизи сортів абрикоса звичайного (*Prunus armeniaca* L.)
на відмінність, однорідність і стабільність**

Загальні рекомендації

1. Предмет Методики

Методика стосується всіх сортів виду *Prunus armeniaca* L.

2. Необхідний рослинний матеріал – саджанці

1) Компетентний орган визначає скільки, якої якості, коли й куди постачається садивний матеріал для експертизи сорту.

2) Мінімальна кількість садивного матеріалу має становити 5 саджанців (однорічних щеп) або 5 живців, або 5 сплячих пагонів для щеплення. Підщепи, які будуть використовуватись, визначає компетентний орган.

3) Садивний матеріал має бути здоровим на вигляд, не ураженим хворобами, не пошкодженим шкідниками та відповідати вимогам чинних нормативних документів щодо якості і сортових характеристик.

4) Садивний матеріал нічим не обробляють.

3. Метод експертизи

1) Тривалість експертизи

Експертиза має тривати два незалежні цикли задовільного плодоношення. За необхідності експертизу продовжують на третій цикл.

2) Місце експертизи

Експертизу проводять у двох закладах експертизи (основному та додатковому).

3) *Умови проведення експертизи*

Експертизу виконують за умов, що забезпечують задовільний ріст і розвиток рослин, і достатнє виявлення характерних ознак сорту. Оптимальну стадію розвитку рослин для оцінки кожної ознаки вказано цифрами (літерами) в другій колонці Таблиці ознак і описано в поясненні до неї.

4) *План експертизи*

Планують такий розмір ділянок, щоб вилучення рослин або їхніх частин для вимірювань і підрахунків не шкодило б обстеженням, які тривають до кінця циклу вирощування. Кожне дослідження має включати щонайменше 5 дерев. Рекомендована схема розміщення рослин $6,0 \times 4,0$ м.

5) *Метод дослідження*

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту здійснюється методом візуальної оцінки та за допомогою вимірювань чи підрахунків залежно від типу виявлення (якісні – QL, кількісні – QN, псевдоякісні – PQ). Тип виявлення ознаки проставлено в першій колонці Таблиці ознак.

Рекомендований метод спостереження за ознаками вказано в другій колонці Таблиці ознак:

MG: разове вимірювання групи рослин або частин рослин (наприклад, висота);

MS: вимірювання групи попередньо визначених рослин або частин рослин, на яких впродовж вегетації здійснюють усі вимірювання кількісних ознак (наприклад, довжина);

VG: візуальна разова оцінка групи рослин;

VS: візуальна оцінка окремих, попередньо визначених рослин або частин рослин.

6) *Кількість рослин / частин рослин*

Експертизі підлягає щонайменше 5 рослин.

Усі вимірювання варто здійснювати на такій кількості рослин:

MG: разове вимірювання 5 рослин або 15 частин рослин (наприклад, висота);

MS: вимірювання окремих, попередньо визначених 5 рослин або 15 частин рослин;

VG: візуальна разова оцінка 5 рослин;

VS: візуальна оцінка окремих, попередньо визначених 5 рослин або 15 частин рослин.

4. Оцінка відмінності, однорідності та стабільності

Для оцінки виявлення відмінності й однорідності використовують ознаки, наведені в Таблиці ознак, і коди (1–9), необхідні для електронного опрацювання даних. Сукупність цих кодів складає кодову формулу сорту і використовується для формування групи подібних сортів.

1) *Експертиза на відмінність*

Сорт відповідає умові відмінності, якщо за виявленням ознак він чітко відрізняється від будь-якого іншого сорту, загальновідомого до дати, на яку заявка вважається поданою. Експертизу на відмінність проводять після отримання результатів морфологічного опису першого року. Якщо сорт-кандидат може бути вирізненим з-поміж загальновідомих сортів методом порівняння їхніх описів, то він є відмітним. Коли неможливо чітко вирізнити сорт-кандидат серед загальновідомих за морфологічною кодовою формулою, його необхідно наступного року порівняти в польовому досліді.

2) *Експертиза на однорідність*

Сорт вважається однорідним, якщо з урахуванням особливостей його розмноження рослини сорту залишаються достатньо подібними за своїми основними ознаками, визначеними під час морфологічного опису.

Для оцінки однорідності приймається популяційний стандарт 1% за рівня ймовірності 95%. У вибірці з 5 рослин нетипові не допускаються.

Нетипові рослини позначають стрічками, етикетками тощо. За відсотком нетиповості встановлюють однорідність сорту.

3) *Експертиза на стабільність*

Сорт вважається стабільним, якщо його основні ознаки, відзначені в Описі, залишаються незмінними після неодноразового розмноження чи, у разі

особливого циклу розмноження, наприкінці кожного такого циклу.

Зазвичай, коли сорт однорідний, він може вважатися стабільним.

5. Групування сортів для експертизи на відмінність

Сорти групують за найвідмітнішими морфологічними ознаками для кожного сорту. Для групування сортів використовують ознаки, які, як відомо з практики, не варіюють або дуже слабо варіюють у межах сорту. Ці ознаки можуть бути використані окремо або в комбінаціях з іншими.

Рекомендовано для групування такі ознаки:

- Плід: розмір (ознака 28);
- Плід: основне забарвлення шкірки (ознака 44);
- Плід: відносна площа основного забарвлення (ознака 45);
- Плід: забарвлення м'якоті (ознака 49);
- Час початку цвітіння (ознака 56);
- Час початку досягання плодів (ознака 57).

Для чіткої реєстрації виявлення ознаки поряд із сортами-кандидатами необхідно висаджувати сорти-еталони.

6. Умовні позначення

(*) – ознаки, позначені зірочкою, завжди залучають до Методик з експертизи на ВОС усіма країнами-членами UPOV, за винятком випадків, коли виявлення попередньої ознаки або регіональні умови докільля це унеможливають;

(+) – вказує на те, що до цієї ознаки надано пояснення або ілюстрації після Таблиці ознак.

(a), (b), (c), (d) – див. пояснення в Розділі 8.

7. Таблиця ознак сортів абрикоса звичайного

Ознаки		Ступені виявлення ознак	Коди	Сорти-еталони
1	2	3	4	5
1. (+) QN	Дерево: сила росту MG (a)	дуже слабка	1	Sub-zero
		слабка	3	Ninfa, Polonais
		середня	5	Bergeron, Canino, Peeka, Rouge du Roussillon
		сильна	7	Earle Orange, Magyar kajszai, Palsteyn, Pisana, Portici
		дуже сильна	9	Ceglédi bíbor, Monaco Bello, Moniquí, Viceroy
2. (+) QN	Дерево: габітус VG (a)	конусоподібний	1	Japan's Early
		прямий	2	Harcot, Reale d'Imola
		від прямого до розлогого	3	Ceglédi óriás, Proimo Tyrimthos, Veecot
		розлогий	4	Blenheim, Canino, Hargrand, Magyar kajszai
		пониклий	5	Palsteyn, Pisana, Polonais, Vesna
		плакучий	6	
3. (+) QN	Дерево: ступінь галуження VG (a)	слабкий	3	Earle Orange, Roxana
		помірний	5	Bergeron, Magyar kajszai, San Castrese
		сильний	7	Harlayne, Prevete, Veecot

Продовження таблиці

1	2	3	4	5
4. (*) PQ	Дерево: розподіл квіткових бруньок VG (a)	переважно на шпорках	1	Earle Orange, Nugget, Sun Glo
		порівну на шпорках і однорічних пагонах	2	Bergeron, Canino, San Castrese, Veecot
		переважно на однорічних пагонах	3	Amal, Ouardi, Roxana
5. (*) QN	Молодий пагін: антоціанове забарвлення верхівки (у період швидкого росту) MS	слабке	3	Blenheim, Hargrand, Perla, Samarkandskij rannij
		помірне	5	Polonais, San Castrese, Sun Glo
		сильне	7	Ceglédi bíbor, Harcot, Ohaicos, Roxana
6. (+) PQ	Однорічний пагін: забарвлення з-під сонячного боку VS (a)	жовто-коричневе	1	Bebeco, Grandir
		червоно- коричневе	2	Palsteyn, Polonais, Veecot
		пурпурово- коричневе	3	Blenheim, Harcot
7. QN	Однорічний пагін: розмір основи бруньки MS (a)	малий	3	Canino, Harcot, Vitillo
		середній	5	Hargrand, Magyar kajsi, Palsteyn, Portici
		великий	7	Ceglédi arany, Hamidi, Roxana
8. QN	Листкова пластинка: за	коротка	3	Early Biady, Perla, Samarkandskij rannij

Продовження таблиці

1	2	3	4	5
	довжиною MS (b)	середня	5	Canino, Portici, Rouge du Roussillon, Veecot
		довга	7	A. Vecchioni, Ceglédi arany, Moniquí, Roxana
9. QN	Листкова пластинка: за шириною MS (b)	вузька	3	Ceglédi bíbor, Monaco Bello, Rouget de Sernhac, Veecot
		середня	5	Canino, Harcot, Vitillo
		широка	7	Ceglédi piroska, Moniquí, Pisana
10. QN	Листкова пластинка: відношення довжина / ширина MS (b)	дуже мале	1	Canino, Portici
		мале	3	Cafona, Hargrand
		середнє	5	Harcot, San Castrese
		велике	7	A. Vecchioni, Ceglédi bíbor, Rouget de Sernhac
		дуже велике	9	Colorado Temprano, Noemi
11. QN	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку VS (b)	слабка	3	San Castrese, Veecot, Velasquez
		помірна	5	Canino, Ceglédi óriás, Flaming Gold, Harcot
		сильна	7	A. Vecchioni, Earle Orange, Moniquí
12. (+)	Листкова пластинка: форма	гостра	1	Ceglédi bíbor, Rouget de Sernhac, San Francesco

Продовження таблиці

1	2	3	4	5
PQ VS (b)	основи	тупа	2	Bhart, Magyar kajszi, Portici
		зрізана	3	Bergeron, Blenheim, Canino, Perla
		серцеподібна	4	Moniquí
13. (+) QN MS (b)	Листкова пластинка: кут верхівки (за винятком кінчика)	гострий	1	San Castrese
		прямий	2	Canino, Ceglédi óriás
		тупий	3	Bergeron, Polonais, Portici
		сильно тупий	4	Hargrand, Moniquí
14. QN MS (b)	Листкова пластинка: кінчик за довжиною	відсутній або дуже короткий	1	Alpha
		короткий	3	Bhart, Harmat, Moniquí
		середній	5	Magyar kajszi
		довгий	7	Ivonne Liverani, Roxana
15. (+) PQ VS (b)	Листкова пластинка: форма краю	городчаста	1	Canino, San Castrese, Verdun
		двічі городчаста	2	Bhart, Ninfa
		зазублена	3	Vitillo
		двічі зазублена	4	Hamidi, Rakovszky, Roxana, San Francesco
16. QN VS (b)	Листкова пластинка: хвилястість краю	слабка	3	Harcot, Palsteyn, Portici
		помірна	5	Blenheim, Nonno, Roxana
		сильна	7	Piet Cillié, Polonais, San Francesco

Продовження таблиці

1	2	3	4	5
17.	Листкова	прямий або слабко	1	Earle Orange, Rouget de
(+)	пластинка:	увігнутий		Sernhac, San Castrese
QN	профіль	увігнутий	2	Bergeron, Dulcinea, Moniquí
	поперечного			
	перерізу	сильно увігнутий	3	Polonais
	VS			
	(b)			
18.	Черешок:	короткий	3	Moniquí, Ninfa, Veecot
(*)	за довжиною	середній	5	Bergeron, Cafona, Canino, Hargrand
QN	MS			
	(b)	довгий	7	Reale d'Imola, Skopska Krupna
19.	Листок:	мале	3	Earle Orange, Harcot, Pisana, Rouget de Sernhac
QN	відношення довжина листкової пластинки / довжина черешка	середнє	5	Bergeron, Hâtif Colomer, Portici, Rouge du Roussillon
	MS			
	(b)	велике	7	Bebeco, Flaming Gold, Monaco Bello, Moniquí
20.	Черешок:	тонкий	3	Flaming Gold, San Castrese, Veecot
QN	за товщиною			
	MS	середній	5	Harcot, Portici
	(b)	товстий	7	Ceglédi arany, Moniquí, Reale d'Imola
21.	Черешок:	слабке	3	Cibo del Paradiso
QN	антоціанове	помірне	5	Bebeco, Bhart,

Продовження таблиці

1	2	3	4	5
	забарвлення верхнього боку MS (b)			San Castrese
		сильне	7	Canino, Ceglédi bíbor,
				Early Biady, Harogem
22. (*) QN	Черешок: переважаюча кількість нектарників MS (b)	відсутні або один	1	Mandulakajsz, Rouget de Sernhac, Sant' Ambrogio
		два-три	2	Cafona, Magyar kajsz, Veecot
		понад три	3	Canino, Moniquí, Pisana
23. QN	Черешок: розмір нектарників MS (b)	малий	3	Alpha, San Francesco, Yerevani
		середній	5	Ceglédi óriás, San Castrese, Tilton
		великий	7	Canino, Early Biady, Harmat, Pisana
24. (*) (+) QN	Квітка: діаметр MS (c)	малий	3	Borsi rózsa, Hâtif Colomer, Portici
		середній	5	Magyar kajsz, Polonais, Reale d'Imola
		великий	7	Hargrand, Harmat, San Castrese
25. QN	Квітка: положення	нижче	1	Canetta, Harmat
		на одному рівні	2	Hargrand, Portici
		вище	3	Canino, Pisana,

Продовження таблиці

1	2	3	4	5
	приймочки відносно пиляків MS (с)			Polonais
26.	Пелюстка: форма	широко-еліптична	1	Sant' Ambrogio
(+)	(за винятком	округла	2	Harcot, Luizet
Q	нігтика) VS (с)	сплюснута	3	Canino, Polonais, Vitulo
27.	Пелюстка:	біле	1	Cafona, Polonais
(+)	забарвлення	світло-рожеве	2	Magyar kajszi, San
PQ	нижнього боку VS (с)	темно-рожеве	3	Castrese Harcot
28.	Плід: розмір	дуже малий	1	Haggith, Menace, Zard
(*)	MS	малий	3	Borsi rózsza, Hâtif
QN	(d)	середній	5	Colomer, Patriarca
		великий	7	Temprano Ceglédi bíbor, Moniquí, Portici
		дуже великий	9	Ceglédi óriás, Hargrand, Palsteyn, Pisana
29.	Плід: форма	трикутна	1	Luizet
(+)	(вигляд з боку)	яйцеподібна	2	Bergeron, Pisana
PQ	VS	видовжена	3	Blenheim, Portici,

Продовження таблиці

1	2	3	4	5
	(d)			Sundrop
		еліптична	4	Précoce d'Imola, Wenatchee, Yerevani
		округла	5	Earle Orange, Ninfa, Ouardi, Polonais
		сплюснута	6	Korai zamatos, Nugget, Patriarca Temprano
		обернено- яйцеподібна	7	Harcot, Harmat, Trevatt
		косо-ромбічна	8	Canino, Vulcan
30. (+) PQ VS (d)	Плід: форма (вигляд з черевця)	трикутна	1	Luizet, Mandulakajsi, Reale d'Imola
		яйцеподібна	2	Bergeron, Canino, Fracasso
		видовжена	3	Baracca, Hargrand, Hâtif Colomer, Veecot
		еліптична	4	Bella d'Imola, Flaming Gold, Sant' Ambrogio, Yerevani
		округла	5	Rouge du Roussillon, Polonais, San Castrese, Viceroy
		сплюснута	6	Nugget
		обернено- яйцеподібна	7	Portici, Harcot, Harmat

Продовження таблиці

1	2	3	4	5
31. (+) QN	Плід: за висотою MS (d)	низький	3	Patriarca Temprano, Samarkandskij rannij, Sayeb
		середній	5	Bebeco, Bergeron, Canino, Polonais
		високий	7	Goldrich, Mandulakajsz, Vitillo
32. (+) QN	Плід: за шириною (вигляд з боку) MS (d)	вузький	3	Cerasiello, Harmat, Samarkandskij rannij
		середній	5	Bergeron, Bhart, Cafona
		широкий	7	Hargrand, Moniquí, Vitillo
33. (+) QN	Плід: за шириною (вигляд з черевця) MS (d)	вузький	3	Cerasiello, Harlayne, Hâtif Colomer
		середній	5	Bebeco, Bhart, Palummella
		широкий	7	Ceglédi arany, Goldrich, Moniquí
34. (+) QN	Плід: відношення висота / ширина (вигляд з черевця) MS (d)	мале	3	Korai zamatos, Monaco Bello, Patriarca Temprano
		середнє	5	Cafona, Canino, Magyar kajsz, Rouge du Roussillon
		велике	7	Bergeron, Hâtif Colomer, Vitillo

Продовження таблиці

1	2	3	4	5
35. (+) QN	Плід: відношення ширина (вигляд з боку) / ширина (вигляд з черевця) MS (d)	мале	3	Mandorlon, Maria Ferez, Vesna
		середнє	5	Bergeron, Luizet, Pisana, Rouge du Roussillon
		велике	7	Henderson, Borsi rózsa
36. PQ	Плід: симетрія (вигляд з черевця) VS (d)	симетричний	1	Canino, Hâtif Colomer, Magyar kajszi, Polonais, Portici
		асиметричний		Royal
		чітко асиметричний	3	Borsi rózsa, Reale d'Imola
37. (*) PQ	Плід: шов VS (d)	піднятий	1	Priboto
		злегка запалий	2	Magyar kajszi, Ninfa, Rouge du Roussillon
		запалий	3	Bergeron, Monaco Bello, Pineapple
		сильно запалий	4	Dima, Henderson, Kech-pshar, Portici
38. QN	Плід: ямка плодоніжки за глибиною MS (d)	мілка	3	Harlayne, Rouge du Roussillon, San Castrese
		середня	5	Blenheim, Magyar kajszi, Vitillo
		глибока	7	Canino, Ceglédi óriás, Hâtif Colomer, Palsteyn

Продовження таблиці

1	2	3	4	5
39. (*) (+) PQ	Плід: форма верхівки VS (d)	загострена	1	Mandulakajsz, Reale d'Imola
		заокруглена	2	Bergeron, Goldrich, Luizet, Portici
		зрізана	3	Bella d'Imola, Hargrand, Hâtif Colomer
		вдавлена	4	Early Ril, Perfection, San Castrese
40. (+) QL	Плід: шпичак VS (d)	відсутній	1	Blenheim, Canino, San Castrese
		наявний	9	Bhart, Pisana
41. QL	Плід: поверхня VS (d)	гладенька	1	Bergeron, Palsteyn, Portici, Rouge du Roussillon
		горбкувата	2	Canino, Ceglédi óriás, Nonno
42. QL	Плід: опушення VS (d)	відсутнє	1	Glattschalige Frühmarille
		наявне	9	Bergeron, Canino, Magyar kajsz
43. QN	<u>Лише сорти без опушення.</u> Плід: глянсуватість VS (d)	відсутня або слабка	1	
		помірна	2	Harcot
		сильна	3	Cluthagold, Sun Glo
44. (*) PQ	Плід: основне забарвлення шкірки	невизначне	1	A3759, A3844
		біле	2	San Nicola, Shirazskij belyj

Продовження таблиці

1	2	3	4	5
	VS (d)	жовтувате	3	Piet Cillié, Vitillo, Yerevani
		жовто-зелене	4	Grüne Spätmarille, Kaisi, Ashtarak, Sateni Karmir
		світло-оранжеве	5	Canino Hargrand, Goldcot, Portici, Rouge du Roussillon
		оранжеве	6	Hâtif Colomer, Luizet, Pisana, Veecot
		темно-оранжеве	7	Bhart, Harcot, Harogem
45. (*) QN	Плід: відносна площа основного забарвлення MS (d)	відсутня або дуже мала	1	Maria Matilde, Moniquí, Yerevani
		мала	3	Cafona, Canino, Goldrich
		середня	5	Hâtif Colomer, Magyar kajszí, Palsteyn, Portici
		велика	7	Bergeron, Bhart, Pisana
		дуже велика	9	A3759, A3844
46. PQ	Плід: відтінок основного забарвлення VS (d)	оранжево- червоний	1	
		червоний	2	
		рожевий	3	
		пурпуровий	4	
47. QN	Плід: інтенсивність основного забарвлення VS (d)	слабка	3	
		середня	5	
		сильна	7	

Продовження таблиці

1	2	3	4	5
48. PQ	Плід: характер основного забарвлення VS (d)	окремі плями	1	Rouge du Roussillon
		щільний рум'янець	2	Bergeron
		вся поверхня з маленькими плямами	3	Moniquí
49. (*) PQ	Плід: забарвлення м'якоті VS (d)	білувато-зелене	1	Amban
		біле	2	Cibo del Paradiso, Mouchbah Mourry, Spitak
		кремове	3	Barese, Malatya, Moniquí, Patriarca, Temprano
		світло-оранжеве	4	Canino, Harmat, San Castrese, Yerevani
		оранжеве	5	Harglow, Pisana, Rouge du Roussillon, Screara
		темно-оранжеве	6	Francese, Harcot, Hâtif Colomer, Palsteyn
50. QN	Плід: текстура м'якоті MS (d)	ніжна	1	Fracasso, Harlayne, Peeka
		проміжна	2	Canino, Magyar kajszi, Piet Cillié
		груба	3	Bergeron, Précocce d'Imola
51. QN	Плід: твердість м'якоті MS	дуже м'яка	1	Sant' Ambrogio, Viceroy
		м'яка	3	Alessandrino, Goldcot

Продовження таблиці

1	2	3	4	5
	(d)	середня	5	Magyar kajszi, Piet Cillié, Rouge du Roussillon, San Castrese
		тверда	7	Bella d'Imola, Bergeron, Palsteyn
		дуже тверда	9	Boccuccia Liscia, Borsi rózsza, Čačansko zlato, Harogem
52. QN	Плід: відношення вага плоду / вага кісточки MS (d)	мале	3	Borsi rózsza, Reale d'Imola
		середнє	5	Blenheim, Hâtif Colomer, Portici
		велике	7	Badami, Bergeron, San Castrese
53. (*) QN	Плід: зростання кісточка із м'якоттю MS (d)	відсутнє або дуже слабке	1	Bergeron, Hargrand, Ninfa, Peeka
		слабке	3	Canino, Nonno, Rouge du Roussillon, Sirena
		помірне	5	Tardif de Bordaneil
		сильне	7	Comandor, Precoce di Toscana
54. (*) (+) PQ	Кісточка: форма (вигляд з боку) VS (d)	овальна	1	Goldcot, Magyar kajszi, Portici
		видовжена	2	Bella d'Imola, Palsteyn, Rouge du Roussillon
		еліптична	3	Bergeron, Vitillo

Продовження таблиці

1	2	3	4	5
		округла	4	Canino, Eten Bey, Hargrand, Monaco Bello
		обернено- яйцеподібна	5	Harcot, Harmat
55. QN	Ядро: гіркота MS (d)	відсутня або слабка	1	Bergeron, Harcot, Magyar kajszi, Moniquí, Reale d'Imola
		помірна	2	Bella d'Imola, Harlayne, Palsteyn
		сильна	3	Borsi rózsza, Canino, Prevete, Viceroy
56. (*) (+) QN	Час початку цвітіння MG	дуже ранній	1	Bakour, Currots, Harmat, Ninfa
		ранній	3	Canino, Harcot, Hâtif Colomer, San Castrese
		середній	5	Magyar kajszi, Moniquí, Portici, San Francesco
		пізній	7	Bergeron, Boccuccia Liscia, Harlayne, Polonais
		дуже пізній	9	Harglow, Skromnyj, Zard

Продовження таблиці

1	2	3	4	5
57. (*) (+) MG QN	Час початку достигання плодів	дуже ранній	1	Bakour, Ninfa, Patriarca Temprano, Rutbhart, Samarkandskij rannij
		ранній	3	Bhart, Hâtif Colomer, Monaco Bello, Rouget de Sernhac, Tomcot
		середній	5	Bergeron, Harlayne, Pisana, Polonais
		пізній	7	Larquen
		дуже пізній	9	Lartago

8. Пояснення до Таблиці ознак сортів абрикоса звичайного

1) *Пояснення, що охоплюють декілька ознак*

Ознаки обстежують за таким ключем у другій колонці Таблиці ознак, як зазначено нижче:

(а) Дерево / однорічний пагін: якщо не вказано інше, усі обстеження дерева чи однорічного пагона проводять взимку, на деревах, що хоча б один раз плодоносили.

(б) Листок: якщо не вказано інше, усі обстеження листка проводять влітку на повністю розвинених листках у середній третині розвиненого пагона поточного сезону.

(с) Квітка: якщо не вказано інше, усі обстеження проводять на повністю розвиненій квітці на початку розкривання пиляків.

(д) Плід / кісточка: усі обстеження плоду і кісточки проводять на 25 плодах, зібраних по п'ять з кожного з п'яти дерев.

2) Пояснення, що стосуються окремих ознак

До 1. Дерево: сила росту


Силу росту дерева визначають як загальний приріст вегетативного росту.

До 2. Дерево: габітус




1

Конусоподібний




2

прямий




3

від прямого до розлого




4

розлогий



5

поникий



6

плакучий

До 3. Дерево: ступінь галуження

Обстеження базується на кількості гілок, ступінь галуження вказується за щільністю бічних гілок і пагонів, виключаючи плодові гілочки.

До 6. Однорічний пагін: забарвлення з-під сонячного боку


Обстеження здійснюють у середній частині однорічного пагона.

До 12. Листкова пластинка: форма основи




1

Гостра




2

тупа



3


зрізана



4


серцеподібна

До 13. Листкова пластинка: кут верхівки (за винятком кінчика)




1

Гострий




2

прямий



3

тупий



4

сильно тупий

До 15. Листкова пластинка: форма краю



1

Городчаста



2

двічі городчаста



3

зазублена



4

двічі зазублена

До 17. Листкова пластинка: профіль поперечного перерізу

Листки обстежують на шпорках або в основі квітучих пагонів.

До 24. Квітка: діаметр

Обстеження або вимірювання здійснюють на квітках з розправленими в горизонтальному положенні пелюстками.

До 26. Пелюстка: форма (за винятком нігтика)



1

Широко-еліптична



2

округла



3

сплюснута


До 27 Пелюстка: забарвлення нижнього боку

Обстеження проводять на щойно відкритих чашолиستках з нижнього боку.


До 29+30+31+32+33+34+35+40

Плід: форма (вигляд з боку) (29), форма (вигляд з черевця) (30), за висотою (31), за шириною (вигляд з боку) (32), за шириною (вигляд з черевця) (33), відношення висота / ширина (вигляд з черевця) (34), відношення ширина (вигляд з боку) / ширина (вигляд з черевця) (35), шпичак (40).


Вигляд з боку



Вигляд з черевця




До 29+30 Плід: форма (вигляд з боку) (29), форма (вигляд з черевця) (30)




1

Трикутна



2

яйцеподібна




3

видовжена



4

еліптична



5

округла




6

сплюснута



7

оберненояйцеподібна



8

косо-ромбічна

(не стосується ознаки 30)

До 39 Плід: форма вехівки

Обстежують плоди у поздовжньому розрізі (вигляд збоку).



1

Загострена



2

заокруглена



3

зрізана



4

вдавлена

До 54 Кісточка: форма (вигляд з боку)



1

Овальна



2

видовжена



3

еліптична



4

округла



5

оберненояйцеподібна

До 56 Час початку цвітіння

Обстеження проводять, коли відкрито 5–10% квіток.

До 57 Час початку достигання плодів

Обстежують, коли 5–10% плодів досягли споживчої стиглості, коли вони легко знімаються.

Синоніми до прикладів сортів-еталонів

Приклад сорту	Синоніми
Sant' Ambrogio	Ambrosia, Saint Ambroise
Bhart	NJA 32
Borsi rózsza	Kecskemeter rose, Ružova neskora, Trandafirii tirzi
Čačacansko zlato	Čačak's Gold
Earle Orange	Erle Orange, Stark Earli Orange
Goldrich	Sungiant
Magyar kajszi	Cea mai bună de Ungaria, Hungarian Best, Klosterneuburger Aprikose, Krasnoshchokij, Mađarska najbolja, Meilleur d'Hongrie, Ungarische Beste, Velkopavlovická
Pineapple	Abricot d'Ananas, Ananas-Marille, Ananasnyj
Proimo Tyrinthos	Précoce de Tyrinthe
Rutbhart	Early Blush
Sateni Karmir	Tabarza
Yerevani	Shalakh

9. Література

1. Test Guidelines for the conduct of tests for distinctness, uniformity and stability of Apricot (*Prunus armeniaca* L.) (TG /70/4 Rev., UPOV) // Geneva. 2007-03-28. – 40 P. // URL: <http://www.upov.int/edocs/tgdocs/en/tg070.pdf>