

**МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ**  
MINISTRY AGRARIAN POLICI OF UKRAINE

**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА З ОХОРОНИ ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН**  
STATE SERVICE ON RIGHT PROTECTION FOR PLANT VARIETIES

**ОХОРОНА ПРАВ НА  
СОРТИ РОСЛИН**  
PLANT VARIETY RIGHTS PROTECTION

**Офіційний бюлетень**  
OFFICIAL BULLETIN

**КУКУРУДЗА І СОРГО ЗЕРНОВЕ**  
(ОФІЦІЙНІ ОПИСИ СОРТІВ І ГІБРИДІВ)

**2**  
**2009**

частина 4

м. Київ  
Kyiv

# ОХОРОНА ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН

PLANT VARIETY RIGHTS PROTECTION

Офіційний  
бюлетень

Видається  
щоквартально

Заснований  
у січні 2003 р.

Випуск 2, частина 4,  
2009

КУКУРУДЗА І СОРГО ЗЕРНОВЕ  
(ОФІЦІЙНІ ОПИСИ СОРТІВ І ГІБРИДІВ)

ЗАСНОВНИК –  
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА З ОХОРОНИ ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН



Мінагрополітики  
України  
MINAGROPOLICY  
OF UKRAINE

Державна служба  
з охорони прав  
на сорти рослин  
STATE SERVICE ON RIGHT  
PROTECTION FOR PLANT  
VARIETIES



ЧАСТИНА 4

Головний редактор  
*Editor-in-chief*

**В. А. Хаджиматов**  
*V. Khadzhimatov*

Редакційна колегія

Editorial board

А. М. Бочкарьов  
(заступник головного редактора)  
Г. М. Каражбей  
(відповідальний секретар)

A. Bochkarov  
(deputy editor-in-chief)  
G. Karazhbei  
(executive secretary)

А. В. Андрущенко  
С. В. Гаценко  
О. В. Захарчук  
З. Б. Києнко  
М. Ф. Літошенко  
С. М. Луночкін  
С. О. Ткачик

A. Andryushchenko  
S. Gatsenko  
O. Zakharchuk  
Z. Kyuenko  
M. Litoshenko  
S. Lunochkin  
C. Tkachyk

УДК 347.77:633(055)

ББК 67.404.1

0-92

0-92 Охорона прав на сорти рослин: офіц. бюл. /  
Міністерство аграрної політики України, Державна  
служба з охорони прав на сорти рослин – К.: ТОВ  
„Алефа”, 2009. Вип.2, ч. 4. – 151 с.

Офіційний бюлетень видається на виконання Закону  
України “Про охорону прав на сорти рослин” з метою  
організації інформаційної діяльності у сфері охорони  
прав на сорти рослин та реалізації міжнародних  
зобов’язань України, що випливають з її членства в  
Міжнародному союзі з охорони нових сортів рослин  
(УПОВ).

Поширюється для селекціонерів, власників майнових  
прав інтелектуальної власності на поширення сортів,  
володільців патентів, виробників насіння і садивного  
матеріалу, селекційно-насінницьких фірм, науково-  
дослідних інститутів, вузів, коледжів. Представляє  
також інтерес для господарств різної форми власності,  
городників і садівників.

УДК 347.77:633(055)

ББК 67.404.1

**Адреса засновника та редакційної колегії:**

Державна служба з охорони прав на сорти рослин,  
вул. Генерала Родимцева, 15, м. Київ-41, 03041, Україна,  
тел.: 257-99-33, факс :257-99-63

e-mail: [sops@sops.gov.ua](mailto:sops@sops.gov.ua) [www.sops.gov.ua](http://www.sops.gov.ua)

## ЗМІСТ

Офіційні описи сортів і гібридів кукурудзи	5	Арабка МАС 20Ф	49 50
Сільськогосподарські: злаки	6	Небора	51
Кукурудза:	6	Амеліор	52
ДКС 3511	6	Натура	53
Тендра	7	Краснодарський 194 МВ	54
АДН 220 МВ	8	Краснодарський 291 АМВ	55
Галера МВ	9	Лювена	56
Кішкун СЦ 4337 (Ізабелла)	10	Пустоварівський 280 СВ	57
Кішкун 4368 (Ліза)	11	Кочубей 342 СВ	58
Кішкун СК 4345 (Раса)	12	Вимпел МВ	59
Азов	13	Донор МВ	60
Віраж 178 МВ	14	Подих МВ	61
Розівський 311 СВ	15	Пірс МВ	62
Збруч	16	Флагман	63
Санжарський 279 МВ	17	Діалог	64
Легіон 400	18	ДОК МВ	65
Ханні	19	Усмішка	66
Сеїді	20	Орільський 357 СВ	67
Слобожанський МВ	21	Вись 287 СВ	68
Витязь МВ	22	Маг	69
Барвінок МВ	23	Боржава 290 СВ	70
Ранг МС 310	24	Борозенський 277 МВ	71
Коло МС 280	25	Криничанський 257 СВ	72
Стожар 330 МВ	26	Кіцманський 215 СВ	73
Апостолівський 310 ВС	27	Стіжок 192 СВ	74
Каресс	28	КВС 381	75
Футура	29	Аматур	76
Роналдініо	30	Гельвін 387 МВ	77
Водограй	31	КВС Амбер	78
Космо 230	32	Кліфтон	79
НК Равело	33	Ера МС	80
Анжу 425	34	Гифт 310 СВ	81
ПР39Т13	35	Джекпот МС	82
ЕС Лаймо	36	Трон МС	83
ЕС Анамур	37	Зомба	84
ЕС Паролі	38	ЛГ 3330	85
ДКС 5143	39	ЛГ 3232	86
ПАН 350	40	ЕС Беніта	87
ЗУМ 0235	41	ЕСМ 602х	88
Фанжіо	42	ЕС Нінфеа	89
Оріоль	43	ЕСМ 601х	90
Армані	44	Сангрія	91
МАС 33А	45	ДК 312	92
Аксель	46	Баксос	93
МАС 24А	47	Джуксін	94
Бц 394	48	Ріксер	95

Астері КС	96	Суботівський 190 СВ	18/28
Жаззі	97	ЄС Тріо	129
ПР38Б12	98	Аттракт	130
ПР39К13	99	Бігстар	131
ПР39Б76	100	ХЛ 2017	132
ПР37И12	101	ХЛ 2093	133
ПР37Ф73	102	ХЛ 2222	134
ПР39П20	103	Мотрин 178 СВ	135
Кадет	104	Кіодас	136
Лайка	105	Бистриця 400 МВ	137
НК Тімік	106	Почаївський 190 МВ	138
НК Некта	107	Кіпарус	139
НК Альтіус	108	П9571	140
НК Галактік	109	ПР39Г93	141
НК Фалькон	110	ПР39Б93	142
НК Перформ	111	ПР38М27	143
Неріса	112	Прікслі	144
НК Леморо	113	Токсол	145
НК Пако	114	НК Хеліко	146
ДК 434	115	ЄС Інберроу	147
ДКС 3420	116		
ДКС 3759	117	<b>Офіційні описи сортів і гібридів сорго зернового</b>	
ДКС 3880	118		148
ДКС 2960	119	<b>Сільськогосподарські: круп'яні</b>	149
ДКС 2949	120	<b>Сорго зернове</b>	149
Бюрлі	121	Бургго	149
ПВ 75-01	122	ПР88У20	150
ПВ 90-04	123		
ПВ 81-01	124		
Голосіївський 260 СВ	125		
Орлик 330 МВ	126		
Переяславський 230 СВ	127		

ОФІЦІЙНІ ОПИСИ СОРТІВ І ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ

Заявка №: 03004001

Вид: Кукурудза

Zea mays L

Назва сорту ДКС 3511

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листкової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	ледь похиле	3
5	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	від середнього до пізнього	6
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	помірне	5
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	сильне	7
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на шойно з'явлених пиляках)	сильне	7
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	середньої щільності	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	5
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" ( у 50 % рослин)	від середнього до пізнього	6
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	наявне	9
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	помірна	5
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	середня від 31 до 40	5
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	коротка	3
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	середні	5
22	Лише для самозапилюваних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	середній (19-22)	5
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	середня від 15 до 18	5
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	зубовий	5
32	Качан: колір верхівки зернини	жовтий	3
33	Качан: колір низу зернини	жовто-оранжевий	4
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	сильна	7

Заявка №: 03004024

Вид: Кукурудза

Zea mays L.

Назва сорту Тендра

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідчення про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2
3	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	ледь похиле	3
5	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	ранній	3
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	відсутнє або дуже слабке	1
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на шойно з'явлених пиляках)	слабке	3
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	середньої щільності	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	великий (51-75)	7
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	ледь відхилене	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	середній	5
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	наявне	9
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	помірна	5
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	середня від 31 до 40	5
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	середня	5
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	середні	5
22	Лише для самозапильних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	середній (19-22)	5
28	Качан: діаметр (посередені) см	середній від 3.1 до 4,0	5
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	мала від 9 до 14	3
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	кременистий	1
32	Качан: колір верхівки зернини	жовто-оранжевий	4
33	Качан: колір низу зернини	жовто-оранжевий	4
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє	1
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	ознака не визначається	0



Заявка №: 03004032

Вид: Кукурудза

Zea mays L.

Назва сорту АДН 220 МВ

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію № 08205

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листкової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	ледь похиле	3
5	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	ранній	3
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	відсутнє або дуже слабке	1
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на щойно з'явлених пиляках)	відсутнє або дуже слабке	1
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	щільне	7
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	5
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	ледь відхилене	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	ранній	3
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	наявне	9
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	слабка	3
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	середня від 31 до 40	5
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	коротка	3
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	короткі	3
22	Лише для самозапилюваних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	середній (19-22)	5
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	середня від 15 до 18	5
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	зубовий	5
32	Качан: колір верхівки зернини	жовтий	3
33	Качан: колір низу зернини	жовто-оранжевий	4
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	помірна	5

Заявка №: 03004041

Вид: Кукурудза

Zea mays L.

Назва сорту Галера МВ

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію № 08307

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листкової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	похиле	5
5	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	середній	5
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	відсутнє або дуже слабке	1
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на щойно з'явлених пиляках)	відсутнє або дуже слабке	1
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	середньої щільності	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	5
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	похиле	5
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	середній	5
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	наявне	9
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	відсутня або дуже слабка	1
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	середня від 31 до 40	5
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	довга	7
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	середні	5
22	Лише для самоzapильних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	вузька від 6.1 до 8.0	3
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	короткий (15-18)	3
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	середня від 15 до 18	5
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	зубовий	5
32	Качан: колір верхівки зернини	жовтий	3
33	Качан: колір низу зернини	жовто-оранжевий	4
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	сильна	7

Заявка №: 04004029

Вид: Кукурудза

Zea mays L.

Назва сорту Кішкун СЦ 4337 (Ізабелла)

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2
3	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	ледь похиле	3
5	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	дуже пізній	9
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	слабке	3
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	помірне	5
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на щойно з'явлених пиляках)	помірне	5
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	середньої щільності	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	5
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	похиле	5
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	дуже пізній	9
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	наявне	9
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	слабка	3
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	довга від 41 до 50	7
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	середня	5
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	середні	5
22	Лише для самозапилюваних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	середній (19-22)	5
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	середня від 15 до 18	5
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	зубовий	5
32	Качан: колір верхівки зернини	жовтий	3
33	Качан: колір низу зернини	жовто-оранжевий	4
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	сильна	7

Заявка №: 04004031

Вид: Кукурудза

Zea mays L.

Назва сорту Кішкун 4368 (Ліза)

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	похиле	5
5	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	відсутнє або дуже слабке	1
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	від раннього до середнього	4
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	відсутнє або дуже слабке	1
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	слабке	3
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на шойно з'явлених пиляках)	помірне	5
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	середньої щільності	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	5
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	ледь відхилене	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	від раннього до середнього	4
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	наявне	9
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	слабка	3
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	слабке	3
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	середня від 31 до 40	5
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	довга	7
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	середні	5
22	Лише для самоzapильних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	середній (19-22)	5
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	мала від 9 до 14	3
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	зубовий	5
32	Качан: колір верхівки зернини	жовто-оранжевий	4
33	Качан: колір низу зернини	оранжевий	5
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	сильна	7

Заявка №: 04004033

Вид: Кукурудза

Zea mays L

Назва сорту Кішкун СК 4345 (Раса)

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листкової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	похиле	5
5	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	середній	5
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	відсутнє або дуже слабе	1
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	слабке	3
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на шойно з'явлених пиляках)	помірне	5
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	середньої щільності	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	5
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	ледь відхилене	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	середній	5
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	відсутнє	1
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	слабка	3
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабе	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	довга від 41 до 50	7
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	середня	5
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	середні	5
22	Лише для самозапильних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	середній (19-22)	5
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	мала від 9 до 14	3
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	зубовий	5
32	Качан: колір верхівки зернини	жовто-оранжевий	4
33	Качан: колір низу зернини	оранжевий	5
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	помірна	5

Заявка №: 04004050

Вид: Кукурудза

Zea mays L

Назва сорту Азов

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідчення про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	ледь похиле	3
5	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	середній	5
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	відсутнє або дуже слабе	1
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	помірне	5
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на щойно з'явлених пиляках)	відсутнє або дуже слабе	1
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	середньої щільності	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	5
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	ледь відхилене	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	середній	5
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	наявне	9
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	відсутня або дуже слабка	1
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабе	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	середня від 31 до 40	5
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	довга	7
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	середні	5
22	Лише для самоzapильних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	широка від 10.1 до 12.0	7
26	Качан: ніжка за довжиною, см	коротка від 5,1 до 10	3
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	середній (19-22)	5
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	середня від 15 до 18	5
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	зубоподібний	4
32	Качан: колір верхівки зернини	жовтий	3
33	Качан: колір низу зернини	жовто-оранжевий	4
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	слабка	3

Заявка №: 04004061

Вид: Кукурудза

Zea mays L.

Назва сорту Віраж 178 МВ

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	похиле	5
5	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	ранній	3
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	відсутнє або дуже слабке	1
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	слабке	3
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на щойно з'явлених пиляках)	помірне	5
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	щільне	7
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	5
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	ранній	3
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	наявне	9
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	слабка	3
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	середня від 31 до 40	5
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	коротка	3
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	короткі	3
22	Лише для самозапильних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	короткий (15-18)	3
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	мала від 9 до 14	3
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	зубовий	5
32	Качан: колір верхівки зернини	жовто-оранжевий	4
33	Качан: колір низу зернини	оранжевий	5
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	сильна	7

Заявка №: 04004068

Вид: Кукурудза

Zea mays L

Назва сорту Розівський 311 СВ

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2
3	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листкової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	ледь похиле	3
5	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	від середнього до пізнього	6
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	відсутнє або дуже слабке	1
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	помірне	5
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на щойно з'явлених пиляках)	відсутнє або дуже слабке	1
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	середньої щільності	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	5
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	середній	5
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	наявне	9
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	помірна	5
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	середня від 31 до 40	5
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	коротка	3
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	середні	5
22	Лише для самозапильних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	середній (19-22)	5
28	Качан: діаметр (посередені) см	дуже великий понад 5	9
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	середня від 15 до 18	5
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	зубовий	5
32	Качан: колір верхівки зернини	жовтий	3
33	Качан: колір низу зернини	оранжевий	5
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	помірна	5



Заявка №: 04004069

Вид: Кукурудза

Zea mays L.

Назва сорту Збруч

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2
3	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	похиле	5
5	Стебло: зигзагоподібність	сильна	3
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	середній	5
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	сильне	7
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	помірне	5
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на щойно з'явлених пиляках)	помірне	5
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	нешільне	3
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	5
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	середній	5
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	наявне	9
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	помірна	5
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	середня від 31 до 40	5
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	коротка	3
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	короткі	3
22	Лише для самозапильних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	середній (19-22)	5
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	мала від 9 до 14	3
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	зубовий	5
32	Качан: колір верхівки зернини	жовтий	3
33	Качан: колір низу зернини	оранжевий	5
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	сильна	7

Заявка №: 04004077

Вид: Кукурудза

Zea mays L

Назва сорту Санжарський 289 МВ

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	ледь похиле	3
5	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	середній	5
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	сильне	7
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	помірне	5
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на шойно з'явлених пиляках)	дуже сильне	9
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	середньої щільності	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	5
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	ледь відхилене	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	середній	5
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	наявне	9
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	слабка	3
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	слабке	3
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	коротка від 21 до 30	3
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	коротка	3
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	короткі	3
22	Лише для самозапильних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	короткий (15-18)	3
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	середня від 15 до 18	5
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	зубовий	5
32	Качан: колір верхівки зернини	жовтий	3
33	Качан: колір низу зернини	оранжевий	5
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	сильна	7

Заявка №: 04004078

Вид: Кукурудза

Zea mays L.

Назва сорту: Легіон 400

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію № 08308

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листкової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	похиле	5
5	Стебло: зигзагоподібність	сильна	3
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	від середнього до пізнього	6
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	відсутнє або дуже слабке	1
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	помірне	5
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на щойно з'явлених пиляках)	відсутнє або дуже слабке	1
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	середньої щільності	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	5
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	похиле	5
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	від середнього до пізнього	6
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	відсутнє	1
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	відсутня або дуже слабка	1
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	середня від 31 до 40	5
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	довга	7
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	середні	5
22	Лише для самозапилюваних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	короткий (15-18)	3
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	середня від 15 до 18	5
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	зубоподібний	4
32	Качан: колір верхівки зернини	жовтий	3
33	Качан: колір низу зернини	оранжевий	5
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	помірна	5

Заявка №: 04004081

Вид: Кукурудза

Zea mays L.

Назва сорту Ханні

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідомство про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	похиле	5
5	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	ранній	3
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	помірне	5
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	сильне	7
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на шойно з'явлених пиляках)	помірне	5
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	середньої щільності	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	5
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	ранній	3
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	наявне	9
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	слабка	3
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	слабке	3
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	середня від 31 до 40	5
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	коротка	3
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	середні	5
22	Лише для самозапильних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	від середньої до довгої	6
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	середнє	5
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	короткий (15-18)	3
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	від малої до середньої	4
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	кременистоподібний	2
32	Качан: колір верхівки зернини	жовто-оранжевий	4
33	Качан: колір низу зернини	оранжевий	5
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	сильна	7

Заявка №: 04004082

Вид: Кукурудза

Zea mays L

Назва сорту Сеїді

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	похиле	5
5	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	від раннього до середнього	4
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	слабке	3
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	помірне	5
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на щойно з'явлених пиляках)	помірне	5
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	середньої щільності	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	5
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	ледь відхилене	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	від раннього до середнього	4
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	наявне	9
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	помірна	5
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	середня від 31 до 40	5
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	коротка	3
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	короткі	3
22	Лише для самозапильних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	дуже довга понад 200	9
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	короткий (15-18)	3
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	мала від 9 до 14	3
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	кременистоподібний	2
32	Качан: колір верхівки зернини	жовто-оранжевий	4
33	Качан: колір низу зернини	оранжевий	5
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	сильна	7

Заявка №: 04004084

Вид: Кукурудза

Zea mays L.

Назва сорту Слобожанський МВ

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію № 08359

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2
3	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	похиле	5
5	Стебло: зигзагоподібність	сильна	3
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	від раннього до середнього	4
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	слабке	3
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	помірне	5
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на щойно з'явлених пиляках)	помірне	5
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	щільне	7
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	5
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	середній	5
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	наявне	9
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	слабка	3
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	середня від 31 до 40	5
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	коротка	3
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	короткі	3
22	Лише для самозапилюючих ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	короткий (15-18)	3
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	середня від 15 до 18	5
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	зубовий	5
32	Качан: колір верхівки зернини	жовтий	3
33	Качан: колір низу зернини	оранжевий	5
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	сильна	7

Заявка №: 04004086

Вид: Кукурудза

Zea mays L

Назва сорту Витязь МВ

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію № 08356

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листкової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	похиле	5
5	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	середній	5
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	помірне	5
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	помірне	5
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на щойно з'явлених пиляках)	слабке	3
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	середньої щільності	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	5
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	похиле	5
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	від раннього до середнього	4
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	наявне	9
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	слабка	3
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	середня від 31 до 40	5
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	довга	7
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	середні	5
22	Лише для самоzapильних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	вузька від 6.1 до 8.0	3
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	короткий (15-18)	3
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	мала від 9 до 14	3
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	зубовий	5
32	Качан: колір верхівки зернини	жовтий	3
33	Качан: колір низу зернини	жовто-оранжевий	4
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	слабка	3

Заявка №: 04004087

Вид: Кукурудза

Zea mays L.

Назва сорту Барвінок МВ

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію № 08354

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	похиле	5
5	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослини)	від пізнього до дуже пізнього	8
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	відсутнє або дуже слабке	1
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	помірне	5
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на щойно з'явлених пиляках)	відсутнє або дуже слабке	1
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	щільне	7
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	5
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	похиле	5
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослини)	середній	5
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	відсутнє	1
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	відсутня або дуже слабка	1
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	довга від 41 до 50	7
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	коротка	3
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	короткі	3
22	Лише для самоzapильних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	короткий (15-18)	3
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	мала від 9 до 14	3
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	зубовий	5
32	Качан: колір верхівки зернини	жовтий	3
33	Качан: колір низу зернини	оранжевий	5
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	сильна	7



Заявка №: 04004092

Вид: Кукурудза

Zea mays L.

Назва сорту Ранг МС 310

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листкової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	похиле	5
5	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	ранній	3
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	відсутнє або дуже слабке	1
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	помірне	5
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на шойно з'явлених пиляках)	помірне	5
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	середньої щільності	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	5
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	пізній	7
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	відсутнє	1
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	відсутня або дуже слабка	1
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	середня від 31 до 40	5
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	коротка	3
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	середні	5
22	Лише для самоzapильних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	середній (19-22)	5
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	циліндрична	3
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	середня від 15 до 18	5
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	зубовий	5
32	Качан: колір верхівки зернини	жовто-оранжевий	4
33	Качан: колір низу зернини	оранжевий	5
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	сильна	7

Заявка №: 04004093

Вид: Кукурудза

Zea mays L

Назва сорту Коло МС 280

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2
3	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	сильно похиле	7
5	Стебло: зигзагоподібність	сильна	3
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослини)	від середнього до пізнього	6
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	відсутнє або дуже слабке	1
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на шойно з'явлених пиляках)	помірне	5
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	середньої щільності	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	великий (51-75)	7
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	сильно похиле	7
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослини)	від середнього до пізнього	6
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	відсутнє	1
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	відсутня або дуже слабка	1
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	середня від 31 до 40	5
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	довга	7
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	середні	5
22	Лише для самозапильних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	середній (19-22)	5
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	середня від 15 до 18	5
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	зубовий	5
32	Качан: колір верхівки зернини	жовтий	3
33	Качан: колір низу зернини	оранжевий	5
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє	1
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	ознака не визначається	0

Заявка №: 04004094

Вид: Кукурудза

Zea mays L.

Назва сорту Стожар 330 MB

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідство про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листкової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	похиле	5
5	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	від середнього до пізнього	6
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	відсутнє або дуже слабке	1
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	слабке	3
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на шойно з"явлених пиляках)	слабке	3
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	щільне	7
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	5
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	середній	5
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	наявне	9
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	слабка	3
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	середня від 31 до 40	5
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	коротка	3
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	короткі	3
22	Лише для самозапильних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	широка від 10.1 до 12.0	7
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	середній (19-22)	5
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	середня від 15 до 18	5
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	зубовий	5
32	Качан: колір верхівки зернини	жовтий	3
33	Качан: колір низу зернини	оранжевий	5
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	сильна	7

Заявка №: 04004095

Вид: Кукурудза

Zea mays L.

Назва сорту Апостолівський 310 ВС

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідчення про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листкової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	похиле	5
5	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	середній	5
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	помірне	5
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	помірне	5
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на шойно з'явлених пиляках)	слабке	3
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	щільне	7
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	5
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	середній	5
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	відсутнє	1
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	відсутня або дуже слабка	1
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	середня від 31 до 40	5
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	коротка	3
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	короткі	3
22	Лише для самозапильних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	короткий (15-18)	3
28	Качан: діаметр (посередені) см	дуже великий понад 5	9
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	середня від 15 до 18	5
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	зубовий	5
32	Качан: колір верхівки зернини	жовтий	3
33	Качан: колір низу зернини	жовто-оранжевий	4
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	сильна	7

Заявка №: 04004099

Вид: Кукурудза

Zea mays L

Назва сорту Каресс

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2
3	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	ледь похиле	3
5	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослини)	від раннього до середнього	4
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	помірне	5
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	сильне	7
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на щойно з'явлених пиляках)	сильне	7
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	нешільне	3
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	5
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослини)	від дуже раннього до раннього	2
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	наявне	9
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	сильна	7
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	середня від 31 до 40	5
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	коротка	3
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	короткі	3
22	Лише для самозапильних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	короткий (15-18)	3
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	мала від 9 до 14	3
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	кременистоподібний	2
32	Качан: колір верхівки зернини	оранжевий	5
33	Качан: колір низу зернини	оранжевий	5
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє	1
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	ознака не визначається	0

Заявка №: 04004100

Вид: Кукурудза

Zea mays L

Назва сорту Футура

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідчення про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листкової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	похиле	5
5	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	від середнього до пізнього	6
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	відсутнє або дуже слабке	1
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	слабке	3
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на шойно з'явлених пиляках)	слабке	3
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	нещільне	3
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	5
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	від середнього до пізнього	6
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	відсутнє	1
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	відсутня або дуже слабка	1
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	середня від 31 до 40	5
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	коротка	3
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	короткі	3
22	Лише для самозаймальних ліній. Рослина: за довжиною (разом із вологтю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	короткий (15-18)	3
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	середня від 15 до 18	5
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	зубовий	5
32	Качан: колір верхівки зернини	жовто-оранжевий	4
33	Качан: колір низу зернини	оранжевий	5
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	помірна	5

Заявка №: 04004103

Вид: Кукурудза

Zea mays L

Назва сорту Роналдініо

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2
3	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	ледь похиле	3
5	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	ранній	3
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	помірне	5
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	помірне	5
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на шойно з'явлених пиляках)	помірне	5
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	середньої щільності	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	малий (5-25)	3
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	ранній	3
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	наявне	9
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	слабка	3
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	середня від 31 до 40	5
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	коротка	3
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	середні	5
22	Лише для самозапильних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	велике	7
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	короткий (15-18)	3
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	мала від 9 до 14	3
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	кременистоподібний	2
32	Качан: колір верхівки зернини	жовто-оранжевий	4
33	Качан: колір низу зернини	оранжевий	5
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє	1
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	ознака не визначається	0

Заявка №: 04004104

Вид: Кукурудза

Zea mays L

Назва сорту Водограй

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію № 08337

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2
3	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	похиле	5
5	Стебло: зигзагоподібність	сильна	3
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	від раннього до середнього	4
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	відсутнє або дуже слабке	1
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на шойно з'явлених пиляках)	помірне	5
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	середньої щільності	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	5
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	середній	5
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	наявне	9
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	помірна	5
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	середня від 31 до 40	5
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	коротка	3
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	середні	5
22	Лише для самоzapильних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	середній (19-22)	5
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	середня від 15 до 18	5
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	зубовий	5
32	Качан: колір верхівки зернини	жовтий	3
33	Качан: колір низу зернини	оранжевий	5
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	сильна	7



Заявка №: 04004107

Вид: Кукурудза

Zea mays L.

Назва сорту Космо 230

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідчення про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листкової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	похиле	5
5	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	ранній	3
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	відсутнє або дуже слабке	1
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	помірне	5
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на щойно з'явлених пиляках)	сильне	7
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	середньої щільності	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	5
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	від раннього до середнього	4
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	наявне	9
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	слабка	3
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	середня від 31 до 40	5
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	коротка	3
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	середні	5
22	Лише для самозапилюючих ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	короткий (15-18)	3
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	мала від 9 до 14	3
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	проміжний	3
32	Качан: колір верхівки зернини	оранжевий	5
33	Качан: колір низу зернини	оранжевий	5
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	помірна	5

Заявка №: 04004110

Вид: Кукурудза

Zea mays L

Назва сорту НК Равело

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідчення про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2
3	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	похиле	5
5	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	ранній	3
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	відсутнє або дуже слабе	1
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	слабке	3
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на щойно з'явлених пиляках)	відсутнє або дуже слабе	1
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	щільне	7
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	5
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	похиле	5
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	ранній	3
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	наявне	9
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	слабка	3
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабе	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	середня від 31 до 40	5
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	коротка	3
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	короткі	3
22	Лише для самозапильних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	вужька від 6.1 до 8.0	3
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	короткий (15-18)	3
28	Качан: діаметр (посередені) см	середній від 3,1 до 4,0	5
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	мала від 9 до 14	3
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	кременистоподібний	2
32	Качан: колір верхівки зернини	оранжевий	5
33	Качан: колір низу зернини	оранжевий	5
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	сильна	7

Заявка №: 04004111

Вид: Кукурудза

Zea mays L.

Назва сорту Анжу 425

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	похиле	5
5	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	від середнього до пізнього	6
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	відсутнє або дуже слабке	1
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	слабке	3
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на шойно з'явлених пиляках)	помірне	5
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	середньої щільності	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	5
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	від середнього до пізнього	6
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	наявне	9
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	слабка	3
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	довга від 41 до 50	7
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	середня	5
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	середні	5
22	Лише для самозапилюваних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	дуже довга понад 200	9
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	середній (19-22)	5
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	середня від 15 до 18	5
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	зубоподібний	4
32	Качан: колір верхівки зернини	жовтий	3
33	Качан: колір низу зернини	оранжевий	5
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	помірне	5

Заявка №: 05004002

Вид: Кукурудза

Zea mays L.

Назва сорту ПР39Т13

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	ледь похиле	3
5	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	пізній	7
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	відсутнє або дуже слабке	1
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	слабке	3
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на шойно з'явлених пиляках)	сильне	7
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	нешільне	3
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	малий (5-25)	3
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	відсутня або дуже мала до 5	1
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	середній	5
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	наявне	9
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	слабка	3
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	середня від 31 до 40	5
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	коротка	3
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	короткі	3
22	Лише для самозапильних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	короткий (15-18)	3
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	мала від 9 до 14	3
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	проміжний	3
32	Качан: колір верхівки зернини	жовто-оранжевий	4
33	Качан: колір низу зернини	оранжевий	5
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє	1
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	ознака не визначається	0

Заявка №: 05004003

Вид: Кукурудза

Zea mays L

Назва сорту ЕС Лаймс

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листкової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	ледь похиле	3
5	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	від раннього до середнього	4
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	помірне	5
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	помірне	5
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на шойно з'явлених пиляках)	сильне	7
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	щільне	7
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	5
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" ( у 50 % рослин)	від дуже раннього до раннього	2
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	наявне	9
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	сильна	7
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	середня від 31 до 40	5
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	коротка	3
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	середні	5
22	Лише для самозапильних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	короткий (15-18)	3
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	мала від 9 до 14	3
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	зубоподібний	4
32	Качан: колір верхівки зернини	жовто-оранжевий	4
33	Качан: колір низу зернини	жовто-оранжевий	4
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє	1
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	ознака не визначається	0

Заявка №: 05004004

Вид: Кукурудза

Zea mays L.

Назва сорту ЕС Анамур

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідчення про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2
3	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	малий (6-25)	3
4	Листок: положення листової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	ледь похиле	3
5	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	від раннього до середнього	4
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	відсутнє або дуже слабке	1
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	слабке	3
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на шойно з'явлених пиляках)	сильне	7
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	щільне	7
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	5
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	від раннього до середнього	4
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	наявне	9
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	дуже сильна	9
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	середня від 31 до 40	5
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	коротка	3
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	середні	5
22	Лише для самозапильних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	середній (19-22)	5
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	мала від 9 до 14	3
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	зубоподібний	4
32	Качан: колір верхівки зернини	жовтий	3
33	Качан: колір низу зернини	жовто-оранжевий	4
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє	1
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	ознака не визначається	0

Заявка №: 05004005

Вид: Кукурудза

Zea mays L.

Назва сорту ЕС Паролі

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	ледь похиле	3
5	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	ранній	3
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	відсутнє або дуже слабке	1
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на щойно з'явлених пиляках)	відсутнє або дуже слабке	1
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	середньої щільності	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	5
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	відсутня або дуже мала до 5	1
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	ранній	3
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	відсутнє	1
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	відсутня або дуже слабка	1
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	середня від 31 до 40	5
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	коротка	3
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	короткі	3
22	Лише для самоzapильних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	короткий (15-18)	3
28	Качан: діаметр (посередені) см	дуже великий понад 5	9
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	мала від 9 до 14	3
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	проміжний	3
32	Качан: колір верхівки зернини	жовто-оранжевий	4
33	Качан: колір низу зернини	оранжевий	5
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє	1
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	ознака не визначається	0

Заявка №: 05004006

Вид: Кукурудза

Zea mays L

Назва сорту ДКС 5143

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідчення про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	ледь похиле	3
5	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	від середнього до пізнього	6
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	відсутнє або дуже слабке	1
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	слабке	3
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на шойно з'явлених пиляках)	сильне	7
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	середньої щільності	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	5
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	від середнього до пізнього	6
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	відсутнє	1
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	відсутня або дуже слабка	1
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	середня від 31 до 40	5
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	коротка	3
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	короткі	3
22	Лише для самозапилюваних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	середній (19-22)	5
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	середня від 15 до 18	5
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	зубовий	5
32	Качан: колір верхівки зернини	жовтий	3
33	Качан: колір низу зернини	жовто-оранжевий	4
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	слабка	3



Заявка №: 05004008

Вид: Кукурудза

Zea mays L

Назва сорту ПАН 350

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2009

Свідоцтво про державну реєстрацію № 09130

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листкової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	сильно похиле	7
5	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	середній	5
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	слабке	3
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	слабке	3
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на шойно з'явлених пиляках)	слабке	3
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	середньої щільності	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	5
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	ледь відхилене	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	середній	5
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	наявне	9
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	слабка	3
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	середня від 31 до 40	5
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	довга	7
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	середні	5
22	Лише для самозапильних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	середній (19-22)	5
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	циліндрична	3
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	середня від 15 до 18	5
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	зубоподібний	4
32	Качан: колір верхівки зернини	жовтий	3
33	Качан: колір низу зернини	оранжевий	5
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	помірна	5

Заявка №: 05004011

Вид: Кукурудза

Zea mays L.

Назва сорту ЗУМ 0235

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2009

Свідоцтво про державну реєстрацію № 09127

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	похиле	5
5	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	середній	5
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	відсутнє або дуже слабке	1
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на щойно з'явлених пиляках)	відсутнє або дуже слабке	1
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	середньої щільності	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	5
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	ледь відхилене	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" ( у 50 % рослин)	середній	5
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	наявне	9
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	слабка	3
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	слабке	3
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	довга від 41 до 50	7
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	довга	7
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	середні	5
22	Лише для самозапильних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	вужька від 6.1 до 8.0	3
26	Качан: ніжка за довжиною, см	довга від 20.1 до 40	7
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	середній (19-22)	5
28	Качан: діаметр (посередені) см	середній від 3.1 до 4.0	5
29	Качан: форма	циліндрична	3
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	середня від 15 до 18	5
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	зубовий	5
32	Качан: колір верхівки зернини	жовтий	3
33	Качан: колір низу зернини	оранжевий	5
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	помірна	5

Заявка №: 05004016

Вид: Кукурудза

Zea mays L.

Назва сорту Фанжіо

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію № 08087

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	малий (6-25)	3
4	Листок: положення листової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	ледь похиле	3
5	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	від середнього до пізнього	6
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	відсутнє або дуже слабке	1
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	слабке	3
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на шойно з'явлених пиляках)	помірне	5
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	середньої щільності	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	5
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	ледь відхилене	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	середній	5
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	наявне	9
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	слабка	3
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	довга від 41 до 50	7
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	середня	5
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	середні	5
22	Лише для самозапильних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	довга від 20.1 до 40	7
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	середній (19-22)	5
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	мала від 9 до 14	3
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	зубовий	5
32	Качан: колір верхівки зернини	жовтий	3
33	Качан: колір низу зернини	оранжевий	5
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	сильна	7

Заявка №: 05004017

Вид: Кукурудза

Zea mays L.

Назва сорту Оріоль

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію № 08088

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листкової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	ледь похиле	3
5	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	відсутнє або дуже слабке	1
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	ранній	3
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	слабке	3
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	слабке	3
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на щойно з'явлених пиляках)	слабке	3
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	середньої щільності	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	5
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	похиле	5
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	ранній	3
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	наявне	9
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	слабка	3
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	середня від 31 до 40	5
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	довга	7
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	короткі	3
22	Лише для самозапильних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	коротка від 5,1 до 10	3
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	короткий (15-18)	3
28	Качан: діаметр (посередені) см	середній від 3,1 до 4,0	5
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	мала від 9 до 14	3
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	проміжний	3
32	Качан: колір верхівки зернини	жовто-оранжевий	4
33	Качан: колір низу зернини	оранжевий	5
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	слабка	3

Заявка №: 05004018

Вид: Кукурудза

Zea mays L

Назва сорту Армані

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію № 08089

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3
2	Перший листок: форма верхівки	від округленої до лопатоподібної	4
3	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	ледь похиле	3
5	Стебло: зигзагоподібність	сильна	3
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	середній	5
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	відсутнє або дуже слабке	1
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на щойно з'явлених пиляках)	відсутнє або дуже слабке	1
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	середньої щільності	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	малий (5-25)	3
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	ледь відхилене	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" ( у 50 % рослин)	середній	5
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	наявне	9
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	відсутня або дуже слабка	1
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	середня від 31 до 40	5
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	довга	7
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	середні	5
22	Лише для самозапильних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	мале	3
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	середній (19-22)	5
28	Качан: діаметр (посередені) см	середній від 3,1 до 4.0	5
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	мала від 9 до 14	3
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	зубоподібний	4
32	Качан: колір верхівки зернини	жовто-оранжевий	4
33	Качан: колір низу зернини	оранжевий	5
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	слабка	3

Заявка №: 05004019

Вид: Кукурудза

Zea mays L

Назва сорту МАС 33А

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію № 08090

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	похиле	5
5	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	середній	5
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	відсутнє або дуже слабке	1
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	слабке	3
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на шойно з'явлених пиляках)	відсутнє або дуже слабке	1
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	середньої щільності	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	5
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	середній	5
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	відсутнє	1
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	відсутня або дуже слабка	1
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	середня від 31 до 40	5
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	коротка	3
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	короткі	3
22	Лише для самозапильних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	дуже довга понад 200	9
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	середній (19-22)	5
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	мала від 9 до 14	3
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	зубовий	5
32	Качан: колір верхівки зернини	жовтий	3
33	Качан: колір низу зернини	оранжевий	5
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	слабка	3

Заявка №: 05004020

Вид: Кукурудза

Zea mays L

Назва сорту Аксель

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію № 08086

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	малий (6-25)	3
4	Листок: положення листової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	пряме	1
5	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	ранній	3
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	відсутнє або дуже слабе	1
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	помірне	5
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на щойно з'явлених пиляках)	сильне	7
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	середньої щільності	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	5
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	ранній	3
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	наявне	9
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	сильна	7
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабе	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	середня від 31 до 40	5
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	коротка	3
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	середні	5
22	Лише для самозапилюючих ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	коротка від 5,1 до 10	3
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	короткий (15-18)	3
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	мала від 9 до 14	3
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	кременистоподібний	2
32	Качан: колір верхівки зернини	оранжевий	5
33	Качан: колір низу зернини	оранжевий	5
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	дуже сильна	9

Заявка №: 05004021

Вид: Кукурудза

Zea mays L.

Назва сорту МАС 24А

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію № 08091

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	від округленої до лопатоподібної	4
3	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	пряме	1
5	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	ранній	3
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	відсутнє або дуже слабке	1
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	слабке	3
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на щойно з'явлених пиляках)	слабке	3
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	середньої щільності	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	5
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	ледь відхилене	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	ранній	3
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	наявне	9
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	сильна	7
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	середня від 31 до 40	5
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	середня	5
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	середні	5
22	Лише для самозапильних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	середній (19-22)	5
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	мала від 9 до 14	3
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	кременистоподібний	2
32	Качан: колір верхівки зернини	оранжевий	5
33	Качан: колір низу зернини	оранжевий	5
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	дуже сильна	9



Заявка №: 05004026

Вид: Кукурудза

Zea mays L.

Назва сорту Бц 394

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідчення про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	похиле	5
5	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	пізній	7
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	помірне	5
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	слабке	3
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на шойно з'явлених пиляках)	слабке	3
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	щільне	7
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	5
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	ледь відхилене	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	пізній	7
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	відсутнє	1
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	відсутня або дуже слабка	1
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	середня від 31 до 40	5
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки, волоті)	коротка	3
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	середні	5
22	Лише для самоzapильних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	середній (19-22)	5
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	мала від 9 до 14	3
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	зубовий	5
32	Качан: колір верхівки зернини	жовтий	3
33	Качан: колір низу зернини	жовто-оранжевий	4
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	сильна	7

Заявка №: 05004027

Вид: Кукурудза

Zea mays L

Назва сорту Арабіка

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію № 08083

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	малий (6-25)	3
4	Листок: положення листової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	ледь похиле	3
5	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	від дуже раннього до раннього	2
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	відсутнє або дуже слабке	1
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	слабке	3
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на щойно з'явлених пиляках)	сильне	7
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	щільне	7
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	малий (5-25)	3
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	ледь відхилене	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	ранній	3
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	наявне	9
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	помірна	5
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	середня від 31 до 40	5
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	коротка	3
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	середні	5
22	Лише для самозапильних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	середній (19-22)	5
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	середня від 15 до 18	5
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	кременистоподібний	2
32	Качан: колір верхівки зернини	оранжевий	5
33	Качан: колір низу зернини	оранжевий	5
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	помірна	5

Заявка №: 05004028

Вид: Кукурудза

Zea mays L

Назва сорту МАС 20Ф

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідчення про державну реєстрацію № 08092

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	дуже сильне	9
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листкової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	пряме	1
5	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	ранній	3
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	сильне	7
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на щойно з'явлених пиляках)	слабке	3
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	середньої щільності	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	5
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	ледь відхилене	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	ранній	3
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	наявне	9
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	відсутня або дуже слабка	1
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	середня від 31 до 40	5
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	коротка	3
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	середні	5
22	Лише для самозапильних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	середній (19-22)	5
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	середня від 15 до 18	5
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	проміжний	3
32	Качан: колір верхівки зернини	жовтий	3
33	Качан: колір низу зернини	оранжевий	5
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	сильна	7

Заявка №: 05004029

Вид: Кукурудза

Zea mays L

Назва сорту Небора

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідчення про державну реєстрацію № 08084

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	малий (6-25)	3
4	Листок: положення листової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	ледь похиле	3
5	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	від дуже раннього до раннього	2
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	слабке	3
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	слабке	3
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на щойно з'явлених пиляках)	сильне	7
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	середньої щільності	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	5
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	ледь відхилене	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	ранній	3
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	наявне	9
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	помірна	5
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	середня від 31 до 40	5
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	коротка	3
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	середні	5
22	Лише для самозапилюючих ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	вузька від 6.1 до 8.0	3
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	середній (19-22)	5
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	середня від 15 до 18	5
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	кременистоподібний	2
32	Качан: колір верхівки зернини	жовто-оранжевий	4
33	Качан: колір низу зернини	оранжевий	5
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	сильна	7

Заявка №: 05004030

Вид: Кукурудза

Zea mays L.

Назва сорту Амеліор

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідцтво про державну реєстрацію № 08093

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листкової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	похиле	5
5	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	від дуже раннього до раннього	2
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	слабке	3
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	слабке	3
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на щойно з'явлених пиляках)	помірне	5
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	середньої щільності	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	5
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	похиле	5
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	ранній	3
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	наявне	9
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	помірна	5
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	середня від 31 до 40	5
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	коротка	3
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	короткі	3
22	Лише для самоzapильних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	вузька від 6.1 до 8.0	3
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	середній (19-22)	5
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	мала від 9 до 14	3
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	кременистоподібний	2
32	Качан: колір верхівки зернини	оранжевий	5
33	Качан: колір низу зернини	оранжевий	5
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	сильна	7

Заявка №: 05004031

Вид: Кукурудза

Zea mays L

Назва сорту Натура

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію № 08085

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	ледь похиле	3
5	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	від помірного до сильного	6
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	від середнього до пізнього	6
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	відсутнє або дуже слабке	1
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	слабке	3
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на шойно з'явлених пиляках)	відсутнє або дуже слабке	1
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	середньої щільності	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	5
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	ледь відхилене	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	від середнього до пізнього	6
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	наявне	9
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	слабка	3
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	середня від 31 до 40	5
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	коротка	3
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	короткі	3
22	Лише для самозапильних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	короткий (15-18)	3
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	мала від 9 до 14	3
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	зубовий	5
32	Качан: колір верхівки зернини	жовтий	3
33	Качан: колір низу зернини	оранжевий	5
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	помірна	5

Заявка №: 05004033

Вид: Кукурудза

Zea mays L.

Назва сорту Краснодарський 194 МВ

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	похиле	5
5	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	від раннього до середнього	4
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	слабке	3
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	помірне	5
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на шойно з'явлених пиляках)	помірне	5
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	щільне	7
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	5
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	від раннього до середнього	4
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	наявне	9
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	слабка	3
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	середня від 31 до 40	5
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	коротка	3
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	короткі	3
22	Лише для самоzapильних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	короткий (15-18)	3
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	мала від 9 до 14	3
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	зубовий	5
32	Качан: колір верхівки зернини	жовто-оранжевий	4
33	Качан: колір низу зернини	оранжевий	5
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	сильна	7

Заявка №: 05004034

Вид: Кукурудза

Zea mays L.

Назва сорту Краснодарський 291 АМВ

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	похиле	5
5	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	середній	5
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	відсутнє або дуже слабке	1
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	помірне	5
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на шойно з'явлених пиляках)	сильне	7
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	середньої щільності	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	5
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	середній	5
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	наявне	9
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	помірна	5
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	середня від 31 до 40	5
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	коротка	3
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	середні	5
22	Лише для самозапильних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	середній (19-22)	5
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	мала від 9 до 14	3
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	зубовий	5
32	Качан: колір верхівки зернини	жовто-оранжевий	4
33	Качан: колір низу зернини	оранжевий	5
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	слабка	3



Заявка №: 05004035

Вид: Кукурудза

Zea mays L.

Назва сорту Лювена

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідчення про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листкової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	ледь похиле	3
5	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	від раннього до середнього	4
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	відсутнє або дуже слабке	1
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на шойно з'явлених пиляках)	відсутнє або дуже слабке	1
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	середньої щільності	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	5
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	похиле	5
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	середній	5
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	наявне	9
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	сильна	7
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	середня від 31 до 40	5
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	коротка	3
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	середні	5
22	Лише для самоzapильних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	широка від 10.1 до 12.0	7
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	короткий (15-18)	3
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	мала від 9 до 14	3
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	зубовий	5
32	Качан: колір верхівки зернини	жовтий	3
33	Качан: колір низу зернини	жовтий	3
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє	1
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	ознака не визначається	0

Заявка №: 05004037

Вид: Кукурудза

Zea mays L

Назва сорту Пустоварівський 280 СВ

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію № 08042

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	від округлої до лопатоподібної	4
3	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	ледь похиле	3
5	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	середній	5
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	відсутнє або дуже слабке	1
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	помірне	5
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на шойно з"явлених пиляках)	відсутнє або дуже слабке	1
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	щільне	7
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	5
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	ледь відхилене	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	ранній	3
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	відсутнє	1
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	відсутня або дуже слабка	1
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	середня від 31 до 40	5
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	коротка	3
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	короткі	3
22	Лише для самозапильних ліній. Рослина: за довжиною (разом із вологтю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	середній (19-22)	5
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	середня від 15 до 18	5
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	зубовий	5
32	Качан: колір верхівки зернини	жовтий	3
33	Качан: колір низу зернини	оранжевий	5
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	сильна	7

Заявка №: 05004038

Вид: Кукурудза

Zea mays L

Назва сорту Кочубей 342 СВ

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію № 08206

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	ледь похиле	3
5	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	пізній	7
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	слабке	3
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	сильне	7
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на шойно з'явлених пиляках)	слабке	3
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	середньої щільності	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	5
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	ледь відхилене	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" ( у 50 % рослин)	від середнього до пізнього	6
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	наявне	9
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	слабка	3
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	довга від 41 до 50	7
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	коротка	3
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	середні	5
22	Лише для самозапилюваних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	середній (19-22)	5
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	циліндрична	3
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	середня від 15 до 18	5
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	зубовий	5
32	Качан: колір верхівки зернини	жовтий	3
33	Качан: колір низу зернини	оранжевий	5
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	слабка	3

Заявка №: 05004044

Вид: Кукурудза

Zea mays L

Назва сорту Вимпел МВ

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію № 08355

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листкової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	ледь похиле	3
5	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	середній	5
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	відсутнє або дуже слабке	1
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	слабке	3
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на щойно з'явлених пиляках)	помірне	5
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	щільне	7
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	малий (5-25)	3
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	похиле	5
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	середній	5
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	наявне	9
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	слабка	3
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	середня від 31 до 40	5
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	коротка	3
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	короткі	3
22	Лише для самозапильних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	середній (19-22)	5
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	мала від 9 до 14	3
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	зубовий	5
32	Качан: колір верхівки зернини	жовтий	3
33	Качан: колір низу зернини	оранжевий	5
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	сильна	7

Заявка №: 05004045

Вид: Кукурудза

Zea mays L

Назва сорту Донор МВ

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію № 08357

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листкової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	ледь похиле	3
5	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	середній	5
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	сильне	7
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	сильне	7
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на шойно з'явлених пиляках)	слабке	3
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	щільне	7
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	5
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	похиле	5
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	середній	5
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	наявне	9
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	слабка	3
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	довга від 41 до 50	7
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	коротка	3
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	короткі	3
22	Лише для самозапильних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	середній (19-22)	5
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	середня від 15 до 18	5
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	зубовий	5
32	Качан: колір верхівки зернини	жовтий	3
33	Качан: колір низу зернини	жовто-оранжевий	4
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	помірна	5

Заявка №: 05004047

Вид: Кукурудза

Zea mays L

Назва сорту Подих МВ

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідчення про державну реєстрацію № 08358

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2
3	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листкової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	ледь похиле	3
5	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	середній	5
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	відсутнє або дуже слабке	1
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	слабке	3
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на щойно з'явлених пиляках)	відсутнє або дуже слабке	1
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	щільне	7
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	5
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	середній	5
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	відсутнє	1
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	відсутня або дуже слабка	1
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	середня від 31 до 40	5
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	коротка	3
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	короткі	3
22	Лише для самозапильних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	середній (19-22)	5
28	Качан: діаметр (посередні) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	мала від 9 до 14	3
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	зубоподібний	4
32	Качан: колір верхівки зернини	жовто-оранжевий	4
33	Качан: колір низу зернини	оранжевий	5
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	сильна	7

Заявка №: 05004050

Вид: Кукурудза

Zea mays L

Назва сорту Пірс МВ

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію № 08301

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	ледь похиле	3
5	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	від дуже раннього до раннього	2
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	відсутнє або дуже слабке	1
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на щойно з'явлених пиляках)	відсутнє або дуже слабке	1
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	щільне	7
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	5
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	ледь відхилене	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	ранній	3
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	відсутнє	1
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	відсутня або дуже слабка	1
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	середня від 31 до 40	5
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	коротка	3
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	короткі	3
22	Лише для самозапильних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	короткий (15-18)	3
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	мала від 9 до 14	3
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	зубоподібний	4
32	Качан: колір верхівки зернини	жовто-оранжевий	4
33	Качан: колір низу зернини	жовто-оранжевий	4
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	сильна	7

Заявка №: 05004051

Вид: Кукурудза

Zea mays L

Назва сорту Флагман

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію № 08306

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2
3	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	ледь похиле	3
5	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	пізній	7
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	слабке	3
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	слабке	3
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на шойно з"явлених пиляках)	слабке	3
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	щільне	7
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	малий (5-25)	3
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	пізній	7
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	відсутнє	1
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	відсутня або дуже слабка	1
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	середня від 31 до 40	5
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	коротка	3
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	короткі	3
22	Лише для самозапильних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	короткий (15-18)	3
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	середня від 15 до 18	5
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	зубоподібний	4
32	Качан: колір верхівки зернини	оранжевий	5
33	Качан: колір низу зернини	оранжевий	5
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє	1
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	ознака не визначається	0



Заявка №: 05004053

Вид: Кукурудза

Zea mays L

Назва сорту Діалог

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію № 08305

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2
3	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	ледь похиле	3
5	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	від середнього до пізнього	6
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	слабке	3
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	слабке	3
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на щойно з'явлених пиляках)	слабке	3
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	щільне	7
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	5
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	ледь відхилене	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" ( у 50 % рослин)	від середнього до пізнього	6
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	наявне	9
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	помірна	5
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	середня від 31 до 40	5
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	коротка	3
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	середні	5
22	Лише для самоzapильних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	короткий (15-18)	3
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	середня від 15 до 18	5
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	зубовий	5
32	Качан: колір верхівки зернини	жовтий	3
33	Качан: колір низу зернини	жовто-оранжевий	4
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	сильна	7

Заявка №: 05004054

Вид: Кукурудза

Zea mays L.

Назва сорту ДОК МВ

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію № 08302

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2
3	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	ледь похиле	3
5	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	середній	5
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	помірне	5
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	слабке	3
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на щойно з'явлених пиляках)	відсутнє або дуже слабке	1
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	щільне	7
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	5
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	середній	5
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	наявне	9
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	помірна	5
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	середня від 31 до 40	5
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	коротка	3
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	середні	5
22	Лише для самозапилюваних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	середній (19-22)	5
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рялів, шт.	середня від 15 до 18	5
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	зубовий	5
32	Качан: колір верхівки зернини	жовтий	3
33	Качан: колір низу зернини	жовто-оранжевий	4
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	сильна	7

Заявка №: 05004055

Вид: Кукурудза

Zea mays L.

Назва сорту Усмішка

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію № 08304

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	ледь похиле	3
5	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	пізній	7
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	слабке	3
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	слабке	3
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на щойно з'явлених пиляках)	помірне	5
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	щільне	7
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	5
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	ледь відхилене	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	середній	5
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	наявне	9
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	слабка	3
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	середня від 31 до 40	5
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	середня	5
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	середні	5
22	Лише для самозапильних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	короткий (15-18)	3
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	середня від 15 до 18	5
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	зубовий	5
32	Качан: колір верхівки зернини	жовтий	3
33	Качан: колір низу зернини	жовто-оранжевий	4
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	сильна	7

Заявка №: 05004056

Вид: Кукурудза

Zea mays L

Назва сорту Орільський 357 СВ

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідство про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2
3	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	ледь похиле	3
5	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	середній	5
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	слабке	3
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	помірне	5
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на шойно з'явлених пиляках)	слабке	3
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	щільне	7
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	5
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	ледь відхилене	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	від середнього до пізнього	6
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	наявне	9
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	слабка	3
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	довга від 41 до 50	7
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	середня	5
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	середні	5
22	Лише для самоzapильних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	короткий (15-18)	3
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	мала від 9 до 14	3
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	зубовий	5
32	Качан: колір верхівки зернини	жовтий	3
33	Качан: колір низу зернини	оранжевий	5
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	сильна	7

Заявка №: 05004057

Вид: Кукурудза

Zea mays L

Назва сорту Вись 287 СВ

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	від округлої до лопатоподібної	4
3	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листкової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	ледь похиле	3
5	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	середній	5
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	помірне	5
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	помірне	5
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на щойно з'явлених пиляках)	відсутнє або дуже слабке	1
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	щільне	7
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	5
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" ( у 50 % рослин)	середній	5
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	відсутнє	1
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	відсутня або дуже слабка	1
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	довга від 41 до 50	7
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	коротка	3
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	середні	5
22	Лише для самозапильних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	середній (19-22)	5
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	мала від 9 до 14	3
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	зубовий	5
32	Качан: колір верхівки зернини	жовтий	3
33	Качан: колір низу зернини	оранжевий	5
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	сильна	7

Заявка №: 05004058

Вид: Кукурудза

Zea mays L.

Назва сорту Маг

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідомство про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листкової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	ледь похиле	3
5	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	середній	5
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	слабке	3
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	помірне	5
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на шойно з'явлених пиляках)	відсутнє або дуже слабке	1
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	середньої щільності	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	5
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	похиле	5
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	середній	5
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	наявне	9
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	слабка	3
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	середня від 31 до 40	5
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	коротка	3
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	короткі	3
22	Лише для самозапилюючих ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	короткий (15-18)	3
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	мала від 9 до 14	3
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	зубовий	5
32	Качан: колір верхівки зернини	жовтий	3
33	Качан: колір низу зернини	оранжевий	5
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	сильна	7

Заявка №: 05004059

Вид: Кукурудза

Zea mays L

Назва сорту Боржава 290 СВ

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2
3	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	ледь похиле	3
5	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	від середнього до пізнього	6
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	відсутнє або дуже слабке	1
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	слабке	3
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на щойно з'явлених пиляках)	помірне	5
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	щільне	7
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	5
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	ледь відхилене	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	від середнього до пізнього	6
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	наявне	9
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	помірна	5
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	середня від 31 до 40	5
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	коротка	3
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	середні	5
22	Лише для самозапилюючих ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	короткий (15-18)	3
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	мала від 9 до 14	3
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	зубовий	5
32	Качан: колір верхівки зернини	жовтий	3
33	Качан: колір низу зернини	оранжевий	5
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	помірна	5

Заявка №: 05004060

Вид: Кукурудза

Zea mays L

Назва сорту Борозенський 277 МВ

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідомство про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	похиле	5
5	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	середній	5
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	сильне	7
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на щойно з'явлених пиляках)	сильне	7
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	щільне	7
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	5
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	ледь відхилене	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	середній	5
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	відсутнє	1
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	відсутня або дуже слабка	1
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	середня від 31 до 40	5
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	коротка	3
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	короткі	3
22	Лише для самозапильних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	середній (19-22)	5
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	мала від 9 до 14	3
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	зубоподібний	4
32	Качан: колір верхівки зернини	жовто-оранжевий	4
33	Качан: колір низу зернини	оранжевий	5
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	сильна	7



Заявка №: 05004061

Вид: Кукурудза

Zea mays L.

Назва сорту Криничанський 257 СВ

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2
3	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	ледь похиле	3
5	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	від раннього до середнього	4
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	відсутнє або дуже слабке	1
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	помірне	5
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на щойно з'явлених пиляках)	відсутнє або дуже слабке	1
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	щільне	7
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	5
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	ледь відхилене	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	середній	5
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	наявне	9
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	помірна	5
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	середня від 31 до 40	5
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	коротка	3
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	короткі	3
22	Лише для самозапильних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	короткий (15-18)	3
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	мала від 9 до 14	3
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	зубовий	5
32	Качан: колір верхівки зернини	жовтий	3
33	Качан: колір низу зернини	жовто-оранжевий	4
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	помірна	5

Заявка №: 05004062

Вид: Кукурудза

Zea mays L

Назва сорту Кіцманський 215 СВ

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію № 08332

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	ледь похиле	3
5	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	ранній	3
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	сильне	7
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	помірне	5
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на щойно з'явлених пиляках)	відсутнє або дуже слабке	1
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	щільне	7
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	малий (5-25)	3
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	ледь відхилене	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	від раннього до середнього	4
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	відсутнє	1
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	відсутня або дуже слабка	1
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	середня від 31 до 40	5
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	коротка	3
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	середні	5
22	Лише для самозапилюваних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	вузька від 6.1 до 8.0	3
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	короткий (15-18)	3
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	середня від 15 до 18	5
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	зубовий	5
32	Качан: колір верхівки зернини	жовтий	3
33	Качан: колір низу зернини	оранжевий	5
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	сильна	7

Заявка №: 05004063

Вид: Кукурудза

Zea mays L

Назва сорту Стіжок 192 СВ

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію № 08331

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	від округленої до лопатоподібної	4
3	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листкової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	ледь похиле	3
5	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	середній	5
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	відсутнє або дуже слабке	1
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	слабке	3
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на щойно з'явлених пиляках)	відсутнє або дуже слабке	1
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	щільне	7
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	5
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	похиле	5
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	середній	5
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	наявне	9
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	слабка	3
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	довга від 41 до 50	7
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	коротка	3
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	середні	5
22	Лише для самозапильних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	середній (19-22)	5
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	мала від 9 до 14	3
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	зубовий	5
32	Качан: колір верхівки зернини	жовтий	3
33	Качан: колір низу зернини	оранжевий	5
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	сильна	7

Заявка №: 05004066

Вид: Кукурудза

Zea mays L

Назва сорту KBC 381

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	дуже сильне	9
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листкової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	пряме	1
5	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	середній	5
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	відсутнє або дуже слабке	1
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	слабке	3
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на шойно з'явлених пиляках)	помірне	5
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	щільне	7
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	5
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	ледь відхилене	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	середній	5
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	наявне	9
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	сильна	7
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	середня від 31 до 40	5
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	коротка	3
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	короткі	3
22	Лише для самозапильних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	короткий (15-18)	3
28	Качан: діаметр (посередені) см	дуже великий понад 5	9
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	середня від 15 до 18	5
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	зубовий	5
32	Качан: колір верхівки зернини	жовтий	3
33	Качан: колір низу зернини	жовто-оранжевий	4
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	помірна	5

Заявка №: 05004068

Вид: Кукурудза

Zea mays L

Назва сорту Аматус

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	похиле	5
5	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	ранній	3
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	помірне	5
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	слабке	3
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на шойно з'явлених пиляках)	дуже сильне	9
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	середньої щільності	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	дуже малий (<5)	1
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	ранній	3
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	наявне	9
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	сильна	7
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	середня від 31 до 40	5
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	коротка	3
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	короткі	3
22	Лише для самозапильних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	вужька від 6.1 до 8.0	3
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	короткий (15-18)	3
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	середня від 15 до 18	5
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	кременистоподібний	2
32	Качан: колір верхівки зернини	жовто-оранжевий	4
33	Качан: колір низу зернини	жовто-оранжевий	4
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	дуже слабка	1

Заявка №: 05004070

Вид: Кукурудза

Zea mays L

Назва сорту Гельвін 387 МВ

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію № 08335

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	ледь похиле	3
5	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	пізній	7
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	помірне	5
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	помірне	5
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на щойно з'явлених пиляках)	відсутнє або дуже слабе	1
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	щільне	7
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	5
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	ледь відхилене	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	пізній	7
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	наявне	9
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	слабка	3
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабе	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	середня від 31 до 40	5
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	коротка	3
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	середні	5
22	Лише для самозапилювальних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	середній (19-22)	5
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	середня від 15 до 18	5
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	зубовий	5
32	Качан: колір верхівки зернини	жовтий	3
33	Качан: колір низу зернини	оранжевий	5
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	сильна	7

Заявка №: 05004072

Вид: Кукурудза

Zea mays L.

Назва сорту КВС Амбер

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідомство про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	похиле	5
5	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	від середнього до пізнього	6
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	відсутнє або дуже слабке	1
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	слабке	3
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на щойно з'явлених пиляках)	відсутнє або дуже слабке	1
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	середньої щільності	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	5
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	ледь відхилене	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	відсутня або дуже мала до 5	1
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	від середнього до пізнього	6
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	наявне	9
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	слабка	3
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	довга від 41 до 50	7
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	коротка	3
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	середні	5
22	Лише для самоzapильних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	короткий (15-18)	3
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	мала від 9 до 14	3
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	зубовий	5
32	Качан: колір верхівки зернини	жовто-оранжевий	4
33	Качан: колір низу зернини	червоно-оранжевий	6
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	сильна	7

Заявка №: 05004073

Вид: Кукурудза

Zea mays L

Назва сорту Кліфтон

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2009

Свідоцтво про державну реєстрацію № 09112

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	похиле	5
5	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	дуже сильне	9
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	ранній	3
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	відсутнє або дуже слабке	1
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	слабке	3
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на шойно з'явлених пиляках)	слабке	3
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	щільне	7
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	5
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	ранній	3
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	наявне	9
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	слабка	3
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	середня від 31 до 40	5
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	коротка	3
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	середні	5
22	Лише для самозапилюючих ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	вужька від 6.1 до 8.0	3
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	короткий (15-18)	3
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	мала від 9 до 14	3
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	кременисто-подібний	2
32	Качан: колір верхівки зернини	жовто-оранжевий	4
33	Качан: колір низу зернини	оранжевий	5
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє	1
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	ознака не визначається	0



Заявка №: 05004078

Вид: Кукурудза

Zea mays L

Назва сорту Ера МС

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	похиле	5
5	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	від раннього до середнього	4
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	помірне	5
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	сильне	7
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на шойно з'явлених пиляках)	відсутнє або дуже слабке	1
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	щільне	7
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	5
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	ледь відхилене	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	від середнього до пізнього	6
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	відсутнє	1
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	відсутня або дуже слабка	1
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	середня від 31 до 40	5
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	коротка	3
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	середні	5
22	Лише для самозапилюючих ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	середній (19-22)	5
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	середня від 15 до 18	5
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	зубовий	5
32	Качан: колір верхівки зернини	жовтий	3
33	Качан: колір низу зернини	оранжевий	5
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	помірна	5

Заявка №: 05004080

Вид: Кукурудза

Zea mays L

Назва сорту Гифт 310 СВ

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідчення про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листкової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	пряме	1
5	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	середній	5
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	дуже сильне	9
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	слабке	3
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на шойно з'явлених пиляках)	сильне	7
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	щільне	7
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	малий (5-25)	3
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	середній	5
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	наявне	9
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	слабка	3
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	середня від 31 до 40	5
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	коротка	3
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	короткі	3
22	Лише для самозапилюючих ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	широка від 10.1 до 12.0	7
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	середній (19-22)	5
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	середня від 15 до 18	5
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	зубовий	5
32	Качан: колір верхівки зернини	жовтий	3
33	Качан: колір низу зернини	оранжевий	5
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	сильна	7

Заявка №: 05004082

Вид: Кукурудза

Zea mays L

Назва сорту Джекпот МС

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	ледь похиле	3
5	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	від раннього до середнього	4
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	відсутнє або дуже слабке	1
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на шойно з'явлених пиляках)	слабке	3
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	щільне	7
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	5
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	ледь відхилене	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" ( у 50 % рослин)	від раннього до середнього	4
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	наявне	9
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	слабка	3
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	середня від 31 до 40	5
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	коротка	3
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	короткі	3
22	Лише для самоzapильних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	короткий (15-18)	3
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	мала від 9 до 14	3
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	зубовий	5
32	Качан: колір верхівки зернини	жовтий	3
33	Качан: колір низу зернини	жовто-оранжевий	4
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	сильна	7

Заявка №: 05004083

Вид: Кукурудза

Zea mays L

Назва сорту Трон МС

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2009

Свідчення про державну реєстрацію № 09133

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	малий (6-25)	3
4	Листок: положення листової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	ледь похиле	3
5	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	пізній	7
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	помірне	5
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	слабке	3
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на шойно з'явлених пиляках)	помірне	5
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	щільне	7
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	малий (5-25)	3
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	ледь відхилене	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	пізній	7
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	відсутнє	1
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	відсутня або дуже слабка	1
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	середня від 31 до 40	5
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	коротка	3
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	короткі	3
22	Лише для самозапильних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	широка від 10,1 до 12,0	7
26	Качан: ніжка за довжиною, см	коротка від 5,1 до 10	3
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	середній (19-22)	5
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	середня від 15 до 18	5
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	зубовий	5
32	Качан: колір верхівки зернини	жовтий	3
33	Качан: колір низу зернини	жовто-оранжевий	4
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	сильна	7

Заявка №: 05004086

Вид: Кукурудза

Zea mays L.

Назва сорту Зомба

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	малий (6-25)	3
4	Листок: положення листової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	пряме	1
5	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	ранній	3
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	слабке	3
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	помірне	5
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на шойно з'явлених пиляках)	сильне	7
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	середньої щільності	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	5
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	ледь відхилене	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	ранній	3
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	наявне	9
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	відсутня або дуже слабка	1
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	середня від 31 до 40	5
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	коротка	3
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	середні	5
22	Лише для самозапильних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	середній (19-22)	5
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	мала від 9 до 14	3
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	кременистоподібний	2
32	Качан: колір верхівки зернини	оранжевий	5
33	Качан: колір низу зернини	оранжевий	5
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє	1
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	ознака не визначається	0

Заявка №: 05004087

Вид: Кукурудза

Zea mays L

Назва сорту ЛГ 3330

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	ледь похиле	3
5	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	від середнього до пізнього	6
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	відсутнє або дуже слабке	1
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	слабке	3
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на щойно з'явлених пиляках)	помірне	5
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	середньої щільності	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	малий (5-25)	3
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	ледь відхилене	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	від середнього до пізнього	6
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	наявне	9
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	помірна	5
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	середня від 31 до 40	5
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	коротка	3
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	короткі	3
22	Лише для самозапилюючих ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	короткий (15-18)	3
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	мала від 9 до 14	3
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	зубовий	5
32	Качан: колір верхівки зернини	жовто-оранжевий	4
33	Качан: колір низу зернини	оранжевий	5
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	сильна	7

Заявка №: 05004088

Вид: Кукурудза

Zea mays L

Назва сорту ЛГ 3232

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	малий (6-25)	3
4	Листок: положення листкової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	ледь похиле	3
5	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	середній	5
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	відсутнє або дуже слабке	1
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на шойно з'явлених пиляках)	відсутнє або дуже слабке	1
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	середньої щільності	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	5
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	ледь відхилене	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	від середнього до пізнього	6
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	наявне	9
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	слабка	3
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	довга від 41 до 50	7
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	середня	5
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	середні	5
22	Лише для самозапильних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	середній (19-22)	5
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	мала від 9 до 14	3
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	зубовий	5
32	Качан: колір верхівки зернини	жовтий	3
33	Качан: колір низу зернини	жовто-оранжевий	4
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє	1
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	ознака не визначається	0

Заявка №: 05004089

Вид: Кукурудза

Zea mays L

Назва сорту ЕС Беніта

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	малий (6-25)	3
4	Листок: положення листкової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	пряме	1
5	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	від середнього до пізнього	6
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	відсутнє або дуже слабе	1
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	сильне	7
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на шойно з'явлених пиляках)	помірне	5
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	середньої щільності	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	5
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" ( у 50 % рослин)	від середнього до пізнього	6
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	наявне	9
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	помірна	5
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабе	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	середня від 31 до 40	5
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	коротка	3
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	короткі	3
22	Лише для самозапильних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	короткий (15-18)	3
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	середня від 15 до 18	5
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	проміжний	3
32	Качан: колір верхівки зернини	жовто-оранжевий	4
33	Качан: колір низу зернини	оранжевий	5
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	помірна	5



Заявка №: 05004090

Вид: Кукурудза

Zea mays L

Назва сорту ЕСМ 602х

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	малий (6-25)	3
4	Листок: положення листкової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	ледь похиле	3
5	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	від раннього до середнього	4
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	сильне	7
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	сильне	7
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на щойно з'явлених пиляках)	сильне	7
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	щільне	7
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	5
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	ранній	3
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	наявне	9
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	сильна	7
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	середня від 31 до 40	5
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	коротка	3
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	короткі	3
22	Лише для самозапилюваних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	короткий (15-18)	3
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	середня від 15 до 18	5
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	зубоподібний	4
32	Качан: колір верхівки зернини	жовто-оранжевий	4
33	Качан: колір низу зернини	оранжевий	5
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє	1
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	ознака не визначається	0

Заявка №: 05004091

Вид: Кукурудза

Zea mays L.

Назва сорту ЕС Нінфеа

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3
2	Перший листок: форма верхівки	від округленої до лопатоподібної	4
3	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	пряме	1
5	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	ранній	3
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	відсутнє або дуже слабке	1
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	слабке	3
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на щойно з'явлених пиляках)	відсутнє або дуже слабке	1
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	щільне	7
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	5
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	відсутня або дуже мала до 5	1
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	ранній	3
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	відсутнє	1
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	відсутня або дуже слабка	1
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	середня від 31 до 40	5
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	коротка	3
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	короткі	3
22	Лише для самозапильних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	короткий (15-18)	3
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	мала від 9 до 14	3
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	зубоподібний	4
32	Качан: колір верхівки зернини	жовто-оранжевий	4
33	Качан: колір низу зернини	оранжевий	5
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє	1
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	ознака не визначається	0

Заявка №: 05004092

Вид: Кукурудза

Zea mays L

Назва сорту ЕСМ 601х

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	малий (6-25)	3
4	Листок: положення листової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	ледь похиле	3
5	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	ранній	3
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	слабке	3
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	помірне	5
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на шойно з'явлених пиляках)	сильне	7
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	щільне	7
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	малий (5-25)	3
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	від дуже раннього до раннього	2
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	наявне	9
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	сильна	7
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	середня від 31 до 40	5
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	коротка	3
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	короткі	3
22	Лише для самоzapильних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	короткий (15-18)	3
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	мала від 9 до 14	3
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	зубоподібний	4
32	Качан: колір верхівки зернини	жовто-оранжевий	4
33	Качан: колір низу зернини	оранжевий	5
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє	1
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	ознака не визначається	0

Заявка №: 05004093

Вид: Кукурудза

Zea mays L

Назва сорту Сангрія

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2009

Свідоцтво про державну реєстрацію № 09134

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2
3	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	ледь похиле	3
5	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	від середнього до пізнього	6
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	відсутнє або дуже слабке	1
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на шойно з'явлених пиляках)	слабке	3
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	щільне	7
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	5
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	від середнього до пізнього	6
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	наявне	9
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	слабка	3
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	довга від 41 до 50	7
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	коротка	3
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	середні	5
22	Лише для самоzapильних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	короткий (15-18)	3
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	мала від 9 до 14	3
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	зубовий	5
32	Качан: колір верхівки зернини	жовтий	3
33	Качан: колір низу зернини	оранжевий	5
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	сильна	7

Заявка №: 05004094

Вид: Кукурудза

Zea mays L.

Назва сорту ДК 312

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідчення про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2
3	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листкової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	ледь похиле	3
5	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	від раннього до середнього	4
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	відсутнє або дуже слабке	1
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	слабке	3
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на щойно з'явлених пиляках)	слабке	3
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	щільне	7
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	5
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	середній	5
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	відсутнє	1
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	відсутня або дуже слабка	1
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	довга від 41 до 50	7
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	середня	5
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	середні	5
22	Лише для самозапильних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	короткий (15-18)	3
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	циліндрична	3
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	середня від 15 до 18	5
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	зубовий	5
32	Качан: колір верхівки зернини	жовтий	3
33	Качан: колір низу зернини	оранжевий	5
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	сильна	7

Заявка №: 05004095

Вид: Кукурудза

Zea mays L.

Назва сорту Баксос

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2
3	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	ледь похиле	3
5	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	ранній	3
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	відсутнє або дуже слабке	1
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	слабке	3
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на шойно з'явлених пиляках)	відсутнє або дуже слабке	1
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	щільне	7
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	5
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	ранній	3
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	відсутнє	1
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	слабка	3
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	середня від 31 до 40	5
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	коротка	3
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	середні	5
22	Лише для самозапильних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	дуже довга понад 200	9
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	середній (19-22)	5
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	середня від 15 до 18	5
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	зубоподібний	4
32	Качан: колір верхівки зернини	жовто-оранжевий	4
33	Качан: колір низу зернини	оранжевий	5
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	помірна	5

Заявка №: 05004096

Вид: Кукурудза

Zea mays L.

Назва сорту Джуксін

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	похиле	5
5	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	середній	5
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	відсутнє або дуже слабке	1
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	помірне	5
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на шойно з'явлених пиляках)	слабке	3
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	середньої щільності	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	5
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	середній	5
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	наявне	9
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	помірна	5
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	середня від 31 до 40	5
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	коротка	3
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	середні	5
22	Лише для самоzapильних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	середній (19-22)	5
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	мала від 9 до 14	3
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	зубовий	5
32	Качан: колір верхівки зернини	жовтий	3
33	Качан: колір низу зернини	оранжевий	5
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	помірна	5

Заявка №: 05004097

Вид: Кукурудза

Zea mays L

Назва сорту Ріксер

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	похиле	5
5	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	від середнього до пізнього	6
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	відсутнє або дуже слабе	1
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	відсутнє або дуже слабе	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на шойно з'явлених пиляках)	слабе	3
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	щільне	7
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	5
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	пізній	7
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	відсутнє	1
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	відсутня або дуже слабка	1
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабе	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	середня від 31 до 40	5
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	коротка	3
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	середні	5
22	Лише для самозапилюваних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	короткий (15-18)	3
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	середня від 15 до 18	5
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	зубовий	5
32	Качан: колір верхівки зернини	жовтий	3
33	Качан: колір низу зернини	жовто-оранжевий	4
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	помірна	5



Заявка №: 05004099

Вид: Кукурудза

Zea mays L.

Назва сорту Астері КС

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2009

Свідоцтво про державну реєстрацію № 09122

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	похиле	5
5	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	від раннього до середнього	4
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	відсутнє або дуже слабке	1
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	слабке	3
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на шойно з'явлених пиляках)	слабке	3
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	щільне	7
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	5
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	від раннього до середнього	4
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	наявне	9
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	слабка	3
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	слабке	3
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	коротка від 21 до 30	3
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	коротка	3
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	короткі	3
22	Лише для самоzapильних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	вужька від 6.1 до 8.0	3
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	короткий (15-18)	3
28	Качан: діаметр (посередені) см	середній від 3,1 до 4,0	5
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	мала від 9 до 14	3
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	зубоподібний	4
32	Качан: колір верхівки зернини	жовто-оранжевий	4
33	Качан: колір низу зернини	оранжевий	5
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	слабка	3

Заявка №: 05004100

Вид: Кукурудза

Zea mays L.

Назва сорту Жаззі

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	похиле	5
5	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	ранній	3
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	помірне	5
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	сильне	7
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на шойно з "явлених пиляках)	помірне	5
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	щільне	7
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	5
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" ( у 50 % рослин)	ранній	3
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	наявне	9
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	помірна	5
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабе	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	середня від 31 до 40	5
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	коротка	3
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	короткі	3
22	Лише для самозапильних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	короткий (15-18)	3
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	середня від 15 до 18	5
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	зубоподібний	4
32	Качан: колір верхівки зернини	жовто-оранжевий	4
33	Качан: колір низу зернини	оранжевий	5
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	сильна	7

Заявка №: 05004101

Вид: Кукурудза

Zea mays L

Назва сорту ПР38Б12

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листкової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	ледь похиле	3
5	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	від раннього до середнього	4
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	відсутнє або дуже слабке	1
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	слабке	3
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на щойно з'явлених пиляках)	відсутнє або дуже слабке	1
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	щільне	7
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	5
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	ледь відхилене	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	від раннього до середнього	4
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	відсутнє	1
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	відсутня або дуже слабка	1
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	середня від 31 до 40	5
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	коротка	3
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	середні	5
22	Лише для самозапильних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8,1 до 10,0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	коротка від 5,1 до 10	3
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	короткий (15-18)	3
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	мала від 9 до 14	3
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	зубовий	5
32	Качан: колір верхівки зернини	жовтий	3
33	Качан: колір низу зернини	оранжевий	5
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	сильна	7

Заявка №: 05004103

Вид: Кукурудза

Zea mays L

Назва сорту PR39K13

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2009

Свідоцтво про державну реєстрацію № 09123

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2
3	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	ледь похиле	3
5	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	ранній	3
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	слабке	3
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	слабке	3
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на шойно з'явлених пиляках)	сильне	7
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	щільне	7
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	5
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	ледь відхилене	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	від дуже раннього до раннього	2
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	наявне	9
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	сильна	7
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	середня від 31 до 40	5
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	коротка	3
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	середні	5
22	Лише для самозапильних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	середній (19-22)	5
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	середня від 15 до 18	5
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	кременистоподібний	2
32	Качан: колір верхівки зернини	оранжевий	5
33	Качан: колір низу зернини	оранжевий	5
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	сильна	7

Заявка №: 05004104

Вид: Кукурудза

Zea mays L

Назва сорту ПР39Б76

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2009

Свідоцтво про державну реєстрацію № 09128

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	ледь похиле	3
5	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	середній	5
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	помірне	5
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	помірне	5
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на шойно з'явлених пиляках)	сильне	7
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	щільне	7
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	великий (51-75)	7
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	ледь відхилене	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	відсутня або дуже мала до 5	1
15	Качан: час появи "шовку" ( у 50 % рослин)	середній	5
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	наявне	9
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	помірна	5
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	довга від 41 до 50	7
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	середня	5
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	середні	5
22	Лише для самозапильних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	короткий (15-18)	3
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	конусна	1
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	середня від 15 до 18	5
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	зубовий	5
32	Качан: колір верхівки зернини	жовтувато-білий	2
33	Качан: колір низу зернини	жовто-оранжевий	4
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	сильна	7

Заявка №: 05004106

Вид: Кукурудза

Zea mays L.

Назва сорту ПРЗ7И12

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2009

Свідоцтво про державну реєстрацію № 09135

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	ледь похиле	3
5	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	від середнього до пізнього	6
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	відсутнє або дуже слабке	1
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	слабке	3
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на щойно з'явлених пиляках)	слабке	3
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	середньої щільності	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	5
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	ледь відхилене	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	відсутня або дуже мала до 5	1
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	від середнього до пізнього	6
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	відсутнє	1
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	відсутня або дуже слабка	1
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	середня від 31 до 40	5
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	коротка	3
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	середні	5
22	Лише для самозапилюючих ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	середній (19-22)	5
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	середня від 15 до 18	5
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	зубовий	5
32	Качан: колір верхівки зернини	жовтий	3
33	Качан: колір низу зернини	жовто-оранжевий	4
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	сильна	7

Заявка №: 05004107

Вид: Кукурудза

Zea mays L

Назва сорту ПР37Ф73

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2009

Свідоцтво про державну реєстрацію № 09143

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листкової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	ледь похиле	3
5	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	від середнього до пізнього	6
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	слабке	3
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	слабке	3
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на щойно з'явлених пиляках)	відсутнє або дуже слабке	1
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	щільне	7
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	5
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	від середнього до пізнього	6
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	наявне	9
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	помірна	5
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	середня від 31 до 40	5
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	коротка	3
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	середні	5
22	Лише для самозапильних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	середній (19-22)	5
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	середня від 15 до 18	5
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	зубовий	5
32	Качан: колір верхівки зернини	жовтий	3
33	Качан: колір низу зернини	жовто-оранжевий	4
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	сильна	7

Заявка №: 05004108

Вид: Кукурудза

Zea mays L.

Назва сорту ПР39Р20

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	малий (6-25)	3
4	Листок: положення листової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	ледь похиле	3
5	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	середній	5
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	відсутнє або дуже слабке	1
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	слабке	3
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на щойно з'явлених пиляках)	помірне	5
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	середньої щільності	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	5
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	ледь відхилене	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	від раннього до середнього	4
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	наявне	9
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	сильна	7
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	середня від 31 до 40	5
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	коротка	3
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	середні	5
22	Лише для самозапильних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	середній (19-22)	5
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4.1 до 5.0	7
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	мала від 9 до 14	3
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	кременистоподібний	2
32	Качан: колір верхівки зернини	оранжевий	5
33	Качан: колір низу зернини	оранжевий	5
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	помірна	5



Заявка №: 05004109

Вид: Кукурудза

Zea mays L

Назва сорту Кадет

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідчення про державну реєстрацію № 08094

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	малий (6-25)	3
4	Листок: положення листкової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	ледь похиле	3
5	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	від раннього до середнього	4
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	відсутнє або дуже слабке	1
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	помірне	5
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на шойно з'явлених пиляках)	сильне	7
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	щільне	7
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	малий (5-25)	3
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	ледь відхилене	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	від середнього до пізнього	6
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	наявне	9
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	сильна	7
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	довга від 41 до 50	7
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	середня	5
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	середні	5
22	Лише для самозапильних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	довга від 20.1 до 40	7
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	середній (19-22)	5
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	мала від 9 до 14	3
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	кременистоподібний	2
32	Качан: колір верхівки зернини	оранжевий	5
33	Качан: колір низу зернини	оранжевий	5
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	сильна	7

Заявка №: 05004111

Вид: Кукурудза

Zea mays L

Назва сорту Лайка

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію № 08095

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	малий (6-25)	3
4	Листок: положення листкової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	ледь похиле	3
5	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	ранній	3
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	помірне	5
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на шойно з'явлених пиляках)	сильне	7
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	щільне	7
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	5
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	ранній	3
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	наявне	9
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	помірна	5
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	середня від 31 до 40	5
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	коротка	3
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	середні	5
22	Лише для самозапильних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	середній (19-22)	5
28	Качан: діаметр (посередні) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	мала від 9 до 14	3
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	кременистоподібний	2
32	Качан: колір верхівки зернини	оранжевий	5
33	Качан: колір низу зернини	оранжевий	5
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	сильна	7

Заявка №: 06004002

Вид: Кукурудза

Zea mays L.

Назва сорту НК Тімік

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2009

Свідоцтво про державну реєстрацію № 09147

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	дуже сильне	9
2	Перший листок: форма верхівки	від округленої до лопатоподібної	4
3	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	малий (6-25)	3
4	Листок: положення листової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	ледь похиле	3
5	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	пізній	7
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	відсутнє або дуже слабке	1
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	слабке	3
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на щойно з'явлених пиляках)	відсутнє або дуже слабке	1
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	середньої щільності	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	5
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	похиле	5
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" ( у 50 % рослин)	від пізнього до дуже пізнього	8
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	наявне	9
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	помірна	5
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	середня від 31 до 40	5
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	коротка	3
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	середні	5
22	Лише для самозапильних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	дуже довга понад 200	9
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	широка від 10.1 до 12.0	7
26	Качан: ніжка за довжиною, см	коротка від 5,1 до 10	3
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	короткий (15-18)	3
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	циліндрична	3
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	середня від 15 до 18	5
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	проміжний	3
32	Качан: колір верхівки зернини	жовто-оранжевий	4
33	Качан: колір низу зернини	жовто-оранжевий	4
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	сильна	7

Заявка №: 06004003

Вид: Кукурудза

Zea mays L.

Назва сорту НК Некта

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2009

Свідоцтво про державну реєстрацію № 09124

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	похиле	5
5	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	від раннього до середнього	4
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	відсутнє або дуже слабке	1
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на шойно з'явлених пиляках)	відсутнє або дуже слабке	1
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	середньої щільності	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	великий (51-75)	7
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	сильно похиле	7
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	від раннього до середнього	4
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	відсутнє	1
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	ознака не визначається	0
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	слабке	3
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	середня від 31 до 40	5
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	довга	7
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	середні	5
22	Лише для самозапильних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	короткий (15-18)	3
28	Качан: діаметр (посередні) см	середній від 3,1 до 4,0	5
29	Качан: форма	циліндрична	3
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	мала від 9 до 14	3
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	кременистоподібний	2
32	Качан: колір верхівки зернини	жовто-оранжевий	4
33	Качан: колір низу зернини	жовто-оранжевий	4
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	помірна	5

Заявка №: 06004004

Вид: Кукурудза

Zea mays L.

Назва сорту НК Альтіус

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	дуже сильне	9
2	Перший листок: форма верхівки	від округленої до лопатоподібної	4
3	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	пряме	1
5	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	середній	5
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	слабке	3
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	сильне	7
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на шойно з'явлених пиляках)	слабке	3
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	середньої щільності	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	5
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	відсутня або дуже мала до 5	1
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	середній	5
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	наявне	9
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	слабка	3
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	середня від 31 до 40	5
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	коротка	3
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	короткі	3
22	Лише для самозапилюваних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	коротка від 5,1 до 10	3
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	короткий (15-18)	3
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	середня від 15 до 18	5
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	зубовий	5
32	Качан: колір верхівки зернини	жовтий	3
33	Качан: колір низу зернини	оранжевий	5
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	помірна	5

Заявка №: 06004005

Вид: Кукурудза

Zea mays L.

Назва сорту НК Галактик

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 01.01.2009

Свідчення про державну реєстрацію № 09148

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	дуже сильне	9
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листкової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	ледь похиле	3
5	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	дуже сильне	9
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	від пізнього до дуже пізнього	8
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	слабке	3
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	помірне	5
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на шойно з'явлених пиляках)	слабке	3
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	середньої щільності	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	5
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	від пізнього до дуже пізнього	8
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	наявне	9
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	сильна	7
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	середня від 31 до 40	5
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	коротка	3
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	середні	5
22	Лише для самоzapильних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	дуже довга понад 200	9
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	середній (19-22)	5
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	середня від 15 до 18	5
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	зубовий	5
32	Качан: колір верхівки зернини	жовто-оранжевий	4
33	Качан: колір низу зернини	жовто-оранжевий	4
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	сильна	7

Заявка №: 06004008

Вид: Кукурудза

Zea mays L

Назва сорту НК Фалькон

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідчення про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	від округленої до лопатоподібної	4
3	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листкової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	ледь похиле	3
5	Стебло: зигзагоподібність	сильна	3
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	середній	5
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	відсутнє або дуже слабке	1
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	слабке	3
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на шойно з'явлених пиляках)	сильне	7
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	середньої щільності	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	5
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	сильно похиле	7
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	середній	5
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	наявне	9
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	слабка	3
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	середня від 31 до 40	5
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	довга	7
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	короткі	3
22	Лише для самозапильних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	мале	3
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	довгий (23-26)	7
28	Качан: діаметр (посередені) см	від дуже малого до малого	2
29	Качан: форма	циліндрична	3
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	від дуже малої до малої	2
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	зубоподібний	4
32	Качан: колір верхівки зернини	оранжевий	5
33	Качан: колір низу зернини	синьо-чорний	9
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	дуже слабка	1

Заявка №: 06004009

Вид: Кукурудза

Zea mays L.

Назва сорту НК Перформ

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	похиле	5
5	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	дуже ранній	1
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	відсутнє або дуже слабке	1
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	слабке	3
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на шойно з'явлених пиляках)	помірне	5
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	середньої щільності	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	5
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	похиле	5
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	від раннього до середнього	4
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	наявне	9
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	помірна	5
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	середня від 31 до 40	5
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	довга	7
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	середні	5
22	Лише для самозапилюваних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	мале	3
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	вужька від 6.1 до 8.0	3
26	Качан: ніжка за довжиною, см	коротка від 5,1 до 10	3
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	середній (19-22)	5
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	мала від 9 до 14	3
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	кременистоподібний	2
32	Качан: колір верхівки зернини	жовто-оранжевий	4
33	Качан: колір низу зернини	оранжевий	5
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	слабка	3



Заявка №: 06004010

Вид: Кукурудза

Zea mays L.

Назва сорту Неріса

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2009

Свідоцтво про державну реєстрацію № 09113

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	малий (6-25)	3
4	Листок: положення листкової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	ледь похиле	3
5	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	середній	5
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	відсутнє або дуже слабке	1
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на шойно з "явлених пиляках)	відсутнє або дуже слабке	1
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	середньої щільності	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	великий (51-75)	7
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	сильно похиле	7
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	середній	5
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	наявне	9
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	слабка	3
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	довга від 41 до 50	7
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	довга	7
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	середні	5
22	Лише для самозапильних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	середній (19-22)	5
28	Качан: діаметр (посередені) см	середній від 3,1 до 4,0	5
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	середня від 15 до 18	5
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	кременисто-подібний	2
32	Качан: колір верхівки зернини	жовто-оранжевий	4
33	Качан: колір низу зернини	оранжевий	5
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	помірна	5

Заявка №: 06004011

Вид: Кукурудза

Zea mays L.

Назва сорту НК Леморо

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	ледь похиле	3
5	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	від середнього до пізнього	6
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	відсутнє або дуже слабке	1
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	слабке	3
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на щойно з'явлених пиляках)	помірне	5
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	щільне	7
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	малий (5-25)	3
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	ледь відхилене	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" ( у 50 % рослин)	від середнього до пізнього	6
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	наявне	9
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	помірна	5
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	середня від 31 до 40	5
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	коротка	3
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	короткі	3
22	Лише для самозапильних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	широка від 10.1 до 12.0	7
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	короткий (15-18)	3
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	середня від 15 до 18	5
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	зубовий	5
32	Качан: колір верхівки зернини	жовтий	3
33	Качан: колір низу зернини	жовто-оранжевий	4
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	сильна	7

Заявка №: 06004012

Вид: Кукурудза

Zea mays L.

Назва сорту НК Пако

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2009

Свідоцтво про державну реєстрацію № 09144

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	похиле	5
5	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослини)	від середнього до пізнього	6
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	відсутнє або дуже слабке	1
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на шойно з'явлених пиляках)	відсутнє або дуже слабке	1
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	середньої щільності	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	5
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	похиле	5
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослини)	від середнього до пізнього	6
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	наявне	9
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	слабка	3
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	середня від 31 до 40	5
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	довга	7
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	середні	5
22	Лише для самозапильних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	середній (19-22)	5
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	середня від 15 до 18	5
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	зубовий	5
32	Качан: колір верхівки зернини	жовтий	3
33	Качан: колір низу зернини	жовто-оранжевий	4
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	сильна	7

Заявка №: 06004017

Вид: Кукурудза

Zea mays L.

Назва сорту ДК 434

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2009

Свідоцтво про державну реєстрацію № 09136

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2
3	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	малий (6-25)	3
4	Листок: положення листової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	ледь похиле	3
5	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	від середнього до пізнього	6
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	слабке	3
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	помірне	5
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на шойно з'явлених пиляках)	помірне	5
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	щільне	7
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	5
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	ледь відхилене	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	від середнього до пізнього	6
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	наявне	9
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	слабка	3
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	довга від 41 до 50	7
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	середня	5
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	середні	5
22	Лише для самозапильних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	дуже довга понад 200	9
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	середній (19-22)	5
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	середня від 15 до 18	5
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	зубовий	5
32	Качан: колір верхівки зернини	жовтий	3
33	Качан: колір низу зернини	жовто-оранжевий	4
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	помірна	5

Заявка №: 06004018

Вид: Кукурудза

Zea mays L

Назва сорту ДКС 3420

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідство про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2
3	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	ледь похиле	3
5	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	середній	5
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	слабке	3
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	помірне	5
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на щойно з'явлених пиляках)	відсутнє або дуже слабке	1
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	щільне	7
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	5
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	ледь відхилене	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	відсутня або дуже мала до 5	1
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	середній	5
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	наявне	9
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	слабка	3
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	середня від 31 до 40	5
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	коротка	3
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	середні	5
22	Лише для самозапилюючих ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	короткий (15-18)	3
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	мала від 9 до 14	3
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	зубовий	5
32	Качан: колір верхівки зернини	жовтий	3
33	Качан: колір низу зернини	жовто-оранжевий	4
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	сильна	7

Заявка №: 06004020

Вид: Кукурудза

Zea mays L.

Назва сорту ДКС 3759

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	ледь похиле	3
5	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	від середнього до пізнього	6
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	слабке	3
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	сильне	7
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на щойно з'явлених пиляках)	відсутнє або дуже слабке	1
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	щільне	7
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	малий (5-25)	3
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	середній	5
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	наявне	9
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	помірна	5
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	середня від 31 до 40	5
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	коротка	3
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	середні	5
22	Лише для самозапильних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	середній (19-22)	5
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	мала від 9 до 14	3
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	зубовий	5
32	Качан: колір верхівки зернини	жовтий	3
33	Качан: колір низу зернини	оранжевий	5
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	сильна	7

Заявка №: 06004021

Вид: Кукурудза

Zea mays L

Назва сорту ДКС 3880

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2009

Свідоцтво про державну реєстрацію № 09137

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2
3	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	ледь похиле	3
5	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	середній	5
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	відсутнє або дуже слабке	1
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	сильне	7
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на шойно з'явлених пиляках)	відсутнє або дуже слабке	1
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	середньої щільності	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	малий (5-25)	3
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	середній	5
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	наявне	9
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	помірна	5
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	середня від 31 до 40	5
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	коротка	3
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	середні	5
22	Лише для самозапильних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	короткий (15-18)	3
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	мала від 9 до 14	3
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	зубовий	5
32	Качан: колір верхівки зернини	жовтий	3
33	Качан: колір низу зернини	оранжевий	5
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	сильна	7

Заявка №: 06004022

Вид: Кукурудза

Zea mays L

Назва сорту ДКС 2960

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2
3	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	малий (6-25)	3
4	Листок: положення листової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	ледь похиле	3
5	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	ранній	3
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	відсутнє або дуже слабке	1
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	слабке	3
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на щойно з'явлених пиляках)	слабке	3
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	середньої щільності	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	5
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	ледь відхилене	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	від дуже раннього до раннього	2
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	наявне	9
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	сильна	7
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	довга від 41 до 50	7
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	середня	5
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	короткі	3
22	Лише для самозапильних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	довга від 20.1 до 40	7
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	середній (19-22)	5
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	мала від 9 до 14	3
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	зубоподібний	4
32	Качан: колір верхівки зернини	жовто-оранжевий	4
33	Качан: колір низу зернини	оранжевий	5
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	помірна	5



Заявка №: 06004023

Вид: Кукурудза

Zea mays L.

Назва сорту ДКС 2949

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2009

Свідоцтво про державну реєстрацію № 09126

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2
3	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	ледь похиле	3
5	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	ранній	3
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	відсутнє або дуже слабке	1
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на шойно з'явлених пиляках)	слабке	3
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	щільне	7
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	5
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	ранній	3
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	відсутнє	1
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	відсутня або дуже слабка	1
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	середня від 31 до 40	5
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	коротка	3
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	короткі	3
22	Лише для самоzapильних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	довга від 20.1 до 40	7
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	короткий (15-18)	3
28	Качан: діаметр (посередені) см	середній від 3,1 до 4,0	5
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	мала від 9 до 14	3
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	зубоподібний	4
32	Качан: колір верхівки зернини	жовто-оранжевий	4
33	Качан: колір низу зернини	оранжевий	5
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	сильна	7

Заявка №: 06004026

Вид: Кукурудза

Zea mays L

Назва сорту Бюрлі

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	малий (6-25)	3
4	Листок: положення листкової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	ледь похиле	3
5	Стебло: зигзагоподібність	сильна	3
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	від раннього до середнього	4
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	відсутнє або дуже слабке	1
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	слабке	3
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на щойно з'явлених пиляках)	помірне	5
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	середньої щільності	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	5
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	похиле	5
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" ( у 50 % рослин)	від раннього до середнього	4
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	наявне	9
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	помірна	5
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	середня від 31 до 40	5
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	довга	7
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	середні	5
22	Лише для самозапильних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	вужька від 6.1 до 8.0	3
26	Качан: ніжка за довжиною, см	коротка від 5,1 до 10	3
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	короткий (15-18)	3
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рялів, шт.	мала від 9 до 14	3
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	проміжний	3
32	Качан: колір верхівки зернини	жовто-оранжевий	4
33	Качан: колір низу зернини	оранжевий	5
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	слабка	3

Заявка №: 06004027

Вид: Кукурудза

Zea mays L.

Назва сорту ПВ 75 - 01

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листкової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	ледь похиле	3
5	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	від середнього до пізнього	6
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	відсутнє або дуже слабке	1
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на щойно з'явлених пиляках)	відсутнє або дуже слабке	1
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	середньої щільності	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	малий (5-25)	3
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	ледь відхилене	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	середній	5
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	відсутнє	1
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	ознака не визначається	0
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	середня від 31 до 40	5
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	коротка	3
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	середні	5
22	Лише для самозапильних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	короткий (15-18)	3
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	циліндрична	3
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	середня від 15 до 18	5
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	зубовий	5
32	Качан: колір верхівки зернини	жовтий	3
33	Качан: колір низу зернини	оранжевий	5
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	сильна	7

Заявка №: 06004030

Вид: Кукурудза

Zea mays L.

Назва сорту ПВ 90 - 04

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2009

Свідчення про державну реєстрацію № 09138

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2
3	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	ледь похиле	3
5	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	середній	5
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	відсутнє або дуже слабе	1
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	слабке	3
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на щойно з'явлених пиляках)	відсутнє або дуже слабе	1
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	щільне	7
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	5
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	похиле	5
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	середній	5
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	відсутнє	1
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	відсутня або дуже слабка	1
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабе	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	середня від 31 до 40	5
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	середня	5
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	середні	5
22	Лише для самоzapильних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	середній (19-22)	5
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	середня від 15 до 18	5
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	зубовий	5
32	Качан: колір верхівки зернини	жовтий	3
33	Качан: колір низу зернини	жовто-оранжевий	4
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	сильна	7

Заявка №: 06004031

Вид: Кукурудза

Zea mays L

Назва сорту ПВ 81-01

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	похиле	5
5	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	від раннього до середнього	4
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	відсутнє або дуже слабке	1
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	сильне	7
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на щойно з'явлених пиляках)	сильне	7
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	середньої щільності	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	5
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	ледь відхилене	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	від раннього до середнього	4
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	наявне	9
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	сильна	7
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	середня від 31 до 40	5
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	довга	7
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	короткі	3
22	Лише для самозаймих ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	коротка від 5,1 до 10	3
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	короткий (15-18)	3
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	мала від 9 до 14	3
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	кременистоподібний	2
32	Качан: колір верхівки зернини	жовто-оранжевий	4
33	Качан: колір низу зернини	оранжевий	5
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє	1
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	ознака не визначається	0

Заявка №: 06004037

Вид: Кукурудза

Zea mays L

Назва сорту Голосіївський 260 СВ

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію № 08049

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	ледь похиле	3
5	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	від середнього до пізнього	6
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	відсутнє або дуже слабке	1
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на щойно з'явлених пиляках)	відсутнє або дуже слабке	1
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	щільне	7
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	5
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	від середнього до пізнього	6
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	наявне	9
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	помірна	5
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	довга від 41 до 50	7
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	коротка	3
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	середні	5
22	Лише для самоzapильних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	середній (19-22)	5
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	середня від 15 до 18	5
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	зубовий	5
32	Качан: колір верхівки зернини	жовто-оранжевий	4
33	Качан: колір низу зернини	оранжевий	5
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	дуже сильна	9

Заявка №: 06004038

Вид: Кукурудза

Zea mays L

Назва сорту Орлик 330 МВ

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідчення про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	від округленої до лопатоподібної	4
3	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	похиле	5
5	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	від середнього до пізнього	6
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	відсутнє або дуже слабке	1
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на шойно з'явлених пиляках)	помірне	5
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	щільне	7
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	5
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	ледь відхилене	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	від середнього до пізнього	6
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	наявне	9
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	слабка	3
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	середня від 31 до 40	5
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	коротка	3
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	середні	5
22	Лише для самозапильних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	середній (19-22)	5
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	середня від 15 до 18	5
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	зубовий	5
32	Качан: колір верхівки зернини	жовтий	3
33	Качан: колір низу зернини	оранжевий	5
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	сильна	7

Заявка №: 06004039

Вид: Кукурудза

Zea mays L

Назва сорту Переяславський 230 СВ

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2
3	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	похиле	5
5	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	середній	5
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	сильне	7
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	слабке	3
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на щойно з'явлених пиляках)	слабке	3
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	середньої щільності	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	5
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	ледь відхилене	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	середній	5
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	наявне	9
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	помірна	5
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	середня від 31 до 40	5
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	коротка	3
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	короткі	3
22	Лише для самозапильних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	короткий (15-18)	3
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	середня від 15 до 18	5
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	зубовий	5
32	Качан: колір верхівки зернини	жовто-оранжевий	4
33	Качан: колір низу зернини	оранжевий	5
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	сильна	7



Заявка №: 06004040

Вид: Кукурудза

Zea mays L

Назва сорту Суботівський 190 СВ

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	похиле	5
5	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	ранній	3
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	сильне	7
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	слабке	3
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на щойно з'явлених пиляках)	відсутнє або дуже слабке	1
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	середньої щільності	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	5
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	ледь відхилене	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	від раннього до середнього	4
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	відсутнє	1
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	відсутня або дуже слабка	1
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	довга від 41 до 50	7
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	коротка	3
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	середні	5
22	Лише для самозапильних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	вужька від 6.1 до 8.0	3
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	короткий (15-18)	3
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	мала від 9 до 14	3
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	кременистий	1
32	Качан: колір верхівки зернини	оранжевий	5
33	Качан: колір низу зернини	оранжевий	5
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	помірне	5

Заявка №: 06004041

Вид: Кукурудза

Zea mays L.

Назва сорту ЄС Тріо

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

25.02.2008

Свідчення про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	від округленої до лопатоподібної	4
3	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	ледь похиле	3
5	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	від середнього до пізнього	6
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	помірне	5
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	сильне	7
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на щойно з'явлених пиляках)	сильне	7
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	щільне	7
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	малий (5-25)	3
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	ледь відхилене	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	відсутня або дуже мала до 5	1
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	середній	5
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	наявне	9
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	сильна	7
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	середня від 31 до 40	5
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	коротка	3
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	короткі	3
22	Лише для samozапильних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	короткий (15-18)	3
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	середня від 15 до 18	5
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	зубоподібний	4
32	Качан: колір верхівки зернини	оранжевий	5
33	Качан: колір низу зернини	оранжевий	5
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє	1
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	ознака не визначається	0

Заявка №: 06004042

Вид: Кукурудза

Zea mays L

Назва сорту Аттракт

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

25.02.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2
3	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листкової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	ледь похиле	3
5	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	від середнього до пізнього	6
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	помірне	5
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	сильне	7
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на шойно з'явлених пиляках)	помірне	5
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	середньої щільності	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	5
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	ледь відхилене	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	середній	5
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	наявне	9
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	сильна	7
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	середня від 31 до 40	5
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	коротка	3
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	короткі	3
22	Лише для самозапильних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	короткий (15-18)	3
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	середня від 15 до 18	5
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	зубоподібний	4
32	Качан: колір верхівки зернини	оранжевий	5
33	Качан: колір низу зернини	оранжевий	5
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє	1
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	ознака не визначається	0

Заявка №: 06004043

Вид: Кукурудза

Zea mays L

Назва сорту Бігстар

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

25.02.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	ледь похиле	3
5	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	від раннього до середнього	4
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	слабке	3
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	сильне	7
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на шойно з'явлених пиляках)	слабке	3
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	середньої щільності	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	малий (5-25)	3
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	ледь відхилене	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	від раннього до середнього	4
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	наявне	9
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	слабка	3
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	середня від 31 до 40	5
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	середня	5
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	короткі	3
22	Лише для самозапильних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	коротка від 5.1 до 10	3
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	короткий (15-18)	3
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	середня від 15 до 18	5
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	зубоподібний	4
32	Качан: колір верхівки зернини	жовто-оранжевий	4
33	Качан: колір низу зернини	оранжевий	5
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє	1
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	ознака не визначається	0

Заявка №: 06004044

Вид: Кукурудза

Zea mays L

Назва сорту ХЛ 2017

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію № 08116

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листкової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	похиле	5
5	Стебло: зигзагоподібність	сильна	3
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	ранній	3
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	відсутнє або дуже слабке	1
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	помірне	5
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на щойно з'явлених пиляках)	відсутнє або дуже слабке	1
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	середньої щільності	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	5
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	похиле	5
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	ранній	3
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	відсутнє	1
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	відсутня або дуже слабка	1
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	середня від 31 до 40	5
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	середня	5
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	середні	5
22	Лише для самозапильних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	короткий (15-18)	3
28	Качан: діаметр (посередені) см	середній від 3,1 до 4,0	5
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	мала від 9 до 14	3
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	зубоподібний	4
32	Качан: колір верхівки зернини	жовто-оранжевий	4
33	Качан: колір низу зернини	оранжевий	5
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	сильна	7

Заявка №: 06004045

Вид: Кукурудза

Zea mays L

Назва сорту ХЛ 2093

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію № 08117

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листкової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	похиле	5
5	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	ранній	3
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	слабке	3
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	сильне	7
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на щойно з'явлених пиляках)	помірне	5
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	середньої щільності	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	5
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	сильно похиле	7
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	ранній	3
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	наявне	9
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	слабка	3
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	середня від 31 до 40	5
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	довга	7
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	короткі	3
22	Лише для самозапильних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	коротка від 5,1 до 10	3
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	короткий (15-18)	3
28	Качан: діаметр (посередені) см	середній від 3,1 до 4,0	5
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	мала від 9 до 14	3
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	зубовий	5
32	Качан: колір верхівки зернини	жовто-оранжевий	4
33	Качан: колір низу зернини	оранжевий	5
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	помірна	5

Заявка №: 06004046

Вид: Кукурудза

Zea mays L

Назва сорту ХЛ 2222

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію № 08118

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	похиле	5
5	Стебло: зигзагоподібність	сильна	3
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	від раннього до середнього	4
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	відсутнє або дуже слабке	1
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	помірне	5
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на щойно з'явлених пиляках)	сильне	7
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	середньої щільності	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	5
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	похиле	5
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	від раннього до середнього	4
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	наявне	9
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	слабка	3
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	середня від 31 до 40	5
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	довга	7
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	середні	5
22	Лише для самозапильних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	коротка від 5,1 до 10	3
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	короткий (15-18)	3
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	мала від 9 до 14	3
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	зубоподібний	4
32	Качан: колір верхівки зернини	жовтий	3
33	Качан: колір низу зернини	оранжевий	5
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	помірна	5

Заявка №: 06004050

Вид: Кукурудза

Zea mays L

Назва сорту Мотрин 178 СВ

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2009

Свідоцтво про державну реєстрацію № 09114

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	від округленої до лопатоподібної	4
3	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листкової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	похиле	5
5	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	відсутнє або дуже слабке	1
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослини)	від середнього до пізнього	6
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	відсутнє або дуже слабке	1
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	слабке	3
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на щойно з'явлених пиляках)	відсутнє або дуже слабке	1
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	середньої щільності	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	5
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	ледь відхилене	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	від середнього до пізнього	6
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	наявне	9
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	слабка	3
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	середня від 31 до 40	5
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	коротка	3
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	середні	5
22	Лише для самозанильних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана). см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	короткий (15-18)	3
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	середня від 15 до 18	5
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	зубовий	5
32	Качан: колір верхівки зернини	жовтий	3
33	Качан: колір низу зернини	оранжевий	5
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	сильна	7



Заявка №: 06004063

Вид: Кукурудза

Zea mays L

Назва сорту Кіодас

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2009

Свідоцтво про державну реєстрацію № 09139

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листкової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	похиле	5
5	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	від середнього до пізнього	6
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	помірне	5
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	слабке	3
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на щойно з'явлених пиляках)	помірне	5
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	середньої щільності	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	5
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	ледь відхилене	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	пізній	7
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	наявне	9
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	помірна	5
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	довга від 41 до 50	7
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	коротка	3
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	короткі	3
22	Лише для самозапилюючих ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	середній (19-22)	5
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	мала від 9 до 14	3
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	зубовий	5
32	Качан: колір верхівки зернини	жовтий	3
33	Качан: колір низу зернини	жовтий	3
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	сильна	7

Заявка №: 06004067

Вид: Кукурудза

Zea mays L

Назва сорту Бистриця 400 МВ

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2009

Свідоцтво про державну реєстрацію № 09145

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	похиле	5
5	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	пізній	7
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	слабке	3
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	сильне	7
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на щойно з'явлених пиляках)	відсутнє або дуже слабке	1
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	середньої щільності	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	5
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	ледь відхилене	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	від середнього до пізнього	6
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	наявне	9
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	слабка	3
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	середня від 31 до 40	5
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	коротка	3
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	короткі	3
22	Лише для самозапильних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	дуже довга понад 200	9
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	середній (19-22)	5
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	мала від 9 до 14	3
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	зубовий	5
32	Качан: колір верхівки зернини	жовтий	3
33	Качан: колір низу зернини	жовто-оранжевий	4
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	сильна	7

Заявка №: 06004069

Вид: Кукурудза

Zea mays L

Назва сорту Почаївський 190 МВ

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2009

Свідство про державну реєстрацію № 09115

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листкової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	похиле	5
5	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	ранній	3
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	відсутнє або дуже слабке	1
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	слабке	3
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на шойно з"явлених пиляках)	слабке	3
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	середньої щільності	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	5
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	ледь відхилене	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	ранній	3
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	наявне	9
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	відсутня або дуже слабка	1
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	середня від 31 до 40	5
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	коротка	3
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	короткі	3
22	Лище для самозапилюючих ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лище для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	короткий (15-18)	3
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	середня від 15 до 18	5
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	зубовий	5
32	Качан: колір верхівки зернини	жовто-оранжевий	4
33	Качан: колір низу зернини	оранжевий	5
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	сильна	7

Заявка №: 06004080

Вид: Кукурудза

Zea mays L

Назва сорту Кіпарус

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2009

Свідчення про державну реєстрацію № 09140

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	похиле	5
5	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослини)	від середнього до пізнього	6
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	відсутнє або дуже слабке	1
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	слабке	3
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на щойно з'явлених пиляках)	відсутнє або дуже слабке	1
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	середньої щільності	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	5
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	від середнього до пізнього	6
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	відсутнє	1
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	відсутня або дуже слабка	1
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	середня від 31 до 40	5
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	коротка	3
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	короткі	3
22	Лише для самозапильних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	дуже довга понад 200	9
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	короткий (15-18)	3
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	мала від 9 до 14	3
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	зубовий	5
32	Качан: колір верхівки зернини	жовтий	3
33	Качан: колір низу зернини	оранжевий	5
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	сильна	7

Заявка №: 06004083

Вид: Кукурудза

Zea mays L

Назва сорту П9571

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2009

Свідоцтво про державну реєстрацію № 09141

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	похиле	5
5	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	середній	5
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	слабке	3
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	сильне	7
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на щойно з'явлених пиляках)	відсутнє або дуже слабке	1
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	середньої щільності	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	5
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	відсутня або дуже мала до 5	1
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	середній	5
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	наявне	9
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	слабка	3
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	середня від 31 до 40	5
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	коротка	3
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	короткі	3
22	Лише для самоzapильних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	короткий (15-18)	3
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	середня від 15 до 18	5
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	зубовий	5
32	Качан: колір верхівки зернини	жовто-оранжевий	4
33	Качан: колір низу зернини	оранжевий	5
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	сильна	7

Заявка №: 06004086

Вид: Кукурудза

Zea mays L

Назва сорту ПР39Г93

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2009

Свідоцтво про державну реєстрацію № 09117

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	ледь похиле	3
5	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	дуже сильне	9
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	ранній	3
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	дуже сильне	9
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	помірне	5
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на щойно з'явлених пиляках)	сильне	7
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	середньої щільності	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	5
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	похиле	5
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	середня від 15 до 26	5
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	ранній	3
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	наявне	9
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	слабка	3
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	середня від 31 до 40	5
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	середня	5
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	середні	5
22	Лише для самозапильних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	середній (19-22)	5
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	мала від 9 до 14	3
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	проміжний	3
32	Качан: колір верхівки зернини	жовто-оранжевий	4
33	Качан: колір низу зернини	оранжевий	5
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	сильна	7

Заявка №: 06004088

Вид: Кукурудза

Zea mays L

Назва сорту ПР39Б93

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2009

Свідоцтво про державну реєстрацію № 09118

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	похиле	5
5	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	від раннього до середнього	4
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	відсутнє або дуже слабке	1
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	слабке	3
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на щойно з'явлених пиляках)	слабке	3
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	середньої щільності	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	5
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	від раннього до середнього	4
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	наявне	9
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	слабка	3
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	середня від 31 до 40	5
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	коротка	3
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	середні	5
22	Лише для самоzapильних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	короткий (15-18)	3
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	середня від 15 до 18	5
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	зубоподібний	4
32	Качан: колір верхівки зернини	жовтий	3
33	Качан: колір низу зернини	оранжевий	5
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	сильна	7

Заявка №: 06004089

Вид: Кукурудза

Zea mays L.

Назва сорту ПР38М27

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2009

Свідоцтво про державну реєстрацію № 09142

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	похиле	5
5	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	від середнього до пізнього	6
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	відсутнє або дуже слабке	1
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	сильне	7
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на щойно з'явлених пиляках)	слабке	3
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	середньої щільності	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	5
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	від середнього до пізнього	6
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	наявне	9
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	слабка	3
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	середня від 31 до 40	5
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	коротка	3
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	короткі	3
22	Лише для самозапильних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	коротка від 5,1 до 10	3
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	короткий (15-18)	3
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	середня від 15 до 18	5
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	зубовий	5
32	Качан: колір верхівки зернини	жовтий	3
33	Качан: колір низу зернини	жовто-оранжевий	4
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	сильна	7



Заявка №: 06004092

Вид: Кукурудза

Zea mays L.

Назва сорту Прікслі

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2009

Свідоцтво про державну реєстрацію № 09129

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	ледь похиле	3
5	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	середній	5
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	відсутнє або дуже слабке	1
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	слабке	3
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на шойно з'явлених пиляках)	слабке	3
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	середньої щільності	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	5
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	від раннього до середнього	4
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	наявне	9
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	помірна	5
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	середня від 31 до 40	5
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	коротка	3
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	короткі	3
22	Лише для самозапильних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	дуже довга понад 200	9
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	середній (19-22)	5
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	мала від 9 до 14	3
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	проміжний	3
32	Качан: колір верхівки зернини	жовто-оранжевий	4
33	Качан: колір низу зернини	оранжевий	5
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	помірна	5

Заявка №: 06004096

Вид: Кукурудза

Zea mays L

Назва сорту Токсол

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2009

Свідоцтво про державну реєстрацію № 09149

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	малий (6-25)	3
4	Листок: положення листової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	ледь похиле	3
5	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	від пізнього до дуже пізнього	8
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	відсутнє або дуже слабке	1
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	помірне	5
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на шойно з'явлених пиляках)	відсутнє або дуже слабке	1
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	нешільне	3
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	5
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	ледь відхилене	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	дуже пізній	9
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	наявне	9
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	слабка	3
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	довга від 41 до 50	7
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	середня	5
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	середні	5
22	Лише для самозапилюваних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	дуже довга понад 200	9
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	середній (19-22)	5
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	середня від 15 до 18	5
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	зубовий	5
32	Качан: колір верхівки зернини	жовтий	3
33	Качан: колір низу зернини	жовто-оранжевий	4
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	помірна	5

Заявка №: 06004120

Вид: Кукурудза

Zea mays L.

Назва сорту НК Хеліко

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2009

Свідоцтво про державну реєстрацію № 09146

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	дуже сильне	9
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	малий (6-25)	3
4	Листок: положення листової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	ледь похиле	3
5	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	від середнього до пізнього	6
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	помірне	5
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	сильне	7
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на шойно з "явлених пиляках)	слабке	3
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	середньої щільності	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	5
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	пізній	7
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	наявне	9
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	помірна	5
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	середня від 31 до 40	5
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	коротка	3
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	середні	5
22	Лише для самозапилюючих ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	дуже довга понад 200	9
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	широка від 10.1 до 12.0	7
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	середній (19-22)	5
28	Качан: діаметр (посередені) см	дуже великий понад 5	9
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	середня від 15 до 18	5
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	зубовий	5
32	Качан: колір верхівки зернини	жовто-оранжевий	4
33	Качан: колір низу зернини	жовто-оранжевий	4
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	сильна	7

Заявка №: 07004027

Вид: Кукурудза

Zea mays L

Назва сорту ЕС Інберроу

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2009

Свідоцтво про державну реєстрацію № 09119

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	сильно похиле	7
5	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	дуже сильне	9
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	ранній	3
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	помірне	5
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	помірне	5
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на шойно з'явлених пиляках)	слабке	3
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	щільне	7
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	5
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	3
15	Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)	ранній	3
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	наявне	9
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	помірна	5
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	середня від 31 до 40	5
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	коротка	3
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	короткі	3
22	Лише для самозапилюючих ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	довга від 151 до 200	7
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	1
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	короткий (15-18)	3
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	середня від 15 до 18	5
31	Качан: тип зернини (в центральній третині качана)	кременистоподібний	2
32	Качан: колір верхівки зернини	жовто-оранжевий	4
33	Качан: колір низу зернини	оранжевий	5
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9
35	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	помірна	5

## ОФІЦІЙНІ ОПИСИ СОРТІВ І ГІБРИДІВ СОРГО ЗЕРНОВОГО

Заявка №: 05064003

Вид: Сорго зернове

*Sorghum bicolor* (L.) Moench

Назва сорту Бургго

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

23.01.2008

Свідоцтво про державну реєстрацію №

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення колеоптиля	відсутнє або дуже слабке	1
2	Паросток: антоціанове забарвлення дорсального боку першого листка	відсутнє або дуже слабке	1
3	Паросток: антоціанове забарвлення пазухи першого листка	відсутнє або дуже слабке	1
4	Листок: антоціанове забарвлення пластинки (стадія п'ятого листка)	помірне	5
5	Рослина: час викидання волоті (50% рослин з волоттю)	ранній	3
6	Рослина: за висотою під час викидання волоті	дуже низька	1
7	Листок: зелене забарвлення пластинки (за викидання волоті)	помірне	5
8	Прапорцевий листок: поширення обезбарвлення середньої жилки (за викидання волоті)	помірне	5
9	Прапорцевий листок: інтенсивність зеленого забарвлення середньої жилки у порівнянні з пластинкою листка (якщо не обезбарвлена, викидання волоті)	світліше	1
10	Прапорцевий листок: жовте забарвлення середньої жилки (за викидання волоті)	сильне	7
11	Колоскова луска: забарвлення під час цвітіння	жовто-зелене	3
12	Колоскова луска: антоціанове забарвлення (під час цвітіння)	відсутнє або дуже слабке	1
13	Колоскова луска: антоціанове забарвлення опушення (під час цвітіння)	відсутнє або дуже слабке	1
14	Нижня квіткова луска: розвиток устяка (під час цвітіння)	відсутній або дуже слабкий	1
15	Приймочка: антоціанове забарвлення (під час цвітіння)	відсутнє або дуже слабке	1
16	Приймочка: жовте забарвлення (під час цвітіння)	помірне	5
17	Приймочка: за довжиною (як для 12)	середня	5
18	Квітка з квітконіжкою: за довжиною квітки (під час цвітіння)	середня	5
19	Волоть: щільність в кінці цвітіння	помірна	5
20	Сухі тичинки: забарвлення (після цвітіння)	оранжево-червоне	4
21	Рослина: за висотою (за досягання)	дуже низька	1
22	Стебло: за товщиною (верхньої третини рослини за досягання)	тонке	3
23	Листок: за довжиною пластинки третього листка від верхівки (за досягання)	середній	5
24	Листок: за шириною пластинки (за досягання)	вузький	3
25	Волоть: за довжиною без шийки (за досягання)	середня	5
26	Волоть: довжина гілочок (всередній третині волоті)	середні	5
27	Волоть: щільність (за досягання)	помірна	5
28	Волоть: форма (за досягання)	симетрична	3
29	Шийка волоті: видима довжина над пазухою (обгорткою, за досягання)	середня	5
30	Колоскова луска: забарвлення за досягання	чорне	7
31	Колоскова луска: за довжиною (за досягання)	середня	5
32	Зернівка: забарвлення після досягання	світло-коричневе	7
33	Маса 1000 зерен	велика	7
34	Зернівка: форма зі спинки	округла	7
35	Зернівка: форма в профіль	еліптична	5
36	Зернівка: розмір зародка	великий	7
37	Зернівка: поверхня, вкрита насінною шкіркою	середня	5
38	Зернівка: вміст таніну	відсутній або дуже низький	1
39	Зерно: структура ендосперму (в подовжному розрізі)	на 1/2 склоподібна	5
40	Зерно: забарвлення склоподібного ендосперму	жовте	3

Заявка №: 06064008

Вид: Сорго зернове

*Sorghum bicolor* (L.) Moench

Назва сорту ПР88У20

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2009

Свідоцтво про державну реєстрацію № 09165

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення колеоптиля	відсутнє або дуже слабке	1
2	Паросток: антоціанове забарвлення дорсального боку першого листка	відсутнє або дуже слабке	1
3	Паросток: антоціанове забарвлення пазухи першого листка	відсутнє або дуже слабке	1
4	Листок: антоціанове забарвлення пластинки (стадія п'ятого листка)	відсутнє або дуже слабке	1
5	Рослина: час викидання волоті (50% рослин з волоттю)	середній	5
6	Рослина: за висотою під час викидання волоті	низька	3
7	Листок: зелене забарвлення пластинки (за викидання волоті)	помірне	5
8	Прапорцевий листок: поширення обезбарвлення середньої жилки (за викидання волоті)	помірне	5
9	Прапорцевий листок: інтенсивність зеленого забарвлення середньої жилки у порівнянні з пластинкою листка (якщо не обезбарвлена, викидання волоті)	однакове	2
10	Прапорцевий листок: жовте забарвлення середньої жилки (за викидання волоті)	слабке	3
11	Колоскова луска: забарвлення під час цвітіння	світло-зелене	2
12	Колоскова луска: антоціанове забарвлення (під час цвітіння)	відсутнє або дуже слабке	1
13	Колоскова луска: антоціанове забарвлення опушення (під час цвітіння)	відсутнє або дуже слабке	1
14	Нижня квіткова луска: розвиток устюка (під час цвітіння)	відсутній або дуже слабкий	1
15	Приймочка: антоціанове забарвлення (під час цвітіння)	відсутнє або дуже слабке	1
16	Приймочка: жовте забарвлення (під час цвітіння)	відсутнє або дуже слабке	1
17	Приймочка: за довжиною (як для 12)	середня	5
18	Квітка з квітконіжкою: за довжиною квітки (під час цвітіння)	середня	5
19	Волоть: щільність в кінці цвітіння	помірна	5
20	Сухі тичинки: забарвлення (після цвітіння)	оранжеве	3
21	Рослина: за висотою (за досягання)	низька	3
22	Стебло: за товщиною (верхньої третини рослини за досягання)	тонке	3
23	Листок: за довжиною пластинки третього листка від верхівки (за досягання)	середній	5
24	Листок: за шириною пластинки (за досягання)	широкий	7
25	Волоть: за довжиною без шийки (за досягання)	середня	5
26	Волоть: довжина гілочок (всередній третині волоті)	середні	5
27	Волоть: щільність (за досягання)	помірна	5
28	Волоть: форма (за досягання)	симетрична	3
29	Шийка волоті: видима довжина над пазухою (обгорткою, за досягання)	довга	7
30	Колоскова луска: забарвлення за досягання	темно-червоне	6
31	Колоскова луска: за довжиною (за досягання)	коротка	3
32	Зернівка: забарвлення після досягання	жовтувато-біле	3
33	Маса 1000 зерен	середня	5
34	Зернівка: форма зі спинки	округла	7
35	Зернівка: форма в профіль	еліптична	5
36	Зернівка: розмір зародка	великий	7
37	Зернівка: поверхня, вкрита насінною шкіркою	мала	3
38	Зернівка: вміст таніну	відсутній або дуже низький	1
39	Зерно: структура ендосперму (в подовжному розрізі)	на 3/4 крохмалиста	7
40	Зерно: забарвлення склоподібного ендосперму	біле	1

ОФІЦІЙНЕ ВИДАННЯ

# ОХОРОНА ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН

PLANT VARIETY RIGHTS PROTECTION

Офіційний бюлетень  
OFFICIAL BULLETIN

Номер підготували: Таганцова М. М.,  
Безручко О. І.,  
Гаврилянчик В. С.,  
Гоцуєнко Л. М.

Підписано до друку 20.08.2009 року. Формат 60x84 1/8. Папір офсетний.  
Гарнітура Times. Ум.-др. арк. 18,88. Тираж 250 пр.  
Зам. 10/22-2009

Віддруковано у ТОВ "Алефа" з оригінал-макета замовника.  
Адреса видавництва: вул. Празька, 18, офіс 3, м. Київ, Україна, 02090,  
тел. / факс: (044) 528-80-30. E-mail: alefaa@ukr.net  
Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 306 від 28.12.2000 р.