




МІНІСТЕРСТВО
РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ
ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
MINISTRY FOR DEVELOPMENT OF ECONOMY, TRADE
AND AGRICULTURE OF UKRAINE
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ
ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН
UKRAINIAN INSTITUTE FOR PLANT VARIETY EXAMINATION

ОХОРОНА ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН

PLANT VARIETY RIGHTS PROTECTION

Офіційне видання
Official publication

Бюлетень
Bulletin



6
2020

Вінниця
2020



МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ
ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
MINISTRY FOR DEVELOPMENT OF ECONOMY, TRADE AND AGRICULTURE OF UKRAINE
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН
UKRAINIAN INSTITUTE FOR PLANT VARIETY EXAMINATION

ОХОРОНА ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН

PLANT VARIETY RIGHTS PROTECTION

Бюлетень
Свідоцтво КВ № 22460-1236 ПР
від 01.03.2017

Видається
6 разів на рік

Заснований
24 січня 2003 р.

Випуск 6, 2020



Український інститут
експертизи сортів рослин
UKRAINIAN INSTITUTE FOR
PLANT VARIETY EXAMINATION

Головний редактор
Мельник С. І.

Editor-in-chief
S. Melnyk

Редакційна колегія
Лещук Н. В.
(заступник головного редактора)
Павлюк Н. В.
(відповідальний секретар)

Editorial board
N. Leshchuk
(deputyies editor-in-chief)
N. Pavlyuk
(executive secretary)

Ткачик С. О.	S. Tkachyk
Києнко З. Б.	Z. Kyienko
Васьківська С. В.	S. Vaskivska
Гринів С. М.	S. Gryniv
Стариченко Є. М.	Y. Starychenko
Хоменко Т. М.	T. Khomenko
Попова О. П.	O. Popova
Якубенко Н. Б.	N. Yakubenko

6
2020

м. Вінниця
ТОВ «ТВОРИ»
2020

УДК 347.77:633(055)

0-92

Охорона прав на сорти рослин: Бюлетень / Український інститут експертизи сортів рослин. Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2020. Вип. 6. 705 с.

0-92 Бюлетень видається на виконання Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» з метою організації офіційної інформаційної діяльності у сфері охорони прав на сорти рослин та реалізації міжнародних зобов'язань України, що випливають з її членства в Міжнародному союзі з охорони нових сортів рослин (UPOV).

Поширюється для селекціонерів, власників майнових прав інтелектуальної власності на поширення сортів, володільців патенту, виробників насіння і садивного матеріалу, селекційно-насінницьких фірм, науково-дослідних інститутів, вузів, технікумів. Представляє також інтерес для господарств різної форми власності, городників і садівників.

УДК 347.77:633(055)

Адреса видавця:

Український інститут експертизи сортів рослин,
вул. Генерала Родімцева, 15, м. Київ-41, 03041, Україна,
тел.: +38 044 258-34-56, факс: +38 044 257-99-63
e-mail: sops@sops.gov.ua,
веб-сайт: <http://sops.gov.ua>

ЗМІСТ

Відомості, внесені до Реєстру заявок	7
Заявки на сорти рослин, за якими завершено формальну експертизу і запропоновано назву сорту	7
Заявки на сорти рослин, за якими запропоновано іншу назву сорту	11
Відомості щодо заявок на сорти рослин, за якими прийнято рішення про відмову у державній реєстрації прав на сорт	12
Відкликані заявки або такі, що вважаються відкликаними	13
Інші відомості, внесені до Реєстру заявок	14
Відомості щодо зміни назви сорту рослин	15
Відомості щодо зміненої та ухваленої назви сорту рослин	16
Відомості щодо ухваленої назви сорту рослин	17
Відомості, внесені до Реєстру патентів	24
Відомості про сорти рослин, щодо яких прийнято рішення про державну реєстрацію прав на сорт та внесені до Реєстру патентів	24
Відомості про видані патенти на сорти рослин та їхньої завіреної копії	30
Відомості щодо припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин та визнання їх не чинними	31
Відомості про відновлення чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорти рослин	32
Інші відомості, внесені до Реєстру патентів	33
Відомості, внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні (Реєстр сортів рослин України)	34
Відомості про сорти рослин, щодо яких прийнято рішення про державну реєстрацію прав на сорт та внесені до Реєстру сортів рослин України	34
Відомості щодо припинення чинності майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослин	51
Відомості щодо відновлення чинності майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослин	52
Інші відомості, внесені до Реєстру сортів рослин України	53
Каталог сортів рослин, придатних для поширення в Україні	57
Відомості про сорти рослин, які включено до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні	57
Офіційні описи сортів рослин та показники господарської придатності	
Сільськогосподарські:	
злаки	
<i>Жито посівне (озиме)</i>	
Алатир	
Амей	
Верша	
Еліас	
КВС Пропауер	
Ласкаве	
Оріана	
<i>Жито посівне (озиме) – батьківський компонент</i>	
ЛСР 153	
МСГ 2135	
РГ 1124	
<i>Кукурудза восковидна</i>	
Твістер	
<i>Кукурудза звичайна</i>	89
Адей	89
АМАЗОН	90
Б2114Ц	91
Б3316С	92
Б3545Д	93
БАГРОВО	94
Балта	95
БІГБІТ	96
Валат	97
Вебер	98
Гебалот	99
ГІМОВ	100
Глуманда	101
Девіс	102
ДЕЛАНО	103
Дженні	104
ДЗ Шквал	105
ДН Анаїт	106
ДН Атон	107
ДН Велд	108
ДН Джура	109
ДН Пульсація	110
ДН Сінрай	111
ДН Стяг	112
ДС1897Б	113
Дулкано	114
ЕЛЬДАКАР	115
Ервінга	116
ЕС Орільскай	117
Зума	118
ІМПРЕССІВО	119
КАМЕО	120
Кардіф	121
КВС АДАЖІО	122
КВС БІСТРО	123
КВС БУРІТО	124
КВС ГЕНДАЛЬФ	125
КВС ДЖОРДЖІО	126
КВС ДИНАМО	127
КВС ІНТЕЛЕГЕНС	128
КВС КАЛАФУНА	129
КВС ЛАУРО	130
КВС ПАУЛО	131
КВС ПРОВІЗО	132
КВС РАМІРО	133
КВС ФОРТУНАТО	134
КМ 3130	135
КМ 3260	136
КМ 3310	137
КМ 4100	138
Контенто	139
Кросбі	140
ЛГ 31330	141
Леонідо	142
ЛЕОНОВО	143
ЛУКАКУ	144
МАС 16Б	145
Нокс	146
ПО200	147
ПО217	148
ПО268	149
ПО312	150
ПО349	151
ПО362	152
П7515	153
П7948	154
П8271	155
П8329	156

П8358	157	КВ 7П1484	213	ГЕРМА	265	Тритикале (яре)	309
П8666	158	КВ 7ФП1503	214	Гефест	266	Скарб харківський	309
П9071	159	КВ 9ЕЙ0043	215	ГК Корос	267		
П9074Е	160	КВ 9ЕЙ0046	216	Гладь	268	Ячмінь звичайний	
П9300	161	КВ 9ЕЙ0067	217	ГОРИНЯ	269	(озимий)	310
П9361	162	КВ 9ЕЙ0069	218	Громада	270	Аренія	310
П9363	163	КВ 9ЕЙ0070	219	Діжон	271	Белісса	311
П9610	164	КВ 9ЕЙ0071	220	ДОБРОВІТ	272	Белла	312
П9757	165	КВСЕК 537	221	Емблем	273	Гіронделла	313
П9874	166	Крос245М	222	Ефектна	274	КАЙЛІН	314
П9889	167	Крос272М	223	ЗЛАТАНА	275	Крікс	315
П9978	168	Крос368М	224	Золотце	276	Непереможний	316
РЖТ ЕККЗАКТ	169	Крос454М	225	ІСТА	277	СИ КОМЕТ	317
РЖТ ІРЕНОККС	170	ЛЖН2098	226	Київська 19	278		
РЖТ КОККСІНЕЛЛЬ	171	ЛКФ2757	227	Крепиш	279	Ячмінь звичайний	
РЖТ МІКАЕЛІККС	172	ЛМР3185	228	ОРЖИЦЯ НОВА	280	(озимий) –	
РЖТ СІНФОНІККС	173	ЛПХ3916	229	Основа одеська	281	батьківський	
РЖТ ФЕРАРІККС		ЛПХ3917	230	Перемога одеська	282	компонент	318
ВАКСІ	174	ПК 1116 М	231	Пирятинка	283	Ф1Ф180	318
СКАНДИНАВ	176	ПК 114	232	Пітон	284		
СПАРТАН	177	ПК 1313	233	Проня	285	Ячмінь звичайний	
Юренга	178	ПК 155	234	Світязь	286	(ярий)	319
		ПК 210	235	Сідоніус	287	АББА	319
		ПК 211	236	Сомельє	288	АМІДАЛА	320
Кукурудза звичайна –		Р13036	237	Тоннаж	289	Арей	321
батьківський		Р15076	238	Трублiон	290	Ескалена	322
компонент	179	Р17065	239	Фортеця Поліська	291	Кречет	323
А32879	179	Р17098	240	Херсонська		МІП Акцент	324
А5472	180	Р18020	241	Фортеця	292	МІП Люкс	325
АГ2016	181	РФА58ІІ	242	Цеціліус	293	Перспект	326
АГЖ535	182	СМ395	243	Шеріф	294	Реванш	327
АГЖ955	183			Ювілейна Патона	295		
АС3512СЦ	184					Сільськогосподарські:	
ДК3172 3М	185	Овес голозерний	244			бобові	
ДК3173 3М	186	Родоніт	244	Пшениця м'яка		Горох посівний	
ДК3173М	187			(яра)	296	(зерновий)	329
ДК3938МВ	188	Овес посівний		ВПБ Трой	296	Білий ангел	329
ДК4168М	189	(ярий)	245	КВС Старлайт	297		
ДК4168СВ3М	190	Азамат	245	Токата	298		
ДК4540СВ3М	191	Ерл	246			Квасоля звичайна	
ДК7400М	192	Матрос	247	Пшениця спельта		(зернова)	331
ДК7400СВ3М	193			(озима)	299	Журавка	331
ДК7443М	194	Пшениця м'яка		Вишиванка		Подольанка	332
ІКС 250 М	195	(озима)	248	білоцерківська	299		
ІКС 259 3М	196	Агота	248			Нут звичайний	333
ІКС 349 3С	197	Адїса	249	Пшениця тверда		Бланко	333
К147	198	Академічна 100	250	(озима)	300		
КВ 1Ф1815	199	Аквілегія	251	Алмазний	300	Соя культурна	334
КВ 1ФЛ7015	200	Анрі	252	Діадур	301	ААЦ Інвест 1605	334
КВ 4ЕХ1631	201	Арабатка	253	Янтарний	302	Адесса	335
КВ 4ЕЦ1728	202	Архітект	254			Акардія	336
КВ 4ЕЦ1732	203	Аскабан	255	Пшениця тверда		Амбелла	337
КВ 4П1336	204	Асорі	256	(яра)	303	Ангеліка	338
КВ 4ФП1573	205	Астерія	257	Альжбета	303	Атакама	339
КВ 4ФП1579	206	АФК ЕЛІТ ГРЕЙН	258	Меїса	304	Паллада	340
КВ 5Г7544	207	АФК ПАУЕР	259			Райдо	341
КВ 5ФЛ5018	208	АФК СТРОНГ	260	Тритикале (озиме)	305	РЖТ СФІНКСА	342
КВ 6ЕЙ0052	209	Бригантіна	261	Єлань	305	СОЛЕНА	343
КВ 7ЕХ1761	210	Відповідь одеська	262	Леонтій	306	Титан	344
КВ 7ЕХ1764	211	Гадзінка	263	Мироносець	307	Чураївна	345
КВ 7ЕЦ1789	212	Гейзер	264	Пудік	308	ЯКАРІ	346

Сільськогосподарські:		ИНВУЕЛО	381	MAC 865IP	464	Сільськогосподарські:	
круп'яні		КВІТО	382	MAC 920КП	466	буряк	
Гречка їстівна	348	Людгер	383	П63ГГ142	468	Буряк цукровий	538
Володар	348	ПАРКУРС	384	П64ГГ150	470	АЛЬВЕРІНА КВС	538
Покровська	349	ПХ131	385	П64ЛЕ153	472	БЕНІАМІНА КВС	539
Христина	350	СИ ІОВА	386	П64ЛЛ155	474	СМАРТ	
		СИ ФЛОРІАН	387	Реасан	476	ДЖЕРБА КВС	540
Лобода кіноа	351	Сімплекс КЛ	388	РЖТ КАПІТОЛЛ	478	СМАРТ	
Олімп	351	ТАЛЕЛ КЛ	389	Текадра	480	ДЖІНЕВРА КВС	541
		ТЕМПО	390	ТРАВЕЛЛЕР	482	СМАРТ ІБЕРІЯ КВС	542
Просо посівне	352	Шопен	391	Тріполі	484	СМАРТ ЛАТОРІЯ КВС	543
Дивовижне	352			Уносан	486	СМАРТ ЛЕОНА КВС	544
Казкове джерело	353	Ріпак (озимий) –		Флорасан	488	СМАРТ ЯСНА КВС	545
Корнбергер		батьківський		Фортасол	490	ФДР19Б1123	546
Міттельфрьюе	354	компонент	392	ФОРТЕРА	492	ФДР19Б2094	547
		ЕСР1064	392	Хайсан 189 СУ	494	ФДР19Б4027	548
		ЕСФ2014ЦМС	393	Хайсан 195 ІТ	496		
Сорго звичайне				Хайсан 268 ІТ	498	Сільськогосподарські:	
(двокольорове)	355	Ріпак (ярий)	394	ХОРОЛ	500	картопля	
КВС НЕМЕСІС	355	ИНВ110 КЛ	394			Картопля	550
КВС РАСМУС	356	Караміно КЛ	395	Соняшник однорічний –		7 ФОР 7	550
РЖТ АЛІГГАТОР	357	Клауд КЛ	396	батьківський		АЛЮЕТТ	551
Сентініел ІГ	358	Колет КЛ	397	компонент	502	Княжа	552
Сріблясте	359	Перформер	398	85П10Р	502	ЛАУДІН	553
		Чеві КЛ	399	АС ХДЖ 9	503	Містерія	554
Сільськогосподарські:				АС15А	504	ПАРАДІЗО	555
олійні та прядивні				ДС 33 А	505	РАНОМІ	556
Арахіс підземний	361	Соняшник		ДС 33 Б	506	Родріга	557
Кремена	361	однорічний	400	ДС 53 Б	507	ФОНТАНЕ	558
Цветеліна	362	Алекса СУ	400	ДС 78 В	508	Шері	559
		АУСТІН	402	ДС 8 Б	509		
Гірчиця сарептська		Барон	404	ДС 83 А	510	Сільськогосподарські:	
(яра)	363	Булерія	406	ДС 88 В	511	кормові	
Корона	363	ВАДОР	408	ДС33АДС53Б	512	Горошок посівний	
Сінтіум	364	Гранд Адмірал	410	ДС83АДС58Б	513	(ярий)	561
		Гуара	412	ЕХ500СУЛ	514	Володимир	561
Коноплі посівні	365	Даверо СУ	414	ЛГ13013МЖА	515		
Артеміда	365	ДЖУЛІУС	416	ОВ10Б	516	Кострице-райграсовий	
		ЕС Бонум	418	Р10019МІ	517	гібрид	562
Льон звичайний,		ЕС Ортус	420	Р4НП8МЖІ	518	ПАНІЯ ДС	562
довгунець	366	ЕС Прімум	422	Р5ХІЗМЖС	519		
Сіверський	366	ЕС Фортем	424	Р8035М2Ж	520	Люпин	
Усівський	367	ЕС Харді	426	Р8035МЖС	521	вузьколистий	563
		ЗУРО 162	428	Рф1010	522	Юліан	563
Льон низький		Каледонія КЛ	430	Рф1018	523		
(олійний, кудряш)	368	Катрін	432	Рф1136	524	Люцерна посівна	564
Парус	368	КВС АМОРЕС КЛ	434	Рф3074	525	Адорна	564
		КВС АПАЧІ КЛ	436	СФ1561М2СА	526	Кураж	565
Ріпак (озимий)	369	КВС ПЕРСЕУС КЛ	438	ТРІ3751Р	527	Родена	566
АЛІВІО	369	КВС ЦЕЗАРЕС КЛ	440	ТРІ4748Р	528		
Батис	370	КДВ 2017	442	ТРІ4757Р	529	Пажитниця	
ВІОЛІН	371	Кімера СТ	444	ТРІ4760Р	530	багаторічна	567
Галілеус	372	КОНКВЕСТ	446	ТР04385Р	531	ЕЛЕНА ДС	567
Дайнемік	373	Ласса	448	ТФІ3719А	532		
Донат	374	ЛГ50455 КЛП	450	ТФ03188	533	Сорго суданське	568
ЕС АМАДЕО	375	ЛГ50479 СХ	452	ТФ03288 ТФ03188	534	Мурашка	568
ЕС НАВІГО	376	ЛГ50529 СХ	454	ТФС3780А	535		
ИНВ1170	377	ЛГ50586 КЛП	456	Ф5ДНЗМКА	536	Тритикале	
ИНВ1188	378	Марвін	458			(дворучка)	569
ИНВ1199	379	МАРІСАН	460			Олександра	569
ИНВ1266 КЛ	380	MAC 810Б	462				

Сільськогосподарські:	Оксілус	606	Любаша	636	Цибуля слизун	673
овочеві	Раніні	607	Напока	637	Удай	673
Баклажан	572 РОСБЕРГ	608				
Віронік	572 Таліс	609	Помідор їстівний	638	Сільськогосподарські:	
Джокер	573 Тропикана	610	АНТЕЛАІСІ	638	інші	
Мінерва	574		Гонг	640	Гісон лікарський	675
СВ1574ЕВ	575 Капуста броколі	611	Едімар	642	Небокрай	675
	Вавілон	611	МАКАН	644		
Бугиля кервель	576 Самоа	612	Севен	646	Плодові та ягідні	
Жайворонок	576 СТРІЛІНГ	613	Танок	648	Аронія	
			Фабер	650	чорноплідна	677
Буряк столовий	577 Капуста цвітна	614	Янтарний богатир	651	Всеслава	677
Бреско	577 Арієнзо	614				
	ГРІН СТОРМ	615	Салат посівний		Горіх грецький	678
Гарбуз звичайний	578 Моментум	616	листяний	653	Подільський	678
ГЛ Класік	578 ТРАЙДЕНТ	617	Бартімер	653	Подільський	
	ФЛЕЙМ СТАР	618	Вишиванка	654	Бокоплідний	679
Дворядник			Кулхард	655	Стрижавський	
тонколистий	580 Кукурудза		Лель	656	Паперовий	680
Молодість	580 розлусна	619				
	ДН Карамель	619	Салат посівний		Обліпіха	
Диня звичайна	581 Кукурудза цукрова	620	ромен	657	крушиновидна	681
Ареналес	581 Білий Кролик	620	Лотус	657	Обрій	681
Дейра	583 ДМС Шафран	621			Суниця садова	682
Лукстар	585 ДН Шугарін	622	Салат посівний		ФІ1309	682
МАІЛЛОТ	587 КАМБЕРЛЕНД	623	стебловий	658		
МАКАБЕО	589 Мессенджер	624	Лелека	658		
МІМОЗА	591 НБМ 2020	625	Цибуля городня	659	Яблуна домашня	683
	Роттердам	626	Венус	659	Дміана	683
Кавун звичайний	593		Іроко	660	Мілана	684
Бретона	593		Кореон 1	661		
ГЕРКУЛЕС	594 Морква	627	Мінді	662	Декоративні	
Лузітана	595 Карлано	627	Міннесота	663	та лікарські	
	Каспі	628	Надійна	664	Півонія	686
Капуста	Небіда	629	Ногал	665	Загадка Херсонеса	686
білоголова	Руфіна	630	Ред Флойд	666	Корсар	687
Аструс Плюс	596		Сакраменто	667		
Ботран	597 Огірок посівний	631	СВ4058НЮ	668	Троянда	688
Владіма	598 Бридж	631	Такмарк	669	КОРкут0159	688
ДЕРБЕНТ	599 Джокер	632	Фабула	670		
Дулсіма	600 Джуніор	633	Ялтинська	671	Інші	
Ірма	601 Сармат	634			Павловнія	690
КВАЛІТАТОР	602		Цибуля запашна	672	ЗЕ ПРО	690
КІЛАСІС	603 Перець однорічний		Вишукана	672	ТУРБО ПРО	691
КІЛАСТРЕСС	604 (солодкий)	635			Фенікс	692
ЛАУДА	605 Даціана	635				
Інші відомості						693
Інші відомості Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України						693
Інші відомості Українського інституту експертизи сортів рослин						694
Перелік заявників, підтримувачів сортів, власників сортів, володільців патенту						695
Загальноживані скорочення термінів						703

Відомості, внесені до Реєстру заявок

Notification listed in the Register of applications

Заявки на сорти рослин, за якими завершено формальну експертизу і запропонована назва сорту

Plant varieties applications, with formal examination has been completed and proposed variety denomination

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Назва сорту Variety denomination	Заявник Application	Мета реєстрації (ПС, РС, АС) Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	Автор (и) сорту Author(s) of the variety
Пшениця м'яка (озима) <i>Triticum aestivum</i> L. Soft Wheat (Winter)					
20012039	12.08.2020	ЮСОН YuSON	1751	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Панов Олександр Ігорович Власенко Світлана Володимирівна Масюк Ніна Олексіївна Ямкова Олена Вікторівна
20012040	12.08.2020	Сонцедар Sontsedar	1751	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Солошенко Ольга Вікторівна Ямкова Олена Вікторівна Масюк Ніна Олексіївна Власенко Світлана Володимирівна Панов Олександр Ігорович
20012041	19.08.2020	Гусар Husar	1751	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Панов Олександр Ігорович Масюк Ніна Олексіївна Власенко Світлана Володимирівна Ямкова Олена Вікторівна
Ячмінь звичайний (ярий) <i>Hordeum vulgare</i> L. Barley (Spring)					
20020004	28.09.2020	Авангард Avanhard	2568	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Вінюкова Ольга Борисівна Прокаєв Олександр Сергійович
20020005	28.09.2020	Кряж Kriazh	2568	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Вінюкова Ольга Борисівна Прокаєв Олександр Сергійович
20020006	28.09.2020	Алекс Aleks	2568	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Прокаєв Олександр Сергійович Вінюкова Ольга Борисівна
Вігна промениста (Квасоля золотиста, Маш) <i>Vigna radiata</i> (L.) R. Wilczek (<i>Phaseolus aureus</i> Roxb.) Mung Bean					
20024001	12.10.2020	Бераш Berash	2718	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Бушулян Олег Володимирович Чичета Андрій Борисович
Льон низький (олійний, кудряш) <i>Linum humile</i> Mill. Linseed					
20035002	28.10.2020	Добродар Dobrodar	1702	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Левченко Валентина Іванівна Лях Віктор Олексійович Товстановська Тетяна Григорівна Махно Юлія Олександрівна Ручка Вікторія Олександрівна
20035003	28.10.2020	Лінсан Linsan	1702	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Сорока Анатолій Іванович Товстановська Тетяна Григорівна Махно Юлія Олександрівна Таранець Тетяна Олександрівна Лях Віктор Олексійович Ручка Вікторія Олександрівна
Соняшник однорічний <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower					
20039037	12.10.2020	Тур Tur	1702	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Кутіщева Наталія Миколаївна Щудря Лариса Іванівна Середа Валентина Олексіївна Одинець Сергій Іванович
Ріпак (озимий) <i>Brassica napus</i> L. <i>oleifera</i> Rape Seed (Winter)					
20040060	16.09.2020	Майбах Maibakh	2666	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Парій Юлія Олександрівна Сидоров Андрій Валерійович Бреус Оксана Сергіївна Парій Мирослав Федорович Парій Ярослав Федорович
20040061	16.09.2020	Маркус Markus	2666	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Парій Юлія Олександрівна Бреус Оксана Сергіївна Сидоров Андрій Валерійович Парій Ярослав Федорович Парій Мирослав Федорович

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Назва сорту Variety denomination	Заявник Application	Мета реєстрації (ПС, РС, АС) Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	Автор (и) сорту Author(s) of the variety
20040062	16.09.2020	Квант Kvant	2666	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Парій Мирослав Федорович Сидоров Андрій Валерійович Парій Юлія Олександрівна Бреус Оксана Сергіївна Парій Ярослав Федорович
20040064	27.10.2020	Вегас Vehas	1702	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Тарасова Галина Арнольдівна Комарова Ірина Борисівна Лісняк Ганна Данилівна
20040066	28.10.2020	Скай Skai	1702	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Комарова Ірина Борисівна Сеник Руслана Володимирівна Калінова Марія Григорівна
Соя культурна <i>Glycine max</i> (L.) Merrill Soya Bean					
20045014	05.10.2020	Рината Rynata	1807	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Ляшенко Володимир Митрофанович Матвієць Наталія Мирославівна Куничак Галина Іванівна Дутчак Ольга Василівна Вівчарик Василина Іванівна Матвієць Володимир Григорович
20045015	05.10.2020	Плай Plai	1807	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Матвієць Наталія Мирославівна Матвієць Володимир Григорович Куничак Галина Іванівна Вівчарик Василина Іванівна Дутчак Ольга Василівна Ляшенко Володимир Митрофанович
20045016	12.10.2020	Поєдинок Poiedynok	1702	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Зінченко Олексій Сергійович Донцова Юлія Іванівна Ведмедева Катерина Владиславівна Якубенко Олена Володимирівна Бойко Костянтин Якович
Коріандр посівний (кінза) <i>Coriandrum sativum</i> L. Coriander					
20051001	14.09.2020	Ювілейний Yuvileinyi	1708	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Позняк Олександр Васильович Касян Олександр Іванович Чабан Леся Василівна Кондратенко Сергій Іванович
Фенхель звичайний <i>Foeniculum vulgare</i> Miller Fennel					
20066001	14.09.2020	Гостинець Hostynets	1708	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Позняк Олександр Васильович Кондратенко Сергій Іванович Чабан Леся Василівна Касян Олександр Іванович
Картопля <i>Solanum tuberosum</i> L. Potato					
20088016	13.10.2020	Сенсейшн Sensation	2243	РС, АС NLI, AC	Temmerman Handels
Цибуля городня <i>Allium cepa</i> L. Onion, Echalion					
20106005	14.09.2020	Чайка Chaika	1708	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Позняк Олександр Васильович Біленька Ольга Миколаївна Фесенко Любов Петрівна
Огірок посівний <i>Cucumis sativus</i> L. Cucumber					
20110007	14.09.2020	Олімп Olimp	1708	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Птуха Надія Іванівна Шевченко Олена Юріївна Позняк Олександр Васильович Дяченко Ніна Миколаївна Сергієнко Оксана Володимирівна
Помідор їстівний <i>Solanum lycopersicum</i> L. Tomato					
20115007	01.06.2020	Накаумі Nakaumi	1730	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Maarten Verlaan
20115008	01.06.2020	Хевіозо Heavioso	1730	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Maarten Verlaan
20115009	16.06.2020	Реддері Reddery	1730	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Maarten Verlaan
Ревінь чорноморський <i>Rheum rhaponticum</i> L. Rhubarb					
20116001	14.09.2020	Березіль Berezil	1708	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Кондратенко Сергій Іванович Позняк Олександр Васильович

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Назва сорту Variety denomination	Заявник Application	Мета реєстрації (ПС, РС, АС) Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	Автор (и) сорту Author(s) of the variety
					Касян Олександр Іванович Чабан Леся Василівна
Кріп пахучий <i>Anethum graveolens</i> L. Dill					
20125002	14.09.2020	Делікатесний Delikatesnyi	1708	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Чабан Леся Василівна Касян Олександр Іванович Кондратенко Сергій Іванович Позняк Олександр Васильович
Конюшина лучна (червона) <i>Trifolium pratense</i> L. Red Clover					
20155002	23.06.2020	Любава Liubava	1658	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Жапалеу Галина Зіновіївна Хом'як Марія Михайлівна Стасів Олег Федорович Коник Григорій Станіславович Байструк-Глодан Леся Зіновіївна
20155003	29.09.2020	Мальва Поліська Malva Poliska	1626	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Бочарова Марина Іванівна Міняйло Валентина Дмитрівна Корягін Олексій Михайлович Слюсар Сергій Миколайович Якименко Любов Петрівна
Буряк кормовий <i>Beta vulgaris</i> L. Fodder Beet					
20166001	06.10.2020	Аспор Aspor	1626	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Костенко Олена Іванівна Слюсар Сергій Миколайович Крамар Олександр Степанович Бернацька Марія Миколаївна
Горошок посівний (ярий) <i>Vicia sativa</i> L. Common Vetch (Spring)					
20177001	12.08.2020	Оазис Oazys	1751	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Орлов Станіслав Дмитрович Бровко Сергій Миколайович Гагін Андрій Олександрович Синьогуб Сергій Васильович
Стоколос безостий <i>Bromopsis inermis</i> (Leyss.) Holub Smooth Brome Grass					
20191001	23.06.2020	Карпатський Karpatskyi	1658	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Байструк-Глодан Леся Зіновіївна Жапалеу Галина Зіновіївна Стасів Олег Федорович Хом'як Марія Михайлівна Коник Григорій Станіславович
Райграс високий <i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P. Beauv. ex J. S. et K.B. Presl. Tall Oatgrass					
20223001	23.06.2020	Наруєвицький Nahuievytskyi	1658	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Байструк-Глодан Леся Зіновіївна Коник Григорій Станіславович Хом'як Марія Михайлівна Іванців Руслана Євгенівна Павлів Дарія Юріївна Стасів Олег Федорович
Яблуна домашня <i>Malus domestica</i> Borkh. Apple					
20263007	08.05.2020	Рєа Белліна Rea Bellina	2719	ПС, РС PBR, NLI	
20263008	08.05.2020	Рєа Агата Rea Agata	2719	ПС, РС PBR, NLI	
20263009	04.06.2020	ВА 38 WA 38	2698	ПС PBR	
20263011	22.06.2020	Рєа Кадіс Rea Cadis	2719	ПС, РС PBR, NLI	
20263012	22.06.2020	Рєа Голд Rea Gold	2719	ПС, РС PBR, NLI	
Виноград справжній <i>Vitis vinifera</i> L. Grape, Grapevine					
20304001	14.08.2020	Кекфранкос Kekfrankos	2704 2705	РС NLI	
20304002	14.08.2020	Фурмінт Furmint	2704 2705	РС NLI	
20304003	14.08.2020	Черсегі фюсереш Cserszegi fuzseres	2704 2705	РС NLI	
20304004	06.10.2020	Карбонадо Karbonado	2714	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Бачинський Анатолій Леонідович
20304005	27.10.2020	Альбіна Albina	2714	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Бачинський Анатолій Леонідович
20304006	27.10.2020	Біла Церква Bila Tserkva	2714	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Бачинський Анатолій Леонідович

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Назва сорту Variety denomination	Заявник Application	Мета реєстрації (ПС, РС, АС) Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	Автор (и) сорту Author(s) of the variety
Люцерна мінлива <i>Medicago</i> × <i>varia</i> Martyn Hybrid Lucerne					
20364003	06.10.2020	Київська жовтогібридна Kyivska zhovtohibrydna	1626	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Корягін Олексій Михайлович Остапець Тамара Анатоліївна Слюсар Сергій Миколайович Повидало Марія Василівна
20364004	06.10.2020	Київська синьогібридна Kyivska synohibrydna	1626	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Слюсар Сергій Миколайович Корягін Олексій Михайлович Остапець Тамара Анатоліївна Повидало Марія Василівна
Паслін сизолистковий <i>Solanum glaucophyllum</i> Desf. Waxy leaf nightshade					
20398001	30.06.2020	Гервіт 153 Hervit 153	2703	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Amin Chaanim
Хризантема садова <i>Chrysanthemum</i> × <i>hortorum</i> Bailey Chrysanthemum					
20416001	18.09.2020	Сніжинка Snizhynka	348	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Горобець Василь Федорович Завідова Людмила Гнатівна
20416002	18.09.2020	Степівчанка Stepivchanka	348	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Горобець Василь Федорович Завідова Людмила Гнатівна
20416003	18.09.2020	Полонина Polonyna	348	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Горобець Василь Федорович Завідова Людмила Гнатівна
20416004	18.09.2020	Сутінки Sutinky	348	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Завідова Людмила Гнатівна Горобець Василь Федорович
20416005	18.09.2020	Україночка Ukrainochka	348	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Горобець Василь Федорович Завідова Людмила Гнатівна
Костриця шорстколиста <i>Festuca brevipila</i> R. Tracey Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina					
20437001	23.06.2020	Сиза Syza	1658	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Байструк-Глодан Леся Зіновіївна Стасів Олег Федорович Жапалеу Галина Зіновіївна Хом'як Марія Михайлівна Коник Григорій Станіславович
Індау посівний <i>Eruca sativa</i> Mill. Arugula, Rocket, Rucola					
20500001	14.09.2020	Барвінковий Barvinkovy	1708	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Чабан Леся Василівна Позняк Олександр Васильович Касян Олександр Іванович Кондратенко Сергій Іванович
Павловнія <i>Paulownia</i> Sieb. et Zucc. Paulownia					
20649004	25.05.2020	Павловнія Гіант-27 Pavlovniia Hiant-27	2694	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Фуглевич Ярослав Миронович
Соняшник однорічний – батьківський компонент <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower – parental component					
18939104	04.12.2018	ФР85501 FR85501	2643 2644	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Bertrand Haquin
20939019	12.10.2020	ЗЛ96А ZL96A	1702	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Середа Валентина Олексіївна Кутіщева Наталія Миколаївна Щудра Лариса Іванівна Одинець Сергій Іванович
Ріпак (озимий) – батьківський компонент <i>Brassica napus</i> L. <i>oleifera</i> Rape Seed (Winter) – parental component					
20940007	16.09.2020	УНР 7 UNR 7	2666	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Парій Ярослав Федорович Парій Мирослав Федорович
20940008	16.09.2020	УНР 5 UNR 5	2666	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Парій Ярослав Федорович Парій Мирослав Федорович
20940009	16.09.2020	УНР 3 UNR 3	2666	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Парій Мирослав Федорович Парій Ярослав Федорович
20940010	16.09.2020	УНР 56 UNR 56	2666	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Парій Мирослав Федорович Парій Ярослав Федорович
20940011	16.09.2020	УНР 21 UNR 21	2666	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Парій Ярослав Федорович Парій Мирослав Федорович
20940012	16.09.2020	УНР 44 UNR 44	2666	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Парій Ярослав Федорович Парій Мирослав Федорович
20940013	27.10.2020	К1Ф0А09 K1F0A09	1702	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Лісняк Ганна Данилівна Комарова Ірина Борисівна Тарасова Галина Арнольдівна

Заявки на сорти рослин, за якими запропонована інша назва сорту

Plant varieties applications, for which proposed other variety denomination

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Запропонована назва сорту Proposed variety denomination	Запропонована інша назва сорту Other proposed variety denomination	Заявник (код) Application (code)	Мета реєстрації (ПС, РС, АС) Purpose of registration (PBR, NLI, AC)
Кукурудза звичайна					
14009159	25.11.2014	ДКС4869 DKC4869	ІНВАДОР INVADOR	844	ПС, РС, АС PBR, NLI,
18009043	16.10.2018	Б2114Ц B2114C	Б2114С B2114C	9	ПС PBR
19009017	10.01.2019	НВП1732 NVP1732	АС3300 AS3300	2563	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
19009020	10.01.2019	НВП1841 NVP1841	АС4400 AS4400	2563	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
19009034	14.01.2019	Патент Патент	ВН 6969 VN 6969	736	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
19009135	27.11.2019	Б3316Ц B3316C	Б3316С B3316C	1688	ПС PBR
Соняшник однорічний					
11017084	11.11.2011	Явір Явір	Санрок Sunrock	1591	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
17039175	18.12.2017	РЖТ БЕЛЛЬВЕДЕР RGT BELVEDER	БЕЛЛЬВЕДЕР BELVEDER	1783	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
18039095	30.11.2018	СИ АТЛЕТ КЛП SY ATLET CLP	АТЛЕТ КЛП ATLET CLP	1219	РС, АС NLI, AC
18039136	17.12.2018	НА Сурінда NA Surinda	НА Соліс NA Solis	1978	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
18039136	17.12.2018	НА Сурінда NA Surinda	НА Сокар NA Sokar	1978	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
18039159	27.12.2018	ОБ 19 ОБ 19	Євро Маестро Євро Маестро	2555	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
18039160	27.12.2018	ОБ 18 ОБ 18	Гранд Санні Гранд Санні	2555	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
19039106	16.12.2019	Честер Честер	Честерфілд Честерфілд	736	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
19039106	16.12.2019	Честер Честер	Шенген Шенген	736	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
Тритикале (озиме)					
19022005	14.11.2019	Наполеон Наполеон	Щедра Носівське Щедра Носівське	1990	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
Жито посівне (озиме) – батьківський компонент					
19915003	14.06.2019	Л2171-П x Л2181-Н L2171-P x L2181-N	Л2171П x Л2181Н L2171P x L2181N	1900	ПС, РС PBR, NLI
19915004	18.06.2019	Л2171-П x Л2177-Н L2171-P x L2177-N	Л2171П x Л2177Н L2171P x L2177N	1900	ПС, РС PBR, NLI
Ріпак (озимий)					
19040070	10.12.2019	Х9160195 H9160195	КВС ГРАНОС KWS GRANOS	2649	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
18045031	30.11.2018	СЖ 1595 SJ 1595	Селектор Selector	2534	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
Буряк цукровий					
19069025	13.12.2019	САЛАМАНДЕР СМАР SALAMANDER SMART	САНДПАЙПЕР СМАРТ SANDPIPER SMART	1628	РС, АС NLI, AC
Петрушка городня					
18114001	21.11.2018	Гіганте д'Італія Gigante d'Italia	Гіганте д'Італія Капут Gigante d'Italia Caput	2591	РС NLI
Суниця садова					
19294004	24.05.2019	ДЖ14527 Талія G14527Taliia	ДЖ14527 G14527	2615	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
Кукурудза звичайна – батьківський компонент					
189099150	30.11.2018	ЮААКС3722 UAAK3722	ЮААКС3722 UAAK3722	1959	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
18909166	13.12.2018	ХМв 5329 ХМв 5449 HМv 5329 HМv 5449	ХМБ 5329 ХМБ5449 HМv 5329 HМv 5449	2508	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
18909167	13.12.2018	ХМв 5449 HМv 5449	ХМБ 5449 HМv 5449	2508	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
18909168	13.12.2018	ХМв 5372 HМv 5372	ХМБ 5372 HМv 5372	2508	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
18909169	13.12.2018	ХМв 5435 HМv 5435	ХМБ 5435 HМv 5435	2508	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
18909170	13.12.2018	ХМв 5368 HМv 5368	ХМБ 5368 HМv 5368	2508	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
18909179	18.12.2018	ХМв 5435 ХМв 5405 HМv 5435 HМv 5405	ХМБ 5435 ХМБ5405 HМv 5435 HМv 5405	2508	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
18909180	18.12.2018	ХМв 5388 HМv 5388	ХМБ 5388 HМv 5388	2508	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC

Відомості щодо заявок на сорти рослин, за якими прийнято рішення про відмову у державній реєстрації прав на сорт

Notifications on plant variety applications, for which decision has been adopted on refusing the plant variety rights registration

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Мета реєстрації (ПС, РС, АС) Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	Дата відмови Date of refusal
Пшениця м'яка (озима) <i>Triticum aestivum</i> L. Soft Wheat (Winter)					
20012038	29.07.2020	Амбурго Amburgo	2440	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	14.12.2020
Конопля посівна <i>Cannabis sativa</i> L. Hemp					
20080003	07.07.2020	Канбекс Kanbeks	2700	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	18.11.2020
Пажитниця багаторічна <i>Lolium perenne</i> L. Perennial Ryegrass					
20222004	30.03.2020	ВАЛЕРІО VALERIO	807	РС NLI	23.11.2020
20222006	30.03.2020	КАРАТОС KARATOS	807	РС NLI	23.11.2020
20222007	30.03.2020	ШЕРЛОК SHERLOCK	807	РС NLI	23.11.2020
Ліщина звичайна <i>Corylus avellana</i> L. Hazelnut					
19543011	25.11.2019	ТОНДА ДЖЕНТИЛЕ РОМАНА Tonda gentile romana	2091	РС NLI	04.11.2020

Відкликані заявки або такі, що вважаються відкликаними

Withdrawn applications for plant varieties or those that considered as withdrawn

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Назва сорту Variety denomination	а: Заявник (код) в: Представник (код) а: Applicant (code) в: Representative (code)	Мета реєстрації Purpose of registration	Дата відкликання Date of withdrawal
Кукурудза звичайна Maize, Corn					
20009094	02.11.2020	ЕЮ4446 EU4446	а: 844 в:	ПС, РС PBR, NLI	19.11.2020
Ячмінь звичайний (озимий) Barley (Winter)					
16019018	01.12.2016	Киара Chiara	а: 1498 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	02.11.2020
Соняшник однорічний Sunflower					
20039043	03.11.2020	МЖТ102520 MGT102520	а: 2720 в:	РС, АС NLI, AC	21.12.2020
Ріпак (озимий) Rape Seed (Winter)					
20040019	06.04.2020	Кларнет КЛ Clarinet CL	а: 912 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	02.11.2020
Помідор їстівний Tomato					
19115027	22.11.2019	ПІНАНТА PINANTA	а: 1852 в:	ПС, РС PBR, NLI	23.11.2020
Салат посівний листовий Lettuce					
19120017	17.09.2019	Бойд Boyd	а: 1730 в:	РС, АС NLI, AC	02.11.2020
Суниця садова Strawberry					
14294004	17.04.2014	Фламенко Flamenco	а: 672 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	02.11.2020
Кукурудза звичайна – батьківський компонент Maize, Corn – parental component					
20909117	06.11.2020	Вера Veha	а: 2530 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	31.12.2020
Соняшник однорічний – батьківський компонент Sunflower – parental component					
12017007	18.01.2012	9702 Р 9702 R	а: 1755 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	02.11.2020

Інші відомості, внесені до Реєстру заявок

Other notifications listed in the Register of Plant Variety Applications

Відповідно до наказу Мінекономіки від 14.12.2020 № 2618 унесено зміну до відомостей, що містяться в Реєстрі заявок на сорти рослин стосовно сорту картоплі Ажур (заявка № 12031002, дата подання 20.01.2012) щодо зміни найменування заявника, замінивши слова

«Закрите акціонерне товариство Науково-виробниче об'єднання «Чернігівеліткартопля» словами «Приватне акціонерне товариство науково-виробниче об'єднання «Чернігівеліткартопля».

Відомості щодо зміни назви сорту рослин

Notifications of changing plant variety denomination

Номер заявки Application number	Заявник (код) Applicant (code)	Запропонована назва Proposed variety denomination	Ухвалена назва сорту Approved variety denomination
Кукурудза звичайна <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn			
15009019	844	ДКС3379	СТАРОФ STAROF
17009069	844	ДКС3893	ЧОУРІ TCHOURI
Соняшник однорічний <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower			
14039045	924	МАС 90СП	МЕРІТ КЛП MERIT CLP
Буряк цукровий <i>Beta vulgaris</i> L. ssp. <i>vulgaris</i> var. <i>altissima</i> Doell Sugar Beet			
17069033	796	ФДР18Б1089	ФД Сокол FD Sokol
17069034	796	ФДР18Б1086	ФД Форсаж FD Forsage
17069035	796	ФДР18Б4020	ФД Хоккей FD Khokkey

Відомості щодо зміненої та ухваленої назви сорту рослин

Notification on changed and approved plant variety denomination

Номер заявки Application number	Заявник (код) Applicant (code)	Дата ухвалення Date of approval	Запропонована назва сорту при поданні заявки Plant variety denomination during order application	Змінена та ухвалена назва сорту Changed and approved variety denomination
Кукурудза звичайна <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn				
18009111	844	14.11.2020	ET5315	I33LI IZZLI
18009150	2524 2436	03.12.2020	ГЛ170500	Дженні Jenny
19009135	1688	29.12.2020	Б3316Ц	Б3316С В3316С
Пшениця м'яка (озима) <i>Triticum aestivum</i> L. Soft Wheat (Winter)				
19012024	355	14.12.2020	Тара	Степова криниця Stepova krynytsia
Соняшник однорічний <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower				
18039160	2555 2556	07.12.2020	ОБ 18	Гранд Санні Hrand Sanni
Ріпак (озимий) <i>Brassica napus</i> L. <i>oleifera</i> Rape Seed (Winter)				
17040016	2602	09.11.2020	6ЕВ0173	ІНВУЕЛО INVUELO
19040070	2649	24.11.2020	Х9160195	КВС ГРАНОС KWS GRANOS
19040072	2255	27.11.2020	МХ 16ЖД085	ХОСТИН HOSTINE
Соя культурна <i>Glycine max</i> (L.) Merrill Soya Bean				
18045031	2534	10.12.2020	СЖ 1595	Селектор Selector
Диня звичайна <i>Cucumis melo</i> L. Melon				
19147008	1730	05.11.2020	34-870	Тарбо Tagbo
Суниця садова <i>Fragaria ananassa</i> Duch. Strawberry				
19294004	2615	27.11.2020	ДЖ14527 Талія	ДЖ14527 G14527
Люцерна мінлива <i>Medicago x varia</i> Martyn Hybrid Lucerne				
20364002	1698	24.12.2020	Южанка	Чародійка Charodiika
Кукурудза звичайна – батьківський компонент <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn – parental component				
18909103	844	09.11.2020	P26833СКУГ3	P26833СКУГ3 R26833ZSQGZ
18909164	2264	07.12.2020	МБС4138/4131	МБС41384131 MBS41384131

Відомості щодо ухвалення назви сорту рослин

Notification on approved denomination for plant variety

Номер заявки Application number	Заявник (код) Applicant (code)	Дата ухвалення Date of approval	Ухвалена назва сорту Approved denomination of variety
Кукурудза звичайна <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn			
04004106	279	09.12.2020	КБ 2704
15009019	844	31.12.2020	КВ 2704
17009069	844	31.12.2020	СТАРОФ
19009010	1581	31.12.2020	STAROF
19009015	1994	31.12.2020	ЧОУРІ
19009018	2563	03.12.2020	TCHOURI
19009019	2563	03.12.2020	Вектор
19009024	2548	03.12.2020	Vektor
19009025	2548	03.12.2020	ЗП 4123
19009026	2548	03.12.2020	ZP 4123
19009027	736	14.12.2020	АС400
19009028	736	14.12.2020	AS400
19009029	736	14.12.2020	АС201
19009030	736	14.12.2020	AS201
19009031	736	03.12.2020	Екодар 380
19009032	736	03.12.2020	Ekodar 380
19009033	2479	14.12.2020	Екодар 280
19009036	2569	14.12.2020	Ekodar 280
19009038	2569	14.12.2020	Екодар 240
19009039	2569	14.12.2020	Ekodar 240
19009040	2569	03.12.2020	Роден
19009041	2569	03.12.2020	Roden
19009042	2260 1433	04.12.2020	Бейліс
19009043	2260 1433	04.12.2020	Beilis
19009044	2479	31.12.2020	ЛЕГО
19009045	2479	31.12.2020	LEGO
19009046	2479	14.12.2020	ЛЕНО
19009054	1688	14.12.2020	Картель
19009063	1688	14.12.2020	Kartel
19009066	9	14.12.2020	Скайп
19009067	2570	14.12.2020	Skaip
19009070	2622	14.12.2020	Шерідан
19009138	1688	14.12.2020	Sheridan
		09.12.2020	БЦ323
		01.12.2020	BC323
		14.12.2020	Байросса
		14.12.2020	Bayrossa
		14.12.2020	БПЦ7144
		14.12.2020	BPZ7144
		14.12.2020	Рудеста
		14.12.2020	Rudesta
		31.12.2020	Гердіне
		31.12.2020	Gerdine
		14.12.2020	Ельсанта
		14.12.2020	Elsanto
		14.12.2020	Фоліант
		14.12.2020	Foliant
		31.12.2020	Саміт
		31.12.2020	Samit
		31.12.2020	БЦ344
		31.12.2020	BC344
		14.12.2020	БЦ424
		14.12.2020	BC424
		14.12.2020	АЛІБІ
		14.12.2020	ALIBI
		14.12.2020	П8834
		14.12.2020	P8834
		14.12.2020	П9170
		14.12.2020	P9170
		29.12.2020	П0937
		29.12.2020	P0937
		03.12.2020	ЕС Юнкай
		03.12.2020	ES IUnkai
		31.12.2020	Кішкун 4435
		31.12.2020	Kiskun 4435
		29.12.2020	П9889
		29.12.2020	P9889

Номер заявки Application number	Заявник (код) Applicant (code)	Дата ухвалення Date of approval	Ухвалена назва сорту Approved denomination of variety
19009139	1688	29.12.2020	П8271
19009148	1688	29.12.2020	Р8271
19009149	1688 1690	29.12.2020	П9610
19009150	1688	29.12.2020	Р9610
19009151	1688	29.12.2020	П0217
19009152	1688 1690	29.12.2020	Р0217
19009153	1690 1688	29.12.2020	П8666
19009161	2524 2436	31.12.2020	Р8666
19009162	2524 2436	31.12.2020	П7948
19009215	2658	31.12.2020	Р7948
19009216	2658	31.12.2020	П0200
Овес посівний (ярий) <i>Avena sativa</i> L. Oat (Spring)			
19011004	2657	31.12.2020	Р0200
Пшениця м'яка (озима) <i>Triticum aestivum</i> L. Soft Wheat (Winter)			
19012013	1543	31.12.2020	П9300
19012014	1543	31.12.2020	Р9300
19012036	2597	04.12.2020	ГЛ170509
19012044	2513	03.12.2020	GL170509
19012083	1498	13.11.2020	ГЛ170454
19012086	2653	06.11.2020	GL170454
19012089	1783	31.12.2020	А6pica
19012090	2657	03.12.2020	Abrisa
19012091	2657	03.12.2020	Дорлен
Пшениця м'яка (яра) <i>Triticum aestivum</i> L. Soft Wheat (Spring)			
19013003	2076 2616	31.12.2020	Dorlen
Ячмінь звичайний (озимий) <i>Hordeum vulgare</i> L. Barley (Winter)			
19019006	1959	31.12.2020	Перун
Ячмінь звичайний (ярий) <i>Hordeum vulgare</i> L. Barley (Spring)			
19020010	2657	31.12.2020	Ши́ра
19020015	2076 2616	31.12.2020	Shyra
Тритикале (озиме) <i>Triticosecale</i> Witt. Triticale (Winter)			
19022006	2657	03.12.2020	Карбон
19022007	2632	31.12.2020	Karbon
Арахіс підземний <i>Arachis hypogaea</i> L. Groundnut			
20031001	2675	12.11.2020	Аннабель
20031002	2675	12.11.2020	Annabelle

Номер заявки Application number	Заявник (код) Applicant (code)	Дата ухвалення Date of approval	Ухвалена назва сорту Approved denomination of variety
Соняшник однорічний <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower			
14039045	924	09.12.2020	МЕРІТ КЛП MERIT CLP
17039029	2269	14.11.2020	ЗУХАТ ZUHAT
18039149	2552	14.12.2020	МЕРО ШТ MERO ST
19039001	2062	17.11.2020	Текносун Teknosun
19039002	2062	17.11.2020	Каламис Kalamis
19039004	1498	17.11.2020	Тангосол Tangosol
19039005	2444	17.11.2020	H1034 N1034
19039006	2444	14.12.2020	H606 N606
19039007	2570	17.11.2020	ЕС Імібор ES Imibor
19039008	2570	17.11.2020	ЕС Супра ES Supra
19039012	1738	31.12.2020	Ром Rom
19039020	9	31.12.2020	ХФ17959 XF17959
19039022	924	31.12.2020	МЖТ102660 MGT102660
19039023	924	31.12.2020	МЖТ102661 MGT102661
19039024	924	31.12.2020	МЖТ102506 MGT102506
19039025	924	31.12.2020	МЖТ98272 MGT98272
19039027	924	31.12.2020	МЖТ98905 MGT98905
19039028	2011	31.12.2020	Інкасан ІР Inkasun IR
19039033	2643	31.12.2020	СИ ФЛАВІО КЛП SY FLAVIO CLP
19039034	2643	31.12.2020	СУРЕЛІ SURELI
19039035	2643	31.12.2020	СУВАНГО SUVANGO
19039036	1985	31.12.2020	H4X471 КЛ N4H471 CL
19039037	1985	31.12.2020	H4L472 КЛ N4L472 CL
19039038	1985	31.12.2020	H4L473 КЛ N4L473 CL
19039039	1985	31.12.2020	H4L374 Е N4L374 E
19039040	1985	31.12.2020	H4X469 КЛ N4H469 CL
19039043	1688	14.12.2020	Р64ГГ150 P64HH150
19039044	1688	14.12.2020	Р63ГГ142 P63HH142
19039045	1688	14.12.2020	Р64ЛЛ155 P64LL155
19039070	2256	05.11.2020	МАСКІ MASKI
19039071	2256	05.11.2020	АДАЗІ ADAZI
19039072	2256	05.11.2020	ПЕПІ PEPI
19039073	2256	05.11.2020	ГЛАСГОУ GLASGOW
19039117	1978 1517	14.12.2020	П'ятий елемент Pyatiy element
19039119	1978 1517	05.11.2020	Рептор Raptor
19039122	2554	05.11.2020	ХАЙСАН280 HYSUN280

Номер заявки Application number	Заявник (код) Applicant (code)	Дата ухвалення Date of approval	Ухвалена назва сорту Approved denomination of variety
Ріпак (озимий) <i>Brassica napus</i> L. <i>oleifera</i> Rape Seed (Winter)			
19040019	912	31.12.2020	Ресет Reset
19040054	2587	31.12.2020	ГК Ченге GK Csenge
20040047	1688	24.12.2020	ПХ133 PX133
20040048	1688	23.12.2020	ПХ135 PX135
Ріпак (ярий) <i>Brassica napus</i> L. <i>oleifera</i> Rape Seed (Spring)			
11016047	1520	09.12.2020	Хіола 575 КЛ Hyola 575 CL
Соя культурна <i>Glycine max</i> (L.) Merrill Soya Bean			
19045001	2557	31.12.2020	ОАЦ Аклайм OAC Acclaim
Буряк цукровий <i>Beta vulgaris</i> L. ssp. <i>vulgaris</i> var. <i>altissima</i> Doell Sugar Beet			
17069033	796	09.12.2020	ФД Сокол FD Sokol
17069034	796	09.12.2020	ФД Форсаж FD Forsage
17069035	796	08.12.2020	ФД Хокей FD Khokkey
Яблуна домашня <i>Malus domestica</i> Borkh. Apple			
20263001	1601	29.12.2020	Соломія Solomiia
Фісташка справжня <i>Pistacia vera</i> L. Pistachio			
20287001	2709	31.12.2020	Керман Kerman
Суниця садова <i>Fragaria ananassa</i> Duch. Strawberry			
19294003	2614	17.12.2020	Ельсанта Elsanta
Малина <i>Rubus idaeus</i> L. Raspberry			
18296003	2419	17.11.2020	ДрісРаспТвелв DrisRaspTwelve
Ліщина звичайна <i>Corylus avellana</i> L. Hazelnut			
19543003	2538	07.12.2020	Ямхїлл Yamhill
Кукурудза звичайна – батьківський компонент <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn – parental component			
18909152	1959	14.12.2020	ХЮІД3780 HUID3780
19909001	2558	27.11.2020	K421 K421
19909002	2558	27.11.2020	MC1832 MS1832
19909003	2558	27.11.2020	MC182 MS182
19909004	2558	01.12.2020	K935 K935
19909005	2558	01.12.2020	MC7423 MS7423
19909006	2558	01.12.2020	MC3939 MS3939
19909007	2558	01.12.2020	MC6529 MS6529
19909008	2558	31.12.2020	MC9595 MS9595
19909009	2558	01.12.2020	MC2529 MS2529
19909010	2558	01.12.2020	MC4445 MS4445
19909011	2558	01.12.2020	СДМ85 SDM85
19909012	2558	01.12.2020	СДМ103 SDM103

Номер заявки Application number	Заявник (код) Applicant (code)	Дата ухвалення Date of approval	Ухвалена назва сорту Approved denomination of variety
19909014	2558	01.12.2020	MC1543
19909015	2558	01.12.2020	MS1543
19909021	736	03.12.2020	MKB02
19909022	736	03.12.2020	MKV02
19909023	736	03.12.2020	BHK 115C
19909024	736	03.12.2020	VNK 115S
19909025	736	03.12.2020	BHK 811C
19909026	736	03.12.2020	VNK 811S
19909027	736	03.12.2020	BHK 118Л
19909028	736	03.12.2020	VNK 118L
19909029	736	03.12.2020	BHK 219C
19909030	736	03.12.2020	VNK 219S
19909031	736	07.12.2020	BHK 117Л
19909032	736	07.12.2020	VNK 117L
19909033	736	07.12.2020	BHK 001Л
19909034	736	07.12.2020	VNK 001L
19909035	736	07.12.2020	BHK 208C
19909036	736	07.12.2020	VNK 208S
19909037	736	07.12.2020	BHK 002Л
19909038	736	07.12.2020	VNK 002L
19909039	2444	01.12.2020	C2A250A
19909040	2444	01.12.2020	S2A250A
19909041	2444	01.12.2020	C2A250P
19909042	2444	01.12.2020	S2A250R
19909043	2444	01.12.2020	C2A300P
19909044	2444	01.12.2020	S2A300R
19909045	2444	01.12.2020	C2A320A
19909046	2444	01.12.2020	S2A320A
19909047	2444	01.12.2020	C2A200A
19909048	2444	01.12.2020	S2A200A
19909049	2444	01.12.2020	C2A200P
19909050	2444	01.12.2020	S2A200R
19909051	2444	01.12.2020	C2A300A
19909052	2444	01.12.2020	S2A300A
19909053	2444	01.12.2020	C2A320P
19909054	2444	01.12.2020	S2A320R
19909055	2260	01.12.2020	DK5550CB3M
19909056	2260	01.12.2020	DK5550SVZM
19909057	2260	01.12.2020	DK9523 3C3M
19909058	2260	01.12.2020	DK9523 ZSZM
19909059	2260	01.12.2020	DK9527C
19909060	2260	01.12.2020	DK9527S
19909061	2260	01.12.2020	Kroc160C
19909062	2260	01.12.2020	Kros160S
19909063	2260	01.12.2020	DK2564MB
19909064	2260	01.12.2020	DK2564MV
19909065	2260	01.12.2020	DK5550M
19909066	1433	31.12.2020	DK5550M
19909067	1433	31.12.2020	УГ635MB
19909068	1433	31.12.2020	UH635MV
19909069	806	01.12.2020	EG7A59
19909070	806	01.12.2020	EG7A59
19909071	9	11.12.2020	PX2B63
19909072	9	11.12.2020	PH2W63
19909073	1591	31.12.2020	ЛБ 319 CMB
19909074	1591	31.12.2020	LB 319 SMV
19909075	1688	11.12.2020	PX2PX3
19909076	1688	11.12.2020	PKh2RKh3
19909077	1688	18.12.2020	PX2PFΦ
19909078	1688	18.12.2020	PH2RGF
19909079	1688	11.12.2020	PX2TЦT
19909080	1688	11.12.2020	PH2TCT
19909081	1688	14.12.2020	PX42A9
19909082	1688	14.12.2020	PH42A9
19909083	1688	11.12.2020	PX2T94
19909084	1688	11.12.2020	PH2T94
19909085	1688	11.12.2020	PX410Ц
19909086	1688	11.12.2020	PH410C
19909087	1688	31.12.2020	PX2ΦHB
19909088	1688	31.12.2020	PH2FNV
19909089	1688	31.12.2020	PX2TC3
19909090	1688	31.12.2020	PH2TS3
19909091	1688	31.12.2020	PX2TBM
19909092	1688	31.12.2020	PH2TWM

Номер заявки Application number	Заявник (код) Applicant (code)	Дата ухвалення Date of approval	Ухвалена назва сорту Approved denomination of variety
19909205	1690 1688	11.12.2020	ПХ2Т93 РН2Т93
19909206	1688	11.12.2020	ПХ1ТДК РН1ТДК
19909207	1688	11.12.2020	ПХ42ЦД РН42СД
19909208	9	11.12.2020	ПХ2РХ3 РН2РН3
19909209	9	11.12.2020	ПХ2РГФ РН2РГФ
19909210	9	11.12.2020	ПХ2ТГГ РН2ТГГ
19909211	9	11.12.2020	ПХ2ТЦТ РН2ТСТ
19909212	9	14.12.2020	ПХ42А9 РН42А9
19909213	9	14.12.2020	ПХ2Т94 РН2Т94
19909214	9	14.12.2020	ПХ410Ц РН410С
19909216	9	14.12.2020	ПХ2ФНВ РН2ФНВ
19909217	9	14.12.2020	ПХ2ТС3 РН2ТС3
19909218	9	14.12.2020	ПХ2ТВМ РН2ТВМ
19909219	9	14.12.2020	ПХ2Т93 РН2Т93
19909220	9	14.12.2020	ПХ1ТДК РН1ТДК
19909221	9	14.12.2020	ПХ42ЦД РН42СД
19909225	2537	31.12.2020	ІМ137 ІМ137
20909078	1783	14.12.2020	Р16055 Р16055
Ячмінь звичайний (озимий) – батьківський компонент <i>Hordeum vulgare</i> L. Barley (Winter) – parental component			
19919002	1959	31.12.2020	МТ0767 МТ0767
Соняшник однорічний – батьківський компонент <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower – parental component			
17939083	1591	14.12.2020	Од 135 А Од 135 А
19939001	2444	09.12.2020	С1М75А С1М75А
19939002	2444	09.12.2020	С1М65Р С1М65Р
19939003	2444	09.12.2020	С1М65А С1М65А
19939004	2444	09.12.2020	С1М15Р С1М15Р
19939005	2444	09.12.2020	С1М15А С1М15А
19939006	2444	09.12.2020	С1А75Р С1А75Р
19939007	2444	09.12.2020	С1А75А С1А75А
19939008	2444	09.12.2020	С1А65Р С1А65Р
19939009	2444	09.12.2020	С1А65А С1А65А
19939010	2444	09.12.2020	С1А15Р С1А15Р
19939011	2444	09.12.2020	С1А15А С1А15А
19939012	2444	09.12.2020	С1Т65Р С1Т65Р
19939013	2444	09.12.2020	С1Т75А С1Т75А
19939014	2444	09.12.2020	С1Т75Р С1Т75Р
19939015	2444	09.12.2020	С1М75Р С1М75Р

Номер заявки Application number	Заявник (код) Applicant (code)	Дата ухвалення Date of approval	Ухвалена назва сорту Approved denomination of variety
19939016	2444	09.12.2020	C1M135A
19939017	2444	09.12.2020	S1M135A
19939018	2444	09.12.2020	C1T15A
19939019	2444	09.12.2020	S1T15A
19939020	2444	09.12.2020	C1T15P
19939023	1688	23.12.2020	S1T15R
19939024	1688	23.12.2020	C1T65A
19939025	1688	14.12.2020	S1T65A
19939026	1688	23.12.2020	C1M135P
19939027	1688	14.12.2020	S1M135R
19939028	9	23.12.2020	7ПЦДК22P
19939029	9	23.12.2020	7PCDQ22R
19939030	9	23.12.2020	7ПАЦЙ80P
19939031	9	14.12.2020	7РАСJ80R
19939032	9	23.12.2020	7ПКВЛ42P
19939033	9	14.12.2020	7РКVL42R
19939051	924	31.12.2020	7ПППУ01B
19939052	924	31.12.2020	7PPPU01B
19939053	924	31.12.2020	T0831ЛГ
19939087	9	23.12.2020	T0831ЛГ
19939088	9	23.12.2020	T0831LG
19939089	9	24.12.2020	7ПЦДК22P
19939090	9	23.12.2020	7PCDQ22R
19939091	1688	23.12.2020	7ПППУ01A
19939092	1690 1688	24.12.2020	7PPPU01A
19939117	1783	14.12.2020	T0902СУЛФ
19939118	1783	14.12.2020	T0902SULF
20939037	2445 2599	14.12.2020	T0831ЛФ
20939038	2445 2599	14.12.2020	T0831LF
20939039	2445 2599	14.12.2020	7ПАЦЙ80P
20939040	2445 2599	14.12.2020	7РАСJ80R
20939042	2445 2599	14.12.2020	7ПКВЛ42P
			7РКVL42R
			ТPI4747P
			TRI4747R
			ТPI4761P
			TRI4761R
			ТPI5016P
			TRI5016R
			7ПВДХ67A
			7PWDH67A
			7ПБНК89P
			7PBNQ89R
			7ПБАД55P
			7PVAD55R
			T1184ГМ
			T1184HM
			T1184ГМ
			T1184HM
			7ПБАД55P
			7PVAD55R
			PT9817
			RT9817
			AT3317
			AT3317
			Лс3A
			Лs3A
			ЛСТ54A
			LST54A
			Лв33B
			Lv33V
			Лв77B
			Lv77V
			Лв211B
			Lv211V

Відомості, внесені до Реєстру патентів

Information for which a decision on the Register of patent

Відомості про сорти рослин, щодо яких прийнято рішення про державну реєстрацію прав на сорт та внесені до Реєстру патентів

Information on plant varieties, for which a decision on the state registration of the variety and the Register of patent

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер патенту Number of patent	Дата реєстрації прав Date of rights registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Володілець сорту (код) Variety owner (code)	Опис морфологічних ознак
Пшениця тверда (яра) <i>Triticum durum</i> Desf. Durum Wheat (Spring)							
17006009	16.11.2017	200662	21.10.2020	16.11.2017	Альжбета Alzhbeta	736	
Пшениця тверда (озима) <i>Triticum durum</i> Desf. Durum Wheat (Winter)							
18007001	01.03.2018	200805	24.11.2020	01.03.2018	Алмазний Almaznyi	1591	
18007002	01.03.2018	200806	24.11.2020	01.03.2018	Янтарний Yantarnyi	1591	
18007003	27.04.2018	200807	08.12.2020	27.04.2018	Діадур Diadur	1564	
Гречка їстівна <i>Fagopyrum esculentum</i> Moench Buckwheat							
18008004	10.12.2018	200740	11.12.2020	10.12.2018	Христіна Khrystyna	2546	
Кукурудза звичайна <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn							
13009210	02.12.2013	200758	02.12.2020	02.12.2013	Аурум Aurum	1433	бюлетень, випуск 1, 2016
13009214	02.12.2013	200759	02.12.2020	02.12.2013	Ферум Ferum	1854 1433	бюлетень, випуск 1, 2016
13009215	02.12.2013	200760	02.12.2020	02.12.2013	Аргентум Arhentum	1854 1433	бюлетень, випуск 1, 2016
18009011	17.01.2018	200761	10.11.2020	17.01.2018	Камаро Camaro	2313	бюлетень, випуск 4, 2020
19009048	08.02.2019	200638	12.10.2020	08.02.2019	П9757 P9757	1690	
19009049	08.02.2019	200639	12.10.2020	08.02.2019	П9074E P9074E	1688	
19009050	08.02.2019	200640	12.10.2020	08.02.2019	П8358 P8358	1688	
19009051	08.02.2019	200641	12.10.2020	08.02.2019	П9874 P9874	1690 1688	
19009053	08.02.2019	200642	12.10.2020	08.02.2019	П7515 P7515	1690 1688	
19009056	08.02.2019	200643	12.10.2020	08.02.2019	Б3545Д B3545D	1690 1688	
19009057	08.02.2019	200644	12.10.2020	08.02.2019	П0349 P0349	1690 1688	
19009058	08.02.2019	200645	12.10.2020	08.02.2019	П0268 P0268	1690 1688	
19009059	08.02.2019	200646	12.10.2020	08.02.2019	П0312 P0312	1690 1688	
19009060	08.02.2019	200647	12.10.2020	08.02.2019	П0362 P0362	1690 1688	
19009062	08.02.2019	200648	12.10.2020	08.02.2019	П9361 P9361	1690 1688	
19009064	08.02.2019	200649	12.10.2020	08.02.2019	П9071 P9071	1690 1688	
19009065	08.02.2019	200650	12.10.2020	08.02.2019	П9363 P9363	1690 1688	
Овес посівний (ярий) <i>Avena sativa</i> L. Oat (Spring)							
18011003	13.12.2018	200777	18.11.2020	13.12.2018	Азамат Azamat	2260	
Пшениця м'яка (озима) <i>Triticum aestivum</i> L. Soft Wheat (Winter)							
15012068	16.12.2015	200786	04.12.2020	16.12.2015	Адїса Adisa	2597	
16140001	15.06.2016	200787	24.11.2020	15.06.2016	Арабатка Arabatka	1123	

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер патенту Number of patent	Дата реєстрації прав Date of rights registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Володілець сорту (код) Variety owner (code)	Опис морфологічних ознак
17012048	08.12.2017	200788	05.11.2020	08.12.2017	КВС Спенсер KWS Spencer	824	бюлетень, випуск 5, 2020
18012005	23.02.2018	200789	17.11.2020	23.02.2018	Академічна 100 Akademichna 100	355	
18012006	23.02.2018	200790	17.11.2020	23.02.2018	Світязь Svitiaz	355	
18012007	23.02.2018	200791	17.11.2020	23.02.2018	Ювілейна Патона Yuvileina Patona	355	
18012015	23.02.2018	200795	17.11.2020	23.02.2018	Київська 19 Kyivska 19	355	
18012011	01.03.2018	200792	24.11.2020	01.03.2018	Гейзер Heizer	1591	
18012012	01.03.2018	200793	24.11.2020	01.03.2018	Основа одеська Osnova odeska	1591	
18012013	01.03.2018	200794	24.11.2020	01.03.2018	Громада Hromada	1591	
18012016	01.03.2018	200796	24.11.2020	01.03.2018	Відповідь одеська Vidprovid odeska	1591	
18012017	01.03.2018	200797	24.11.2020	01.03.2018	Перемога одеська Peremoha odeska	1591	
18012028	05.04.2018	200798	05.11.2020	05.04.2018	Стромболі Stromboli	2255	бюлетень, випуск 5, 2020
18012029	05.04.2018	200799	05.11.2020	05.04.2018	КВС Лазулі KWS Lazuli	2255	бюлетень, випуск 5, 2020
18012031	16.04.2018	200660	21.10.2020	16.04.2018	Уманська царівна Umanska tsarivna	1571 736	бюлетень, випуск 5, 2020
18012038	23.05.2018	200800	19.11.2020	23.05.2018	Шеріф Sheriff	947	бюлетень, випуск 5, 2020
18012047	13.06.2018	200801	05.11.2020	13.06.2018	КВС Талант KWS Talent	824	
18012052	27.06.2018	200661	21.10.2020	27.06.2018	Асорі Asori	1797	
18012063	18.07.2018	200802	16.11.2020	18.07.2018	Гадзинка Hadzynka	2738 1097	
Пшениця м'яка (яра) <i>Triticum aestivum</i> L. Soft Wheat (Spring)							
18013001	06.12.2018	200803	19.11.2020	06.12.2018	Токата Toccata	880	
19013002	01.02.2019	200785	05.11.2020	01.02.2019	КВС Старлайт KWS Starlight	824	
Жито посівне (озиме) <i>Secale cereale</i> L. Rye (Winter)							
17015007	13.04.2017	200636	21.10.2020	13.04.2017	Оріана Oriana	2291	бюлетень, випуск 5, 2020
18015002	09.01.2018	200742	05.11.2020	09.01.2018	КВС Балко KWS Balko	824	
18015003	09.01.2018	200743	05.11.2020	09.01.2018	КВС Тьютор KWS Tutor	824	
18015005	09.01.2018	200744	05.11.2020	09.01.2018	КВС Мотиватор KWS Motivator	824	
18015006	09.01.2018	200745	25.11.2020	09.01.2018	КВС Пропауер KWS Propower	824	
18015007	08.02.2018	200637	21.10.2020	08.02.2018	Алатир Alatyr	2291	
Рис посівний <i>Oryza sativa</i> L. Rice							
17017001	15.11.2017	200664	02.10.2020	15.11.2017	Морячок Moriachok	1715	бюлетень, випуск 1, 2020
17017002	15.11.2017	200665	02.10.2020	15.11.2017	Фарот Fahot	1715	бюлетень, випуск 1, 2020
Ячмінь звичайний (озимий) <i>Hordeum vulgare</i> L. Barley (Winter)							
14019005	20.11.2014	200675	12.10.2020	20.11.2014	Презент Prezent	1591	бюлетень, випуск 5, 2020
15019007	26.08.2015	200812	13.11.2020	26.08.2015	Збруч Zbruch	1658	бюлетень, випуск 5, 2020
18019002	01.03.2018	200813	24.11.2020	01.03.2018	Крікс Kriks	1591	
18019005	23.05.2018	200814	19.11.2020	23.05.2018	КАЙЛІН KAYLIN	2302	бюлетень, випуск 5, 2020
18019010	23.06.2018	200815	05.11.2020	26.06.2018	КВС Фаро KWS Faro	2255	
18019011	23.06.2018	200816	05.11.2020	23.06.2018	КВС Дунай KWS Donau	824	

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер патенту Number of patent	Дата реєстрації прав Date of rights registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Володілець сорту (код) Variety owner (code)	Опис морфологічних ознак
Ячмінь звичайний (ярий) <i>Hordeum vulgare</i> L. Barley (Spring)							
18020004	21.11.2018	200817	05.11.2020	21.11.2018	КВС Джессі KWS Jessie	824	бюлетень, випуск 5, 2020
18020008	12.12.2018	200818	20.11.2020	12.12.2018	МІП Люкс MIP Liuks	1589	
18020009	12.12.2018	200819	20.11.2020	12.12.2018	МІП Акцент MIP Aktsent	1589	
Тритикале (озиме) <i>Triticosecale</i> Witt. Triticale (Winter)							
17022009	21.12.2017	200811	20.11.2020	21.12.2017	Мироносець Myronosets	1589 1601	
Горох посівний (зерновий) <i>Pisum sativum</i> L. Pea							
17023011	27.11.2017	200738	24.11.2020	27.11.2017	Білий ангел Bilyi anhel	1591	
Нут звичайний <i>Cicer arietinum</i> L. Chick-Pea							
19028005	13.12.2019	200775	24.11.2020	13.12.2019	Бланко Blanko	1123	
Соняшник однорічний <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower							
17039159	08.12.2017	200809	26.11.2020	08.12.2017	НС Х 7917 NS H 7917	1978 2549	бюлетень, випуск 4, 2020
Ріпак (озимий) <i>Brassica napus</i> L. <i>oleifera</i> Rape Seed (Winter)							
17040049	27.11.2017	200808	12.10.2020	27.11.2017	Селебріті КС Celebriti CS	485	бюлетень, випуск 5, 2020
Конопля посівні <i>Cannabis sativa</i> L. Hemp							
19080001	29.01.2019	200756	30.11.2020	29.01.2019	Артеміда Artemida	2289	
Картопля <i>Solanum tuberosum</i> L. Potato							
18088016	02.11.2018	200755	10.12.2020	02.11.2018	Містерія Misteriia	1710	
Баклажан <i>Solanum melongena</i> L. Egg Plant							
17093001	16.01.2017	200736	10.12.2020	16.01.2017	Віронік Vironik	1781	
Кукурудза цукрова <i>Zea mays</i> L. ssp. <i>saccharata</i> Sturt. Sweet Corn							
19103002	04.01.2019	200769	08.12.2020	04.01.2019	Роттердам Rotterdam	2424	
19103003	04.01.2019	200770	08.12.2020	04.01.2019	НБМ 2020 NBМ 2020	2424	
19103004	04.01.2019	200771	08.12.2020	04.01.2019	Білий Кролик White Rabbit	2424	
Огірок посівний <i>Cucumis sativus</i> L. Cucumber							
17110011	06.09.2017	191006	28.03.2019	06.09.2017	Мерамор Meramore	1730	бюлетень, випуск 6, 2018
19110009	28.10.2019	200651	21.10.2020	28.10.2019	Ілонара Illonara	1730	бюлетень, випуск 5, 2020
Перець однорічний (солодкий) <i>Capsicum annuum</i> L. Sweet Pepper, Paprika							
16113001	16.02.2016	200781	10.12.2020	16.02.2016	Любаша Liubasha	1781	бюлетень, випуск 6, 2018
18113002	20.03.2018	191007	28.03.2019	20.03.2018	Кейсі Keessie	1730	
Помідор їстівний <i>Solanum lycopersicum</i> L. Tomato							
16115002	16.02.2016	200782	10.12.2020	16.02.2016	Янтарний богатир Yantarnyi bohatyr	1781	
16115004	16.02.2016	200783	10.12.2020	16.02.2016	Танок Tanok	1781	
16115005	16.02.2016	200784	10.12.2020	16.02.2016	Севен Seven	1781	
17115025	24.10.2017	191008	28.03.2019	24.10.2017	Сенсерно Senserno	1730	бюлетень, випуск 6, 2018
18115019	31.07.2018	200652	13.10.2020	31.07.2018	КЛАДРІЗ KLADRES	1902	бюлетень, випуск 5, 2020
19115013	20.05.2019	200653	12.10.2020	20.05.2019	Дінеро082 Dinero082	2507	бюлетень, випуск 5, 2020

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер патенту Number of patent	Дата реєстрації прав Date of rights registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Володілець сорту (код) Variety owner (code)	Опис морфологічних ознак
19115016	17.10.2019	200654	21.10.2020	17.10.2019	Томарі Tomary	1730	бюлетень, випуск 5, 2020
19115017	17.10.2019	200655	21.10.2020	17.10.2019	Сіберіте 916 Siberite 916	1730	бюлетень, випуск 5, 2020
19115018	17.10.2019	200656	02.10.2020	17.10.2019	Кавагучі Kawaguchi	1730	бюлетень, випуск 5, 2020
19115019	22.10.2019	200657	21.10.2020	22.10.2019	Пінквін Pinkwin	1730	бюлетень, випуск 5, 2020
19115020	22.10.2019	200658	21.10.2020	22.10.2019	Сантіана Santiana	1730	бюлетень, випуск 5, 2020
Редька посівна (редиска) <i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>sativus</i> Pers. Radish, Garden Radish, European Radish							
18118003	08.08.2018	200663	12.10.2020	08.08.2018	Романо Romano	2241	бюлетень, випуск 5, 2020
Салат посівний листовий <i>Lactuca sativa</i> L. var. <i>secalina</i> Lettuce							
19120006	10.06.2019	200668	02.10.2020	10.06.2019	Орбітал Orbital	1730	бюлетень, випуск 5, 2020
19120015	17.09.2019	200669	21.10.2020	17.09.2019	Тамбей Tambay	1730	бюлетень, випуск 5, 2020
19120021	17.09.2019	200670	21.10.2020	17.09.2019	Тражект Traject	1730	бюлетень, випуск 5, 2020
19120022	17.09.2019	200671	02.10.2020	17.09.2019	Дюнан Dunand	1730	бюлетень, випуск 5, 2020
19120023	17.09.2019	200672	21.10.2020	17.09.2019	Мінерал Mineral	1730	бюлетень, випуск 5, 2020
Диня звичайна <i>Cucumis melo</i> L. Melon							
18147002	27.06.2018	200635	02.10.2020	27.06.2018	Каліна Kalyna	1730	бюлетень, випуск 5, 2020
Горошок посівний (ярий) <i>Vicia sativa</i> L. Common Vetch (Spring)							
17177001	01.11.2017	200739	16.11.2020	01.11.2017	Володимир Volodymyr	1669	
Яблуна домашня <i>Malus domestica</i> Borkh. Apple							
18263006	17.12.2018	200674	09.10.2020	17.12.2018	Мілана Milana	348	
Ліщина велика (фундук) <i>Corylus maxima</i> Mill. Hazelnut							
19286002	04.10.2019	200772	28.09.2020	04.10.2019	Акорн Akorn	2640	бюлетень, випуск 5, 2020
19286003	04.10.2019	200773	28.09.2020	04.10.2019	Панський Panskyi	2640	бюлетень, випуск 5, 2020
Суниця садова <i>Fragaria ananassa</i> Duch. Strawberry							
19294001	17.04.2019	200810	24.11.2020	17.04.2019	ФІ1309 FI1309	1993	
Салат посівний головчастий <i>Lactuca sativa</i> L. var. <i>capitata</i> Lettuce, Head Lettuce							
17421005	16.08.2017	191009	28.03.2019	16.08.2017	Ізана Izanas	1730	бюлетень, випуск 1, 2019
17421006	16.08.2017	191010	28.03.2019	16.08.2017	Асмера Asmara	1730	бюлетень, випуск 1, 2019
17421007	16.08.2017	191011	28.03.2019	16.08.2017	Даянас Dayanas	1730	бюлетень, випуск 6, 2018
19421006	25.09.2019	200666	21.10.2020	25.09.2019	Катанас Katanas	1730	бюлетень, випуск 5, 2020
19421007	25.09.2019	200667	21.10.2020	25.09.2019	Антіліна Antolina	1730	бюлетень, випуск 5, 2020
Гісоп лікарський <i>Hyssopus officinalis</i> L. Hyssop							
19450001	08.07.2019	200634	05.10.2020	08.07.2019	Небокрай Nebokrai	1708	
Овес голозерний <i>Avena nuda</i> L. Naked Oat							
18520001	13.12.2018	200776	18.11.2020	13.12.2018	Родоніт Rodonit	2260	
Пшениця спельта (озима) <i>Triticum spelta</i> L. Spelt, Dinkel Wheat, Hulled Wheat							
18539003	18.07.2018	200804	16.11.2020	18.07.2018	Вишиванка білоцерківська Vyshyvanka bilotserkivska	2738 1097	

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер патенту Number of patent	Дата реєстрації прав Date of rights registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Володілець сорту (код) Variety owner (code)	Опис морфологічних ознак
Салат посівний ромен <i>Lactuca sativa</i> L. var. <i>longifolia</i> Roman Lettuce, Cos Lettuce							
17546003	16.08.2017	191012	28.03.2019	16.08.2017	Тацитус Tacitus	1730	бюлетень, випуск 6, 2018
17546004	16.08.2017	191013	28.03.2019	16.08.2017	Ролдона Roldona	1730	бюлетень, випуск 6, 2018
17546005	16.08.2017	191014	28.03.2019	16.08.2017	Тукадона Tuccadona	1730	бюлетень, випуск 6, 2018
17546006	24.10.2017	191015	28.03.2019	24.10.2017	Турінус Thurinus	1730	бюлетень, випуск 6, 2018
19546005	23.09.2019	200673	21.10.2020	23.09.2019	Алайн Alaine	1730	бюлетень, випуск 5, 2020
Бугиля кервель <i>Anthriscus cerefolium</i> (L.) Hoffm. Chervil, Garden Chervil							
19549001	08.07.2019	200737	11.12.2020	08.07.2019	Жайворонок Zhaivoronok	1708	
Дворядник тонколистий <i>Diplotaxis tenuifolia</i> (L.) DC. Rocket (Wild Rocket)							
17582002	15.11.2017	191004	28.03.2019	15.11.2017	Темісто Themisto	1730	бюлетень, випуск 6, 2018
17582003	15.11.2017	191005	28.03.2019	15.11.2017	Синоп Sinope	1730	бюлетень, випуск 6, 2018
19582001	08.07.2019	200741	11.12.2020	08.07.2019	Молодість Molodist	1708	
Просо африканське <i>Pennisetum glaucum</i> (L.) R.Br.							
20634001	09.01.2020	200659	16.10.2020	09.01.2020	Нутріджет Nutrijet	2554	бюлетень, випуск 5, 2020
Павловнія <i>Paulownia</i> Sieb. et Zucc. Paulownia							
20649001	23.01.2020	200778	26.11.2020	23.01.2020	Фенікс Feniks	736	
20649002	10.04.2020	200779	25.11.2020	10.04.2020	3E PRO	2692	
20649003	10.04.2020	200780	25.11.2020	10.04.2020	TURBO PRO	2692	
Костриця несправжньоовеча <i>Festuca pseudovina</i> Hack. ex Wiesb.							
19660001	27.03.2019	200757	27.10.2020	27.03.2019	Інгела Inhela	1669	бюлетень, випуск 5, 2020
Лобода кіноа <i>Chenopodium quinoa</i> Willd. Quinoa							
19661001	22.01.2019	200774	25.11.2020	22.01.2019	Олімп Olimp	2612	
Кукурудза звичайна – батьківський компонент <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn – parental component							
11004210	29.11.2011	200762	02.12.2020	29.11.2011	УГ329MB UH329MV	1433	бюлетень, випуск 2, 2015
12004137	06.12.2012	200763	02.12.2020	06.12.2012	УГ722CB3M UH722SVZM	1433	бюлетень, випуск 2, 2015
12004202	11.12.2012	200764	02.12.2020	11.12.2012	УГ722M UH722M	1433	бюлетень, випуск 2, 2015
13909215	02.12.2013	200765	02.12.2020	02.12.2013	УГ1462CB UH1462SV	1433	бюлетень, випуск 1, 2016
13909216	02.12.2013	200766	02.12.2020	02.12.2013	УГ242MB UH242MV	1433	бюлетень, випуск 1, 2016
13909217	02.12.2013	200767	02.12.2020	02.12.2013	УГ366зМ UH366зМ	1433	бюлетень, випуск 1, 2016
13909218	02.12.2013	200768	02.12.2020	02.12.2013	Маїс320М Mais320M	1433	бюлетень, випуск 1, 2016
Жито посівне (озиме) – батьківський компонент <i>Secale cereale</i> L. Rye (Winter) – parental component							
17915001	13.04.2017	200746	05.11.2020	13.04.2017	ЛСР137ЦЕ LSR137CE	824	бюлетень, випуск 5, 2020
17915002	13.04.2017	200747	05.11.2020	13.04.2017	ЛСР135 LSR135	824	бюлетень, випуск 5, 2020
17915003	13.04.2017	200748	05.11.2020	13.04.2017	ЛСР141 LSR141	824	бюлетень, випуск 5, 2020
18915001	09.01.2018	200749	05.11.2020	09.01.2018	ЛСР 147 LSR 147	824	бюлетень, випуск 5, 2020
18915002	09.01.2018	200750	05.11.2020	09.01.2018	ЛСР 126 LSR 126	824	бюлетень, випуск 5, 2020
18915003	09.01.2018	200751	05.11.2020	09.01.2018	Ло1019П Ло1066Н Lo1019P Lo1066N	824	бюлетень, випуск 5, 2020
18915005	09.01.2018	200752	05.11.2020	09.01.2018	ЛСР 151 LSR 151	824	бюлетень, випуск 5, 2020

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер патенту Number of patent	Дата реєстрації прав Date of rights registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Володілець сорту (код) Variety owner (code)	Опис морфологічних ознак
18915006	09.01.2018	200753	05.11.2020	09.01.2018	ЛСП 153 LSR 153	824	бюлетень, випуск 5, 2020
18915007	09.01.2018	200754	05.11.2020	09.01.2018	Ло1019П Ло1071Н Ло1019Р Ло1071Н	824	

Відомості про видані патенти на сорти рослин та їхньої завіреної копії

Information on issued patents on plant varieties and certified copies

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер патенту Patent number	Назва сорту Variety denomination	Володілець сорту (код) Variety owner (code)	Дата видачі Date of granting
Кукурудза звичайна <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn					
16009043	25.10.2016	200035	Просеко Proseco	844	17.11.2020
17009069	27.10.2017	200040	ЧОУРІ TCHOURI	844	17.11.2020
17009070	27.10.2017	200041	ДКС3595 DKC3595	844	17.11.2020
17009071	13.11.2017	200042	Піафф Piaff	844	17.11.2020
17009073	13.11.2017	200043	MAC220B MAS220V	844	17.11.2020
17009084	15.11.2017	200044	Естілла Estilla	844	17.11.2020
Буряк цукровий <i>Beta vulgaris</i> L. ssp. <i>vulgaris</i> var. <i>altissima</i> Doell Sugar Beet					
17069021	12.12.2017	200004	ЛІВІОЛА КВС LIVIOLO KWS	2092	24.11.2020
17069022	12.12.2017	200005	СМАРТ ДАНУТА КВС SMART DANUTA KWS	2092	24.11.2020
17069023	12.12.2017	200006	САНТОРІНА КВС SANTORINA KWS	2092	24.11.2020
17069025	12.12.2017	200007	ПРЕЦІОЗА КВС PREZIOSA KWS	2092	24.11.2020
17069026	12.12.2017	200008	КОНЦЕРТИНА КВС CONCERTINA KWS	2092	24.11.2020
17069027	12.12.2017	200009	СМАРТ БРІГА КВС SMART BRIGA KWS	2092	24.11.2020
17069029	12.12.2017	200010	СМАРТ НАРНІЯ КВС SMART NARNIA KWS	2092	24.11.2020
17069031	12.12.2017	200011	СТЕПАНКА КВС STEPANKA KWS	2092	24.11.2020
17069032	12.12.2017	200012	АННАМІРА КВС ANNAMIRA KWS	2092	24.11.2020
18069001	24.01.2018	200016	СМАРТ КЛІВІЯ КВС SMART KLIVIA KWS	2092	24.11.2020
Боби кінські <i>Vicia faba</i> L. var. <i>minor</i> Field Bean					
18094001	07.02.2018	200001	Аполло Apollo	2258	10.11.2020
18094002	07.02.2018	200002	Біргіт Birgit	2258	10.11.2020
18094003	07.02.2018	200003	Стелла Stella	2258	10.11.2020
Капуста цвітна <i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>botrytis</i> (L.) Alef. var. <i>botrytis</i> L. Cauliflower					
17101004	26.10.2017	200029	Овіндолі Ovindoli	1852	17.11.2020
Кавун звичайний <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Watermelon					
17146006	27.11.2017	200025	Морган Morhan	1730	12.11.2020
Жито посівне (озиме) – батьківський компонент <i>Secale cereale</i> L. Rye (Winter) – parental component					
17915004	14.04.2017	200023	Ло1018П Ло1015Н Lo1018P Lo1015N	824	24.11.2020
17915005	20.04.2017	200024	Ло1019П Ло1059Н Lo1019P Lo1059N	824	24.11.2020

Відомості щодо припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин та визнання їх не чинними

Information on termination of intellectual property rights on plant varieties and their acceptance is not valid

Номер заявки Number of application	Номер патенту Number of patent	Назва сорту Variety denomination	Володілець сорту (код) Variety owner (code)	Дата реєстрації припинення права Registration date of the right termination	Підстава On the basis of
Кукурудза звичайна <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn					
17009140	200082	КВС БОЛІВІО KWS BOLIVIO	2092	17.12.2020	Наказ Мінекономіки від 17.12.2020 № 2680 (за клопотанням)
17009141	200083	КВС АГГРО KWS AGGRO	2092	17.12.2020	Наказ Мінекономіки від 17.12.2020 № 2680 (за клопотанням)
Ріпак (озимий) <i>Brassica napus</i> L. <i>oleifera</i> Rape Seed (Winter)					
14040045	180945	АЛЬБЕРІХ КВС ALLBERICH KWS	2092	17.12.2020	Наказ Мінекономіки від 17.12.2020 № 2680 (за клопотанням)

Відомості про відновлення чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорти рослин

For information about restoring force of the intellectual property rights for plant varieties

Номер патенту Number of patent	Назва сорту Variety denomination	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Дата реєстрації відновлення права Registration date of renewing right	Підстава On the basis of
Кукурудза звичайна <i>Zea mays</i> L. Corn, Maize				
170435	Аполлон Apollon	2619	13.11.2020	Наказ Мінекономіки від 13.11.2020 № 2321
170436	Кріос Krios	2619	13.11.2020	Наказ Мінекономіки від 13.11.2020 № 2321
Суниця <i>Fragaria</i> L. Strawberry				
10377	Флорида Фестиваль Florida Festival	1282	03.12.2020	Наказ Мінекономіки від 03.12.2020 № 2521

Інші відомості, внесені до Реєстру патентів

Other notifications as listed in the Register of Patents

Відповідно до наказу Мінекономіки № 2221-20 від 02.11.2020 «Про внесення змін до відомостей, що містяться в Реєстрі патентів на сорти рослин та Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні» внесено зміни до відомостей, що містяться в Реєстрі патентів на сорти рослин, стосовно сорту суниці садової Вайбрант (заявка № 14294005) щодо зміни назви власника патенту, замінивши слова і цифри «Meiosis Limited», Бредбурн Хаус Стебл Блок, Іст Моллінг, Кент ME19 6 ДЗ Англія (Bradbourne House Stable Block, East Malling, Kent, ME 19 6 DZ, England), тел.: +44/1732872711, факс: +44/1732 872712, e-mail: mark.coxeter@meiosis.co.uk» словами і цифрами «НІАБ ЕМР (NIAB EMR), НІАБ, 93 Лоуренс Вівер Роуд, Кембрідж, Кембриджшир, CB3 0LF, Сполучене Королівство, тел.: +44(0)/1732843833, e-mail: enquiries@emr.ac.uk».

Відповідно до наказу Мінекономіки № 2243-20 від 04.11.2020 «Про внесення змін до відомостей, що містяться в Реєстрі патентів на сорти рослин та Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні» внесено зміни до відомостей, що містяться в Реєстрі патентів на сорти рослин, стосовно сортів пшениці м'якої озимої: Олеса (заявка № 97007009), Перлина лісостепу

(заявка № 98007013), Елегія (заявка № 99007003), Либідь (заявка № 03007021), Лісова пісня (заявка № 05007035), Царівна (заявка № 05007036), Романтика (заявка № 06007038), Відрада (заявка № 07007034), Чародійка білоцерківська (заявка № 08007045), Щедра нива (заявка № 08007046) щодо зміни назви володільця патенту, замінивши слова і цифри «Білоцерківська дослідно-селекційна станція ім. О. К. Коломієць Інституту цукрових буряків Української академії аграрних наук, п/в Мала Вільшанка, 1, Білоцерківський р-н, Київська обл., 09175, тел.: +3804463/2-54-95, факс: +3804463/2-54-95» словами і цифрами «Білоцерківська дослідно-селекційна станція Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України, с. Мала Вільшанка, 1, Білоцерківський р-н, Київська обл., 09175, тел.: +3804463/2-54-95, факс: +3804463/2-54-95, e-mail: bc-selecstation.com.ua».

Відповідно до наказу Мінекономіки № 2682-20 від 17.12.2020 «Про внесення змін до відомостей, що містяться в Реєстрі патентів на сорти рослин та Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні» внесено зміни до назв сортів рослин, що містяться в Реєстрі патентів на сорти рослин, згідно з переліком.

ПЕРЕЛІК

сортів рослин, щодо яких змінюється назва сорту, зазначених у Реєстрі патентів на сорти рослин

№	Назва сорту	Змінена назва сорту	Заявник	Номер та дата подання заявки	Клопотання щодо зміни назви сорту (вхідний номер Мінекономіки)	Підстави для зміни назви
Кукурудза звичайна						
1	ДКС3379 (DKC3379)	СТАРОФ (STAROF)	Монсанто Технології ЛТД	28.10.2015 № 15009019	Від 22.10.2020 (23.10.2020 № 07/98793-20)	Відповідно до статті 28 Закону після затвердження назви сорту рішенням про виникнення прав на сорт її зміна Компетентним органом можлива, якщо встановлено, що вона не відповідає умовам, викладеним у статті 13, або володільць патенту чи будь-яка інша особа вимагає заборонити використання існуючої назви сорту (сорт занесений до Реєстру патентів на сорти рослин та Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні)
2	ДКС3893 (DKC3893)	ЧОУРІ (TCHOURI)	Монсанто Технології ЛТД	27.10.2017 № 17009069	22.10.2020 (23.10.2020 № 07/98803-20)	Відповідно до статті 28 Закону після затвердження назви сорту рішенням про виникнення прав на сорт її зміна Компетентним органом можлива, якщо встановлено, що вона не відповідає умовам, викладеним у статті 13, або володільць патенту чи будь-яка інша особа вимагає заборонити використання існуючої назви сорту (сорт занесений до Реєстру патентів на сорти рослин та Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні)

Відомості, внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні (Реєстр сортів рослин України)

Notifications listed in the State Register of Plant Varieties Suitable for Dissemination in Ukraine (Register of Plant Varieties of Ukraine)

Відомості про сорти рослин, щодо яких прийнято рішення про державну реєстрацію прав на сорт та внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Information on plant varieties, for which a decision on the state registration of the variety and included in the State register of plant varieties suitable for distribution in Ukraine

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата пріоритету Date of Priority	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)
Пшениця тверда (яра) <i>Triticum durum</i> Desf. Durum Wheat (Spring)					
17006009	20.10.2020	16.11.2017	Альжбета Alzhbeta	736	736
18006002	17.11.2020		Meica Meisa	1581	1581
Пшениця тверда (озима) <i>Triticum durum</i> Desf. Durum Wheat (Winter)					
18007001	24.11.2020	01.03.2018	Алмазний Almaznyi	1591	1591
18007002	24.11.2020	01.03.2018	Янтарний Yantarnyi	1591	1591
18007003	28.10.2020	27.04.2018	Діадур Diadur	1564	1564
Гречка їстівна <i>Fagopyrum esculentum</i> Moench Buckwheat					
17008001	15.10.2020		Володар Volodar	417	417
18008003	06.11.2020		Покровська Pokrovska	1626	1626
18008004	20.11.2020	10.12.2018	Христина Khrystyna	2546	2546
Кукурудза звичайна <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn					
16009124	22.12.2020		КМ 3130	2257	2257
17009044	22.12.2020		КМ 3130 ЄС Орїлскай YeS Orilskai	2287	2287
17009087	15.12.2020		Адей Adei	966	966
17009124	15.12.2020		Гебалот Gebalot	2524	2524
17009178	18.12.2020		ДН Джюра DN Dzhura	2260	2260
17009184	18.12.2020		ДН Сінрай DN Sinrai	2260	2260
18009033	15.12.2020		B3316C B3316C	9	9
18009034	15.12.2020		P9889 P9889	9	9
18009035	15.12.2020		P9610 P9610	9	9
18009036	15.12.2020		P8271 P8271	9	9
18009037	16.12.2020		P0200 P0200	9	9
18009039	15.12.2020		P9978 P9978	9	9
18009041	15.12.2020		P0217 P0217	9	9
18009042	15.12.2020		P9300 P9300	9	9
18009043	15.12.2020		B2114Ц B2114Ts	9	9
18009044	15.12.2020		P8329 P8329	9	9

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата пріоритету Date of Priority	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)
18009045	15.12.2020		П8666	9	9
18009046	17.12.2020		P8666		
18009050	15.12.2020		Кардіф	1902	1902
18009051	15.12.2020		Cardif		
18009052	15.12.2020		АМАЗОН	924	924
18009055	15.12.2020		AMAZON		
18009063	15.12.2020		МАС 16Б	924	924
18009064	15.12.2020		MAS 16B		
18009065	15.12.2020		ЛУКАКУ	924	924
18009072	15.12.2020		LUKAKU		
18009073	15.12.2020		СКАНДИНАВ	924	924
18009077	15.12.2020		SCANDINAV		
18009078	15.12.2020		Глуманда	844	844
18009079	15.12.2020		Glumanda		
18009080	15.12.2020		Контенто	2011	2011
18009081	15.12.2020		Contento		
18009083	15.12.2020		Леонідо	2011	2011
18009084	15.12.2020		Leonido		
18009085	18.12.2020		РЖТ ФЕРАРІККС ВАКСІ	1783	1783
18009086	18.12.2020		RGT FERARIXX WAXY		
18009087	18.12.2020		ГІМОВ	1783	1783
18009088	15.12.2020		GUIMAUVE		
18009089	15.12.2020		КВС ПАУЛО	2649	2649
18009090	23.12.2020		KWS PAULO		
18009091	18.12.2020		Балта	2530	2530
18009092	18.12.2020		Balta		
18009093	18.12.2020		РЖТ ІРЕНОККС	1783	1783
18009094	18.12.2020		RGT IRENOXX		
18009095	18.12.2020		РЖТ ЕККЗАКТ	1783	1783
18009096	15.12.2020		RGT EXHACT		
18009097	15.12.2020		КВС БУРІТО	2649	2649
18009098	15.12.2020		KWS BURITO		
18009099	15.12.2020		КВС ФОРТУНАТО	2649	2649
18009100	15.12.2020		KWS FORTUNATO		
18009101	15.12.2020		КВС ІНТЕЛЕГЕНС	2649	2649
18009102	15.12.2020		KWS INTELIGENS		
18009103	15.12.2020		КВС АДАЖІО	2649	2649
18009104	15.12.2020		KWS ADAGIO		
18009105	15.12.2020		ЛЕОНОВО	2649	2649
18009106	15.12.2020		LEONOWO		
18009107	15.12.2020		БІГБІТ	2649	2649
18009108	15.12.2020		BIGBEAT		
18009109	15.12.2020		КВС ПРОВІЗО	2649	2649
18009110	15.12.2020		KWS PROVISO		
18009111	15.12.2020		КВС ГЕНДАЛЬФ	2649	2649
18009112	15.12.2020		KWS GANDALF		
18009113	15.12.2020		КВС КАЛАФУНА	2649	2649
18009114	15.12.2020		KWS KALAFUNA		
18009115	15.12.2020		КВС ЛАУРО	2649	2649
18009116	15.12.2020		KWS LAURO		
18009117	15.12.2020		КВС БІСТРО	2649	2649
18009118	15.12.2020		KWS BISTRO		
18009119	15.12.2020		КВС ДИНАМО	2649	2649
18009120	15.12.2020		KWS DYNAMO		
18009121	15.12.2020		ІМПРЕССІВО	2649	2649
18009122	15.12.2020		IMPRESSIVO		
18009123	15.12.2020		БАГРОВО	2649	2649
18009124	15.12.2020		BAGROWO		
18009125	15.12.2020		КВС РАМІРО	2649	2649
18009126	15.12.2020		KWS RAMIRO		
18009127	15.12.2020		КАМЕО	2649	2649
18009128	15.12.2020		CAMEO		
18009129	15.12.2020		КВС ДЖОРДЖІО	2649	2649
18009130	15.12.2020		KWS GEORGIO		
18009131	15.12.2020		ДЕЛАНО	2649	2649
18009132	17.12.2020		DELANO		
18009133	18.12.2020		ЛГ 31330	793	793
18009134	18.12.2020		LG 31330		
18009135	18.12.2020		РЖТ СІНФОНІККС	1783	1783
18009136	18.12.2020		RGT SYNFONIXX		
18009137	18.12.2020		РЖТ КОККСІНЕЛЛЬ	1783	1783
18009138	18.12.2020		RGT COXXINELLE		
18009139	18.12.2020		РЖТ МІКАЕЛІККС	1783	1783
18009140			RGT MIKAELIXX		

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата пріоритету Date of Priority	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)
18009148	15.12.2020		Дулкано Dulcano	2524 2436	2524 2436
18009149	18.12.2020		ЕЛЬДАКАР ELDACAR	1783	1783
18009150	15.12.2020		Дженні Jenny	2524 2436	2524 2436
18009151	15.12.2020		Валат Vallat	2524 2436	2524 2436
18009152	15.12.2020		Ервінга Erwinga	2524 2436	2524 2436
18009153	15.12.2020		Зума Zuma	2524 2436	2524 2436
18009154	15.12.2020		Юренга Jurenga	2524 2436	2524 2436
18009155	17.12.2020		СПАРТАН Spartan	2537	2537
18009158	15.12.2020		П7948 P7948	9	9
18009180	15.12.2020		ДС1897Б DS1897B	2094	2094
18009181	18.12.2020		ДЗ Шквал DZ Shkval	2260 1988	2260 1988
18009182	18.12.2020		ДН Анаїт DN Anait	2260	2260
18009183	18.12.2020		ДН Велд DN Veld	2260	2260
18009184	18.12.2020		ДН Атон DN Aton	2260	2260
18009185	18.12.2020		ДН Пульсация DN Pulsatsiia	2260	2260
18009186	18.12.2020		ДН Стяг DN Stiah	2260	2260
19009011	22.12.2020		Девіс Devis	2260 921	2260 921
19009012	22.12.2020		Нокс Noks	2260 921	2260 921
19009013	22.12.2020		Кросбі Krosbi	2260 921	2260 921
19009014	22.12.2020		Вебер Veber	2260 921	2260 921
19009021	22.12.2020		КМ 3260 KM 3260	2257	2257
19009022	22.12.2020		КМ 4100 KM 4100	2257	2257
19009023	22.12.2020		КМ 3310 KM 3310	2257	2257
Овес посівний (ярий) <i>Avena sativa</i> L. Oat (Spring)					
18011001	28.10.2020		Ерл Earl	2524	2524
18011002	17.11.2020		Матрос Matros	1990	1990
18011003	10.11.2020	13.12.2018	Азамат Azamat	2260	2260
Пшениця м'яка (озима) <i>Triticum aestivum</i> L. Soft Wheat (Winter)					
15012066	20.11.2020		Агота Agota	2597	2597
15012067	20.11.2020		Астерія Asteria	2597	2597
15012068	27.10.2020	16.12.2015	Адїса Adisa	2597	2597
15012070	20.11.2020		Анрі Anri	2597	2597
16012025	15.12.2020		Трубліон Trublion	2238	2238
16012052	02.11.2020		Діжон Dizhon	1517	1517
16140001	09.11.2020	15.06.2016	Арабатка Arabatka	1123	1123
17012018	20.11.2020		ДОБРОВІТ DOBROVIT	2597	2597
17012019	20.11.2020		ГОРИНЯ GORYNIA	2597	2597

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата пріоритету Date of Priority	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)
17012020	20.11.2020		ЗЛАТАНА ZLATANA	2597	2597
17012021	20.11.2020		ГЕРМА GERMA	2597	2597
17012022	20.11.2020		ІСТА ISTA	2597	2597
17012046	17.11.2020	22.11.2017	ОРЖИЦЯ НОВА ORZHYTsIA NOVA	386	386
17012049	17.11.2020		Проня Pronia	1581	1581
18012002	13.11.2020		Крепиш Krepysh	1543	1543
18012005	06.11.2020	23.02.2018	Академічна 100 Akademichna 100	355	355
18012006	06.11.2020	23.02.2018	Світязь Svitiaz	355	355
18012007	06.11.2020	23.02.2018	Ювілейна Патона Yuvileina Patona	355	355
18012009	02.11.2020	27.02.2018	Золотце Zolottse	1998	1998
18012010	02.11.2020	27.02.2018	Гефест Hefest	1998	1998
18012011	24.11.2020	01.03.2018	Гейзер Heizer	1591	1591
18012012	24.11.2020	01.03.2018	Основа одеська Osnova odeska	1591	1591
18012013	24.11.2020	01.03.2018	Громада Hromada	1591	1591
18012015	06.11.2020	23.02.2018	Київська 19 Kyivska 19	355	355
18012016	24.11.2020	01.03.2018	Відповідь одеська Vidpovid odeska	1591	1591
18012017	24.11.2020	01.03.2018	Перемога одеська Peremoha odeska	1591	1591
18012018	24.11.2020		Гладь Hlad	1591	1591
18012019	24.11.2020		АФК ЕЛІТ ГРЕЙН AFK ELIT HREIN	655	655
18012020	24.11.2020		АФК СТРОНГ AFK STRONH	655	655
18012021	24.11.2020		АФК ПАУЕР AFK PAUER	655	655
18012024	06.11.2020		Пирятинка Pyriatynka	1626	1626
18012025	06.11.2020		Ефектна Efektna	1626	1626
18012026	06.11.2020		Фортеця Поліська Fortetsia Poliska	1626	1626
18012032	28.10.2020	27.04.2018	Цеціліус Cecilius	1564	1564
18012033	28.10.2020	27.04.2018	Сідоніус Sidonius	1564	1564
18012034	28.10.2020	27.04.2018	Тоннаж Tonnage	2486	2486
18012035	04.11.2020	23.05.2018	Аквілегія Akvillehiia	1698	1698
18012037	04.11.2020	23.05.2018	Херсонська Фортеця Khersonska Fortetsia	1698	1698
18012038	23.10.2020	23.05.2018	Шеріф Sheriff	947	947
18012040	28.10.2020		ГК Корос GK Koros	1694	2537
18012042	02.12.2020	07.06.2018	Емблем Emblem	807	807
18012043	02.12.2020	07.06.2018	Архітект Architekt	807	807
18012044	02.12.2020	07.06.2018	Аскабан Askaban	807	807
18012045	02.12.2020	07.06.2018	Сомельє Sommelier	807	807
18012046	02.12.2020	07.06.2018	Бригантина Brigantina	807	807
18012050	23.10.2020		Пітон Python	2238	2238

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата пріоритету Date of Priority	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)
18012052	26.10.2020	27.06.2018	Асорі	1797	1797
18012063	16.11.2020	18.07.2018	Асору Гадзинка Hadzynka	1635 1097	2738 1097
Пшениця м'яка (яра) <i>Triticum aestivum</i> L. Soft Wheat (Spring)					
18013001	23.10.2020	06.12.2018	Токата	2076	880
18013002	11.12.2020		Тоската	2513	2513
19013002	20.11.2020	01.02.2019	ВПБ Трой WPB Troy КВС Старлайт KWS Starlight	824	824
Просо посівне <i>Panicum miliaceum</i> L. Common Millet					
17014001	17.12.2020		Казкове джерело	1581	1581
18014001	03.11.2020		Kazkove dzherelo	2524 2436	2524 2436
18014002	17.11.2020		Корнбергер Міттельфрюе Kornberger Mittelfruhe Дивовижне Dyuvovyzhne	1581	1581
Жито посівне (озиме) <i>Secale cereale</i> L. Rye (Winter)					
17015007	21.10.2020	13.04.2017	Оріана	2291	2291
18015006	20.10.2020	09.01.2018	Oriana	824	824
18015007	21.10.2020	08.02.2018	КВС Пропауер KWS Propower	2291	2291
18015008	20.11.2020		Алатир	2291 736	2291 736
18015009	09.12.2020		Алатур	1990	1990
18015010	09.12.2020		Ласкаве	1990	1990
18015013	20.11.2020		Laskave Верша Versha Амей Amei Еліас Elias	2524	2524
Сорго звичайне (двокольорове) <i>Sorghum bicolor</i> L. Sorghum					
17018010	15.12.2020		КВС НЕМЕСІС	2649	2649
18018001	18.12.2020		KWS NEMESIS	1783	1783
18018005	15.12.2020		РЖТ АЛІГГАТОР	2649	2649
18018006	18.12.2020		RGT ALIGGATOR	2260	2260
18018009	22.12.2020		КВС РАСМУС	2554	2554
			KWS RASMUS		
			Сріблясте		
			Sribliaste		
			Сентініл ІГ		
			Sentinel IG		
Ячмінь звичайний (озимий) <i>Hordeum vulgare</i> L. Barley (Winter)					
17019002	02.12.2020		Гіронделла	1891	1891
18019001	02.11.2020	27.02.2018	Hirondella	1998	1998
18019002	24.11.2020	01.03.2018	Непереможний	1591	1591
18019004	10.11.2020		Neperezhnyy	1959	1959
18019005	23.10.2020	23.05.2018	Крікс	2302	2302
18019006	23.10.2020		Kriks	926	926
18019007	23.10.2020		СИ КОМЕТ	1223	1223
18019008	23.10.2020		SY KOOMET	1223	1223
			КАЙЛІН		
			KAYLIN		
			Белісса		
			Belissa		
			Аренія		
			Arenia		
			Белла		
			Bella		
Ячмінь звичайний (ярий) <i>Hordeum vulgare</i> L. Barley (Spring)					
17020020	17.11.2020		Кречет	1581	1581
18020006	28.10.2020		Krechets	2524 2301	2524 2301
18020007	23.10.2020		Ескалена	2545	947
			Escalena		
			Проспект		
			Prospect		

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата пріоритету Date of Priority	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)
18020008	05.11.2020	12.12.2018	МІП Люкс MIP Liuks	1589	1589
18020009	05.11.2020	12.12.2018	МІП Акцент MIP Aktsent	1589	1589
18020010	09.11.2020		Арей Arei	2260	2260
18020011	11.12.2020		АМІДАЛА AMIDALA	1223	1223
18020012	11.12.2020		АББА ABBA	1223	1223
18020013	11.12.2020		Реванш Revanche	1891	1891
Тритикале (озиме) <i>Triticosecale</i> Witt. Triticale (Winter)					
17022002	17.11.2020		Леонтій Leontii	1581	1581
17022009	05.11.2020	21.12.2017	Мироносець Myronosets	1589 1601	1589 1601
17022010	27.10.2020	22.12.2017	Пудік Pudik	2632 1807	2632 1807
18022001	17.11.2020		Елань Yelan	1581 2284	1581 2284
Горох посівний (зерновий) <i>Pisum sativum</i> L. Pea					
17023011	24.11.2020	27.11.2017	Білий ангел Bilyi anhel	1591	1591
Квасоля звичайна (зернова) <i>Phaseolus vulgaris</i> L. French Bean					
18025001	10.11.2020		Журавка Zhuravka	2260	2260
18025002	26.10.2020		Подольанка Podolianka	2471	2471
Нут звичайний <i>Cicer arietinum</i> L. Chick-Pea					
19028005	09.11.2020	13.12.2019	Бланко Blanko	1123	1123
Арахіс підземний <i>Arachis hypogaea</i> L. Groundnut					
20031001	30.11.2020		Кремена Kremena	2675	2675
20031002	30.11.2020		Цветеліна Tsvetelina	2675	2675
Гірчиця сарептська (яра) <i>Brassica juncea</i> (L.) Czern. Brown Mustard (Spring)					
19032001	08.12.2020		Корона Korona	2458	2458
19032002	17.12.2020	09.12.2019	Сінтіум Sintium	2654	2654
Льон низький (олійний, кудряш) <i>Linum humile</i> Mill. Linseed					
19035001	24.11.2020		Парус Parus	2458	2458
Соняшник однорічний <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower					
15039022	05.10.2020	23.10.2015	Есмань Esman`	1848	1848
16039079	15.12.2020		Каледонія КЛ Kaledonia CL	485	485
17039060	01.12.2020		ЕС Бонум YeS Bonum	2287	2287
17039061	01.12.2020		ЕС Харді YeS Khardi	2287	2287
17039062	01.12.2020		ЕС Прімум YeS Primum	2287	2287
17039063	01.12.2020		ЕС Ортус YeS Ortus	2287	2287
17039064	01.12.2020		ЕС Фортем YeS Fortem	2287	2287
17039068	15.12.2020		КДВ 2017 KDV 2017	2265	2265
17039126	17.12.2020		Марвін Marvin	2291	2291
18039007	17.12.2020		Булерія Buleria	2312	2312

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата пріоритету Date of Priority	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)
18039008	17.12.2020		Тріполі Tripoli	2312	2312
18039018	22.12.2020		ХОРОЛ KhOROL	2458	2458
18039023	23.12.2020		Гранд Адмірал Hrand Admiral	2467 2468	2467 2468
18039024	15.12.2020		П64ГГ150 P64HH150	9	9
18039025	15.12.2020		П64ЛЕ153 P64LE153	9	9
18039026	15.12.2020		П63ГГ142 P63HH142	9	9
18039027	15.12.2020		П64ЛЛ155 P64LL155	9	9
18039028	02.12.2020		МАРІСАН MARISUN	924	924
18039031	15.12.2020		КОНКВЕСТ CONQUEST	924	924
18039033	15.12.2020		ВАДОР VADOR	924	924
18039034	02.12.2020		МАС 810Б MAS 810B	924	924
18039035	02.12.2020		МАС 865ІР MAS 865IR	924	924
18039036	15.12.2020		Кімера СТ Kimera ST	924	924
18039037	15.12.2020		ДЖУЛІУС JULIUS	924	924
18039045	15.12.2020		Реасан Reasun	2232	2232
18039046	15.12.2020		Флорасан Florasun	2232	2232
18039047	15.12.2020		МАС 920КП MAS 920CP	924	924
18039050	30.11.2020		КВС ЦЕЗАРЕС КЛ KWS CESARES CL	2649	2649
18039052	15.12.2020		КВС АМОРЕС КЛ KWS AMORES CL	2649	2649
18039055	02.12.2020		РЖТ КАПІТОЛЛ RGT CAPITOLL	1783	1783
18039057	18.12.2020		АУСТІН AUSTIN	1783	1783
18039059	30.11.2020		ЛГ50455 КЛП LG50455 CLP	793	793
18039060	30.11.2020		ЛГ50479 СХ LG50479 SX	793	793
18039061	30.11.2020		ЛГ50586 КЛП LG50586 CLP	793	793
18039062	30.11.2020		ЛГ50529 СХ LG50529 SX	793	793
18039064	02.12.2020		ТРАВЕЛЛЕР TRAVELLER	1783	1783
18039092	15.12.2020		КВС ПЕРСЕУС КЛ KWS PERSEUS CL	2649	2649
18039093	15.12.2020		КВС АПАЧІ КЛ KWS APACHE CL	2649	2649
18039103	17.12.2020		Текадра Tecadra	2537	2537
18039106	17.12.2020		Барон BARON	2267	2267
18039107	17.12.2020		Фортасол Fortasol	2267	2267
18039112	17.12.2020		Ласса Lassa	2539	2539
18039113	23.12.2020		ФОРТЕРА FORTERA	2440	2440
18039115	17.12.2020		Алекса СУ Alexa SU	2537	2537
18039116	17.12.2020		Даверо СУ Davero SU	2537	2537
18039121	15.12.2020		Уносан Unosun	2011	2011
18039132	17.12.2020		Гуара Guara	2267	2267

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата пріоритету Date of Priority	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)
18039151	22.12.2020		Хайсан 195 ІТ Hysun 195 IT	2554	2554
18039152	22.12.2020		Хайсан 268 ІТ Hysun 268 IT	2554	2554
18039153	22.12.2020		Хайсан 189 СУ Hysun 189 SU	2554	2554
19039014	17.12.2020		Катрін Katrin	2576 2676	2576 2676
19039015	17.12.2020		ЗУРО 162 SURO 162	2537	2537
Ріпак (озимий) <i>Brassica napus</i> L. <i>oleifera</i> Rape Seed (Winter)					
17040015	20.11.2020		ІНВ1188 INV1188	2602	2602
17040016	17.12.2020		ІНВУЕЛО INVUELO	2602	2602
17040021	20.11.2020		ІНВ1199 INV1199	2602	2602
17040022	20.11.2020		ІНВ1170 INV1170	2602	2602
18040006	09.12.2020		ПАРКУРС PARCOURS	912	912
18040010	09.12.2020		ВІОЛІН VIOLIN	912	912
18040011	09.12.2020		ТЕМПО TEMPO	912	912
18040020	27.10.2020	03.05.2018	АЛІВІО ALIVIO	2602	2602
18040021	27.10.2020	03.05.2018	КВІТО QUITO	2602	2602
18040024	27.10.2020	03.05.2018	ІНВ1266 КЛ INV1266 CL	2602	2602
18040026	27.10.2020	03.05.2018	ТАЛЕЛ КЛ THALEL CL	2602	2602
18040028	27.10.2020		СИ ФЛОРІАН SY FLORIAN	1959	1959
18040029	27.10.2020		СИ ІОБА SY IOWA	1959	1959
18040035	16.10.2020		ПХ131 PKh131	9	9
18040039	02.12.2020		Людгер Ludger	807	807
18040040	02.12.2020		Шопен Chopin	807	807
18040041	02.12.2020		Батис Batis	807	807
18040043	02.12.2020		Дайнемік DYNAMIC	807	807
18040044	02.12.2020		Донат Donut	807	807
18040046	02.12.2020		Сімплекс КЛ Simplex CL	807	807
18040047	28.10.2020		Галілеус Galileus	2524	2524
18040048	23.10.2020		ЕС НАВІГО ES NAVIGO	806	806
18040049	23.10.2020		ЕС АМАДЕО ES AMADEO	806	806
Ріпак (ярий) <i>Brassica napus</i> L. <i>oleifera</i> Rape Seed (Spring)					
15041011	30.11.2020		ІНВ110 КЛ INV110 CL	2602	2602
17041009	30.11.2020		Перформер Performer	2602	2602
17041013	18.12.2020		Чеві КЛ Chevy CL	912	912
18041002	18.12.2020		Клауд КЛ Cloud CL	912	912
18041003	18.12.2020		Колет КЛ Colette CL	912	912
18041004	18.12.2020		Караміно КЛ Caramino CL	912	912

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата пріоритету Date of Priority	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)	
Соя культурна <i>Glycine max</i> (L.) Merrill Soya Bean						
17045034	22.12.2020	01.11.2017	Паллада Pallada	1669	1669	
18045011	15.12.2020		Ангеліка Angelica	1498	1498	
18045012	15.12.2020		Атакама Atacama	1498	1498	
18045013	15.12.2020		Акардія Acardia	1498	1498	
18045025	22.12.2020		Чураївна Churaivna	1669	1669	
18045027	15.12.2020		Адесса Adessa	2011	2011	
18045028	18.12.2020		СОЛЕНА SOLENA	1783	1783	
18045030	18.12.2020		РЖТ СФІНКСА RGT SPHINXA	1783	1783	
18045038	18.12.2020		ААЦ Інвест 1605 AAC Invest 1605	2536	2536	
18045039	15.12.2020		Амбелла Ambella	2011	2011	
18045043	22.12.2020		Титан Tytan	1669 1591	1669 1591	
18045044	22.12.2020		Райдо Raido	2430	2430	
18045045	17.12.2020		ЯКАРІ YAKARI	2258	2258	
Буряк цукровий <i>Beta vulgaris</i> L. ssp. <i>vulgaris</i> var. <i>altissima</i> Doell Sugar Beet						
18069015	15.12.2020		СМАРТ ЛАТОРІЯ КВС SMART LATORIA KWS	2649	2649	
18069016	15.12.2020		СМАРТ ЯСНА КВС SMART JASNA KWS	2649	2649	
18069019	15.12.2020		СМАРТ ДЖІНЕВРА КВС SMART GINEVRA KWS	2649	2649	
18069020	15.12.2020		АЛЬВЕРІНА КВС ALVERINA KWS	2649	2649	
18069021	15.12.2020		СМАРТ ІБЕРІЯ КВС SMART IBERIA KWS	2649	2649	
18069024	15.12.2020		БЕНІАМІНА КВС BENIAMINA KWS	2649	2649	
18069025	15.12.2020		СМАРТ ЛЕОНА КВС SMART LEONA KWS	2649	2649	
18069026	15.12.2020		СМАРТ ДЖЕРБА КВС SMART DJERBA KWS	2649	2649	
18069033	21.12.2020		ФДР19Б1123 FDR19B1123	796	796	
18069034	21.12.2020		ФДР19Б2094 FDR19B2094	796	796	
18069035	21.12.2020		ФДР19Б4027 FDR19B4027	796	796	
Коноплі посівні <i>Cannabis sativa</i> L. Hemp						
19080001	24.11.2020		29.01.2019	Артеміда Artemida	2289	2289
Льон звичайний, довгунець <i>Linum usitatissimum</i> L. Flax, Linseed						
15081004	24.12.2020		Сіверський Sivers'kyi	1869	1869	
17081002	24.11.2020		Усівський Usivskyi	2289	2289	
Картопля <i>Solanum tuberosum</i> L. Potato						
17088005	16.12.2020	02.11.2018	Княжа Kniazha	369	369	
18088016	10.12.2020		Містерія Misteriia	1710	1710	
18088018	30.11.2020		7 ФОР 7 7 FOUR 7	801	801	
18088019	30.11.2020		Родріга Rodriga	1508	1508	
18088020	04.12.2020		АЛЮЕТТ ALOUETTE	1652	1652	

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата пріоритету Date of Priority	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)
18088021	04.12.2020		ПАРАДІЗО PARADISO	1652	1652
18088022	04.12.2020		ФОНТАНЕ FONTANE	1652	1652
18088023	04.12.2020		РАНОМІ RANOMI	1652	1652
18088024	04.12.2020		ЛАУДІН LAUDINE	1652	1652
19088001	01.12.2020		Шері Cherie	2584	2584
Баклажан <i>Solanum melongena</i> L. Egg Plant					
17093001	10.12.2020	16.01.2017	Віронік Vironik	1781	1781
19093003	27.10.2020	22.11.2019	СВ1574ЕВ SV1574EV	1852	1852
19093004	20.10.2020	27.12.2019	Мінерва Minerva	2659	2659
20093003	15.12.2020	10.02.2020	Джокер Jocker	2226	2226
Капуста білоголова <i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>alba</i> DC. White Cabbage					
18096001	02.12.2020		Ірма Irma	2200 2485	2200 2485
18096003	25.11.2020		Оксілус Oxylus	1852	1852
18096004	25.11.2020		Тропикана Tropicana	1852	1852
18096005	25.11.2020		Аструс Плюс Astrus Plus	1852	1852
18096008	08.12.2020		ЛАУДА LAUDA	1959	1959
18096009	08.12.2020		КІЛАСТРЕСС KILASRTRESS	1050	1050
18096010	08.12.2020		ДЕРБЕНТ DERBENT	1050	1050
18096011	08.12.2020		КВАЛІТАТОР QUALITATOR	1050	1050
18096012	08.12.2020		РОСБЕРГ ROSBERG	1959	1959
18096013	08.12.2020		КІЛАСІС KILACEES	1959	1959
18096015	26.11.2020		Таліс Thalys	751	751
18096016	26.11.2020		Ботран Botran	751	751
18096017	24.11.2020		Раніні Ranini	751	751
18096019	25.11.2020		Владіма Vladima	1730	1730
18096021	25.11.2020		Дулсіма Dulcima	1730	1730
Капуста цвітна <i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>botrytis</i> (L.) Alef. var. <i>botrytis</i> L. Cauliflower					
18101002	25.11.2020		Моментум Momentum	1852	1852
18101004	08.12.2020		ФЛЕЙМ СТАР FLAME STAR	1959	1959
18101009	08.12.2020		ГРІН СТОРМ GREEN STORM	1050	1050
18101010	26.11.2020		ТРАЙДЕНТ TRIDENT	2020	2020
18101013	25.11.2020		Арієнзо Arienzo	1730	1730
Кукурудза цукрова <i>Zea mays</i> L. ssp. <i>saccharata</i> Sturt. Sweet Corn					
17103004	25.11.2020		Мессенджер Messenger	1852	1852
18103009	26.11.2020		КАМБЕРЛЕНД CUMBERLAND	2087	2662
18103010	10.12.2020		ДН Шугарін DN Shuharin	2260	2260
19103001	22.12.2020		ДМС Шафран DMS Shafran	2558	2558

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата пріоритету Date of Priority	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)
19103002	08.12.2020	04.01.2019	Роттердам Rotterdam	2424	2424
19103003	08.12.2020	04.01.2019	НБМ 2020 NBM 2020	2424	2424
19103004	08.12.2020	04.01.2019	Білий Кролик White Rabbit	2424	2424
Цибуля городня <i>Allium cepa</i> L. Onion, Echalion					
17106010	16.12.2020		Такмарк Takmark	861	861
17106012	25.11.2020		СВ4058НЮ SV4058NU	1852	1852
18106001	03.12.2020		Кореон 1 Coreon 1	2455	2455
18106008	02.12.2020		Ялтинська Yaltynska	2200 2485	2200 2485
18106009	20.11.2020		Сакраменто Sacramento	1852	1852
18106010	20.11.2020		Міннесота Minnesota	1852	1852
18106011	20.11.2020		Ред Флойд Red Floyd	1852	1852
18106013	20.11.2020		Венус Venus	2529	1418
18106014	20.11.2020		Фабула Fabula	2529	1418
18106017	09.12.2020		Надійна Nadiina	1990	1990
19106003	20.11.2020	30.01.2019	Мінді Mindi	840	840
19106004	20.11.2020	30.01.2019	Іроко Iroko	840	840
19106005	20.11.2020		Ногал Nogal	840	840
Морква <i>Daucus carota</i> L. Carrot					
17109005	02.12.2020		Руфіна Rufina	2200 2201	2200 2201
17109006	15.12.2020		Карлано Carlano	1852	1852
18109002	26.11.2020		Каспі Caspі	751	751
18109004	26.11.2020		Небіда Nebida	751	751
Огірок посівний <i>Cucumis sativus</i> L. Cucumber					
15110011	21.10.2020	03.11.2015	Сармат Sarmat	1708	1708
18110002	02.12.2020		Джокер Dzhoker	2485 2200	2485 2200
18110003	02.12.2020		Джуніор Dzhunior	2485 2200	2485 2200
18110014	20.11.2020		Бридж Bridge	1730	1730
Перець однорічний (солодкий) <i>Capsicum annuum</i> L. Sweet Pepper, Paprika					
16113001	10.12.2020	16.02.2016	Любаша Liubasha	1781	1781
19113007	20.10.2020	27.12.2019	Даціана Daciāna	2659	2659
19113008	20.10.2020	27.12.2019	Напока Napoca	2659	2659
Помідор їстівний <i>Solanum lycopersicum</i> L. Tomato					
16115002	10.12.2020	16.02.2016	Янтарний богатыр Yantarnyi bohatyr	1781	1781
16115004	10.12.2020	16.02.2016	Танок Tanok	1781	1781
16115005	10.12.2020	16.02.2016	Севен Seven	1781	1781
19115004	30.11.2020		Фабер Faber	2529	1418
19115005	30.11.2020		Едімар Edimar	2529	1418

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата пріоритету Date of Priority	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)
19115006	30.11.2020		Гонг Gong	2529	1418
19115028	27.10.2020	22.11.2019	АНТЕЛАІСІ ANTELAISI	1852	1852
19115033	23.12.2020		МАКАН MACAN	2020	2020
Салат посівний листовий <i>Lactuca sativa</i> L. var. <i>secalina</i> Lettuce					
19120007	02.11.2020		Бартімер Bartimer	753	753
19120009	17.11.2020	12.09.2019	Лель Lel	1708	1708
19120010	17.11.2020	12.09.2019	Вишиванка Vyshyvanka	1708	1708
19120019	18.12.2020	17.09.2019	Кулхард Coulthard	1730	1730
Буряк столовий <i>Beta vulgaris</i> L. ssp. <i>vulgaris</i> var. <i>conditiva</i> Alef. Beetroot, Garden Beet					
18122002	26.11.2020		Бреско Bresko	751	751
Капуста броколі <i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>botrytis</i> (L.) Alef. var. <i>cymosa</i> Duch. Calabrese, Sprouting Broccoli					
19136001	23.12.2020		Вавілон BABILON	2020	2020
19136002	23.12.2020		СТІРЛІНГ STIRLING	2020	2020
20136001	15.12.2020	10.02.2020	Самоа Samoa	2226	2226
Кавун звичайний <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Watermelon					
18146007	08.12.2020		ГЕРКУЛЕС HERCULES	1050	1050
18146011	20.11.2020		Лузітана Lusitana	1730	1730
18146012	20.11.2020		Бретона Bretona	1730	1730
Диня звичайна <i>Cucumis melo</i> L. Melon					
18147004	08.12.2020		МАКАБЕО MACABEO	1050	1050
18147005	08.12.2020		МАІЛЛОТ MAILLOT	1050	1050
18147007	08.12.2020		МІМОЗА MIMOZA	1050	1050
19147001	20.11.2020	30.01.2019	Дейра Deyra	840	840
19147014	15.12.2020	24.12.2019	Лукстар Lookstar	840	840
19147020	15.12.2020	24.12.2019	Ареналес Arenales	840	840
Гарбуз звичайний <i>Cucurbita pepo</i> L. Pumpkin					
17150002	20.11.2020		ГЛ Класік GL Classic	2524	2524
Кукурудза розлусна <i>Zea mays</i> L. ssp. <i>everta</i> Sturt. Pop-corn					
18163001	10.12.2020		ДН Карамель DN Karamel	2260	2260
Цибуля запашна <i>Allium odorum</i> L. Sweet-scented onion					
19167001	17.11.2020	08.07.2019	Вишукана Vyshukana	1708	1708
Горошок посівний (ярий) <i>Vicia sativa</i> L. Common Vetch (Spring)					
17177001	09.11.2020	01.11.2017	Володимир Volodymyr	1669	1669
Люцерна посівна <i>Medicago sativa</i> L. Lucerne					
15196002	17.11.2020	25.11.2015	Кураз Kurazh	1990	1990
16196001	09.11.2020		Родена Rodena	1669	1669
17196001	23.10.2020		Адорна Adorna	1694	2537

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата пріоритету Date of Priority	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)
Пажитниця багаторічна <i>Lolium perenne</i> L. Perennial Ryegrass					
20222002	15.12.2020		ЄЛЕНА ДС ELENA DS	2669	2669
Сорго суданське <i>Sorghum sudanense</i> (Piper.) Stapf Sudan Grass					
17227001	18.12.2020		Мурашка Murashka	2260	2260
Кострице-райграсовий гібрид × <i>Festulolium</i> Aschers. et Graebn. Festulolium hybrid					
20240002	15.12.2020	ПАНІЯ ДС	2669 PUNIA DS	2669	
Яблуна домашня <i>Malus domestica</i> Borkh. Apple					
18263003	09.12.2020		Дміана Dmiana	1601	1601
18263006	09.10.2020	17.12.2018	Мілана Milana	348	348
Горіх грецький <i>Juglans regia</i> L. Walnut					
19284003	22.10.2020	03.07.2019	Подільський Бокоплідний Podilskyi Bokoplidnyi	2623 2466	2623 2466
19284004	22.10.2020	03.07.2019	Стрижавський Паперовий Stryzhavskyi Paperovyi	2623 2466	2623 2466
19284005	22.10.2020	03.07.2019	Подільський Podilskyi	2623 2466	2623 2466
Тритикале (яре) <i>Triticosecale</i> Witt. Triticale (Spring)					
18288002	17.11.2020		Скарб харківський Skarb kharkivskyi	1581	1581
Обліпіха крушиновидна <i>Hippophae rhamnoides</i> L. Common Sea Buckthorn					
18299008	09.12.2020		Обрій Obrii	1601	1601
Півонія <i>Paeonia</i> L. Peony					
16329002	18.12.2020		Загадка Херсонеса Zahadka Khersonesa	348	348
16329003	18.12.2020		Корсар Korsar	348	348
Троянда <i>Rosa</i> L. Rose					
17339008	05.10.2020		КОРкут0159 KORcut0159	2303	2303
Люпин жовтий <i>Lupinus luteus</i> L. Yellow Lupin					
15402002	27.11.2020	18.12.2015	Золотий купол Zoloty kupol	1809	1809
Люпин вузьколистий <i>Lupinus angustifolius</i> L. Blue Lupin					
18403001	27.11.2020		Юліан Yulian	1809	1809
Цибуля слизун <i>Allium nutans</i> L. Dwarf Alp					
19444001	17.11.2020	08.07.2019	Удай Udai	1708	1708
Гісоп лікарський <i>Hyssopus officinalis</i> L. Hyssop					
19450001	05.10.2020	08.07.2019	Небокрай Nebokrai	1708	1708
Салат посівний стебловий <i>Lactuca sativa</i> L. var. <i>angustana</i> Chinese Lettuce					
19518001	17.11.2020	12.09.2019	Лелека Leleka	1708	1708
Овес голозерний <i>Avena nuda</i> L. Naked Oat					
18520001	09.11.2020	13.12.2018	Родоніт Rodonit	2260	2260
Пшениця спельта (озима) <i>Triticum spelta</i> L. Spelt, Dinkel Wheat, Hulled Wheat					
18539003	16.11.2020	18.07.2018	Вишиванка білоцерківська Vyshyvanka bilotserkivska	1635 1097	2738 1097
Салат посівний ромен <i>Lactuca sativa</i> L. var. <i>longifolia</i> Roman Lettuce, Cos Lettuce					
19546003	30.11.2020		Лотус Lotus	1730	1730

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата пріоритету Date of Priority	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)
Буги́ла кервель <i>Anthriscus cerefolium</i> (L.) Hoffm. Chervil, Garden Chervil					
19549001	17.11.2020	08.07.2019	Жайворонок Zhaivoronok	1708	1708
Дворядник тонколистий <i>Diplotaxis tenuifolia</i> (L.) DC. Rocket (Wild Rocket)					
19582001	17.11.2020	08.07.2019	Молодість Molodist	1708	1708
Тритика́ле (дворучка) <i>Triticosecale</i> Witt. Triticale (both winter and spring sowing)					
18622001	17.11.2020		Олександра Oleksandra	1581	1581
Аронія чорноплідна <i>Aronia melanocarpa</i> (Michx.) Elliott. Black Chockberry					
19624001	22.10.2020	03.07.2019	Всеслава Vseslava	2466	2466
Кукурудза восковидна <i>Zea mays</i> var. <i>ceratina</i> L. Corn					
17009217	17.09.2020		Твістер Tvister	1581	1581
Павловнія <i>Paulownia</i> Sieb. et Zucc. Paulownia					
20649001	30.11.2020	23.01.2020	Фенікс Feniks	736	736
20649002	20.11.2020	10.04.2020	ЗЕ ПРО ZE PRO	2692	2692
20649003	20.11.2020	10.04.2020	ТУРБО ПРО TURBO PRO	2692	2692
Лобода кіноа <i>Chenopodium quinoa</i> Willd. Quinoa					
19661001	25.11.2020	22.01.2019	Олімп Olimp	2612	2612
Кукурудза звичайна – батьківський компонент <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn – parental component					
16909148	21.10.2020	25.10.2018	ПК 1116 М	2257	2257
17909132	15.12.2020		РК 1116 М	2649	2649
18909067	15.12.2020		КВ 9ЕЙ0043	924	924
18909068	15.12.2020		КВ 9ЕУ0043	924	924
18909069	15.12.2020		ЛМР3185	924	924
18909071	15.12.2020		ЛМР3185	924	924
18909073	15.12.2020		ЛЖН2098	924	924
18909077	15.12.2020		ЛГН2098	924	924
18909078	15.12.2020		ЛПХ3916	924	924
18909079	15.12.2020		ЛРН3916	924	924
18909084	18.12.2020		ЛПХ3917	924	924
18909085	18.12.2020		ЛРН3917	924	924
18909086	18.12.2020		ЛКФ2757	924	924
18909087	15.12.2020		ЛКФ2757	2649	2649
18909088	15.12.2020		КВ 9ЕЙ0069	2649	2649
18909091	15.12.2020		КВ 9ЕУ0069	2649	2649
18909092	15.12.2020		КВ 9ЕЙ0046	2649	2649
18909094	15.12.2020		КВ 9ЕУ0046	2649	2649
18909097	18.12.2020		КВ 1Ф1815	2649	2649
18909098	15.12.2020		КВ 1Ф1815	1783	1783
			Р13036	1783	1783
			Р15076	1783	1783
			Р15076	1783	1783
			Р18020	2649	2649
			Р18020	2649	2649
			КВ 9ЕЙ0071	2649	2649
			КВ 9ЕУ0071	2649	2649
			КВ 9ЕЙ0067	2649	2649
			КВ 9ЕУ0067	2649	2649
			КВ 9ЕЙ0070	2649	2649
			КВ 9ЕУ0070	2649	2649
			КВСК 537	2649	2649
			КВСК 537	2649	2649
			КВ 5ФЛ5018	2649	2649
			КВ 5ФЛ5018	1783	1783
			Р17065	2649	2649
			Р17065		
			КВ 1ФЛ7015		
			КВ 1ФЛ7015		

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата пріоритету Date of Priority	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)
18909099	15.12.2020		KB 4EЦ1728	2649	2649
18909100	17.12.2020		KW 4EC1728		
18909101	18.12.2020		PFA58II	793	793
18909101	18.12.2020		RFA58II		
18909101	18.12.2020		P17098	1783	1783
18909101	18.12.2020		R17098		
18909118	15.12.2020		KB 4П1336	2649	2649
18909118	15.12.2020		KW 4P1336		
18909119	15.12.2020		KB 4EЦ1732	2649	2649
18909119	15.12.2020		KW 4EC1732		
18909120	15.12.2020		KB 4EX1631	2649	2649
18909120	15.12.2020		KW 4EH1631		
18909121	15.12.2020		KB 4ФП1573	2649	2649
18909121	15.12.2020		KW 4FP1573		
18909122	15.12.2020		KB 4ФП1579	2649	2649
18909122	15.12.2020		KW 4FP1579		
18909123	15.12.2020		KB 6EY0052	2649	2649
18909123	15.12.2020		KW 6EY0052		
18909124	15.12.2020		KB 5Г7544	2649	2649
18909124	15.12.2020		KW 5G7544		
18909130	15.12.2020		KB 7П1484	2649	2649
18909130	15.12.2020		KW 7P1484		
18909132	15.12.2020		KB 7ФП1503	2649	2649
18909132	15.12.2020		KW 7FP1503		
18909133	15.12.2020		KB 7EX1764	2649	2649
18909133	15.12.2020		KW 7EH1764		
18909135	15.12.2020		KB 7EX1761	2649	2649
18909135	15.12.2020		KW 7EH1761		
18909136	15.12.2020		KB 7EЦ1789	2649	2649
18909136	15.12.2020		KW 7EC1789		
18909147	15.12.2020		K147	2535	2535
18909147	15.12.2020		K147		
18909158	15.12.2020		CM395	2524 2436	2524 2436
18909158	15.12.2020		SM395		
18909159	15.12.2020		AG2016	2524 2436	2524 2436
18909159	15.12.2020		AG2016		
18909160	15.12.2020		AGЖ955	2524 2436	2524 2436
18909160	15.12.2020		AGJ955		
18909161	15.12.2020		AGЖ535	2524 2436	2524 2436
18909161	15.12.2020		AGJ535		
18909171	18.12.2020		IKC 259 3M	2260	2260
18909171	18.12.2020		IKS 259 ZM		
18909172	18.12.2020		IKC 250 M	2260	2260
18909172	18.12.2020		IKS 250 M		
18909173	18.12.2020		IKC 349 3C	2260	2260
18909173	18.12.2020		IKS 349 ZS		
18909186	18.12.2020		Крос245M	2260	2260
18909186	18.12.2020		Kros245M		
18909187	18.12.2020		ДК7400CB3M	2260	2260
18909187	18.12.2020		DK7400SVZM		
18909188	18.12.2020		ДК7400M	2260	2260
18909188	18.12.2020		DK7400M		
18909189	18.12.2020		Крос454M	2260	2260
18909189	18.12.2020		Kros454M		
18909190	18.12.2020		Крос368M	2260	2260
18909190	18.12.2020		Kros368M		
18909191	18.12.2020		ДК7443M	2260	2260
18909191	18.12.2020		DK7443M		
18909192	18.12.2020		Крос272M	2260	2260
18909192	18.12.2020		Kros272M		
18909193	18.12.2020		ДК3938MB	2260	2260
18909193	18.12.2020		DK3938MV		
18909194	18.12.2020		ДК3173M	2260	2260
18909194	18.12.2020		DK3173M		
18909195	18.12.2020		ДК3172 3M	2260	2260
18909195	18.12.2020		DK3172 ZM		
18909196	18.12.2020		ДК3173 3M	2260	2260
18909196	18.12.2020		DK3173 ZM		
18909197	18.12.2020		ДК4168CB3M	2260	2260
18909197	18.12.2020		DK4168SVZM		
18909198	18.12.2020		ДК4168M	2260	2260
18909198	18.12.2020		DK4168M		
18909199	18.12.2020		ДК4540CB3M	2260	2260
18909199	18.12.2020		DK4540SVZM		

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата пріоритету Date of Priority	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)
19909016	22.12.2020		ПК 210	2257	2257
19909017	22.12.2020		ПК 210	2257	2257
19909018	22.12.2020		ПК 114	2257	2257
19909019	22.12.2020		ПК 114	2257	2257
19909020	22.12.2020		ПК 155	2257	2257
19909090	17.12.2020		ПК 155	2257	2257
19909091	17.12.2020		ПК 1313	2257	2257
19909098	15.12.2020		ПК 1313	2257	2257
			ПК 211	2257	2257
			ПК 211	2257	2257
			A5472	2576 2676	2576 2676
			A5472	2576 2676	2576 2676
			A32879	2576 2676	2576 2676
			A32879	2576 2676	2576 2676
			AC3512CЦ	2094	2094
			AC3512SC	2094	2094
Жито посівне (озиме) – батьківський компонент <i>Secale cereale</i> L.					
Rye (Winter) – parental component					
17915007	03.11.2020	29.08.2017	МСГ 2135	2313	2313
17915008	03.11.2020	29.08.2017	MSG 2135	2313	2313
18915006	20.11.2020	09.01.2018	РГ 1124	824	824
			РГ 1124	824	824
			ЛСР 153	824	824
			LSR 153	824	824
Ячмінь звичайний (озимий) – батьківський компонент <i>Hordeum vulgare</i> L.					
Barley (Winter) – parental component					
18919001	10.11.2020		Ф1Ф180	1959	1959
			F1F180	1959	1959
Соняшник однорічний – батьківський компонент <i>Helianthus annuus</i> L.					
Sunflower – parental component					
14939029	17.12.2020		85П10Р	485	485
17939049	15.12.2020		85Р10R	924	924
18939005	22.12.2020		ТРІ3751Р	924	924
18939006	22.12.2020		ТРІ3751R	924	924
18939007	22.12.2020		ДС 83 А	2458	2458
18939008	22.12.2020		DS 83 A	2458	2458
18939009	22.12.2020		ДС 33 Б	2458	2458
18939010	22.12.2020		DS 33 B	2458	2458
18939011	22.12.2020		ДС 33 А	2458	2458
18939012	22.12.2020		DS 33 A	2458	2458
18939013	22.12.2020		ДС 88 В	2458	2458
18939014	22.12.2020		DS 88 V	2458	2458
18939015	22.12.2020		ДС 8 Б	2458	2458
18939016	22.12.2020		DS 8 B	2458	2458
18939017	22.12.2020		ДС 78 В	2458	2458
18939018	22.12.2020		DS 78 V	2458	2458
18939019	22.12.2020		ДС 53 Б	2458	2458
18939020	22.12.2020		DS 53 B	2458	2458
18939021	01.10.2020		AC15A	2467 2468	2467 2468
18939022	01.10.2020		AS15A	2467 2468	2467 2468
18939023	23.12.2020		OB10B	2467 2468	2467 2468
18939024	23.12.2020		OV10B	2467 2468	2467 2468
18939025	15.12.2020		ТФ03288 ТФ03188	924	924
18939026	15.12.2020		TF03288 TF03188	924	924
18939027	15.12.2020		ТРІ4757Р	924	924
18939028	15.12.2020		TRI4757R	924	924
18939029	15.12.2020		ТРІ4760Р	924	924
18939030	15.12.2020		TRI4760R	924	924
18939031	15.12.2020		ТР04385Р	924	924
18939032	15.12.2020		TR04385R	924	924
18939033	15.12.2020	25.10.2018	ТФС3780А	924	924
18939034	15.12.2020	25.10.2018	TFC3780A	924	924
18939035	15.12.2020	25.10.2018	ТФІ3719А	924	924
18939036	15.12.2020	25.10.2018	TFI3719A	924	924
18939037	15.12.2020	25.10.2018	ТРІ4748Р	924	924
18939038	15.12.2020	25.10.2018	TRI4748R	924	924
18939039	17.12.2020		Р10019МІ	1435	1435
18939040	17.12.2020		R10019MI	1435	1435
18939041	17.12.2020		Р8035МЖС	1435	1435
18939042	17.12.2020		R8035MJS	1435	1435
18939043	17.12.2020		Р8035М2Ж	1435	1435
18939044	17.12.2020		R8035M2J	1435	1435
18939045	17.12.2020		Р5ХІЗМЖС	1435	1435
18939046	17.12.2020		R5XY3MJS	1435	1435

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата пріоритету Date of Priority	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)
18939076	17.12.2020		P4HP8MЖI	1435	1435
18939077	17.12.2020		R4NP8MЖI	1435	1435
18939078	17.12.2020		Ф5ДН3МКА	1435	1435
18939079	17.12.2020		F5DN3MKA	1435	1435
18939112	17.12.2020		СФ1561М2СА	793	793
18939154	17.12.2020		SF1561M2SA	793	793
18939155	17.12.2020		ЛГ13013МЖА	2267	2267
18939156	17.12.2020		LG13013MJA	2267	2267
18939157	17.12.2020		ЕХ500СУЛ	924	924
18939158	17.12.2020		EH500SUL	924	924
19939034	22.12.2020		ТФ03188	2537	2537
19939035	22.12.2020		TF03188	2537	2537
19939036	22.12.2020		Pф1136	2537	2537
			Rf1136	2537	2537
			Pф1010	2537	2537
			Rf1010	2537	2537
			Pф3074	2537	2537
			Rf3074	2537	2537
			Pф1018	2537	2537
			Rf1018	2537	2537
			ДС83АДС58Б	2458	2458
			DS83ADS58B	2458	2458
			ДС33АДС53Б	2576 2676	2576 2676
			DS33ADS53B		
			АС ХДЖ 9		
			AS KhDZh 9		
Ріпак (озимий) – батьківський компонент <i>Brassica napus L. oleifera</i> Rape Seed (Winter) – parental component					
18940004	23.10.2020		ЕСР1064	806	806
18940005	23.10.2020		ESR1064	806	806
			ЕСФ2014ЦМС		
			ESF2014CMS		

Відомості щодо припинення чинності майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослин

Information on termination of intellectual property rights in the spread of plant variety

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата припинення Date of cancellation	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)
Кукурудза звичайна <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn					
14009079	24.03.2017	25.11.2020	MAC 36H MAS 36N	924	924
17009140	24.02.2020	17.12.2020	КВС БОЛІВІО KWS BOLIVIO	2092	2092
17009141	12.03.2020	17.12.2020	КВС АГГРО KWS AGGRO	2092	2092
Соняшник однорічний <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower					
05017099	23.01.2008	25.11.2020	MAC 94C MAS 94S	924	924
08017078	20.12.2011	25.11.2020	MAC 84E MAS 84E	924	924
15039042	29.01.2018	25.11.2020	MAC 96Г MAS 96G	924	924
17039076	28.12.2019	25.11.2020	ВОЛВЕРІН WOLVERINE	924	924
17039077	28.12.2019	25.11.2020	ЗЕФІР ZEPHYR	924	924
17039080	28.12.2019	25.11.2020	ПОВЕРСАН POWERSUN	924	924
17039082	28.12.2019	25.11.2020	MAC 870Г MAS 870G	924	924
Ріпак (озимий) <i>Brassica napus</i> L. <i>oleifera</i> Rape Seed (Winter)					
14040045	12.07.2018	17.12.2020	АЛЬБЕРІХ КВС ALLBERICH KWS	2092	2092

Відомості щодо відновлення чинності майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослин

For information about restoring force of intellectual property rights in the spread of plant variety

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата відновлення Date of renewal	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)
Кукурудза звичайна <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn					
15009001	20.03.2017	13.11.2020	Аполлон Apollon	2051	2619
15009002	20.03.2017	13.11.2020	Кріос Krios	2051	2619
Ячмінь звичайний (ярий) <i>Hordeum vulgare</i> L. Barley (Spring)					
10012020	17.04.2014	14.12.2020	Святомихайлівський Sviatomykhailivs'kyi	356	2606
Цибуля городня <i>Allium cepa</i> L. Onion, Echalion					
13106017	22.03.2016	14.12.2020	Отаман Otaman	1926	1926
13106018	22.03.2016	14.12.2020	Фенікс Feniks	1926	1926
Помідор їстівний <i>Lycopersicon esculentum</i> Mill. Tomato					
13115069	09.06.2015	03.12.2020	Джагернаут Dzhahernaut	1926	1926
14115056	25.02.2016	03.12.2020	Редбері Redberi	1926	1926
Кавун звичайний <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Watermelon					
13146005	16.03.2016	03.12.2020	Енріке Enrike	1926	1926
Суниця садова <i>Fragaria</i> L. Strawberry					
08084002	18.12.2009	03.12.2020	Флорида Фестиваль Florida Festival	1282	1282

Інші відомості, внесені до Реєстру сортів рослин України

Other notifications listed in the Plant Varieties Register in Ukraine

Відповідно до наказу Мінекономіки № 2221-20 від 02.11.2020 «Про внесення змін до відомостей, що містяться в Реєстрі патентів на сорти рослин та Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні» внесено зміни до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, стосовно сортів суниці садової: Флоренс (заявка № 13294001), Фламенко (заявка № 14294004), Елеганс (заявка № 14294003), Вайбрант (заявка № 14294005); сорту малини Октавія (заявка № 14296001) щодо зміни назви власника сорту, замінивши слова і цифри «Меосіс Лімітед (MEIOSIS Limited), Бредбурн Хаус Стебл Блок, Іст Моллінг, Кент ME19 6 ДЗ Англія (Bradbourne House Stable Block, East Malling, Kent, ME 19 6 DZ, England), тел.: +44/1732872711, факс: +44/1732 872712, e-mail: mark.coxeter@meiosis.co.uk» словами і цифрами «НІАБ ЕМР (NIAB EMR), НІАБ, 93 Лоуренс Бівер Роуд, Кембрідж, Кембриджшир, CB3 0LF, Сполучене Королівство, тел.: +44(0)/1732843833, e-mail: enquiries@emr.ac.uk».

Відповідно до наказу Мінекономіки № 2241-20 від 04.11.2020 «Про внесення зміни до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні», внесено зміну до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, стосовно сорту соняшника однорічного МАС 90СП (заявка № 14039045), замінивши назву сорту «МАС 90СП (MAS 90CP)» назвою «МЕРІТ КЛП (MERIT CLP)».

Відповідно до наказу Мінекономіки № 2243-20 від 04.11.2020 «Про внесення змін до відомостей, що міс-

тяться в Реєстрі патентів на сорти рослин та Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні» внесено зміни до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, стосовно сортів пшениці м'якої озимої: Олесь (заявка № 97007009), Перлина лісостепу (заявка № 98007013), Елегія (заявка № 99007003), Ясочка (заявка № 01007039), Либідь (заявка № 03007021), Лісова пісня (заявка № 05007035), Царівна (заявка № 05007036), Романтика (заявка № 06007038), Відрода (заявка № 07007034), Чародійка білоцерківська (заявка № 08007045), Щедра нива (заявка № 08007046) щодо зміни назви власника сорту, замінивши слова і цифри «Білоцерківська дослідно-селекційна станція ім. О. К. Коломієць Інституту цукрових буряків Української академії аграрних наук, п/в Мала Вільшанка, 1, Білоцерківський р-н, Київська обл., 09175, тел.: +3804463/2-54-95, факс: +3804463/2-54-95» словами і цифрами «Білоцерківська дослідно-селекційна станція Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України, с. Мала Вільшанка, 1, Білоцерківський р-н, Київська обл., 09175, тел.: +3804463/2-54-95, факс: +3804463/2-54-95, e-mail: bc-selecstation.com.ua».

Відповідно до наказу Мінекономіки № 2682-20 від 17.12.2020 «Про внесення змін до відомостей, що містяться в Реєстрі патентів на сорти рослин та Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні» внесено зміни до назв сортів рослин, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, згідно з переліком.

ПЕРЕЛІК сортів рослин, щодо яких змінюється назва сорту, зазначених у Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні

№	Назва сорту	Змінена назва сорту	Заявник	Номер та дата подання заявки	Клопотання щодо зміни назви сорту (вхідний номер Мінекономіки)	Підстави для зміни назви
Кукурудза звичайна						
1	ДКС3379 (DKC3379)	СТАРОФ (STAROF)	Монсанто Технології ЛТД	28.10.2015 № 15009019	Від 22.10.2020 (23.10.2020 № 07/98793-20)	Відповідно до статті 28 Закону після затвердження назви сорту рішенням про виникнення прав на сорт її зміна Компетентним органом можлива, якщо встановлено, що вона не відповідає умовам, викладеним у статті 13, або володілець патенту чи будь-яка інша особа вимагає заборонити використання існуючої назви сорту (сорт занесений до Реєстру патентів на сорти рослин та Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні)
2	ДКС3893 (DKC3893)	ЧОУРІ (TCHOURI)	Монсанто Технології ЛТД	27.10.2017 № 17009069	22.10.2020 (23.10.2020 № 07/98803-20)	Відповідно до статті 28 Закону після затвердження назви сорту рішенням про виникнення прав на сорт її зміна Компетентним органом можлива, якщо встановлено, що вона не відповідає умовам, викладеним у статті 13, або володілець патенту чи будь-яка інша особа вимагає заборонити використання існуючої назви сорту (сорт занесений до Реєстру патентів на сорти рослин та Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні)

Відповідно до наказу Мінекономіки № 2710-20 від 22.12.2020 «Про внесення змін до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні» внесено зміни до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, стосовно сортів рослин згідно з переліком щодо зміни назви власника сорту, за-

мінивши слова і цифри «Товариство з обмеженою відповідальністю «Піонер Насіння Україна», вул. Спаська, 30а, м. Київ, 04070, Україна, e-mail: mykola.vlasyuk@pioneer.com» словами і цифрами «Товариство з обмеженою відповідальністю «Кортева Агрісаєнс Україна», вул. Петра Сагайдачного, 1, м. Київ, Україна, 04070, e-mail: iryna.vlasyuk@corteva.com».

ПЕРЕЛІК
сортів рослин, щодо яких вносяться зміни до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин,
придатних для поширення в Україні

№	Ботанічний таксон	Номер заявки	Назва сорту	Дата подачі заявки	Рік реєстрації
1	Кукурудза звичайна	13009094	П9718Е	18.11.2013	2017
2	Кукурудза звичайна	13009102	П7412	18.11.2013	2017
3	Кукурудза звичайна	15009010	П8307	15.10.2015	2018
4	Кукурудза звичайна	15009011	П9486	15.10.2015	2018
5	Кукурудза звичайна	13009092	П9903	18.11.2013	2017
6	Кукурудза звичайна	14009206	П0074	01.12.2014	2017
7	Кукурудза звичайна	16009032	П9127	15.09.2016	2019
8	Кукурудза звичайна	16009034	П8409	15.09.2016	2019
9	Кукурудза звичайна	16009035	П9537	15.09.2016	2019
10	Кукурудза звичайна	16009037	П8812	15.09.2016	2019
11	Кукурудза звичайна	16009039	П9415	15.09.2016	2019
12	Кукурудза звичайна	16009040	П7043	15.09.2016	2019
13	Кукурудза звичайна	16009041	П8012Е	15.09.2016	2019
14	Кукурудза звичайна	17009007	П8723	10.01.2017	2019
15	Кукурудза звичайна	17009040	П9234	23.01.2017	2019
16	Кукурудза звичайна	17009046	П0312	12.10.2017	2019
17	Кукурудза звичайна	17009047	П9071	12.10.2017	2019
18	Кукурудза звичайна	17009048	П9757	12.10.2017	2019
19	Кукурудза звичайна	17009049	П0349	12.10.2017	2019
20	Кукурудза звичайна	17009050	П9363	12.10.2017	2019
21	Кукурудза звичайна	17009051	П9170	12.10.2017	2019
22	Кукурудза звичайна	17009052	П0268	13.10.2017	2019
23	Кукурудза звичайна	17009053	П9874	13.10.2017	2019
24	Кукурудза звичайна	17009054	П8707	13.10.2017	2019
25	Кукурудза звичайна	17009055	П0362	13.10.2017	2019
26	Кукурудза звичайна	17009074	П8358	10.11.2017	2019
27	Кукурудза звичайна	17009075	Б2190	10.11.2017	2019
28	Кукурудза звичайна	17009144	П9361	05.12.2017	2020
29	Кукурудза звичайна	17009145	Б3545Д	05.12.2017	2020
30	Кукурудза звичайна	17009158	П9074Е	05.12.2017	2019
31	Кукурудза звичайна	17009159	П7515	05.12.2017	2019
32	Кукурудза звичайна	17009160	П8834	05.12.2017	2019
33	Кукурудза звичайна	17009144	П9361	05.12.2017	2020
34	Кукурудза звичайна	17009145	Б3545Д	05.12.2017	2020
35	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	13909270	ПХФ1Й	20.12.2013	2015
36	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	13909278	ПХ18ХХ	25.12.2013	2015
37	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	15909007	ПХ138Ц	25.02.2015	2017
38	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	15909010	ПХ18П6	25.02.2015	2017
39	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	15909012	ПХ1ДН1	25.02.2015	2016
40	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	15909021	ПХ132	05.10.2015	2019
41	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	15909028	ПХ13ДЙ	15.10.2015	2017
42	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	15909173	ПХ1Ф9Г1	18.12.2015	2017
43	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	15909174	ПХ1АІ11	18.12.2015	2017
44	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	13909269	ПХ15КФ	20.12.2013	2015
45	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	13909271	ПХФ5Р	20.12.2013	2015
46	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	13909280	ПХ8ЙР	25.12.2013	2015
47	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	13909283	ПХЕІВ	25.12.2013	2015
48	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	13909286	ПХ18МВ	25.12.2013	2015
49	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	13909268	ПХ7АБ	20.12.2013	2015
50	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	13909272	ПХЕДР	20.12.2013	2015
51	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	13909273	ПХАНА	20.12.2013	2015
52	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	13909274	ПХ12ІП	20.12.2013	2015
53	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	13909279	ПХ12ЦН	25.12.2013	2015
54	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	13909281	ПХБ00	25.12.2013	2015
55	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	13909282	ПХ51К	25.12.2013	2015
56	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	13909284	ПХБВ7	25.12.2013	2015
57	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	13909285	ПХХКВ	25.12.2013	2015
58	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	13909287	ПХЖТР	25.12.2013	2015
59	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	15909008	ПХП8Р	25.02.2015	2017
60	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	15909009	ПХ1ДБ1	25.02.2015	2016
61	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	15909011	ПХ1МРК	25.02.2015	2016
62	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	15909022	ПХ20ДТ	05.10.2015	2018
63	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	15909023	ПХЗД4	05.10.2015	2018
64	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	15909024	ПХ23Г8	05.10.2015	2018
65	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	15909025	ПХ16СЦ	05.10.2015	2018
66	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	15909026	ПХ23Р1	05.10.2015	2018
67	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	15909029	ПХ18В2	15.10.2015	2017
68	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	15909019	ПХ204В	05.10.2015	2018
69	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	15909020	ПХ1СХТ	05.10.2015	2018
70	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	16909036	ПХ1ДД3	15.09.2016	2018
71	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	16909037	ПХ2І0В	15.09.2016	2019

№	Ботанічний таксон	Номер заявки	Назва сорту	Дата подачі заявки	Рік реєстрації
72	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	16909038	ПХ2ЦЗЗ	15.09.2016	2019
73	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	16909039	ПХ1КІК	15.09.2016	2018
74	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	16909040	ПХ13Ц5	04.10.2016	2018
75	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	16909041	ПХ18ГІ	04.10.2016	2018
76	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	16909042	ПХ18ВР	04.10.2016	2018
77	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	16909043	ПХ18ВІ	04.10.2016	2018
78	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	16909044	ПХ137К	04.10.2016	2018
79	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	16909046	ПХХТХ	04.10.2016	2018
80	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	16909047	ПХГВД	04.10.2016	2018
81	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	16909048	ПХ10ВХ1	04.10.2016	2018
82	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	16909049	ПХ12КБ	04.10.2016	2018
83	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	16909052	ПХ181Ц	04.10.2016	2018
84	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	16909053	ПХ1МРІ	04.10.2016	2018
85	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	16909054	ПХ1ДН2	04.10.2016	2018
86	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	16909055	ПХ12К5	04.10.2016	2018
87	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	16909056	ПХ2ВІЗ	04.10.2016	2018
88	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	16909057	ПХ1ДГК	04.10.2016	2018
89	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	16909058	ПХ253Р	04.10.2016	2018
90	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	16909060	ПХ13Т5	04.10.2016	2019
91	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	16909061	ПХ1Т6Н	04.10.2016	2018
92	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	16909062	ПХВЕІ	04.10.2016	2018
93	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	16909063	ПХ43МВ	04.10.2016	2019
94	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	16909064	ПХ1Ц9Н	04.10.2016	2018
95	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	16909069	ПХ1МІ5	27.10.2016	2018
96	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	16909070	ПХ1ДБ7	27.10.2016	2018
97	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	16909071	ПХ1ДД8	27.10.2016	2018
98	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	17909017	ПХВ2П	10.01.2017	2018
99	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	17909092	ПХ1ДГ1	23.01.2017	2018
100	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	17909093	ПХ20ДА	23.01.2017	2019
101	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	17909094	ПХ1К8Н	23.01.2017	2018
102	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	17909095	ПХ2СМГ	23.01.2017	2019
103	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	17909096	ПХ2047	23.01.2017	2019
104	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	17909097	ПХ1СХР	23.01.2017	2019
105	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	17909102	ПХ2В5П	22.03.2017	2019
106	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	17909103	ПХВВІ	24.03.2017	2018
107	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	18909035	ПХ269Г	16.02.2018	2019
108	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	18909036	ПХ2ГР31	16.02.2018	2019
109	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	18909037	ПХ253Т	16.02.2018	2019
110	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	18909038	ПХИДЦ2	16.02.2018	2019
111	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	18909039	ПХ1В6В	16.02.2018	2019
112	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	18909040	ПХ1В4Р	16.02.2018	2019
113	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	18909041	ПХ1К1Н	16.02.2018	2019
114	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	18909042	ПХ266Ф	16.02.2018	2019
115	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	18909043	ПХ25А0	16.02.2018	2019
116	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	19909037	ПХ2РГ1	22.01.2019	2020
117	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	19909038	ПХ2Т83	22.01.2019	2020
118	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	19909039	ПХ2Т2Б	22.01.2019	2020
119	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	19909040	ПХ2ТНВ	22.01.2019	2020
120	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	19909041	ПХ25К1	22.01.2019	2020
121	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	19909042	ПХ2ФП0	22.01.2019	2020
122	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	19909043	ПХ2Г22	22.01.2019	2020
123	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	19909044	ПХ2Г60	22.01.2019	2020
124	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	19909045	ПХ2Ф33	22.01.2019	2020
125	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	19909046	ПХ4033	22.01.2019	2020
126	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	19909047	ПХ25В7	22.01.2019	2020
127	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	19909048	ПХ410П	22.01.2019	2020
128	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	19909052	ПХ46451	22.01.2019	2020
129	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	19909053	ПХ4БФС1	22.01.2019	2020
130	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	19909056	ПХ2РФ3	22.01.2019	2020
131	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	19909057	ПХ43М3	22.01.2019	2020
132	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	19909058	ПХ26БК	23.01.2019	2020
133	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	19909059	ПХ25К0	23.01.2019	2020
134	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	19909095	ПХ18ПФ	18.02.2019	2020
135	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	19909097	ПХ2Ф42	18.02.2019	2020
136	Ріпак (озимий)	13040051	ПХ115	18.11.2013	2017
137	Ріпак (озимий)	13040055	ПХ125КЛ	18.11.2013	2017
138	Ріпак (озимий)	13040056	ПТ240ЦЛ	18.11.2013	2017
139	Ріпак (озимий)	13040057	ПТ248	18.11.2013	2017
140	Ріпак (озимий)	13040049	ПТ234	18.11.2013	2017
141	Ріпак (озимий)	14040057	ПТ264	22.12.2014	2019
142	Ріпак (озимий)	15040035	ПТ271	24.11.2015	2019
143	Ріпак (озимий)	15040041	ПХ126	24.11.2015	2019
144	Ріпак (озимий)	15040036	ПТ269	24.11.2015	2019
145	Ріпак (озимий)	15040038	ПХ128	24.11.2015	2019
146	Ріпак (озимий)	15040040	ПТ279КЛ	24.11.2015	2019

№	Ботанічний таксон	Номер заявки	Назва сорту	Дата подачі заявки	Рік реєстрації
147	Ріпак (озимий)	17040001	ПТ274	10.01.2017	2019
148	Ріпак (озимий)	17040002	ПТ275	10.01.2017	2019
149	Ріпак (ярий)	15041004	ПС304	27.11.2015	2019
150	Ріпак (ярий)	15041005	44И84	27.11.2015	2019
151	Ріпак (ярий)	14041002	ПС303	01.12.2014	2019
152	Соняшник однорічний	13039043	П63ЛЕ113	18.11.2013	2016
153	Соняшник однорічний	13039046	П62ЛЛ109	18.11.2013	2017
154	Соняшник однорічний	13039044	П64ГЕ118	18.11.2013	2016
155	Соняшник однорічний	13039041	П64ЛЦ108	18.11.2013	2016
156	Соняшник однорічний	14039068	П64ЛЛ125	14.11.2014	2017
157	Соняшник однорічний	15039035	П64ЛЕ119	10.11.2015	2018
158	Соняшник однорічний	15039039	П63ГГ111	12.11.2015	2018
159	Соняшник однорічний	14039062	П63ЛЛ124	14.11.2014	2017
160	Соняшник однорічний	14039063	П64ГГ106	14.11.2014	2017
161	Соняшник однорічний	14039065	П62ЛЕ122	14.11.2014	2017
162	Соняшник однорічний	15039020	П64ГГ123	05.10.2015	2019
163	Соняшник однорічний	15039036	П64ЛЕ121	11.11.2015	2018
164	Соняшник однорічний	16039032	П64ЛП140	29.09.2016	2019
165	Соняшник однорічний	16039034	П64ГЕ133	29.09.2016	2019
166	Соняшник однорічний	16039037	П64ЛП130	29.09.2016	2019
167	Соняшник однорічний	16039040	П64ЛЛ129	29.09.2016	2019
168	Соняшник однорічний	16039041	П64ББ01	29.09.2016	2019
169	Соняшник однорічний	16039042	П64ГГ132	29.09.2016	2019
170	Соняшник однорічний	17039071	П64ЛЛ138	12.10.2017	2019
171	Соняшник однорічний	17039073	П64ГЕ144	12.10.2017	2019
172	Соняшник однорічний	17039075	П64ЛЕ136	12.10.2017	2019
173	Соняшник однорічний – батьківський компонент	13939080	Т0860ЛМ	20.12.2013	2016
174	Соняшник однорічний – батьківський компонент	15039010	ПХ1015А	12.03.2015	2016
175	Соняшник однорічний – батьківський компонент	16939029	Е0205ЛФ	02.03.2016	2018
176	Соняшник однорічний – батьківський компонент	13939079	Т1075ЛМ	20.12.2013	2016
177	Соняшник однорічний – батьківський компонент	13939081	Т0916ЛФ	20.12.2013	2015
178	Соняшник однорічний – батьківський компонент	15039011	ПХ5016Р	12.03.2015	2016
179	Соняшник однорічний – батьківський компонент	15039012	ПХ5000Р	12.03.2015	2016
180	Соняшник однорічний – батьківський компонент	16939054	У0761ЛФ	10.10.2016	2018
181	Соняшник однорічний – батьківський компонент	16939055	ПХ1024А	10.10.2016	2018
182	Соняшник однорічний – батьківський компонент	16939056	ПХ5044Р	10.10.2016	2018
183	Соняшник однорічний – батьківський компонент	16939057	У11ТАІМЛМ	10.10.2016	2018
184	Соняшник однорічний – батьківський компонент	16939058	Ф1164ЛМ	10.10.2016	2018
185	Соняшник однорічний – батьківський компонент	16939059	ПХ5057Р	10.10.2016	2018
186	Соняшник однорічний – батьківський компонент	16939060	Т0989ХМ	10.10.2016	2018
187	Соняшник однорічний – батьківський компонент	16939061	Б0615ЛМ	10.10.2016	2018
188	Соняшник однорічний – батьківський компонент	16939062	У1156ХФ	10.10.2016	2018
189	Соняшник однорічний – батьківський компонент	16939063	Т1170ЛМ	10.10.2016	2018
190	Соняшник однорічний – батьківський компонент	19939064	У1188ІМЛФ	10.10.2016	2018
191	Соняшник однорічний – батьківський компонент	16939065	У09МІГМ	10.10.2016	2018
192	Соняшник однорічний – батьківський компонент	16939066	ПХ1023А	10.10.2016	2018
193	Соняшник однорічний – батьківський компонент	17939028	У1255СУЛФ	22.03.2017	2018
194	Соняшник однорічний – батьківський компонент	17939029	У14ЛГЦЛЛМ	22.03.2017	2019
195	Соняшник однорічний – батьківський компонент	17939030	У067СЛМ	22.03.2017	2018
196	Соняшник однорічний – батьківський компонент	17939031	Т1187ГМ	22.03.2017	2019
197	Соняшник однорічний – батьківський компонент	17939032	У09РФСУЛМ	22.03.2017	2020
198	Соняшник однорічний – батьківський компонент	17939033	7ПНВФ24А	22.03.2017	2018
199	Соняшник однорічний – батьківський компонент	17939034	Т1333ГФ	22.03.2017	2018
200	Соняшник однорічний – батьківський компонент	17939035	Ф1316ГФ	22.03.2017	2020
201	Соняшник однорічний – батьківський компонент	17939036	Т0833ГФ	22.03.2017	2018
202	Соняшник однорічний – батьківський компонент	17939037	ПХ1031А	22.03.2017	2018
203	Соняшник однорічний – батьківський компонент	17939038	Т1334ГФ	22.03.2017	2020
204	Соняшник однорічний – батьківський компонент	17939039	7ПГЛК23Р	22.03.2017	2019
205	Соняшник однорічний – батьківський компонент	17939040	Т1370СУХМ	22.03.2017	2020
206	Соняшник однорічний – батьківський компонент	17939043	Ф1319ЛФ	30.03.2017	2018
207	Соняшник однорічний – батьківський компонент	17939032	У09РФСУЛМ	22.03.2017	2020
208	Соняшник однорічний – батьківський компонент	17939035	Ф1316ГФ	22.03.2017	2020
209	Соняшник однорічний – батьківський компонент	17939038	Т1334ГФ	22.03.2017	2020
210	Соняшник однорічний – батьківський компонент	17939040	Т1370СУХМ	22.03.2017	2020

Каталог сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Catalog of plant varieties suitable for distribution in Ukraine

Відомості про сорти рослин, які включено до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Information on plant varieties included in the State Register of Plant Varieties Suitable for Distribution in Ukraine

Заявка № Application №	Назва сорту Variety denomination	Метод створення Method of propagating	Заявник (и) Applicant	Власник Owner	Володілець патенту Patent holder	Підтримувач Maintainer	Рік реєстрації Registration year	Рекомендована зона для вирощування Recommended zones for growing	Напрямок використання Purpose	Група стиглості Group of ripeness	Якість Quality
Сільськогосподарські: злаки Agricultural: Field cereal Пшениця м'яка (озима) <i>Triticum aestivum</i> L. Soft Wheat (Winter) (<i>Triticum aestivum</i> L. emend. Fiori et Paol.; <i>Triticum vulgare</i> Host.; <i>Triticum hybernum</i> L.; <i>Triticum cereale</i> Schrank; <i>Triticum sativum</i> Lam.)											
® 18012007	Ювілейна Патона Ювілейна Патона / Yuvileina Patona	C3	355	355	355		2020	ЛП	зерн		цін
® 18012006	Світязь Світязь / Svitiaz	C3	355	355	355		2020	ЛП	зерн		цін
18012019	АФК ЕЛІТ ГРЕЙН АФК ЕЛІТ ГРЕЙН / AFK ELIT HREIN	C3	655	655			2020	ЛП	зерн		ф
18012020	АФК СТРОНГ АФК СТРОНГ / AFK STRONH	C3	655	655			2020	П	зерн		ф
18012021	АФК ПАУЕР АФК ПАУЕР / AFK PAUER	C3	655	655			2020	СЛП	зерн		цін
® 18012042	Емблем Emblem / Emblem	C3	807	807	807		2020	СЛП	зерн		слн
® 18012044	Аскабан Askaban / Askaban	C3	807	807	807		2020	П	зерн		ф
® 18012045	Сомельє Sommelier / Sommelier		807	807	807		2020	ЛП	зерн		цін
® 18012046	Бригантина Brigantina / Brigantina		807	807	807		2020	П	зерн		ф
® 18012043	Архітект Architekt / Architekt	C3	807	807	807		2020	П	зерн		цін
® 18012038	Шеріф Sheriff / Sheriff	C3	947	947	947		2020	П	зерн		ф
® 18012015	Київська 19 Київська 19 / Kyivska 19	C3	355	355	355		2020	ЛП	зерн		ф
® 18012005	Академічна 100 Академічна 100 / Akademichna 100	C3	355	355	355		2020	П	зерн		ф
18012002	Крепиш Крепиш / Krepish	C3	1543	1543			2020	СЛП	зерн		цін
® 18012032	Цецилійс Cecilius / Cecilius	C3	1564	1564	1564		2020	П	зерн		цін
® 18012033	Сідоніус Sidonius / Sidonius	C3	1564	1564	1564		2020	СП	зерн		ф
17012049	Проня Проня / Pronia	C3	1581	1581			2020	СЛП	зерн		цін
® 18012011	Гейзер Гейзер / Heizer	C3	1591	1591	1591		2020	СЛ	зерн		цін
® 18012012	Основа одеська Основа одеська / Osnova odeska	C3	1591	1591	1591		2020	СЛП	зерн		цін
® 18012013	Громада Громада / Hromada	C3	1591	1591	1591		2020	ЛП	зерн		слн
® 18012016	Відповідь одеська Відповідь одеська / Vidpovid odeska	C3	1591	1591	1591		2020	Л	зерн		цін
® 18012017	Перемога одеська Перемога одеська / Peremoha odeska	C3	1591	1591	1591		2020	СЛП	зерн		цін
18012018	Гладь Гладь / Hlad	C3	1591	1591			2020	СЛ	зерн		слн

Заявка № Application №	Назва сорту Variety denomination	Метод створення Method of propagating	Заявник (и) Applicant	Власник Owner	Володієць патенту Patent holder	Підтримувач Maintainer	Рік реєстрації Registration year	Рекомендована зона для вирощування Recommended zones for growing	Напрямок використання Purpose	Група стиглості Group of ripeness	Якість Quality
18012024	Пирятинка Пирятинка / Pyriatynka	C3	1626	1626			2020	Л	зерн		ф
18012025	Ефектна Ефектна / Efektna	C3	1626	1626			2020	П	зерн		ф
18012026	Фортеця Поліська Фортеця Поліська / Fortetsia Poliska	C3	1626	1626			2020	СЛП	зерн		ф
® 18012063	Гадзинка Гадзинка / Hadzynka	C3	1635 1097	2738 1097	2738 1097		2020	СЛП	зерн		ф
18012040	ГК Корос GK Koros / GK Koros	C3	1694	2537			2020	П	зерн		цін
18012035	Аквілегія Аквілегія / Akvilehiia	C3	1698	1698			2020	С	зерн		цін
18012037	Херсонська Фортеця Херсонська Фортеця / Khersonska Fortetsia	C3	1698	1698			2020	СЛП	зерн		цін
® 18012052	Асорі Asory / Asory	C3	1797	1797	1797		2020	ЛП	зерн		цін
® 18012009	Золотце Золотце / Zolottse	C3	1998	1998	1998		2020	СЛП	зерн		цін
® 18012010	Гефест Гефест / Hefest	C3	1998	1998	1998		2020	СЛП	зерн		цін
18012050	Пітон Python / Python	C3	2238	2238			2020	ЛП	зерн		цін
® 17012046	ОРЖИЦЯ НОВА ОРЖИЦЯ НОВА / ORZHYTsIA NOVA	C3	386	386	386		2020	ЛП	зерн		ф
® 18012034	Тоннаж Tonnage / Tonnage	C3	2486	2486	2486		2020	СЛП	зерн		ф
15012066	Агота Agota / Agota	C3	2597	2597			2020	ЛП	зерн		ф
15012070	Анрі Anri / Anri	C3	2597	2597			2020	П	зерн		ф
17012021	ГЕРМА GERMA / GERMA	C3	2597	2597			2020	ЛП	цін		цін
17012020	ЗЛАТАНА ZLATANA / ZLATANA	C3	2597	2597			2020	ЛП	цін		цін
15012067	Астерія Asteria / Asteria	C3	2597	2597			2020	ЛП	зерн		цін
17012018	ДОБРОВІТ DOBROVIT / DOBROVIT	C3	2597	2597			2020	ЛП	цін		цін
17012019	ГОРИНЯ GORYNIA / GORYNIA	C3	2597	2597			2020	П	цін		цін
17012022	ІСТА ISTA / ISTA	C3	2597	2597			2020	ЛП	ф		ф
® 15012068	Адїса Adisa / Adisa	C3	2597	2597	2597		2020	П	зерн		ф
® 16140001	Арабатка Арабатка / Arabatka	C3	1123	1123	1123		2020	С	зерн		ф
16012052	Діжон Dizhon / Dizhon	C3	1517	1517			2020	П	зерн		цін
16012025	Трублїон Trublion / Trublion	F1	2238	2238			2020	ЛП	цін		цін
Пшениця м'яка (яра) Soft Wheat (Spring) <i>Triticum aestivum</i> L. (Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.; <i>Triticum vulgare</i> Host.; <i>Triticum hybernum</i> L.; <i>Triticum cereale</i> Schrank; <i>Triticum sativum</i> Lam.)											
® 19013002	КВС Старлайт KWS Starlight / KWS Starlight	C3	824	824	824		2020	СЛП	зерн		слн
® 18013001	Токата Toccata / Toccata	C3	2076	880	880		2020	СЛП	зерн		слн
18013002	ВПБ Трої WPB Troy / WPB Troy	C3	2513	2513			2020	СЛП	зерн		слн
Пшениця тверда (озима) Durum Wheat (Winter) <i>Triticum durum</i> Desf. (Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) Husn.; <i>Triticum turgidum</i> L. subsp. turgidum conv. durum (Desf.) MacKey; <i>Triticum turgidum</i> L.; <i>Triticum sativum durum</i> Pers.; <i>Triticum vulgare durum</i> Alef.; <i>Triticum vulgare</i> Vill. s. str.; <i>Triticum durum</i> Koern.; <i>Triticum sativum durum</i> Hackel; <i>Triticum tenax</i> B durum Asch. et Graebn.; <i>Triticum alatum</i> Peterm.; <i>Triticum dicoccum tenaces</i> Perc.; <i>Triticum pyramidale</i> Pers.)											
® 18007003	Діадур Diadur / Diadur	C3	1564	1564	1564		2020	С	х		

Заявка № Application №	Назва сорту Variety denomination	Метод створення Method of propagating	Заявник (и) Applicant	Власник Owner	Володієць патенту Patent holder	Підтримувач Maintainer	Рік реєстрації Registration year	Рекомендована зона для вирощування Recommended zones for growing	Напрямок використання Purpose	Група стиглості Group of ripeness	Якість Quality
® 18007001	Алмазний Алмазний / <i>Almaznyi</i>	C3	1591	1591	1591		2020	C	x		
® 18007002	Янтарний Янтарний / <i>Yantarnyi</i>	C3	1591	1591	1591		2020	C	x		
Пшениця тверда (яра) <i>Triticum durum</i> Desf. Durum Wheat (Spring) (<i>Triticum turgidum</i> L. subsp. <i>durum</i> (Desf.) Husn.; <i>Triticum turgidum</i> L. subsp. <i>turgidum</i> conv. <i>durum</i> (Desf.) MacKey; <i>Triticum turgidum</i> L.; <i>Triticum sativum durum</i> Pers.; <i>Triticum vulgare durum</i> Alef.; <i>Triticum vulgare</i> Vill. s. str.; <i>Triticum durum</i> Koern.; <i>Triticum sativum durum</i> Hackel; <i>Triticum tenax</i> B. <i>durum</i> Asch. et Graebn.; <i>Triticum alatum</i> Peterm.; <i>Triticum dicoccum tenaces</i> Perc.; <i>Triticum pyramidale</i> Pers.)											
® 17006009	Альжбета Альжбета / <i>Alzhbeta</i>	C3	736	736	736		2020	СЛ	x		
18006002	Meica Meica / <i>Meisa</i>	C3	1581	1581			2020	СЛ	x		
Пшениця спелта (озима) <i>Triticum spelta</i> L. Spelt, Dinkel Wheat, Hulled Wheat											
® 18539003	Вишиванка білоцерківська Вишиванка білоцерківська / <i>Vyshyvanka bilotserkivska</i>	C3	1635 1097	2738 1097	2738 1097		2020	СЛП	зерн		цін
Жито посівне (озиме) <i>Secale cereale</i> L. Rye (Winter) (<i>Triticum secale</i> Link; <i>Triticum cereale</i> Salisb.)											
18015008	Ласкаве Ласкаве / <i>Laskave</i>	C	2291 736	2291 736			2020	ЛП	зерн		сбіл
® 18015007	Алатир Алатир / <i>Alatyr</i>	C	2291	2291	2291		2020	П	зерн		сбіл
18015010	Амей Амей / <i>Amei</i>	C	1990	1990			2020	ЛП	зерн		сбіл
18015009	Верша Верша / <i>Versha</i>	C	1990	1990			2020	ЛП	зерн		сбіл
® 18015006	КВС Пропавер KWS Propower / <i>KWS Propower</i>	F1	824	824	824		2020	ЛП	зерн		нбіл
18015013	Еліас Elias / <i>Elias</i>	П	2524	2524			2020	ЛП	зерн		сбіл
® 17015007	Оріана Оріана / <i>Oriana</i>	C	2291	2291	2291		2020	П	зерн		сбіл
Жито посівне (озиме) – батьківський компонент <i>Secale cereale</i> L. Rye (Winter) – parental component (<i>Triticum secale</i> Link; <i>Triticum cereale</i> Salisb.)											
® 18915006	ЛСР 153 LSR 153 / <i>LSR 153</i>	C3	824	824	824		2020				
® 17915007	МСГ 2135 MSG 2135 / <i>MSG 2135</i>	F1	2313	2313	2313		2020				
® 17915008	РГ 1124 RG 1124 / <i>RG 1124</i>	C3	2313	2313	2313		2020				
Тритикале (озиме) <i>Triticosecale</i> Witt. Triticale (Winter) (<i>Triticosecale</i> Wittm. ex A. Camus)											
18022001	Елань Елань / <i>Yelan</i>	C3	1581 2284	1581 2284			2020	ЛП	зерн		сбіл
17022002	Леонтій Леонтій / <i>Leontii</i>	C3	1581	1581			2020	ЛП	зерн		сбіл
® 17022009	Мироносець Мироносець / <i>Myronosets</i>	C3	1589 1601	1589 1601	1589 1601		2020	ЛП	зерн		сбіл
® 17022010	Пудік Пудік / <i>Pudik</i>	C3	2632 1807	2632 1807	2632 1807		2020	ЛП	зерн		сбіл
Тритикале (яре) <i>Triticosecale</i> Witt. Triticale (Spring) (<i>Triticosecale</i> Wittm. ex A. Camus)											
18288002	Скарб харківський Скарб харківський / <i>Skarb kharkivskiyi</i>	C3	1581	1581			2020	ЛП	зерн		сбіл
Овес посівний (ярий) <i>Avena sativa</i> L. Oat (Spring)											
® 18011003	Азамат Азамат / <i>Azamat</i>	C3	2260	2260	2260		2020	ЛП	x		
18011001	Ерл Earl / <i>Earl</i>	C3	2524	2524			2020	ЛП	x		
18011002	Матрос Matros / <i>Matros</i>	C3	1990	1990			2020	ЛП	x		
Ячмінь звичайний (озимий) <i>Hordeum vulgare</i> L. Barley (Winter) (<i>Hordeum vulgare</i> (L.) emend. Vav. et Bacht.; <i>Hordeum distichum</i> L.; <i>Hordeum distichon</i> L. emend. Lam.; <i>Hordeum aestivum</i> Hall; <i>Hordeum zeocriton</i> L.; <i>Zeocriton distichon</i> ; <i>Zeocriton commune</i> Beauv.; <i>Hordeum vulgare</i> ssp. <i>distichum</i> grex <i>culta</i> Regel; <i>Hordeum sativum</i> Jessen; <i>Hordeum hexastichum</i> L.)											
18019006	Белісса Belissa / <i>Belissa</i>	C3	926	926			2020	П	зерн		нбіл

Заявка № Application №	Назва сорту Variety denomination	Метод створення Method of propagating	Заявник (и) Applicant	Власник Owner	Володієць патенту Patent holder	Підтримувач Maintainer	Рік реєстрації Registration year	Рекомендована зона для вирощування Recommended zones for growing	Напрямок використання Purpose	Група стиглості Group of ripeness	Якість Quality
18019008	Белла <i>Bella / Bella</i>	C3	1223	1223			2020	П	зерн		нбіл
18019007	Аренія <i>Arenia / Arenia</i>	C3	1223	1223			2020	СП	зерн		сбіл
® 18019002	Крікс <i>Крікс / Kriks</i>		1591	1591	1591		2020	СЛП	х		
17019002	Гіронделла <i>Hirondella / Hirondella</i>	C3	1891	1891			2020	П	зерн		зерн
18019004	СИ КОМЕТ <i>SY KOOMET / SY KOOMET</i>	F1	1959	1959			2020	СЛП	зерн		сбіл
® 18019001	Непереможний <i>Непереможний / Neperemozhnyi</i>	C3	1998	1998	1998		2020	СЛП	х		
® 18019005	КАЙЛІН <i>KAYLIN / KAYLIN</i>	C3	2302	2302	2302		2020	СП	зерн		сбіл
Ячмінь звичайний (ярий) <i>Hordeum vulgare</i> L. Barley (Spring) (<i>Hordeum vulgare</i> (L.) emend. Vav. et Bacht.; <i>Hordeum distichum</i> L.; <i>Hordeum distichon</i> L. emend. Lam.; <i>Hordeum aestivum</i> Hall; <i>Hordeum zeocriton</i> L.; <i>Zeocriton distichon</i>; <i>Zeocriton commune</i> Beauv.; <i>Hordeum vulgare</i> ssp. <i>distichum</i> grex <i>culta</i> Regel; <i>Hordeum sativum</i> Jessen; <i>Hordeum hexastichum</i> L.)											
18020011	АМІДАЛА <i>AMIDALA / AMIDALA</i>	C3	1223	1223			2020	СЛП	пв		нбіл
18020012	АББА <i>ABBA / ABBA</i>	C3	1223	1223			2020	СЛП	пв		нбіл
17020020	Кречет <i>Кречет / Krechet</i>	C3	1581	1581			2020	СЛ	зерн		вбіл
® 18020009	МІП Акцент <i>МІП Акцент / MIP Aktsent</i>	C3	1589	1589	1589		2020	СЛП	зерн		сбіл
® 18020008	МІП Люкс <i>МІП Люкс / MIP Liuks</i>	C3	1589	1589	1589		2020	СЛП	зерн		сбіл
18020013	Реванш <i>Revanche / Revanche</i>	C3	1891	1891			2020	СЛП	пв		нбіл
18020010	Арей <i>Арей / Arei</i>	C3	2260	2260			2020	СЛП	зерн		сбіл
18020006	Ескалена <i>Escalena / Escalena</i>	C3	2524 2301	2524 2301			2020	СЛП	зерн		сбіл
18020007	Проспект <i>Prospect / Prospect</i>	C3	2545	947			2020	СЛП	зерн		сбіл
Кукурудза звичайна <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn (<i>Zea americana</i>; <i>Zea alba</i>; <i>Zea vulgaris</i> Mill.; <i>Mays zea</i> Gaertn; <i>Zea segetalis</i> Salisb.; <i>Mays americana</i> Baumg.; <i>Thalissia mays</i> O. Kuntze.)											
18009042	Р9300 <i>P9300 / P9300</i>	F1	9	9			2020	С	зерн	сс	
18009044	Р8329 <i>P8329 / P8329</i>	F1	9	9			2020	СЛ	зерн	ср	
18009045	Р8666 <i>P8666 / P8666</i>	F1	9	9			2020	СЛП	зерн	ср	
18009043	В2114Ц <i>B2114C / B2114Ts</i>	F1	9	9			2020	ЛП	зерн	сс	
18009039	Р9978 <i>P9978 / P9978</i>	F1	9	9			2020	Л	зерн	сп	
18009041	Р0217 <i>P0217 / P0217</i>	F1	9	9			2020	С	зерн	сп	
18009034	Р9889 <i>P9889 / P9889</i>	F1	9	9			2020	СЛП	зерн	сс	
18009035	Р9610 <i>P9610 / P9610</i>	F1	9	9			2020	СЛП	зерн	сс	
18009036	Р8271 <i>P8271 / P8271</i>	F1	9	9			2020	СП	зерн	ср	
18009158	Р7948 <i>P7948 / P7948</i>	F1	9	9			2020	СП	зерн	ср	
18009063	Глуманда <i>Glumanda / Glumanda</i>	F1	844	844			2020	СЛП	зерн	ср	
18009050	АМАЗОН <i>AMAZON / AMAZON</i>	F1	924	924			2020	СЛП	зерн	рс	
18009051	МАС 16Б <i>MAS 16B / MAS 16B</i>	F1	924	924			2020	СЛП	зерн	ср	
18009055	СКАНДИНАВ <i>SCANDINAV / SCANDINAV</i>	F1	924	924			2020	СЛП	зерн	др	
18009037	Р0200 <i>P0200 / P0200</i>	F1	9	9			2020	СЛ	зерн	сс	

Заявка № Application №	Назва сорту Variety denomination	Метод створення Method of propagating	Заявник (и) Applicant	Власник Owner	Володілець патенту Patent holder	Підтримувач Maintainer	Рік реєстрації Registration year	Рекомендована зона для вирощування Recommended zones for growing	Напрямок використання Purpose	Група стиглості Group of ripeness	Якість Quality
18009033	B3316C B3316C / B3316C	F1	9	9			2020	СП	зерн	сс	
17009087	Адей Adei / Adei	F1	966	966			2020	Л	зерн		
18009073	ГІМОВ GUIMAUVE / GUIMAUVE	F1	1783	1783			2020	С	зерн	сп	
18009078	РЖТ ІРЕНОХКС RGT IRENOXX / RGT IRENOXX	F1	1783	1783			2020	СЛП	зерн	ср	
18009079	РЖТ ЕХХАКТ RGT EXXACT / RGT EXXACT	F1	1783	1783			2020	СЛП	зерн	ср	
18009106	РЖТ СІНФОНІККС RGT SYNFONIXX / RGT SYNFONIXX	F1	1783	1783			2020	СЛП	зерн	ср	
18009105	ЛГ 31330 LG 31330 / LG 31330	F1	793	793			2020	СП	зерн	сс	
18009107	РЖТ КОКСІНЕЛЛЬ RGT COXXINELLE / RGT COXXINELLE	F1	1783	1783			2020	СП	зерн	сс	
18009108	РЖТ МІКАЕЛІККС RGT MIKAELIXX / RGT MIKAELIXX	F1	1783	1783			2020	СЛП	зерн	сс	
18009149	ЕЛЬДАКАР ELDACAR / ELDACAR	F1	1783	1783			2020	С	зерн	сп	
18009072	РЖТ ФЕРАРІККС ВАКСІ RGT FERARIXX WAXY / RGT FERARIXX WAXY	F1	1783	1783			2020	СЛП	зерн	сс	
18009046	Кардіф Cardif / Cardif	F1	1902	1902			2020	ЛП	зерн	ср	
18009052	ЛУКАКУ LUKAKU / LUKAKU	F1	924	924			2020	СЛП	зерн	сс	
18009182	ДН Анаїт DN Anaït / DN Anaït	F1	2260	2260			2020	С	зерн	сп	
18009064	Контенто Contento / Contento	F1	2011	2011			2020	СЛП	зерн		
18009065	Леонідо Leonido / Leonido	F1	2011	2011			2020	СЛП	зерн	ср	
18009180	ДС1897Б DS1897B / DS1897B	F1	2094	2094			2020	СЛП	зерн	ср	
19009021	КМ 3260 KM 3260 / KM 3260	F1	2257	2257			2020	ЛП	зерн	ср	
19009023	КМ 3310 KM 3310 / KM 3310	F1	2257	2257			2020	ЛП	зерн	ср	
19009013	Кросбі Krosbi / Krosbi	F1	2260 921	2260 921			2020	С	зерн	ср	
19009022	КМ 4100 KM 4100 / KM 4100	F1	2257	2257			2020	П	зерн	сс	
16009124	КМ 3130 KM 3130 / KM 3130	F1	2257	2257			2020	ЛП	зерн	сс	
17009184	ДН Сінрай DN Sinrai / DN Sinrai	F1	2260	2260			2020	СЛ	зерн		
19009012	Нокс Noks / Noks	F1	2260 921	2260 921			2020	СЛП	зерн	рс	
19009014	Вебер Veber / Veber	F1	2260 921	2260 921			2020	С	зерн	сп	
17009044	ЄС Орїлскаї ES Orilskai / YeS Orilskai	F1	2287	2287			2020	С	зерн	сс	
18009183	ДН Велд DN Veld / DN Veld	F1	2260	2260			2020	С	зерн	сс	
18009184	ДН Атон DN Aton / DN Aton	F1	2260	2260			2020	СЛП	зерн	рс	
18009185	ДН Пульсація DN Pulsatsiia / DN Pulsatsiia	F1	2260	2260			2020	ЛП	зерн	рс	
18009186	ДН Стяг DN Stiah / DN Stiah	F1	2260	2260			2020	СЛП	зерн	ср	
17009178	ДН Джура DN Dzhura / DN Dzhura	F1	2260	2260			2020	С	зерн	сс	
18009148	Дулкано Dulcano / Dulcano	F1	2524 2436	2524 2436			2020	ЛП	зерн	ср	

Заявка № Application №	Назва сорту Variety denomination	Метод створення Method of propagating	Заявник (и) Applicant	Власник Owner	Володієць патенту Patent holder	Підтримувач Maintainer	Рік реєстрації Registration year	Рекомендована зона для вирощування Recommended zones for growing	Напрямок використання Purpose	Група стиглості Group of ripeness	Якість Quality
18009151	Balam Vallat / Vallat	F1	2524 2436	2524 2436			2020	СЛП	зерн	ср	
18009152	Ервінга Erwinga / Erwinga	F1	2524 2436	2524 2436			2020	СЛП	зерн	ср	
18009153	Зума Zuma / Zuma	F1	2524 2436	2524 2436			2020	СЛП	зерн	ср	
19009011	Девіс Devic / Devic	F1	2260 921	2260 921			2020	СЛП	зерн	ср	
18009181	ДЗ Шквал DZ Shkval / DZ Shkval	F1	2260 1988	2260 1988			2020	СЛП	зерн	сс	
18009150	Дженні Jenny / Jenny	F1	2524 2436	2524 2436			2020	СЛ	зерн	ср	
18009077	Балма Balma / Balta	F1	2530	2530			2020	СЛП	зерн	ср	
18009155	СПАРТАН Spartan / Spartan	F1	2537	2537			2020	СЛП	зерн	сс	
18009074	КВС ПАУЛО KWS PAULO / KWS PAULO	F1	2649	2649			2020	СЛП	зерн	сс	
18009080	КВС БУРИТО KWS BURITO / KWS BURITO	F1	2649	2649			2020	СЛП	зерн	сс	
17009124	Гебалот Gebalot / Gebalot	F1	2524	2524			2020	СЛ	зерн		
18009089	КВС КАЛАФУНА KWS KALAFUNA / KWS KALAFUNA	F1	2649	2649			2020	СЛП	зерн	ср	
18009095	ІМПРЕССИВО IMPRESSIVO / IMPRESSIVO	F1	2649	2649			2020	СЛП	зерн	ср	
18009104	ДЕЛАНО DELANO / DELANO	F1	2649	2649			2020	СЛП	зерн	сс	
18009102	КАМЕО CAMEO / CAMEO	F1	2649	2649			2020	СЛП	зерн	ср	
18009090	КВС ЛАУРО KWS LAURO / KWS LAURO	F1	2649	2649			2020	СЛП	зерн	сс	
18009154	Юренга Jurenga / Jurenga	F1	2524 2436	2524 2436			2020	СЛП	зерн	ср	
18009094	КВС ДИНАМО KWS DYNAMO / KWS DYNAMO	F1	2649	2649			2020	СЛП	зерн	ср	
18009097	БАГРОВО BAGROWO / BAGROWO	F1	2649	2649			2020	СЛП	зерн	ср	
18009098	КВС РАМИРО KWS RAMIRO / KWS RAMIRO	F1	2649	2649			2020	СЛП	зерн	сс	
18009103	КВС ДЖОРДЖІО KWS GEORGIO / KWS GEORGIO	F1	2649	2649			2020	СЛП	зерн	ср	
18009081	КВС ФОРТУНАТО KWS FORTUNATO / KWS FORTUNATO	F1	2649	2649			2020	СЛП	зерн	ср	
18009088	КВС ГЕНДАЛЬФ KWS GANDALF / KWS GANDALF	F1	2649	2649			2020	СЛП	зерн	ср	
18009083	КВС ІНТЕЛЕГЕНС KWS INTELIGENS / KWS INTELIGENS	F1	2649	2649			2020	СЛП	зерн	сс	
18009084	КВС АДАЖІО KWS ADAGIO / KWS ADAGIO	F1	2649	2649			2020	СЛП	зерн	ср	
18009085	ЛЕОНОВО LEONOWO / LEONOWO	F1	2649	2649			2020	СП	зерн	сс	
18009086	БІГБІТ BIGBEAT / BIGBEAT	F1	2649	2649			2020	СЛП	зерн	ср	
18009087	КВС ПРОВІЗО KWS PROVISO / KWS PROVISO	F1	2649	2649			2020	СЛП	зерн	сс	
18009091	КВС БІСТРО KWS BISTRO / KWS BISTRO	F1	2649	2649			2020	СП	зерн	сс	
Кукурудза звичайна – батьківський компонент Zea mays L. Maize, Corn – parental component											
18909100	РФА58ІІ RFA58II / RFA58II		793	793			2020				
18909073	ЛКФ2757 LKF2757 / LKF2757	C3	924	924			2020				
18909067	ЛМР3185 LMR3185 / LMR3185	C3	924	924			2020				

Заявка № Application №	Назва сорту Variety denomination	Метод створення Method of propagating	Заявник (и) Applicant	Власник Owner	Володієць патенту Patent holder	Підтримувач Maintainer	Рік реєстрації Registration year	Рекомендована зона для вирощування Recommended zones for growing	Напрямок використання Purpose	Група стиглості Group of ripeness	Якість Quality
18909068	ЛЖН2098 LGN2098 / LGN2098	C3	924	924			2020				
18909071	ЛПХ3917 LRH3917 / LPH3917	C3	924	924			2020				
18909069	ЛПХ3916 LRH3916 / LPH3916	C3	924	924			2020				
18909097	P17065 R17065 / R17065	C3	1783	1783			2020				
18909101	P17098 R17098 / R17098	C3	1783	1783			2020				
18909084	P13036 R13036 / R13036	C3	1783	1783			2020				
18909085	P15076 R15076 / R15076	C3	1783	1783			2020				
19909098	AC3512CЦ AC3512SC / AC3512SC	C3	2094	2094			2020				
19909019	ПК 1313 PK 1313 / PK 1313	C3	2257	2257			2020				
19909018	ПК 155 PK 155 / PK 155	C3	2257	2257			2020				
19909016	ПК 210 PK 210 / PK 210	C3	2257	2257			2020				
19909017	ПК 114 PK 114 / PK 114	C3	2257	2257			2020				
16909148	ПК 1116 М PK 1116 M / PK 1116 M	C3	2257	2257			2020				
18909086	P18020 R18020 / R18020	C3	1783	1783			2020				
18909193	ДК3938МВ DK3938MB / DK3938MV	C3	2260	2260			2020				
18909194	ДК3173М DK3173M / DK3173M		2260	2260			2020				
18909195	ДК3172 3М DK3172 3M / DK3172 ZM	C3	2260	2260			2020				
18909196	ДК3173 3М DK3173 3M / DK3173 ZM	C3	2260	2260			2020				
18909197	ДК4168СВ3М DK4168CB3M / DK4168SVZM	C3	2260	2260			2020				
19909020	ПК 211 PK 211 / PK 211	C3	2257	2257			2020				
18909199	ДК4540СВ3М DK4540CB3M / DK4540SVZM	C3	2260	2260			2020				
18909172	ІКС 250 М IKS 250 M / IKS 250 M		2260	2260			2020				
18909192	Крос272М Kros272M / Kros272M	F1	2260	2260			2020				
18909173	ІКС 349 ЗС IKS 349 3C / IKS 349 ZS	C3	2260	2260			2020				
18909186	Крос245М Kros245M / Kros245M	F1	2260	2260			2020				
18909191	ДК7443М DK7443M / DK7443M		2260	2260			2020				
18909188	ДК7400М DK7400M / DK7400M		2260	2260			2020				
18909189	Крос454М Kros454M / Kros454M	F1	2260	2260			2020				
18909190	Крос368М Kros368M / Kros368M	F1	2260	2260			2020				
18909171	ІКС 259 3М IKS 259 3M / IKS 259 ZM	C3	2260	2260			2020				
18909159	АГ2016 AG2016 / AG2016	C3	2524 2436	2524 2436			2020				
18909198	ДК4168М DK4168M / DK4168M		2260	2260			2020				
18909161	АГЖ535 AGJ535 / AGJ535	C3	2524 2436	2524 2436			2020				
18909158	СМ395 SM395 / SM395	C3	2524 2436	2524 2436			2020				

Заявка № Application №	Назва сорту Variety denomination	Метод створення Method of propagating	Заявник (и) Applicant	Власник Owner	Володієць патенту Patent holder	Підтримувач Maintainer	Рік реєстрації Registration year	Рекомендована зона для вирощування Recommended zones for growing	Напрямок використання Purpose	Група стиглості Group of ripeness	Якість Quality
18909147	K147 K147 / K147	C3	2535	2535			2020				
19909090	A5472 A5472 / A5472	C3	2576 2676	2576 2676			2020				
19909091	A32879 A32879 / A32879	C3	2576 2676	2576 2676			2020				
18909187	ДК7400СВ3М ДК7400СВ3М / DK7400SVZM	C3	2260	2260			2020				
18909088	КВ 9ЕУ0067 KW 9EY0067 / KW 9EY0067	C3	2649	2649			2020				
18909091	КВ 9ЕУ0070 KW 9EY0070 / KW 9EY0070	C3	2649	2649			2020				
18909099	КВ 4ЕЦ1728 KW 4EC1728 / KW 4EC1728	C3	2649	2649			2020				
18909120	КВ 4ЕХ1631 KW 4EH1631 / KW 4EH1631	C3	2649	2649			2020				
17909132	КВ 9ЕУ0043 KW 9EY0043 / KW 9EY0043	C3	2649	2649			2020				
18909160	АГЖ955 AGJ955 / AGJ955	C3	2524 2436	2524 2436			2020				
18909136	КВ 7ЕЦ1789 KW 7EC1789 / KW 7EC1789	C3	2649	2649			2020				
18909118	КВ 4П1336 KW 4P1336 / KW 4P1336	C3	2649	2649			2020				
18909124	КВ 5Г7544 KW 5G7544 / KW 5G7544	C3	2649	2649			2020				
18909135	КВ 7ЕХ1761 KW 7EH1761 / KW 7EH1761	C3	2649	2649			2020				
18909094	КВ 5ФЛ5018 KW 5FL5018 / KW 5FL5018	C3	2649	2649			2020				
18909079	КВ 1Ф1815 KW 1F1815 / KW 1F1815	C3	2649	2649			2020				
18909122	КВ 4ФП1579 KW 4FP1579 / KW 4FP1579	C3	2649	2649			2020				
18909130	КВ 7П1484 KW 7P1484 / KW 7P1484	C3	2649	2649			2020				
18909132	КВ 7ФП1503 KW 7FP1503 / KW 7FP1503	C3	2649	2649			2020				
18909133	КВ 7ЕХ1764 KW 7EH1764 / KW 7EH1764	C3	2649	2649			2020				
18909078	КВ 9ЕУ0046 KW 9EY0046 / KW 9EY0046	C3	2649	2649			2020				
18909077	КВ 9ЕУ0069 KW 9EY0069 / KW 9EY0069	C3	2649	2649			2020				
18909087	КВ 9ЕУ0071 KW 9EY0071 / KW 9EY0071	C3	2649	2649			2020				
18909092	КВСЕК 537 KWSEK 537 / KWSEK 537	F1	2649	2649			2020				
18909119	КВ 4ЕЦ1732 KW 4EC1732 / KW 4EC1732	C3	2649	2649			2020				
18909121	КВ 4ФП1573 KW 4FP1573 / KW 4FP1573	C3	2649	2649			2020				
18909123	КВ 6ЕУ0052 KW 6EY0052 / KW 6EY0052	C3	2649	2649			2020				
18909098	КВ 1ФЛ7015 KW 1FL7015 / KW 1FL7015	C3	2649	2649			2020				
Овес голозерний <i>Avena nuda</i> L. Naked Oat											
® 18520001	Родоніт Родоніт / Rodonit	C3	2260	2260	2260		2020	СЛП	x		
Ячмінь звичайний (озимий) – батьківський компонент <i>Hordeum vulgare</i> L. Barley (Winter) – parental component (<i>Hordeum vulgare</i> (L.) emend. Vav. et Bacht.; <i>Hordeum distichum</i> L.; <i>Hordeum distichon</i> L. emend. Lam.; <i>Hordeum aestivum</i> Hall; <i>Hordeum zeocriton</i> L.; <i>Zeocriton distichon</i>; <i>Zeocriton commune</i> Beauv.; <i>Hordeum vulgare</i> ssp. <i>distichum</i> grex <i>culta</i> Regel; <i>Hordeum sativum</i> Jessen; <i>Hordeum hexastichum</i> L.)											
18919001	Ф1Ф180 F1F180 / F1F180	F1	1959	1959			2020				

Заявка № Application №	Назва сорту Variety denomination	Метод створення Method of propagating	Заявник (и) Applicant	Власник Owner	Володієць патенту Patent holder	Підтримувач Maintainer	Рік реєстрації Registration year	Рекомендована зона для вирощування Recommended zones for growing	Напрямок використання Purpose	Група стиглості Group of ripeness	Якість Quality
Кукурудза восковицна Zea mays var. ceratina L. Corn (Zea mays subsp. ceratina (Kuelesh.) Zhuk., Zea mays L. var. ceratina Kulesh.)											
17009217	Твістер Twister / Twister	F1	1581	1581			2020	СЛ	зерн		
Сільськогосподарські: бобові Agricultural: Field pulse Горох посівний (зерновий) Pisum sativum L. Pea (Pisum majus Dode; Pisum romanum; Pisum saccharatum Ser. in DC.; Pisum macrocarpum Ser.; Pisum hortense Asch. et Graebn.; Pisum commune Clav.; Pisum jomardi Schrank; Pisum uniflorum Hort.; Pisum macrospermum Hort.; Pisum vulgare Jundz.; Pisum sativum L. (s. amplissima) Gov.)											
® 17023011	Білий ангел Білий ангел / Bilyi anhel	C3	1591	1591	1591		2020	П	зерн		сбіл
Нут звичайний Cicer arietinum L. Chick-Pea (Cicer grossum Salisb.; Cicer sativum Schkuhr; Cicer physodes Rchb.; Cicer rotundum Jord.; Cicer sintensii Hausskn.; Cicer edessanum Stapf.)											
® 19028005	Бланко Бланко / Blanco	C3	1123	1123	1123		2020	СЛ			
Квасоля звичайна (зернова) Phaseolus vulgaris L. French Bean (Phaseolus vulgaris (L.) Savi; Phaseolus nanus L.; Phaseolus romanus; Phaseolus gonospermus; Phaseolus saponaceus; Phaseolus sphaericus; Phaseolus haematocarpus Savi; Phaseolus compressus DC.; Phaseolus angulosus Schuebl. et Martens; Phaseolus capensis Hort.; Phaseolus cruentus Hort.; Phaseolus zedra; Phaseolus subglobosus Fingerh.; Phaseolus vexillatus Blanco; Phaseolus melanospermus Fingerh.; Phaseolus dimidiatus Haberle; Phaseolus pictus Cav.; Phaseolus nigricans Haberle)											
18025001	Журавка Журавка / Zhuravka	C3	2260	2260			2020	СЛ	насіння		
18025002	Подольська Подольська / Podolianka	П	2471	2471			2020	ЛП	насіння		
Соя культурна Glycine max (L.) Merrill Soya Bean (Phaseolus max L.; Dolichos soja L.; Soja hispida Moench; Phaseolus sordilis Salisb.; Soja japonica Savi; Soja angustifolia Miq.; Glycine tabacina; Glycine tomentosa Benth.; Glycine hispida (Moench) Maxim.; Soja soja Karst.; Soja max Piper)											
18045012	Атакама Atacama / Atacama	C3	1498	1498			2020	СЛП	зерн		
18045013	Акардія Acardia / Acardia	C3	1498	1498			2020	СЛП	зерн		
18045011	Ангеліка Angelica / Angelica	C3	1498	1498			2020	СЛП	зерн		
18045025	Чураївна Чураївна / Churaivna	C3	1669	1669			2020	СЛП	зерн		
17045034	Паллада Pallada / Pallada	C3	1669	1669			2020	СЛП	зерн		
18045043	Титан Titan / Titan	C3	1669 1591	1669 1591			2020	СЛП	зерн		
18045044	Райдо Raido / Raido	C3	2430	2430			2020	СЛП	зерн		
18045038	ААЦ Інвест 1605 AAC Invest 1605 / AAC Invest 1605	П	2536	2536			2020	П	зерн		
18045028	СОЛЕНА SOLENA / SOLENA	C3	1783	1783			2020	СЛП	зерн		
18045030	РЖТ СФІНКС RGT SPHINX / RGT SPHINX	C3	1783	1783			2020	СП	зерн		
18045027	Адецца Adessa / Adessa	C3	2011	2011			2020	СЛП	зерн		
18045039	Амбелла Ambella / Ambella	C3	2011	2011			2020	СП	зерн		
18045045	ЯКАРІ YAKARI / YAKARI	C3	2258	2258			2020	СЛП	зерн		
Сільськогосподарські: круп'яні Agricultural: Field groats Гречка їстівна Fagopyrum esculentum Moench Buckwheat (Fagopyrum sagittatum Gilib.; Polygonum fagopyrum L.; Polygonum cereale Salisb.; Fagopyrum fagopyrum Karsten; Fagopyrum emarginatum Roth; Fagopyrum macropterum a. emarginatum Fenzl.; Fagopyrum cereale)											
17008001	Володар Володар / Volodar	П	417	417			2020	Л	х		
18008003	Покровська Покровська / Pokrovska		1626	1626			2020	Л	х		
® 18008004	Христіна Христіна / Khrystyna	П	2546	2546	2546		2020	ЛП	х		
Просо посівне Panicum miliaceum L. Common Millet (Miliun panicum Mill.; Milium esculentum Moench; Panicum milium Pers.; Leptoloma miliacea Smith.)											
17014001	Казкове джерело Казкове джерело / Kazkove dzhherelo	C3	1581	1581			2020	СЛП	х		

Заявка № Application №	Назва сорту Variety denomination	Метод створення Method of propagating	Заявник (и) Applicant	Власник Owner	Володієць патенту Patent holder	Підтримувач Maintainer	Рік реєстрації Registration year	Рекомендована зона для вирощування Recommended zones for growing	Напрямок використання Purpose	Група стиглості Group of ripeness	Якість Quality
18014002	Дивовижне Дивовижне / Dyvovyzhne	C3	1581	1581			2020	СЛП	х		
18014001	Корнбергер Миттельфруе Kornberger Mittelfruhe / Kornberger Mittelfruhe	П	2524 2436	2524 2436			2020	СЛП	х		
Сорго звичайне (двоколіорове) Sorghum bicolor L. (Holcus sorghum; Holcus bicolor L.; Holcus arduini Gmel.; Andropogon bicolor Roxb.; Andropogon halepensis var. bicolor Vined et Druce.)											
18018001	РЖТ АЛІГГАТОР RGT ALIGGATOR / RGT ALIGGATOR	F1	1783	1783			2020	СЛ			
18018006	Сріблясте Сріблясте / Sribliaste	C3	2260	2260			2020	СЛ			
18018009	Сентініл ІГ Sentinel IG / Sentinel IG	F1	2554	2554			2020	СЛ			
17018010	КВС НЕМЕСІС KWS NEMESIS / KWS NEMESIS	F1	2649	2649			2020	СЛ			
18018005	КВС РАСМУС KWS RASMUS / KWS RASMUS	F1	2649	2649			2020	СЛ			
Лобода кіноа Chenopodium quinoa Willd. Quinoa											
© 19661001	Олімп Олімп / Olimp	C3	2612	2612	2612		2020	СЛ			
Сільськогосподарські: олійні та прядивні Agricultural: Oil and Fibre											
Соняшник однорічний Helianthus annuus L. (Helianthus debilis Nutt.; Helianthus indicus L.; Helianthus tubaeformis Nutt.; Helianthus platycephalis.; Helianthus macrocarpus DC.; Helianthus ovatus Lehm.; Helianthus colossus O. Ktze.; Helianthus erythrocarpus Bartl.; Helianthus multiflorus Hook.; Helianthus grandiflorus Wender.; Helianthus cultus Venzl.; Helianthus ruderalis Venzl.)											
18039025	П64ЛЕ153 P64LE153 / P64LE153	F1	9	9			2020	СЛ	олн	ср	сл
18039027	П64ЛЛ155 P64LL155 / P64LL155	F1	9	9			2020	СЛ	олн	ср	сл
18039026	П63ГГ142 P63HH142 / P63HH142	F1	9	9			2020	СЛ	ВОЛ	рс	сл
18039024	П64ГГ150 P64HH150 / P64HH150	F1	9	9			2020	СЛ	ВОЛ	ср	сл
16039079	Каледонія КЛ Kaledonia CL / Kaledonia CL	F1	485	485			2020	Л	ВОЛ	сс	вл
18039060	ЛГ50479 СХ LG50479 SX / LG50479 SX	F1	793	793			2020	СЛ	олн	ср	сл
18039062	ЛГ50529 СХ LG50529 SX / LG50529 SX	F1	793	793			2020	СЛ	олн	ср	сл
18039034	МАС 810Б MAS 810B / MAS 810B	F1	924	924			2020	СЛ	олн	ур	вл
18039035	МАС 865ІР MAS 865IR / MAS 865IR	F1	924	924			2020	СЛ	олн	ср	нл
18039047	МАС 920КП MAS 920CP / MAS 920CP	C3	924	924			2020	СЛ	олн	ср	сл
18039037	ДЖУЛІУС JULIUS / JULIUS	F1	924	924			2020	СЛ	олн		сл
18039028	МАРІСАН MARISUN / MARISUN	C3	924	924			2020	СЛ	олн	ср	сл
18039031	КОНКВЕСТ CONQUEST / CONQUEST	F1	924	924			2020	СЛ	олн	ур	сл
18039055	РЖТ КАПІТОЛЛ RGT CAPITOLL / RGT CAPITOLL	F1	1783	1783			2020	СЛ	ВОЛ	рс	сл
18039061	ЛГ50586 КЛП LG50586 CLP / LG50586 CLP	F1	793	793			2020	СЛ	олн	ср	сл
18039059	ЛГ50455 КЛП LG50455 CLP / LG50455 CLP	F1	793	793			2020	СЛ	олн	рс	сл
18039121	Уносан Unosun / Unosun	F1	2011	2011			2020	СЛ	олн	сс	сл
18039046	Флорасан Florasun / Florasun	F1	2232	2232			2020	СЛ	олн	ср	сл
18039045	Реасан Reasun / Reasun	F1	2232	2232			2020	СЛ	олн	ср	сл
18039033	ВАДОР VADOR / VADOR	F1	924	924			2020	СЛ	олн	ср	нл
18039036	Кімера СТ Kimera ST / Kimera ST	F1	924	924			2020	СЛ	олн	ур	сл

Заявка № Application №	Назва сорту Variety denomination	Метод створення Method of propagating	Заявник (и) Applicant	Власник Owner	Володієць патенту Patent holder	Підтримувач Maintainer	Рік реєстрації Registration year	Рекомендована зона для вирощування Recommended zones for growing	Напрямок використання Purpose	Група стиглості Group of ripeness	Якість Quality
18039107	Фортасол Fortasol / Fortasol	F1	2267	2267			2020	СЛ	олн	сс	сл
18039132	Гуара Guara / Guara	F1	2267	2267			2020	СЛ	олн	сс	сл
17039060	ЕС Бонум ЕС Бонум / YeS Bonum		2287	2287			2020	СЛ	олн	ср	сл
17039063	ЕС Ортус ЕС Ортус / YeS Ortus	F1	2287	2287			2020	СЛ	олн	ср	сл
18039057	АУСТИН AUSTIN / AUSTIN	F1	1783	1783			2020	СЛ	олн	рс	вл
18039064	ТРАВЕЛЛЕР TRAVELLER / TRAVELLER	F1	1783	1783			2020	СЛ	олн	рс	вл
17039061	ЕС Харді ЕС Харді / YeS Khardi		2287	2287			2020	СЛ	олн	ср	сл
17039126	Марвін Марвін / Marvin	F1	2291	2291			2020	СЛ	олн	рс	вл
18039008	Тріполі Tripoli / Tripoli	F1	2312	2312			2020	Л	олн	сс	нл
18039007	Булерія Buleria / Buleria	F1	2312	2312			2020	СЛ	олн	ср	вл
17039068	КДВ 2017 КДВ 2017 / KDV 2017	F1	2265	2265			2020	СЛ	олн	ср	сл
18039106	Барон Baron / BARON	F1	2267	2267			2020	СЛ	олн	ср	вл
18039023	Гранд Адмірал Гранд Адмірал / Hrand Admiral	F1	2467 2468	2467 2468			2020	СЛ	олн		
18039103	Текадра Tecadra / Tecadra	F1	2537	2537			2020	СЛ	олн	сс	сл
18039115	Алекса СУ Alexa SU / Alexa SU	F1	2537	2537			2020	СЛ	олн	сс	сл
18039116	Даверо СУ Davero SU / Davero SU	F1	2537	2537			2020	СЛ	олн	сс	сл
17039062	ЕС Прімум ЕС Прімум / YeS Primum	F1	2287	2287			2020	СЛ	олн	рс	нл
17039064	ЕС Фортем ЕС Фортем / YeS Fortem	F1	2287	2287			2020	СЛ	олн	рс	сл
18039153	Хайсан 189 СУ Hysun 189 SU / Hysun 189 SU	F1	2554	2554			2020	СЛ	олн	сс	вл
18039151	Хайсан 195 ІТ Hysun 195 IT / Hysun 195 IT	F1	2554	2554			2020	СЛ	олн	ср	нл
18039152	Хайсан 268 ІТ Hysun 268 IT / Hysun 268 IT	F1	2554	2554			2020	СЛ	олн	ср	сл
19039014	Катрін Katrin / Katrin	C3 F1	2576 2676	2576 2676			2020	СЛ	олн	ср	сл
18039113	ФОРТЕРА FORTERA / FORTERA	F1	2440	2440			2020	СЛ	олн	рс	сл
18039018	ХОРОЛ KHOROL / Khorol	F1	2458	2458			2020	СЛ	олн		
18039050	КВС ЦЕЗАРЕС КЛ KWS CESARES CL / KWS CESARES CL	F1	2649	2649			2020	СЛ	олн	ср	вл
18039093	КВС АПАЧІ КЛ KWS APACHE CL / KWS APACHE CL	F1	2649	2649			2020	СЛ	олн	сс	сл
18039052	КВС АМОРЕС КЛ KWS AMORES CL / KWS AMORES CL	F1	2649	2649			2020	СЛ	олн	сс	нл
® 15039022	Есмань Esman`	П	1848	1848	1848		2020	Л	олн	ур	
18039092	КВС ПЕРСЕУС КЛ KWS PERSEUS CL / KWS PERSEUS CL	F1	2649	2649			2020	СЛ	олн	рс	сл
19039015	СУРО 162 SURO 162 / SURO 162	F1	2537	2537			2020	СЛ	олн	ср	сл
18039112	Ласса Lassa / Lassa	F1	2539	2539			2020	СЛ	олн	рс	вл
Соняшник однорічний – батьківський компонент Sunflower – parental component <i>Helianthus annuus L.</i> <i>(Helianthus debilis Nutt.; Helianthus indicus L.; Helianthus tubaeformis Nutt.; Helianthus platycephalis.; Helianthus macrocarpus DC.; Helianthus ovatus Lehm.; Helianthus colossus O. Ktze.; Helianthus erythrocarpus Bartl.; Helianthus multiflorus Hook.; Helianthus grandiflorus Wender.; Helianthus cultus Venzl.; Helianthus ruderalis Venzl.)</i>											
14939029	85П10Р 85P10R / 85P10R	C3	485	485			2020				

Заявка № Application №	Назва сорту Variety denomination	Метод створення Method of propagating	Заявник (и) Applicant	Власник Owner	Володієць патенту Patent holder	Підтримувач Maintainer	Рік реєстрації Registration year	Рекомендована зона для вирощування Recommended zones for growing	Напрямок використання Purpose	Група стиглості Group of ripeness	Якість Quality
18939079	ЛГ13013МЖА LG13013MJA / LG13013MJA	C3	793	793			2020				
17939049	ТРІ3751Р TRI3751R / TRI3751R	C3	924	924			2020				
18939063	ТРІ4748Р TRI4748R / TRI4748R	C3	924	924			2020				
18939038	ТРО4385Р TRO4385R / TRO4385R	C3	924	924			2020				
18939035	ТФО3288 ТФО3188 TFO3288 TFO3188 / TFO3288 TFO3188	C3	924	924			2020				
18939041	ТФІ3719А TFI3719A / TFI3719A	C3	924	924			2020				
18939154	ТФО3188 TFO3188 / TFO3188	C3	924	924			2020				
18939037	ТРІ4760Р TRI4760R / TRI4760R	C3	924	924			2020				
18939036	ТРІ4757Р TRI4757R / TRI4757R	C3	924	924			2020				
18939076	Р4НП8МЖІ R4NP8MJI / R4NP8MJI	C3	1435	1435			2020				
18939072	Р10019МІ R10019MI / R10019MI	C3	1435	1435			2020				
18939074	Р8035М2Ж R8035M2J / R8035M2J	C3	1435	1435			2020				
18939077	Ф5ДН3МКА F5DN3MKA / F5DN3MKA	C3	1435	1435			2020				
18939078	СФ1561М2СА SF1561M2SA / SF1561M2SA	C3	1435	1435			2020				
18939073	Р8035МЖС R8035MJS / R8035MJS	C3	1435	1435			2020				
18939040	ТФС3780А TFC3780A / TFC3780A	C3	924	924			2020				
18939006	ДС 33 Б DS 33 B / DS 33 B		2458	2458			2020				
18939013	ДС 53 Б DS 53 B / DS 53 B	П	2458	2458			2020				
19939034	ДС83АДС58Б DS83ADS58B / DS83ADS58B	F1	2458	2458			2020				
18939008	ДС 88 В DS 88 B / DS 88 V	П	2458	2458			2020				
18939011	ДС 78 В DS 78 B / DS 78 V	П	2458	2458			2020				
18939075	Р5ХІЗМЖС R5XY3MJS / R5XY3MJS	C3	1435	1435			2020				
18939007	ДС 33 А DS 33 A / DS 33 A	C3	2458	2458			2020				
18939009	ДС 8 Б DS 8 B / DS 8 B		2458	2458			2020				
18939005	ДС 83 А DS 83 A / DS 83 A	C3	2458	2458			2020				
18939024	АС15А AS15A / AS15A	C3	2467 2468	2467 2468			2020				
18939025	ОВ10Б OV10B / OV10B	C3	2467 2468	2467 2468			2020				
18939112	ЕХ500СУЛ EH500SUL / EH500SUL	C3	2267	2267			2020				
18939158	Рф1018 Rf1018 / Rf1018	C3	2537	2537			2020				
18939156	Рф1010 Rf1010 / Rf1010	C3	2537	2537			2020				
18939157	Рф3074 Rf3074 / Rf3074	C3	2537	2537			2020				
18939155	Рф1136 Rf1136 / Rf1136	C3	2537	2537			2020				
19939036	АС ХДЖ 9 AS KhDZh 9 / AS KhDZh 9	C3	2576 2676	2576 2676			2020				
19939035	ДС33АДС53Б DS33ADS53B / DS33ADS53B	F1	2458	2458			2020				

Заявка № Application №	Назва сорту Variety denomination	Метод створення Method of propagating	Заявник (и) Applicant	Власник Owner	Володієць патенту Patent holder	Підтримувач Maintainer	Рік реєстрації Registration year	Рекомендована зона для вирощування Recommended zones for growing	Напрямок використання Purpose	Група стиглості Group of ripeness	Якість Quality
Ріпак (озимий) Brassica napus L. oleifera Rape Seed (Winter) (Brassica oleifera Moench.; Brassica oleifera Delile; Brassica napus L. ssp. oleifera Metzg.; Brassica rapa L. ssp. napus Briquet.)											
18040035	ПХ131 PX131 / PKh131	F1	9	9			2020	С	олн		00
18040049	ЕС АМАДЕО ES AMADEO / ES AMADEO	F1	806	806			2020	СП	олн		00
18040048	ЕС НАВИГО ES NAVIGO / ES NAVIGO	F1	806	806			2020	СП	олн		00
18040039	Людгер Ludger / Ludger	F1	807	807			2020	СП	олн		00
18040040	Шопен Chopin / Chopin	F1	807	807			2020	СП	олн		00
18040041	Батис Batis / Batis	F1	807	807			2020	СП	олн		00
18040046	Сімлекс КЛ Simplex CL / Simplex CL	F1	807	807			2020	СП	олн		00
18040044	Донат Donut / Donut	F1	807	807			2020	СП	олн		00
18040010	ВІОЛІН VIOLIN / VIOLIN	F1	912	912			2020	С	олн		00
18040006	ПАРКУРС PARCOURS / PARCOURS	F1	912	912			2020	С	олн		00
18040011	ТЕМПО TEMPO / TEMPO	F1	912	912			2020	СП	олн		00
18040029	СИ ІОБА SY IOWA / SY IOWA	F1	1959	1959			2020	СП	олн		00
18040047	Галілеус Galileus / Galileus	C3	2524	2524			2020	С	олн		00
® 18040020	АЛІВІО ALIVIO / ALIVIO	F1	2602	2602	2602		2020	С	олн		00
® 18040024	ІНВ1266 КЛ INV1266 CL / INV1266 CL	F1	2602	2602	2602		2020	СП	олн		00
® 18040026	ТАЛЕЛ КЛ THALEL CL / THALEL CL	F1	2602	2602	2602		2020	СП	олн		00
18040043	Дайнемік Dynamic / Dynamic	F1	807	807			2020	СП	олн		00
17040015	ІНВ1188 INV1188 / INV1188	F1	2602	2602			2020	СЛП	олн		00
17040016	ІНВУЕЛО INVUELO / INVUELO	F1	2602	2602			2020	СЛП	олн		00
17040021	ІНВ1199 INV1199 / INV1199	F1	2602	2602			2020	СЛП	олн		00
17040022	ІНВ1170 INV1170 / INV1170	F1	2602	2602			2020	СЛП	олн		00
® 18040021	КВІТО QUITO / QUITO	F1	2602	2602	2602		2020	С	олн		00
18040028	СИ ФЛОРІАН SY FLORIAN / SY FLORIAN	F1	1959	1959			2020	СП	олн		00
Ріпак (озимий) – батьківський компонент Brassica napus L. oleifera Rape Seed (Winter) – parental component (Brassica oleifera Moench.; Brassica oleifera Delile; Brassica napus L. ssp. oleifera Metzg.; Brassica rapa L. ssp. napus Briquet.)											
18940004	ЕСР1064 ESR1064 / ESR1064	C3	806	806			2020				
18940005	ЕСФ2014ЦМС ESF2014CMS / ESF2014CMS	C3	806	806			2020				
Ріпак (ярий) Brassica napus L. oleifera Rape Seed (Spring) (Brassica oleifera Moench.; Brassica oleifera Delile; Brassica napus L. ssp. oleifera Metzg.; Brassica rapa L. ssp. napus Briquet.)											
17041013	Чеві КЛ Chevy CL / Chevy CL	F1	912	912			2020	П	олн		00
18041002	Клауд КЛ Cloud CL / Cloud CL	F1	912	912			2020	П	олн		00
18041003	Колет КЛ Colette CL / Colette CL	F1	912	912			2020	П	олн		00
18041004	Караміно КЛ Caramino CL / Caramino CL	F1	912	912			2020	ЛП	олн		00
15041011	ІНВ110 КЛ INV110 CL / INV110 CL	F1	2602	2602			2020	ЛП	олн		00

Заявка № Application №	Назва сорту Variety denomination	Метод створення Method of propagating	Заявник (и) Applicant	Власник Owner	Володієць патенту Patent holder	Підтримувач Maintainer	Рік реєстрації Registration year	Рекомендована зона для вирощування Recommended zones for growing	Напрямок використання Purpose	Група стиглості Group of ripeness	Якість Quality
17041009	Перформер Performer / Performer	F1	2602	2602			2020	П	олн		00
Льон низький (олійний, кудряш) <i>Linum humile</i> Mill. Linseed (<i>Proles brevimulticaula</i> Vav. et Ell)											
19035001	Парус Парус / Parus	C3	2458	2458			2020	СЛП			
Гірчиця сарептська (яра) <i>Brassica juncea</i> (L.) Czern. Brown Mustard (Spring) (<i>Brassica juncea</i> (L.) Czern.; <i>Sinapis juncea</i> L.; <i>Raphanus junceus</i> Crantz; <i>Brassica besseriana</i> Andr.; <i>Crucifera juncea</i> Krause; <i>Sinapis juncea</i> Thunb.; <i>Brassica japonica</i>)											
19032001	Корона Корона / Korona	П	2458	2458			2020	СЛ			
19032002	Сінтіум Сінтіум / Sintium	C3	2654	2654			2020	СЛП			
Арахіс підземний <i>Arachis hypogaea</i> L. Groundnut (<i>Chamaebalanus Japonica</i> Rumph.; <i>Arachnida hypogaea</i> Moench; <i>Arachis asiatica</i> Lour.; <i>Arachis africana</i> Lour.; <i>Arachis americana</i> Tenore.)											
20031002	Цветеліна Tsvetelina / Tsvetelina	C3	2675	2675			2020	С			
20031001	Кремена Kremena / Kremena	C3	2675	2675			2020	С			
Льон звичайний, довгунець <i>Linum usitatissimum</i> L. Flax, Linseed (<i>Linum usitatissimum</i> L. f. <i>elongata</i>, <i>Linum usitatissimum</i> L. var. <i>intermedia</i> Vav et Ell, <i>Proles elongata</i> Vav et Ell)											
15081004	Сіверський Сіверський / Sivers`kyi	C3	1869	1869			2020	ЛП			
17081002	Усівський Усівський / Usivskyi	C3	2289	2289			2020	ЛП			
Конопля посівні <i>Cannabis sativa</i> L. Hemp (<i>Cannabis chinensis</i> Delile; <i>Cannabis erratica</i> Siev.; <i>Cannabis foetens</i> Gilib.; <i>Cannabis lupulus</i> Scop.; <i>Cannabis macrosperma</i> Stokes; <i>Cannabis gigantea</i> Hort.)											
© 19080001	Артеміда Артеміда / Artemida	П	2289	2289	2289		2020	ЛП	тхн, олн		
Сільськогосподарські: буряк Agricultural: Beet Буряк цукровий <i>Beta vulgaris</i> L. ssp. <i>vulgaris</i> var. <i>altissima</i> Doell Sugar Beet (<i>Beta vulgaris</i> L. ssp. <i>europaea</i> convar. <i>saccharifera</i> (Alef.) Krass.; <i>Beta vulgaris</i> provar. <i>altissima</i> Doll.; <i>Beta alba</i> Langenthal.; <i>Beta vulgaris</i> L. ssp. <i>saccharifera</i> Alef.)											
18069033	ФДР19Б1123 FDR19B1123 / FDR19B1123	F1	796	796			2020	ЛП	тхн		
18069034	ФДР19Б2094 FDR19B2094 / FDR19B2094	F1	796	796			2020	ЛП	тхн		
18069035	ФДР19Б4027 FDR19B4027 / FDR19B4027	F1	796	796			2020	ЛП	тхн		
18069016	СМАРТ ЯСНА КВС SMART JASNA KWS / SMART JASNA KWS	F1	2649	2649			2020	ЛП	тхн		
18069019	СМАРТ ДЖІНЕВРА КВС SMART GINEVRA KWS / SMART GINEVRA KWS	F1	2649	2649			2020	ЛП	тхн		
18069020	АЛЬВЕРІНА КВС ALVERINA KWS / ALVERINA KWS	F1	2649	2649			2020	ЛП	тхн		
18069021	СМАРТ ІБЕРІЯ КВС SMART IBERIA KWS / SMART IBERIA KWS	F1	2649	2649			2020	ЛП	тхн		
18069015	СМАРТ ЛАТОРІЯ КВС SMART LATORIA KWS / SMART LATORIA KWS	F1	2649	2649			2020	ЛП	тхн		
18069026	СМАРТ ДЖЕРБА КВС SMART DJERBA KWS / SMART DJERBA KWS	F1	2649	2649			2020	ЛП	тхн		
18069024	БЕНІАМІНА КВС BENIAMINA KWS / BENIAMINA KWS	F1	2649	2649			2020	ЛП	тхн		
18069025	СМАРТ ЛЕОНА КВС SMART LEONA KWS / SMART LEONA KWS	F1	2649	2649			2020	ЛП	тхн		

Заявка № Application №	Назва сорту Variety denomination	Метод створення Method of propagating	Заявник (и) Applicant	Власник Owner	Володілець патенту Patent holder	Підтримувач Maintainer	Рік реєстрації Registration year	Рекомендована зона для вирощування Recommended zones for growing	Напрямок використання Purpose	Група стиглості Group of ripeness	Якість Quality
Сільськогосподарські: картопля Agricultural: Potato											
Картопля Potato	<i>Solanum tuberosum</i> L. (<i>Solanum tuberosum</i> ssp. <i>tuberosum</i> ; <i>Solanum tuberosum</i> var. <i>chiloense</i> DC.; <i>Solanum tuberosum</i> var. <i>cultum</i> DC.; <i>Solanum tuberosum</i> var. <i>sabini</i> DC.; <i>Solanum fonckii</i> Phil.; <i>Solanum chiloense</i> (DC.) Benth.; <i>Solanum cultum</i> (DC.) Berth.; <i>Solanum sabini</i> (DC.) Berth.; <i>Solanum maglia</i> Schlecht. var. <i>guaytecarum</i> Bitt.; <i>Solanum maglia</i> var. <i>chutuberse</i> Bitt.; <i>Solanum tuberosum</i> var. <i>europaeum</i> Buk.; <i>Solanum leptostigma</i> Juz.; <i>Solanum molinae</i> Juz.; <i>Solanum tuberosum</i> ssp. <i>chiloense</i> Hawk.; <i>Solanum tuberosum</i> var. <i>guaytecarum</i> (Bitt.) Hawk.; <i>Solanum tuberosum</i> var. <i>chutubense</i> (Bitt.) Hawk.; <i>Solanum tuberosum</i> ssp. <i>andigenum</i> (Juz. et Buk.) Hawk.; <i>Solanum andigenum</i> Juz. et Buk.; <i>Solanum herrerae</i> Juz.; <i>Solanum subandigenum</i> Hawk.; <i>Solanum andigenum</i> var. <i>grauense</i> Varg.; <i>Solanum andigenum</i> var. <i>digitobatosum</i> Varg.; <i>Solanum andigenum</i> var. <i>carhua</i> Varg.)										
17088005	Княжа Княжа / Kniazha		369	369			2020	П			
18088018	7 ФОР 7 7 FOUR 7 / 7 FOUR 7		801	801			2020	Л			
18088019	Родріга Rodriga / Rodriga		1508	1508			2020	ЛП			
18088020	АЛЮЕТТ ALOUETTE / ALOUETTE		1652	1652			2020	ЛП			
18088021	ПАРАДІЗО PARADISO / PARADISO		1652	1652			2020	ЛП			
18088022	ФОНТАНЕ FONTANE / FONTANE		1652	1652			2020	ЛП			
18088023	РАНОМІ RANOMI / RANOMI		1652	1652			2020	ЛП			
18088024	ЛАУДІН LAUDINE / LAUDINE		1652	1652			2020	Л			
* 18088016	Містерія Містерія / Misteria		1710	1710	1710		2020	П			
19088001	Шері Cherie / Cherie		2584	2584			2020	Л			
Сільськогосподарські: кормові Agricultural: Fodder											
Сорго суданське Sudan Grass	<i>Sorghum sudanense</i> (Piper.) Stapf (<i>Andropogon sorghum sudanensis</i> Piper; <i>Sorghum exiguum</i> auct., non Piper; <i>Andropogon sorghum</i> var. <i>sudanensis</i>)										
17227001	Мурашка Мурашка / Murashka	П	2260	2260			2020	СЛП	корм		
Пажитниця багаторічна <i>Lolium perenne</i> L. (<i>Lolium vulgare</i> Host; <i>Lolium brasilianum</i> Nees; <i>Lolium canadense</i> Bernh. (njn Michx.); <i>Lolium marschallii</i> Stev.)											
20222002	ЕЛЕНА ДС ELENA DS / ELENA DS	П	2669	2669			2020	ПЛ			
Горошок посівний (ярий) <i>Vicia sativa</i> L. (<i>Vicia amphicarpa</i> L.; <i>Vicia notata</i> Gilib.; <i>Vicia leucosperma</i> Moench; <i>Vicia segetalis</i> Thuill.; <i>Faba sativa</i> Bernh.; <i>Vicia communis</i> Rouy et Foucaud.)											
* 17177001	Володимир Володимир / Volodymyr	СЗ	1669	1669	1669		2020	Л	корм		вбіл
Люпин жовтий <i>Lupinus luteus</i> L. (<i>Lupinus odoratus</i> Hort.)											
* 15402002	Золотий купол Золотий купол / Zoloty kupol	СЗ	1809	1809	1809		2020	П	корм		сбіл
Люпин вузьколистий <i>Lupinus angustifolius</i> L. (<i>Lupinus varius</i> Savi (non L.))											
18403001	Юліан Юліан / Yulian	СЗ	1809	1809			2020	П	корм		сбіл
Люцерна посівна <i>Medicago sativa</i> L. (<i>Medicago falcata</i> Lam. (non L.); <i>Medicago coerulea</i> Less.)											
16196001	Родена Родена / Rodena	С	1669	1669			2020	С	корм		сбіл
17196001	Адорна Adorna / Adorna	СЗ	1694	2537			2020	СЛ	корм		сбіл
* 15196002	Кураж Kurazh / Kurazh	С	1990	1990	1990		2020	С	корм		сбіл
Кострице-райграсовий гібрид × <i>Festulolium</i> Aschers. et Graebn. <i>Festulolium</i> hybrid											
20240002	ПАНІЯ ДС PUNIA DS / PUNIA DS	F1	2669	2669			2020	ПЛ			
Тритикале (дворучка) <i>Triticosecale</i> Witt. (<i>Triticosecale</i> Wittm. ex A. Camus)											
18622001	Олександра Олександра / Oleksandra	СЗ	1581	1581			2020	ЛП	зерн		сбіл

Заявка № Application №	Назва сорту Variety denomination	Метод створення Method of propagating	Заявник (и) Applicant	Власник Owner	Володієць патенту Patent holder	Підтримувач Maintainer	Рік реєстрації Registration year	Рекомендована зона для вирощування Recommended zones for growing	Напрямок використання Purpose	Група стиглості Group of ripeness	Якість Quality
Сільськогосподарські: овочеві Agricultural: Vegetable											
Баклажан Solanum melongena L. Egg Plant (Solanum longum L.; Melongena teres Mill; Solanum undatum Lam.; Solanum esculentum Dun.)											
17093001	Віронік Віронік / Vironik	C3	1781	1781	1781		2020	СЛПЗГр	пер, конс		
19093003	СВ1574ЕВ SV1574EV / SV1574EV	F1	1852	1852			2020	ЗГр	свж		
20093003	Джокер Jocker / Jocker	F1	2226	2226			2020	ЗГр	свж, конс		
19093004	Мінерва Minerva / Minerva	F1	2659	2659			2020	ЗГр	свж, пер		
Буряк столовий Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. conditiva Alef. Beetroot, Garden Beet (Beta vulgaris L. ssp. europea Krass. var. atro rubra Krass.)											
18122002	Бреско Bresko / Bresko	F1	751	751			2020	СЛП	овоч, свж		
Гарбуз звичайний Cucurbita pepo L. Pumpkin (Cucurbita melopepo; Cucurbita verrucosa; Cucurbita ovifera L.; Cucurbita pyxidaridis DC.; Cucurbita subverrucosa Willd.; Cucurbita aurantia Willd.; Cucurbita maxima g courgero Ser.; Cucurbita venosa Descourt.; Cucurbita mammeata Molina.; Cucurbita ceratoceares Haberle; Cucurbita tuberculosa; Cucurbita asteroides; Cucurbita cucumifera; Cucurbita elongate Schrad.; Cucumis zapallo; Cucurbita pileiformis Roem; Cucurbita arsupiformis Haberle; Citrullus variegatus Schrad.; Cucurbita succado Naud.; Cucurbita hybrida Bertol.)											
17150002	ГЛ Класік GL Classic / GL Classic	П	2524	2524			2020	СЛП	овоч		
Диня звичайна Cucumis melo L. Melon (Melo adana Pang.; Cucumis melo convar. Adana (Pang.) Greb.)											
19147001	Дейра Deyra / Deyra	F1	840	840			2020	СЛП	свж		
19147014	Лукстар Lookstar / Lookstar	F1	840	840			2020	СЛПЗГр	свж		
19147020	Ареналес Arenales / Arenales	F1	840	840			2020	СЛПЗГр	свж		
18147004	МАКАБЕО MACABEO / MACABEO	F1	1050	1050			2020	СЛ	свж		
18147005	МАІЛЛОТ MAILLOT / MAILLOT	F1	1050	1050			2020	СЛ	свж		
18147007	МІМОЗА MIMOZA / MIMOZA	F1	1050	1050			2020	СЛ	свж		
Кавун звичайний Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai Watermelon (Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai ssp. Vulgaris Fursa var. vulgaris; Citrullus vulgaris Schrad.; Cucurbita citrullus L.; Momordica lanata Thunb.; Cucumis sativus Battich; Citrullus pasteca Sageret; Citrullus lanatus (Thunb.) Mansf.)											
18146007	ГЕРКУЛЕС HERCULES / HERCULES	F1	1050	1050			2020	СЛ	свж		
18146012	Бретона Bretona / Bretona	F1	1730	1730			2020	СЛП	свж		
18146011	Лузітана Lusitana / Lusitana	F1	1730	1730			2020	СЛП	свж		
Капуста білогорова Brassica oleracea L. var. alba DC. White Cabbage (Brassica oleracea L. var. capitata L.; Brassica capitata DC.; Brassica oleracea ssp. capitata laevis Metzg.)											
18096016	Ботран Botran / Botran	F1	751	751			2020	СЛП	свж		
18096017	Раніні Ranini / Ranini	F1	751	751			2020	СЛП	свж		
18096015	Таліс Thalys / Thalys	F1	751	751			2020	СЛП	свж		
18096009	КІЛАСРЕСС KILASRETT / KILASRETT	F1	1050	1050			2020	СЛ	свж		
18096010	ДЕРБЕНТ DERBENT / DERBENT	F1	1050	1050			2020	СЛ	свж		
18096011	КВАЛІТАТОР QUALITATOR / QUALITATOR	F1	1050	1050			2020	СЛ	свж		
18096005	Аструс Плюс Astrus Plus / Astrus Plus	F1	1852	1852			2020	СЛП	свж		
18096003	Оксілус Oxylus / Oxylus	F1	1852	1852			2020	СЛП	свж		
18096008	ЛАУДА LAUDA / LAUDA	F1	1959	1959			2020	С	свж		
18096012	РОСБЕРГ ROSBERG / ROSBERG	F1	1959	1959			2020	СЛ	свж		

Заявка № Application №	Назва сорту Variety denomination	Метод створення Method of propagating	Заявник (и) Applicant	Власник Owner	Володієць патенту Patent holder	Підтримувач Maintainer	Рік реєстрації Registration year	Рекомендована зона для вирощування Recommended zones for growing	Напрямок використання Purpose	Група стиглості Group of ripeness	Якість Quality
18096013	KILACIC KILACEES / KILACEES	F1	1959	1959			2020	СЛ	свж		
18096001	Ірма Irma / Irma	F1	2200 2485	2200 2485			2020	СЛП	свж		
18096021	Дулсіма Dulcima / Dulcima	F1	1730	1730			2020	СЛП	свж		
18096019	Владіма Vladima / Vladima	F1	1730	1730			2020	СЛП	свж		
18096004	Тропікана Tropicana / Tropicana	F1	1852	1852			2020	СЛП	свж		
Капуста броколі <i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>botrytis</i> (L.) Alef. var. <i>cymosa</i> Duch. Calabrese, Sprouting Broccoli (<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>botrytis</i> (L.) Alef. var. <i>italica</i> Plenck; <i>Brassica cauliflora</i> (Mill.) Lizg. ssp. <i>simplex</i> Lizg.; <i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i> Helm; <i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i> subvar. <i>cultiflora</i> DC. et subvar. <i>cymosa</i> Lam.)											
19136002	СТІРЛІНГ STIRLING / STIRLING	F1	2020	2020			2020	СЛП	свж, пер		
19136001	Вавілон BABILON / BABILON	F1	2020	2020			2020	СЛП	свж, пер		
20136001	Самоа Samoa / Samoa	F1	2226	2226			2020	ЗГр	ун		
Капуста цвітна <i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>botrytis</i> (L.) Alef. var. <i>botrytis</i> L. Cauliflower (<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>botrytis</i> (L.) Alef. var. <i>italica</i> Plenck; <i>Brassica cauliflora</i> (Mill.) Lizg.; <i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>botrytis</i> L.; <i>Brassica oleracea</i> var. <i>italica</i> Plenck; <i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>botrytis</i> L.; <i>Brassica botrytis</i> Mill.; <i>Brassica cauliflora</i> Garsaul; <i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i> Helm; <i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i> subvar. <i>cultiflora</i> DC. et subvar. <i>cymosa</i> Lam.; <i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i> subvar. <i>asparagoides</i> f. <i>albida</i> et f. <i>violascens</i> Thell.; <i>Brassica asparagoides</i> Dalechampi)											
18101009	ГРІН СТОРМ GREEN STORM / GREEN STORM	F1	1050	1050			2020	СЛ	свж		
18101013	Арієнзо Arienzo / Arienzo	F1	1730	1730			2020	СЛП	свж		
18101002	Моментум Momentum / Momentum	F1	1852	1852			2020	СЛП	свж		
18101004	ФЛЕЙМ СТАР FLAME STAR / FLAME STAR	F1	1959	1959			2020	С	свж		
18101010	ТРАЙДЕНТ TRIDENT / TRIDENT	F1	2020	2020			2020	СЛП	свж, пер		
Кукурудза розлусна <i>Zea mays</i> L. ssp. <i>evarta</i> Sturt. Pop-corn											
18163001	ДН Карамель ДН Карамель / DN Karamel	F1	2260	2260			2020	СЛП	ун		
Кукурудза цукрова <i>Zea mays</i> L. ssp. <i>saccharata</i> Sturt. Sweet Corn											
17103004	Мессенджер Messenger / Messenger	F1	1852	1852			2020	СЛП	ун		
18103009	КАМБЕРЛЕНД CUMBERLAND / CUMBERLAND	F1	2087	2662			2020	СЛП	ун		
18103010	ДН Шугарін ДН Шугарін / DN Shuharin	F1	2260	2260			2020	СЛП	ун		
® 19103002	Роттердам Роттердам / Rotterdam	F1	2424	2424	2424		2020	СЛП	ун		
® 19103003	НБМ 2020 НБМ 2020 / NBM 2020	F1	2424	2424	2424		2020	СЛП	ун		
® 19103004	Білий Кролик White Rabbit / White Rabbit	F1	2424	2424	2424		2020	СЛП	ун		
19103001	ДМС Шафран ДМС Шафран / DMS Shafran	F1	2558	2558			2020	СЛП	ун		
Морква <i>Daucus carota</i> L. Carrot (<i>Daucus carota</i> L. ssp. <i>sativus</i> (Hoffm.) Schubl. et G. Martens; <i>Daucus sativus</i> (Hoffm.) Roehl.; <i>Daucus carota</i> L. (pro parte); <i>Daucus carota</i> L. var. <i>sativus</i> Hoffm.; <i>Daucus carota</i> L. ssp.)											
18109002	Каспі Caspi / Caspi	F1	751	751			2020	СЛП	свж		
18109004	Небіда Nebida / Nebida	F1	751	751			2020	СЛП	свж		
17109006	Карлано Carlano / Carlano	F1	1852	1852			2020	СЛП	свж		
17109005	Руфіна Rufina / Rufina	F1	2200 2201	2200 2201			2020	СЛП	овоч, свж, конс		

Заявка № Application №	Назва сорту Variety denomination	Метод створення Method of propagating	Заявник (и) Applicant	Власник Owner	Володієць патенту Patent holder	Підтримувач Maintainer	Рік реєстрації Registration year	Рекомендована зона для вирощування Recommended zones for growing	Напрямок використання Purpose	Група стиглості Group of ripeness	Якість Quality
Огірок посівний <i>Cucumis sativus</i> L. Cucumber (<i>Cucumis sativus</i> chlar Forsk.; <i>Cucumis esculentus</i> Salisb.)											
© 15110011	Сармат Sarmat / Sarmat	F1	1708	1708	1708		2020	ЛП	свж		
18110014	Бридж Bridge / Bridge	F1	1730	1730			2020	СЛП	свж		
18110002	Джокер Dzhoker / Dzhoker	F1	2485 2200	2485 2200			2020	СЛП	свж, конс		
18110003	Джуніор Dzhunior / Dzhunior	F1	2485 2200	2485 2200			2020	СЛП	свж, конс		
Перець однорічний (солодкий) <i>Capsicum annuum</i> L. Sweet Pepper, Paprika (<i>Capsicum indicum</i> Rumph.; <i>Capsicum frutescens</i> L.; <i>Capsicum grossum</i> ; <i>Capsicum baccatum</i> L.; <i>Capsicum corsicum</i> ; <i>Capsicum tetragonum</i> ; <i>Capsicum cerasiforme</i> ; <i>Capsicum olivaeformae</i> ; <i>Capsicum peramidale</i> ; <i>Capsicum conoides</i> ; <i>Capsicum minimum</i> Mill.; <i>Capsicum bicolor</i> Jacq.; <i>Capsicum longum</i> DC.; <i>Capsicum cordiforme</i> Mill.; <i>Capsicum mexicanum</i> Haz.)											
© 16113001	Любаша Liubasha / Liubasha	C3	1781	1781	1781		2020	СЛПЗГр	свж, конс, пер		
19113007	Дациана Daciana / Daciana	F1	2659	2659			2020	ЗГр	свж		
19113008	Напока Napoca / Napoca	F1	2659	2659			2020	ЗГр	свж		
Помідор їстівний <i>Solanum lycopersicum</i> L. Tomato (<i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karst. ex Farwell; <i>Lycopersicon esculentum</i> P. Mill. nom. cons. var. <i>esculentum</i> ; <i>Lycopersicon esculentum</i> P. Mill. nom. cons. var. <i>cerasiforme</i> (Dun.) A. Gray; <i>Lycopersicon esculentum</i> P. Mill.; <i>Lycopersicon pomumamori</i> Moench; <i>Solanum lirioides</i> Salisb.; <i>Solanum foliosum</i> Link; <i>Lycopersicon esculentum</i> Alef.; <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karst.; <i>Lycopersicon lycopersicum</i> Britt. et Brown; <i>Lycopersicon esculentum</i> Mill. ssp. <i>esculentum</i> Prokh.)											
© 16115004	Танок Tanok / Tanok	C3	1781	1781	1781		2020	СЛ	овоч		
© 16115005	Севен Seven / Seven	C3	1781	1781	1781		2020	СЛ	ун		
© 16115002	Янтарний богатыр Янтарний богатыр / Yantarnyi bohatyr	C3	1781	1781	1781		2020	СЛ	ун		
19115028	АНТЕЛАІСІ ANTELAISI / ANTELAISI	F1	1852	1852			2020	ЗГр	свж		
19115033	МАКАН MACAN / MACAN	F1	2020	2020			2020	ЗГр	свж, пер		
19115005	Едімар Edimar / Edimar	F1	2529	1418			2020	СЛП	свж		
19115004	Фабер Faber / Faber	F1	2529	1418			2020	СЛП	свж, пер		
19115006	Гонг Gong / Gong	F1	2529	1418			2020	СЛП	свж, пер		
Салат посівний листковий <i>Lactuca sativa</i> L. var. <i>secalina</i> Lettuce (<i>Lactuca esculenta</i> Salisb.; <i>Lactuca scariola</i> var. <i>sativa</i> C. B. Clarke; <i>Lactuca scariola</i> b <i>sativa</i> Boiss.; <i>Lactuca sativa</i> L. var. <i>secalina</i> Alef.; <i>Lactuca sativa</i> L. var. <i>acephala</i> ; <i>Lactuca sativa</i> L. var. <i>capitata</i> L.; <i>Lactuca sativa</i> L. var. <i>romana</i> Lam.; <i>Lactuca sativa</i> L. var. <i>integrifolia</i> Bish.; <i>Lactuca sativa</i> L. var. <i>hortensis</i>)											
19120007	Бартімер Bartimer / Bartimer	C3	753	753			2020	ЛПЗГр	свж		
© 19120009	Лель Lel / Lel	C3	1708	1708	1708		2020	ЛП	свж		
© 19120010	Вишиванка Vyshyvanka / Vyshyvanka	C3	1708	1708	1708		2020	ЛП	свж		
19120019	Култхард Coulthard / Coulthard	C	1730	1730			2020	СЛП	свж		
Цибуля городня <i>Allium cepa</i> L. Onion, Echalion (<i>Allium cepa</i> L. var. <i>aggregatum</i> G. Don; <i>Allium cepa</i> L. var. <i>cepa</i> Helm; <i>Allium cepa</i> L. var. <i>viviparum</i> (Metzg.) Alef.; <i>Allium esculentum</i> Salisb.; <i>Cepa vulgaris</i> Renault; <i>Cepa esculenta</i> Rafin; <i>Porrum cepa</i> (L.) Rchb.)											
19106004	Іроко Iroko / Iroko	F1	840	840			2020	СЛП	свж		
19106003	Мінді Mindi / Mindi	F1	840	840			2020	СЛП	свж		
19106005	Ногал Nogal / Nogal	F1	840	840			2020	СЛП	свж		
17106010	Такмарк Takmark / Takmark	F1	861	861			2020	СЛП	свж		
17106012	СВ4058ННУ SV4058NU / SV4058NU	F1	1852	1852			2020	СЛП	свж		

Заявка № Application №	Назва сорту Variety denomination	Метод створення Method of propagating	Заявник (и) Applicant	Власник Owner	Володілець патенту Patent holder	Підтримувач Maintainer	Рік реєстрації Registration year	Рекомендована зона для вирощування Recommended zones for growing	Напрямок використання Purpose	Група стиглості Group of ripeness	Якість Quality
18106009	Сакраменто <i>Sacramento / Sacramento</i>	F1	1852	1852			2020	СЛП			
18106013	Венус <i>Venus / Venus</i>	F1	2529	1418			2020	СЛП	свж		
18106014	Фабула <i>Fabula / Fabula</i>	F1	2529	1418			2020	СЛП	свж		
18106010	Міннесота <i>Minnesota / Minnesota</i>	F1	1852	1852			2020	СЛП	свж		
18106011	Ред Флойд <i>Red Floyd / Red Floyd</i>	F1	1852	1852			2020	СЛП	свж		
18106017	Надійна <i>Nadiina / Nadiina</i>	C	1990	1990			2020	СЛП	свж, пер		
18106008	Ялтинська <i>Yaltynska / Yaltynska</i>	F1	2200 2485	2200 2485			2020	СЛП			
18106001	Кореон 1 <i>Coreon 1 / Coreon 1</i>	F1	2455	2455			2020	СЛП	свж		
Цибуля слизун <i>Allium nutans</i> L. Dwarf Alp											
® 19444001	Удай <i>Uдай / Uдай</i>	П	1708	1708	1708		2020	ЛП	овоч		
Цибуля запашна <i>Allium odorum</i> L. Sweet-scented onion											
® 19167001	Вишукана <i>Vyshukana / Vyshukana</i>	C	1708	1708	1708		2020	ЛП	овоч		
Салат посівний стебловий <i>Lactuca sativa</i> L. var. <i>angustana</i> Chinese Lettuce (<i>Lactuca esculenta</i> Salisb.; <i>Lactuca scariola</i> var. <i>sativa</i> C. B. Clarke; <i>Lactuca scariola</i> b <i>sativa</i> Boiss.; <i>Lactuca sativa</i> L. var. <i>secalina</i> Alef.; <i>Lactuca sativa</i> L. var. <i>acephala</i> ; <i>Lactuca sativa</i> L. var. <i>capitata</i> L.; <i>Lactuca sativa</i> L. var. <i>romana</i> Lam.; <i>Lactuca sativa</i> L. var. <i>integrifolia</i> Bish.; <i>Lactuca sativa</i> L. var. <i>hortensis</i>)											
® 19518001	Лелека <i>Leleka / Leleka</i>	C3	1708	1708	1708		2020	ЛП	овоч		
Дворядник тонколистий <i>Diplotaxis tenuifolia</i> (L.) DC. Rocket (Wild Rocket)											
® 19582001	Молодість <i>Молодість / Molodist</i>	П	1708	1708	1708		2020	ЛП	овоч		
Салат посівний ромен <i>Lactuca sativa</i> L. var. <i>longifolia</i> Roman Lettuce, Cos Lettuce (<i>Lactuca esculenta</i> Salisb.; <i>Lactuca scariola</i> var. <i>sativa</i> C. B. Clarke; <i>Lactuca scariola</i> b <i>sativa</i> Boiss.; <i>Lactuca sativa</i> L. var. <i>secalina</i> Alef.; <i>Lactuca sativa</i> L. var. <i>acephala</i> ; <i>Lactuca sativa</i> L. var. <i>capitata</i> L.; <i>Lactuca sativa</i> L. var. <i>romana</i> Lam.; <i>Lactuca sativa</i> L. var. <i>integrifolia</i> Bish.; <i>Lactuca sativa</i> L. var. <i>hortensis</i>)											
19546003	Лотус <i>Lotus / Lotus</i>	C	1730	1730			2020	ЗГр	свж		
Бугиля кербель <i>Anthriscus cerefolium</i> (L.) Hoffm. Chervil, Garden Chervil											
® 19549001	Жайворонок <i>Жайворонок / Zhaivoronok</i>	П	1708	1708	1708		2020	ЛП	овоч		
Сільськогосподарські: інші <i>Agricultural: Others</i> Гісоп лікарський <i>Hyssopus officinalis</i> L. Hyssop (<i>Hyssopus ruber</i> Mill.; <i>Hyssopus altissimus</i> Mill.; <i>Hyssopus angustifolius</i> M. B.; <i>Hyssopus alopecuroides</i> Fisch.)											
® 19450001	Небокрай <i>Небокрай / Nebokrai</i>	П	1708	1708	1708		2020	ЛП	овоч		
Плодові та ягідні <i>Fruit and Berry</i> Яблуна домашня <i>Malus domestica</i> Borkh. Apple (<i>Purus malus</i> L.; <i>Malus communis</i> Lam.)											
® 18263006	Мілана <i>Мілана / Milana</i>		348	348	348		2020	СЛП	ун	сс	
18263003	Дміана <i>Дміана / Dmiana</i>		1601	1601			2020	СЛП	ун	зим	
Обліпиха крушиновидна <i>Hippophae rhamnoides</i> L. Common Sea Buckthorn (<i>Hippophae littoralis</i> Salisb.; <i>Hippophae rhamnoides</i> var. <i>sibirica</i> Rgl.; <i>Hippophae rhamnoides</i> var. <i>angustifolia</i> Dipp.; <i>Hippophae rhamnoides</i> St.-Lag.)											
18299008	Обрій <i>Обрій / Obrii</i>		1601	1601			2020	СЛП	зпл		
Горіх грецький <i>Juglans regia</i> L. Walnut (<i>Juglans fallax</i> Dode; <i>Juglans japonica</i> Sieb.; <i>Juglans duclouxiana</i> Dode; <i>Juglans orientalis</i> Dode; <i>Juglans sinensis</i> Dode; <i>Juglans sibirica</i> Dode; <i>Juglans kamaonia</i>)											
® 19284005	Подільський <i>Подільський / Podilskyi</i>		2623 2466	2623 2466	2623 2466		2020	СЛП	ун	сс	
® 19284003	Подільський Бокоплідний <i>Подільський Бокоплідний / Podilskyi Bokoplidnyi</i>		2623 2466	2623 2466	2623 2466		2020	СЛП	ун	рсдн	

Заявка № Application №	Назва сорту Variety denomination	Метод створення Method of propagating	Заявник (и) Applicant	Власник Owner	Володілець патенту Patent holder	Підтримувач Maintainer	Рік реєстрації Registration year	Рекомендована зона для вирощування Recommended zones for growing	Напрямок використання Purpose	Група стиглості Group of ripeness	Якість Quality
® 19284004	Стрижавський Паперовий Стрижавський Паперовий / Stryzhavskiy Paperoviy		2623 2466	2623 2466	2623 2466		2020	СЛП	ун	рсдн	
Аронія чорноплідна Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott. Black Chockberry											
® 19624001	Всеслава Всеслава / Vseslava		2466	2466	2466		2020	СЛП	ун	рс	
Декоративні та лікарські Ornamental and Healing Півонія Paeonia L. Реоуу											
16329002	Загадка Херсонеса Загадка Херсонеса / Zahadka Khersonesa		348	348			2020	ЛП	озл, зріз		
16329003	Корсар Корсар / Korsar		348	348			2020	ЛП	озл, зріз		
Троянда Rosa L. Rose											
17339008	KORcut0159 KORcut0159 / KORcut0159		2303	2303			2020	ЗГр	зріз		
Інші Other Павловнія Paulownia Sieb. et Zucc.											
® 20649001	Фенікс Фенікс / Feniks		736	736	736		2020	СЛП	Е, дкр		
® 20649002	ЗЕ ПРО ZE PRO / ZE PRO		2692	2692	2692		2020	СЛП	Е, озл, тхн		
® 20649003	ТУРБО ПРО TURBO PRO / TURBO PRO		2692	2692	2692		2020	СЛП	Е, озл, тхн		

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ: ЗЛАКИ

Жито посівне (озиме)
Жито посівне (озиме) – батьківський компонент
Кукурудза восковидна
Кукурудза звичайна
Кукурудза звичайна – батьківський компонент
Овес голозерний
Овес посівний (ярий)
Пшениця м'яка (озима)
Пшениця м'яка (яра)
Пшениця спельта (озима)
Пшениця тверда (озима)
Пшениця тверда (яра)
Тритикале (озиме)
Тритикале (яре)
Ячмінь звичайний (озимий)
Ячмінь звичайний (озимий) – батьківський компонент
Ячмінь звичайний (ярий)



Вид: Жито посівне (озиме) *Secale cereale* L.

Заявка № 18015007 Назва сорту: Алатир Заявник (код): 2291 Власник сорту (код): 2291

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 21.10.2020 Патент № 200637

Дата пріоритету: 08.02.2018

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.10.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200808

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: плоїдність	диплоїд	2	
2	Зернівка: забарвлення алеїронового шару	темне	2	
3	Колеоптіль: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
4	Колеоптіль: за довжиною	довгий	7	
5	Прапорцевий листок: піхва за довжиною	коротка	3	
6	Прапорцевий листок: пластинка за довжиною	коротка	3	
7	Рослина: габітус	напівпрямий	3	
8	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	дуже сильний	9	
9	Час початку колосіння	середній	5	
10	Підпрапорцевий листок: пластинка за довжиною	коротка	3	
11	Підпрапорцевий листок: пластинка за шириною	дуже вузька	1	
12	Колос: сизий наліт	слабкий	3	
13	Соломина: опушення під колосом	дуже сильне	9	
14	Рослина: за висотою (разом з колосом і остюками)	низька	3	
15	Соломина: відстань між верхнім вузлом та колосом	коротка	3	
16	Колос: за довжиною (без остюків)	короткий	3	
17	Колос: за щільністю	нещільний	3	
18	Колос: положення в просторі	напівпохиле	7	
19	Зернівки: маса 1000 шт.	середня	5	
20	Зернівка: за довжиною	довга	7	
21	Зернівка: забарвлення у фенолі	ознака не визначалась	0	
22	Тип розвитку	озимий	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		6,5	5,81
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га		6,33	5,88
+, - до усередненої урожайності, т/га		-0,17	0,07
+, - до усередненої урожайності, %		-2,6	1,2
Довірчий інтервал, т/га		0,25	0,15
Тривалість періоду вегетації, діб		270	281
Висота рослини, см		119	133,7
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г		41,1	38,4
Череззерниця, %		4,5	8
Вміст білка, %		10,2	10,1
Число падіння, с		195,9	191,6
Стійкість до вилягання, бал		6	4
Стійкість до обсіпання, бал		7	8
Стійкість до посухи, бал		9	7
Зимостійкість: польова оцінка, бал		9	8
Стійкість проти борошнистої роси, бал		8	4
Стійкість проти бурі іржі, бал		7	8
Стійкість проти внутрішньостеблових шкідників, бал		9	9
Стійкість проти снігової плісняви, бал		9	8
Напрямок використання		зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: П.

Вид: Жито посівне (озиме) *Secale cereale* L.

Заявка № 18015010 Назва сорту: Амей **Заявник (код):** 1990 **Власник сорту (код):** 1990

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 09.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200968

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: плідність	диплоїд	2	
2	Зернівка: забарвлення алейронового шару	темне	2	
3	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
4	Колеоптиль: за довжиною	довгий	7	
5	Прапорцевий листок: піхва за довжиною	коротка	3	
6	Прапорцевий листок: пластинка за довжиною	коротка	3	
7	Рослина: габітус	напіврозлогий	5	
8	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
9	Час початку колосіння	середній	5	
10	Підпрапорцевий листок: пластинка за довжиною	коротка	3	
11	Підпрапорцевий листок: пластинка за шириною	дуже вузька	1	
12	Колос: сизий наліт	слабкий	3	
13	Соломина: опушення під колосом	дуже сильне	9	
14	Рослина: за висотою (разом з колосом і остюками)	низька	3	
15	Соломина: відстань між верхнім вузлом та колосом	середня	5	
16	Колос: за довжиною (без остюків)	короткий	3	
17	Колос: за щільністю	дуже нещільний	1	
18	Колос: положення в просторі	напівпряме	3	
19	Зернівки: маса 1000 шт.	велика	7	
20	Зернівка: за довжиною	довга	7	
21	Зернівка: забарвлення у фенолі	ознака не визначалась	0	
22	Тип розвитку	озимий	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		5,96	5,21
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га		5,7	5,21
+, - до усередненої урожайності, т/га		-0,26	0
+, - до усередненої урожайності, %		-4,4	-0,1
Довірчий інтервал, т/га		1,54	0,69
Тривалість періоду вегетації, діб		270	282
Висота рослини, см		116,7	127,8
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г		40,9	36,2
Череззерниця, %		4	10
Вміст білка, %		10,5	10
Число падіння, с		152,1	150,4
Стійкість до вилягання, бал		4	2
Стійкість до обсіпання, бал		7	8
Стійкість до посухи, бал		8	7
Зимостійкість: польова оцінка, бал		7	8
Стійкість проти борошнистої роси, бал		8	6
Стійкість проти бурі іржі, бал		6	8
Стійкість проти внутрішньостеблових шкідників, бал		9	9
Стійкість проти снігової плісняви, бал		9	8
Напрямок використання		зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Жито посівне (озиме) *Secale cereale* L.

Заявка № 18015009 Назва сорту: Верша Заявник (код): 1990 Власник сорту (код): 1990

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 09.12.2020

Свідцтво про державну реєстрацію № 200967

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: плідність	диплоїд	2	
2	Зернівка: забарвлення алейронового шару	темне	2	
3	Колеоптіль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
4	Колеоптіль: за довжиною	довгий	7	
5	Прапорцевий листок: піхва за довжиною	коротка	3	
6	Прапорцевий листок: пластинка за довжиною	коротка	3	
7	Рослина: габітус	напіврозлогий	5	
8	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
9	Час початку колосіння	середній	5	
10	Підпрапорцевий листок: пластинка за довжиною	коротка	3	
11	Підпрапорцевий листок: пластинка за шириною	дуже вузька	1	
12	Колос: сизий наліт	помірний	5	
13	Соломина: опушення під колосом	дуже сильне	9	
14	Рослина: за висотою (разом з колосом і остюками)	низька	3	
15	Соломина: відстань між верхнім вузлом та колосом	середня	5	
16	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	5	
17	Колос: за щільністю	нешільний	3	
18	Колос: положення в просторі	напівпохиле	7	
19	Зернівки: маса 1000 шт.	велика	7	
20	Зернівка: за довжиною	довга	7	
21	Зернівка: забарвлення у фенолі	ознака не визначалась	0	
22	Тип розвитку	озимий	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		5,96	5,21
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га		5,82	5,21
+, - до усередненої урожайності, т/га		-0,14	0
+, - до усередненої урожайності, %		-2,4	0
Довірчий інтервал, т/га		1,54	0,69
Тривалість періоду вегетації, діб		270	281
Висота рослини, см		119	133,6
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г		41,3	37,3
Череззерниця, %		4,8	8,1
Вміст білка, %		10,5	10,2
Число падіння, с		190,6	168
Стійкість до вилягання, бал		6	4
Стійкість до обсіпання, бал		7	8
Стійкість до посухи, бал		8	7
Зимостійкість: польова оцінка, бал		8	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал		8	6
Стійкість проти бурі іржі, бал		6	7
Стійкість проти внутрішньостеблових шкідників, бал		9	9
Стійкість проти снігової плісняви, бал		9	8
Напрямок використання		зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Жито посівне (озиме) *Secale cereale* L.

Заявка № 18015013 Назва сорту: Еліас **Заявник (код):** 2524 **Власник сорту (код):** 2524

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 20.11.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200867

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: плідність	диплоїд	2	
2	Зернівка: забарвлення алейронового шару	світле	1	
3	Колеоптіль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
4	Колеоптіль: за довжиною	середній	5	
5	Прапорцевий листок: піхва за довжиною	коротка	3	
6	Прапорцевий листок: пластинка за довжиною	дуже коротка	1	
7	Рослина: габітус	напівпрямий	3	
8	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
9	Час початку колосіння	середній	5	
10	Підпрапорцевий листок: пластинка за довжиною	коротка	3	
11	Підпрапорцевий листок: пластинка за шириною	дуже вузька	1	
12	Колос: сизий наліт	помірний	5	
13	Соломина: опушення під колосом	слабке	3	
14	Рослина: за висотою (разом з колосом і остюками)	середня	5	
15	Соломина: відстань між верхнім вузлом та колосом	середня	5	
16	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	5	
17	Колос: за щільністю	нещільний	3	
18	Колос: положення в просторі	напівпохиле	7	
19	Зернівки: маса 1000 шт.	велика	7	
20	Зернівка: за довжиною	довга	7	
21	Зернівка: забарвлення у фенолі	ознака не визначалась	0	
22	Тип розвитку	озимий	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		5,96	5,21
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га		5,72	5,15
+, - до усередненої урожайності, т/га		-0,24	-0,06
+, - до усередненої урожайності, %		-4,1	-1,2
Довірчий інтервал, т/га		1,54	0,69
Тривалість періоду вегетації, діб		270	281
Висота рослини, см		131,1	143,9
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г		34	31,5
Череззерниця, %		3,5	9,6
Вміст білка, %		10,4	10,1
Число падіння, с		261,9	239,4
Стійкість до вилягання, бал		4	5
Стійкість до обсіпання, бал		9	8
Стійкість до посухи, бал		7	7
Зимостійкість: польова оцінка, бал		9	8
Стійкість проти борошнистої роси, бал		7	7
Стійкість проти бурі іржі, бал		6	7
Стійкість проти внутрішньостеблових шкідників, бал		9	9
Стійкість проти снігової плісняви, бал		9	8
Напрямок використання		зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Жито посівне (озиме) *Secale cereale* L.**Заявка № 18015006 Назва сорту:** КВС Пропауер **Заявник (код):** 824 **Власник сорту (код):** 824**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 25.11.2020 **Патент №** 200745**Дата пріоритету:** 09.01.2018**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 20.10.2020**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 200809**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: плідність	диплоїд	2	
2	Зернівка: забарвлення алеїронового шару	світле	1	
3	Колеоптіль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
4	Колеоптіль: за довжиною	середній	5	
5	Прапорцевий листок: піхва за довжиною	коротка	3	
6	Прапорцевий листок: пластинка за довжиною	дуже коротка	1	
7	Рослина: габітус	напівпрямий	3	
8	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	дуже сильний	9	
9	Час початку колосіння	середній	5	
10	Підпрапорцевий листок: пластинка за довжиною	коротка	3	
11	Підпрапорцевий листок: пластинка за шириною	дуже вузька	1	
12	Колос: сизий наліт	сильний	7	
13	Соломина: опушення під колосом	сильне	7	
14	Рослина: за висотою (разом з колосом і остюками)	висока	7	
15	Соломина: відстань між верхнім вузлом та колосом	середня	5	
16	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	5	
17	Колос: за щільністю	нещільний	3	
18	Колос: положення в просторі	напівпохиле	7	
19	Зернівки: маса 1000 шт.	велика	7	
20	Зернівка: за довжиною	довга	7	
21	Зернівка: забарвлення у фенолі	ознака не визначалась	0	
22	Тип розвитку	озимий	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		6,5	5,81
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га		7,62	7,14
+, - до усередненої урожайності, т/га		1,12	1,33
+, - до усередненої урожайності, %		17,2	22,9
Довірчий інтервал, т/га		0,25	0,15
Тривалість періоду вегетації, діб		270	281
Висота рослини, см		128,6	131,9
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г		33,7	30,4
Череззерниця, %		3,5	4,3
Вміст білка, %		9,2	9,3
Число падіння, с		252,5	279,9
Стійкість до вилягання, бал		3	5
Стійкість до обсіпання, бал		9	8
Стійкість до посухи, бал		9	7
Зимостійкість: польова оцінка, бал		9	8
Стійкість проти борошнистої роси, бал		8	8
Стійкість проти бурі іржі, бал		7	7
Стійкість проти внутрішньостеблових шкідників, бал		9	9
Стійкість проти снігової плісняви, бал		9	8
Напрямок використання		зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Жито посівне (озиме) *Secale cereale* L.

Заявка № 18015008 Назва сорту: Ласкаве **Заявник (код):** 2291 736 **Власник сорту (код):** 2291 736

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 20.11.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200866

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: плідність	диплоїд	2	
2	Зернівка: забарвлення алейронового шару	темне	2	
3	Колеоптіль: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
4	Колеоптіль: за довжиною	довгий	7	
5	Прапорцевий листок: піхва за довжиною	коротка	3	
6	Прапорцевий листок: пластинка за довжиною	коротка	3	
7	Рослина: габітус	напівпрямий	3	
8	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
9	Час початку колосіння	середній	5	
10	Підпрапорцевий листок: пластинка за довжиною	коротка	3	
11	Підпрапорцевий листок: пластинка за шириною	дуже вузька	1	
12	Колос: сизий наліт	помірний	5	
13	Соломина: опушення під колосом	дуже сильне	9	
14	Рослина: за висотою (разом з колосом і остюками)	середня	5	
15	Соломина: відстань між верхнім вузлом та колосом	середня	5	
16	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	5	
17	Колос: за щільністю	нещільний	3	
18	Колос: положення в просторі	напівпохиле	7	
19	Зернівки: маса 1000 шт.	дуже велика	9	
20	Зернівка: за довжиною	довга	7	
21	Зернівка: забарвлення у фенолі	ознака не визначалась	0	
22	Тип розвитку	озимий	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		5,96	5,21
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га		5,5	5,18
+, - до усередненої урожайності, т/га		-0,46	-0,03
+, - до усередненої урожайності, %		-7,7	-0,6
Довірчий інтервал, т/га		1,54	0,69
Тривалість періоду вегетації, діб		271	282
Висота рослини, см		131,7	139,1
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г		36,3	31,3
Череззерниця, %		5,8	9,5
Вміст білка, %		11,1	9,9
Число падіння, с		195,5	185,3
Стійкість до вилягання, бал		6	3
Стійкість до обсіпання, бал		7	8
Стійкість до посухи, бал		8	7
Зимостійкість: польова оцінка, бал		8	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал		8	4
Стійкість проти бурі іржі, бал		7	6
Стійкість проти внутрішньостеблових шкідників, бал		9	9
Стійкість проти снігової плісняви, бал		9	8
Напрямок використання		зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Жито посівне (озиме) *Secale cereale* L.

Заявка № 17015007 Назва сорту: Оріана Заявник (код): 2291 Власник сорту (код): 2291

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 21.10.2020 Патент № 200636

Дата пріоритету: 13.04.2017

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.10.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200807

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: плідність	диплоїд	2	
2	Зернівка: забарвлення алеїронового шару	темне	2	
3	Колеоптіль: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
4	Колеоптіль: за довжиною	середній	5	
5	Прапорцевий листок: піхва за довжиною	дуже коротка	1	
6	Прапорцевий листок: пластинка за довжиною	дуже коротка	1	
7	Рослина: габітус	напівпрямий	3	
8	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	дуже сильний	9	
9	Час початку колосіння	середній	5	
10	Підпрапорцевий листок: пластинка за довжиною	коротка	3	
11	Підпрапорцевий листок: пластинка за шириною	дуже вузька	1	
12	Колос: сизий наліт	дуже сильний	9	
13	Соломина: опушення під колосом	сильне	7	
14	Рослина: за висотою (разом з колосом і остюками)	низька	3	
15	Соломина: відстань між верхнім вузлом та колосом	коротка	3	
16	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	5	
17	Колос: за щільністю	середній	5	
18	Колос: положення в просторі	напівпохиле	7	
19	Зернівки: маса 1000 шт.	середня	5	
20	Зернівка: за довжиною	довга	7	
21	Зернівка: забарвлення у фенолі	ознака не визначалась	0	
22	Тип розвитку	озимий	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		6,5	5,81
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га		5,76	5,73
+, - до усередненої урожайності, т/га		-0,74	-0,08
+, - до усередненої урожайності, %		-11,4	-1,4
Довірчий інтервал, т/га		0,25	0,15
Тривалість періоду вегетації, діб		271	283
Висота рослини, см		116,8	130,1
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г		43,6	40,7
Череззерниця, %		6,4	11,1
Вміст білка, %		10,7	10
Число падіння, с		155,8	146,1
Стійкість до вилягання, бал		6	4
Стійкість до обсіпання, бал		7	8
Стійкість до посухи, бал		7	7
Зимостійкість: польова оцінка, бал		7	8
Стійкість проти борошнистої роси, бал		8	6
Стійкість проти бурі іржі, бал		6	7
Стійкість проти внутрішньостеблових шкідників, бал		9	8
Стійкість проти снігової плісняви, бал		9	8
Напрямок використання		зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: П.

Вид: Жито посівне (озиме) – батьківський компонент *Secale cereale* L.

Заявка № 18915006 Назва сорту: ЛСР 153 **Заявник (код):** 824 **Власник сорту (код):** 824

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 05.11.2020 **Патент № 200753**

Дата пріоритету: 09.01.2018

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 20.11.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200868

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: плоідність	диплоїд	2	
2	Зернівка: забарвлення алеїронового шару	темне	2	
3	Колеоптіль: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
4	Колеоптіль: за довжиною	середній	5	
5	Прапорцевий листок: піхва за довжиною	коротка	3	
6	Прапорцевий листок: пластинка за довжиною	коротка	3	
7	Рослина: габітус	напіврозлогий	5	
8	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	дуже сильний	9	
9	Час початку колосіння	середній	5	
10	Підпрапорцевий листок: пластинка за довжиною	дуже коротка	1	
11	Підпрапорцевий листок: пластинка за шириною	дуже вузька	1	
12	Колос: сизий наліт	помірний	5	
13	Соломина: опушення під колосом	сильне	7	
14	Рослина: за висотою (разом з колосом і остюками)	середня	5	
15	Соломина: відстань між верхнім вузлом та колосом	середня	5	
16	Колос: за довжиною (без остюків)	короткий	3	
17	Колос: за щільністю	нещільний	3	
18	Колос: положення в просторі	горизонтальне	5	
19	Зернівки: маса 1000 шт.	середня	5	
20	Зернівка: за довжиною	довга	7	
21	Зернівка: забарвлення у фенолі	ознака не визначалась	0	
22	Тип розвитку	озимий	1	

Вид: Жито посівне (озиме) – батьківський компонент *Secale cereale* L.

Заявка № 17915007 Назва сорту: МСГ 2135 **Заявник (код):** 2313 **Власник сорту (код):** 2313

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 26.10.2020 **Патент №** 200685

Дата пріоритету: 29.08.2017

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 03.11.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200810

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: плоїдність	диплоїд	2	
2	Зернівка: забарвлення алеїронового шару	світле	1	
3	Колеоптіль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
4	Колеоптіль: за довжиною	середній	5	
5	Прапорцевий листок: піхва за довжиною	дуже коротка	1	
6	Прапорцевий листок: пластинка за довжиною	дуже коротка	1	
7	Рослина: габітус	напівпрямий	3	
8	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	дуже сильний	9	
9	Час початку колосіння	середній	5	
10	Підпрапорцевий листок: пластинка за довжиною	коротка	3	
11	Підпрапорцевий листок: пластинка за шириною	дуже вузька	1	
12	Колос: сизий наліт	помірний	5	
13	Соломина: опушення під колосом	сильне	7	
14	Рослина: за висотою (разом з колосом і остюками)	середня	5	
15	Соломина: відстань між верхнім вузлом та колосом	середня	5	
16	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	5	
17	Колос: за щільністю	нещільний	3	
18	Колос: положення в просторі	пряме	1	
19	Зернівки: маса 1000 шт.	середня	5	
20	Зернівка: за довжиною	середня	5	
21	Зернівка: забарвлення у фенолі	ознака не визначалась	0	
22	Тип розвитку	озимий	1	

Вид: Жито посівне (озиме) – батьківський компонент *Secale cereale* L.

Заявка № 17915008 Назва сорту: РГ 1124 **Заявник (код):** 2313 **Власник сорту (код):** 2313

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 26.10.2020 **Патент № 200686**

Дата пріоритету: 29.08.2017

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 03.11.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200811

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: плоідність	диплоїд	2	
2	Зернівка: забарвлення алеїронового шару	світле	1	
3	Колеоптіль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слаба	1	
4	Колеоптіль: за довжиною	середній	5	
5	Прапорцевий листок: піхва за довжиною	дуже коротка	1	
6	Прапорцевий листок: пластинка за довжиною	дуже коротка	1	
7	Рослина: габітус	напівпрямий	3	
8	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	дуже сильний	9	
9	Час початку колосіння	середній	5	
10	Підпрапорцевий листок: пластинка за довжиною	коротка	3	
11	Підпрапорцевий листок: пластинка за шириною	дуже вузька	1	
12	Колос: сизий наліт	сильний	7	
13	Соломина: опушення під колосом	відсутнє або дуже слабке	1	
14	Рослина: за висотою (разом з колосом і остюками)	середня	5	
15	Соломина: відстань між верхнім вузлом та колосом	середня	5	
16	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	5	
17	Колос: за щільністю	нещільний	3	
18	Колос: положення в просторі	горизонтальне	5	
19	Зернівки: маса 1000 шт.	середня	5	
20	Зернівка: за довжиною	довга	7	
21	Зернівка: забарвлення у фенолі	ознака не визначалась	0	
22	Тип розвитку	озимий	1	

Вид: Кукурудза восковидна *Zea mays* var. *ceratina* L.

Заявка № 17009217 Назва сорту: Твістер **Заявник (код):** 1581 **Власник сорту (код):** 1581

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 17.09.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200886

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки в просторі	помірно похиле	5	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірно	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	помірно похиле	5	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	циліндрична	3	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	два	2	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого забарвлення	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожайність зерна (за стандартної вологості 14%), т/га – 6,4. ФАО – 300. Висота прикріплення першого нижнього розвиненого (з зерном) качана, см – 60. Вміст амілопектину, % – 66. Загальний вміст крохмалю, % – 69. Посухостійкість, бал (1–9) – 5. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): бактеріоз (*Bacillus zeae* Burr.) – 5, сажка летюча (*Sorosporium reilianum* Mc. Alp.) – 9, сажка пухирчаста (*Ustilago zeae* Beckm.) – 9, фузаріоз (*Fusarium moniliforme* Sheldon.) – 5. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): метелик кукурудзяний (*Pyrausta nubilalis* Hb) – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 17009087 Назва сорту: Адей Заявник (код): 966 Власник сорту (код): 966

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201024

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення півхи	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	до слабкої
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	помірне	5	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення півхи	відсутнє або дуже слабка	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запліваються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	4,96	7,44	7,31
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	4,9	9,1	7,27
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,06	1,66	-0,04
+, - до усередненої урожайності, %	-1,3	22,3	-0,5
Довірчий інтервал, т/га	0,16	0,15	0,19
Тривалість періоду вегетації, діб	105	109	106
Висота рослини, см	214	239,6	215,6
Вихід зерна, %	73,4	77,9	79,1
Висота прикріплення качана, см	66,7	83,6	78,9
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	25,1	18,2	7
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5,2	5,6	5
Вміст білка, %	8,3	8,7	9,4
Вміст крохмалю, %	73,3	73	72,2
Стійкість до посухи, бал	8	9	8
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	8
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	8	7
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	8	9	8
Група стиглості (FAO)	1	1	1
Напрямок використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 18009050 Назва сорту: АМА30Н Заявник (код): 924 Власник сорту (код): 924

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.12.2020

Свідство про державну реєстрацію № 201036

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	дуже сильне	9	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	помірне	5	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	S
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	S
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	ранній	3	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	сильне	7	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	до слабого
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	4,74	7,44	6,99
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	4,92	8,36	7,68
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,18	0,92	0,69
+, - до усередненої урожайності, %	3,8	12,4	9,8
Довірчий інтервал, т/га	0,17	0,15	0,18
Тривалість періоду вегетації, діб	103	108	109
Висота рослини, см	231,4	243,7	236,6
Вихід зерна, %	79,1	80,1	82,4
Висота прикріплення качана, см	76,5	84,6	87,5
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	47,8	25,4	1,1
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	6	4,7	5,6
Вміст білка, %	8,9	8,9	9,5
Вміст крохмалю, %	73,5	72,7	72,4
Стійкість до посухи, бал	6	8	8
Стійкість до вилягання, бал	8	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	8
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	4	7	7
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	8	9	7
Група стиглості (FAO)	1	1	1
Напрямок використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 18009043 Назва сорту: Б2114Ц Заявник (код): 9 Власник сорту (код): 9

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201033

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення півхи	слабке	3	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення півхи	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запліваються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,19	8,24	7,83
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5	8,53	8,87
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,19	0,29	1,04
+, - до усередненої урожайності, %	-3,7	3,5	13,3
Довірчий інтервал, т/га	0,1	0,09	0,17
Тривалість періоду вегетації, діб	110	122	123
Висота рослини, см	251	256,8	243,5
Вихід зерна, %	81,3	81,9	81
Висота прикріплення качана, см	98	95,2	97,4
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	48,2	40,4	19,5
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5,9	4,6	5,4
Вміст білка, %	8,4	8,3	10
Вміст крохмалю, %	73,7	73,8	71,7
Стійкість до посухи, бал	6	7	9
Стійкість до вилягання, бал	9	9	7
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	7	8	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	8	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	6	7	6
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	8	9	7
Група стиглості (FAO)	3	3	3
Напрямок використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 18009033 Назва сорту: Б3316С Заявник (код): 9 Власник сорту (код): 9

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.12.2020

Свідцтво про державну реєстрацію № 201026

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	до середнього
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	до слабого
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	до помірного
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	до сильного

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,19	8,24	7,83
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,35	9,46	7,28
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,16	1,22	-0,55
+, - до усередненої урожайності, %	3,1	14,8	-7
Довірчий інтервал, т/га	0,1	0,09	0,17
Тривалість періоду вегетації, діб	111	122	123
Висота рослини, см	250	259	240,9
Вихід зерна, %	82,9	81,6	80,8
Висота прикріплення качана, см	95,8	97	100,1
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	45,5	46,9	13,4
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5,5	5,3	4,4
Вміст білка, %	8,1	8,3	9,1
Вміст крохмалю, %	73,7	73,4	72,6
Стійкість до посухи, бал	6	9	8
Стійкість до вилягання, бал	8	9	8
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	8	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	7	4
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	8	9	7
Група стиглості (FAO)	3	3	3
Напрямок використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 19009056 Назва сорту: Б3545Д Заявник (код): 1690 1688

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 12.10.2020 Патент № 200643

Дата пріоритету: 08.02.2019

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	сильна	3	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	до середньої
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	до дуже довгої
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	велике	7	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	до довгого
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	до великого
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	до сильного

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 18009097 Назва сорту: БАГРОВО Заявник (код): 2649 Власник сорту (код): 2649

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.12.2020

Свідцтво про державну реєстрацію № 201057

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	4,94	7,82	7,21
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,24	8,88	8,21
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,3	1,06	1
+, - до усередненої урожайності, %	6,2	13,6	13,9
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,07
Тривалість періоду вегетації, діб	110	113	116
Висота рослини, см	243,7	251,6	247,1
Вихід зерна, %	82,9	82,2	82,6
Висота прикріплення качана, см	85,3	89	92,4
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	45,7	44,8	8,6
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	6,4	3,7	3,7
Вміст білка, %	8,3	8,5	10
Вміст крохмалю, %	73,8	73,1	71,5
Стійкість до посухи, бал	4	8	9
Стійкість до вилягання, бал	8	8	7
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	7	8	8
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	8	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	7	4
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	8	9	8
Група стиглості (ФАО)	2	2	2
Напрямок використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 18009077 Назва сорту: Балта Заявник (код): 2530 Власник сорту (код): 2530

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201782

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	до помірно похилої
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	до сильного
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно заплілюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	4,94	7,82	7,21
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,54	8,66	8,15
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,6	0,84	0,94
+, - до усередненої урожайності, %	12,2	10,8	13,1
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,07
Тривалість періоду вегетації, діб	113	112	114
Висота рослини, см	245,8	254,3	257
Вихід зерна, %	80,2	78,5	80,3
Висота прикріплення качана, см	92,4	95	105,8
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	42,5	32,2	10
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	7	5,3	4,6
Вміст білка, %	8,2	8,3	9,9
Вміст крохмалю, %	73,8	73,5	72,3
Стійкість до посухи, бал	5	8	8
Стійкість до вилягання, бал	9	9	7
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	8	6	4
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	8	9	7
Група стиглості (ФАО)	2	2	2
Напрямок використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 18009086 Назва сорту: БІГБІТ Заявник (код): 2649 Власник сорту (код): 2649

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.12.2020

Свідство про державну реєстрацію № 201049

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	сильне	7	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	до помірного
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	велике	7	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	4,94	7,82	7,21
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,9	8,38	8,31
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,96	0,56	1,1
+, - до усередненої урожайності, %	19,5	7,2	15,3
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,07
Тривалість періоду вегетації, діб	113	115	116
Висота рослини, см	259,8	266,1	265,4
Вихід зерна, %	80,3	79,1	81,1
Висота прикріплення качана, см	99,8	100,9	104
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	34,2	24,7	2,9
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	7,1	5,7	4,3
Вміст білка, %	8,9	8,4	10,3
Вміст крохмалю, %	72,5	72,8	70,7
Стійкість до посухи, бал	5	8	9
Стійкість до вилягання, бал	7	8	7
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	6	6	6
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	9	9	8
Група стиглості (FAO)	2	2	2
Напрямок використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.**Заявка №** 18009151 **Назва сорту:** Валат **Заявник (код):** 2524 2436 **Власник сорту (код):** 2524 2436**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 15.12.2020**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 201063**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	дуже ранній	1	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	до слабкого
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від дуже раннього до раннього	2	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабе	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабе	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	до середньої
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно заплілюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	до середньої
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	пром'їжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	оранжеве	5	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	4,94	7,82	7,21
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,53	8,76	8,04
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,59	0,94	0,83
+, - до усередненої урожайності, %	12	12	11,5
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,07
Тривалість періоду вегетації, діб	109	113	115
Висота рослини, см	256,5	265,9	252,5
Вихід зерна, %	79,8	77	81,1
Висота прикріплення качана, см	87,4	91,7	98,3
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	38,7	12,2	2,9
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5,1	5,1	4,6
Вміст білка, %	8,8	8,7	11,1
Вміст крохмалю, %	72,3	72,5	69,8
Стійкість до посухи, бал	5	8	9
Стійкість до вилягання, бал	8	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	4	6	6
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	9	8	8
Група стиглості (FAO)	2	2	2
Напрямок використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 19009014 Назва сорту: Вебер Заявник (код): 2260 921 Власник сорту (код): 2260 921

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 22.12.2020

Свідство про державну реєстрацію № 201780

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	пізній	7	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	до середнього
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	пізній	7	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	дуже великий	9	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,21	10,51	
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,4	7,48	
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,19	-3,03	
+, - до усередненої урожайності, %	22,9	-28,8	
Довірчий інтервал, т/га	0,17	0,64	
Тривалість періоду вегетації, діб	129	130	
Висота рослини, см	257,8	270	
Вихід зерна, %	81,5	79,8	
Висота прикріплення качана, см	101	97,1	
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	39,5	29,9	
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	7,6	5,1	
Вміст білка, %	8,5	8,9	
Вміст крохмалю, %	73,7	72,9	
Стійкість до посухи, бал	6	7	
Стійкість до вилягання, бал	9	9	
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	7	9	
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	8	7	
Стійкість проти гельмінтоспороозу, бал	9	9	
Група стиглості (ФАО)	4	4	
Напрямок використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 17009124 Назва сорту: Гебалот Заявник (код): 2524 Власник сорту (код): 2524

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201025

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	дуже сильне	9	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	до слабого
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	до сильного
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	ранній	3	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	до великої
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	до середньої кількості
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	до жовто-оранжевого
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	до оранжевого
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,14	7,75	7,52
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,84	9,46	6,76
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,7	1,71	-0,76
+, - до усередненої урожайності, %	13,6	22	-10,1
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,08
Тривалість періоду вегетації, діб	112	113	113
Висота рослини, см	222,2	239,8	218,4
Вихід зерна, %	80,7	79,3	81
Висота прикріплення качана, см	76	86,3	86,2
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	10,4	33	4,2
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5,3	4,8	4,9
Вміст білка, %	8,7	8	8,1
Вміст крохмалю, %	72,6	72,7	72,8
Стійкість до посухи, бал	7	9	8
Стійкість до вилягання, бал	9	8	8
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	8
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	8	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	8	8	7
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	9	9	8
Група стиглості (FAO)	2	2	2
Напрямок використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 18009073 Назва сорту: ГІМОВ Заявник (код): 1783 Власник сорту (код): 1783

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.12.2020

Свідство про державну реєстрацію № 201166

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	до дуже сильного
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабе	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабе	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	до помірної щільності
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	до середньої
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,21	10,51	
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,9	9,34	
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,69	-1,17	
+, - до усередненої урожайності, %	32,4	-11,1	
Довірчий інтервал, т/га	0,17	0,64	
Тривалість періоду вегетації, діб	129	130	
Висота рослини, см	246,8	264,6	
Вихід зерна, %	78,9	81,4	
Висота прикріплення качана, см	91,6	94	
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	53,5	40	
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	4,7	4,7	
Вміст білка, %	8,3	8,7	
Вміст крохмалю, %	73,1	72,8	
Стійкість до посухи, бал	6	8	
Стійкість до вилягання, бал	9	9	
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	6	
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	9	9	
Група стиглості (FAO)	4	4	
Напрямок використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 18009063 Назва сорту: Глуманда Заявник (код): 844 Власник сорту (код): 844

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201040

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабе	3	до помірного
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабе	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	до сильного

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	4,94	7,82	7,21
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,52	9,13	8,52
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,58	1,31	1,31
+, - до усередненої урожайності, %	11,7	16,7	18,1
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,07
Тривалість періоду вегетації, діб	114	112	117
Висота рослини, см	245	253,6	245,8
Вихід зерна, %	83,1	82,3	80,7
Висота прикріплення качана, см	89,1	92	90,8
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	42,7	39,3	4,1
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	6,7	4,4	3,9
Вміст білка, %	8,3	8,6	8,7
Вміст крохмалю, %	73,7	72,7	72,3
Стійкість до посухи, бал	4	8	8
Стійкість до вилягання, бал	9	9	8
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	6	6
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	9	9	7
Група стиглості (FAO)	2	2	2
Напрямок використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 19009011 Назва сорту: Девіс Заявник (код): 2260 921 Власник сорту (код): 2260 921

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 22.12.2020

Свідство про державну реєстрацію № 201777

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	до сильного
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабе	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабе	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	до малої
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабе	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабе	3	до помірного
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	до середньої
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	до сильного

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	4,94	7,82	7,21
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,42	8	7,62
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,48	0,18	0,41
+, - до усередненої урожайності, %	9,7	2,3	5,7
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,07
Тривалість періоду вегетації, діб	111	113	117
Висота рослини, см	232	248,9	240,6
Вихід зерна, %	82	79,4	80,1
Висота прикріплення качана, см	86,3	96,3	94,4
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	39,5	41,1	4,3
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5,8	3,7	5,5
Вміст білка, %	8,5	8,9	10,2
Вміст крохмалю, %	72,6	72,4	71,5
Стійкість до посухи, бал	4	6	8
Стійкість до вилягання, бал	8	9	8
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	8
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	8	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	6	7	6
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	8	9	7
Група стиглості (FAO)	2	2	2
Напрямок використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 18009104 Назва сорту: ДЕЛАНО Заявник (код): 2649 Власник сорту (код): 2649

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201061

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення півхи	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	до помірного
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення півхи	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запліваються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,19	8,24	7,83
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,59	9,19	7,92
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,4	0,95	0,09
+, - до усередненої урожайності, %	7,7	11,5	1,1
Довірчий інтервал, т/га	0,1	0,09	0,17
Тривалість періоду вегетації, діб	114	122	125
Висота рослини, см	247,2	250,9	247,4
Вихід зерна, %	80,1	80,2	80,5
Висота прикріплення качана, см	85,2	84,5	98,1
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	54,2	45,3	4,5
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	4,2	5,2	4,7
Вміст білка, %	8,3	8,1	9,1
Вміст крохмалю, %	73,4	73,1	73
Стійкість до посухи, бал	5	8	9
Стійкість до вилягання, бал	9	9	8
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	7	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	7	6
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	8	9	7
Група стиглості (FAO)	3	3	3
Напрямок використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.**Заявка №** 18009150 **Назва сорту:** Дженні **Заявник (код):** 2524 2436 **Власник сорту (код):** 2524 2436**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 15.12.2020**Свідчення про державну реєстрацію №** 201069**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нешільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	до середньої
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	до середнього
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	4,94	7,82	7,21
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	4,97	8,55	6,95
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,03	0,73	-0,26
+, - до усередненої урожайності, %	0,6	9,4	-3,5
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,07
Тривалість періоду вегетації, діб	111	113	115
Висота рослини, см	245,2	262,7	258
Вихід зерна, %	80,7	79,7	78,2
Висота прикріплення качана, см	82,3	90,9	100,4
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	39,5	21,2	6,4
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	6,8	4,5	5,3
Вміст білка, %	8,6	8,5	10,1
Вміст крохмалю, %	73	73,1	71,5
Стійкість до посухи, бал	4	8	9
Стійкість до вилягання, бал	7	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	5	6	6
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	9	9	7
Група стиглості (ФАО)	2	2	2
Напрямок використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 18009181 Назва сорту: ДЗ Шквал Заявник (код): 2260 1988 Власник сорту (код): 2260 1988

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201175

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення півхи	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	до середнього
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	до ледь похилого
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення півхи	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запліваються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	велике	7	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	дуже великий	9	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,19	8,24	7,83
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,37	10,15	7,64
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,18	1,91	-0,19
+, - до усередненої урожайності, %	22,8	23,2	-2,5
Довірчий інтервал, т/га	0,1	0,09	0,17
Тривалість періоду вегетації, діб	116	123	125
Висота рослини, см	231,2	247,5	233,4
Вихід зерна, %	80,6	78,2	81,4
Висота прикріплення качана, см	87,2	95,6	92,6
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	40,2	29,9	1,5
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	6,5	4,7	5,8
Вміст білка, %	8,1	8,1	10,1
Вміст крохмалю, %	72,9	72,8	71,9
Стійкість до посухи, бал	5	9	8
Стійкість до вилягання, бал	9	9	8
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	8	7	5
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	8	9	8
Група стиглості (FAO)	3	3	3
Напрямок використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.**Заявка № 18009182 Назва сорту:** ДН Анаїт **Заявник (код):** 2260 **Власник сорту (код):** 2260**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 18.12.2020**Свідчення про державну реєстрацію № 201176****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	пізній	7	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	до ледь похилого
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	пізній	7	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	дуже великий	9	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	слабке	3	до помірного

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,21	10,51	
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,62	9,07	
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,41	-1,44	
+, - до усередненої урожайності, %	27,1	-13,7	
Довірчий інтервал, т/га	0,17	0,64	
Тривалість періоду вегетації, діб	129	131	
Висота рослини, см	241,2	264,9	
Вихід зерна, %	81	82,9	
Висота прикріплення качана, см	98,6	98,6	
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	43	32,4	
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	7,1	4,4	
Вміст білка, %	8,1	8,2	
Вміст крохмалю, %	73,5	72,7	
Стійкість до посухи, бал	6	8	
Стійкість до вилягання, бал	9	9	
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	8	7	
Стійкість проти гельмінтоспоруозу, бал	8	9	
Група стиглості (FAO)	4	4	
Напрямок використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 18009184 Назва сорту: ДН Атон Заявник (код): 2260 Власник сорту (код): 2260

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201178

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення півхи	слабке	3	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від дуже раннього до раннього	2	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від дуже раннього до раннього	2	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення півхи	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлених зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	дуже сильне	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	4,96	7,44	7,31
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,36	8,24	7,96
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,4	0,8	0,65
+, - до усередненої урожайності, %	8,1	10,8	8,9
Довірчий інтервал, т/га	0,16	0,15	0,19
Тривалість періоду вегетації, діб	103	108	107
Висота рослини, см	212,7	218,6	200,8
Вихід зерна, %	80,3	78	78,2
Висота прикріплення качана, см	71	85,4	83,3
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	33,3	48,3	4
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	6,9	5,2	5,1
Вміст білка, %	7	11,1	
Вміст крохмалю, %	74,6	71,9	
Стійкість до посухи, бал	8	9	9
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	8	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	8	8
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	8	9	8
Група стиглості (FAO)	1	1	1
Напрямок використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 18009183 Назва сорту: ДН Велд Заявник (код): 2260 Власник сорту (код): 2260

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.12.2020

Свідство про державну реєстрацію № 201177

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	до помірного
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запліваються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	до великого
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	до сильного

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,19	8,24	7,83
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,83	8,05	7,41
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,64	-0,19	-0,42
+, - до усередненої урожайності, %	12,4	-2,3	-5,3
Довірчий інтервал, т/га	0,1	0,09	0,17
Тривалість періоду вегетації, діб	111	122	125
Висота рослини, см	228,2	242,3	229,1
Вихід зерна, %	83,9	81,4	79,7
Висота прикріплення качана, см	87,9	91,1	86,8
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	50	34,2	2,3
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5,4	4,1	3,9
Вміст білка, %	7,8	8,4	9,2
Вміст крохмалю, %	73,4	72,8	72,6
Стійкість до посухи, бал	6	8	8
Стійкість до вилягання, бал	9	9	7
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	7	4
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	7	9	8
Група стиглості (FAO)	3	3	3
Напрямок використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 17009178 Назва сорту: ДН Джура Заявник (код): 2260 Власник сорту (код): 2260

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201181

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення півхи	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	сильна	3	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення півхи	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запліваються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	велике	7	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	дуже великий	9	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,42	8,11	
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,53	7,89	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,11	-0,23	
+, - до усередненої урожайності, %	2,6	-2,8	
Довірчий інтервал, т/га	0,1	0,08	
Тривалість періоду вегетації, діб	128	129	
Висота рослини, см	240	259,3	
Вихід зерна, %	78,8	78,6	
Висота прикріплення качана, см	96,8	97,8	
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	37,9	20,2	
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	4,9	5,3	
Вміст білка, %	8,7	8,4	
Вміст крохмалю, %	72,8	73,2	
Стійкість до посухи, бал	7	9	
Стійкість до вилягання, бал	9	9	
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	8	8	
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	8	9	
Група стиглості (ФАО)	3	3	
Напрямок використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 18009185 Назва сорту: ДН Пульсація Заявник (код): 2260 Власник сорту (код): 2260

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.12.2020

Свідчення про державну реєстрацію № 201179

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	до помірного
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	до слабкої
8	Волоть: час цвітіння	від дуже раннього до раннього	2	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	до малої
15	Качан: час появи шовку	від дуже раннього до раннього	2	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	до великого
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	дуже сильне	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	4,74	7,44	6,99
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	4,56	7,46	7,47
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,18	0,02	0,48
+, - до усередненої урожайності, %	-3,7	0,2	6,8
Довірчий інтервал, т/га	0,17	0,15	0,18
Тривалість періоду вегетації, діб	103	108	108
Висота рослини, см	195	216	215,4
Вихід зерна, %	75,6	78,3	80,9
Висота прикріплення качана, см	84	79,5	82,5
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	56,3	32,9	2,6
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	6,6	4,7	6
Вміст білка, %	8,2	8,5	9,6
Вміст крохмалю, %	74,2	73,4	73,1
Стійкість до посухи, бал	7	8	9
Стійкість до вилягання, бал	8	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	7	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	3	7	6
Стійкість проти гельмінтоспорозу, бал	8	9	7
Група стиглості (FAO)	1	1	1
Напрямок використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 17009184 Назва сорту: ДН Сінрай Заявник (код): 2260 Власник сорту (код): 2260

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201162

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення півхи	помірне	5	до сильного
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	дуже сильне	9	S
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабе	1	S
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення півхи	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	ознака не визначалась	0	S

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	4,96	7,44	7,31
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,36	8,64	6,95
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,4	1,2	-0,36
+, - до усередненої урожайності, %	8,1	16,1	-5
Довірчий інтервал, т/га	0,16	0,15	0,19
Тривалість періоду вегетації, діб	104	107	107
Висота рослини, см	205,3	226,9	205,8
Вихід зерна, %	80,5	78,4	80,4
Висота прикріплення качана, см	70,5	76,6	79,9
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	21,3	19,7	4,8
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5,5	4,5	5,7
Вміст білка, %	8,9	9,7	10,3
Вміст крохмалю, %	72,3	71,8	70,9
Стійкість до посухи, бал	8	9	8
Стійкість до вилягання, бал	8	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	8	7
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	8	9	8
Група стиглості (FAO)	1	1	1
Напрямок використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 18009186 Назва сорту: ДН Стяг Заявник (код): 2260 Власник сорту (код): 2260

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.12.2020

Свідчення про державну реєстрацію № 201180

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	4,94	7,82	7,21
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,04	8,07	7,29
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,1	0,25	0,08
+, - до усередненої урожайності, %	2	3,2	1,1
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,07
Тривалість періоду вегетації, діб	112	113	116
Висота рослини, см	245,2	263,7	263,9
Вихід зерна, %	79,7	79,9	80
Висота прикріплення качана, см	98,1	102,8	100,5
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	34,5	27,8	0,8
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	6	5,1	4,6
Вміст білка, %	8,8	8,6	10
Вміст крохмалю, %	73,1	72,5	71,1
Стійкість до посухи, бал	5	7	8
Стійкість до вилягання, бал	8	8	6
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	8	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	5	7	5
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	8	9	8
Група стиглості (FAO)	2	2	2
Напрямок використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 18009180 Назва сорту: ДС1897Б Заявник (код): 2094 Власник сорту (код): 2094

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201068

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення півхи	дуже сильне	9	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення півхи	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	до слабого
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запліваються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	до дуже довгої
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	до середнього
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	до середнього
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	4,94	7,82	7,21
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,52	8,51	8,46
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,58	0,69	1,25
+, - до усередненої урожайності, %	11,8	8,8	17,3
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,07
Тривалість періоду вегетації, діб	110	114	116
Висота рослини, см	245	249,6	248,6
Вихід зерна, %	81,2	81,8	81,3
Висота прикріплення качана, см	81	86,8	97
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	33,4	48,4	6,4
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5,2	5,3	4,5
Вміст білка, %	8,4	7,8	9,3
Вміст крохмалю, %	73	73	71,6
Стійкість до посухи, бал	4	7	8
Стійкість до вилягання, бал	9	9	8
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	7	5
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	8	9	8
Група стиглості (FAO)	2	2	2
Напрямок використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 18009148 Назва сорту: Дулкан Заявник (код): 2524 2436 Власник сорту (код): 2524 2436

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201062

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	до дуже сильного
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	сильне	7	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	до середньої
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	велике	7	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	4,94	7,82	7,21
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	4,73	8,91	7,23
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,21	1,09	0,02
+, - до усередненої урожайності, %	-4,2	14	0,3
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,07
Тривалість періоду вегетації, діб	105	111	116
Висота рослини, см	241,7	246,8	250,3
Вихід зерна, %	82,1	81	80
Висота прикріплення качана, см	94,2	93,6	98,3
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	46,2	41,3	12,3
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	8,8	5,7	4,1
Вміст білка, %	9,7	9,2	10,2
Вміст крохмалю, %	71,8	71,9	71,4
Стійкість до посухи, бал	4	9	8
Стійкість до вилягання, бал	7	9	7
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	7	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	7	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	6	7	6
Стійкість проти гельмінтоспорозу, бал	8	9	7
Група стиглості (FAO)	2	2	2
Напрямок використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 18009149 Назва сорту: ЕЛЬДАКАР Заявник (код): 1783 Власник сорту (код): 1783

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201173

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення півхи	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	до ледь похилого
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	пізній	7	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення півхи	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	до слабого
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	до середньої
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	до середньої
28	Качан: за довжиною	короткий	3	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	слабке	3	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,21	10,51	
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,37	9,58	
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,16	-0,93	
+, - до усередненої урожайності, %	22,3	-8,9	
Довірчий інтервал, т/га	0,17	0,64	
Тривалість періоду вегетації, діб	128	130	
Висота рослини, см	235,5	249,3	
Вихід зерна, %	83,7	82,9	
Висота прикріплення качана, см	82,6	87,8	
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	48,8	30,2	
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	4,5	3,9	
Вміст білка, %	8,3	7,9	
Вміст крохмалю, %	73,6	73,4	
Стійкість до посухи, бал	6	8	
Стійкість до вилягання, бал	9	9	
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	6	
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	9	9	
Група стиглості (FAO)	4	4	
Напрямок використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 18009152 Назва сорту: Ервінга Заявник (код): 2524 2436 Власник сорту (код): 2524 2436

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.12.2020

Свідцтво про державну реєстрацію № 201064

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	до дуже сильного
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від дуже раннього до раннього	2	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	помірне	5	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	сильне	7	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	ранній	3	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	4,94	7,82	7,21
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,44	9,22	7,97
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,5	1,4	0,76
+, - до усередненої урожайності, %	10,2	17,9	10,6
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,07
Тривалість періоду вегетації, діб	109	113	117
Висота рослини, см	243,5	276,2	268,4
Вихід зерна, %	79,1	79,8	79,7
Висота прикріплення качана, см	89,5	101,2	107,6
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	46,3	16	8
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	7,1	5,4	4,1
Вміст білка, %	8,6	8,3	10,4
Вміст крохмалю, %	72,5	72,9	70,3
Стійкість до посухи, бал	4	9	9
Стійкість до вилягання, бал	8	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	7	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	8	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	7	5
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	8	9	7
Група стиглості (FAO)	2	2	2
Напрямок використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 17009044 Назва сорту: ЄС Орільскай Заявник (код): 2287 Власник сорту (код): 2287

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 22.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201776

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення півхи	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	помірне	5	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення півхи	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	до середньої
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запліваються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	до середнього
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	дуже сильне	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,19	8,24	7,83
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,14	7,97	7,53
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,05	-0,27	-0,3
+, - до усередненої урожайності, %	-0,9	-3,2	-3,8
Довірчий інтервал, т/га	0,1	0,09	0,17
Тривалість періоду вегетації, діб	112	122	122
Висота рослини, см	232,5	253,3	239,9
Вихід зерна, %	80,5	81	80,4
Висота прикріплення качана, см	88	89,7	92,6
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	52	29,4	8,9
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	6,1	4,2	4,9
Вміст білка, %	8,9	9,1	8,1
Вміст крохмалю, %	73,1	72,2	72,9
Стійкість до посухи, бал	5	8	9
Стійкість до вилягання, бал	9	9	8
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	7	5
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	8	9	7
Група стиглості (FAO)	3	3	3
Напрямок використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 18009153 Назва сорту: Зума Заявник (код): 2524 2436 Власник сорту (код): 2524 2436

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201065

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	до слабого
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	до помірного
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	ранній	3	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	4,94	7,82	7,21
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,16	8,26	8,02
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,22	0,44	0,81
+, - до усередненої урожайності, %	4,5	5,6	11,2
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,07
Тривалість періоду вегетації, діб	110	112	116
Висота рослини, см	256,7	257	249
Вихід зерна, %	78,6	75,1	78,9
Висота прикріплення качана, см	94,3	88,6	98,1
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	42,3	43,1	5
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5,6	5,3	3,8
Вміст білка, %	9,1	9	9,4
Вміст крохмалю, %	71,8	72,5	71,7
Стійкість до посухи, бал	5	6	9
Стійкість до вилягання, бал	8	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	7	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	8	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	6	6	6
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	8	9	7
Група стиглості (FAO)	2	2	2
Напрямок використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 18009095 Назва сорту: ІМПРЕССІВО Заявник (код): 2649 Власник сорту (код): 2649

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201056

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нешільне	3	до помірної щільності
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	до слабого
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	4,94	7,82	7,21
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,28	8,65	7,83
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,34	0,83	0,62
+, - до усередненої урожайності, %	6,9	10,7	8,6
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,07
Тривалість періоду вегетації, діб	111	111	116
Висота рослини, см	242,8	243,8	256
Вихід зерна, %	81,4	82,6	82,1
Висота прикріплення качана, см	90,3	91,9	95,9
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	49,2	44	7,6
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	6	3,4	4,3
Вміст білка, %	9,2	8,8	9,6
Вміст крохмалю, %	72,9	72,9	72,2
Стійкість до посухи, бал	5	9	9
Стійкість до вилягання, бал	9	9	8
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	8
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	6	6	5
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	9	9	8
Група стиглості (FAO)	2	2	2
Напрямок використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.**Заявка № 18009102 Назва сорту:** KAMEO **Заявник (код):** 2649 **Власник сорту (код):** 2649**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 15.12.2020**Свідцтво про державну реєстрацію №** 201059**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	до середньої
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	4,94	7,82	7,21
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,26	8,51	7,76
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,32	0,69	0,55
+, - до усередненої урожайності, %	6,5	8,9	7,6
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,07
Тривалість періоду вегетації, діб	109	113	117
Висота рослини, см	221,8	246,8	249
Вихід зерна, %	81,3	80,9	81,8
Висота прикріплення качана, см	85,7	87	95,4
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	46,7	42,3	6,5
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	7,1	4	4,4
Вміст білка, %	8,9	8,2	9,8
Вміст крохмалю, %	73,2	73,5	72,6
Стійкість до посухи, бал	5	9	8
Стійкість до вилягання, бал	8	9	7
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	5	7	6
Стійкість проти гельмінтоспорузу, бал	9	9	8
Група стиглості (ФАО)	2	2	2
Напрямок використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 18009046 Назва сорту: Кардіф Заявник (код): 1902 Власник сорту (код): 1902

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 17.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201164

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення півхи	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від дуже раннього до раннього	2	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	ранній	3	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення півхи	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	до середньої
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	до середньої
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	до великого
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	4,94	7,82	7,21
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	4,36	7,92	7,37
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,58	0,1	0,16
+, - до усередненої урожайності, %	-11,7	1,2	2,2
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,07
Тривалість періоду вегетації, діб	110	111	117
Висота рослини, см	237,7	245,4	245,6
Вихід зерна, %	81,1	80,1	79
Висота прикріплення качана, см	77,3	90,3	83,1
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	49,5	31,3	7
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5	4,4	4,8
Вміст білка, %	8,7	9,7	9,8
Вміст крохмалю, %	72,3	71,6	71,8
Стійкість до посухи, бал	4	9	9
Стійкість до вилягання, бал	8	9	8
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	8	8
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	4	7	4
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	9	9	8
Група стиглості (FAO)	2	2	2
Напрямок використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 18009084 Назва сорту: КВС АДАЖІО Заявник (код): 2649 Власник сорту (код): 2649

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.12.2020

Свідство про державну реєстрацію № 201047

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	до помірного
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	до сильного
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	до слабого
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	до середньої
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	до середнього
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	до середньої
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	до середньої
28	Качан: за довжиною	короткий	3	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	до великого
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	4,94	7,82	7,21
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,03	8,35	7,52
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,09	0,53	0,31
+, - до усередненої урожайності, %	22	6,7	4,3
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,07
Тривалість періоду вегетації, діб	111	111	116
Висота рослини, см	240,5	240,6	243,8
Вихід зерна, %	84,3	81,9	82,8
Висота прикріплення качана, см	81,7	83,1	96
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	43,8	32,4	9,3
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5,7	5,1	4,9
Вміст білка, %	9,3	8,3	11,3
Вміст крохмалю, %	73,2	73,3	71,2
Стійкість до посухи, бал	6	8	9
Стійкість до вилягання, бал	9	9	7
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	7	5
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	9	9	8
Група стиглості (FAO)	2	2	2
Напрямок використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 18009091 Назва сорту: КВС БІСТРО Заявник (код): 2649 Власник сорту (код): 2649

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201054

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення півхи	дуже сильне	9	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	сильна	3	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабе	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабе	3	до помірного
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабе	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення півхи	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	до довгої
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	до середньої
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	до зубовидно-подібного
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,19	8,24	7,83
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,22	7,91	7,86
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,03	-0,33	0,03
+, - до усередненої урожайності, %	19,9	-4	0,4
Довірчий інтервал, т/га	0,1	0,09	0,17
Тривалість періоду вегетації, діб	115	123	125
Висота рослини, см	242,8	254	245,6
Вихід зерна, %	82,7	79,2	80,8
Висота прикріплення качана, см	78,9	84,4	90,9
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	56,3	46,9	11,3
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	3,9	4,2	5,6
Вміст білка, %	8,3	8,2	9,1
Вміст крохмалю, %	73,2	73,2	72,2
Стійкість до посухи, бал	5	7	9
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	7	9	8
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	8	7	5
Стійкість проти гельмінтоспору, бал	8	9	7
Група стиглості (FAO)	3	3	3
Напрямок використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 18009080 Назва сорту: КВС БУРІТО Заявник (код): 2649 Власник сорту (код): 2649

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.12.2020

Свідцтво про державну реєстрацію № 201044

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	до середнього
26	Листок: пластинка за шириною	широка	7	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	дуже великий	9	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,19	8,24	7,83
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,22	10	8,29
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,03	1,76	0,46
+, - до усередненої урожайності, %	19,8	21,3	5,8
Довірчий інтервал, т/га	0,1	0,09	0,17
Тривалість періоду вегетації, діб	115	122	124
Висота рослини, см	255,5	263,1	241
Вихід зерна, %	83,5	82,3	81,1
Висота прикріплення качана, см	87,3	90,6	91,6
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	49	24,2	1
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	6,5	5,1	4,9
Вміст білка, %	8,3	8,8	11,1
Вміст крохмалю, %	73,9	73,1	71,3
Стійкість до посухи, бал	7	9	9
Стійкість до вилягання, бал	9	9	7
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	8	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	6	7	6
Стійкість проти гельмінтоспору, бал	8	9	7
Група стиглості (FAO)	3	3	3
Напрямок використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 18009088 Назва сорту: КВС ГЕНДАЛЬФ Заявник (код): 2649 Власник сорту (код): 2649

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201051

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення півхи	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	сильне	7	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення півхи	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	помірне	5	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запліваються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	до дуже довгої
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	4,94	7,82	7,21
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,62	9,02	8,52
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,68	1,2	1,31
+, - до усередненої урожайності, %	13,7	15,4	18,1
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,07
Тривалість періоду вегетації, діб	112	115	117
Висота рослини, см	252,3	257,3	267,3
Вихід зерна, %	81,5	78,9	81,6
Висота прикріплення качана, см	90	94,7	106,4
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	42	20,2	4,8
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5,6	5	5,2
Вміст білка, %	10	8,6	10,7
Вміст крохмалю, %	71,6	72,3	70,6
Стійкість до посухи, бал	5	9	9
Стійкість до вилягання, бал	8	9	8
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	7	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	8	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	6	5	5
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	8	9	7
Група стиглості (FAO)	2	2	2
Напрямок використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 18009103 Назва сорту: КВС ДЖОРДЖІО Заявник (код): 2649 Власник сорту (код): 2649

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.12.2020

Свідство про державну реєстрацію № 201060

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	сильна	3	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	прямі	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нешільне	3	до помірної щільності
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	до дуже довгої
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	до середнього
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	4,94	7,82	7,21
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,1	8,79	7,9
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,16	0,97	0,69
+, - до усередненої урожайності, %	23,5	12,5	9,6
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,07
Тривалість періоду вегетації, діб	110	113	116
Висота рослини, см	230	246,8	243,6
Вихід зерна, %	83	80,9	81,9
Висота прикріплення качана, см	87,8	83,6	94,1
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	46	37	5,5
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	6	4,8	4,6
Вміст білка, %	8,9	8,3	9,7
Вміст крохмалю, %	73,2	73,5	71,9
Стійкість до посухи, бал	4	7	8
Стійкість до вилягання, бал	9	9	7
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	7	9	8
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	6	6	6
Стійкість проти гельмінтоспорозу, бал	9	9	7
Група стиглості (ФАО)	2	2	2
Напрямок використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 18009094 Назва сорту: КВС ДИНАМО Заявник (код): 2649 Власник сорту (код): 2649

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201055

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабке	1	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	до ледь похилого до малої
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	до середнього
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	4,94	7,82	7,21
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,76	8,16	7,16
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,82	0,34	-0,05
+, - до усередненої урожайності, %	16,5	4,4	-0,7
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,07
Тривалість періоду вегетації, діб	110	112	117
Висота рослини, см	244	252,9	256,6
Вихід зерна, %	82	82,8	79,8
Висота прикріплення качана, см	84,7	94,4	102,1
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	47,8	47,4	9,4
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5,3	4,1	3,4
Вміст білка, %	9,1	8,7	10,1
Вміст крохмалю, %	73,3	73,4	73
Стійкість до посухи, бал	5	9	9
Стійкість до вилягання, бал	8	9	8
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	8	8
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	6	7	5
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	9	9	8
Група стиглості (FAO)	2	2	2
Напрямок використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 18009083 Назва сорту: КВС ІНТЕЛЕГЕНС Заявник (код): 2649 Власник сорту (код): 2649

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.12.2020

Свідство про державну реєстрацію № 201046

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	до сильного
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабке	1	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	до слабого
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	до помірного
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	до великої
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	до великого
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	до дуже великого
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,19	8,24	7,83
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,55	10,38	8,3
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,36	2,14	0,47
+, - до усередненої урожайності, %	26,2	26	6
Довірчий інтервал, т/га	0,1	0,09	0,17
Тривалість періоду вегетації, діб	115	122	125
Висота рослини, см	261,7	259	247,6
Вихід зерна, %	84,1	82,8	82,4
Висота прикріплення качана, см	83,8	85,8	88,3
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	52,8	28,3	0,4
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	4	4,5	5,8
Вміст білка, %	8,3	8,3	9,9
Вміст крохмалю, %	73,5	72,5	71,9
Стійкість до посухи, бал	6	9	9
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	7	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	8	5	7
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	8	9	7
Група стиглості (FAO)	3	3	3
Напрям використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 18009089 Назва сорту: КВС КАЛАФУНА Заявник (код): 2649 Власник сорту (код): 2649

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201052

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення півхи	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення півхи	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	до дуже довгої
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	4,94	7,82	7,21
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,61	7,82	8,56
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,67	0	1,35
+, - до усередненої урожайності, %	13,6	0	18,7
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,07
Тривалість періоду вегетації, діб	112	116	117
Висота рослини, см	241	263,4	266,4
Вихід зерна, %	81,9	77	79,1
Висота прикріплення качана, см	90,5	95,6	105,4
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	40,8	28,4	6,8
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	6,6	4,3	5,7
Вміст білка, %	8,7	9	10,1
Вміст крохмалю, %	73,1	72,5	71,8
Стійкість до посухи, бал	5	7	9
Стійкість до вилягання, бал	8	9	8
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	6	8	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	8	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	6	6
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	8	9	7
Група стиглості (FAO)	2	2	2
Напрямок використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 18009090 Назва сорту: КВС ЛАУРО Заявник (код): 2649 Власник сорту (код): 2649

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.12.2020

Свідство про державну реєстрацію № 201053

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	до помірного
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	до сильного
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабе	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	до дуже довгої
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	до середньої
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	до середнього
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	до дуже сильного

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,19	8,24	7,83
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,44	8,34	8,01
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,25	0,1	0,18
+, - до усередненої урожайності, %	24,1	1,2	2,3
Довірчий інтервал, т/га	0,1	0,09	0,17
Тривалість періоду вегетації, діб	112	122	124
Висота рослини, см	253,5	251,2	244,6
Вихід зерна, %	82,6	82,6	80
Висота прикріплення качана, см	81,1	85,6	92,3
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	49	42,3	15,9
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5,2	5,3	5,3
Вміст білка, %	8,1	8,2	10,4
Вміст крохмалю, %	73,7	73,3	72,1
Стійкість до посухи, бал	6	9	9
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	7	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	8	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	7	5
Стійкість проти гельмінтоспору, бал	8	9	6
Група стиглості (FAO)	3	3	3
Напрямок використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 18009074 Назва сорту: КВС ПАУЛО Заявник (код): 2649 Власник сорту (код): 2649

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201043

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлених зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	до дуже сильного

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,19	8,24	7,83
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,77	8,3	8,23
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,58	0,06	0,4
+, - до усередненої урожайності, %	11,2	0,7	5,1
Довірчий інтервал, т/га	0,1	0,09	0,17
Тривалість періоду вегетації, діб	113	123	124
Висота рослини, см	247,3	258,1	242,4
Вихід зерна, %	82,4	81,1	82,2
Висота прикріплення качана, см	95,7	91,3	100
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	48	35,8	0,8
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5,8	4,3	5,1
Вміст білка, %	8,1	8,1	9,7
Вміст крохмалю, %	72,7	72,6	72,6
Стійкість до посухи, бал	6	6	9
Стійкість до вилягання, бал	8	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	8	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	7	4
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	7	9	7
Група стиглості (FAO)	3	3	3
Напрямок використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 18009087 Назва сорту: КВС ПРОВІЗО Заявник (код): 2649 Власник сорту (код): 2649

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.12.2020

Свідство про державну реєстрацію № 201050

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	до помірного
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	помірно похиле	5	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	до середньої
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовте	3	до жовто-оранжевого
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,19	8,24	7,83
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,61	8,35	7,71
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,42	0,11	-0,12
+, - до усередненої урожайності, %	8	1,3	-1,5
Довірчий інтервал, т/га	0,1	0,09	0,17
Тривалість періоду вегетації, діб	114	122	125
Висота рослини, см	238,5	243,5	238,9
Вихід зерна, %	85,4	82,9	80,6
Висота прикріплення качана, см	89,6	85,4	95,9
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	57,7	42,2	10,6
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	4,6	4,3	6,6
Вміст білка, %	7,7	8,4	10,1
Вміст крохмалю, %	72,6	72,7	71,9
Стійкість до посухи, бал	5	8	8
Стійкість до вилягання, бал	9	9	8
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	7	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	8	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	6	6
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	8	9	6
Група стиглості (FAO)	3	3	3
Напрямок використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 18009098 Назва сорту: КВС РАМІРО Заявник (код): 2649 Власник сорту (код): 2649

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201058

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення півхи	сильне	7	до дуже сильного
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	сильне	7	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення півхи	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлених зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,19	8,24	7,83
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,83	8,46	8,35
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,64	0,22	0,52
+, - до усередненої урожайності, %	31,6	2,6	6,7
Довірчий інтервал, т/га	0,1	0,09	0,17
Тривалість періоду вегетації, діб	115	122	124
Висота рослини, см	240,2	259,2	257
Вихід зерна, %	81,7	82,9	82,4
Висота прикріплення качана, см	88,1	91,1	96,6
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	59,2	45	9,1
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5,2	5,5	4,4
Вміст білка, %	8,4	8,4	9,8
Вміст крохмалю, %	73,6	72,9	72,2
Стійкість до посухи, бал	5	7	9
Стійкість до вилягання, бал	9	9	8
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	8
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	7	6
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	8	9	7
Група стиглості (FAO)	3	3	3
Напрямок використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 18009081 Назва сорту: КВС ФОРТУНАТО Заявник (код): 2649 Власник сорту (код): 2649

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.12.2020

Свідцтво про державну реєстрацію № 201045

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	велике	7	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	4,94	7,82	7,21
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,48	8,16	8,15
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,54	0,34	0,94
+, - до усередненої урожайності, %	11	4,3	13
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,07
Тривалість періоду вегетації, діб	111	114	117
Висота рослини, см	244,3	248,3	254,5
Вихід зерна, %	82,8	80	79,3
Висота прикріплення качана, см	89,4	88	92
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	48,5	36,1	12,5
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	6	5,3	3,6
Вміст білка, %	8,8	7,8	9,1
Вміст крохмалю, %	72,8	73,4	72,6
Стійкість до посухи, бал	5	7	9
Стійкість до вилягання, бал	8	9	8
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	8	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	6	6	6
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	8	9	7
Група стиглості (FAO)	2	2	2
Напрямок використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 16009124 Назва сорту: КМ 3130 Заявник (код): 2257 Власник сорту (код): 2257

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 22.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201775

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	пізній	7	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	до ледь похилого
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	пізній	7	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	до слабого
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	до довгої
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	велике	7	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	до середньої кількості
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	дуже сильне	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,19	8,24	7,83
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	4,88	8,33	7,68
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,31	0,09	-0,15
+, - до усередненої урожайності, %	-6,1	1,1	-1,9
Довірчий інтервал, т/га	0,1	0,09	0,17
Тривалість періоду вегетації, діб	114	123	124
Висота рослини, см	245	254,4	246,8
Вихід зерна, %	75,1	77,5	80,4
Висота прикріплення качана, см	111,3	93,9	90,7
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	58,3	22,3	3,2
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	6,8	4	4,3
Вміст білка, %	9,4	9,6	11,2
Вміст крохмалю, %	73	72,1	70,7
Стійкість до посухи, бал	7	8	9
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	7	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	5	7	6
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	8	9	7
Група стиглості (FAO)	3	3	3
Напрямок використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 19009021 Назва сорту: KM 3260 Заявник (код): 2257 Власник сорту (код): 2257

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 22.12.2020

Свідчення про державну реєстрацію № 201773

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	до ледь похилого
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	пізній	7	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	пізній	7	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	велике	7	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	дуже великий	9	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	дуже сильне	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	4,94	7,82	7,21
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,54	7,86	7,23
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,6	0,04	0,02
+, - до усередненої урожайності, %	12,1	0,6	0,3
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,07
Тривалість періоду вегетації, діб	114	116	118
Висота рослини, см	246	254,5	263
Вихід зерна, %	81,2	79,1	80,9
Висота прикріплення качана, см	108	101,2	100,2
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	52	23,3	9,5
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	7,1	4,5	2,9
Вміст білка, %	9,8	9,2	11,9
Вміст крохмалю, %	72,7	72,8	70,2
Стійкість до посухи, бал	7	7	9
Стійкість до вилягання, бал	9	9	8
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	7	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	7	5
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	9	9	7
Група стиглості (FAO)	2	2	2
Напрямок використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 19009023 Назва сорту: КМ 3310 Заявник (код): 2257 Власник сорту (код): 2257

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 22.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201774

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення півхи	слабке	3	до помірного
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення півхи	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	велике	7	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлених зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	дуже сильне	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	4,94	7,82	7,21
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,87	9,19	8,28
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,93	1,37	1,07
+, - до усередненої урожайності, %	18,8	17,6	14,8
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,07
Тривалість періоду вегетації, діб	113	116	117
Висота рослини, см	238,3	248,6	257,3
Вихід зерна, %	79,4	78,5	78,7
Висота прикріплення качана, см	108,2	96,8	103,3
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	55	37,4	2,7
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	7,7	4,5	3,6
Вміст білка, %	9,7	9	11,1
Вміст крохмалю, %	73	72,4	71
Стійкість до посухи, бал	9	9	9
Стійкість до вилягання, бал	7	8	7
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	7	8	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	8	5
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	9	9	8
Група стиглості (FAO)	2	2	2
Напрямок використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 19009022 Назва сорту: KM 4100 Заявник (код): 2257 Власник сорту (код): 2257

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 22.12.2020

Свідчення про державну реєстрацію № 201781

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	пізній	7	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабе	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабе	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	пізній	7	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	велике	7	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	дуже великий	9	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,19	8,24	7,83
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,27	8,2	7,92
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,08	-0,04	0,09
+, - до усередненої урожайності, %	1,5	-0,5	1,2
Довірчий інтервал, т/га	0,1	0,09	0,17
Тривалість періоду вегетації, діб	114	123	127
Висота рослини, см	242,7	251,7	257,7
Вихід зерна, %	80,5	80,5	81,6
Висота прикріплення качана, см	107,2	92,5	107
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	72,7	19,7	4,5
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	4,5	4,3	5
Вміст білка, %	9,3	9,5	11,1
Вміст крохмалю, %	71,2	72,3	71
Стійкість до посухи, бал	7	7	9
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	8
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	7	6
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	9	9	7
Група стиглості (FAO)	3	3	3
Напрямок використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: П.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 18009064 Назва сорту: Контенто Заявник (код): 2011 Власник сорту (код): 2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201041

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	до дуже сильного
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від дуже раннього до раннього	2	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	до сильного
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від дуже раннього до раннього	2	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	сильне	7	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	до середньої
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	до великого
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	4,94	7,82	7,21
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,48	8,98	7,52
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,54	1,16	0,31
+, - до усередненої урожайності, %	10,9	14,8	4,3
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,07
Тривалість періоду вегетації, діб	111	113	115
Висота рослини, см	240	243,1	240,6
Вихід зерна, %	80,5	82,6	79,7
Висота прикріплення качана, см	88	92,3	98,5
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	42,2	26,8	8,1
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	6,5	4,4	3,9
Вміст білка, %	8,4	8,5	8,4
Вміст крохмалю, %	73,2	72,7	73,2
Стійкість до посухи, бал	5	8	9
Стійкість до вилягання, бал	9	9	8
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	8	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	6	7	6
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	9	9	7
Група стиглості (FAO)	2	2	2
Напрямок використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 19009013 Назва сорту: Кросбі Заявник (код): 2260 921 Власник сорту (код): 2260 921

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 22.12.2020

Свідство про державну реєстрацію № 201779

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від дуже раннього до раннього	2	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	помірне	5	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	до помірно похилої
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	до малої
15	Качан: час появи шовку	від дуже раннього до раннього	2	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	до сильного
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	до довгої
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	до довгого
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	4,94	7,82	7,21
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,34	7,45	6,85
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,4	-0,37	-0,36
+, - до усередненої урожайності, %	8	-4,7	-4,9
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,07
Тривалість періоду вегетації, діб	109	112	116
Висота рослини, см	227,3	257,2	244,1
Вихід зерна, %	82,2	82,1	80,8
Висота прикріплення качана, см	81,7	92,8	95,1
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	49,7	49,4	8,8
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	6	6,3	4,3
Вміст білка, %	9,4	9,3	11,4
Вміст крохмалю, %	72,3	72	70,5
Стійкість до посухи, бал	5	7	8
Стійкість до вилягання, бал	8	9	7
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	7	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	6	7	5
Стійкість проти гельмінтоспору, бал	9	9	7
Група стиглості (FAO)	2	2	2
Напрямок використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 18009105 Назва сорту: ЛГ 31330 Заявник (код): 793 Власник сорту (код): 793

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 17.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201169

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	до сильного
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	до слабкого
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	до слабкого
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	до дуже довгої
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	велике	7	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	до сильного

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,19	8,24	7,83
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,26	8,12	8,07
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,07	-0,12	0,24
+, - до усередненої урожайності, %	20,6	-1,5	3,1
Довірчий інтервал, т/га	0,1	0,09	0,17
Тривалість періоду вегетації, діб	114	122	125
Висота рослини, см	267	265,5	248,5
Вихід зерна, %	83,9	83,3	79,3
Висота прикріплення качана, см	102,9	93,3	100,1
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	52,7	43,4	2,1
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	6,1	4,6	5,8
Вміст білка, %	9,1	9,3	9,6
Вміст крохмалю, %	73	72,9	71,9
Стійкість до посухи, бал	5	7	9
Стійкість до вилягання, бал	9	9	7
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	7	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	8	6	3
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	7	9	7
Група стиглості (FAO)	3	3	3
Напрямок використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.**Заявка №** 18009065 **Назва сорту:** Леонідо **Заявник (код):** 2011 **Власник сорту (код):** 2011**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 15.12.2020**Свідчення про державну реєстрацію №** 201042**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	велике	7	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	4,94	7,82	7,21
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,72	8,92	7,96
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,78	1,1	0,75
+, - до усередненої урожайності, %	15,8	14	10,5
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,07
Тривалість періоду вегетації, діб	110	115	117
Висота рослини, см	263,2	275,3	271,9
Вихід зерна, %	80,3	79,4	76,9
Висота прикріплення качана, см	99,6	107,2	113
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	43,7	22,8	12,3
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	6	4,8	6,2
Вміст білка, %	8,7	8,8	8,8
Вміст крохмалю, %	73,4	73,1	72,5
Стійкість до посухи, бал	5	9	9
Стійкість до вилягання, бал	7	9	7
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	7	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	5	6	6
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	9	9	7
Група стиглості (FAO)	2	2	2
Напрямок використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 18009085 Назва сорту: ЛЕОНОВО Заявник (код): 2649 Власник сорту (код): 2649

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201048

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабке	1	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	до сильного
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	до великої
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлених зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,19	8,24	7,83
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,42	8,11	8
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,23	-0,13	0,17
+, - до усередненої урожайності, %	4,5	-1,6	2,2
Довірчий інтервал, т/га	0,1	0,09	0,17
Тривалість періоду вегетації, діб	115	122	124
Висота рослини, см	221,2	246,7	242,6
Вихід зерна, %	83,2	81,4	80,5
Висота прикріплення качана, см	86	84,6	92,3
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	47,5	35,2	1,3
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	4,1	3,8	4,7
Вміст білка, %	8,1	8,3	10
Вміст крохмалю, %	73,7	73,3	71,8
Стійкість до посухи, бал	5	7	9
Стійкість до вилягання, бал	9	9	7
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	7	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	7	5
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	7	9	7
Група стиглості (ФА0)	3	3	3
Напрямок використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 18009052 Назва сорту: ЛУКАКУ Заявник (код): 924 Власник сорту (код): 924

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.12.2020

Свідство про державну реєстрацію № 201038

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	дуже великий	9	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,19	8,24	7,83
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,43	10,09	9,12
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,24	1,85	1,29
+, - до усередненої урожайності, %	24	22,4	16,5
Довірчий інтервал, т/га	0,1	0,09	0,17
Тривалість періоду вегетації, діб	113	121	124
Висота рослини, см	240,2	248,5	237
Вихід зерна, %	81,4	81,1	80,9
Висота прикріплення качана, см	83,1	87,2	88,6
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	46,8	34,3	1,8
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	4,8	4,6	4,4
Вміст білка, %	7,6	7,8	9,1
Вміст крохмалю, %	73,5	73,7	72
Стійкість до посухи, бал	6	9	9
Стійкість до вилягання, бал	9	9	8
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	8	7	7
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	9	9	7
Група стиглості (ФА0)	3	3	3
Напрямок використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 18009051 Назва сорту: MAC 165 Заявник (код): 924 Власник сорту (код): 924

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201037

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення півхи	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від дуже раннього до раннього	2	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	до помірного
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	помірно похиле	5	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від дуже раннього до раннього	2	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	до помірного
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення півхи	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	оранжеве	5	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	4,94	7,82	7,21
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,39	8,48	8,48
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,45	0,66	1,27
+, - до усередненої урожайності, %	9	8,5	17,7
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,07
Тривалість періоду вегетації, діб	111	113	117
Висота рослини, см	243,5	251,7	248,6
Вихід зерна, %	81,6	81,3	83
Висота прикріплення качана, см	86,3	93,4	96,9
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	47	25	2,3
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	8,6	5,2	5,1
Вміст білка, %	8,9	9	9,3
Вміст крохмалю, %	72,2	73,7	71,5
Стійкість до посухи, бал	5	9	8
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	8
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	8	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	8	6	5
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	9	9	8
Група стиглості (FAO)	2	2	2
Напрямок використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 19009012 Назва сорту: Нокс Заявник (код): 2260 921 Власник сорту (код): 2260 921

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 22.12.2020

Свідство про державну реєстрацію № 201778

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від дуже раннього до раннього	2	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	до слабкого
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від дуже раннього до раннього	2	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	до середньої
28	Качан: за довжиною	короткий	3	до середнього
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	дуже сильне	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	4,74	7,44	6,99
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	4,84	7,88	7,88
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,1	0,44	0,89
+, - до усередненої урожайності, %	2,1	5,9	12,7
Довірчий інтервал, т/га	0,17	0,15	0,18
Тривалість періоду вегетації, діб	102	106	108
Висота рослини, см	205,3	233,2	216,8
Вихід зерна, %	77,3	79	81
Висота прикріплення качана, см	82,6	90,9	85,4
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	50	30,9	5,1
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	6,1	5,5	5,6
Вміст білка, %	9,8	8,7	10,4
Вміст крохмалю, %	72,5	72,7	72
Стійкість до посухи, бал	7	7	9
Стійкість до вилягання, бал	8	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	4	7	6
Стійкість проти гельмінтоспору, бал	8	9	7
Група стиглості (FAO)	1	1	1
Напрямок використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 18009037 Назва сорту: П0200 Заявник (код): 9 Власник сорту (код): 9

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 16.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201163

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення півхи	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	до слабого
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	до слабого
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	до ледь похилого до малої
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	до слабого
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення півхи	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	до слабого
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,19	8,24	
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	7,44	9,73	
+, - до усередненої урожайності, т/га	2,25	1,49	
+, - до усередненої урожайності, %	43,4	18,1	
Довірчий інтервал, т/га	0,1	0,09	
Тривалість періоду вегетації, діб	127	130	
Висота рослини, см	247,2	262,9	
Вихід зерна, %	80,3	81,9	
Висота прикріплення качана, см	92	95,5	
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	45,8	25,6	
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5,1	4,8	
Вміст білка, %	8,4	7,9	
Вміст крохмалю, %	73,5	73,2	
Стійкість до посухи, бал	5	8	
Стійкість до вилягання, бал	9	9	
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	8	7	
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	9	9	
Група стиглості (FAO)	3	3	
Напрямок використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 18009041 Назва сорту: ПО217 Заявник (код): 9 Власник сорту (код): 9

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.12.2020

Свідство про державну реєстрацію № 201031

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	до помірного
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	до слабого
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	до помірного
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	до ледь похилого
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	до малої
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	до великого
29	Качан: діаметр (посередині)	дуже великий	9	
30	Качан: форма	циліндрична	3	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,21	10,51	
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,82	8,99	
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,61	-1,52	
+, - до усередненої урожайності, %	31	-14,5	
Довірчий інтервал, т/га	0,17	0,64	
Тривалість періоду вегетації, діб	127	129	
Висота рослини, см	241	257,5	
Вихід зерна, %	80,7	82,2	
Висота прикріплення качана, см	88,8	90,6	
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	47,5	20,9	
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	3,9	4,4	
Вміст білка, %	8,2	8,1	
Вміст крохмалю, %	73,8	72,9	
Стійкість до посухи, бал	6	8	
Стійкість до вилягання, бал	9	9	
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	6	
Стійкість проти гельмінтоспорозу, бал	9	9	
Група стиглості (FAO)	4	4	
Напрямок використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 19009058 Назва сорту: П0268 Заявник (код): 1690 1688

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 12.10.2020 Патент № 200645

Дата пріоритету: 08.02.2019

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення півхи	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	до середнього
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	до середнього
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	до малої кількості
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нешільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення півхи	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	до довгої
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	до середньої
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	до середньої
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	до великого
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	до широкої
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	до середньої
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	дуже великий	9	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	до оранжевого
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.**Заявка №** 19009059 **Назва сорту:** ПО312 **Заявник (код):** 1690 1688**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 12.10.2020 **Патент №** 200646**Дата пріоритету:** 08.02.2019**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	до дуже сильного
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	до середньої
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	дуже великий	9	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 19009057 Назва сорту: П0349 Заявник (код): 1690 1688

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 12.10.2020 Патент № 200644

Дата пріоритету: 08.02.2019

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	до помірного
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	велике	7	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлених зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 19009060 Назва сорту: ПО362 Заявник (код): 1690 1688

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 12.10.2020 Патент № 200647

Дата пріоритету: 08.02.2019

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	до слабого
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	до помірного
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	до помірного
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	до помірного
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	до дуже великого
30	Качан: форма	циліндрична	3	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовте	3	до жовто-оранжевого
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 19009053 Назва сорту: П7515 Заявник (код): 1690 1688

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 12.10.2020 Патент № 200642

Дата пріоритету: 08.02.2019

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	ранній	3	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	щільне	7	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 18009158 Назва сорту: П7948 Заявник (код): 9 Власник сорту (код): 9

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.12.2020

Свідство про державну реєстрацію № 201067

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	до середнього
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	до помірного
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	до ледь похилого
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	до помірного
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	4,94	7,82	7,21
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	4,93	7,63	7,18
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,01	-0,19	-0,03
+, - до усередненої урожайності, %	-0,2	-2,4	-0,4
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,07
Тривалість періоду вегетації, діб	110	112	116
Висота рослини, см	239,2	258,8	264
Вихід зерна, %	79,8	79,4	82,4
Висота прикріплення качана, см	87,3	87,3	98,5
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	45,5	38	1,8
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5,6	4	4,3
Вміст білка, %	8,5	8,1	9,1
Вміст крохмалю, %	73,7	73,6	73,2
Стійкість до посухи, бал	4	6	9
Стійкість до вилягання, бал	9	9	7
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	6	6	3
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	9	9	8
Група стиглості (FAO)	2	2	2
Напрямок використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 18009036 Назва сорту: П8271 Заявник (код): 9 Власник сорту (код): 9

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201029

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення півхи	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення півхи	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запліваються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	4,94	7,82	7,21
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,38	7,64	7,29
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,44	-0,18	0,08
+, - до усередненої урожайності, %	8,8	-2,3	1,1
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,07
Тривалість періоду вегетації, діб	110	111	117
Висота рослини, см	239,2	250,1	245,6
Вихід зерна, %	83,5	83,4	83,1
Висота прикріплення качана, см	93	91,6	105,1
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	54	37,8	8,8
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	6,9	5	4,3
Вміст білка, %	8,4	7,8	10,1
Вміст крохмалю, %	73,5	73,5	71,5
Стійкість до посухи, бал	5	6	9
Стійкість до вилягання, бал	9	9	7
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	8	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	8	7	5
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	8	9	7
Група стиглості (FAO)	2	2	2
Напрямок використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.**Заявка №** 18009044 **Назва сорту:** П8329 **Заявник (код):** 9 **Власник сорту (код):** 9**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 15.12.2020**Свідчення про державну реєстрацію №** 201034**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	ранній	3	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	слабке	3	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	4,94	7,82	7,21
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,49	9,29	7,12
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,55	1,47	-0,09
+, - до усередненої урожайності, %	11,2	18,8	-1,2
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,07
Тривалість періоду вегетації, діб	110	112	116
Висота рослини, см	250,8	253,3	248,4
Вихід зерна, %	82,2	81,4	74,2
Висота прикріплення качана, см	97,6	99,2	102,1
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	52	35,2	5,5
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	6,3	3,9	4,7
Вміст білка, %	8,7	8,6	10,3
Вміст крохмалю, %	73,3	72,9	71,5
Стійкість до посухи, бал	6	8	8
Стійкість до вилягання, бал	8	9	7
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	6	6
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	8	9	7
Група стиглості (FAO)	2	2	2
Напрямок використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 19009050 Назва сорту: П8358 Заявник (код): 1688

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 12.10.2020 Патент № 200640

Дата пріоритету: 08.02.2019

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	ранній	3	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.**Заявка №** 18009045 **Назва сорту:** П8666 **Заявник (код):** 9 **Власник сорту (код):** 9**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 15.12.2020**Свідчення про державну реєстрацію №** 201035**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	4,94	7,82	7,21
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,16	8,22	7,32
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,22	0,4	0,11
+, - до усередненої урожайності, %	4,4	5,1	1,6
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,07
Тривалість періоду вегетації, діб	110	112	117
Висота рослини, см	237,5	246,4	255,4
Вихід зерна, %	81,3	79,4	81,2
Висота прикріплення качана, см	88,3	95,9	100,6
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	50,7	31,4	8
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5	5,3	5,3
Вміст білка, %	9,2	8,7	10,1
Вміст крохмалю, %	72,8	73,1	71,4
Стійкість до посухи, бал	5	7	8
Стійкість до вилягання, бал	9	8	8
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	8	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	5	7	6
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	9	9	7
Група стиглості (ФАО)	2	2	2
Напрямок використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 19009064 Назва сорту: П9071 Заявник (код): 1690 1688

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 12.10.2020 Патент № 200649

Дата пріоритету: 08.02.2019

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	ранній	3	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	до середнього
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлених зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	до сильного

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 19009049 Назва сорту: П9074Е Заявник (код): 1688

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 12.10.2020 Патент № 200639

Дата пріоритету: 08.02.2019

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	великий	7	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	до довгої
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	до середньої
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	до дуже довгої
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	до середньої
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	воскоподібного типу
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	слабке	3	до помірного

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 18009042 Назва сорту: П9300 Заявник (код): 9 Власник сорту (код): 9

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201032

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	до дуже сильного
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	до середнього
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	циліндрична	3	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,19	8,24	7,83
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,86	8,01	7,82
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,67	-0,23	-0,01
+, - до усередненої урожайності, %	32,2	-2,7	-0,2
Довірчий інтервал, т/га	0,1	0,09	0,17
Тривалість періоду вегетації, діб	113	121	124
Висота рослини, см	247,2	255,5	242,5
Вихід зерна, %	83,5	82,5	79,2
Висота прикріплення качана, см	98,7	99,7	103,9
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	51	39,9	9,1
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	6,6	4	5,4
Вміст білка, %	7,8	8	9
Вміст крохмалю, %	74	72,9	72,8
Стійкість до посухи, бал	7	6	9
Стійкість до вилягання, бал	9	9	8
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	7	8	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	7	5
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	8	9	7
Група стиглості (FAO)	3	3	3
Напрямок використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.**Заявка №** 19009062 **Назва сорту:** П9361 **Заявник (код):** 1690 1688**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 12.10.2020 **Патент №** 200648**Дата пріоритету:** 08.02.2019**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	сильна	3	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	до середнього
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабе	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабе	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабе	3	до помірного
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно заплілюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	дуже великий	9	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	до сильного

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 19009065 Назва сорту: П9363 Заявник (код): 1690 1688

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 12.10.2020 Патент № 200650

Дата пріоритету: 08.02.2019

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення півхи	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення півхи	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 18009035 Назва сорту: П9610 Заявник (код): 9 Власник сорту (код): 9

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.12.2020

Свідство про державну реєстрацію № 201028

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	дуже сильне	9	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	сильна	3	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабе	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабе	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабе	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабе	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	дуже сильне	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,19	8,24	7,83
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,66	8,7	8,67
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,47	0,46	0,84
+, - до усередненої урожайності, %	28,4	5,6	10,7
Довірчий інтервал, т/га	0,1	0,09	0,17
Тривалість періоду вегетації, діб	113	122	123
Висота рослини, см	254,2	258,5	247,8
Вихід зерна, %	82,8	82,1	81
Висота прикріплення качана, см	93,7	91,8	93,5
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	44,8	38,1	11,6
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	4,6	4,4	4,7
Вміст білка, %	8,1	7,9	9,2
Вміст крохмалю, %	73,9	73,2	72,5
Стійкість до посухи, бал	7	6	9
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	7	8	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	8	7	6
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	8	9	7
Група стиглості (FAO)	3	3	3
Напрямок використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 19009048 Назва сорту: П9757 Заявник (код): 1690

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 12.10.2020 Патент № 200638

Дата пріоритету: 08.02.2019

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	до помірної щільності
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	до довгої
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	циліндрична	3	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлених зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	до сильного

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.**Заявка №** 19009051 **Назва сорту:** П9874 **Заявник (код):** 1690 1688**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 12.10.2020 **Патент №** 200641**Дата пріоритету:** 08.02.2019**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	до сильного
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	до середнього
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	до середнього
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	до ледь похилого
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	до помірної щільності
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	до дуже довгої
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	до середнього
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	до сильного

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 18009034 Назва сорту: П9889 Заявник (код): 9 Власник сорту (код): 9

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201027

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	до дуже сильного
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	до помірного
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	до середнього
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	до великого
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	до циліндричної
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	до середньої кількості
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,19	8,24	7,83
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,91	8,43	8,08
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,72	0,19	0,25
+, - до усередненої урожайності, %	13,8	2,3	3,2
Довірчий інтервал, т/га	0,1	0,09	0,17
Тривалість періоду вегетації, діб	112	122	124
Висота рослини, см	238,5	253,8	226,1
Вихід зерна, %	85,1	82,5	81
Висота прикріплення качана, см	97,3	99,4	95,1
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	53,2	37,7	13
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	4,5	4,7	4,4
Вміст білка, %	7,9	7,9	8,8
Вміст крохмалю, %	74,3	73,1	73,3
Стійкість до посухи, бал	6	7	9
Стійкість до вилягання, бал	9	9	7
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	8
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	8	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	6	7	4
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	8	9	8
Група стиглості (FAO)	3	3	3
Напрямок використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.**Заявка №** 18009039 **Назва сорту:** П9978 **Заявник (код):** 9 **Власник сорту (код):** 9**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 15.12.2020**Свідчення про державну реєстрацію №** 201030**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від пізнього до дуже пізнього	8	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від пізнього до дуже пізнього	8	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	дуже великий	9	
30	Качан: форма	циліндрична	3	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,21	10,51	
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,95	10,07	
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,74	-0,44	
+, - до усередненої урожайності, %	33,5	-4,2	
Довірчий інтервал, т/га	0,17	0,64	
Тривалість періоду вегетації, діб	126	129	
Висота рослини, см	249,2	263,4	
Вихід зерна, %	83	82,5	
Висота прикріплення качана, см	94,6	91,3	
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	43	31,2	
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	4,6	5,4	
Вміст білка, %	7,9	8,4	
Вміст крохмалю, %	73,7	72,6	
Стійкість до посухи, бал	5	9	
Стійкість до вилягання, бал	9	9	
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	8	5	
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	9	9	
Група стиглості (FAO)	4	4	
Напрямок використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 18009079 Назва сорту: РЖТ ЕКЗЗАКТ Заявник (код): 1783 Власник сорту (код): 1783

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201168

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення півхи	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	сильна	3	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення півхи	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запліваються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	слабке	3	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	4,94	7,82	7,21
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,81	9,02	8,37
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,87	1,2	1,16
+, - до усередненої урожайності, %	17,6	15,3	16
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,07
Тривалість періоду вегетації, діб	112	113	117
Висота рослини, см	249,7	258,1	234
Вихід зерна, %	81,9	82	79,3
Висота прикріплення качана, см	92,8	94,5	91,5
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	42,2	44,5	5,1
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	8,6	5,1	4,6
Вміст білка, %	8,4	8,5	9,6
Вміст крохмалю, %	72,5	72,9	71,3
Стійкість до посухи, бал	5	8	9
Стійкість до вилягання, бал	9	9	7
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	6	7	5
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	8	9	4
Група стиглості (FAO)	2	2	2
Напрямок використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 18009078 Назва сорту: РЖТ ІРЕНОККС Заявник (код): 1783 Власник сорту (код): 1783

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.12.2020

Свідство про державну реєстрацію № 201167

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	дуже малий	1	до малого
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	до ледь похилого
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	помірно похиле	5	до сильно похилого
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	ранній	3	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	до середнього
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	до середнього
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	4,94	7,82	7,21
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,59	8,26	8,12
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,65	0,44	0,91
+, - до усередненої урожайності, %	13,1	5,7	12,7
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,07
Тривалість періоду вегетації, діб	109	111	116
Висота рослини, см	240,2	249,2	246,9
Вихід зерна, %	83,8	83	81,1
Висота прикріплення качана, см	86,8	86,7	94,8
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	45	29,6	2,1
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	4,9	4,8	5,6
Вміст білка, %	8,6	8,7	10,6
Вміст крохмалю, %	73,3	72,8	71
Стійкість до посухи, бал	5	8	9
Стійкість до вилягання, бал	8	9	7
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	6	7	4
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	9	9	7
Група стиглості (FAO)	2	2	2
Напрямок використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 18009107 Назва сорту: РЖТ КОКСІНЕЛЛЬ Заявник (код): 1783 Власник сорту (код): 1783

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201171

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення півхи	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірно	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення півхи	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запліваються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	слабке	3	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,19	8,24	7,83
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,88	6,98	7,69
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,69	-1,26	-0,14
+, - до усередненої урожайності, %	13,3	-15,3	-1,8
Довірчий інтервал, т/га	0,1	0,09	0,17
Тривалість періоду вегетації, діб	114	123	125
Висота рослини, см	247,2	260,4	240,4
Вихід зерна, %	84,3	82,4	81,8
Висота прикріплення качана, см	94,9	88,9	92,4
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	52,3	38,8	2,8
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5	4,5	5,5
Вміст білка, %	8,5	8,1	9,3
Вміст крохмалю, %	73,1	73,2	72,3
Стійкість до посухи, бал	6	5	9
Стійкість до вилягання, бал	9	9	8
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	7	3
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	8	9	8
Група стиглості (FAO)	3	3	3
Напрямок використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 18009108 Назва сорту: РЖТ МІКАЕЛІККС Заявник (код): 1783 Власник сорту (код): 1783

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201172

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	до помірного
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	до середньої
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1	до короткої
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	до середньої
28	Качан: за довжиною	короткий	3	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,19	8,24	7,83
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,53	9,71	8,08
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,34	1,47	0,25
+, - до усередненої урожайності, %	6,6	17,9	3,2
Довірчий інтервал, т/га	0,1	0,09	0,17
Тривалість періоду вегетації, діб	116	121	124
Висота рослини, см	251,3	251,3	242,9
Вихід зерна, %	81,1	81,8	83,6
Висота прикріплення качана, см	93,3	88,7	94,6
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	50,3	38,9	2,8
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5	3,9	3,9
Вміст білка, %	8,3	8,5	9,5
Вміст крохмалю, %	73,3	72,7	71,3
Стійкість до посухи, бал	6	9	9
Стійкість до вилягання, бал	9	9	7
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	7	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	6	6	4
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	8	9	8
Група стиглості (FAO)	3	3	3
Напрямок використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 18009106 Назва сорту: РЖТ СІНФОНІККС Заявник (код): 1783 Власник сорту (код): 1783

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201170

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	до слабкого
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	великий	7	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	до середньої
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	до середньої кількості
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	4,94	7,82	7,21
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,62	9,31	8,38
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,68	1,49	1,17
+, - до усередненої урожайності, %	13,8	19	16,3
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,07
Тривалість періоду вегетації, діб	109	111	116
Висота рослини, см	239,5	252,3	244,8
Вихід зерна, %	84,3	81,9	81
Висота прикріплення качана, см	86,3	88,4	89,6
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	49,8	36,4	0,9
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5,9	4,7	5,2
Вміст білка, %	8,2	8,6	9,5
Вміст крохмалю, %	73,5	72,8	71,9
Стійкість до посухи, бал	5	9	9
Стійкість до вилягання, бал	7	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	7	9	7
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	8	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	6	7	5
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	8	9	8
Група стиглості (FAO)	2	2	2
Напрямок використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 18009072 Назва сорту: РЖТ ФЕРАРІККС ВАКСІ Заявник (код): 1783 Власник сорту (код): 1783

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.12.2020

Свідчення про державну реєстрацію № 201165

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	сильна	3	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	до помірно похилого
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волость: час цвітіння	середній	5	
9	Волость: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волость: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волость: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волость: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волость: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	до помірно похилої
14	Волость: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волость: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волость: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волость: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волость: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	до середньої
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	до середньої
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	до середньої кількості
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	воскоподібного типу
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	слабке	3	до помірного

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,19	8,24	7,83
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,55	8,2	8,69
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,36	-0,04	0,86
+, - до усередненої урожайності, %	7	-0,4	11
Довірчий інтервал, т/га	0,1	0,09	0,17
Тривалість періоду вегетації, діб	114	122	125
Висота рослини, см	235,7	252,4	235,3
Вихід зерна, %	82,3	80,4	80,9
Висота прикріплення качана, см	94	93,7	92,4
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	57,2	41	0,5
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	4,4	5	5,1
Вміст білка, %	8,3	8,3	9
Вміст крохмалю, %	73,9	73	71,7
Стійкість до посухи, бал	5	6	9
Стійкість до вилягання, бал	9	9	8
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	7	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	6	5
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	7	9	7
Група стиглості (ФАО)	3	3	3
Напрямок використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 18009055 Назва сорту: СКАНДИНАВ Заявник (код): 924 Власник сорту (код): 924

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201039

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	дуже ранній	1	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	до сильного
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	дуже ранній	1	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	до середньої
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	оранжеве	5	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	4,33	6,37	6,24
Тривалість періоду вегетації, діб	99	99	104
Висота рослини, см	240,8	222,7	226,4
Вихід зерна, %	77,9	80,5	77,6
Висота прикріплення качана, см	70	73,7	82,4
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	48,7	28	3,5
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	6	3,9	4,1
Вміст білка, %	10	9,9	10,2
Вміст крохмалю, %	72,3	71,3	71,2
Стійкість до посухи, бал	6	6	8
Стійкість до вилягання, бал	8	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	8	8
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	3	7	6
Стійкість проти гельмінтоспороїзу, бал	8	9	7
Група стиглості (FAO)	6	6	6
Напрямок використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 18009155 Назва сорту: СПАРТАН Заявник (код): 2537 Власник сорту (код): 2537

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 17.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201174

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення півхи	слабке	3	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нешільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення півхи	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запліваються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	дуже великий	9	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,19	8,24	7,83
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,56	8,73	7,73
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,37	0,49	-0,1
+, - до усередненої урожайності, %	7,2	5,9	-1,3
Довірчий інтервал, т/га	0,1	0,09	0,17
Тривалість періоду вегетації, діб	115	122	125
Висота рослини, см	232,8	254,4	231,5
Вихід зерна, %	80,7	79,2	79,1
Висота прикріплення качана, см	84,6	93,2	90,5
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	50	24,6	3,5
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	6,6	5	4,4
Вміст білка, %	8,7	8,5	10
Вміст крохмалю, %	73,1	72,8	71,7
Стійкість до посухи, бал	5	9	9
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	7	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	7	5
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	8	9	7
Група стиглості (FAO)	3	3	3
Напрямок використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 18009154 Назва сорту: Юренга Заявник (код): 2524 2436 Власник сорту (код): 2524 2436

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.12.2020

Свідство про державну реєстрацію № 201066

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	до помірного
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	до помірного
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	до сильного
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабка	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	до середньої
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	до середньої
27	Качан: ніжка за довжиною	дуже коротка	1	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	оранжеве	5	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	с	л	п
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	4,94	7,82	7,21
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,85	8,81	7,63
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,91	0,99	0,42
+, - до усередненої урожайності, %	18,5	12,7	5,8
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,07
Тривалість періоду вегетації, діб	110	113	118
Висота рослини, см	253,2	273,2	257,4
Вихід зерна, %	79	79	82,1
Висота прикріплення качана, см	91	102,4	102,8
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	47,8	11,6	0,9
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	6,8	4,9	5
Вміст білка, %	9	8,5	9,4
Вміст крохмалю, %	72,2	72,3	70,7
Стійкість до посухи, бал	5	8	9
Стійкість до вилягання, бал	7	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	6	6	5
Стійкість проти гельмінтоспорозу, бал	9	9	7
Група стиглості (FAO)	2	2	2
Напрямок використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 19909091 Назва сорту: А32879 **Заявник (код):** 2576 2676 **Власник сорту (код):** 2576 2676

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 17.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201206

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	помірне	5	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	дуже довгий	9	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 19909090 Назва сорту: А5472 Заявник (код): 2576 2676 Власник сорту (код): 2576 2676

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 17.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201205

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	дуже довгий	9	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 18909159 Назва сорту: АГ2016 **Заявник (код):** 2524 2436 **Власник сорту (код):** 2524 2436

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201100

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення півхи	дуже сильне	9	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	ранній	3	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення півхи	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	середня	5	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистий	1	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 18909161 Назва сорту: АГЖ535 Заявник (код): 2524 2436 Власник сорту (код): 2524 2436

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201101

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	дуже малий	1	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	дуже сильне	9	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	ранній	3	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	сильне	7	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нешільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	помірне	5	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	середня	5	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	велике	7	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	дуже коротка	1	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистий	1	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 18909160 Назва сорту: АГЖ955 **Заявник (код):** 2524 2436 **Власник сорту (код):** 2524 2436

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201783

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення півхи	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	сильне	7	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	сильне	7	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	сильне	7	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення півхи	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	дуже сильне	9	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 19909098 Назва сорту: АС3512СЦ Заявник (код): 2094 Власник сорту (код): 2094

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201102

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	ознака не визначається	0	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	ознака не визначається	0	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	велике	7	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	слабке	3	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 18909195 Назва сорту: ДК3172 3М **Заявник (код):** 2260 **Власник сорту (код):** 2260

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201200

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 18909196 Назва сорту: ДК3173 3М Заявник (код): 2260 Власник сорту (код): 2260

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201201

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 18909194 Назва сорту: ДКЗ173М **Заявник (код):** 2260 **Власник сорту (код):** 2260

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201199

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	пізній	7	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабе	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	пізній	7	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабе	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабе	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабе	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабе	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 18909193 Назва сорту: ДК3938МВ Заявник (код): 2260 Власник сорту (код): 2260

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201198

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	оранжеве	5	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	дуже сильне	9	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 18909198 Назва сорту: ДК4168М **Заявник (код):** 2260 **Власник сорту (код):** 2260

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201203

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	ознака не визначається	0	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	ознака не визначається	0	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	дуже малий	1	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабе	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабе	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	велике	7	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	дуже коротка	1	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 18909197 Назва сорту: ДК4168СВ3М Заявник (код): 2260 Власник сорту (код): 2260

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201202

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабе	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	дуже малий	1	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабе	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нешільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабе	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабе	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	дуже коротка	1	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 18909199 Назва сорту: ДК4540СВ3М **Заявник (код):** 2260 **Власник сорту (код):** 2260

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201204

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення півхи	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення півхи	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 18909188 Назва сорту: ДК7400М Заявник (код): 2260 Власник сорту (код): 2260

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201193

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	циліндрична	3	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 18909187 Назва сорту: ДК7400СВ3М **Заявник (код):** 2260 **Власник сорту (код):** 2260

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201192

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	дуже коротка	1	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	циліндрична	3	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 18909191 Назва сорту: ДК7443М Заявник (код): 2260 Власник сорту (код): 2260

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201196

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	сильне	7	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабе	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	велике	7	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	дуже коротка	1	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 18909172 Назва сорту: ІКС 250 М **Заявник (код):** 2260 **Власник сорту (код):** 2260

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201189

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	помірно похиле	5	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	ранній	3	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	середня	5	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	дуже вузька	1	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 18909171 Назва сорту: ІКС 259 3М Заявник (код): 2260 Власник сорту (код): 2260

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.12.2020

Свідцтво про державну реєстрацію № 201188

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 18909173 Назва сорту: ІКС 349 ЗС **Заявник (код):** 2260 **Власник сорту (код):** 2260

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201190

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	помірно похиле	5	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	середня	5	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.**Заявка № 18909147 Назва сорту:** K147 **Заявник (код):** 2535 **Власник сорту (код):** 2535**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 15.12.2020**Свідцтво про державну реєстрацію № 201098****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабе	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нешільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 18909079 Назва сорту: KB 1Ф1815 **Заявник (код):** 2649 **Власник сорту (код):** 2649

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201078

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення півхи	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	помірне	5	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення півхи	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	помірне	5	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	оранжеве	5	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабе	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 18909098 Назва сорту: KB 1ФЛ7015 Заявник (код): 2649 Власник сорту (код): 2649

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201084

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нешільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	середня	5	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 18909120 Назва сорту: KB 4EX1631 **Заявник (код):** 2649 **Власник сорту (код):** 2649

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201088

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення півхи	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від пізнього до дуже пізнього	8	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення півхи	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 18909099 Назва сорту: KB 4ЕЦ1728 Заявник (код): 2649 Власник сорту (код): 2649

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201085

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 18909119 Назва сорту: KB 4ЕЦ1732 **Заявник (код):** 2649 **Власник сорту (код):** 2649

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201087

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від пізнього до дуже пізнього	8	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	помірне	5	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	сильне	7	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	помірно похиле	5	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від пізнього до дуже пізнього	8	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	дуже довгий	9	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 18909118 Назва сорту: KB 4П1336 Заявник (код): 2649 Власник сорту (код): 2649

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201086

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	дуже пізній	9	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	дуже пізній	9	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 18909121 Назва сорту: KB 4ФП1573 **Заявник (код):** 2649 **Власник сорту (код):** 2649

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201089

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення півхи	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	дуже пізній	9	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	дуже пізній	9	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення півхи	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабе	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 18909122 Назва сорту: KB 4ФП1579 Заявник (код): 2649 Власник сорту (код): 2649

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201090

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	пізній	7	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	дуже пізній	9	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 18909124 Назва сорту: KB 5Г7544 **Заявник (код):** 2649 **Власник сорту (код):** 2649

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201092

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення півхи	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	пізній	7	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	дуже пізній	9	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення півхи	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 18909094 Назва сорту: KB 5ФЛ5018 Заявник (код): 2649 Власник сорту (код): 2649

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.12.2020

Свідцтво про державну реєстрацію № 201083

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від пізнього до дуже пізнього	8	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабе	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	праве	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	дуже пізній	9	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабе	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабе	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нешільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	слабе	3	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 18909123 Назва сорту: KB 6EY0052 **Заявник (код):** 2649 **Власник сорту (код):** 2649

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201091

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	пізній	7	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	пізній	7	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 18909135 Назва сорту: KB 7EX1761 Заявник (код): 2649 Власник сорту (код): 2649

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201096

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабе	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	пізній	7	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабе	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 18909133 Назва сорту: KB 7EX1764 **Заявник (код):** 2649 **Власник сорту (код):** 2649

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201095

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення півхи	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	пізній	7	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення півхи	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 18909136 Назва сорту: KB 7ЕЦ1789 Заявник (код): 2649 Власник сорту (код): 2649

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.12.2020

Свідцтво про державну реєстрацію № 201097

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 18909130 Назва сорту: KB 7П1484 **Заявник (код):** 2649 **Власник сорту (код):** 2649

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201093

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабе	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	пізній	7	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабе	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 18909132 Назва сорту: KB 7ФП1503 Заявник (код): 2649 Власник сорту (код): 2649

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201094

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 17909132 Назва сорту: KB 9EY0043 **Заявник (код):** 2649 **Власник сорту (код):** 2649

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201070

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення півхи	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	дуже малий	1	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення півхи	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	середня	5	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 18909078 Назва сорту: KB 9EY0046 Заявник (код): 2649 Власник сорту (код): 2649

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201077

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабе	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	оранжеве	5	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабе	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 18909088 **Назва сорту:** KB 9EY0067 **Заявник (код):** 2649 **Власник сорту (код):** 2649

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201080

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення півхи	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення півхи	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	середня	5	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	дуже вузька	1	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 18909077 Назва сорту: KB 9EY0069 **Заявник (код):** 2649 **Власник сорту (код):** 2649

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201076

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	сильне	7	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	дуже сильне	9	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нешільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабе	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 18909091 Назва сорту: KB 9EY0070 **Заявник (код):** 2649 **Власник сорту (код):** 2649

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201081

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення півхи	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення півхи	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	велике	7	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 18909087 Назва сорту: KB 9EY0071 **Заявник (код):** 2649 **Власник сорту (код):** 2649

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201079

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 18909092 Назва сорту: КВСЕК 537 **Заявник (код):** 2649 **Власник сорту (код):** 2649

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201082

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	оранжеве	5	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	червоно-оранжеве	6	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 18909186 Назва сорту: Крос245М Заявник (код): 2260 Власник сорту (код): 2260

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.12.2020

Свідцтво про державну реєстрацію № 201191

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	дуже вузька	1	
27	Качан: ніжка за довжиною	дуже коротка	1	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	велика	7	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 18909192 Назва сорту: Крос272М **Заявник (код):** 2260 **Власник сорту (код):** 2260

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201197

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення півхи	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення півхи	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 18909190 Назва сорту: Крос368М Заявник (код): 2260 Власник сорту (код): 2260

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201195

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	ознака не визначається	0	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	ознака не визначається	0	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 18909189 Назва сорту: Крос454М **Заявник (код):** 2260 **Власник сорту (код):** 2260

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201194

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення півхи	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення півхи	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 18909068 Назва сорту: ЛЖН2098 Заявник (код): 924 Власник сорту (код): 924

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201072

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	сильне	7	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусна	1	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистий	1	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	оранжеве	5	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 18909073 Назва сорту: ЛКФ2757 **Заявник (код):** 924 **Власник сорту (код):** 924

Дата пріоритету: 25.10.2018

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201075

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення півхи	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	пізній	7	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабе	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабе	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	пізній	7	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабе	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабе	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення півхи	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 18909067 Назва сорту: ЛМР3185 Заявник (код): 924 Власник сорту (код): 924

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.12.2020

Свідцтво про державну реєстрацію № 201071

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від дуже раннього до раннього	2	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	сильне	7	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від дуже раннього до раннього	2	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	дуже вузька	1	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистий	1	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 18909069 Назва сорту: ЛПХ3916 **Заявник (код):** 924 **Власник сорту (код):** 924

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201073

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	від округлої до лопатоподібної	4	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	пізній	7	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	пізній	7	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 18909071 Назва сорту: ЛПХ3917 Заявник (код): 924 Власник сорту (код): 924

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.12.2020

Свідцтво про державну реєстрацію № 201074

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від пізнього до дуже пізнього	8	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабе	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабе	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від пізнього до дуже пізнього	8	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабе	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабе	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нешільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 16909148 Назва сорту: ПК 1116 М **Заявник (код):** 2257 **Власник сорту (код):** 2257

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.10.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200813

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	пізній	7	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабе	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабе	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	пізній	7	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабе	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	середня	5	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 19909017 Назва сорту: ПК 114 Заявник (код): 2257 Власник сорту (код): 2257

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 22.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201788

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нешільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	середня	5	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусна	1	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 19909019 Назва сорту: ПК 1313 **Заявник (код):** 2257 **Власник сорту (код):** 2257

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 22.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201785

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення півхи	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення півхи	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	середня	5	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 19909018 Назва сорту: ПК 155 Заявник (код): 2257 Власник сорту (код): 2257

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 22.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201786

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	середня	5	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	оранжеве	5	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 19909016 Назва сорту: ПК 210 **Заявник (код):** 2257 **Власник сорту (код):** 2257

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 22.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201787

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення півхи	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від пізнього до дуже пізнього	8	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	дуже пізній	9	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення півхи	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	слабке	3	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 19909020 Назва сорту: ПК 211 Заявник (код): 2257 Власник сорту (код): 2257

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 22.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201784

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	дуже довгий	9	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 18909084 Назва сорту: P13036 Заявник (код): 1783 Власник сорту (код): 1783

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201182

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення півхи	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірно	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення півхи	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірно	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.**Заявка № 18909085 Назва сорту:** P15076 **Заявник (код):** 1783 **Власник сорту (код):** 1783**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 18.12.2020**Свідоцтво про державну реєстрацію № 201183****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабе	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	помірно похиле	5	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	ранній	3	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	малий	3	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистий	1	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	оранжеве	5	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабе	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 18909097 Назва сорту: P17065 Заявник (код): 1783 Власник сорту (код): 1783

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201185

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 18909101 Назва сорту: P17098 Заявник (код): 1783 Власник сорту (код): 1783

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201187

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	оранжеве	5	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 18909086 Назва сорту: P18020 Заявник (код): 1783 Власник сорту (код): 1783

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201184

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення півхи	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	сильне	7	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення півхи	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 18909100 Назва сорту: РФА58II Заявник (код): 793 Власник сорту (код): 793

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 17.12.2020

Свідство про державну реєстрацію № 201186

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабе	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 18909158 Назва сорту: СМ395 Заявник (код): 2524 2436 Власник сорту (код): 2524 2436

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201099

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Овес голозерний *Avena nuda* L.**Заявка № 18520001 Назва сорту:** Родоніт **Заявник (код):** 2260 **Власник сорту (код):** 2260**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 18.11.2020 **Патент №** 200776**Дата пріоритету:** 13.12.2018**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 09.11.2020**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 200899**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус	напівпрямий	3	
2	Найнижчі листки: опушення пластинки	відсутнє або дуже слабке	1	
3	Листкова пластинка: опушення країв листка	відсутнє або дуже слабке	1	
4	Рослина: частота рослин із закрученими прапорцевими листками	рідко	3	
5	Час викидання волоті (на 50% волотей видно перший вторинний колосок)	середній	5	
6	Стебло: опушеність найвищого вузла	відсутнє	1	
7	Стебло: інтенсивність опушення найвищого вузла	дуже слабка	1	
8	Волоть: орієнтація гілочок	одногріва	1	
9	Волоть: положення гілочок	поникле	7	
10	Волоть: положення вторинних колосків	поникле	2	
11	Колоскові луски: сіруватість	слабка	3	
12	Колоскові луски: за довжиною	середні	5	
13	Первинна зернівка: сіруватість нижньої квіткової луски	наявна	9	
14	Первинна зернівка: інтенсивність сіруватості нижньої квіткової луски	слабка	3	
15	Рослина: за висотою	середня	5	
16	Волоть: за довжиною	середня	5	
17	Зернівка: плівка	відсутня	1	
18	Первинна зернівка: тенденція до остистості	відсутня або дуже слабка	1	
19	Первинна зернівка: нижня квіткова луска за довжиною	довга	7	
20	Зернівка: забарвлення нижньої квіткової луски	біле	1	
21	Первинна зернівка: опушення спинки нижньої квіткової луски	відсутнє	1	
22	Первинна зернівка: опушення основи	відсутнє або дуже слабке	1	
23	Первинна зернівка: базальні волоски за довжиною	ознака не визначалась	0	
24	Первинна зернівка: стрижень другої зернівки за довжиною	довгий	7	
25	Тип розвитку	ярий	2	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га		2,99	2,98
Тривалість періоду вегетації, діб		100	89
Висота рослини, см		100	97
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г		26,6	24,4
Стійкість до вилягання, бал		8	8
Стійкість до обсіпання, бал		9	9
Стійкість до посухи, бал		7	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал		8	8
Стійкість проти корончастої іржі, бал		8	7
Стійкість проти твердої сажки, бал		9	8
Стійкість проти внутрішньостеблових шкідників, бал		9	9
Вміст білка, %		15,5	16,1
Напрямок використання		х	х

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Овес посівний (ярий) *Avena sativa* L.

Заявка № 18011003 Назва сорту: Азамат **Заявник (код):** 2260 **Власник сорту (код):** 2260

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 18.11.2020 **Патент № 200777**

Дата пріоритету: 13.12.2018

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 10.11.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200901

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус	напівпрямий	3	
2	Найнижчі листки: опушення пластинки	відсутнє або дуже слабке	1	
3	Листкова пластинка: опушення країв листка	відсутнє або дуже слабке	1	
4	Рослина: частота рослин із закрученими прапорцевими листками	відсутні або дуже рідко	1	
5	Час викидання волоті (на 50% волотей видно перший вторинний колосок)	середній	5	
6	Стебло: опушення найвищого вузла	відсутнє	1	
7	Стебло: інтенсивність опушення найвищого вузла	дуже слабка	1	
8	Волоть: орієнтація гілочок	одногріва	1	
9	Волоть: положення гілочок	поникле	7	
10	Волоть: положення вторинних колосків	поникле	2	
11	Колоскові луски: сіруватість	слабка	3	
12	Колоскові луски: за довжиною	середні	5	
13	Первинна зернівка: сіруватість нижньої квіткової луски	відсутня	1	
14	Первинна зернівка: інтенсивність сіруватості нижньої квіткової луски	дуже слабка	1	
15	Рослина: за висотою	висока	7	
16	Волоть: за довжиною	середня	5	
17	Зернівка: плівка	наявна	9	
18	Первинна зернівка: тенденція до остистості	відсутня або дуже слабка	1	
19	Первинна зернівка: нижня квіткова луска за довжиною	середня	5	
20	Зернівка: забарвлення нижньої квіткової луски	біле	1	
21	Первинна зернівка: опушення спинки нижньої квіткової луски	відсутнє	1	
22	Первинна зернівка: опушення основи	відсутнє або дуже слабке	1	
23	Первинна зернівка: базальні волоски за довжиною	короткі	3	
24	Первинна зернівка: стрижень другої зернівки за довжиною	середній	5	
25	Тип розвитку	ярий	2	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		3,81	3,57
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га		4,38	3,89
+, - до усередненої урожайності, т/га		0,57	0,32
+, - до усередненої урожайності, %		15	9,1
Довірчий інтервал, т/га		0,28	0,15
Тривалість періоду вегетації, діб		99	87
Висота рослини, см		95,9	94,9
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г		32,5	33,5
Вміст білка, %		12,4	12,1
Плівковість, %		30,8	28,2
Стійкість до вилягання, бал		6	4
Стійкість до обсіпання, бал		9	9
Стійкість до посухи, бал		8	6
Стійкість проти борошнистої роси, бал		9	7
Стійкість проти корончастої іржі, бал		9	7
Стійкість проти твердої сажки, бал		9	7
Стійкість проти внутрішньостеблових шкідників, бал		9	9
Напрямок використання		х	х

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Овес посівний (ярий) *Avena sativa* L.**Заявка № 18011001 Назва сорту:** Ерл **Заявник (код):** 2524 **Власник сорту (код):** 2524**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.10.2020**Свідчення про державну реєстрацію № 200815****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус	напівпрямий	3	
2	Найнижчі листки: опушення пластинки	відсутнє або дуже слабке	1	
3	Листкова пластинка: опушення країв листка	відсутнє або дуже слабке	1	
4	Рослина: частота рослин із закрученими прапорцевими листками	рідко	3	
5	Час викидання волоті (на 50% волотей видно перший вторинний колосок)	середній	5	
6	Стебло: опушення найвищого вузла	наявне	9	
7	Стебло: інтенсивність опушення найвищого вузла	дуже слабка	1	
8	Волоть: орієнтація гілочок	розкидиста	3	
9	Волоть: положення гілочок	напівпряме	3	
10	Волоть: положення вторинних колосків	поникле	2	
11	Колоскові луски: сіруватість	помірна	5	
12	Колоскові луски: за довжиною	довгі	7	
13	Первинна зернівка: сіруватість нижньої квіткової луски	наявна	9	
14	Первинна зернівка: інтенсивність сіруватості нижньої квіткової луски	помірна	5	
15	Рослина: за висотою	висока	7	
16	Волоть: за довжиною	середня	5	
17	Зернівка: плівка	наявна	9	
18	Первинна зернівка: тенденція до остистості	помірна	5	
19	Первинна зернівка: нижня квіткова луска за довжиною	середня	5	
20	Зернівка: забарвлення нижньої квіткової луски	біле	1	
21	Первинна зернівка: опушення спинки нижньої квіткової луски	відсутнє	1	
22	Первинна зернівка: опушення основи	слабке	3	
23	Первинна зернівка: базальні волоски за довжиною	короткі	3	
24	Первинна зернівка: стрижень другої зернівки за довжиною	довгий	7	
25	Тип розвитку	ярий	2	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		3,81	3,57
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га		4,93	4,36
+, - до усередненої урожайності, т/га		1,12	0,79
+, - до усередненої урожайності, %		29,3	22
Довірчий інтервал, т/га		0,28	0,15
Тривалість періоду вегетації, діб		98	85
Висота рослини, см		94,1	92,5
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г		33,2	32,4
Вміст білка, %		11,8	12,8
Плівковість, %		28,1	25,1
Стійкість до вилягання, бал		6	6
Стійкість до обсіпання, бал		9	9
Стійкість до посухи, бал		8	6
Стійкість проти борошнистої роси, бал		9	7
Стійкість проти корончастої іржі, бал		9	6
Стійкість проти твердої сажки, бал		9	9
Стійкість проти внутрішньостеблових шкідників, бал		9	9
Напрямок використання		х	х

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Овес посівний (ярий) *Avena sativa* L.

Заявка № 18011002 Назва сорту: Матрос **Заявник (код):** 1990 **Власник сорту (код):** 1990

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 17.11.2020 **Патент № 200694**

Дата пріоритету: 26.10.2018

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 17.11.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200900

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус	напівпрямий	3	
2	Найнижчі листки: опушення пластинки	відсутнє або дуже слабке	1	
3	Листкова пластинка: опушення країв листка	відсутнє або дуже слабке	1	
4	Рослина: частота рослин із закрученими прапорцевими листками	рідко	3	
5	Час викидання волоті (на 50% волотей видно перший вторинний колосок)	середній	5	
6	Стебло: опушення найвищого вузла	відсутнє	1	
7	Стебло: інтенсивність опушення найвищого вузла	дуже слабка	1	
8	Волоть: орієнтація гілочок	одногріва	1	
9	Волоть: положення гілочок	поникле	7	
10	Волоть: положення вторинних колосків	поникле	2	
11	Колоскові луски: сіруватість	слабка	3	
12	Колоскові луски: за довжиною	довгі	7	
13	Первинна зернівка: сіруватість нижньої квіткової луски	відсутня	1	
14	Первинна зернівка: інтенсивність сіруватості нижньої квіткової луски	дуже слабка	1	
15	Рослина: за висотою	висока	7	
16	Волоть: за довжиною	довга	7	
17	Зернівка: плівка	наявна	9	
18	Первинна зернівка: тенденція до остистості	помірна	5	
19	Первинна зернівка: нижня квіткова луска за довжиною	середня	5	
20	Зернівка: забарвлення нижньої квіткової луски	жовте	2	
21	Первинна зернівка: опушення спинки нижньої квіткової луски	відсутнє	1	
22	Первинна зернівка: опушення основи	слабке	3	
23	Первинна зернівка: базальні волоски за довжиною	короткі	3	
24	Первинна зернівка: стрижень другої зернівки за довжиною	середній	5	
25	Тип розвитку	ярий	2	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		3,81	3,57
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га		4,81	4,33
+, - до усередненої урожайності, т/га		1	0,76
+, - до усередненої урожайності, %		26,1	21,4
Довірчий інтервал, т/га		0,28	0,15
Тривалість періоду вегетації, діб		99	88
Висота рослини, см		92,4	91,9
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г		34,8	34,7
Вміст білка, %		11,3	11,8
Плівковість, %		30,9	27,3
Стійкість до вилягання, бал		5	7
Стійкість до обсіпання, бал		9	9
Стійкість до посухи, бал		8	6
Стійкість проти борошнистої роси, бал		8	7
Стійкість проти корончастої іржі, бал		9	6
Стійкість проти твердої сажки, бал		9	8
Стійкість проти внутрішньостеблових шкідників, бал		9	9
Напрямок використання		х	х

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.

Заявка № 15012066 Назва сорту: Агота Заявник (код): 2597 Власник сорту (код): 2597

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 20.11.2020

Свідство про державну реєстрацію № 200909

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеопиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	відсутня або дуже мала	1	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	помірний	5	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	циліндрична	2	
12	Колос: за щільністю	середній	5	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	короткі	3	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	слабке	3	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	середнє	5	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	пряме	3	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	дуже короткий	1	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	середньо зігнутий	5	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квітова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	2	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	світле	3	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	велике	7	
30	Зернівка: за крупністю	крупна	7	
31	Язичок: виявлення	короткий	3	
32	Нижня квітова луска: кінь	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	шилоподібні	3	
34	Колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	овальна	2	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,11	6,49	5,76
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	4,39	6,59	5,91
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,72	0,1	0,15
+, - до усередненої урожайності, %	-14	1,5	2,6
Довірчий інтервал, т/га	0,06	0,06	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	257	267	267
Висота рослини, см	86,3	91,9	100,3
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	41,8	43,4	43,1
Вміст білка, %	13,6	13,9	13,5
Вміст сирової клейковини, %	26,9	27,9	26,8
Сила борошна (W), о.а.	189	200	171
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	960	950	930
Стійкість до вилягання, бал	9	8	8
Стійкість до обсіпання, бал	8	8	8
Стійкість до посухи, бал	8	8	8
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	8	9
Стійкість проти бурі іржі, бал	9	9	8
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	9	8
Стійкість проти мухи шведської, бал	9	9	8
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	8	8	9
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	8	8
Морозостійкість за проморожування (за даними Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва), бал	5,0		
Блок	1	1	1
Напрямок використання	Ф	Ф	Ф

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.

Заявка № 15012068 Назва сорту: Адіса **Заявник (код):** 2597 **Власник сорту (код):** 2597

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 04.12.2020 **Патент №** 200786

Дата пріоритету: 16.12.2015

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.10.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200821

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	прямий	1	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	мала	3	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	ранній	3	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	до дуже сильного
7	Колос: восковий наліт	помірний	5	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабо виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	циліндрична	2	
12	Колос: за щільністю	середній	5	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	до довгого
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	короткі	3	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	слабке	3	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	вузьке	3	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	пряме	3	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	дуже короткий	1	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	3	
22	Нижня колоскова луска. опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квітова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	2	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	помірне	5	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	велике	7	
30	Зернівка: за крупністю	крупна	7	
31	Язичок: виявлення	короткий	3	
32	Нижня квітова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	овальна	2	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,28	6,71	5,87
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	4,66	5,83	6,02
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,62	-0,88	0,15
+, - до усередненої урожайності, %	-11,7	-13,1	2,6
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,05
Тривалість періоду вегетації, діб	262	261	270
Висота рослини, см	90,7	95,4	107,2
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	42,4	44,5	42,4
Вміст білка, %	14,3	14,6	13,6
Вміст сирової клейковини, %	28,4	28,8	26,6
Сила борошна (W), о.а.	230	245	229
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	955	930	960
Стійкість до вилягання, бал	8	8	8
Стійкість до обсіпання, бал	8	7	8
Стійкість до посухи, бал	7	6	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал	8	7	8
Стійкість проти бурі іржі, бал	8	8	5
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	8	8	7
Стійкість проти мухи шведської, бал	9	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	7	9
Зимостійкість: польова оцінка, бал	7	7	7
Морозостійкість за проморожування (за даними Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва), бал	6,5		
Блок	1	1	1
Напрямок використання	ф	ф	ф

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: П.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.**Заявка №** 18012005 **Назва сорту:** Академічна 100 **Заявник (код):** 355 **Власник сорту (код):** 355**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 17.11.2020 **Патент №** 200789**Дата пріоритету:** 23.02.2018**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 06.11.2020**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 200921**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	середня	5	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	помірний	5	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	помірний	5	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	помірно виповнена	5	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	циліндрична	2	
12	Колос: за щільністю	середній	5	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	довгий	7	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	середні	5	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	слабке	3	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	середнє	5	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	скошене	1	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	короткий	3	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	3	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квітова луска. Зубець: за формою	середньо зігнутий	3	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	помірне	5	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	крупна	7	
31	Язичок: виявлення	короткий	3	
32	Нижня квітова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	овальна	2	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,28	6,71	5,87
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	4,81	6,54	6,03
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,47	-0,17	0,16
+, - до усередненої урожайності, %	-8,9	-2,5	2,7
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,05
Тривалість періоду вегетації, діб	267	258	272
Висота рослини, см	86,1	91	96,7
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	39	43	40,3
Вміст білка, %	14,1	13,2	13,4
Вміст сирової клейковини, %	28	26,5	26,4
Сила борошна (W), о.а.	197	247	132
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	800	985	830
Стійкість до вилягання, бал	8	8	8
Стійкість до обсіпання, бал	9	8	9
Стійкість до посухи, бал	6	7	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал	7	8	7
Стійкість проти бурі іржі, бал	9	6	5
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	7	7
Стійкість проти мухи шведської, бал	9	9	8
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	8	9
Зимостійкість: польова оцінка, бал	6	7	8
Морозостійкість за проморожування (за даними Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва), бал	6		
Блок	1	1	1
Напрямок використання	Ф	Ф	Ф

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: П.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.

Заявка № 18012035 Назва сорту: Аквілегія Заявник (код): 1698 Власник сорту (код): 1698

Дата пріоритету: 23.05.2018

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 04.11.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200825

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	слабке	3	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	мала	3	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	ранній	3	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	помірний	5	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	низька	3	до середньої
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабо виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	веретеноподібна	5	
12	Колос: за щільністю	середній	5	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні остюки	3	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	дуже довгі	9	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	відсутнє або дуже слабе	1	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	вузьке	3	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	скошене	1	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	середній	5	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	3	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квітова луска. Зубець: за формою	ознака не визначається	0	
24	Зернівка: забарвлення	біле	1	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	помірне	5	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	крупна	7	
31	Язичок: виявлення	короткий	3	
32	Нижня квітова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	яйцеподібна	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,28	6,71	5,87
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,51	6,6	5,35
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,23	-0,11	-0,52
+, - до усередненої урожайності, %	4,3	-1,6	-8,8
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,05
Тривалість періоду вегетації, діб	267	256	270
Висота рослини, см	82,6	83,6	90,7
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	39,7	42,7	42
Вміст білка, %	13,2	14,2	14,3
Вміст сирової клейковини, %	26,4	27,9	27,1
Сила борошна (W), о.а.	272	324	326
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1130	1020	1140
Стійкість до вилягання, бал	8	7	5
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	7
Стійкість до посухи, бал	7	7	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал	8	7	7
Стійкість проти бурі іржі, бал	9	7	6
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	8	6
Стійкість проти мухи шведської, бал	9	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	8	8
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	7	7
Морозостійкість за проморожування (за даними Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва), бал	6,8		
Блок	1	1	1
Напрямок використання	цїн	слн	слн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.**Заявка № 15012070 Назва сорту:** Анрі **Заявник (код):** 2597 **Власник сорту (код):** 2597**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 20.11.2020**Свідчення про державну реєстрацію №** 200911**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеопиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	слабке	3	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	відсутня або дуже мала	1	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	помірний	5	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	помірний	5	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	низька	3	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	циліндрична	2	
12	Колос: за щільністю	середній	5	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	дуже короткі	1	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	помірне	5	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	вузьке	3	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	скошене	1	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	короткий	3	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	середньо зігнутий	5	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квітова луска. Зубець: за формою	дуже зігнутий	4	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	світле	3	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	коротка	3	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	середня	5	
31	Язичок: виявлення	короткий	3	
32	Нижня квітова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	овально-ланцетна	3	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	с	л	п
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	4,9	6,38	5,45
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	3,9	6,42	5,71
+, - до усередненої урожайності, т/га	-1	0,04	0,26
+, - до усередненої урожайності, %	-20,5	0,7	4,8
Довірчий інтервал, т/га	0,19	0,19	0,14
Тривалість періоду вегетації, діб	258	268	268
Висота рослини, см	62,6	75,9	83,5
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	36,1	37,8	37,9
Вміст білка, %	13,7	13,7	13
Вміст сирової клейковини, %	27,3	28,4	25,9
Сила борошна (W), о.а.	162	194	161
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	810	840	800
Стійкість до вилягання, бал	8	8	8
Стійкість до обсіпання, бал	8	8	8
Стійкість до посухи, бал	7	8	8
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	9	8
Стійкість проти бурі іржі, бал	8	8	8
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	8	8
Стійкість проти мухи шведської, бал	9	9	8
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	8	8	9
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	8	8
Морозостійкість за проморожування (за даними Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва), бал	3,0		
Блок	2	2	2
Напрямок використання	ф	ф	ф

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: П.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.

Заявка № 16140001 Назва сорту: Арабатка **Заявник (код):** 1123 **Власник сорту (код):** 1123

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 24.11.2020 **Патент №** 200787

Дата пріоритету: 15.06.2016

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 09.11.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200918

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	велика	7	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	помірний	5	до сильного
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	помірний	5	до сильного
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	виповнена	7	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	циліндрична	2	
12	Колос: за щільністю	нещільний	3	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	довгий	7	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	середні	5	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	помірне	5	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	вузьке	3	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	піднесене	4	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	короткий	3	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	прямий	1	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квітова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	2	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	світле	3	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	середня	5	до крупної
31	Язичок: виявлення	короткий	3	
32	Нижня квітова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	овально-ланцетна	3	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,28	6,71	5,87
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,35	6,31	5,57
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,07	-0,4	-0,3
+, - до усередненої урожайності, %	1,3	-5,9	-5
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,05
Тривалість періоду вегетації, діб	263	262	271
Висота рослини, см	84,5	90,6	91,4
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	43,8	42,2	40,6
Вміст білка, %	13,5	13,9	13,8
Вміст сирої клейковини, %	27	27,8	27,6
Сила борошна (W), о.а.	202	263	217
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	810	1040	950
Стійкість до вилягання, бал	8	8	7
Стійкість до обсіпання, бал	6	8	8
Стійкість до посухи, бал	15	22	21
Стійкість проти борошнистої роси, бал	8	7	6
Стійкість проти бурі іржі, бал	8	8	7
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	8	9	7
Стійкість проти мухи шведської, бал	8	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	8	7	9
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	8	8
Морозостійкість за проморожування (за даними Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва), бал	8		
Блок	1	1	1
Напрямок використання	ф	цїн	ф

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.

Заявка № 18012043 Назва сорту: Архітект Заявник (код): 807 Власник сорту (код): 807

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 21.10.2020 Патент № 200706

Дата пріоритету: 07.06.2018

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 02.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200982

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеопіль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напіврозлогий	5	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабе	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	відсутня або дуже мала	1	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний	5	
7	Колос: восковий наліт	сильний	7	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабо виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	циліндрична	2	
12	Колос: за щільністю	середній	5	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	довгий	7	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	дуже короткі	1	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	слабке	3	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	вузьке	3	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	пряме	3	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	короткий	3	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	3	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квітова луска. Зубець: за формою	середньо зігнутий	3	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	помірне	5	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	середня	5	
31	Язичок: виявлення	короткий	3	
32	Нижня квітова луска: кінь	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	яйцеподібна	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,28	6,71	5,87
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,16	6,53	6,37
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,12	-0,18	0,5
+, - до усередненої урожайності, %	-2,3	-2,6	8,6
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,05
Тривалість періоду вегетації, діб	269	260	274
Висота рослини, см	78,5	86,3	91,8
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	36,2	41,5	38,4
Вміст білка, %	14,1	13,6	13,2
Вміст сирової клейковини, %	28,2	26,8	26,5
Сила борошна (W), о.а.	267	284	261
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1090	1000	1020
Стійкість до вилягання, бал	9	8	8
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	9
Стійкість до посухи, бал	7	7	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал	8	8	8
Стійкість проти бурі іржі, бал	9	7	6
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	8	6
Стійкість проти мухи шведської, бал	9	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	8	9
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	7	8
Морозостійкість за проморожування (за даними Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва), бал	4,8		
Блок	1	1	1
Напрямок використання	цїн	цїн	цїн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: П.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.

Заявка № 18012044 Назва сорту: Аскабан Заявник (код): 807 Власник сорту (код): 807

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 21.10.2020 Патент № 200707

Дата пріоритету: 07.06.2018

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 02.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200978

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напіврозлогий	5	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	відсутня або дуже мала	1	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	слабкий	3	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	помірний	5	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабо виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	циліндрична	2	
12	Колос: за щільністю	середній	5	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	довгий	7	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	короткі	3	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	слабке	3	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	відсутнє або дуже вузьке	1	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	піднесене	4	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	короткий	3	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	середньо зігнутий	5	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квітова луска. Зубець: за формою	дуже зігнутий	4	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	помірне	5	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	крупна	7	
31	Язичок: виявлення	короткий	3	
32	Нижня квітова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	яйцеподібна	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,28	6,71	5,87
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,21	6,44	6,29
±, - до усередненої урожайності, т/га	-0,07	-0,27	0,42
±, - до усередненої урожайності, %	-1,4	-4	7,2
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,05
Тривалість періоду вегетації, діб	269	259	273
Висота рослини, см	82,9	86,8	92,1
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	40,9	43,6	42,8
Вміст білка, %	14	14,3	13,1
Вміст сирової клейковини, %	28	29,2	26,3
Сила борошна (W), о.а.	279	304	207
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	980	920	890
Стійкість до вилягання, бал	9	8	7
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	9
Стійкість до посухи, бал	7	7	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал	7	9	8
Стійкість проти бурі іржі, бал	8	7	6
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	7	6
Стійкість проти мухи шведської, бал	8	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	8	8	9
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	6	7
Морозостійкість за проморожування (за даними Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва), бал	4,5		
Блок	1	1	1
Напрямок використання	цїн	слн	ф

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: П.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.**Заявка № 18012052 Назва сорту:** Асорті **Заявник (код):** 1797 **Власник сорту (код):** 1797**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 21.10.2020 **Патент №** 200661**Дата пріоритету:** 27.06.2018**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 26.10.2020**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 200830**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напіврозлогий	5	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабе	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	мала	3	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	пізній	7	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	помірний	5	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	помірний	5	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	виповнена	7	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1	
12	Колос: за щільністю	середній	5	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	довгий	7	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	дуже короткі	1	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	слабке	3	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	середнє	5	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	пряме	3	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	короткий	3	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	прямий	1	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квітова луска. Зубець: за формою	з дуже значним перегином	5	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	світле	3	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	середня	5	
31	Язичок: виявлення	короткий	3	
32	Нижня квітова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	яйцеподібна	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,28	6,71	5,87
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	4,87	6,87	6,6
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,41	0,16	0,73
+, - до усередненої урожайності, %	-7,7	2,5	12,5
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,05
Тривалість періоду вегетації, діб	269	260	275
Висота рослини, см	78,6	85,1	88,4
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	37,8	44,3	41,3
Вміст білка, %	14,1	13,9	12,9
Вміст сирової клейковини, %	28,2	28,5	25,7
Сила борошна (W), о.а.	272	260	289
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	950	950	1000
Стійкість до вилягання, бал	9	8	7
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	9
Стійкість до посухи, бал	7	7	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал	8	8	7
Стійкість проти бурі іржі, бал	9	7	8
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	8	6
Стійкість проти мухи шведської, бал	8	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	8	9
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	8	7
Морозостійкість за проморожування (за даними Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва), бал	5		
Блок	1	1	1
Напрямок використання	цїн	цїн	цїн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.

Заявка № 15012067 Назва сорту: Астерія Заявник (код): 2597 Власник сорту (код): 2597

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 20.11.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200910

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	відсутня або дуже мала	1	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	ранній	3	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	помірний	5	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	циліндрична	2	
12	Колос: за щільністю	середній	5	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні остюки	3	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	дуже довгі	9	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	помірне	5	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	відсутнє або дуже вузьке	1	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	скошене	1	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	короткий	3	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	середньо зігнутий	5	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квітова луска. Зубець: за формою	ознака не визначається	0	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	світле	3	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	велике	7	
30	Зернівка: за крупністю	середня	5	
31	Язичок: виявлення	короткий	3	
32	Нижня квітова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	овальна	2	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,11	6,49	5,76
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	4,89	6,61	5,83
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,22	0,12	0,07
+, - до усередненої урожайності, %	-4,4	1,8	1,3
Довірчий інтервал, т/га	0,06	0,06	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	256	265	263
Висота рослини, см	77,9	86,2	90,2
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	42,6	41,7	40,9
Вміст білка, %	13,2	13,3	13,2
Вміст сирової клейковини, %	26,3	26,7	26,8
Сила борошна (W), о.а.	183	260	249
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	870	820	900
Стійкість до вилягання, бал	9	9	8
Стійкість до обсіпання, бал	8	9	8
Стійкість до посухи, бал	8	8	8
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	8	8
Стійкість проти бурі іржі, бал	8	8	7
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	9	8
Стійкість проти мухи шведської, бал	9	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	8	8	9
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	8	8
Морозостійкість за проморожування (за даними Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва), бал	6,0		
Блок	1	1	1
Напрямок використання	ф	цін	ф

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.

Заявка № 18012019 Назва сорту: АФК ЕЛІТ ГРЕЙН Заявник (код): 655 Власник сорту (код): 655

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 24.11.2020

Свідчення про державну реєстрацію № 201218

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеопиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	мала	3	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний	5	
7	Колос: восковий наліт	слабкий	3	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	слабкий	3	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабо виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	циліндрична	2	
12	Колос: за щільністю	середній	5	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні остюки	3	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	дуже довгі	9	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	слабке	3	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	вузьке	3	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	скошене	1	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	середній	5	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	середньо зігнутий	5	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квітова луска. Зубець: за формою	ознака не визначається	0	
24	Зернівка: забарвлення	біле	1	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	темне	7	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	довга	7	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	велике	7	
30	Зернівка: за крупністю	крупна	7	
31	Язичок: виявлення	короткий	3	
32	Нижня квітова луска: кінь	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	овально-ланцетна	3	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,28	6,71	5,87
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,18	6,79	6,01
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,1	0,08	0,14
+, - до усередненої урожайності, %	-1,9	1,3	2,5
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,05
Тривалість періоду вегетації, діб	264	257	272
Висота рослини, см	89,3	94,9	101,1
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	43,2	44	39,7
Вміст білка, %	13,9	13,6	13
Вміст сирової клейковини, %	27,9	27,7	25,7
Сила борошна (W), о.а.	248	249	240
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	900	910	920
Стійкість до вилягання, бал	7	5	5
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	9
Стійкість до посухи, бал	7	9	6
Стійкість проти борошнистої роси, бал	8	6	7
Стійкість проти бурі іржі, бал	7	7	7
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	8	6
Стійкість проти мухи шведської, бал	8	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	8	9
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	8	9
Морозостійкість за проморожування (за даними Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва), бал	6,5		
Блок	1	1	1
Напрямок використання	Ф	Ф	Ф

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.

Заявка № 18012021 Назва сорту: АФК ПАУЕР Заявник (код): 655 Власник сорту (код): 655

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 24.11.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201220

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	мала	3	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	пізній	7	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	помірний	5	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	помірний	5	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	циліндрична	2	
12	Колос: за щільністю	середній	5	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	довгий	7	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні остюки	3	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	дуже довгі	9	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	слабке	3	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	відсутнє або дуже вузьке	1	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	піднесене	4	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	довгий	7	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	середньо зігнутий	5	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квітова луска. Зубець: за формою	ознака не визначається	0	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	помірне	5	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	крупна	7	
31	Язичок: виявлення	короткий	3	
32	Нижня квітова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	яйцеподібна	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,28	6,71	5,87
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,39	7,39	6,24
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,11	0,68	0,37
+, - до усередненої урожайності, %	2,1	10,1	6,2
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,05
Тривалість періоду вегетації, діб	268	260	276
Висота рослини, см	86,6	88,5	92,1
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	41,3	44,4	42,2
Вміст білка, %	14,1	13,4	13,2
Вміст сирової клейковини, %	27,9	27,2	26,2
Сила борошна (W), о.а.	148	268	254
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	810	970	950
Стійкість до вилягання, бал	9	9	6
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	9
Стійкість до посухи, бал	8	7	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал	8	7	6
Стійкість проти бурі іржі, бал	8	9	8
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	7	6
Стійкість проти мухи шведської, бал	9	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	8	8	9
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	8	7
Морозостійкість за проморожування (за даними Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва), бал	5,5		
Блок	1	1	1
Напрямок використання	ф	цін	ф

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.

Заявка № 18012020 Назва сорту: АФК СТРОНГ Заявник (код): 655 Власник сорту (код): 655

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 24.11.2020

Свідчення про державну реєстрацію № 201219

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеопиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напіврозлогий	5	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	середня	5	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний	5	
7	Колос: восковий наліт	помірний	5	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1	
12	Колос: за щільністю	нешільний	3	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	довгий	7	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні остюки	3	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	дуже довгі	9	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	слабке	3	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	вузьке	3	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	піднесене	4	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	довгий	7	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	середньо зігнутий	5	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квітова луска. Зубець: за формою	ознака не визначається	0	
24	Зернівка: забарвлення	біле	1	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	помірне	5	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	крупна	7	
31	Язичок: виявлення	короткий	3	
32	Нижня квітова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	яйцеподібна	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	с	л	п
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,28	6,71	5,87
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	4,78	5,85	6,02
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,5	-0,86	0,15
+, - до усередненої урожайності, %	-9,4	-12,9	2,6
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,05
Тривалість періоду вегетації, діб	263	257	271
Висота рослини, см	98,8	98,4	106,5
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	43,5	46,8	43,4
Вміст білка, %	14,1	14,6	13,5
Вміст сирової клейковини, %	28	29,5	26,8
Сила борошна (W), о.а.	231	247	240
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	950	1000	1000
Стійкість до вилягання, бал	7	8	7
Стійкість до обсіпання, бал	9	8	9
Стійкість до посухи, бал	7	7	6
Стійкість проти борошнистої роси, бал	8	7	5
Стійкість проти бурі іржі, бал	8	5	5
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	9	6
Стійкість проти мухи шведської, бал	8	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	8	8	9
Зимостійкість: польова оцінка, бал	7	8	8
Морозостійкість за проморожування (за даними Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва), бал	5,3		
Блок	1	1	1
Напрямок використання	ф	ф	ф

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: П.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.

Заявка № 18012046 Назва сорту: Бригантіна Заявник (код): 807 Власник сорту (код): 807

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 21.10.2020 Патент № 200709

Дата пріоритету: 07.06.2018

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 02.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200980

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
2	Рослина: габітус (форма куша)	напівпрямий	3	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	відсутня або дуже мала	1	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	дуже сильний	9	
7	Колос: восковий наліт	помірний	5	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	помірний	5	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	напівбулавоподібна	3	
12	Колос: за щільністю	щільний	7	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	дуже короткі	1	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	помірне	5	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	широке	7	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	скошене	1	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	дуже короткий	1	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	прямий	1	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квітова луска. Зубець: за формою	дуже зігнутий	4	
24	Зернівка: забарвлення	біле	1	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	помірне	5	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	мале	3	
30	Зернівка: за крупністю	середня	5	
31	Язичок: виявлення	короткий	3	
32	Нижня квітова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	овальна	2	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,28	6,71	5,87
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,12	6,46	6,12
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,16	-0,25	0,25
+, - до усередненої урожайності, %	-3	-3,8	4,3
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,05
Тривалість періоду вегетації, діб	264	257	277
Висота рослини, см	72,5	80,1	84,7
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	41,5	44,1	44,2
Вміст білка, %	14,1	13,9	13,1
Вміст сирової клейковини, %	28,3	27,6	26
Сила борошна (W), о.а.	195	279	221
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	930	970	950
Стійкість до вилягання, бал	9	9	8
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	7
Стійкість до посухи, бал	7	8	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал	7	7	7
Стійкість проти бурі іржі, бал	8	6	7
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	8	5
Стійкість проти мухи шведської, бал	9	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	8	7
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	7	9
Морозостійкість за проморожування (за даними Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва), бал	5,5		
Блок	1	1	1
Напрямок використання	ф	цїн	ф

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: П.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.

Заявка № 18012016 Назва сорту: Відповідь одеська Заявник (код): 1591 Власник сорту (код): 1591

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 24.11.2020 Патент № 200796

Дата пріоритету: 01.03.2018

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 24.11.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201215

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабе	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	відсутня або дуже мала	1	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	помірний	5	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабо виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1	
12	Колос: за щільністю	середній	5	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні остюки	3	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	дуже довгі	9	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	слабке	3	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	вузьке	3	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	піднесене	4	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	довгий	7	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	3	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квітова луска. Зубець: за формою	ознака не визначається	0	
24	Зернівка: забарвлення	біле	1	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	помірне	5	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	середня	5	
31	Язичок: виявлення	короткий	3	
32	Нижня квітова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	ланцетна	4	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,28	6,71	5,87
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,15	6,89	5,73
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,13	0,18	-0,14
+, - до усередненої урожайності, %	-2,5	2,7	-2,4
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,05
Тривалість періоду вегетації, діб	267	256	271
Висота рослини, см	83,2	87,8	93,8
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	37,1	42	37,7
Вміст білка, %	13,9	14,3	13,4
Вміст сирової клейковини, %	27,5	29,2	26,3
Сила борошна (W), о.а.	227	260	234
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	870	950	900
Стійкість до вилягання, бал	7	6	3
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	7
Стійкість до посухи, бал	7	8	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал	8	8	6
Стійкість проти бурі іржі, бал	9	8	7
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	7	6
Стійкість проти мухи шведської, бал	9	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	8	9
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	7	8
Морозостійкість за проморожування (за даними Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва), бал	7		
Блок	1	1	1
Напрямок використання	Ф	цїн	Ф

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.

Заявка № 18012063 Назва сорту: Гадзинка **Заявник (код):** 1635 1097 **Власник сорту (код):** 2738 1097

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 16.11.2020 **Патент № 200802**

Дата пріоритету: 18.07.2018

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 16.11.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200981

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	слабке	3	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	відсутня або дуже мала	1	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на півхві	помірний	5	
7	Колос: восковий наліт	помірний	5	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	помірний	5	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	висока	7	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	циліндрична	2	
12	Колос: за щільністю	нешільний	3	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	довгий	7	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	дуже короткі	1	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	слабке	3	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	середнє	5	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	піднесене	4	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	короткий	3	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	3	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квітова луска. Зубець: за формою	середньо зігнутий	3	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	темне	7	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	середня	5	
31	Язичок: виявлення	короткий	3	
32	Нижня квітова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	шилоподібні	3	
34	Колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	ланцетна	4	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	4,84	6,08	5,94
Тривалість періоду вегетації, діб	265	258	274
Висота рослини, см	105,3	115,6	125,8
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	39,2	41,2	39
Вміст білка, %	14,2	14	14
Вміст сироті клейковини, %	28,2	27,9	28
Сила борошна (W), о.а.	232	250	240
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	910	930	990
Стійкість до вилягання, бал	7	5	5
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	9
Стійкість до посухи, бал	7	8	6
Стійкість проти борошнистої роси, бал	7	7	5
Стійкість проти бурі іржі, бал	8	7	4
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	8	6
Стійкість проти мухи шведської, бал	8	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	8	9
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	8	8
Морозостійкість за проморожування (за даними Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва), бал	6		
Блок	3	3	3
Напрямок використання	ф	ф	ф

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.

Заявка № 18012011 Назва сорту: Гейзер Заявник (код): 1591 Власник сорту (код): 1591

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 24.11.2020 Патент № 200792

Дата пріоритету: 01.03.2018

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 24.11.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201212

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабе	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	середня	5	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	дуже ранній	1	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	помірний	5	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	помірний	5	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабо виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	циліндрична	2	
12	Колос: за щільністю	середній	5	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні остюки	3	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	дуже довгі	9	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	слабке	3	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	середнє	5	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	пряме	3	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	короткий	3	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	прямий	1	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квітова луска. Зубець: за формою	ознака не визначається	0	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	дуже темне	9	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	крупна	7	
31	Язичок: виявлення	короткий	3	
32	Нижня квітова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	ланцетна	4	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,28	6,71	5,87
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,49	6,9	5,76
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,21	0,19	-0,11
+, - до усередненої урожайності, %	4,1	2,9	-1,9
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,05
Тривалість періоду вегетації, діб	267	255	270
Висота рослини, см	82,6	85,7	91,5
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	38,2	42,6	37,8
Вміст білка, %	13,6	13,7	13
Вміст сирої клейковини, %	27	26,5	25,8
Сила борошна (W), о.а.	302	276	277
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1010	1030	1020
Стійкість до вилягання, бал	7	7	6
Стійкість до обсіпання, бал	8	9	9
Стійкість до посухи, бал	6	7	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал	7	7	6
Стійкість проти бурі іржі, бал	7	7	5
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	7	6
Стійкість проти мухи шведської, бал	9	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	8	9
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	7	8
Морозостійкість за проморожування (за даними Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва), бал	6,3		
Блок	1	1	1
Напрямок використання	цїн	цїн	цїн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.

Заявка № 17012021 Назва сорту: ГЕРМА Заявник (код): 2597 Власник сорту (код): 2597

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 20.11.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200915

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	мала	3	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	сильний	7	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	помірний	5	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	циліндрична	2	
12	Колос: за щільністю	середній	5	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	середні	5	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	помірне	5	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	середнє	5	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	пряме	3	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	дуже короткий	1	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	3	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квітова луска. Зубець: за формою	прямий	1	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	помірне	5	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	велике	7	
30	Зернівка: за крупністю	крупна	7	
31	Язичок: виявлення	короткий	3	
32	Нижня квітова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	овально-ланцетна	3	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,11	6,49	5,76
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	4,35	6,58	6,03
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,76	0,09	0,27
+, - до усередненої урожайності, %	-14,8	1,4	4,7
Довірчий інтервал, т/га	0,06	0,06	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	259	267	265
Висота рослини, см	86,4	97	104,4
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	41,8	46,5	43,7
Вміст білка, %	14,1	13,8	13,7
Вміст сирової клейковини, %	27,8	27,3	27,3
Сила борошна (W), о.а.	202	262	211
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	950	990	960
Стійкість до вилягання, бал	8	8	9
Стійкість до обсіпання, бал	8	8	8
Стійкість до посухи, бал	8	8	8
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	9	8
Стійкість проти бурі іржі, бал	9	9	8
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	9	8
Стійкість проти мухи шведської, бал	8	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	8	8	9
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	8	8
Морозостійкість за проморозування (за даними Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва), бал	7,0		
Блок	1	1	1
Напрямок використання	ф	цїн	ф

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.

Заявка № 18012010 Назва сорту: Гефест Заявник (код): 1998 Власник сорту (код): 1998

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 10.11.2020 Патент № 200701

Дата пріоритету: 27.02.2018

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 02.11.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200925

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеопиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабе	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	відсутня або дуже мала	1	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	сильний	7	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабо виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	напівбулавоподібна	3	
12	Колос: за щільністю	середній	5	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	дуже короткі	1	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	слабке	3	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	середнє	5	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	пряме	3	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	дуже короткий	1	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	прямий	1	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квітова луска. Зубець: за формою	середньо зігнутий	3	
24	Зернівка: забарвлення	біле	1	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	помірне	5	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	крупна	7	
31	Язичок: виявлення	короткий	3	
32	Нижня квітова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	овальна	2	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,28	6,71	5,87
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,55	6,95	5,97
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,27	0,24	0,1
+, - до усередненої урожайності, %	5,2	3,5	1,7
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,05
Тривалість періоду вегетації, діб	267	255	271
Висота рослини, см	84,4	87,9	94
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	43,4	45,8	41,8
Вміст білка, %	13,9	13,7	13,6
Вміст сирової клейковини, %	28	27,5	27
Сила борошна (W), о.а.	217	260	200
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	830	950	930
Стійкість до вилягання, бал	7	7	8
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	9
Стійкість до посухи, бал	7	9	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал	8	7	7
Стійкість проти бурі іржі, бал	9	8	7
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	8	6
Стійкість проти мухи шведської, бал	9	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	8	9
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	7	8
Морозостійкість за проморожування (за даними Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва), бал	5		
Блок	1	1	1
Напрямок використання	Ф	цїн	Ф

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.

Заявка № 18012040 Назва сорту: ГК Корос Заявник (код): 1694 Власник сорту (код): 2537

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.10.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200828

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	відсутня або дуже мала	1	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	ранній	3	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	сильний	7	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	помірний	5	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабо виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	циліндрична	2	
12	Колос: за щільністю	середній	5	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	дуже короткі	1	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	помірне	5	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	вузьке	3	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	скошене	1	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	короткий	3	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	3	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квітова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	2	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	помірне	5	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	велике	7	
30	Зернівка: за крупністю	середня	5	
31	Язичок: виявлення	короткий	3	
32	Нижня квітова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	яйцеподібна	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,28	6,71	5,87
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	4,87	6,27	6,06
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,41	-0,44	0,19
+, - до усередненої урожайності, %	-7,7	-6,6	3,3
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,05
Тривалість періоду вегетації, діб	264	256	270
Висота рослини, см	80,1	83,4	91,9
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	39,4	43,4	42,7
Вміст білка, %	14,2	14,5	13,7
Вміст сирової клейковини, %	27,8	29,6	27,6
Сила борошна (W), о.а.	271	287	335
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	930	980	1080
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість до обсіпання, бал	9	7	9
Стійкість до посухи, бал	7	7	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал	8	7	7
Стійкість проти бурі іржі, бал	9	6	7
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	9	7
Стійкість проти мухи шведської, бал	8	9	8
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	8	8	9
Зимостійкість: польова оцінка, бал	7	7	7
Морозостійкість за проморожування (за даними Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва), бал	3,8		
Блок	1	1	1
Напрямок використання	цїн	слн	цїн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: П.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.

Заявка № 18012018 Назва сорту: Гладь Заявник (код): 1591 Власник сорту (код): 1591

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 24.11.2020

Свідчення про державну реєстрацію № 201217

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеопиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	мала	3	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	дуже ранній	1	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	помірний	5	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1	
12	Колос: за щільністю	середній	5	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні остюки	3	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	дуже довгі	9	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	слабке	3	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	вузьке	3	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	округле	2	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	середній	5	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	3	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квітова луска. Зубець: за формою	ознака не визначається	0	
24	Зернівка: забарвлення	біле	1	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	помірне	5	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	крупна	7	
31	Язичок: виявлення	короткий	3	
32	Нижня квітова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	яйцеподібна	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,28	6,71	5,87
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,25	7,01	5,41
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,03	0,3	-0,46
+, - до усередненої урожайності, %	-0,6	4,5	-7,8
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,05
Тривалість періоду вегетації, діб	267	255	269
Висота рослини, см	79,1	82,8	87,3
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	39,3	42,5	38,1
Вміст білка, %	13,9	13,7	13,1
Вміст сирової клейковини, %	28	27,1	26,2
Сила борошна (W), о.а.	303	327	296
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1090	1120	1180
Стійкість до вилягання, бал	8	6	7
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	9
Стійкість до посухи, бал	8	9	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал	8	7	7
Стійкість проти бурі іржі, бал	8	7	5
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	6	6
Стійкість проти мухи шведської, бал	8	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	8	9
Зимостійкість: польова оцінка, бал	7	7	8
Морозостійкість за проморожування (за даними Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва), бал	7		
Блок	1	1	1
Напрямок використання	слн	цїн	цїн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.

Заявка № 17012019 Назва сорту: ГОРИНЯ Заявник (код): 2597 Власник сорту (код): 2597

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 20.11.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200913

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	слабке	3	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	мала	3	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	помірний	5	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	помірний	5	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабо виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	циліндрична	2	
12	Колос: за щільністю	щільний	7	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	дуже короткі	1	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	слабке	3	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	вузьке	3	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	скошене	1	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	дуже короткий	1	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	3	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квітова луска. Зубець: за формою	прямий	1	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	помірне	5	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	велике	7	
30	Зернівка: за крупністю	крупна	7	
31	Язичок: виявлення	короткий	3	
32	Нижня квітова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	овально-ланцетна	3	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,11	6,49	5,76
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	4,25	6,37	5,93
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,86	-0,12	0,17
+, - до усередненої урожайності, %	-16,8	-1,9	2,9
Довірчий інтервал, т/га	0,06	0,06	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	261	269	268
Висота рослини, см	89,4	100,9	110,5
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	43,6	44,7	43,9
Вміст білка, %	13,9	14,2	14
Вміст сирої клейковини, %	27,7	28,2	28
Сила борошна (W), о.а.	266	281	272
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1120	1010	1000
Стійкість до вилягання, бал	8	8	8
Стійкість до обсіпання, бал	8	8	8
Стійкість до посухи, бал	7	8	8
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	9	8
Стійкість проти бурі іржі, бал	8	9	8
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	8	8
Стійкість проти мухи шведської, бал	8	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	8	9
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	8	8
Морозостійкість за проморозування (за даними Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва), бал	6,0		
Блок	1	1	1
Напрямок використання	цїн	слн	цїн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: П.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.

Заявка № 18012013 Назва сорту: Громада Заявник (код): 1591 Власник сорту (код): 1591

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 24.11.2020 Патент № 200794

Дата пріоритету: 01.03.2018

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 24.11.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201214

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабе	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	мала	3	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	ранній	3	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	помірний	5	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабо виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1	
12	Колос: за щільністю	середній	5	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні остюки	3	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	дуже довгі	9	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	слабке	3	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	вузьке	3	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	піднесене	4	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	короткий	3	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	3	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квітова луска. Зубець: за формою	ознака не визначається	0	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	помірне	5	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	мале	3	
30	Зернівка: за крупністю	крупна	7	
31	Язичок: виявлення	короткий	3	
32	Нижня квітова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	шилоподібні	3	
34	Колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	яйцеподібна	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,28	6,71	5,87
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,25	7,04	5,83
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,03	0,33	-0,04
+, - до усередненої урожайності, %	-0,5	4,9	-0,8
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,05
Тривалість періоду вегетації, діб	265	255	270
Висота рослини, см	81,4	81,9	91,4
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	41,2	42,9	40,9
Вміст білка, %	13,9	13,9	13,7
Вміст сирової клейковини, %	28,1	27,1	27,3
Сила борошна (W), о.а.	316	331	307
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1050	1040	1070
Стійкість до вилягання, бал	8	7	5
Стійкість до обсіпання, бал	9	8	9
Стійкість до посухи, бал	6	9	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал	8	8	7
Стійкість проти бурі іржі, бал	9	8	5
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	8	6
Стійкість проти мухи шведської, бал	9	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	8	9
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	7	8
Морозостійкість за проморожування (за даними Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва), бал	6,8		
Блок	1	1	1
Напрямок використання	слн	слн	цїн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.

Заявка № 16012052 Назва сорту: Діжон Заявник (код): 1517 Власник сорту (код): 1517

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 02.11.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200917

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	прямий	1	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	відсутня або дуже мала	1	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	ранній	3	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	помірний	5	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	низька	3	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	циліндрична	2	
12	Колос: за щільністю	щільний	7	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	короткий	3	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні остюки	3	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	дуже довгі	9	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	помірне	5	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	відсутнє або дуже вузьке	1	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	скошене	1	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	середній	5	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	середньо зігнутий	5	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квітова луска. Зубець: за формою	ознака не визначається	0	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	світле	3	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	велике	7	
30	Зернівка: за крупністю	середня	5	
31	Язичок: виявлення	короткий	3	
32	Нижня квітова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	овально-ланцетна	3	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	с	л	п
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,28	6,71	5,87
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5	6,29	5,89
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,28	-0,42	0,02
+, - до усередненої урожайності, %	-5,2	-6,3	0,3
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,05
Тривалість періоду вегетації, діб	262	258	268
Висота рослини, см	74,5	79,1	83,8
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	39,4	41,6	39,7
Вміст білка, %	13,4	14,3	13,7
Вміст сирової клейковини, %	26,6	29,1	27,5
Сила борошна (W), о.а.	287	270	283
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1030	1040	1180
Стійкість до вилягання, бал	7	6	7
Стійкість до обсіпання, бал	9	8	7
Стійкість до посухи, бал	7	7	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал	8	6	6
Стійкість проти бурі іржі, бал	8	8	5
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	7	7
Стійкість проти мухи шведської, бал	9	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	7	9
Зимостійкість: польова оцінка, бал	7	7	7
Морозостійкість за проморожування (за даними Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва), бал	6		
Блок	1	1	1
Напрямок використання	цїн	цїн	цїн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: П.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.

Заявка № 17012018 Назва сорту: ДОБРОВІТ Заявник (код): 2597 Власник сорту (код): 2597

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 20.11.2020

Свідчення про державну реєстрацію № 200912

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	прямий	1	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	слабке	3	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	мала	3	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний	5	
7	Колос: восковий наліт	помірний	5	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	циліндрична	2	
12	Колос: за щільністю	середній	5	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	дуже короткі	1	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	слабке	3	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	вузьке	3	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	пряме	3	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	дуже короткий	1	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	3	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квітова луска. Зубець: за формою	прямий	1	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	помірне	5	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	велике	7	
30	Зернівка: за крупністю	крупна	7	
31	Язичок: виявлення	короткий	3	
32	Нижня квітова луска: киль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	овальна	2	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,11	6,49	5,76
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	4,4	6,64	5,96
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,71	0,15	0,2
+, - до усередненої урожайності, %	-13,9	2,2	3,5
Довірчий інтервал, т/га	0,06	0,06	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	259	266	266
Висота рослини, см	84,4	97,1	103,7
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	43,8	45,8	45,3
Вміст білка, %	13,5	13,6	13,7
Вміст сирової клейковини, %	27	27,6	27,9
Сила борошна (W), о.а.	289	261	274
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1180	1000	1020
Стійкість до вилягання, бал	8	8	8
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	8
Стійкість до посухи, бал	8	8	8
Стійкість проти борошнистої роси, бал	8	8	8
Стійкість проти бурі іржі, бал	8	9	8
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	8	9	8
Стійкість проти мухи шведської, бал	9	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	8	9
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	8	8
Морозостійкість за проморожування (за даними Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва), бал	7,0		
Блок	1	1	1
Напрямок використання	цїн	цїн	цїн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.

Заявка № 18012042 Назва сорту: Емблем **Заявник (код):** 807 **Власник сорту (код):** 807

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 21.10.2020 **Патент №** 200705

Дата пріоритету: 07.06.2018

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 02.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200977

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
2	Рослина: габітус (форма куша)	напівпрямий	3	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	відсутня або дуже мала	1	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на півхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	помірний	5	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1	
12	Колос: за щільністю	нешільний	3	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	дуже короткі	1	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	помірне	5	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	середнє	5	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	скошене	1	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	короткий	3	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	3	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квітова луска. Зубець: за формою	середньо зігнутий	3	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	помірне	5	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	коротка	3	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	мале	3	
30	Зернівка: за крупністю	середня	5	
31	Язичок: виявлення	короткий	3	
32	Нижня квітова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	яйцеподібна	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,28	6,71	5,87
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,64	6,76	6,51
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,36	0,05	0,64
+, - до усередненої урожайності, %	6,8	0,7	11
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,05
Тривалість періоду вегетації, діб	268	257	272
Висота рослини, см	84,8	83,5	91,5
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	36,7	40,3	38,4
Вміст білка, %	14,1	13,5	12,9
Вміст сирої клейковини, %	28,8	27,3	25,9
Сила борошна (W), о.а.	323	329	347
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1090	980	1020
Стійкість до вилягання, бал	9	8	9
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	7
Стійкість до посухи, бал	7	7	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал	7	7	8
Стійкість проти бурі іржі, бал	9	8	6
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	8	5
Стійкість проти мухи шведської, бал	8	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	8	8
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	7	7
Морозостійкість за проморожування (за даними Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва), бал	6,8		
Блок	1	1	1
Напрямок використання	слн	цін	цін

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.

Заявка № 18012025 Назва сорту: Ефектна Заявник (код): 1626 Власник сорту (код): 1626

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 06.11.2020

Свідчення про державну реєстрацію № 200928

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеопіль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	слабке	3	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	мала	3	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний	5	
7	Колос: восковий наліт	помірний	5	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	помірний	5	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	низька	3	до середньої
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабо виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1	
12	Колос: за щільністю	середній	5	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні остюки	3	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	дуже довгі	9	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	слабке	3	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	середнє	5	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	пряме	3	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	середній	5	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	середньо зігнутий	5	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квітова луска. Зубець: за формою	ознака не визначається	0	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	світле	3	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	крупна	7	
31	Язичок: виявлення	короткий	3	
32	Нижня квітова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	яйцеподібна	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	с	л	п
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,28	6,71	5,87
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,14	6,5	5,89
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,14	-0,21	0,02
+, - до усередненої урожайності, %	-2,7	-3,1	0,3
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,05
Тривалість періоду вегетації, діб	267	265	272
Висота рослини, см	80,6	87,6	93,4
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	41,2	43,8	40,7
Вміст білка, %	14,4	14,3	13,8
Вміст сирової клейковини, %	28,3	29,1	27,4
Сила борошна (W), о.а.	219	217	147
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	770	940	900
Стійкість до вилягання, бал	8	8	7
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	7
Стійкість до посухи, бал	7	7	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал	7	8	7
Стійкість проти бурі іржі, бал	9	7	7
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	8	6
Стійкість проти мухи шведської, бал	9	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	8	9
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	8	8
Морозостійкість за проморожування (за даними Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва), бал	5		
Блок	1	1	1
Напрямок використання	ф	ф	ф

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: П.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.

Заявка № 17012020 Назва сорту: ЗЛАТАНА Заявник (код): 2597 Власник сорту (код): 2597

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 20.11.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200914

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	слабке	3	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	мала	3	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	сильний	7	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	циліндрична	2	
12	Колос: за щільністю	середній	5	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	короткі	3	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	помірне	5	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	середнє	5	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	пряме	3	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	дуже короткий	1	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	3	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квітова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	2	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	помірне	5	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	велике	7	
30	Зернівка: за крупністю	крупна	7	
31	Язичок: виявлення	короткий	3	
32	Нижня квітова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	овально-ланцетна	3	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,11	6,49	5,76
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	4,34	7,01	6,01
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,77	0,52	0,25
+, - до усередненої урожайності, %	-15,1	8,1	4,3
Довірчий інтервал, т/га	0,06	0,06	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	259	266	266
Висота рослини, см	83,4	94,9	103,3
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	38,6	43,1	41,9
Вміст білка, %	13,9	14	14,5
Вміст сирової клейковини, %	27,7	28,1	29,6
Сила борошна (W), о.а.	238	268	216
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	920	950	960
Стійкість до вилягання, бал	8	8	8
Стійкість до обсіпання, бал	8	9	8
Стійкість до посухи, бал	7	8	8
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	9	8
Стійкість проти бурі іржі, бал	8	9	8
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	8	8
Стійкість проти мухи шведської, бал	8	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	8	8	9
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	8	8
Морозостійкість за проморожування (за даними Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва), бал	6,0		
Блок	1	1	1
Напрямок використання	ф	цїн	ф

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.**Заявка № 18012009 Назва сорту:** Золотце **Заявник (код):** 1998 **Власник сорту (код):** 1998**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 10.11.2020 **Патент №** 200700**Дата пріоритету:** 27.02.2018**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 02.11.2020**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 200924**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	середня	5	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	помірний	5	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабо виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1	
12	Колос: за щільністю	середній	5	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	довгий	7	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні остюки	3	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	дуже довгі	9	
16	Колос: забарвлення	сіро-димчасте	3	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	слабке	3	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	вузьке	3	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	скошене	1	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	середній	5	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	3	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квіткова луска. Зубець: за формою	ознака не визначається	0	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	світле	3	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	
28	Зернівка: за шириною	широка	7	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	середня	5	
31	Язичок: виявлення	короткий	3	
32	Нижня квіткова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	яйцеподібна	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,28	6,71	5,87
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,55	7,25	6,3
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,27	0,54	0,43
+, - до усередненої урожайності, %	5,1	8,1	7,4
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,05
Тривалість періоду вегетації, діб	266	256	271
Висота рослини, см	75,5	79,4	87,2
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	40,6	43,8	41,6
Вміст білка, %	14	13,9	13,3
Вміст сирової клейковини, %	27,8	27,6	26,4
Сила борошна (W), о.а.	238	267	263
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	930	940	910
Стійкість до вилягання, бал	8	8	7
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	9
Стійкість до посухи, бал	8	9	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал	8	8	8
Стійкість проти бурі іржі, бал	9	8	8
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	9	7
Стійкість проти мухи шведської, бал	9	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	8	8	9
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	8	8
Морозостійкість за проморожування (за даними Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва), бал	6		
Блок	1	1	1
Напрямок використання	ф	цїн	цїн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.

Заявка № 17012022 Назва сорту: ІСТА Заявник (код): 2597 Власник сорту (код): 2597

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 20.11.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200916

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	слабке	3	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	середня	5	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	помірний	5	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	циліндрична	2	
12	Колос: за щільністю	середній	5	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	середні	5	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	помірне	5	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	широке	7	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	піднесене	4	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	дуже короткий	1	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	3	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квітова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	2	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	світле	3	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	велике	7	
30	Зернівка: за крупністю	крупна	7	
31	Язичок: виявлення	короткий	3	
32	Нижня квітова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	овальна	2	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,11	6,49	5,76
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	4,17	6,79	5,94
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,94	0,3	0,18
+, - до усередненої урожайності, %	-18,5	4,6	3,2
Довірчий інтервал, т/га	0,06	0,06	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	254	263	264
Висота рослини, см	86,8	97,4	101,1
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	41,5	45,1	43,8
Вміст білка, %	13,5	13,7	13,5
Вміст сирової клейковини, %	26,8	27	27,3
Сила борошна (W), о.а.	217	243	244
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	970	960	940
Стійкість до вилягання, бал	9	8	8
Стійкість до обсіпання, бал	8	8	8
Стійкість до посухи, бал	7	8	8
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	8	7
Стійкість проти бурі іржі, бал	9	8	8
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	9	8
Стійкість проти мухи шведської, бал	9	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	8	9
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	9	8
Морозостійкість за проморожування (за даними Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва), бал	6,0		
Блок	1	1	1
Напрямок використання	Ф	Ф	Ф

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.

Заявка № 18012015 Назва сорту: Київська 19 Заявник (код): 355 Власник сорту (код): 355

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 17.11.2020 Патент № 200795

Дата пріоритету: 23.02.2018

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 06.11.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200926

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеопиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабе	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	мала	3	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	слабкий	3	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	помірний	5	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабо виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	циліндрична	2	
12	Колос: за щільністю	нешільний	3	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	дуже короткі	1	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	слабке	3	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	відсутнє або дуже вузьке	1	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	пряме	3	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	дуже короткий	1	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	3	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квітова луска. Зубець: за формою	середньо зігнутий	3	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	помірне	5	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	середня	5	
31	Язичок: виявлення	короткий	3	
32	Нижня квітова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	яйцеподібна	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,28	6,71	5,87
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,19	6,81	6,27
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,09	0,1	0,4
+, - до усередненої урожайності, %	-1,8	1,5	6,9
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,05
Тривалість періоду вегетації, діб	267	257	272
Висота рослини, см	87,6	90,7	95,8
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	41,6	43	40,1
Вміст білка, %	13,8	14,2	13,8
Вміст сирової клейковини, %	27,5	28,5	27,6
Сила борошна (W), о.а.	236	254	238
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	920	980	900
Стійкість до вилягання, бал	9	8	7
Стійкість до обсіпання, бал	9	8	9
Стійкість до посухи, бал	7	8	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал	8	7	7
Стійкість проти бурі іржі, бал	7	7	7
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	8	7
Стійкість проти мухи шведської, бал	8	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	8	8	9
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	7	8
Морозостійкість за проморожування (за даними Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва), бал	4,5		
Блок	1	1	1
Напрямок використання	Ф	Ф	Ф

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.

Заявка № 18012002 Назва сорту: Крепиш Заявник (код): 1543 Власник сорту (код): 1543

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 13.11.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200920

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	мала	3	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	ранній	3	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	сильний	7	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	помірний	5	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	низька	3	до середньої
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	циліндрична	2	
12	Колос: за щільністю	середній	5	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	середні	5	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	слабке	3	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	відсутнє або дуже вузьке	1	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	округле	2	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	короткий	3	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	прямий	1	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квітова луска. Зубець: за формою	з дуже значним перегином	5	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	помірне	5	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	крупна	7	
31	Язичок: виявлення	короткий	3	
32	Нижня квітова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	ланцетна	4	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,28	6,71	5,87
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,33	6,75	5,9
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,05	0,04	0,03
+, - до усередненої урожайності, %	0,9	0,6	0,6
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,05
Тривалість періоду вегетації, діб	267	256	270
Висота рослини, см	85,2	85,6	91,4
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	38,9	43,5	38,1
Вміст білка, %	13,9	13,9	14,6
Вміст сирової клейковини, %	28	27,6	29,1
Сила борошна (W), о.а.	195	273	226
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	920	1040	900
Стійкість до вилягання, бал	8	6	8
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	9
Стійкість до посухи, бал	7	9	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал	8	7	7
Стійкість проти бурі іржі, бал	8	9	7
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	8	6
Стійкість проти мухи шведської, бал	9	9	8
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	8	9
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	7	8
Морозостійкість за проморожування (за даними Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва), бал	6,8		
Блок	1	1	1
Напрямок використання	ф	цін	ф

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.

Заявка № 17012046 Назва сорту: ОРЖИЦЯ НОВА Заявник (код): 386 Власник сорту (код): 386

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 17.11.2020 Патент № 200695

Дата пріоритету: 22.11.2017

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 17.11.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200919

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеопиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напіврозлогий	5	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабе	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	середня	5	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	слабкий	3	
7	Колос: восковий наліт	слабкий	3	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	слабкий	3	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабо виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1	
12	Колос: за щільністю	нешільний	3	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	довгий	7	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні остюки	3	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	дуже довгі	9	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	слабке	3	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	вузьке	3	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	скошене	1	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	середній	5	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	3	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квітова луска. Зубець: за формою	ознака не визначається	0	
24	Зернівка: забарвлення	біле	1	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	помірне	5	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	довга	7	
28	Зернівка: за шириною	широка	7	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	дуже крупна	9	
31	Язичок: виявлення	короткий	3	
32	Нижня квітова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	яйцеподібна	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,28	6,71	5,87
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,24	6,7	6,04
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,04	-0,01	0,17
+, - до усередненої урожайності, %	-0,8	-0,1	3
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,05
Тривалість періоду вегетації, діб	263	255	270
Висота рослини, см	84,9	86,1	94,8
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	41,2	44,6	40,6
Вміст білка, %	14,6	13,8	13,4
Вміст сирової клейковини, %	28,9	27,5	26,5
Сила борошна (W), о.а.	204	239	220
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	890	930	930
Стійкість до вилягання, бал	8	8	8
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	9
Стійкість до посухи, бал	6	8	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал	8	7	6
Стійкість проти бурі іржі, бал	9	7	7
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	8	6
Стійкість проти мухи шведської, бал	9	9	8
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	8	9
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	8	9
Морозостійкість за проморожування (за даними Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва), бал	6,3		
Блок	1	1	1
Напрямок використання	Ф	Ф	Ф

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.

Заявка № 18012012 Назва сорту: Основа одеська **Заявник (код):** 1591 **Власник сорту (код):** 1591

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 24.11.2020 **Патент № 200793**

Дата пріоритету: 01.03.2018

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 24.11.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201213

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	мала	3	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на п'хві	помірний	5	
7	Колос: восковий наліт	помірний	5	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабо виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	циліндрична	2	
12	Колос: за щільністю	середній	5	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні остюки	3	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	дуже довгі	9	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	слабке	3	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	вузьке	3	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	піднесене	4	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	середній	5	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	3	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квітова луска. Зубець: за формою	ознака не визначається	0	
24	Зернівка: забарвлення	біле	1	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	темне	7	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	крупна	7	
31	Язичок: виявлення	короткий	3	
32	Нижня квітова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	яйцеподібна	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,28	6,71	5,87
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,55	7,28	5,93
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,27	0,57	0,06
+, - до усередненої урожайності, %	5	8,5	1,1
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,05
Тривалість періоду вегетації, діб	267	255	270
Висота рослини, см	87,7	92,6	96,6
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	40,7	43,3	41
Вміст білка, %	13,8	13,8	13,6
Вміст сирої клейковини, %	27,5	27,5	26,8
Сила борошна (W), о.а.	303	326	304
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1060	1040	1080
Стійкість до вилягання, бал	8	7	6
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	9
Стійкість до посухи, бал	7	9	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал	8	8	7
Стійкість проти бурі іржі, бал	8	7	5
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	8	7
Стійкість проти мухи шведської, бал	9	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	8	8	9
Зимостійкість: польова оцінка, бал	7	7	9
Морозостійкість за проморожування (за даними Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва), бал	6		
Блок	1	1	1
Напрямок використання	цїн	цїн	цїн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.

Заявка № 18012017 Назва сорту: Перемога одеська Заявник (код): 1591 Власник сорту (код): 1591

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 24.11.2020 Патент № 200797

Дата пріоритету: 01.03.2018

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 24.11.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201216

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	слабке	3	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	мала	3	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	помірний	5	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	помірний	5	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	циліндрична	2	
12	Колос: за щільністю	середній	5	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні остюки	3	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	дуже довгі	9	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	слабке	3	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	вузьке	3	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	скошене	1	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	середній	5	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	3	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квітова луска. Зубець: за формою	ознака не визначається	0	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	помірне	5	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	велике	7	
30	Зернівка: за крупністю	крупна	7	
31	Язичок: виявлення	короткий	3	
32	Нижня квітова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	яйцеподібна	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,28	6,71	5,87
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,42	7,66	6,11
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,14	0,95	0,24
+, - до усередненої урожайності, %	2,6	14,1	4,1
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,05
Тривалість періоду вегетації, діб	267	257	271
Висота рослини, см	77,7	82,1	87,3
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	41	43,2	39,8
Вміст білка, %	13,4	14	13,5
Вміст сирової клейковини, %	26,6	27,5	27
Сила борошна (W), о.а.	279	260	235
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1020	960	1010
Стійкість до вилягання, бал	8	7	3
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	9
Стійкість до посухи, бал	7	9	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал	8	8	7
Стійкість проти бурі іржі, бал	7	9	7
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	7	8	6
Стійкість проти мухи шведської, бал	9	9	8
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	8	9
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	8	7
Морозостійкість за проморожування (за даними Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва), бал	7		
Блок	1	1	1
Напрямок використання	цїн	цїн	ф

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.

Заявка № 18012024 Назва сорту: Пирятинка Заявник (код): 1626 Власник сорту (код): 1626

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 06.11.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200927

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	слабке	3	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	середня	5	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	сильний	7	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	висока	7	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	циліндрична	2	
12	Колос: за щільністю	середній	5	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	дуже короткі	1	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	помірне	5	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	середнє	5	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	піднесене	4	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	дуже короткий	1	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	3	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квітова луска. Зубець: за формою	середньо зігнутий	3	
24	Зернівка: забарвлення	біле	1	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	помірне	5	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина/ ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	крупна	7	
31	Язичок: виявлення	середній	5	
32	Нижня квітова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	ланцетна	4	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,28	6,71	5,87
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,12	6,73	5,63
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,16	0,02	-0,24
+, - до усередненої урожайності, %	-3	0,3	-4,1
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,05
Тривалість періоду вегетації, діб	267	258	272
Висота рослини, см	99,4	101,1	102,8
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	43,3	45,4	41,6
Вміст білка, %	14	14,1	13,2
Вміст сирової клейковини, %	27,9	28,5	26,2
Сила борошна (W), о.а.	230	236	205
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	840	990	990
Стійкість до вилягання, бал	8	8	7
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	9
Стійкість до посухи, бал	8	8	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал	8	8	6
Стійкість проти бурі іржі, бал	9	8	6
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	8	6
Стійкість проти мухи шведської, бал	9	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	8	8	8
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	8	8
Морозостійкість за проморожування (за даними Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва), бал	6,5		
Блок	1	1	1
Напрямок використання	Ф	Ф	Ф

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.

Заявка № 18012050 Назва сорту: Пітон Заявник (код): 2238 Власник сорту (код): 2238

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.10.2020

Свідчення про державну реєстрацію № 200829

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеопиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напіврозлогий	5	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	відсутня або дуже мала	1	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	помірний	5	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	помірний	5	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	низька	3	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1	
12	Колос: за щільністю	середній	5	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні остюки	3	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	короткі	3	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	помірне	5	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	відсутнє або дуже вузьке	1	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	скошене	1	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	середній	5	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	середньо зігнутий	5	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квітова луска. Зубець: за формою	ознака не визначається	0	
24	Зернівка: забарвлення	біле	1	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	темне	7	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	мале	3	
30	Зернівка: за крупністю	середня	5	
31	Язичок: виявлення	короткий	3	
32	Нижня квітова луска: кінь	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	яйцеподібна	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	с	л	п
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,15	6,67	5,61
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	4,93	6,68	6,32
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,22	0,01	0,71
+, - до усередненої урожайності, %	-4,2	0,2	12,7
Довірчий інтервал, т/га	0,23	0,23	0,16
Тривалість періоду вегетації, діб	264	258	270
Висота рослини, см	65,4	73	78,7
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	36	40,2	37,1
Вміст білка, %	13,7	13,3	13
Вміст сирової клейковини, %	27,5	26,7	25,9
Сила борошна (W), о.а.	290	292	263
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	980	1000	990
Стійкість до вилягання, бал	9	8	7
Стійкість до обсіпання, бал	9	8	9
Стійкість до посухи, бал	6	6	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал	8	8	7
Стійкість проти бурі іржі, бал	9	6	5
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	7	7
Стійкість проти мухи шведської, бал	9	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	8	8
Зимостійкість: польова оцінка, бал	6	8	7
Морозостійкість за проморожування (за даними Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва), бал	4,3		
Блок	2	2	2
Напрямок використання	цїн	цїн	цїн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.

Заявка № 17012049 Назва сорту: Проня Заявник (код): 1581 Власник сорту (код): 1581

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 17.11.2020

Свідство про державну реєстрацію № 201798

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	відсутня або дуже мала	1	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний	5	
7	Колос: восковий наліт	слабкий	3	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	помірний	5	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабо виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	веретеноподібна	5	
12	Колос: за щільністю	нещільний	3	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	до довгого
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	дуже короткі	1	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	сильне	7	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	вузьке	3	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	округле	2	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	дуже короткий	1	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	прямий	1	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квітова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	2	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	світле	3	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	коротка	3	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	мале	3	
30	Зернівка: за крупністю	крупна	7	
31	Язичок: виявлення	короткий	3	
32	Нижня квітова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	помірне	5	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	яйцеподібна	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,28	6,71	5,87
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,54	7,69	6,82
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,26	0,98	0,95
+, - до усередненої урожайності, %	4,8	14,6	16,1
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,05
Тривалість періоду вегетації, діб	269	259	283
Висота рослини, см	85,9	91,2	99,8
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	37,4	40,5	39,7
Вміст білка, %	13,9	13,9	12,1
Вміст сирової клейковини, %	28	27,5	24
Сила борошна (W), о.а.	255	276	206
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	900	1000	880
Стійкість до вилягання, бал	7	8	8
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	9
Стійкість до посухи, бал	6	7	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал	8	7	7
Стійкість проти бурі іржі, бал	8	7	7
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	8	5
Стійкість проти мухи шведської, бал	9	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	8	9
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	8	9
Морозостійкість за проморожування (за даними Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва), бал	5		
Блок	1	1	1
Напрямок використання	ф	цін	ф

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.

Заявка № 18012006 Назва сорту: Світязь Заявник (код): 355 Власник сорту (код): 355

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 17.11.2020 Патент № 200790

Дата пріоритету: 23.02.2018

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 06.11.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200922

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напіврозлогий	5	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	слабке	3	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	мала	3	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	помірний	5	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	помірний	5	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	висока	7	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	циліндрична	2	
12	Колос: за щільністю	нешільний	3	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	довгий	7	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	дуже короткі	1	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	сильне	7	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	вузьке	3	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	піднесене	4	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	короткий	3	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	3	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квітова луска. Зубець: за формою	середньо зігнутий	3	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	помірне	5	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	крупна	7	
31	Язичок: виявлення	короткий	3	
32	Нижня квітова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	овальна	2	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,28	6,71	5,87
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,11	6,96	5,99
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,17	0,25	0,12
+, - до усередненої урожайності, %	-3,3	3,7	2
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,05
Тривалість періоду вегетації, діб	268	259	276
Висота рослини, см	96,8	101,5	110,3
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	41,2	45,9	42
Вміст білка, %	13,8	13,6	13,9
Вміст сирової клейковини, %	27,2	26,9	27,9
Сила борошна (W), о.а.	223	260	197
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	860	970	940
Стійкість до вилягання, бал	9	9	8
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	9
Стійкість до посухи, бал	8	8	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал	8	7	7
Стійкість проти бурі іржі, бал	8	8	8
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	8	6
Стійкість проти мухи шведської, бал	8	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	8	9
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	7	8
Морозостійкість за проморожування (за даними Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва), бал	7		
Блок	1	1	1
Напрямок використання	Ф	цїн	Ф

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.

Заявка № 18012033 Назва сорту: Сідоніус **Заявник (код):** 1564 **Власник сорту (код):** 1564

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 27.10.2020 **Патент №** 200703

Дата пріоритету: 27.04.2018

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.10.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200823

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напіврозлогий	5	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	мала	3	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на п'хві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	помірний	5	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	помірний	5	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1	
12	Колос: за щільністю	нешільний	3	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	дуже короткі	1	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	сильне	7	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	вузьке	3	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	округле	2	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	дуже короткий	1	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	середньо зігнутий	5	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квітова луска. Зубець: за формою	дуже зігнутий	4	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	помірне	5	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	крупна	7	
31	Язичок: виявлення	короткий	3	
32	Нижня квітова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	яйцеподібна	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,28	6,71	5,87
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,26	6,12	6,5
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,02	-0,59	0,63
+, - до усередненої урожайності, %	-0,3	-8,7	10,7
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,05
Тривалість періоду вегетації, діб	269	257	272
Висота рослини, см	82,3	87,7	91,3
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	40,6	43,9	41,1
Вміст білка, %	14,4	14,2	13,7
Вміст сирої клейковини, %	28,7	28,5	27
Сила борошна (W), о.а.	243	261	226
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	900	950	920
Стійкість до вилягання, бал	9	8	8
Стійкість до обсіпання, бал	9	8	9
Стійкість до посухи, бал	7	5	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал	8	8	8
Стійкість проти бурі іржі, бал	8	8	6
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	8	8	6
Стійкість проти мухи шведської, бал	8	9	8
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	8	8	9
Зимостійкість: польова оцінка, бал	7	7	7
Морозостійкість за проморожування (за даними Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва), бал	4,5		
Блок	1	1	1
Напрямок використання	ф	цїн	ф

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СП.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.

Заявка № 18012045 Назва сорту: Сомельє Заявник (код): 807 Власник сорту (код): 807

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 21.10.2020 Патент № 200708

Дата пріоритету: 07.06.2018

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 02.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200979

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеопіль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	до слабкої
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	слабке	3	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	мала	3	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	помірний	5	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	помірний	5	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабо виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	циліндрична	2	
12	Колос: за щільністю	нешільний	3	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні остюки	3	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	дуже довгі	9	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	слабке	3	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	вузьке	3	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	скошене	1	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	короткий	3	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	3	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квітова луска. Зубець: за формою	ознака не визначається	0	
24	Зернівка: забарвлення	біле	1	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	помірне	5	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	середня	5	
31	Язичок: виявлення	короткий	3	
32	Нижня квітова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	яйцеподібна	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,28	6,71	5,87
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	4,95	6,73	6,06
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,33	0,02	0,19
+, - до усередненої урожайності, %	-6,2	0,3	3,2
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,05
Тривалість періоду вегетації, діб	268	258	280
Висота рослини, см	87,9	92,9	103
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	40,7	43,9	42,6
Вміст білка, %	13,7	13,5	14,4
Вміст сирової клейковини, %	27,3	27,5	28,5
Сила борошна (W), о.а.	282	276	260
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1040	1010	1000
Стійкість до вилягання, бал	8	9	2
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	9
Стійкість до посухи, бал	7	7	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал	8	7	7
Стійкість проти бурі іржі, бал	8	8	8
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	8	7
Стійкість проти мухи шведської, бал	9	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	8	8	9
Зимостійкість: польова оцінка, бал	7	7	9
Морозостійкість за проморожування (за даними Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва), бал	6,8		
Блок	1	1	1
Напрямок використання	цїн	цїн	цїн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.

Заявка № 18012034 Назва сорту: Тоннаж Заявник (код): 2486 Власник сорту (код): 2486

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 27.10.2020 Патент № 200704

Дата пріоритету: 27.04.2018

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.10.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200824

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
2	Рослина: габітус (форма куша)	напіврозлогий	5	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	відсутня або дуже мала	1	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	пізній	7	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на півхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	помірний	5	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	помірний	5	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	циліндрична	2	
12	Колос: за щільністю	середній	5	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	довгий	7	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	середні	5	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	помірне	5	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	вузьке	3	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	піднесене	4	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	середній	5	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	середньо зігнутий	5	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квітова луска. Зубець: за формою	з дуже значним перегином	5	
24	Зернівка: забарвлення	біле	1	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	помірне	5	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	коротка	3	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	мале	3	
30	Зернівка: за крупністю	крупна	7	
31	Язичок: виявлення	короткий	3	
32	Нижня квітова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	яйцеподібна	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,28	6,71	5,87
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,41	8,2	7,52
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,13	1,49	1,65
+, - до усередненої урожайності, %	2,5	22,2	28
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,05
Тривалість періоду вегетації, діб	269	260	274
Висота рослини, см	79,4	84,3	90,2
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	38,5	43,8	40,6
Вміст білка, %	14	13,3	13,1
Вміст сирої клейковини, %	27,6	26,7	25,4
Сила борошна (W), о.а.	245	164	134
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	870	840	820
Стійкість до вилягання, бал	9	8	5
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	9
Стійкість до посухи, бал	6	7	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал	8	9	8
Стійкість проти бурі іржі, бал	9	9	8
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	8	6
Стійкість проти мухи шведської, бал	8	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	8	9
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	7	7
Морозостійкість за проморожування (за даними Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва), бал	4,5		
Блок	1	1	1
Напрямок використання	Ф	Ф	Ф

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.

Заявка № 16012025 Назва сорту: Трубілон Заявник (код): 2238 Власник сорту (код): 2238

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.12.2020

Свідчення про державну реєстрацію № 201105

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеопиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напіврозлогий	5	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	слабке	3	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	мала	3	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	сильний	7	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	помірний	5	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	низька	3	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1	
12	Колос: за щільністю	середній	5	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	дуже короткі	1	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	помірне	5	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	вузьке	3	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	округле	2	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	короткий	3	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	середньо зігнутий	5	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квітова луска. Зубець: за формою	середньо зігнутий	3	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	помірне	5	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	велике	7	
30	Зернівка: за крупністю	крупна	7	
31	Язичок: виявлення	короткий	3	
32	Нижня квітова луска: кінь	наявний	9	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	яйцеподібна	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	с	л	п
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,11	6,49	5,76
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	4,14	6,7	5,91
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,97	0,21	0,15
+, - до усередненої урожайності, %	-19	3,2	2,5
Довірчий інтервал, т/га	0,06	0,06	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	258	264	268
Висота рослини, см	63	70,6	70
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	38	44,8	43,2
Вміст білка, %	13,3	13,6	12,9
Вміст сирової клейковини, %	27,1	27,3	25,9
Сила борошна (W), о.а.	266	286	238
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	910	900	900
Стійкість до вилягання, бал	9	8	9
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	8
Стійкість до посухи, бал	7	8	8
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	8	8
Стійкість проти бурі іржі, бал	9	8	8
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	9	8
Стійкість проти мухи шведської, бал	9	8	8
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	8	8	9
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	7	8
Морозостійкість за проморожування (за даними Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва), бал	3,0		
Блок	1	1	1
Напрямок використання	цїн	цїн	ф

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.

Заявка № 18012026 Назва сорту: Фортеця Поліська Заявник (код): 1626 Власник сорту (код): 1626

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 06.11.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200929

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	мала	3	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	помірний	5	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	помірний	5	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1	
12	Колос: за щільністю	нещільний	3	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	довгий	7	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	середні	5	
16	Колос: забарвлення	червоне	2	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	слабке	3	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	середнє	5	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	скошене	1	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	дуже короткий	1	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	прямий	1	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квітова луска. Зубець: за формою	середньо зігнутий	3	
24	Зернівка: забарвлення	біле	1	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	світле	3	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	коротка	3	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	мале	3	
30	Зернівка: за крупністю	середня	5	
31	Язичок: виявлення	короткий	3	
32	Нижня квітова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	яйцеподібна	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,28	6,71	5,87
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,25	6,72	6,19
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,03	0,01	0,32
+, - до усередненої урожайності, %	-0,6	0,2	5,5
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,05
Тривалість періоду вегетації, діб	266	256	270
Висота рослини, см	92,9	98,1	106,1
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	38,4	42,5	39,9
Вміст білка, %	13,8	13,3	12,5
Вміст сирової клейковини, %	27,4	26,4	25
Сила борошна (W), о.а.	211	218	85
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	720	850	780
Стійкість до вилягання, бал	7	6	7
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	9
Стійкість до посухи, бал	8	7	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал	8	8	6
Стійкість проти бурі іржі, бал	7	7	5
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	8	9	8
Стійкість проти мухи шведської, бал	9	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	8	9
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	7	7
Морозостійкість за проморожування (за даними Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва), бал	6,3		
Блок	1	1	1
Напрямок використання	ф	ф	ф

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.**Заявка № 18012037 Назва сорту:** Херсонська Фортеця **Заявник (код):** 1698 **Власник сорту (код):** 1698**Дата пріоритету:** 23.05.2018**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 04.11.2020**Свідчення про державну реєстрацію № 200826****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	мала	3	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	помірний	5	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабо виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	циліндрична	2	
12	Колос: за щільністю	середній	5	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	дуже короткі	1	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	помірне	5	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	середнє	5	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	скошене	1	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	дуже короткий	1	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	прямий	1	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квіткова луска. Зубець: за формою	середньо зігнутий	3	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	помірне	5	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	
28	Зернівка: за шириною	вузька	3	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	велике	7	
30	Зернівка: за крупністю	крупна	7	
31	Язичок: виявлення	короткий	3	
32	Нижня квіткова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	яйцеподібна	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,28	6,71	5,87
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,53	6,79	6,02
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,25	0,08	0,15
+, - до усередненої урожайності, %	4,6	1,3	2,5
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,05
Тривалість періоду вегетації, діб	267	256	270
Висота рослини, см	90,3	87,2	97,3
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	40,7	43	39,5
Вміст білка, %	13,5	13,5	14
Вміст сирої клейковини, %	27,1	27,1	27,7
Сила борошна (W), о.а.	232	267	276
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	990	1000	1110
Стійкість до вилягання, бал	7	7	4
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	9
Стійкість до посухи, бал	7	8	6
Стійкість проти борошнистої роси, бал	8	7	6
Стійкість проти бурі іржі, бал	9	7	7
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	8	7
Стійкість проти мухи шведської, бал	9	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	8	8	9
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	8	7
Морозостійкість за проморожування (за даними Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва), бал	6,8		
Блок	1	1	1
Напрямок використання	ф	цїн	цїн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.

Заявка № 18012032 Назва сорту: Цеціліус Заявник (код): 1564 Власник сорту (код): 1564

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 27.10.2020 Патент № 200702

Дата пріоритету: 27.04.2018

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.10.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200822

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напіврозлогий	5	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	мала	3	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на п'хві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	помірний	5	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	помірний	5	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1	
12	Колос: за щільністю	нешільний	3	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні остюки	3	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	дуже довгі	9	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	сильне	7	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	вузьке	3	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	пряме	3	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	середній	5	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	прямий	1	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квітова луска. Зубець: за формою	ознака не визначається	0	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	помірне	5	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	крупна	7	
31	Язичок: виявлення	короткий	3	
32	Нижня квітова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	яйцеподібна	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,28	6,71	5,87
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,11	6,24	6,45
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,17	-0,47	0,58
+, - до усередненої урожайності, %	-3,3	-7,1	9,8
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,05
Тривалість періоду вегетації, діб	268	258	271
Висота рослини, см	74,9	78,5	85,8
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	41,1	42,4	39,8
Вміст білка, %	14	13,6	13,6
Вміст сирої клейковини, %	27,9	26,9	27
Сила борошна (W), о.а.	186	284	272
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	930	960	1070
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість до обсіпання, бал	9	8	9
Стійкість до посухи, бал	7	6	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал	8	8	8
Стійкість проти бурі іржі, бал	9	8	7
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	9	6
Стійкість проти мухи шведської, бал	8	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	8	8	9
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	8	7
Морозостійкість за проморожування (за даними Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва), бал	5		
Блок	1	1	1
Напрямок використання	ф	цїн	цїн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: П.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.**Заявка № 18012038 Назва сорту:** Шеріф **Заявник (код):** 947 **Власник сорту (код):** 947**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 19.11.2020 **Патент №** 200800**Дата пріоритету:** 23.05.2018**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 23.10.2020**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 200827**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напіврозлогий	5	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабе	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	мала	3	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	пізній	7	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	помірний	5	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	помірний	5	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	виповнена	7	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1	
12	Колос: за щільністю	середній	5	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	дуже короткі	1	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	дуже сильне	9	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	вузьке	3	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	скошене	1	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	короткий	3	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	3	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квітова луска. Зубець: за формою	середньо зігнутий	3	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	помірне	5	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	крупна	7	
31	Язичок: виявлення	короткий	3	
32	Нижня квітова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	яйцеподібна	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,28	6,71	5,87
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	4,87	6,22	6,02
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,41	-0,49	0,15
+, - до усередненої урожайності, %	-7,7	-7,3	2,5
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,05
Тривалість періоду вегетації, діб	269	260	275
Висота рослини, см	74	80,1	87,3
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	36	40,4	36,8
Вміст білка, %	14,1	13,5	12,9
Вміст сирової клейковини, %	28,6	26,9	25,5
Сила борошна (W), о.а.	216	252	209
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	930	930	900
Стійкість до вилягання, бал	9	9	8
Стійкість до обсіпання, бал	9	8	9
Стійкість до посухи, бал	6	6	6
Стійкість проти борошнистої роси, бал	7	8	8
Стійкість проти бурі іржі, бал	9	7	8
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	8	6
Стійкість проти мухи шведської, бал	8	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	8	9
Зимостійкість: польова оцінка, бал	7	5	6
Морозостійкість за проморожування (за даними Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва), бал	2,5		
Блок	1	1	1
Напрямок використання	Ф	Ф	Ф

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: П.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.

Заявка № 18012007 Назва сорту: Ювілейна Патона **Заявник (код):** 355 **Власник сорту (код):** 355

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 17.11.2020 **Патент № 200791**

Дата пріоритету: 23.02.2018

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 06.11.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200923

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	відсутня або дуже мала	1	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	помірний	5	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	помірний	5	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	циліндрична	2	
12	Колос: за щільністю	середній	5	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	довгий	7	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	дуже короткі	1	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	помірне	5	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	вузьке	3	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	піднесене	4	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	короткий	3	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	середньо зігнутий	5	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квітова луска. Зубець: за формою	дуже зігнутий	4	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	помірне	5	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	крупна	7	
31	Язичок: виявлення	короткий	3	
32	Нижня квітова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	яйцеподібна	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,28	6,71	5,87
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,06	6,98	6
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,22	0,27	0,13
+, - до усередненої урожайності, %	-4,1	4	2,2
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,05
Тривалість періоду вегетації, діб	269	258	274
Висота рослини, см	88,7	96	99
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	38,7	40,9	39,1
Вміст білка, %	14,2	13,5	13,8
Вміст сирої клейковини, %	28,7	27,3	28,1
Сила борошна (W), о.а.	237	260	268
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	930	930	1010
Стійкість до вилягання, бал	8	8	6
Стійкість до обсіпання, бал	9	8	7
Стійкість до посухи, бал	7	7	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал	8	8	6
Стійкість проти бурі іржі, бал	7	7	4
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	7	7
Стійкість проти мухи шведської, бал	9	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	8	9
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	7	8
Морозостійкість за проморожування (за даними Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва), бал	6		
Блок	1	1	1
Напрямок використання	ф	цїн	цїн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Пшениця м'яка (яра) *Triticum aestivum* L.**Заявка №** 18013002 **Назва сорту:** ВПБ Трой **Заявник (код):** 2513 **Власник сорту (код):** 2513**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 11.12.2020**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 200983**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	прямий	1	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	помірне	5	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	середня	5	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	дуже ранній	1	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	слабкий	3	
7	Колос: восковий наліт	помірний	5	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	низька	3	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу і найближчим вузлом)	помірно виповнена	5	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1	
12	Колос: за щільністю	нещільний	3	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	довгі	7	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	слабке	3	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок в середині колоса)	середнє	5	
19	Нижня колоскова луска. Плече за формою	піднесене	4	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	середній	5	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	середньо зігнутий	5	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	помірне	5	
23	Нижня квітова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	2	
24	Зернівка: забарвлення	коричнєве	3	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	помірне	5	
26	Тип розвитку	ярий	3	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина/ ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	крупна	7	
31	Язичок: виявлення	середній	5	
32	Нижня квітова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	яйцеподібна	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	с	л	п
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,4	4,03	3,57
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	3,55	5,52	4,82
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,15	1,49	1,25
+, - до усередненої урожайності, %	47,8	36,9	35
Довірчий інтервал, т/га	0,16	0,19	0,11
Тривалість періоду вегетації, діб	92	94	97
Висота рослини, см	68,2	81,9	80,1
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	34,8	40,1	39,9
Вміст білка, %	14,5	13,3	13
Вміст сирової клейковини, %	29,2	26,7	25,8
Сила борошна (W), о.а.	301	264	281
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1030	910	940
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	9
Стійкість до посухи, бал	7	8	8
Стійкість проти борошнистої роси, бал	7	9	7
Стійкість проти бурі іржі, бал	7	8	7
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	7	6
Стійкість проти мухи шведської, бал	9	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	8	9	9
Напрямок використання	слн	цїн	цїн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Пшениця м'яка (яра) *Triticum aestivum* L.

Заявка № 19013002 Назва сорту: КВС Старлайт **Заявник (код):** 824 **Власник сорту (код):** 824

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 05.11.2020 **Патент № 200785**

Дата пріоритету: 01.02.2019

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 20.11.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200930

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напіврозлогий	5	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	мала	3	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний	5	
7	Колос: восковий наліт	слабкий	3	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	помірний	5	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу і найближчим вузлом)	помірно виповнена	5	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1	
12	Колос: за щільністю	середній	5	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	довгий	7	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	короткі	3	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	слабке	3	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок в середині колоса)	широке	7	
19	Нижня колоскова луска. Плече за формою	пряме	3	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	короткий	3	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	прямий	1	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квітова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	2	
24	Зернівка: забарвлення	коричнєве	3	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	дуже темне	9	
26	Тип розвитку	ярий	3	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	крупна	7	
31	Язичок: виявлення	середній	5	
32	Нижня квітова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	яйцеподібна	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,4	4,03	3,57
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	3,7	5,46	4,76
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,3	1,43	1,19
+, - до усередненої урожайності, %	54,3	35,6	33,5
Довірчий інтервал, т/га	0,16	0,19	0,11
Тривалість періоду вегетації, діб	92	96	98
Висота рослини, см	72,5	84,4	84,3
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	33,6	38,1	38
Вміст білка, %	14,8	13,3	12,9
Вміст сирової клейковини, %	29,7	26,5	25,4
Сила борошна (W), о.а.	302	284	296
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1000	1010	950
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	9
Стійкість до посухи, бал	7	8	8
Стійкість проти борошнистої роси, бал	6	9	7
Стійкість проти бурі іржі, бал	7	8	6
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	8	8	7
Стійкість проти мухи шведської, бал	8	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	8	9	9
Напрямок використання	слн	цїн	цїн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Пшениця м'яка (яра) *Triticum aestivum* L.**Заявка № 18013001 Назва сорту:** Токата **Заявник (код):** 2076 **Власник сорту (код):** 880**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 19.11.2020 **Патент №** 200803**Дата пріоритету:** 06.12.2018**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 23.10.2020**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 200831**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	прямий	1	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	мала	3	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний	5	
7	Колос: восковий наліт	сильний	7	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу і найближчим вузлом)	помірно виповнена	5	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1	
12	Колос: за щільністю	середній	5	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	довгий	7	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	короткі	3	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	помірне	5	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок в середині колоса)	середнє	5	
19	Нижня колоскова луска. Плече за формою	піднесене	4	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	середній	5	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	середньо зігнутий	5	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квітова луска. Зубець: за формою	середньо зігнутий	3	
24	Зернівка: забарвлення	біле	1	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	помірне	5	
26	Тип розвитку	ярий	3	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	крупна	7	
31	Язичок: виявлення	середній	5	
32	Нижня квітова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	яйцеподібна	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,4	4,03	3,57
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	3,58	5,44	4,5
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,18	1,41	0,93
+, - до усередненої урожайності, %	49,1	34,9	26,1
Довірчий інтервал, т/га	0,16	0,19	0,11
Тривалість періоду вегетації, діб	92	95	96
Висота рослини, см	73,9	86,3	85,1
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	37	39,8	40,9
Вміст білка, %	14,5	13,5	13
Вміст сиров'язковини, %	28,8	27,1	26
Сила борошна (W), о.а.	320	277	261
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1000	930	930
Стійкість до вилягання, бал	8	9	9
Стійкість до обсіпання, бал	8	9	9
Стійкість до посухи, бал	7	8	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал	7	9	8
Стійкість проти бурі іржі, бал	8	9	7
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	8	6	6
Стійкість проти мухи шведської, бал	8	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	8	9	9
Напрямок використання	слн	цїн	цїн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Пшениця спельта (озима) *Triticum spelta* L.

Заявка № 18539003 Назва сорту: Вишиванка білоцерківська **Заявник (код):** 1635 1097

Власник сорту (код): 2738 1097

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 16.11.2020 **Патент №** 200804

Дата пріоритету: 18.07.2018

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 16.11.2020

Свідство про державну реєстрацію № 200984

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напіврозлогий	5	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	слабке	3	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	мала	3	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	пізній	7	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний	5	
7	Колос: восковий наліт	помірний	5	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	помірний	5	
9	Рослина: за висотою (стебло, колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1	
12	Колос: за щільністю	середній	5	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	довгий	7	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2	
15	Колос: довжина зубців / остюків на верхівці	дуже короткі	1	
16	Колос: забарвлення	білий або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	сильне	7	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	широке	7	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	пряме	3	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	короткий	3	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	прямий	1	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	дуже слабке	1	
23	Нижня квітова луска. Зубець: за формою	середньо зігнутий	3	
24	Зернівка: забарвлення	білий	1	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	світле	3	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Лише для сортів пшениці шарозерної. Колос (остистий): зазубленість остюків	ознака не визначається	0	
28	Лише для сортів пшениці шарозерної. Рослина: час досягання зерна	ознака не визначається	0	
29	Лише для сортів пшениці шарозерної. Рослина: тенденція до вилягання	ознака не визначається	0	
30	Лише для сортів пшениці шарозерної. Насіння: маса 1000 шт.	ознака не визначається	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	с	л	п
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,98	5,4	4,75
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	4,1	5,46	5,17
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,12	0,06	0,42
+, - до усередненої урожайності, %	37,7	1,2	8,9
Довірчий інтервал, т/га	1,15	0,97	0,64
Тривалість періоду вегетації, діб	8	7	7
Висота рослини, см	7	3	4
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	9	9	9
Вміст білка, %	14,5	14,4	14,8
Вміст клейковини, %	29,7	29,1	30,2
Показник альвеографа (W), о.а.	272	273	261
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	960	960	950
Стійкість до вилягання, бал	7	3	4
Стійкість до обсіпання, бал	9	8	4
Стійкість до посухи, бал	5	7	6
Стійкість проти борошнистої роси, бал	8	6	5
Стійкість проти бурі іржі, бал	9	8	4
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	7	7
Стійкість проти мухи шведської, бал	9	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	8	9
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	7	7
Морозостійкість за проморожування (за даними Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва), бал	6,3		
Блок	1	1	1
Напрямок використання	цїн	цїн	цїн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Пшениця тверда (озима) *Triticum durum* Desf.**Заявка № 18007001 Назва сорту:** Алмазний **Заявник (код):** 1591 **Власник сорту (код):** 1591**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 24.11.2020 **Патент №** 200805**Дата пріоритету:** 01.03.2018**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 24.11.2020**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 201221**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеопиль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	до слабого
2	Перший листок: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
3	Рослина: габітус	напівпрямий	3	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	відсутній або дуже мала	1	до малої
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	пізній	7	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Прапорцевий листок: восковий наліт на листовій пластинці (з нижнього боку)	сильний	7	
8	Остюки: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
9	Соломина: опушення верхнього вузла	помірне	5	
10	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	помірний	5	
11	Колос: восковий наліт	помірний	5	до сильного
12	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5	
13	Колос: наявність і розміщення остюків	по всій довжині колоса	4	
14	Колос: довжина остюків на верхівці відносно довжини колоса	довша	3	
15	Нижня колоскова луска: за формою	яйцеподібна	3	
16	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	скошене	1	
17	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною	вузьке	3	до середнього
18	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	короткий	3	
19	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	2	
20	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	відсутнє	1	
21	Соломина: виповнення (між основою колоса й верхнім вузлом)	слабке	3	до помірного
22	Остюки: забарвлення	біле	1	
23	Колос: за довжиною (без остюків)	короткий	3	
24	Колос: опушення країв нижніх 2-4 сегментів стрижня	помірне	5	
25	Колос: інтенсивність забарвлення за досягання	біле	1	
26	Колос: форма	пірамідальна	1	
27	Колос: за щільністю	щільний	7	
28	Зернівка: форма	овальна	5	
29	Зернівка: чубок за довжиною (вид зі спинки)	короткий	3	
30	Зернівка: забарвлення у фенолі	відсутнє або дуже світле	1	
31	Тип розвитку	озимий	1	
32	Колос: забарвлення	білий або солом'яно-жовте	1	
33	Язичок: за формою	округлий	1	
34	Язичок: за довжиною	короткий	3	до середнього
35	Вушка: охоплення соломини	з перекриттям	3	
36	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	сильне	7	
37	Лише для сортів пшениці полби звичайної. Колос: ламкість	ознака не визначається	0	
38	Лише для сортів пшениці полби звичайної. Зернівка: маса 1000	ознака не визначається	0	
39	Лише для сортів пшениці полби звичайної. Рослина: час досягання зерна	ознака не визначається	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	4,57	5,83	
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,7	5,53	
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,13	-0,3	
+, - до усередненої урожайності, %	24,7	-5,1	
Довірчий інтервал, ц/га	0,24	0,37	
Тривалість періоду вегетації, діб	264	259	
Висота рослини, см	94,3	90,6	
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	47	44,4	
Вміст білка, %	13,1	13,8	
Стійкість до вилягання, бал	8	7	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	7	9	
Стійкість проти борошнистої роси, бал	8	6	
Стійкість проти бурі іржі, бал	9	7	
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	8	
Стійкість проти мухи шведської, бал	9	9	
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	9	
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	9	
Стійкість проти твердої сажки, бал	8	9	
Морозостійкість за проморожування (за даними Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва), бал		4,3	
Блок	1	1	
Напрямок використання	х	х	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.

Вид: Пшениця тверда (озима) *Triticum durum* Desf.

Заявка № 18007003 Назва сорту: Діадур **Заявник (код):** 1564 **Власник сорту (код):** 1564

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 08.12.2020 **Патент № 200807**

Дата пріоритету: 27.04.2018

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.10.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200832

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Перший листок: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
3	Рослина: габітус	напіврозлогий	5	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	відсутній або дуже мала	1	до малої
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	пізній	7	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний	5	до сильного
7	Прапорцевий листок: восковий наліт на листковій пластинці (з нижнього боку)	помірний	5	до сильного
8	Остюки: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
9	Соломина: опушення верхнього вузла	сильне	7	
10	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
11	Колос: восковий наліт	сильний	7	
12	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5	
13	Колос: наявність і розміщення остюків	по всій довжині колоса	4	
14	Колос: довжина остюків на верхівці відносно довжини колоса	довша	3	
15	Нижня колоскова луска: за формою	видовжена	5	
16	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	пряме	3	
17	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною	середнє	5	
18	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	середній	5	
19	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	2	
20	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	відсутнє	1	
21	Соломина: виповнення (між основою колоса й верхнім вузлом)	слабке	3	
22	Остюки: забарвлення	чорне	4	
23	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	5	
24	Колос: опушення країв нижніх 2-4 сегментів стрижня	сильне	7	
25	Колос: інтенсивність забарвлення за досягання	біле	1	
26	Колос: форма	циліндрична	2	
27	Колос: за щільністю	щільний	7	
28	Зернівка: форма	овальна	5	
29	Зернівка: чубок за довжиною (вид зі спинки)	середній	5	
30	Зернівка: забарвлення у фенолі	відсутнє або дуже світле	1	
31	Тип розвитку	озимий	1	
32	Колос: забарвлення	білий або солом'яно-жовте	1	
33	Язичок: за формою	округлий	1	
34	Язичок: за довжиною	короткий	3	
35	Вушка: охоплення соломини	неповне	1	
36	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	сильне	7	
37	Лише для сортів пшениці полби звичайної. Колос: ламкість	ознака не визначається	0	
38	Лише для сортів пшениці полби звичайної. Зернівка: маса 1000	ознака не визначається	0	
39	Лише для сортів пшениці полби звичайної. Рослина: час досягання зерна	ознака не визначається	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	4,57	5,83	
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,3	4,22	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,73	-1,61	
+, - до усередненої урожайності, %	15,9	-27,5	
Довірчий інтервал, т/га	0,24	0,37	
Тривалість періоду вегетації, діб	262	259	
Висота рослини, см	83,7	83,7	
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	47,6	45,4	
Вміст білка, %	13,8	14,9	
Стійкість до вилягання, бал	7	8	
Стійкість до обсіпання, бал	9	8	
Стійкість до посухи, бал	7	8	
Стійкість проти борошнистої роси, бал	8	8	
Стійкість проти бурі іржі, бал	9	8	
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	7	
Стійкість проти мухи шведської, бал	9	9	
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	9	
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	7	
Стійкість проти твердої сажки, бал	8	7	
Морозостійкість за проморожування (за даними Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва), бал	2,5		
Блок	1	1	
Напрямок використання	х	х	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.

Вид: Пшениця тверда (озима) *Triticum durum* Desf.**Заявка № 18007002 Назва сорту:** Янтарний **Заявник (код):** 1591 **Власник сорту (код):** 1591**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 24.11.2020 **Патент №** 200806**Дата пріоритету:** 01.03.2018**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 24.11.2020**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 201222**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеопіль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Перший листок: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
3	Рослина: габітус	напівпрямий	3	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	відсутній або дуже мала	1	до малої
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Прапорцевий листок: восковий наліт на листовій пластинці (з нижнього боку)	сильний	7	
8	Остюки: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
9	Соломина: опушення верхнього вузла	сильне	7	
10	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	до дуже сильного
11	Колос: восковий наліт	сильний	7	
12	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5	
13	Колос: наявність і розміщення остюків	по всій довжині колоса	4	
14	Колос: довжина остюків на верхівці відносно довжини колоса	довша	3	
15	Нижня колоскова луска: за формою	яйцеподібна	3	
16	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	піднесене з наявністю другої вершини	5	
17	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною	вузьке	3	до середнього
18	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	короткий	3	
19	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	прямий	1	
20	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	відсутнє	1	
21	Соломина: виповнення (між основою колоса й верхнім вузлом)	помірне	5	
22	Остюки: забарвлення	біле	1	
23	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	5	
24	Колос: опушення країв нижніх 2-4 сегментів стрижня	помірне	5	
25	Колос: інтенсивність забарвлення за досягання	біле	1	
26	Колос: форма	пірамідална	1	
27	Колос: за щільністю	щільний	7	
28	Зернівка: форма	овальна	5	
29	Зернівка: чубок за довжиною (вид зі спинки)	короткий	3	до довгого
30	Зернівка: забарвлення у фенолі	відсутнє або дуже світле	1	
31	Тип розвитку	озимий	1	
32	Колос: забарвлення	білий або солом'яно-жовте	1	
33	Язичок: за формою	округлий	1	
34	Язичок: за довжиною	короткий	3	
35	Вушка: охоплення соломини	з перекриттям	3	
36	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	сильне	7	
37	Лише для сортів пшениці полби звичайної. Колос: ламкість	ознака не визначається	0	
38	Лише для сортів пшениці полби звичайної. Зернівка: маса 1000	ознака не визначається	0	
39	Лише для сортів пшениці полби звичайної. Рослина: час досягання зерна	ознака не визначається	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	4,57	5,83	
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,22	5,06	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,65	-0,77	
+, - до усередненої урожайності, %	14,3	-13,1	
Довірчий інтервал, т/га	0,24	0,37	
Тривалість періоду вегетації, діб	262	255	
Висота рослини, см	82,9	82	
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	46,7	44,7	
Вміст білка, %	12,6	13	
Стійкість до вилягання, бал	7	7	
Стійкість до обсіпання, бал	9	8	
Стійкість до посухи, бал	7	9	
Стійкість проти борошнистої роси, бал	8	6	
Стійкість проти бурі іржі, бал	9	8	
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	7	
Стійкість проти мухи шведської, бал	9	9	
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	9	
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	9	
Стійкість проти твердої сажки, бал	8	9	
Морозостійкість за проморожування (за даними Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва), бал	4,5		
Блок	1	1	
Напрямок використання	х	х	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.

Вид: Пшениця тверда (яра) *Triticum durum* Desf.

Заявка № 17006009 Назва сорту: Альжбета **Заявник (код):** 736 **Власник сорту (код):** 736

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 21.10.2020 **Патент № 200662**

Дата пріоритету: 16.11.2017

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 20.10.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200833

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Перший листок: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
3	Рослина: габітус	напівпрямий	3	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	середня	5	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	ранній	3	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на півхві	помірний	5	
7	Прапорцевий листок: восковий наліт на пластинці (з нижнього боку)	помірний	5	
8	Остюки: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
9	Соломина: опушення верхнього вузла	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	помірний	5	
11	Колос: восковий наліт	помірний	5	
12	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5	
13	Колос: наявність і розміщення остюків	по всій довжині колоса	4	
14	Колос: довжина остюків на верхівці відносно довжини колоса	довша	3	
15	Нижня колоскова луска: за формою	видовжена	5	
16	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	піднесене	4	
17	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною	середнє	5	
18	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	середній	5	
19	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	середньо зігнутий	3	
20	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	відсутнє	1	
21	Соломина: виповнення (між основою колоса й верхнім вузлом)	слабке	3	
22	Остюки: забарвлення	біле	1	
23	Колос: за довжиною (без остюків)	короткий	3	
24	Колос: опушення країв нижніх 2-4 сегментів стрижня	сильне	7	
25	Колос: інтенсивність забарвлення за досягання	слабко забарвлене	2	
26	Колос: форма	пірамідальна	1	
27	Колос: за щільністю	помірний	5	
28	Зернівка: форма	овальна	5	
29	Зернівка: чубок за довжиною (вид зі спинки)	середній	5	
30	Зернівка: забарвлення у фенолі	відсутнє або дуже світле	1	
31	Тип розвитку	ярий	3	
32	Колос: забарвлення	червоне	2	
33	Язичок: за формою	округлий	1	
34	Язичок: за довжиною	середній	5	
35	Вушка: охоплення соломини	повне	2	
36	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	слабке	3	
37	Лише для сортів пшениці полби звичайної. Колос: ламкість	ознака не визначається	0	
38	Лише для сортів пшениці полби звичайної. Зернівка: маса 1000	ознака не визначається	0	
39	Лише для сортів пшениці полби звичайної. Рослина: час досягання зерна	ознака не визначається	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,08	3,48	
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	2,21	3,31	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,13	-0,17	
+, - до усередненої урожайності, %	6,4	-4,8	
Довірчий інтервал, т/га	0,17	0,28	
Тривалість періоду вегетації, діб	91	90	
Висота рослини, см	94,5	99,1	
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	39,5	42,8	
Вміст білка, %	15,1	15,3	
Стійкість до вилягання, бал	8	6	
Стійкість до обсіпання, бал	9	8	
Стійкість до посухи, бал	5	6	
Стійкість проти борошнистої роси, бал	7	7	
Стійкість проти бурі іржі, бал	8	8	
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	7	
Стійкість проти мухи шведської, бал	9	9	
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	9	
Стійкість проти твердої сажки, бал	9	9	
Стійкість проти летючої сажки, бал	9	9	
Напрямок використання	х	х	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Пшениця тверда (яра) *Triticum durum* Desf.**Заявка № 18006002 Назва сорту:** Meica **Заявник (код):** 1581 **Власник сорту (код):** 1581**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 17.11.2020**Свідоцтво про державну реєстрацію № 201799****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Перший листок: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
3	Рослина: габітус	напіврозлогий	5	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	середня	5	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	ранній	3	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний	5	
7	Прапорцевий листок: восковий наліт на пластинці (з нижнього боку)	помірний	5	
8	Остюки: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
9	Соломина: опушення верхнього вузла	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	дуже сильний	9	
11	Колос: восковий наліт	помірний	5	
12	Рослина: за висотою (стебло і колос)	висока	7	
13	Колос: наявність і розміщення остюків	по всій довжині колоса	4	
14	Колос: довжина остюків на верхівці відносно довжини колоса	довша	3	
15	Нижня колоскова луска: за формою	видовжена	5	
16	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	піднесене	4	
17	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною	середнє	5	
18	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	середній	5	
19	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	2	
20	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	відсутнє	1	
21	Соломина: вивопнення (між основою колоса й верхнім вузлом)	помірне	5	
22	Остюки: забарвлення	біле	1	
23	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	5	
24	Колос: опушення країв нижніх 2-4 сегментів стрижня	слабке	3	
25	Колос: інтенсивність забарвлення за досягання	слабко забарвлене	2	
26	Колос: форма	пірамідальна	1	
27	Колос: за щільністю	щільний	7	
28	Зернівка: форма	овальна	5	
29	Зернівка: чубок за довжиною (вид зі спинки)	середній	5	
30	Зернівка: забарвлення у фенолі	відсутнє або дуже світле	1	
31	Тип розвитку	ярий	3	
32	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
33	Язичок: за формою	округлий	1	
34	Язичок: за довжиною	середній	5	
35	Вушка: охоплення соломини	повне	2	
36	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	слабке	3	
37	Лише для сортів пшениці полби звичайної. Колос: ламкість	ознака не визначається	0	
38	Лише для сортів пшениці полби звичайної. Зернівка: маса 1000	ознака не визначається	0	
39	Лише для сортів пшениці полби звичайної. Рослина: час досягання зерна	ознака не визначається	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,08	3,48	
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	2,26	4,01	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,18	0,53	
+, - до усередненої урожайності, %	8,6	15,2	
Довірчий інтервал, т/га	0,17	0,28	
Тривалість періоду вегетації, діб	92	94	
Висота рослини, см	99,3	104,9	
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	39,2	42,1	
Вміст білка, %	15,1	14	
Стійкість до вилягання, бал	9	5	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	5	7	
Стійкість проти борошнистої роси, бал	7	7	
Стійкість проти бурої іржі, бал	7	9	
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	6	
Стійкість проти мухи шведської, бал	8	9	
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	8	9	
Стійкість проти твердої сажки, бал	9	9	
Стійкість проти летючої сажки, бал	9	9	
Напрямок використання	х	х	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Тритикале (озиме) *Triticosecale* Witt.

Заявка № 18022001 Назва сорту: Єлань **Заявник (код):** 1581 2284 **Власник сорту (код):** 1581 2284

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 17.11.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201824

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: плоідність	гексаплоїд	6	
2	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	слабке	3	
3	Рослина: габітус	напівпрямий	3	
4	Рослина: кількість рослин з похилими прапорцевими листками	мала	3	
5	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
6	Початок колосіння (перший колосок помітний у 50% рослин)	пізнє	7	
7	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний	5	
8	Остюки: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
9	Пиляки: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Прапорцевий листок: листкова пластинка за довжиною	середня	5	
11	Прапорцевий листок: листкова пластинка за шириною	вузька	3	
12	Колос: сизий наліт	помірний	5	
13	Стебло: інтенсивність опушення верхнього (підколосового) міжвузля	слабке	3	
14	Рослина: за висотою (разом зі стеблом, колосом та остюками)	середня	5	
15	Колос: розміщення остюків	у верхній половині	2	
16	Остюки: за довжиною відносно колосу	дуже короткі	1	
17	Нижня колоскова луска: кільовий зубець за довжиною (колосок із середньої третини колоса)	дуже короткий	1	
18	Нижня колоскова луска: розмір другого зубця (як для 17)	відсутній або дуже малий	1	
19	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні (як для 17)	відсутнє	1	
20	Соломина: за виповненням (поперечний переріз між основою колоса і верхнім вузлом)	порожниста	3	
21	Колос: забарвлення	біле	1	
22	Колос: за щільністю	помірно щільний	5	
23	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	5	
24	Колос: за шириною (вигляд збоку)	середній	5	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	ознака не визначена	0	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Колос: за формою	пірамідальний	1	
28	Колос: остюки	наявні	9	
29	Вісь колосу: за міцністю	гнучка	9	
30	Колосок: кількість квіток	середня	5	
31	Колосок: плідність квіток	плідні	1	
32	Зернівка: за формою	горбата	9	
33	Зернівка: забарвлення	жовто-біла	1	
34	Зернівка: за характером поверхні	слабо зморшкувата	7	
35	Зернівка: за крупністю	середня	5	
36	Колос: положення в просторі	поникле	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		5,58	4,92
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га		5,86	5,3
+, - до усередненої урожайності, т/га		0,28	0,38
+, - до усередненої урожайності, %		5	7,8
Довірчий інтервал, т/га		0,28	0,17
Тривалість періоду вегетації, діб		275	278
Висота рослини, см		97	103,8
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г		45,5	38
Череззерниця, %		6,8	4,3
Вміст білка, %		11,6	12,8
Вміст морозобійних зерен, %		0	1,6
Стійкість до вилягання, бал		7	3
Стійкість до обсіпання, бал		8	9
Стійкість до посухи, бал		8	7
Зимостійкість: польова оцінка, бал		7	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал		8	8
Стійкість проти бурі іржі, бал		8	7
Стійкість проти корневих гнилей, бал		9	9
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал		9	7
Напрямок використання		зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Тритикале (озиме) *Triticosecale* Witt.**Заявка № 17022002 Назва сорту:** Леонтій **Заявник (код):** 1581 **Власник сорту (код):** 1581**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 17.11.2020**Свідоцтво про державну реєстрацію № 201823****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: плоідність	гексаплоїд	6	
2	Колеоптіль: антоціанове забарвлення	слабке	3	
3	Рослина: габітус	напівпрямий	3	
4	Рослина: кількість рослин з похилими прапорцевими листками	середня	5	
5	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
6	Початок колосіння (перший колосок помітний у 50% рослин)	середнє	5	
7	Прапорцевий листок: восковий наліт на півхві	сильний	7	
8	Остюки: антоціанове забарвлення	слабке	3	
9	Пиляки: антоціанове забарвлення	слабке	3	
10	Прапорцевий листок: листкова пластинка за довжиною	середня	5	
11	Прапорцевий листок: листкова пластинка за шириною	середня	5	
12	Колос: сизий наліт	сильний	7	
13	Стебло: інтенсивність опушення верхнього (підколосового) міжвузля	слабке	3	
14	Рослина: за висотою (разом зі стеблом, колосом та остюками)	висока	7	
15	Колос: розміщення остюків	у верхній половині	2	
16	Остюки: за довжиною відносно колосу	короткі	3	
17	Нижня колоскова луска: кільовий зубець за довжиною (колосок із середньої третини колоса)	короткий	3	
18	Нижня колоскова луска: розмір другого зубця (як для 17)	середній	5	
19	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні (як для 17)	відсутнє	1	
20	Соломина: за виповненням (поперечний переріз між основою колоса і верхнім вузлом)	порожниста	3	
21	Колос: забарвлення	біле	1	
22	Колос: за щільністю	помірно щільний	5	
23	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	5	
24	Колос: за шириною (вигляд збоку)	середній	5	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	ознака не визначена	0	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Колос: за формою	напівбулавоподібний	3	
28	Колос: остюки	наявні	9	
29	Вісь колосу: за міцністю	гнучка	9	
30	Колосок: кількість квіток	середня	5	
31	Колосок: плідність квіток	плідні	1	
32	Зернівка: за формою	видовжена	5	
33	Зернівка: забарвлення	світло-коричневе	3	
34	Зернівка: за характером поверхні	слабко зморшувата	7	
35	Зернівка: за крупністю	середня	5	
36	Колос: положення в просторі	напівпонижле	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		5,58	4,92
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га		6,43	5,52
+, - до усередненої урожайності, т/га		0,85	0,6
+, - до усередненої урожайності, %		15,2	12,2
Довірчий інтервал, т/га		0,28	0,17
Тривалість періоду вегетації, діб		276	278
Висота рослини, см		112	124,2
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г		45,8	41,4
Череззерниця, %		5,8	5,2
Вміст білка, %		11,5	13,1
Вміст морозобійних зерен, %		0	2,2
Стійкість до вилягання, бал		8	1
Стійкість до обсіпання, бал		9	9
Стійкість до посухи, бал		9	7
Зимостійкість: польова оцінка, бал		9	8
Стійкість проти борошнистої роси, бал		8	8
Стійкість проти бурі іржі, бал		9	7
Стійкість проти кореневих гнилей, бал		9	9
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал		9	6
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Тритикале (озиме) *Triticosecale* Witt.

Заявка № 17022009 Назва сорту: Мироносець **Заявник (код):** 1589 1601 **Власник сорту (код):** 1589 1601

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 20.11.2020 **Патент №** 200811

Дата пріоритету: 21.12.2017

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.11.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200950

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: плідність	гексплоїд	6	
2	Колеоптіль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
3	Рослина: габітус	напіврозлогий	5	
4	Рослина: кількість рослин з похилими прапорцевими листками	мала	3	
5	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
6	Початок колосіння (перший колосок помітний у 50% рослин)	пізні	7	
7	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний	5	
8	Остюки: антоціанове забарвлення	слабке	3	
9	Пиляки: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Прапорцевий листок: листкова пластинка за довжиною	середня	5	
11	Прапорцевий листок: листкова пластинка за шириною	вузька	3	
12	Колос: сизий наліт	слабкий	3	
13	Стебло: інтенсивність опушення верхнього (підколосового) міжвузля	помірне	5	
14	Рослина: за висотою (разом зі стеблом, колосом та остюками)	низька	3	
15	Колос: розміщення остюків	у верхній половині	2	
16	Остюки: за довжиною відносно колосу	середні	5	
17	Нижня колоскова луска: кільцевий зубець за довжиною (колосок із середньої третини колоса)	середній	5	
18	Нижня колоскова луска: розмір другого зубця (як для 17)	відсутній або дуже малий	1	
19	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні (як для 17)	наявне	9	
20	Соломина: за виповненням (поперечний переріз між основою колоса і верхнім вузлом)	порожниста	3	
21	Колос: забарвлення	сіро-димчасте	2	
22	Колос: за щільністю	помірно щільний	5	
23	Колос: за довжиною (без остюків)	короткий	3	
24	Колос: за шириною (вигляд збоку)	середній	5	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	ознака не визначена	0	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Колос: за формою	напівбулавоподібний	3	
28	Колос: остюки	наявні	9	
29	Вісь колосу: за міцністю	гнучка	9	
30	Колосок: кількість квіток	середня	5	
31	Колосок: плідність квіток	плідні	1	
32	Зернівка: за формою	горбата	9	
33	Зернівка: забарвлення	жовто-біла	1	
34	Зернівка: за характером поверхні	слабко зморшкувата	7	
35	Зернівка: за крупністю	середня	5	
36	Колос: положення в просторі	напівпоникле	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		5,58	4,92
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га		5,74	5,18
+, - до усередненої урожайності, т/га		0,16	0,26
+, - до усередненої урожайності, %		2,9	5,4
Довірчий інтервал, т/га		0,28	0,17
Тривалість періоду вегетації, діб		275	278
Висота рослини, см		93,6	95,7
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г		42,2	36,4
Череззерниця, %		10	4,3
Вміст білка, %		12,4	13,4
Вміст морозобійних зерен, %		0	2,6
Стійкість до вилягання, бал		8	2
Стійкість до обсіпання, бал		8	9
Стійкість до посухи, бал		8	7
Зимостійкість: польова оцінка, бал		9	8
Стійкість проти борошнистої роси, бал		7	3
Стійкість проти бурі іржі, бал		8	5
Стійкість проти корневих гнилей, бал		9	9
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал		9	6
Напрямок використання		зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Тритикале (озиме) *Triticosecale* Witt.

Заявка № 17022010 Назва сорту: Пудік Заявник (код): 2632 1807 Власник сорту (код): 2632 1807

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 30.10.2020 Патент № 200726

Дата пріоритету: 22.12.2017

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.10.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200844

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: плідність	гексаплоїд	6	
2	Колеоптіль: антоціанове забарвлення	слабке	3	
3	Рослина: габітус	розлогий	7	
4	Рослина: кількість рослин з похилими прапорцевими листками	велика	7	
5	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
6	Початок колосіння (перший колосок помітний у 50% рослин)	середнє	5	
7	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
8	Остюки: антоціанове забарвлення	слабке	3	
9	Пиляки: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Прапорцевий листок: листкова пластинка за довжиною	середня	5	
11	Прапорцевий листок: листкова пластинка за шириною	середня	5	
12	Колос: сизий наліт	помірний	5	
13	Стебло: інтенсивність опушення верхнього (підколосового) міжвузля	помірне	5	
14	Рослина: за висотою (разом зі стеблом, колосом та остюками)	середня	5	
15	Колос: розміщення остюків	у верхній половині	2	
16	Остюки: за довжиною відносно колосу	короткі	3	
17	Нижня колоскова луска: кільовий зубець за довжиною (колосок із середньої третини колоса)	дуже короткий	1	
18	Нижня колоскова луска: розмір другого зубця (як для 17)	малий	3	
19	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні (як для 17)	відсутнє	1	
20	Соломина: за виповненням (поперечний переріз між основою колоса і верхнім вузлом)	порожниста	3	
21	Колос: забарвлення	біле	1	
22	Колос: за щільністю	щільний	7	
23	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	5	
24	Колос: за шириною (вигляд збоку)	середній	5	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	ознака не визначена	0	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Колос: за формою	веретеноподібний	5	
28	Колос: остюки	наявні	9	
29	Вісь колосу: за міцністю	гнучка	9	
30	Колосок: кількість квіток	середня	5	
31	Колосок: плідність квіток	плідні	1	
32	Зернівка: за формою	горбата	9	
33	Зернівка: забарвлення	жовто-біла	1	
34	Зернівка: за характером поверхні	слабко зморшувата	7	
35	Зернівка: за крупністю	середня	5	
36	Колос: положення в просторі	напівпоникле	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		5,58	4,92
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га		5,66	5,25
+, - до усередненої урожайності, т/га		0,08	0,33
+, - до усередненої урожайності, %		1,4	6,8
Довірчий інтервал, т/га		0,28	0,17
Тривалість періоду вегетації, діб		276	279
Висота рослини, см		87,3	98
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г		41,5	35,6
Череззерниця, %		8,2	4,5
Вміст білка, %		11,5	13
Вміст морозобійних зерен, %		0	1,5
Стійкість до вилягання, бал		7	1
Стійкість до обсіпання, бал		9	9
Стійкість до посухи, бал		7	7
Зимостійкість: польова оцінка, бал		7	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал		8	7
Стійкість проти бурі іржі, бал		8	7
Стійкість проти кореневих гнилей, бал		9	9
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал		8	7
Напрямок використання		зерн	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Тритикале (яре) *Triticosecale* Witt.

Заявка № 18288002 Назва сорту: Скарб харківський **Заявник (код):** 1581 **Власник сорту (код):** 1581

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 17.11.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201825

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: за плоідністю	ознака не визначалась	0	
2	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
3	Рослина: форма куща	напівпрямий	3	
4	Рослина: кількість рослин з похилими прапорцевими листками	мала	3	
5	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
6	Початок колосіння (перший колосок помітний у 50% рослин)	середнє	5	
7	Прапорцевий листок: сизий наліт на півхві	сильний	7	
8	Остюки: антоціанове забарвлення	слабке	3	
9	Пиляки: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Прапорцевий листок: листкова пластинка за довжиною	середня	5	
11	Прапорцевий листок: листкова пластинка за шириною	вузька	3	
12	Колос: сизий наліт	помірний	5	
13	Стебло: інтенсивність опушення верхнього (підколосового) міжвузля	помірне	5	
14	Рослина: висота (разом зі стеблом, колосом та остюками)	середня	5	
15	Колос: розміщення остюків	за всією довжиною	3	
16	Остюки: за довжиною відносно колоса	середні	5	
17	Нижня колоскова луска: кільцевий зубець за довжиною (колосок із середньої третини колоса)	короткий	3	
18	Нижня колоскова луска: розмір другого зубця (як для 17)	відсутній або дуже малий	1	
19	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні (як для 17)	відсутнє	1	
20	Соломина: за виповненням у поперечному розрізі (між основою колосу і верхнім вузлом)	середньо-виповнена	5	
21	Колос: забарвлення	біле	1	
22	Колос: за щільністю	щільний	7	
23	Колос: за довжиною (без остюків)	короткий	3	
24	Колос: за шириною (вигляд збоку)	середній	5	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	ознака не визначалась	0	
26	Тип розвитку	ярий	3	
27	Колос: за формою	напівбулавоподібний	3	
28	Колос: наявність остюків	наявні	9	
29	Вісь колосу: за міцністю	гнучка	9	
30	Колосок: кількість квіток	середня	5	
31	Колосок: плідність квіток	плідні	1	
32	Зернівка: за формою	яйцеподібна	3	
33	Зернівка: забарвлення	жовто-біле	1	
34	Зернівка: за характером поверхні	гладенька	9	
35	Зернівка: за крупністю	середня	5	
36	Колос: положення в просторі	напівпоникле	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		3,66	3,3
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га		4,85	4,7
+, - до усередненої урожайності, т/га		1,19	1,4
+, - до усередненої урожайності, %		32,5	42,5
Довірчий інтервал, т/га		0,38	0,16
Тривалість періоду вегетації, діб		101	97
Висота рослини, см		98,9	107,5
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г		40,9	39,9
Череззерниця, %		7,4	4,6
Вміст білка, %		13,4	13,3
Вміст пророслих зерен, %		1	3,7
Стійкість до вилягання, бал		6	8
Стійкість до обсіпання, бал		8	9
Стійкість до посухи, бал		8	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал		9	7
Стійкість проти бурі іржі, бал		9	6
Стійкість проти корневих гнилей, бал		9	8
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал		8	8
Напрямок використання		зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Ячмінь звичайний (озимий) *Hordeum vulgare* L.**Заявка № 18019007 Назва сорту:** Аренія **Заявник (код):** 1223 **Власник сорту (код):** 1223**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 23.10.2020**Свідцтво про державну реєстрацію № 200848****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус (форма куща)	напіврозлогий	5	
2	Нижні листки: опушення піхви	наявне	9	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє	1	
4	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	ознака не визначається	0	
5	Рослина: кількість рослин із похилим прапорцевим листком	середня	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний	5	
7	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	ранній	3	
8	Остюки: антоціанового забарвлення кінчиків	наявне	9	
9	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків	відсутня або дуже слабка	1	
10	Колос: восковий наліт	відсутній або дуже слабкий	1	
11	Колос: положення в просторі	напівпряме	3	
12	Рослина: за висотою (стебло, колос та остюки)	середня	5	
13	Колос: кількість рядів	більше двох	2	
14	Колос: форма	циліндрична	5	
15	Колос: за щільністю	середній	5	
16	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	2	
17	Остюки: за довжиною (порівняно з колосом)	довгі	7	
18	Стрижень колосу: за довжиною першого сегменту	короткий	3	
19	Стрижень колоса: вигин першого сегмента	малий	3	
20	Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)	ознака не визначається	0	
21	Середній колосок: колоскові луски й остюки за довжиною відносно зернівки	довші	3	
22	Зернівка: волоски основної щетинки за довжиною	короткі	1	
23	Зернівка: плівка	наявна	9	
24	Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски	відсутня або дуже слабка	1	
25	Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски	помірне	5	
26	Зернівка: опушення вентральної бороздки	відсутнє	1	
27	Зернівка: розташування лодикул	фронтальне	1	
28	Зернівка: забарвлення алеїронового шару	слабке забарвлення	2	до сильного
29	Тип розвитку	озимий	1	
30	Колос: остюки	наявні	9	
31	Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення	остюки	5	
32	Зернівка: форма	видовжено-еліптична	5	
33	Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски	тонкозморшкувата	1	
34	Тільки для плівкових сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски	наявне	1	
35	Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка	поступовий	2	
36	Вушка: форма верхівки	загострена	2	
37	Вушка: охоплення соломини	перекриваюче	3	
38	Язичок: ступінь виявлення	середній	5	
39	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й верхнім вузлом)	слабко виповнена	3	
40	Рослина: утворення пилку (чоловіча стерильність)	наявне	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,35	6,96	5,26
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,35	6,49	6,43
+, - до усередненої урожайності, т/га	0	-0,47	1,17
+, - до усередненої урожайності, %	0	-6,8	22,2
Довірчий інтервал, т/га	0,17	0,26	0,18
Тривалість періоду вегетації, діб	250	256	262
Висота рослини, см	76,9	85,3	84,9
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	46,2	43,6	39,9
Вміст білка, %	12,5	12,8	11
Стійкість до вилягання, бал	8	8	8
Стійкість до обсіпання, бал	8	9	9
Стійкість до посухи, бал	8	8	9
Стійкість проти борошнистої роси, бал	8	8	8
Стійкість проти бурі іржі, бал	8	8	7
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	8	8	7
Стійкість проти внутрішньостеблових шкідників, бал	9	9	8
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	8	9
Блок	1	1	1
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СП.

Вид: Ячмінь звичайний (озимий) *Hordeum vulgare* L.

Заявка № 18019006 Назва сорту: Белісса **Заявник (код):** 926 **Власник сорту (код):** 926

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.10.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200847

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
2	Нижні листки: опушення піхви	відсутнє	1	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє	1	
4	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	ознака не визначається	0	
5	Рослина: кількість рослин із похилим прапорцевим листком	мала	3	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
8	Остюки: антоціанового забарвлення кінчиків	відсутнє	1	
9	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків	ознака не визначається	0	
10	Колос: восковий наліт	слабкий	3	
11	Колос: положення в просторі	пряме	1	
12	Рослина: за висотою (стебло, колос та остюки)	низька	3	до середньої
13	Колос: кількість рядів	більше двох	2	
14	Колос: форма	циліндрична	5	
15	Колос: за щільністю	середній	5	
16	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	2	до довгого
17	Остюки: за довжиною (порівняно з колосом)	довгі	7	
18	Стрижень колосу: за довжиною першого сегменту	короткий	3	
19	Стрижень колоса: вигин першого сегмента	малий	3	
20	Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)	ознака не визначається	0	
21	Середній колосок: колоскові луски й остюки за довжиною відносно зернівки	довші	3	
22	Зернівка: волоски основної щетинки за довжиною	довгі	2	
23	Зернівка: плівка	наявна	9	
24	Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски	відсутня або дуже слабка	1	
25	Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски	слабке	3	
26	Зернівка: опушення вентральної борізки	відсутнє	1	
27	Зернівка: розташування лодикул	фронтальне	1	
28	Зернівка: забарвлення алеїронового шару	білясте	1	
29	Тип розвитку	озимий	1	
30	Колос: остюки	наявні	9	
31	Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення	остюки	5	
32	Зернівка: форма	видовжено-еліптична	5	
33	Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски	тонкозморшувата	1	
34	Тільки для плівкових сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски	відсутнє	9	
35	Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка	різкий	1	
36	Вушка: форма верхівки	тупа	1	
37	Вушка: охоплення соломини	ознака не визначалась	0	
38	Язичок: ступінь виявлення	слабкий	3	
39	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й верхнім вузлом)	проміжна	5	
40	Рослина: утворення пилку (чоловіча стерильність)	наявне	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,35	6,96	5,26
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	4,78	6,6	6,68
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,57	-0,36	1,42
+, - до усередненої урожайності, %	-10,7	-5,2	26,9
Довірчий інтервал, т/га	0,17	0,26	0,18
Тривалість періоду вегетації, діб	251	256	262
Висота рослини, см	80,1	90,3	85,3
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	47,2	42,8	41,4
Вміст білка, %	13	13,9	11,4
Стійкість до вилягання, бал	7	8	8
Стійкість до обсіпання, бал	8	9	9
Стійкість до посухи, бал	8	8	9
Стійкість проти борошнистої роси, бал	8	8	8
Стійкість проти бурі ржі, бал	8	8	8
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	8	8	8
Стійкість проти внутрішньостеблових шкідників, бал	9	9	8
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	8	9
Блок	1	1	1
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: П.

Вид: Ячмінь звичайний (озимий) *Hordeum vulgare* L.**Заявка №** 18019008 **Назва сорту:** Белла **Заявник (код):** 1223 **Власник сорту (код):** 1223**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 23.10.2020**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 200849**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус (форма куща)	напіврозлогий	5	
2	Нижні листки: опушення піхви	наявне	9	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє	1	
4	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	ознака не визначається	0	
5	Рослина: кількість рослин із похилим прапорцевим листком	середня	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний	5	
7	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	пізній	7	
8	Остюки: антоціанового забарвлення кінчиків	відсутнє	1	
9	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків	ознака не визначається	0	
10	Колос: восковий наліт	відсутній або дуже слабкий	1	
11	Колос: положення в просторі	пряме	1	
12	Рослина: за висотою (стебло, колос та остюки)	середня	5	
13	Колос: кількість рядів	більше двох	2	
14	Колос: форма	пірамідальна	3	
15	Колос: за щільністю	середній	5	
16	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	2	
17	Остюки: за довжиною (порівняно з колосом)	середні	5	
18	Стрижень колосу: за довжиною першого сегменту	короткий	3	
19	Стрижень колоса: вигин першого сегмента	малий	3	
20	Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)	ознака не визначається	0	
21	Середній колосок: колоскові луски й остюки за довжиною відносно зернівки	рівні	2	
22	Зернівка: волоски основної щетинки за довжиною	довгі	2	
23	Зернівка: плівка	наявна	9	
24	Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски	відсутня або дуже слабка	1	
25	Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски	помірне	5	
26	Зернівка: опушення вентральної борізки	відсутнє	1	
27	Зернівка: розташування лодикул	охоплююче	2	
28	Зернівка: забарвлення алеїронового шару	білясте	1	
29	Тип розвитку	озимий	1	
30	Колос: остюки	наявні	9	
31	Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення	остюки	5	
32	Зернівка: форма	видовжено-еліптична	5	
33	Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски	тонкозморшувата	1	
34	Тільки для плівкових сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски	відсутнє	9	
35	Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка	поступовий	2	
36	Вушка: форма верхівки	загострена	2	
37	Вушка: охоплення соломини	перекриваюче	3	
38	Язичок: ступінь виявлення	середній	5	
39	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й верхнім вузлом)	слабко виповнена	3	
40	Рослина: утворення пилку (чоловіча стерильність)	наявне	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,35	6,96	5,26
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	4,27	6,64	6,47
+, - до усередненої урожайності, т/га	-1,08	-0,34	1,21
+, - до усередненої урожайності, %	-20,3	-4,8	23
Довірчий інтервал, т/га	0,17	0,26	0,18
Тривалість періоду вегетації, діб	252	255	264
Висота рослини, см	85	95	94,8
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	46,1	43,3	40,9
Вміст білка, %	13,3	13,1	11,3
Стійкість до вилягання, бал	7	8	8
Стійкість до обсіпання, бал	8	9	9
Стійкість до посухи, бал	7	8	9
Стійкість проти борошнистої роси, бал	8	8	8
Стійкість проти бурі іржі, бал	8	8	8
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	8	8	7
Стійкість проти внутрішньостеблових шкідників, бал	8	9	9
Зимостійкість: польова оцінка, бал	7	8	8
Блок	1	1	1
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: П.

Вид: Ячмінь звичайний (озимий) *Hordeum vulgare* L.

Заявка № 17019002 Назва сорту: Гірнделла **Заявник (код):** 1891 **Власник сорту (код):** 1891

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 02.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201002

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
2	Нижні листки: опушення піхви	наявне	9	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє	1	
4	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	ознака не визначається	0	
5	Рослина: кількість рослин із похилим прапорцевим листком	мала	3	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	слабкий	3	
7	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
8	Остюки: антоціанового забарвлення кінчиків	відсутнє	1	
9	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків	ознака не визначається	0	
10	Колос: восковий наліт	слабкий	3	
11	Колос: положення в просторі	напівпряме	3	
12	Рослина: за висотою (стебло, колос та остюки)	середня	5	
13	Колос: кількість рядів	більше двох	2	
14	Колос: форма	циліндрична	5	
15	Колос: за щільністю	середній	5	
16	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	2	
17	Остюки: за довжиною (порівняно з колосом)	довгі	7	
18	Стрижень колосу: за довжиною першого сегменту	середній	5	
19	Стрижень колоса: вигин першого сегмента	великий	7	
20	Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)	ознака не визначається	0	
21	Середній колосок: колоскові луски й остюки за довжиною відносно зернівки	довші	3	
22	Зернівка: волоски основної щетинки за довжиною	довгі	2	
23	Зернівка: плівка	наявна	9	
24	Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски	відсутня або дуже слабка	1	
25	Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски	слабке	3	
26	Зернівка: опушення вентральної борізки	відсутнє	1	
27	Зернівка: розташування лодикул	охоплююче	2	
28	Зернівка: забарвлення алеїронового шару	сильне забарвлення	3	
29	Тип розвитку	озимий	1	
30	Колос: остюки	наявні	9	
31	Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення	остюки	5	
32	Зернівка: форма	видовжено-еліптична	5	
33	Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски	тонкозморшківата	1	
34	Тільки для плівкових сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски	відсутнє	9	
35	Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка	поступовий	2	
36	Вушка: форма верхівки	загострена	2	
37	Вушка: охоплення соломини	перекриваюче	3	
38	Язичок: ступінь виявлення	середній	5	
39	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й верхнім вузлом)	слабко виповнена	3	
40	Рослина: утворення пилку (чоловіча стерильність)	наявне	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,36	6,95	5,21
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	4,2	5,62	5,79
+, - до усередненої урожайності, т/га	-1,17	-1,34	0,58
+, - до усередненої урожайності, %	-21,8	-19,2	10,9
Довірчий інтервал, т/га	0,16	0,26	0,18
Тривалість періоду вегетації, діб	251	259	259
Висота рослини, см	71,3	79,2	82,3
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	43,8	42,9	43,3
Вміст білка, %	12,9	13,1	11,5
Стійкість до вилягання, бал	7	8	8
Стійкість до обсіпання, бал	8	8	8
Стійкість до посухи, бал	8	8	8
Стійкість проти борошнистої роси, бал	8	8	8
Стійкість проти бурі ржі, бал	9	8	8
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	8	8	7
Стійкість проти внутрішньостеблових шкідників, бал	9	9	8
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	8	8
Блок	1	1	1
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: П.

Вид: Ячмінь звичайний (озимий) *Hordeum vulgare* L.

Заявка № 18019005 Назва сорту: КАЙЛІН Заявник (код): 2302 Власник сорту (код): 2302

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.11.2020 Патент № 200814

Дата пріоритету: 23.05.2018

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.10.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200846

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
2	Нижні листки: опушення піхви	наявне	9	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє	1	
4	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	ознака не визначається	0	
5	Рослина: кількість рослин із похилим прапорцевим листком	середня	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний	5	
7	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	дуже пізній	9	
8	Остюки: антоціанового забарвлення кінчиків	відсутнє	1	
9	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків	ознака не визначається	0	
10	Колос: восковий наліт	помірний	5	
11	Колос: положення в просторі	напівпряме	3	
12	Рослина: за висотою (стебло, колос та остюки)	середня	5	
13	Колос: кількість рядів	більше двох	2	
14	Колос: форма	пірамідальна	3	
15	Колос: за щільністю	середній	5	
16	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	2	
17	Остюки: за довжиною (порівняно з колосом)	довгі	7	
18	Стрижень колосу: за довжиною першого сегменту	середній	5	
19	Стрижень колоса: вигин першого сегмента	помірний	5	
20	Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)	ознака не визначається	0	
21	Середній колосок: колоскові луски й остюки за довжиною відносно зернівки	рівні	2	
22	Зернівка: волоски основної щетинки за довжиною	довгі	2	
23	Зернівка: плівка	наявна	9	
24	Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски	відсутня або дуже слабка	1	до слабкої
25	Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски	слабке	3	
26	Зернівка: опушення вентральної боріздки	відсутнє	1	
27	Зернівка: розташування лодикул	охоплююче	2	
28	Зернівка: забарвлення алеїронового шару	білясте	1	
29	Тип розвитку	озимий	1	
30	Колос: остюки	наявні	9	
31	Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення	остюки	5	
32	Зернівка: форма	видовжено-еліптична	5	
33	Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски	тонкозморшкувата	1	
34	Тільки для плівкових сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски	відсутнє	9	
35	Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка	поступовий	2	
36	Вушка: форма верхівки	загострена	2	
37	Вушка: охоплення соломини	перекриваюче	3	
38	Язичок: ступінь виявлення	середній	5	
39	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й верхнім вузлом)	слабко виповнена	3	
40	Рослина: утворення пилку (чоловіча стерильність)	наявне	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,35	6,96	5,26
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,54	6,74	6,39
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,19	-0,22	1,13
+, - до усередненої урожайності, %	3,4	-3,2	21,4
Довірчий інтервал, т/га	0,17	0,26	0,18
Тривалість періоду вегетації, діб	252	257	264
Висота рослини, см	86,3	93,6	93,7
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	47,6	46,1	43,2
Вміст білка, %	12,8	13,6	12,2
Стійкість до вилягання, бал	8	8	8
Стійкість до обсипання, бал	8	9	8
Стійкість до посухи, бал	8	8	9
Стійкість проти борошнистої роси, бал	8	8	8
Стійкість проти бурої іржі, бал	9	8	8
Стійкість проти гельмінтоспору, бал	8	8	7
Стійкість проти внутрішньостеблових шкідників, бал	9	9	9
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	8	9
Блок	1	1	1
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СП.

Вид: Ячмінь звичайний (озимий) *Hordeum vulgare* L.

Заявка № 18019002 Назва сорту: Крікс **Заявник (код):** 1591 **Власник сорту (код):** 1591

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 24.11.2020 **Патент №** 200813

Дата пріоритету: 01.03.2018

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 24.11.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201267

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
2	Нижні листки: опушення піхви	відсутнє	1	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє	1	
4	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	ознака не визначається	0	
5	Рослина: кількість рослин із похилим прапорцевим листком	мала	3	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний	5	
7	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	ранній	3	
8	Остюки: антоціанового забарвлення кінчиків	наявне	9	
9	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків	помірна	5	
10	Колос: восковий наліт	слабкий	3	
11	Колос: положення в просторі	напівпряме	3	
12	Рослина: за висотою (стебло, колос та остюки)	низька	3	до середньої
13	Колос: кількість рядів	більше двох	2	
14	Колос: форма	пірамідальна	3	
15	Колос: за щільністю	середній	5	
16	Колос: за довжиною (без остюків)	короткий	1	
17	Остюки: за довжиною (порівняно з колосом)	середні	5	
18	Стрижень колосу: за довжиною першого сегменту	короткий	3	
19	Стрижень колоса: вигин першого сегмента	малий	3	
20	Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)	ознака не визначається	0	
21	Середній колосок: колоскові луски й остюки за довжиною відносно зернівки	довші	3	
22	Зернівка: волоски основної щетинки за довжиною	короткі	1	
23	Зернівка: плівка	наявна	9	легко відокремлюється від зернівки
24	Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски	відсутня або дуже слабка	1	
25	Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски	помірне	5	
26	Зернівка: опушення вентральної боріздки	відсутнє	1	
27	Зернівка: розташування лодикул	фронтальне	1	
28	Зернівка: забарвлення алеїронового шару	білясте	1	
29	Тип розвитку	озимий	1	
30	Колос: остюки	наявні	9	
31	Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення	остюки	5	
32	Зернівка: форма	видовжено-еліптична	5	
33	Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски	тонкозморшувата	1	
34	Тільки для плівкових сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски	ознака не визначається	0	
35	Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка	поступовий	2	
36	Вушка: форма верхівки	загострена	2	
37	Вушка: охоплення соломини	повне	2	
38	Язичок: ступінь виявлення	середній	5	
39	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й верхнім вузлом)	слабко виповнена	3	
40	Рослина: утворення пилку (чоловіча стерильність)	наявне	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	4,41	5,64	5,37
Довірчий інтервал, т/га	0,15	0,24	0,17
Тривалість періоду вегетації, діб	250	257	260
Висота рослини, см	75,1	87,6	82,6
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	41,5	36,8	36,1
Вміст білка, %	12,8	13,2	12
Стійкість до вилягання, бал	7	7	7
Стійкість до обсіпання, бал	8	8	8
Стійкість до посухи, бал	8	8	8
Стійкість проти борошнистої роси, бал	8	8	8
Стійкість проти бурі іржі, бал	8	8	7
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	8	8	7
Стійкість проти внутрішньостеблових шкідників, бал	8	9	8
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	7	9
Блок	2	2	2
Напрямок використання	х	х	х

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Ячмінь звичайний (озимий) *Hordeum vulgare* L.

Заявка № 18019001 Назва сорту: Непереможний **Заявник (код):** 1998 **Власник сорту (код):** 1998

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 10.11.2020 **Патент №** 200734

Дата пріоритету: 27.02.2018

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 02.11.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200962

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
2	Нижні листки: опушення піхви	відсутнє	1	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	наявне	9	
4	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	слабка	3	
5	Рослина: кількість рослин із похилим прапорцевим листком	середня	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	слабкий	3	
7	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	ранній	3	
8	Остюки: антоціанового забарвлення кінчиків	наявне	9	
9	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків	слабка	3	
10	Колос: восковий наліт	слабкий	3	
11	Колос: положення в просторі	напівпряме	3	
12	Рослина: за висотою (стебло, колос та остюки)	низька	3	
13	Колос: кількість рядів	більше двох	2	
14	Колос: форма	пірамідальна	3	
15	Колос: за щільністю	середній	5	
16	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	2	
17	Остюки: за довжиною (порівняно з колосом)	довгі	7	
18	Стрижень колосу: за довжиною першого сегменту	короткий	3	
19	Стрижень колоса: вигин першого сегмента	малий	3	
20	Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)	ознака не визначається	0	
21	Середній колосок: колоскові луски й остюки за довжиною відносно зернівки	довші	3	
22	Зернівка: волоски основної щетинки за довжиною	короткі	1	
23	Зернівка: плівка	наявна	9	легко відокремлюється до слабого
24	Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски	відсутня або дуже слабка	1	
25	Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски	помірне	5	
26	Зернівка: опушення вентральної борізки	відсутнє	1	
27	Зернівка: розташування лодикул	фронтальне	1	
28	Зернівка: забарвлення алеїронового шару	білясте	1	
29	Тип розвитку	озимий	1	
30	Колос: остюки	наявні	9	
31	Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення	остюки	5	
32	Зернівка: форма	видовжено-еліптична	5	
33	Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски	тонкозморшувата	1	
34	Тільки для плівкових сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски	відсутнє	9	
35	Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка	поступовий	2	
36	Вушка: форма верхівки	загострена	2	
37	Вушка: охоплення соломини	перекриваюче	3	
38	Язичок: ступінь виявлення	середній	5	
39	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й верхнім вузлом)	слабко виповнена	3	
40	Рослина: утворення пилку (чоловіча стерильність)	наявне	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	4,97	5,49	5,42
Довірчий інтервал, т/га	0,15	0,24	0,17
Тривалість періоду вегетації, діб	250	256	260
Висота рослини, см	75,6	86,9	83,8
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	42,2	40,2	35,5
Вміст білка, %	13,4	13,6	12
Стійкість до вилягання, бал	8	8	7
Стійкість до обсіпання, бал	8	8	8
Стійкість до посухи, бал	8	8	8
Стійкість проти борошнистої роси, бал	8	8	8
Стійкість проти бурої іржі, бал	8	8	7
Стійкість проти гельмінтоспороозу, бал	8	8	7
Стійкість проти внутрішньостеблових шкідників, бал	9	9	8
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	8	8
Блок	2	2	2
Напрямок використання	х	х	х

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Ячмінь звичайний (озимий) *Hordeum vulgare* L.

Заявка № 18019004 Назва сорту: СИ КОМЕТ **Заявник (код):** 1959 **Власник сорту (код):** 1959

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 10.11.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201268

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус (форма куща)	напіврозлогий	5	
2	Нижні листки: опушення піхви	наявне	9	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	наявне	9	
4	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	помірна	5	
5	Рослина: кількість рослин із похилим прапорцевим листком	середня	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	слабкий	3	
7	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	ранній	3	
8	Остюки: антоціанового забарвлення кінчиків	відсутнє	1	
9	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків	ознака не визначається	0	
10	Колос: восковий наліт	слабкий	3	
11	Колос: положення в просторі	напівпряме	3	
12	Рослина: за висотою (стебло, колос та остюки)	низька	3	до середньої
13	Колос: кількість рядів	більше двох	2	
14	Колос: форма	циліндрична	5	
15	Колос: за щільністю	середній	5	
16	Колос: за довжиною (без остюків)	короткий	1	до середнього
17	Остюки: за довжиною (порівняно з колосом)	довгі	7	
18	Стрижень колосу: за довжиною першого сегменту	середній	5	
19	Стрижень колоса: вигин першого сегмента	малий	3	
20	Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)	ознака не визначається	0	
21	Середній колосок: колоскові луски й остюки за довжиною відносно зернівки	довші	3	
22	Зернівка: волоски основної щетинки за довжиною	довгі	2	
23	Зернівка: плівка	наявна	9	
24	Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски	відсутня або дуже слабка	1	
25	Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски	помірне	5	
26	Зернівка: опушення вентральної борізки	відсутнє	1	
27	Зернівка: розташування лодикул	фронтальне	1	
28	Зернівка: забарвлення алеїронового шару	слабке забарвлення	2	
29	Тип розвитку	озимий	1	
30	Колос: остюки	наявні	9	
31	Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення	остюки	5	
32	Зернівка: форма	видовжено-еліптична	5	
33	Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски	тонкозморшкувата	1	
34	Тільки для плівкових сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски	відсутнє	9	
35	Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка	поступовий	2	
36	Вушка: форма верхівки	загострена	2	
37	Вушка: охоплення соломини	перекриваюче	3	
38	Язичок: ступінь виявлення	середній	5	
39	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й верхнім вузлом)	слабко виповнена	3	
40	Рослина: утворення пилку (чоловіча стерильність)	наявне	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,35	6,96	5,26
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,66	7,11	7,27
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,31	0,15	2,01
+, - до усередненої урожайності, %	5,7	2,1	38,1
Довірчий інтервал, т/га	0,17	0,26	0,18
Тривалість періоду вегетації, діб	250	255	262
Висота рослини, см	88,9	93,8	97,9
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	46,8	44,2	42
Вміст білка, %	11,8	12,5	11,1
Стійкість до вилягання, бал	8	8	8
Стійкість до обсіпання, бал	8	9	8
Стійкість до посухи, бал	8	8	9
Стійкість проти борошнистої роси, бал	8	8	8
Стійкість проти бурі іржі, бал	8	8	8
Стійкість проти гельмінтоспороозу, бал	8	8	7
Стійкість проти внутрішньостеблових шкідників, бал	9	9	9
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	8	9
Блок	1	1	1
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Ячмінь звичайний (озимий) – батьківський компонент *Hordeum vulgare* L.

Заявка № 18919001 Назва сорту: Ф1Ф180 **Заявник (код):** 1959 **Власник сорту (код):** 1959

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 10.11.2020

Свідчення про державну реєстрацію № 201269

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: форма куща (габітус)	напіврозлогий	5	
2	Нижні листки: опушення піхви	наявне	9	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє	1	
4	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	ознака не визначається	0	
5	Рослина: частота рослин з похилим прапорцевим листком	мало	3	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний	5	
7	Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	дуже раннє	1	
8	Остюки: наявність антоціанового забарвлення кінчиків	відсутнє	1	
9	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків	відсутнє або слабке	1	
10	Колос: восковий наліт	слабкий	3	
11	Колос: положення у просторі	напівпряме	3	
12	Рослина: за висотою (стебло і колос без остюків)	низька	3	до середнього
13	Колос: кількість рядів	більше двох	2	
14	Колос: форма	пірамідальна	3	
15	Колос: за щільністю	середній	5	
16	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	2	
17	Остюки: довжина відносно колоса	довші	3	
18	Стрижень колосу: довжина першого сегменту	середній	5	
19	Стрижень колоса: вигин першого сегмента	помірний	5	
20	Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)	ознака не визначається	0	
21	Середній колосок: довжина колоскової луски і остюка відносно зернівки	рівна	2	
22	Зернівка: довжина волосків основної щетинки	довгі	2	
23	Зернівка: наявність плівки	наявна	9	
24	Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
25	Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски	слабке	3	
26	Зернівка: опушення вентральної борізки	відсутнє	1	
27	Зернівка: розташування лодикул	фронтальне	1	
28	Зернівка: забарвлення алеїронового шару	біляста	1	
29	Тип розвитку	озимий	1	
30	Колос: остюки	наявні	9	
31	Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення	остюки	5	
32	Зернівка: форма	видовжено-еліптична	5	
33	Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски	тонкозморшувата	1	
34	Тільки для плівчастих сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски	відсутнє	9	
35	Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка	поступовий	2	
36	Вушка: форма верхівки	загострена	2	
37	Вушка: охоплення соломини	перекриваюче	3	
38	Язичок: ступінь виявлення	середній	5	
39	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса і верхнім вузлом)	слабко виповнена	3	
40	Рослина: утворення пилку (чоловіча стерильність)	наявна	9	

Вид: Ячмінь звичайний (ярий) *Hordeum vulgare* L.

Заявка № 18020012 Назва сорту: АББА **Заявник (код):** 1223 **Власник сорту (код):** 1223

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 11.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201004

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
2	Нижні листки: опушення піхви	відсутнє	1	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	наявне	9	
4	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	слабка	3	
5	Рослина: кількість рослин із похилим прапорцевим листком	мала	3	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
8	Остюки: антоціанове забарвлення кінчиків	наявне	9	
9	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків	помірна	5	
10	Колос: восковий наліт	слабкий	3	
11	Колос: положення у просторі	горизонтальне	5	
12	Рослина: за висотою (стебло, колос та остюки)	низька	3	
13	Колос: кількість рядів	два	1	
14	Колос: форма	пірамідальна	3	
15	Колос: за щільністю	нешільний	3	
16	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	2	
17	Остюки: за довжиною (порівняно з колосом)	довгі	7	
18	Стрижень колосу: за довжиною першого сегменту	середній	5	
19	Стрижень колосу: вигин першого сегмента	відсутній або дуже малий	1	
20	Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)	паралельне	1	
21	Середній колосок: колоскові луски й остюки за довжиною відносно зернівки	довші	3	
22	Зернівка: волоски основної щетинки за довжиною	довгі	2	
23	Зернівка: плівка	наявна	9	
24	Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски	відсутня або дуже слабка	1	
25	Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
26	Зернівка: опушення вентральної борізки	відсутнє	1	
27	Зернівка: розташування лодикул	фронтальне	1	
28	Зернівка: забарвлення алеїронового шару	слабке забарвлення	2	
29	Тип розвитку	ярий	3	
30	Колос: остюки	наявні	9	
31	Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення	остюки	5	
32	Зернівка: форма	еліптична	3	
33	Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски	грубозморшкувата	9	
34	Тільки для плівкових сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски	відсутнє	9	
35	Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка	поступовий	2	
36	Вушка: форма верхівки	загострена	2	
37	Вушка: охоплення соломини	перекриваюче	3	
38	Язичок: ступінь виявлення	середній	5	
39	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й верхнім вузлом)	слабко виповнена	3	
40	Рослина: утворення пилку (чоловіча стерильність)	наявне	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,68	4,36	3,68
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	4,52	6,11	4,56
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,84	1,75	0,88
+, - до усередненої урожайності, %	68,5	40,1	24
Довірчий інтервал, т/га	0,08	0,1	0,06
Тривалість періоду вегетації, діб	83	90	86
Висота рослини, см	58,3	62,3	72,4
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	43,3	50,6	43
Вміст білка, %	11,2	11,5	10,6
Вирівняність зерна, %	92,3	93,1	90,9
Стійкість до вилягання, бал	7	7	7
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	9
Стійкість до посухи, бал	8	9	8
Стійкість проти борошнистої роси, бал	7	9	7
Стійкість проти бурі іржі, бал	8	9	5
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	7	9	7
Стійкість проти внутрішньостеблових шкідників, бал	7	9	9
Блок	1	1	1
Напрямок використання	пв	пв	пв

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Ячмінь звичайний (ярий) *Hordeum vulgare* L.

Заявка № 18020011 Назва сорту: АМІДАЛА Заявник (код): 1223 Власник сорту (код): 1223

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 11.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201003

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
2	Нижні листки: опушення піхви	відсутнє	1	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	наявне	9	
4	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	слабка	3	
5	Рослина: кількість рослин із похилим прапорцевим листком	середня	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний	5	
7	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
8	Остюки: антоціанове забарвлення кінчиків	наявне	9	
9	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків	сильна	7	
10	Колос: восковий наліт	слабкий	3	
11	Колос: положення у просторі	горизонтальне	5	
12	Рослина: за висотою (стебло, колос та остюки)	низька	3	
13	Колос: кількість рядів	два	1	
14	Колос: форма	пірамідальна	3	
15	Колос: за щільністю	нешільний	3	
16	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	2	
17	Остюки: за довжиною (порівняно з колосом)	довгі	7	
18	Стрижень колосу: за довжиною першого сегменту	довгий	7	
19	Стрижень колосу: вигин першого сегмента	малий	3	
20	Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)	паралельне	1	
21	Середній колосок: колоскові луски й остюки за довжиною відносно зернівки	довші	3	
22	Зернівка: волоски основної щетинки за довжиною	довгі	2	
23	Зернівка: плівка	наявна	9	
24	Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски	відсутня або дуже слабка	1	
25	Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
26	Зернівка: опушення вентральної борізки	відсутнє	1	
27	Зернівка: розташування лодикул	охоплююче	2	
28	Зернівка: забарвлення алеїронового шару	слабке забарвлення	2	
29	Тип розвитку	ярий	3	
30	Колос: остюки	наявні	9	
31	Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення	остюки	5	
32	Зернівка: форма	еліптична	3	
33	Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски	грубозморшкувата	9	
34	Тільки для плівкових сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски	відсутнє	9	
35	Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка	поступовий	2	
36	Вушка: форма верхівки	загострена	2	
37	Вушка: охоплення соломини	перекриваюче	3	
38	Язичок: ступінь виявлення	сильний	7	
39	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й верхнім вузлом)	слабко виповнена	3	
40	Рослина: утворення пилку (чоловіча стерильність)	наявне	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,68	4,36	3,68
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	4,46	5,96	4,37
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,78	1,6	0,69
+, - до усередненої урожайності, %	66,6	36,6	18,6
Довірчий інтервал, т/га	0,08	0,1	0,06
Тривалість періоду вегетації, діб	83	91	85
Висота рослини, см	62,2	67	68,8
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	46	51,4	44,3
Вміст білка, %	11,1	12,1	11
Вирівняність зерна, %	91,6	93,3	87,3
Стійкість до вилягання, бал	7	6	7
Стійкість до обсіпання, бал	8	9	8
Стійкість до посухи, бал	8	8	8
Стійкість проти борошнистої роси, бал	7	9	8
Стійкість проти бурі іржі, бал	8	8	7
Стійкість проти гельмінтоспору, бал	7	8	7
Стійкість проти внутрішньостеблових шкідників, бал	8	9	9
Блок	1	1	1
Напрямок використання	пв	зерн	пв

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Ячмінь звичайний (ярий) *Hordeum vulgare* L.

Заявка № 18020010 Назва сорту: Арей **Заявник (код):** 2260 **Власник сорту (код):** 2260

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 09.11.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200965

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
2	Нижні листки: опушення піхви	відсутнє	1	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	наявне	9	
4	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	помірна	5	
5	Рослина: кількість рослин із похилим прапорцевим листком	середня	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	слабкий	3	
7	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	дуже ранній	1	
8	Остюки: антоціанове забарвлення кінчиків	наявне	9	
9	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків	помірна	5	
10	Колос: восковий наліт	слабкий	3	
11	Колос: положення у просторі	горизонтальне	5	
12	Рослина: за висотою (стебло, колос та остюки)	низька	3	
13	Колос: кількість рядів	два	1	
14	Колос: форма	пірамідальна	3	
15	Колос: за щільністю	нешільний	3	
16	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	2	
17	Остюки: за довжиною (порівняно з колосом)	довгі	7	
18	Стрижень колосу: за довжиною першого сегменту	середній	5	
19	Стрижень колосу: вигин першого сегмента	малий	3	
20	Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)	відхилене	3	
21	Середній колосок: колоскові луски й остюки за довжиною відносно зернівки	довші	3	
22	Зернівка: волоски основної щетинки за довжиною	довгі	2	
23	Зернівка: плівка	наявна	9	
24	Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски	відсутня або дуже слабка	1	
25	Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
26	Зернівка: опушення вентральної борізки	відсутнє	1	
27	Зернівка: розташування лодикул	охоплююче	2	
28	Зернівка: забарвлення алеїронового шару	слабке забарвлення	2	
29	Тип розвитку	ярий	3	
30	Колос: остюки	наявні	9	
31	Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення	остюки	5	
32	Зернівка: форма	еліптична	3	
33	Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски	грубозморшкувата	9	
34	Тільки для плівкових сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски	відсутнє	9	
35	Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка	поступовий	2	
36	Вушка: форма верхівки	загострена	2	
37	Вушка: охоплення соломини	перекриваюче	3	
38	Язичок: ступінь виявлення	слабкий	3	
39	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й верхнім вузлом)	слабко виповнена	3	
40	Рослина: утворення пилку (чоловіча стерильність)	наявне	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,68	4,36	3,68
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	3,83	5,13	3,65
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,15	0,77	-0,03
+, - до усередненої урожайності, %	42,9	17,7	-0,7
Довірчий інтервал, т/га	0,08	0,1	0,06
Тривалість періоду вегетації, діб	82	89	85
Висота рослини, см	67,3	71,8	76,5
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	45,2	48,7	41,7
Вміст білка, %	13,2	13,4	13,3
Вирівняність зерна, %	91,4	92,9	91,8
Стійкість до вилягання, бал	7	6	6
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	7
Стійкість до посухи, бал	7	8	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал	8	9	6
Стійкість проти бурі іржі, бал	8	9	5
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	6	9	6
Стійкість проти внутрішньостеблових шкідників, бал	8	9	9
Блок	1	1	1
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Ячмінь звичайний (ярий) *Hordeum vulgare* L.

Заявка № 18020006 Назва сорту: Ескалена Заявник (код): 2524 2301 Власник сорту (код): 2524 2301

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.10.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200850

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус (форма куща)	напіврозлогий	5	
2	Нижні листки: опушення піхви	відсутнє	1	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	наявне	9	
4	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	слабка	3	
5	Рослина: кількість рослин із похилим прапорцевим листком	мала	3	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний	5	
7	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	ранній	3	
8	Остюки: антоціанове забарвлення кінчиків	наявне	9	
9	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків	помірна	5	
10	Колос: восковий наліт	слабкий	3	
11	Колос: положення у просторі	горизонтальне	5	
12	Рослина: за висотою (стебло, колос та остюки)	низька	3	
13	Колос: кількість рядів	два	1	
14	Колос: форма	пірамідальна	3	
15	Колос: за щільністю	нешільний	3	
16	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	2	
17	Остюки: за довжиною (порівняно з колосом)	довгі	7	
18	Стрижень колосу: за довжиною першого сегменту	середній	5	
19	Стрижень колосу: вигин першого сегмента	помірний	5	
20	Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)	паралельне	1	
21	Середній колосок: колоскові луски й остюки за довжиною відносно зернівки	рівні	2	
22	Зернівка: волоски основної щетинки за довжиною	довгі	2	
23	Зернівка: плівка	наявна	9	
24	Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски	відсутня або дуже слабка	1	
25	Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
26	Зернівка: опушення вентральної борізки	відсутнє	1	
27	Зернівка: розташування лодикул	фронтальне	1	
28	Зернівка: забарвлення алеїронового шару	слабке забарвлення	2	
29	Тип розвитку	ярий	3	
30	Колос: остюки	наявні	9	
31	Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення	остюки	5	
32	Зернівка: форма	еліптична	3	
33	Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски	грубозморшкувата	9	
34	Тільки для плівкових сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски	відсутнє	9	
35	Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка	поступовий	2	
36	Вушка: форма верхівки	загострена	2	
37	Вушка: охоплення соломини	перекриваюче	3	
38	Язичок: ступінь виявлення	середній	5	
39	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й верхнім вузлом)	слабко виповнена	3	
40	Рослина: утворення пилку (чоловіча стерильність)	наявне	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,68	4,36	3,68
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	4,43	5,92	4,78
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,75	1,56	1,1
+, - до усередненої урожайності, %	65,2	35,8	29,8
Довірчий інтервал, т/га	0,08	0,1	0,06
Тривалість періоду вегетації, діб	83	89	85
Висота рослини, см	58,3	67,4	72,1
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	46,3	49,4	42,1
Вміст білка, %	12,6	12,6	12,2
Вирівняність зерна, %	90,4	93,7	91,5
Стійкість до вилягання, бал	7	7	7
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	9
Стійкість до посухи, бал	7	8	8
Стійкість проти борошнистої роси, бал	8	8	7
Стійкість проти бурі іржі, бал	8	9	6
Стійкість проти гельмінтоспору, бал	7	8	7
Стійкість проти внутрішньостеблових шкідників, бал	9	9	9
Блок	1	1	1
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Ячмінь звичайний (ярий) *Hordeum vulgare* L.

Заявка № 17020020 Назва сорту: Кречет **Заявник (код):** 1581 **Власник сорту (код):** 1581

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 17.11.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201826

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус (форма куща)	напіврозлогий	5	
2	Нижні листки: опушення піхви	відсутнє	1	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	наявне	9	
4	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	слабка	3	
5	Рослина: кількість рослин із похилим прапорцевим листком	середня	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний	5	
7	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
8	Остюки: антоціанове забарвлення кінчиків	ознака не визначається	0	
9	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків	ознака не визначається	0	
10	Колос: восковий наліт	сильний	7	
11	Колос: положення у просторі	горизонтальне	5	
12	Рослина: за висотою (стебло, колос та остюки)	низька	3	
13	Колос: кількість рядів	два	1	
14	Колос: форма	пірамідальна	3	
15	Колос: за щільністю	нешільний	3	
16	Колос: за довжиною (без остюків)	короткий	1	
17	Остюки: за довжиною (порівняно з колосом)	ознака не визначається	0	
18	Стрижень колосу: за довжиною першого сегменту	короткий	3	
19	Стрижень колосу: вигин першого сегмента	малий	3	
20	Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)	паралельне	1	
21	Середній колосок: колоскові луски й остюки за довжиною відносно зернівки	коротші	1	
22	Зернівка: волоски основної щетинки за довжиною	довгі	2	
23	Зернівка: плівка	наявна	9	
24	Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски	відсутня або дуже слабка	1	
25	Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
26	Зернівка: опушення вентральної борізки	відсутнє	1	
27	Зернівка: розташування лодикул	охоплююче	2	
28	Зернівка: забарвлення алеїронового шару	слабке забарвлення	2	
29	Тип розвитку	ярий	3	
30	Колос: остюки	відсутні	1	
31	Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення	зубці	3	
32	Зернівка: форма	еліптична	3	
33	Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски	грубозморшкувата	9	
34	Тільки для плівкових сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски	відсутнє	9	
35	Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка	поступовий	2	
36	Вушка: форма верхівки	загострена	2	
37	Вушка: охоплення соломини	перекриваюче	3	
38	Язичок: ступінь виявлення	слабкий	3	
39	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й верхнім вузлом)	слабко виповнена	3	
40	Рослина: утворення пилку (чоловіча стерильність)	наявне	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,7	4,18	3,64
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	3,01	4,47	3,13
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,31	0,29	-0,51
+, - до усередненої урожайності, %	11,3	6,7	-14,1
Довірчий інтервал, т/га	0,08	0,09	0,06
Тривалість періоду вегетації, діб	81	83	81
Висота рослини, см	52	62,8	71,4
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	46	48,4	43,3
Вміст білка, %	14,1	13,7	13,1
Вирівняність зерна, %	89,7	93,7	90
Стійкість до вилягання, бал	8	8	8
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	8
Стійкість до посухи, бал	7	8	8
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	8	8
Стійкість проти бурі іржі, бал	9	9	8
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	8	8	8
Стійкість проти внутрішньостеблових шкідників, бал	9	9	9
Блок	1	1	1
Напрямок використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Ячмінь звичайний (ярий) *Hordeum vulgare* L.**Заявка № 18020009 Назва сорту:** МІП Акцент **Заявник (код):** 1589 **Власник сорту (код):** 1589**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 20.11.2020 **Патент №** 200819**Дата пріоритету:** 12.12.2018**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 05.11.2020**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 200964**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
2	Нижні листки: опушення піхви	відсутнє	1	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	наявне	9	
4	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	помірна	5	
5	Рослина: кількість рослин із похилим прапорцевим листком	середня	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний	5	
7	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	пізній	7	
8	Остюки: антоціанове забарвлення кінчиків	наявне	9	
9	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків	слабка	3	
10	Колос: восковий наліт	слабкий	3	
11	Колос: положення у просторі	горизонтальне	5	
12	Рослина: за висотою (стебло, колос та остюки)	низька	3	
13	Колос: кількість рядів	два	1	
14	Колос: форма	пірамідальна	3	
15	Колос: за щільністю	середній	5	
16	Колос: за довжиною (без остюків)	довгий	3	
17	Остюки: за довжиною (порівняно з колосом)	довгі	7	
18	Стрижень колосу: за довжиною першого сегменту	середній	5	
19	Стрижень колосу: вигин першого сегмента	малий	3	
20	Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)	відхилене	3	
21	Середній колосок: колоскові луски й остюки за довжиною відносно зернівки	довші	3	
22	Зернівка: волоски основної щетинки за довжиною	довгі	2	
23	Зернівка: плівка	наявна	9	
24	Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски	відсутня або дуже слабка	1	
25	Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
26	Зернівка: опушення вентральної боріздки	відсутнє	1	
27	Зернівка: розташування лодикул	охоплююче	2	
28	Зернівка: забарвлення алеїронового шару	слабке забарвлення	2	
29	Тип розвитку	ярий	3	
30	Колос: остюки	наявні	9	
31	Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення	остюки	5	
32	Зернівка: форма	еліптична	3	
33	Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски	грубозморшкувата	9	
34	Тільки для плівкових сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски	відсутнє	9	
35	Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка	поступовий	2	
36	Вушка: форма верхівки	загострена	2	
37	Вушка: охоплення соломини	перекриваюче	3	
38	Язичок: ступінь виявлення	сильний	7	
39	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й верхнім вузлом)	слабко виповнена	3	
40	Рослина: утворення пилку (чоловіча стерильність)	наявне	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,68	4,36	3,68
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	3,89	5,16	3,94
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,21	0,8	0,26
+, - до усередненої урожайності, %	45,2	18,3	7
Довірчий інтервал, т/га	0,08	0,1	0,06
Тривалість періоду вегетації, діб	84	91	87
Висота рослини, см	63	67,9	74,4
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	41,8	45,2	40,2
Вміст білка, %	12,7	13,7	13,1
Вирівняність зерна, %	91,7	91,9	90,4
Стійкість до вилягання, бал	5	6	8
Стійкість до обсіпання, бал	9	8	8
Стійкість до посухи, бал	7	8	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал	7	9	6
Стійкість проти бурі іржі, бал	7	9	5
Стійкість проти гельмінтоспороїзу, бал	6	9	6
Стійкість проти внутрішньостеблових шкідників, бал	8	9	8
Блок	1	1	1
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Ячмінь звичайний (ярий) *Hordeum vulgare* L.

Заявка № 18020008 Назва сорту: МІП Люкс **Заявник (код):** 1589 **Власник сорту (код):** 1589

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 20.11.2020 **Патент №** 200818

Дата пріоритету: 12.12.2018

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.11.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200963

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
2	Нижні листки: опушення піхви	відсутнє	1	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	наявне	9	
4	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	помірна	5	
5	Рослина: кількість рослин із похилим прапорцевим листком	мала	3	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
8	Остюки: антоціанове забарвлення кінчиків	наявне	9	
9	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків	помірна	5	
10	Колос: восковий наліт	помірний	5	
11	Колос: положення у просторі	горизонтальне	5	
12	Рослина: за висотою (стебло, колос та остюки)	низька	3	
13	Колос: кількість рядів	два	1	
14	Колос: форма	циліндрична	5	
15	Колос: за щільністю	нещільний	3	
16	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	2	
17	Остюки: за довжиною (порівняно з колосом)	довгі	7	
18	Стрижень колосу: за довжиною першого сегменту	довгий	7	
19	Стрижень колосу: вигин першого сегмента	помірний	5	
20	Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)	від паралельного до ледь відхиленого	2	
21	Середній колосок: колоскові луски й остюки за довжиною відносно зернівки	довші	3	
22	Зернівка: волоски основної щетинки за довжиною	довгі	2	
23	Зернівка: плівка	наявна	9	
24	Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски	відсутня або дуже слабка	1	
25	Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
26	Зернівка: опушення вентральної боріздки	відсутнє	1	
27	Зернівка: розташування лодикул	охоплююче	2	
28	Зернівка: забарвлення алеїронового шару	слабке забарвлення	2	
29	Тип розвитку	ярий	3	
30	Колос: остюки	наявні	9	
31	Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення	остюки	5	
32	Зернівка: форма	еліптична	3	
33	Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски	грубозморшківата	9	
34	Тільки для плівкових сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски	відсутнє	9	
35	Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка	поступовий	2	
36	Вушка: форма верхівки	загострена	2	
37	Вушка: охоплення соломини	перекриваюче	3	
38	Язичок: ступінь виявлення	сильний	7	
39	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й верхнім вузлом)	слабко виповнена	3	
40	Рослина: утворення пилку (чоловіча стерильність)	наявне	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,68	4,36	3,68
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	4,22	5,61	4,15
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,54	1,25	0,47
+, - до усередненої урожайності, %	57,3	28,6	12,8
Довірчий інтервал, т/га	0,08	0,1	0,06
Тривалість періоду вегетації, діб	84	84	86
Висота рослини, см	62,7	69,8	73,4
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	46,8	48,7	43,9
Вміст білка, %	12,4	12,2	12,3
Вирівняність зерна, %	90,1	90,1	88,1
Стійкість до вилягання, бал	7	6	8
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	9
Стійкість до посухи, бал	7	8	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал	7	8	6
Стійкість проти бурі іржі, бал	8	9	5
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	7	7	7
Стійкість проти внутрішньостеблових шкідників, бал	9	9	9
Блок	1	1	1
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Ячмінь звичайний (ярий) *Hordeum vulgare* L.

Заявка № 18020007 Назва сорту: Проспект Заявник (код): 2545 Власник сорту (код): 947

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.10.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200851

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус (форма куща)	напіврозлогий	5	
2	Нижні листки: опушення піхви	відсутнє	1	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	наявне	9	
4	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	слабка	3	
5	Рослина: кількість рослин із похилим прапорцевим листком	мала	3	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний	5	
7	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
8	Остюки: антоціанове забарвлення кінчиків	наявне	9	
9	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків	помірна	5	
10	Колос: восковий наліт	помірний	5	
11	Колос: положення у просторі	напівпряме	3	
12	Рослина: за висотою (стебло, колос та остюки)	низька	3	
13	Колос: кількість рядів	два	1	
14	Колос: форма	пірамідальна	3	
15	Колос: за щільністю	середній	5	
16	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	2	
17	Остюки: за довжиною (порівняно з колосом)	довгі	7	
18	Стрижень колосу: за довжиною першого сегменту	короткий	3	
19	Стрижень колосу: вигин першого сегмента	малий	3	
20	Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)	паралельне	1	
21	Середній колосок: колоскові луски й остюки за довжиною відносно зернівки	довші	3	
22	Зернівка: волоски основної щетинки за довжиною	короткі	1	
23	Зернівка: плівка	наявна	9	
24	Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски	відсутня або дуже слабка	1	
25	Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
26	Зернівка: опушення вентральної борізки	відсутнє	1	
27	Зернівка: розташування лодикул	охоплююче	2	
28	Зернівка: забарвлення алеїронового шару	слабке забарвлення	2	
29	Тип розвитку	ярий	3	
30	Колос: остюки	наявні	9	
31	Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення	остюки	5	
32	Зернівка: форма	еліптична	3	
33	Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски	грубозморшувата	9	
34	Тільки для плівкових сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски	відсутнє	9	
35	Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка	поступовий	2	
36	Вушка: форма верхівки	загострена	2	
37	Вушка: охоплення соломини	перекриваюче	3	
38	Язичок: ступінь виявлення	середній	5	
39	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й верхнім вузлом)	слабко виповнена	3	
40	Рослина: утворення пилку (чоловіча стерильність)	наявне	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,68	4,36	3,68
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	4,25	5,31	4,1
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,57	0,95	0,42
+, - до усередненої урожайності, %	58,7	21,9	11,4
Довірчий інтервал, т/га	0,08	0,1	0,06
Тривалість періоду вегетації, діб	85	91	87
Висота рослини, см	58,8	66	70,3
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	41,3	46	39,5
Вміст білка, %	11,7	12,1	11
Вирівняність зерна, %	90	91,2	90,1
Стійкість до вилягання, бал	7	7	7
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	7
Стійкість до посухи, бал	8	8	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал	8	8	7
Стійкість проти бурі іржі, бал	7	9	5
Стійкість проти гельмінтоспору, бал	7	7	6
Стійкість проти внутрішньостеблових шкідників, бал	9	9	8
Блок	1	1	1
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Ячмінь звичайний (ярий) *Hordeum vulgare* L.

Заявка № 18020013 Назва сорту: Реванш **Заявник (код):** 1891 **Власник сорту (код):** 1891

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 11.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201005

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус (форма куща)	напіврозлогий	5	
2	Нижні листки: опушення піхви	відсутнє	1	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	наявне	9	
4	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	слабка	3	
5	Рослина: кількість рослин із похилим прапорцевим листком	мала	3	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	слабкий	3	
7	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
8	Остюки: антоціанове забарвлення кінчиків	наявне	9	
9	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків	слабка	3	
10	Колос: восковий наліт	слабкий	3	
11	Колос: положення у просторі	горизонтальне	5	
12	Рослина: за висотою (стебло, колос та остюки)	низька	3	
13	Колос: кількість рядів	два	1	
14	Колос: форма	пірамідальна	3	
15	Колос: за щільністю	нешільний	3	
16	Колос: за довжиною (без остюків)	довгий	3	
17	Остюки: за довжиною (порівняно з колосом)	довгі	7	
18	Стрижень колосу: за довжиною першого сегменту	середній	5	
19	Стрижень колосу: вигин першого сегмента	малий	3	
20	Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)	паралельне	1	
21	Середній колосок: колоскові луски й остюки за довжиною відносно зернівки	рівні	2	
22	Зернівка: волоски основної щетинки за довжиною	довгі	2	
23	Зернівка: плівка	наявна	9	
24	Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски	слабка	3	
25	Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
26	Зернівка: опушення вентральної борізки	відсутнє	1	
27	Зернівка: розташування лодикул	охоплююче	2	
28	Зернівка: забарвлення алеїронового шару	слабе забарвлення	2	
29	Тип розвитку	ярий	3	
30	Колос: остюки	наявні	9	
31	Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення	остюки	5	
32	Зернівка: форма	еліптична	3	
33	Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски	грубозморшкувата	9	
34	Тільки для плівкових сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски	відсутнє	9	
35	Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка	поступовий	2	
36	Вушка: форма верхівки	загострена	2	
37	Вушка: охоплення соломини	перекриваюче	3	
38	Язичок: ступінь виявлення	середній	5	
39	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й верхнім вузлом)	слабко виповнена	3	
40	Рослина: утворення пилку (чоловіча стерильність)	наявне	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,68	4,36	3,68
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	4,44	5,44	3,78
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,76	1,08	0,1
+, - до усередненої урожайності, %	65,7	24,7	2,6
Довірчий інтервал, т/га	0,08	0,1	0,06
Тривалість періоду вегетації, діб	84	90	86
Висота рослини, см	57,2	65,6	70,4
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	44	48,4	41
Вміст білка, %	11	12	11
Вирівняність зерна, %	91,4	92,6	90,1
Стійкість до вилягання, бал	7	7	7
Стійкість до обсіпання, бал	9	8	6
Стійкість до посухи, бал	8	9	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал	8	9	5
Стійкість проти бурі іржі, бал	7	9	5
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	6	8	7
Стійкість проти внутрішньостеблових шкідників, бал	9	9	9
Блок	1	1	1
Напрямок використання	пв	зерн	пв

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ: БОБОВІ

*Горох посівний (зерновий)
Квасоля звичайна (зернова)
Нут звичайний
Соя культурна*



Вид: Горох посівний (зерновий) *Pisum sativum* L.

Заявка № 17023011 Назва сорту: Білий ангел **Заявник (код):** 1591 **Власник сорту (код):** 1591

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 24.11.2020 **Патент № 200738**

Дата пріоритету: 27.11.2017

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 24.11.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201147

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Стебло: антоціанове забарвлення пазухи	відсутнє	1	
3	Стебло: фасціяція	відсутня	1	
4	Стебло: за довжиною	середнє	5	
5	Стебло: кількість вузлів (перший фертильний вузол включно)	середня	5	
6	Листки: забарвлення	жовто-зелене	1	
7	Лише сорти з зеленим забарвленням листків (ozn. 6: стан 2). Листки: інтенсивність забарвлення	ознака не визначається	0	
8	Листок: листочки	відсутні	1	
9	Листок: максимальна кількість листочків	ознака не визначається	0	
10	Листочок: розмір	ознака не визначається	0	
11	Листочок: за довжиною	ознака не визначається	0	
12	Листочок: за шириною	ознака не визначається	0	
13	Листочок: положення найширшої частини	ознака не визначається	0	
14	Листочок: зубчастість	ознака не визначається	0	
15	Прилисток: за довжиною	середній	5	
16	Прилисток: за шириною	середній	5	
17	Прилисток: розмір	середній	5	
18	Прилисток: відстань від пазухи до верхівки	середня	5	
19	Прилисток: частина нижче пазухи за довжиною	коротка	3	
20	Прилисток: плямистість	наявна	9	
21	Прилисток: щільність плямистості	не щільна	3	
22	Черешок: за довжиною від пазухи до першого листочка чи вусика	середній	5	
23	Лише сорти без листочків. Черешок: за довжиною від пазухи до останнього вусика	середній	5	
24	Рослина: час цвітіння	середній	5	
25	Лише сорти без фасціяції стебла. Рослина: максимальна кількість квіток на вузлі	дві	3	
26	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Квітка: забарвлення крил (весел)	ознака не визначається	0	
27	Лише сорти без антоціанового забарвлення. Квітка: забарвлення паруса	біле	1	
28	Квітка: парус за шириною	середній	5	
29	Квітка: форма основи паруса	піднесена	3	
30	Квітка: хвилястість паруса	слабка	3	
31	Квітка: чашолисток за шириною	середній	5	
32	Квітка: форма верхівки верхнього чашолистка	гостра	2	
33	Квітконос: верхівка (шпора) за довжиною	коротка	3	
34	Квітконос: відстань від стебла до першого бобу	середня	5	
35	Квітконос: відстань між першим і другим бобом	середня	5	
36	Квітконос: кількість приквітков	відсутні або мала	1	
37	Біб: за довжиною	середній	5	
38	Біб: за шириною	середній	5	
39	Біб: пергаментний шар	суцільний	2	
40	За винятком сортів з пергаментним шаром. Біб: потовщення стулок	ознака не визначається	0	
41	Лише сорти без потовщення стулок. Біб: форма дистального кінця	тупа	2	
42	Біб: вигин	слабкий	3	
43	Біб: забарвлення	зелене	2	
44	Лише сорти з зеленим забарвленням бобу (ozn. 43: стан 2). Біб: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
45	За винятком сортів з пергаментним шаром. Біб: волокна шва	ознака не визначається	0	
46	Біб: кількість насіннєвих зачатків	середня	5	
47	Нестигле насіння: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
48	Насінина: форма	еліптична	1	
49	Насінина: тип крохмальних зерен	простий	1	
50	Лише сорти з циліндричною формою насінини і простим типом крохмальних зерен. Насінина: зморшкуватість сім'ядолей	ознака не визначається	0	
51	Лише сорти з насінинами із складним типом крохмальних зерен. Насінина: інтенсивність зморшкуватості сім'ядолей	ознака не визначається	0	
52	Насінина: забарвлення сім'ядолей	жовте	2	
53	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Насінина: мармуровість насіннєвої шкірки	ознака не визначається	0	
54	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Насінина: фіолетові чи рожеві плями на насіннєвій шкірці	ознака не визначається	0	
55	Насінина: забарвлення рубчика	не відрізняється від насіннєвої шкірки	1	
56	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Насінина: забарвлення насіннєвої шкірки	ознака не визначається	0	
57	Насіння: маса	середня	5	
58	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>pisi</i>	наявна	9	
59	Стійкість проти <i>Erysiphe pisi</i> Syd.	наявна	9	
60	Стійкість проти <i>Ascochyta pisi</i>	наявна	9	
61	Стійкість проти <i>Erysiphe communis</i> Syd.	наявна	9	
62	Тип розвитку	ярий	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		3,02	2,48
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га		2,5	2,43
+, - до усередненої урожайності, т/га		-0,52	-0,05
+, - до усередненої урожайності, %		-17,2	-1,9
Довірчий інтервал, т/га		0,39	0,26
Тривалість періоду вегетації, діб		80	79
Висота рослини, см		68,3	81,3
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 14%), г		203,7	196,6
Придатність до механізованого збирання, бал		7	8
Висота прикріплення нижнього бобу, см		39,5	59,2
Стійкість до вилягання, бал		6	6
Стійкість до обсіпання, бал		7	8
Стійкість до посухи, бал		7	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал		8	8
Стійкість проти гнилей кореневих, бал		9	8
Стійкість проти аскохітозу (боби, зерно), бал		8	8
Стійкість проти антракнозу, бал		8	8
Вміст білка, %		24,4	24
Блок		3	3
Напрямок використання		зерн	зерн
Якість		сбіл	сбіл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: П.

Вид: Квасоля звичайна (зернова) *Phaseolus vulgaris* L.

Заявка № 18025001 Назва сорту: Журавка **Заявник (код):** 2260 **Власник сорту (код):** 2260

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 10.11.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200884

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: антоціанове забарвлення гіпокотилі	відсутнє	1	
2	Рослина: інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилі	ознака не визначається	0	
3	Рослина: тип росту	кущовий	1	
4	Лише виткі сорти. Рослина: архітектоніка	ознака не визначається	0	
5	Лише кущові сорти. Рослина: тип	несланкий	1	
6	Лише кущові сорти. Рослина: за висотою	середня	5	
7	Лише виткі сорти. Рослина: початок завивання (80% рослин)	ознака не визначається	0	
8	Лише виткі сорти. Рослина: швидкість завивання	ознака не визначається	0	
9	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
10	Листок: зморшкуватість	помірна	5	
11	Верхівковий листочок: розмір	великий	7	
12	Верхівковий листочок: форма	округла	3	
13	Верхівковий листочок: верхівка за довжиною	довга	3	
14	Лише кущові сорти. Суцвіття: положення (за повного цвітіння)	проміжне	2	
15	Квітка: розмір приквіток	малий	3	
16	Квітка: забарвлення паруса	біле	1	
17	Квітка: забарвлення крил	біле	1	
18	Лише кущові сорти. Біб: за довжиною (за виключенням дзьобика)	середній	5	
19	Лише виткі сорти. Біб: за довжиною (як для 18)	ознака не визначається	0	
20	Біб: за шириною	середній	5	
21	Біб: за товщиною	тонкий	3	
22	Біб: форма поперечного перерізу (через насінину)	яйцеподібна	2	
23	Біб: відношення товщини до ширини	мале	3	
24	Біб: основне забарвлення	жовте	1	
25	Біб: інтенсивність основного забарвлення	слабка	3	
26	Біб: вторинне забарвлення	відсутнє	1	
27	Біб: вторинне забарвлення	ознака не визначається	0	
28	Біб: щільність плям вторинного забарвлення	ознака не визначається	0	
29	Біб: волокнистість вентрального (черевного) шва	наявна	9	
30	Біб: ступінь вигину	слабкий	3	
31	Біб: форма вигину	увігнута	1	
32	Біб: форма верхівки (за виключенням дзьобика)	від загостреної до заокругленої	2	
33	Біб: дзьобик за довжиною	середній	5	
34	Біб: вигин дзьобика	середній	5	
35	Біб: текстура поверхні	гладенька або слабо шерехата	3	
36	Біб: звуження (в сухому стані)	помірне	2	
37	Насіння: маса	мала	3	
38	Насіння: форма поздовжнього розрізу	ниркоподібна	4	
39	Сорти з ниркоподібним насінням. Насіння: ступінь вигину	середній	5	
40	Насіння: форма поперечного перерізу	еліптична	3	
41	Насіння: за шириною в поперечному перерізі	середня	5	
42	Насіння: за довжиною	середня	5	
43	Насіння: кількість кольорів	один	1	
44	Насіння: основне забарвлення (найбільша зона)	біле	1	
45	Насіння: вторинне забарвлення	ознака не визначається	0	
46	Насіння: розподіл вторинного забарвлення	ознака не визначається	0	
47	Насіння: вираження орнаменту	помірне	5	
48	Час цвітіння (50% рослин мають щонайменше одну квітку)	середній	5	
49	Стійкість проти антракнозу квасолі (<i>Colletotrichum lindemuthianum</i>)	ознака не визначалась	0	
50	Стійкість проти вірусної мозаїки квасолі Common Mosaic Necrosis Virus (CMNV)	ознака не визначалась	0	
51	Стійкість проти кутастої бактеріальної плямистості (<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>phaseolicola</i>)	ознака не визначалась	0	
52	Стійкість проти звичайної плямистості квасолі (<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>phaseoli</i>)	ознака не визначалась	0	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожайність насіння (за стандартної вологості 14%), т/га – 3,25. Висота прикріплення нижнього бобу, см – 16. Тривалість періоду вегетації, дб – 86. Кількість бобів на рослині, шт. – 25. Вміст білка, % – 27. Стійкість бобів до розтріскування, бал (1–9) – 7. Дружність достигання, бал (1–9) – 8. Маса 1000 насінин, г – 198. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): антракноз (*Colletotrichum lindemuthianum*) – 7, аскохітоз (*Ascochyta phaseolorum* Sacc., *Ascochyta pisi* Lib.) – 7. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): квасолева зернівка (*Acanthoscelides obtectus* Say.) – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Квасоля звичайна (зернова) *Phaseolus vulgaris* L.

Заявка № 18025002 Назва сорту: Подолянка **Заявник (код):** 2471 **Власник сорту (код):** 2471

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.10.2020

Свідцтво про державну реєстрацію № 200812

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: антоціанове забарвлення гіпокотіля	відсутнє	1	
2	Рослина: інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотіля	ознака не визначається	0	
3	Рослина: тип росту	кущовий	1	
4	Лише виткі сорти. Рослина: архітектоніка	ознака не визначається	0	
5	Лише кущові сорти. Рослина: тип	несланкий	1	
6	Лише кущові сорти. Рослина: за висотою	низька	3	
7	Лише виткі сорти. Рослина: початок завивання (80% рослин)	ознака не визначається	0	
8	Лише виткі сорти. Рослина: швидкість завивання	ознака не визначається	0	
9	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
10	Листок: зморшуватість	слабка	3	
11	Верхівковий листочок: розмір	великий	7	
12	Верхівковий листочок: форма	ромбічна	5	
13	Верхівковий листочок: верхівка за довжиною	довга	3	
14	Лише кущові сорти. Суцвіття: положення (за повного цвітіння)	проміжне	2	
15	Квітка: розмір приквітков	середній	5	
16	Квітка: забарвлення паруса	біле	1	
17	Квітка: забарвлення крил	біле	1	
18	Лише кущові сорти. Біб: за довжиною (за виключенням дзьобика)	короткий	3	
19	Лише виткі сорти. Біб: за довжиною (як для 18)	ознака не визначається	0	
20	Біб: за шириною	середній	5	
21	Біб: за товщиною	тонкий	3	
22	Біб: форма поперечного перерізу (через насінину)	округла	4	
23	Біб: відношення товщини до ширини	середнє	5	
24	Біб: основне забарвлення	жовте	1	
25	Біб: інтенсивність основного забарвлення	помірна	5	
26	Біб: вторинне забарвлення	відсутнє	1	
27	Біб: вторинне забарвлення	ознака не визначається	0	
28	Біб: щільність плям вторинного забарвлення	ознака не визначається	0	
29	Біб: волокнистість вентрального (черевного) шва	наявна	9	
30	Біб: ступінь вигину	слабкий	3	
31	Біб: форма вигину	увігнута	1	
32	Біб: форма верхівки (за виключенням дзьобика)	від загостреної до заокругленої	2	
33	Біб: дзьобик за довжиною	середній	5	
34	Біб: вигин дзьобика	середній	5	
35	Біб: текстура поверхні	гладенька або слабко шерехата	3	
36	Біб: звуження (в сухому стані)	помірне	2	
37	Насіння: маса	середня	5	
38	Насінина: форма поздовжнього розрізу	ниркоподібна	4	
39	Сорти з ниркоподібним насінням. Насінина: ступінь вигину	слабкий	3	
40	Насінина: форма поперечного перерізу	широкоеліптична	4	
41	Насінина: за шириною в поперечному перерізі	середня	5	
42	Насінина: за довжиною	середня	5	
43	Насінина: кількість кольорів	один	1	
44	Насінина: основне забарвлення (найбільша зона)	біле	1	
45	Насінина: вторинне забарвлення	ознака не визначається	0	
46	Насінина: розподіл вторинного забарвлення	ознака не визначається	0	
47	Насінина: вираження орнаменту	слабке	3	
48	Час цвітіння (50% рослин мають щонайменше одну квітку)	середній	5	
49	Стійкість проти антракнозу квасолі (<i>Colletotrichum lindemuthianum</i>)	ознака не визначалась	0	
50	Стійкість проти вірусної мозаїки квасолі Common Mosaic Necrosis Virus (BCMVV)	ознака не визначалась	0	
51	Стійкість проти кутастої бактеріальної плямистості (<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>phaseolicola</i>)	ознака не визначалась	0	
52	Стійкість проти звичайної плямистості квасолі (<i>Xanthomonas campestris</i> pv.)	ознака не визначалась	0	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожайність насіння (за стандартної вологості 14%), т/га – 3,6. Висота прикріплення нижнього бобу, см – 16. Тривалість періоду вегетації, діб – 95. Кількість бобів на рослині, шт. – 60. Вміст білка, % – 27,4. Стійкість бобів до розтріскування, бал (1–9) – 8. Дружність досягання, бал (1–9) – 8. Маса 1000 насінин, г – 230. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): антракноз (*Colletotrichum lindemuthianum*) – 7, аскохітоз (*Ascochyta phaseolorum* Sacc., *Ascochyta pisi* Lib.) – 8. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): квасолева зернівка (*Acanthoscelides obtectus* Say.) – 6.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Нут звичайний *Cicer arietinum* L.

Заявка № 19028005 Назва сорту: Бланко **Заявник (код):** 1123 **Власник сорту (код):** 1123

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 24.11.2020 **Патент № 200775**

Дата пріоритету: 13.12.2019

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 09.11.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200898

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус (після цвітіння)	напівпрямий	3	
2	Рослина: галузнення	помірне	5	
3	Рослина: за висотою (за повного розвитку бобів)	середня	5	
4	Стебло: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
5	Листки: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
6	Листочок: розмір	середній	5	
7	Квітка: забарвлення	біле	1	
8	Біб: плодоніжка за довжиною	середня	5	
9	Біб: розмір	середній	5	
10	Біб: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Біб: дзьобик за довжиною	короткий	3	
12	Біб: кількість насінин	одна або дві	2	
13	Насінина: забарвлення (через місяць після збирання)	бежеве	2	
14	Насінина: інтенсивність забарвлення (як для озн. 13)	слабка	3	
15	Насіння: маса	середня	5	
16	Насінина: форма	від кулястої до кутастої	2	
17	Насінина: ребристість	слабка	3	
18	Час цвітіння (80% рослин із щонайменше однією квіткою)	ранній	3	
19	Час достигання насіння	середній	5	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожайність зерна (за стандартної вологості 14%), т/га – 2,3. Тривалість періоду вегетації, діб – 94. Висота прикріплення нижнього бобу, см – 25. Вміст білка, % – 28. Висота рослин, см – 55. Маса 1000 зерен, г – 380. Посухостійкість, бал (1–9) – 9. Стійкість до вилягання, бал (1–9) – 9. Стійкість до обсіпання, бал (1–9) – 9. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): аскохітоз – 8, кореневі гнилі – 8. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): зернівка – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill

Заявка № 18045038 Назва сорту: ААЦ Інвест 1605 Заявник (код): 2536 Власник сорту (код): 2536

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201263

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Рослина: тип росту	від напівдетермінантного до індетермінантного	3	
4	Рослина: габітус (характер росту)	напівпрямий	3	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	сіре	1	
6	Рослина: за висотою	середня	5	
7	Листок: пухирчастість	помірна	5	
8	Листок: форма бічного листочка (тричастого листка)	загостренояйцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	сильна	7	
13	Насінина: розмір	середній	5	
14	Насінина: форма	видовжено-плеската	4	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	жовте	2	
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	як у насіннєвій оболонки	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	від дуже раннього до раннього	2	
20	Рослина: час досягання	від дуже раннього до раннього	2	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,59	3	2,75
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	1,41	2,24	2,85
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,18	-0,76	0,1
+, - до усередненої урожайності, %	-11,2	-25,2	3,6
Довірчий інтервал, т/га	0,14	0,17	0,18
Тривалість періоду вегетації, діб	104	105	117
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	145,3	177	171,2
Висота рослини, см	66,9	74	86,3
Висота прикріплення нижнього бобу, см	10,3	13,6	11,8
Стійкість до вилягання, бал	8	6	7
Стійкість до обсіпання, бал	7	7	8
Стійкість до посухи, бал	6	7	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	9	6
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	9	8
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	8	6
Стійкість проти септоріозу, бал	9	8	7
Стійкість проти фузаріозу, бал	9	9	9
Вміст білка, %	38,7	44,5	40,3
Вміст олії, %	22,5	19,4	21,1
Блок (група стиглості)	6	6	6
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, вл	сбіл, сл	сбіл, сл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: П.

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill

Заявка № 18045027 Назва сорту: Адесса Заявник (код): 2011 Власник сорту (код): 2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201141

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Рослина: тип росту	від напівдетермінантного до індетермінантного	3	
4	Рослина: габітус (характер росту)	від прямого до напівпрямого	2	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	від низької до середньої	4	
7	Листок: пухирчастість	помірна	5	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостреноїцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірна	5	
13	Насінина: розмір	середній	5	
14	Насінина: форма	кулясто-плеската	2	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	темно-коричневе	4	
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	як у насіннєвій оболонки	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	дуже ранній	1	
20	Рослина: час досягання	від дуже раннього до раннього	2	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,59	3	2,75
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	2,08	2,92	3,39
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,49	-0,08	0,64
+, - до усередненої урожайності, %	30,6	-2,6	23,2
Довірчий інтервал, т/га	0,14	0,17	0,18
Тривалість періоду вегетації, діб	93	96	101
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	158,8	168,7	170,5
Висота рослини, см	60,3	61,2	75,9
Висота прикріплення нижнього бобу, см	7,5	7,8	9,6
Стійкість до вилягання, бал	9	9	8
Стійкість до обсіпання, бал	8	8	8
Стійкість до посухи, бал	7	8	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	7	6
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	9	9
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	8	6
Стійкість проти септоріозу, бал	9	8	8
Стійкість проти фузаріозу, бал	9	9	9
Вміст білка, %	37,6	39	37,6
Вміст олії, %	22,8	21,9	22,9
Блок (Група стиглості)	6	6	6
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, вл	сбіл, сл	сбіл, вл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill**Заявка № 18045013 Назва сорту:** Акардія **Заявник (код):** 1498 **Власник сорту (код):** 1498**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 15.12.2020**Свідчення про державну реєстрацію № 201140****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Рослина: тип росту	напівдетермінантний	2	
4	Рослина: габітус (характер росту)	напівпрямий	3	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	середня	5	
7	Листок: пухирчастість	слабка	3	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренойцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірна	5	
13	Насінина: розмір	середній	5	
14	Насінина: форма	округло-видовжена	5	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	жовте	2	
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	як у насіннєвої оболонки	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	ранній	3	
20	Рослина: час досягання	ранній	3	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,53	3,07	2,48
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	2,27	2,97	3,21
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,74	-0,1	0,73
+, - до усередненої урожайності, %	48,5	-3,1	29,6
Довірчий інтервал, т/га	0,12	0,16	0,16
Тривалість періоду вегетації, діб	113	115	124
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	153	180,6	168,2
Висота рослини, см	70,3	68,2	82,5
Висота прикріплення нижнього бобу, см	9,4	10,4	12,9
Стійкість до вилягання, бал	8	7	9
Стійкість до обсіпання, бал	8	9	8
Стійкість до посухи, бал	7	8	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	9	6
Стійкість проти аскохітозу, бал	8	7	7
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	8	6
Стійкість проти септоріозу, бал	9	8	8
Стійкість проти фузаріозу, бал	9	9	9
Вміст білка, %	35,5	38,3	34,7
Вміст олії, %	24	21,6	23,6
Блок (група стиглості)	7	7	7
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, вл	сбіл, сл	нбіл, вл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill

Заявка № 18045039 Назва сорту: Амбелла Заявник (код): 2011 Власник сорту (код): 2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201142

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Рослина: тип росту	від напівдетермінантного до індетермінантного	3	
4	Рослина: габітус (характер росту)	від прямого до напівпрямого	2	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	від низької до середньої	4	
7	Листок: пухирчастість	помірна	5	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостреноїцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	слабка	3	
13	Насінина: розмір	середній	5	
14	Насінина: форма	кулясто-плеската	2	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	темно-коричневе	4	
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	як у насіннєвій оболонки	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	дуже ранній	1	
20	Рослина: час достигання	дуже ранній	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,59	3	2,75
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	1,88	2,49	2,83
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,29	-0,51	0,08
+, - до усередненої урожайності, %	18,3	-17	2,7
Довірчий інтервал, т/га	0,14	0,17	0,18
Тривалість періоду вегетації, діб	91	94	99
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	154,6	182,2	173
Висота рослини, см	59,7	59,1	71,6
Висота прикріплення нижнього бобу, см	8,4	7,9	7,9
Стійкість до вилягання, бал	7	9	8
Стійкість до обсіпання, бал	7	7	8
Стійкість до посухи, бал	7	8	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	7	6
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	8	9
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	7	6
Стійкість проти септоріозу, бал	9	8	7
Стійкість проти фузаріозу, бал	9	9	9
Вміст білка, %	36,8	38,5	36,4
Вміст олії, %	23,6	22	23
Блок (Група стиглості)	6	6	6
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, вл	сбіл, сл	сбіл, вл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СП.

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill**Заявка № 18045011 Назва сорту:** Ангеліка **Заявник (код):** 1498 **Власник сорту (код):** 1498**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 15.12.2020**Свідчення про державну реєстрацію № 201138****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Рослина: тип росту	індетермінантний	4	
4	Рослина: габітус (характер росту)	напівпрямий	3	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	сіре	1	
6	Рослина: за висотою	середня	5	
7	Листок: пухирчастість	помірна	5	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	широкояйцеподібна	4	
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	сильна	7	
13	Насінина: розмір	середній	5	
14	Насінина: форма	видовжено-плеската	4	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	жовте	2	
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	інше	2	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	від дуже раннього до раннього	2	
20	Рослина: час досягання	ранній	3	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,53	3,07	2,48
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	1,8	3	3,13
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,27	-0,07	0,65
+, - до усередненої урожайності, %	17,5	-2,2	26,2
Довірчий інтервал, т/га	0,12	0,16	0,16
Тривалість періоду вегетації, діб	116	113	129
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	160,4	203,1	192
Висота рослини, см	72,9	81	90,3
Висота прикріплення нижнього бобу, см	9,4	11,8	12,6
Стійкість до вилягання, бал	8	9	8
Стійкість до обсіпання, бал	7	9	7
Стійкість до посухи, бал	6	8	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	8	6
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	9	7
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	9	6
Стійкість проти септоріозу, бал	8	7	7
Стійкість проти фузаріозу, бал	9	9	8
Вміст білка, %	37	41	37,7
Вміст олії, %	23,4	20,9	22,3
Блок (Група стиглості)	7	7	7
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, вл	сбіл, сл	сбіл, вл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill

Заявка № 18045012 Назва сорту: Атакама Заявник (код): 1498 Власник сорту (код): 1498

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201139

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Рослина: тип росту	від напівдетермінантного до індетермінантного	3	
4	Рослина: габітус (характер росту)	напівпрямий	3	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	середня	5	
7	Листок: пухирчастість	помірна	5	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостреноїцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірна	5	
13	Насінина: розмір	середній	5	
14	Насінина: форма	округло-видовжена	5	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	сіре	1	
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	інше	2	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	ранній	3	
20	Рослина: час досягання	ранній	3	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,53	3,07	2,48
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	2,21	3,23	3,47
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,68	0,16	0,99
+, - до усередненої урожайності, %	44,5	5,1	40,1
Довірчий інтервал, т/га	0,12	0,16	0,16
Тривалість періоду вегетації, діб	113	114	125
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	167,4	191,9	177,7
Висота рослини, см	69,6	72,4	77,8
Висота прикріплення нижнього бобу, см	7,7	11,5	11,3
Стійкість до вилягання, бал	9	9	7
Стійкість до обсіпання, бал	8	9	7
Стійкість до посухи, бал	7	8	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	9	7
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	9	7
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	8	5
Стійкість проти септоріозу, бал	9	8	7
Стійкість проти фузаріозу, бал	9	9	8
Вміст білка, %	35,9	40,3	38,4
Вміст олії, %	24	21,4	22,6
Блок (Група стиглості)	7	7	7
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, вл	сбіл, сл	сбіл, вл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill**Заявка № 17045034 Назва сорту:** Паллада **Заявник (код):** 1669 **Власник сорту (код):** 1669**Дата пріоритету:** 01.11.2017**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 22.12.2020**Свідчення про державну реєстрацію № 201818****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	дуже слабка	1	
3	Рослина: тип росту	від напівдетермінантного до індетермінантного	3	
4	Рослина: габітус (характер росту)	напівпрямий	3	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	сіре	1	
6	Рослина: за висотою	середня	5	
7	Листок: пухирчастість	слабка	3	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	ланцетна	1	
9	Листок: розмір бічного листочка	великий	7	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірна	5	
13	Насінина: розмір	середній	5	
14	Насінина: форма	куляста	1	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	жовте	2	
18	Насінина: забарвлення сім'яної рубчика	як у насіннєвої оболонки	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	від дуже раннього до раннього	2	
20	Рослина: час досягання	від дуже раннього до раннього	2	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,68	2,29	1,88
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	2,14	3,67	3,05
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,46	1,38	1,17
+, - до усередненої урожайності, %	27,4	60,3	62,2
Довірчий інтервал, т/га	0,12	0,12	0,08
Тривалість періоду вегетації, діб	107	105	114
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	138,7	169,4	152,2
Висота рослини, см	66,1	92,6	104,3
Висота прикріплення нижнього бобу, см	9,4	12,9	18,8
Дружність досягання, бал	9	7	8
Кількість бобів на рослині, шт	9	8	8
Кількість зерен у бобі, шт	8	8	8
Стійкість до вилягання, бал	9	8	8
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	8
Стійкість до посухи, бал	9	8	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	8	8
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	8	9
Стійкість проти бактеріозу, бал	35	36,9	33,5
Стійкість проти септоріозу, бал	24,4	22,9	23,3
Стійкість проти фузаріозу, бал	6	6	6
Вміст білка, %	зерн	зерн	зерн
Вміст олії, %	нбіл, вл	сбіл, вл	нбіл, вл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill

Заявка № 18045044 Назва сорту: Райдо Заявник (код): 2430 Власник сорту (код): 2430

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 22.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201821

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
3	Рослина: тип росту	індетермінантний	4	
4	Рослина: габітус (характер росту)	напівпрямий	3	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	сіре	1	
6	Рослина: за висотою	середня	5	
7	Листок: пухирчастість	слабка	3	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	широкояйцеподібна	4	
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	біле	1	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	слабка	3	
13	Насінина: розмір	середній	5	
14	Насінина: форма	видовжено-плеската	4	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насінній оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	жовте	2	
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	інше	2	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	дуже ранній	1	
20	Рослина: час досягання	від дуже раннього до раннього	2	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,59	3	2,75
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	1,91	2,5	2,64
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,32	-0,5	-0,11
+, - до усередненої урожайності, %	20	-16,7	-4
Довірчий інтервал, т/га	0,14	0,17	0,18
Тривалість періоду вегетації, діб	102	99	112
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	157,2	174,9	163
Висота рослини, см	69,1	75,7	82
Висота прикріплення нижнього бобу, см	11,4	13,1	12,6
Стійкість до вилягання, бал	9	9	6
Стійкість до обсіпання, бал	8	8	7
Стійкість до посухи, бал	7	8	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	7	6
Стійкість проти аскохітозу, бал	8	9	8
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	7	7
Стійкість проти септоріозу, бал	9	7	7
Стійкість проти фузаріозу, бал	9	9	9
Вміст білка, %	34,8	38	34,7
Вміст олії, %	23,1	21,1	22,9
Блок (Група стиглості)	6	6	6
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	нбіл, вл	сбіл, сл	нбіл, вл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СП.

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill**Заявка № 18045030 Назва сорту:** РЖТ СФІНКСА **Заявник (код):** 1783 **Власник сорту (код):** 1783**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 18.12.2020**Свідчення про державну реєстрацію № 201262****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Рослина: тип росту	напівдетермінантний	2	
4	Рослина: габітус (характер росту)	напівпрямий	3	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	від низької до середньої	4	
7	Листок: пухирчастість	помірна	5	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренойцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірна	5	
13	Насінина: розмір	середній	5	
14	Насінина: форма	кулясто-плеската	2	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	сіре	1	
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	інше	2	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	від дуже раннього до раннього	2	
20	Рослина: час досягання	від дуже раннього до раннього	2	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,53	3,07	2,48
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	2,17	2,87	3,28
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,64	-0,2	0,8
+, - до усередненої урожайності, %	41,7	-6,6	32,4
Довірчий інтервал, т/га	0,12	0,16	0,16
Тривалість періоду вегетації, діб	115	108	122
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	165,2	201,5	186,2
Висота рослини, см	68	64,4	80,9
Висота прикріплення нижнього бобу, см	7,7	9,1	10
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість до обсіпання, бал	7	9	7
Стійкість до посухи, бал	6	7	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	9	7
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	9	7
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	8	6
Стійкість проти септоріозу, бал	9	8	7
Стійкість проти фузаріозу, бал	9	9	8
Вміст білка, %	38,6	42,1	39,9
Вміст олії, %	22,9	20,7	21,1
Блок (група стиглості)	7	7	7
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, вл	сбіл, сл	сбіл, сл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СП.

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill

Заявка № 18045028 Назва сорту: СОЛЕНА Заявник (код): 1783 Власник сорту (код): 1783

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201261

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Рослина: тип росту	від напівдетермінантного до індетермінантного	3	
4	Рослина: габітус (характер росту)	напівпрямий	3	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричнєве	2	
6	Рослина: за висотою	середня	5	
7	Листок: пухирчастість	помірна	5	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостреноїцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	слабка	3	
13	Насінина: розмір	середній	5	
14	Насінина: форма	округло-видовжена	5	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	темно-коричнєве	4	
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	інше	2	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	ранній	3	
20	Рослина: час достигання	від раннього до середнього	4	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,53	3,07	2,48
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	1,98	3,01	2,97
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,45	-0,06	0,49
+, - до усередненої урожайності, %	29,6	-2,1	19,9
Довірчий інтервал, т/га	0,12	0,16	0,16
Тривалість періоду вегетації, діб	112	110	123
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	167,7	192,4	177
Висота рослини, см	70,4	72,6	77,5
Висота прикріплення нижнього бобу, см	9,4	8,6	10,7
Стійкість до вилягання, бал	8	9	8
Стійкість до обсіпання, бал	9	8	7
Стійкість до посухи, бал	6	8	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	9	7
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	9	6
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	7	7
Стійкість проти септоріозу, бал	9	8	7
Стійкість проти фузаріозу, бал	8	9	8
Вміст білка, %	36,8	41	37,1
Вміст олії, %	23,5	21,1	22,8
Блок (Група стиглості)	7	7	7
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, вл	сбіл, сл	сбіл, вл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill**Заявка №** 18045043 **Назва сорту:** Титан **Заявник (код):** 1669 1591 **Власник сорту (код):** 1669 1591**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 22.12.2020**Свідчення про державну реєстрацію №** 201820**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Рослина: тип росту	від напівдетермінантного до індетермінантного	3	
4	Рослина: габітус (характер росту)	напівпрямий	3	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	від низької до середньої	4	
7	Листок: пухирчастість	слабка	3	
8	Листок: форма бічного листочка (тричастого листка)	загостренояйцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	сильна	7	
13	Насінина: розмір	середній	5	
14	Насінина: форма	округло-видовжена	5	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	сіре	1	
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	інше	2	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	ранній	3	
20	Рослина: час досягання	від раннього до середнього	4	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,53	3,07	2,48
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	2,2	2,95	3,2
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,67	-0,12	0,72
+, - до усередненої урожайності, %	43,9	-4	29,2
Довірчий інтервал, т/га	0,12	0,16	0,16
Тривалість періоду вегетації, діб	114	112	123
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	162	195,5	177,8
Висота рослини, см	66,7	69,9	80,6
Висота прикріплення нижнього бобу, см	9,7	10,2	12,7
Стійкість до вилягання, бал	9	9	8
Стійкість до обсіпання, бал	8	9	7
Стійкість до посухи, бал	7	8	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	9	8
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	9	7
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	9	7
Стійкість проти септоріозу, бал	9	9	7
Стійкість проти фузаріозу, бал	9	9	9
Вміст білка, %	37,7	42,3	38,7
Вміст олії, %	23,5	20,9	22,5
Блок (Група стиглості)	7	7	7
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, вл	сбіл, сл	сбіл, вл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill

Заявка № 18045025 Назва сорту: Чураївна **Заявник (код):** 1669 **Власник сорту (код):** 1669

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 22.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201819

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Рослина: тип росту	індетермінантний	4	
4	Рослина: габітус (характер росту)	від прямого до напівпрямого	2	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	сіре	1	
6	Рослина: за висотою	середня	5	
7	Листок: пухирчастість	помірна	5	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренойцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	слабка	3	
13	Насінина: розмір	середній	5	
14	Насінина: форма	куляста	1	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насінній оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	жовте	2	
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	як у насіннєвої оболонки	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	ранній	3	
20	Рослина: час досягання	від раннього до середнього	4	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,53	3,07	2,48
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	2,15	2,64	2,74
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,62	-0,43	0,26
+, - до усередненої урожайності, %	40,8	-14	10,5
Довірчий інтервал, т/га	0,12	0,16	0,16
Тривалість періоду вегетації, діб	115	109	124
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	133	135,4	137,4
Висота рослини, см	69	81,7	84,6
Висота прикріплення нижнього бобу, см	8,1	11,8	11,1
Стійкість до вилягання, бал	9	9	7
Стійкість до обсіпання, бал	8	8	8
Стійкість до посухи, бал	7	7	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	8	6
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	9	7
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	9	7
Стійкість проти септоріозу, бал	9	8	7
Стійкість проти фузаріозу, бал	8	9	9
Вміст білка, %	35,8	40	37,5
Вміст олії, %	23,8	21,3	22,5
Блок (Група стиглості)	7	7	7
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, вл	сбіл, сл	сбіл, вл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СП.

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill**Заявка № 18045045 Назва сорту:** ЯКАРІ **Заявник (код):** 2258 **Власник сорту (код):** 2258**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 17.12.2020**Свідчення про державну реєстрацію № 201264****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Рослина: тип росту	напівдетермінантний	2	
4	Рослина: габітус (характер росту)	напівпрямий	3	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	від низької до середньої	4	
7	Листок: пухирчастість	сильна	7	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренойцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	слабка	3	
13	Насінина: розмір	середній	5	
14	Насінина: форма	округло-видовжена	5	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	сіре	1	
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	інше	2	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	від дуже раннього до раннього	2	
20	Рослина: час досягання	ранній	3	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,53	3,07	2,48
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	1,91	3,27	3,14
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,38	0,2	0,66
+, - до усередненої урожайності, %	24,7	6,5	26,8
Довірчий інтервал, т/га	0,12	0,16	0,16
Тривалість періоду вегетації, діб	113	110	125
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	161,4	190,5	178,1
Висота рослини, см	72,3	72,3	80,8
Висота прикріплення нижнього бобу, см	8,4	13,1	13,9
Стійкість до вилягання, бал	9	9	8
Стійкість до обсіпання, бал	8	8	8
Стійкість до посухи, бал	7	8	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	9	8
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	9	7
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	7	7
Стійкість проти септоріозу, бал	9	7	7
Стійкість проти фузаріозу, бал	9	9	8
Вміст білка, %	37,2	40,9	36,6
Вміст олії, %	23,1	20,6	22,3
Блок (Група стиглості)	7	7	7
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, вл	сбіл, сл	сбіл, вл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ: КРУП'ЯНІ

Гречка їстівна

Лобода кіноа

Просо посівне

Сорго звичайне (двокольорове)



Вид: Гречка їстівна *Fagopyrum esculentum* Moench**Заявка № 17008001 Назва сорту:** Володар **Заявник (код):** 417 **Власник сорту (код):** 417**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 15.10.2020**Свідчення про державну реєстрацію № 200806****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: плідність	диплоїд	2	
2	Сім'ядоля: антоціанове забарвлення	помірне	5	
3	Стебло: антоціанове забарвлення	помірне	2	
4	Суцвіття: антоціанове забарвлення бруньки	відсутнє або дуже слабе	1	
5	Час початку цвітіння	середній	5	
6	Рослина: тип росту	індетермінантний	2	
7	Рослина: за висотою	висока	7	
8	Листкова пластинка: форма основи	сильно серцеподібна	3	
9	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
10	Квітка: розмір	великий	3	
11	Квітка: забарвлення пелюсток	біле	1	
12	Квітка: квітконіжка за довжиною	середня	2	
13	Рослина: загальна кількість суцвіть	велика	3	
14	Стебло: за довжиною	довге	7	
15	Стебло: кількість вузлів	велика	7	
16	Стебло: діаметр	великий	3	
17	Час достигання	пізній	7	
18	Насінина: за довжиною	довга	3	
19	Насінина: форма	ромбічна	3	
20	Насінина: забарвлення шкірки	темно-коричневе	3	
21	Насіння: маса 1000 шт.	середня	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,32	1,89	1,99
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га		2,32	1,86
+, - до усередненої урожайності, т/га		0,43	-0,13
+, - до усередненої урожайності, %		22,9	-6,6
Довірчий інтервал, т/га	0,1	0,1	0,13
Тривалість періоду вегетації, діб		96	93
Висота рослини, см		115,5	88,3
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г		29,4	28,7
Придатність до механізованого збирання, бал		8	8
Вміст білка, %		14,9	14,2
Плівковість зерна, %		20,5	21,4
Вихід крупи, %		74,6	74,1
Крупність ядра гречки, %		30,7	32,5
Стійкість до вилягання, бал		8	8
Стійкість до обсіпання, бал		7	8
Стійкість до посухи, бал		8	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал		8	8
Стійкість проти бактеріозу плямистого, бал		8	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал		8	8
Стійкість проти гречкової блішки, бал		9	8
Напрямок використання		х	х

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.

Вид: Гречка їстівна *Fagopyrum esculentum* Moench

Заявка № 18008003 Назва сорту: Покровська Заявник (код): 1626 Власник сорту (код): 1626

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 06.11.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200862

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: плідність	ознака не визначалась	0	
2	Сім'ядоля: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
3	Стебло: антоціанове забарвлення	помірне	2	
4	Суцвіття: антоціанове забарвлення бруньки	помірне	5	
5	Час початку цвітіння	середній	5	
6	Рослина: тип росту	індетермінантний	2	
7	Рослина: за висотою	висока	7	
8	Листкова пластинка: форма основи	сильно серцеподібна	3	
9	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
10	Квітка: розмір	середній	2	
11	Квітка: забарвлення пелюсток	біле	1	
12	Квітка: квітконіжка за довжиною	середня	2	
13	Рослина: загальна кількість суцвіть	мала	1	
14	Стебло: за довжиною	довге	7	
15	Стебло: кількість вузлів	велика	7	
16	Стебло: діаметр	великий	3	
17	Час достигання	пізній	7	
18	Насінина: за довжиною	довга	3	
19	Насінина: форма	ромбічна	3	
20	Насінина: забарвлення шкірки	помірно коричневе	2	
21	Насіння: маса 1000 шт.	середня	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,43	2	1,93
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га		2,35	1,53
+, - до усередненої урожайності, т/га		0,35	-0,4
+, - до усередненої урожайності, %		17,3	-20,7
Довірчий інтервал, т/га	0,19	0,19	0,22
Тривалість періоду вегетації, діб		100	90
Висота рослини, см		108,5	96,8
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г		27,8	28,7
Придатність до механізованого збирання, бал		8	8
Вміст білка, %		15,9	15,6
Плівковість зерна, %		20,5	21,2
Вихід крупи, %		75,4	74,8
Крупність ядра гречки, %		32,2	31,4
Стійкість до вилягання, бал		6	7
Стійкість до обсіпання, бал		6	9
Стійкість до посухи, бал		6	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал		9	9
Стійкість проти бактеріозу плямистого, бал		8	7
Стійкість проти пероноспорозу, бал		9	7
Стійкість проти блішки гречкової, бал		9	7
Напрямок використання		х	х

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.

Вид: Гречка їстівна *Fagopyrum esculentum* Moench**Заявка № 18008004 Назва сорту:** Христина **Заявник (код):** 2546 **Власник сорту (код):** 2546**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 11.12.2020 **Патент №** 200740**Дата пріоритету:** 10.12.2018**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 20.11.2020**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 200863**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: плоїдність	ознака не визначалась	0	
2	Сім'ядоля: антоціанове забарвлення	слабке	3	
3	Стебло: антоціанове забарвлення	помірне	2	
4	Суцвіття: антоціанове забарвлення бруньки	помірне	5	
5	Час початку цвітіння	середній	5	
6	Рослина: тип росту	індетермінантний	2	
7	Рослина: за висотою	висока	7	
8	Листкова пластинка: форма основи	сильно серцеподібна	3	
9	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
10	Квітка: розмір	великий	3	
11	Квітка: забарвлення пелюсток	біле	1	
12	Квітка: квітконіжка за довжиною	середня	2	
13	Рослина: загальна кількість суцвіть	мала	1	
14	Стебло: за довжиною	довге	7	
15	Стебло: кількість вузлів	велика	7	
16	Стебло: діаметр	великий	3	
17	Час достигання	пізній	7	
18	Насінина: за довжиною	довга	3	
19	Насінина: форма	ромбічна	3	
20	Насінина: забарвлення шкірки	темно-коричневе	3	
21	Насіння: маса 1000 шт.	велика	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,43	2	1,93
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га		2,34	1,8
+, - до усередненої урожайності, т/га		0,34	-0,13
+, - до усередненої урожайності, %		17	-6,6
Довірчий інтервал, т/га	0,19	0,19	0,22
Тривалість періоду вегетації, діб		99	90
Висота рослини, см		99,6	87,2
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г		28,8	29,9
Придатність до механізованого збирання, бал		8	8
Вміст білка, %		15,3	15,5
Плівковість зерна, %		20,5	21,9
Вихід крупи, %		75,8	74,7
Крупність ядра гречки, %		40	41,8
Стійкість до вилягання, бал		5	8
Стійкість до обсіпання, бал		6	9
Стійкість до посухи, бал		6	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал		8	9
Стійкість проти бактеріозу плямистого, бал		8	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал		9	7
Стійкість проти блішки гречкової, бал		9	7
Напрямок використання		х	х

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Лобода кіноа *Chenopodium quinoa* Willd.

Заявка № 19661001 Назва сорту: Олімп **Заявник (код):** 2612 **Власник сорту (код):** 2612

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 25.11.2020 **Патент № 200774**

Дата пріоритету: 22.01.2019

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 25.11.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200889

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: вміст сапонінів	середній	2	
2	Листки: забарвлення	світло-зелене	1	
3	Листки: інтенсивність залозистості	середня	5	
4	Листок: розмір	середній	5	
5	Листок: лопатевість краю листової пластинки	середня	5	
6	Листок: кут основи листової пластинки	тупий	2	
7	Рослина: час початку цвітіння	середній	5	
8	Стебло: забарвлення	зелене	2	
9	Стебло: наявність смуг	відсутні	1	
10	Стебло: забарвлення смуг	ознака не визначалась	0	
11	Стебло: інтенсивність пігментації пазух листків	відсутня або дуже слабка	1	
12	Волоть: забарвлення під час цвітіння	жовте	3	
13	Рослина: час досягання	середній	5	
14	Рослина: висота	середня	5	
15	Волоть: забарвлення	світло-жовто-коричнєве	1	
16	Волоть: за щільністю	щільна	7	
17	Волоть: за шириною	широка	7	
18	Насіння: забарвлення у плодовій оболонці	світло-коричнєве	4	
19	Насіння: забарвлення	сіре	4	
20	Маса 1000 насінин	мала	3	
21	Пагін: наявність беталаїнового забарвлення верхівки	відсутня	1	
22	Волоть: за довжиною	середня	5	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Висота рослини, см – 137,8. Урожайність насіння (за стандартної вологості), т/га – 1,08. Тривалість періоду від сходів до досягання насіння, діб – 122. Група стиглості: 2 – середня. Вміст у зерні білка, % – 18,1. Облистяність, % – 40,7. Маса 1000 насінин, г – 3,2. Стійкість проти: борошнистої роси (*Erysiphe cichoracearum*, *Erysiphe communis* Grev. F.), бал (1–9) – 8, фузаріозної кореневої гнилі (*Fusarium bataticola* Taub., *Pseudomonas radiciperda* Stapp.), бал (1–9) – 6, бурякової та хрестоцвітної блішки (*Phyllotreta Stepheni*, *Chaetocnema* Steph.), бал (1–9) – 5, бобової попелиці (*Aphis fabae* Scop.), бал (1–9) – 6, лучного метелика (*Phyrausta (Loxostege) strictalis* L.), бал (1–9) – 6, бурякових, трав'яних клопів (*Polymerus cognatus* Fieb, *Adelphocoris lineolatus* Geoe), бал (1–9) – 6.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Просо посівне *Panicum miliaceum* L.

Заявка № 18014002 Назва сорту: Дивовишне Заявник (код): 1581 Власник сорту (код): 1581

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 17.11.2020

Свідчення про державну реєстрацію № 201797

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Прапорцевий листок: положення листової пластинки	напівпряме	3	
2	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення	наявне	9	
3	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
4	Прапорцевий листок: за довжиною	середній	5	
5	Прапорцевий листок: за шириною	середній	5	
6	Стебло: кількість вузлів	мала	3	
7	Стебло: верхнє міжвузля за довжиною	коротке	3	
8	Стебло: міжвузля за товщиною	товсте	7	
9	Час виявлення волоті	середній	5	
10	Рослина: за висотою (стебло та волоть)	висока	7	
11	Волоть: кут відхилення гілочок	дуже гострий	1	
12	Волоть: положення у просторі	помірно похиле	3	
13	Волоть: головна вісь за довжиною (без квітконіжки)	довга	7	
14	Волоть: за шириною	середня	5	
15	Волоть: за щільністю	середня	5	
16	Волоть: ступінь вигину бічних гілочок	слабкий	3	
17	Волоть: кількість подушечок	середня кількість	5	
18	Волоть: гілочки першого порядку за довжиною	довгі	7	
19	Колосок: форма	округла	3	
20	Колосок: інтенсивність жовтого забарвлення	помірна	5	
21	Колоскова луска: антоціанове забарвлення	середнє	5	
22	Приймочка маточки: забарвлення	фіолетове	2	
23	Зернівка: розмір	малий	3	
24	Зернівка: форма	широкоеліптична	2	
25	Зернівка: забарвлення	жовте	4	
26	Зернівка: плямистість	відсутня	1	
27	Зернівка: розмір плям	малий	3	
28	Маса 1000 зерен	середня	5	
29	Ядро (не шліфоване): забарвлення	світло-жовте	2	
30	Ядро: інтенсивність коричневого забарвлення насіннєвого рубчика	слабка	1	
31	Ядро: тип ендосперму	не восковий	2	
32,1	Стійкість проти ураження расами сажки (Sporisorium destruens Yank): Paca 1	ознака не визначалась	0	
32,2	Стійкість проти ураження расами сажки (Sporisorium destruens Yank): Paca 2	ознака не визначалась	0	
32,3	Стійкість до ураження расами сажки (Sporisorium destruens Yank): Paca 3	ознака не визначалась	0	
32,4	Стійкість до ураження расами сажки (Sporisorium destruens Yank): Paca 4	ознака не визначалась	0	
32,5	Стійкість до ураження расами сажки (Sporisorium destruens Yank): Paca 5	ознака не визначалась	0	
32,6	Стійкість до ураження расами сажки (Sporisorium destruens Yank): Paca 6	ознака не визначалась	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,5	3,03	2,7
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	2,94	3,55	2,68
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,44	0,52	-0,02
+, - до усередненої урожайності, %	17,8	17,2	-0,7
Довірчий інтервал, т/га	0,24	0,33	0,3
Тривалість періоду вегетації, діб	94	105	95
Висота рослини, см	119,3	127,6	112,1
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	8,1	7,6	8,4
Вимолочуваність, бал	9	8	7
Вміст білка, %	14	13,2	13,9
Плівковість зерна, %	16,9	17	17
Вихід крупи, %	78,9	78,8	79
Стійкість до вилягання, бал	6	7	8
Стійкість до обсіпання, бал	8	7	7
Стійкість до посухи, бал	7	7	6
Стійкість проти бактеріозу плямистого, бал	9	9	7
Стійкість проти сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти просяного комарика, бал	9	8	7
Напрямок використання	х	х	х

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Просо посівне *Panicum miliaceum* L.

Заявка № 17014001 Назва сорту: Казкове джерело Заявник (код): 1581 Власник сорту (код): 1581

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 17.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201796

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Прапорцевий листок: положення листкової пластинки	напівпряме	3	
2	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
3	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
4	Прапорцевий листок: за довжиною	короткий	3	
5	Прапорцевий листок: за шириною	середній	5	
6	Стебло: кількість вузлів	середня	5	
7	Стебло: верхнє міжвузля за довжиною	середнє	5	
8	Стебло: міжвузля за товщиною	товсте	7	
9	Час виявлення волоті	ранній	3	
10	Рослина: за висотою (стебло та волоть)	середня	5	
11	Волоть: кут відхилення гілочок	дуже гострий	1	
12	Волоть: положення у просторі	помірно похиле	3	
13	Волоть: головна вісь за довжиною (без квітконіжки)	коротка	3	
14	Волоть: за шириною	вузька	3	
15	Волоть: за щільністю	середня	5	
16	Волоть: ступінь вигину бічних гілочок	слабкий	3	
17	Волоть: кількість подушечок	велика	7	
18	Волоть: гілочки першого порядку за довжиною	короткі	3	
19	Колосок: форма	широкоеліптична	2	
20	Колосок: інтенсивність жовтого забарвлення	помірна	5	
21	Колоскова луска: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
22	Приймочка маточки: забарвлення	світло-рожеве	1	
23	Зернівка: розмір	малий	3	
24	Зернівка: форма	округла	3	
25	Зернівка: забарвлення	білувате	2	
26	Зернівка: плямистість	відсутня	1	
27	Зернівка: розмір плям	малий	3	
28	Маса 1000 зерен	велика	7	
29	Ядро (не шліфоване): забарвлення	світло-жовте	2	
30	Ядро: інтенсивність коричневого забарвлення насіннєвого рубчика	слабка	1	
31	Ядро: тип ендосперму	восковий	1	
32,1	Стійкість проти ураження расами сажки (<i>Sporisorium destruens</i> Yank): Paca 1	ознака не визначалась	0	
32,2	Стійкість проти ураження расами сажки (<i>Sporisorium destruens</i> Yank): Paca 2	ознака не визначалась	0	
32,3	Стійкість до ураження расами сажки (<i>Sporisorium destruens</i> Yank): Paca 3	ознака не визначалась	0	
32,4	Стійкість до ураження расами сажки (<i>Sporisorium destruens</i> Yank): Paca 4	ознака не визначалась	0	
32,5	Стійкість до ураження расами сажки (<i>Sporisorium destruens</i> Yank): Paca 5	ознака не визначалась	0	
32,6	Стійкість до ураження расами сажки (<i>Sporisorium destruens</i> Yank): Paca 6	ознака не визначалась	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,5	3,03	2,7
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	3,07	3	2,66
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,57	-0,03	-0,04
+, - до усередненої урожайності, %	22,8	-0,8	-1,4
Довірчий інтервал, т/га	0,24	0,33	0,3
Тривалість періоду вегетації, діб	80	101	86
Висота рослини, см	103,6	117,4	115
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	7	6,9	7,3
Вимолочуваність, бал	9	8	7
Вміст білка, %	15	13,3	14,3
Плівковість зерна, %	16,4	17,1	17,3
Вихід крупи, %	79,4	79	78,6
Стійкість до вилягання, бал	6	6	7
Стійкість до обсіпання, бал	8	6	7
Стійкість до посухи, бал	8	8	6
Стійкість проти бактеріозу плямистого, бал	9	9	7
Стійкість проти сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти просяного комарика, бал	9	7	8
Напрямок використання	х	х	х

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Просо посівне *Panicum miliaceum* L.**Заявка № 18014001 Назва сорту:** Корнбергер Міттельфрюе **Заявник (код):** 2524 2436**Власник сорту (код):** 2524 2436**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 03.11.2020**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200820****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Прапорцевий листок: положення листової пластинки	напівпряме	3	
2	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
3	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
4	Прапорцевий листок: за довжиною	середній	5	
5	Прапорцевий листок: за шириною	широкий	7	
6	Стебло: кількість вузлів	середня	5	
7	Стебло: верхнє міжвузля за довжиною	коротке	3	
8	Стебло: міжвузля за товщиною	товсте	7	
9	Час виявлення волоті	пізній	7	
10	Рослина: за висотою (стебло та волоть)	висока	7	
11	Волоть: кут відхилення гілочок	дуже гострий	1	
12	Волоть: положення у просторі	сильно похиле	4	
13	Волоть: головна вісь за довжиною (без квітконіжки)	довга	7	
14	Волоть: за шириною	вузька	3	
15	Волоть: за щільністю	середня	5	
16	Волоть: ступінь вигину бічних гілочок	слабкий	3	
17	Волоть: кількість подушечок	мала	3	
18	Волоть: гілочки першого порядку за довжиною	середні	5	
19	Колосок: форма	широкоеліптична	2	
20	Колосок: інтенсивність жовтого забарвлення	помірна	5	
21	Колоскова луска: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
22	Приймочка маточки: забарвлення	світло-рожеве	1	
23	Зернівка: розмір	малий	3	
24	Зернівка: форма	округла	3	
25	Зернівка: забарвлення	темно-жовте	5	
26	Зернівка: плямистість	наявна	9	
27	Зернівка: розмір плям	малий	3	
28	Маса 1000 зерен	велика	7	
29	Ядро (не шліфоване): забарвлення	світло-жовте	2	
30	Ядро: інтенсивність коричневого забарвлення насіннєвого рубчика	помірна	2	
31	Ядро: тип ендосперму	не восковий	2	
32,1	Стійкість проти ураження расами сажки (Sporisorium destruens Yank): Paca 1	ознака не визначалась	0	
32,2	Стійкість проти ураження расами сажки (Sporisorium destruens Yank): Paca 2	ознака не визначалась	0	
32,3	Стійкість до ураження расами сажки (Sporisorium destruens Yank): Paca 3	ознака не визначалась	0	
32,4	Стійкість до ураження расами сажки (Sporisorium destruens Yank): Paca 4	ознака не визначалась	0	
32,5	Стійкість до ураження расами сажки (Sporisorium destruens Yank): Paca 5	ознака не визначалась	0	
32,6	Стійкість до ураження расами сажки (Sporisorium destruens Yank): Paca 6	ознака не визначалась	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	с	л	п
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,5	3,03	2,7
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	2,65	3,1	2,77
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,15	0,07	0,07
+, - до усередненої урожайності, %	5,9	2,5	2,6
Довірчий інтервал, т/га	0,24	0,33	0,3
Тривалість періоду вегетації, діб	75	100	87
Висота рослини, см	93,1	113,6	107,6
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	7,5	7,2	7,4
Вимолочуваність, бал	9	8	8
Вміст білка, %	14,5	13,3	13,9
Плівковість зерна, %	13,1	14,7	14
Вихід крупки, %	82,3	81	81,6
Стійкість до вилягання, бал	6	5	7
Стійкість до обсіпання, бал	7	5	7
Стійкість до посухи, бал	7	8	6
Стійкість проти бактеріозу плямистого, бал	9	9	7
Стійкість проти сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти просяного комарика, бал	9	6	8
Напрямок використання	х	х	х

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Сорго звичайне (двокольорове) *Sorghum bicolor* L.

Заявка № 17018010 Назва сорту: КВС НЕМЕСІС Заявник (код): 2649 Власник сорту (код): 2649

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201136

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення колеоптиля	слабке	3	
2	Паросток: антоціанове забарвлення дорсального боку першого листка	відсутнє або дуже слабке	1	
3	Паросток: антоціанове забарвлення піхви першого листка	відсутнє або дуже слабке	1	
4	Листок: антоціанове забарвлення пластинки (стадія п'ятого листка)	відсутнє або дуже слабке	1	
5	Рослина: час виявлення волоті (50% рослин з волоттю)	середній	5	
6	Рослина: за висотою під час виявлення волоті	низька	3	
7	Листок: зелене забарвлення пластинки (за викидання волоті)	темне	7	
8	Прапорцевий листок: поширення знебарвлення середньої жилки (як для 7)	помірне	5	
9	Прапорцевий листок: зелене забарвлення середньої жилки в порівнянні з пластинкою листка (якщо не знебарвлена, як для 7)	однакове	2	
10	Прапорцевий листок: жовте забарвлення середньої жилки (як для 7)	ознака не визначалась	0	
11	Колоскова луска: забарвлення під час цвітіння	блідо-жовте	6	
12	Колоскова луска: антоціанове забарвлення (під час цвітіння)	відсутнє або дуже слабке	1	
13	Колоскова луска: антоціанове забарвлення опушення (як для 12)	відсутнє або дуже слабке	1	
14	Нижня квіткова луска: розвиток остюка (як для 12)	відсутній або дуже слабкий	1	
15	Приймочка: антоціанове забарвлення (як для 12)	слабке	3	
16	Приймочка: жовте забарвлення (як для 12)	слабке	3	
17	Приймочка: за довжиною (як для 12)	коротка	3	
18	Квітка з квітконіжкою: квітка за довжиною (як для 12)	коротка	3	
19	Волоть: щільність в кінці цвітіння	нещільна	3	
20	Сухі тичинки: забарвлення (після цвітіння)	оранжеве	3	
21	Рослина: за висотою (за досягання)	низька	3	
22	Стебло: діаметр (верхня третина рослини за досягання)	малий	3	
23	Листок: за довжиною пластинки третього листка від верхівки (як для 21)	середній	5	
24	Листок: за шириною пластинки третього листка від верхівки (як для 21)	вузький	3	
25	Волоть: за довжиною без шийки (як для 21)	середня	5	
26	Волоть: гілочки за довжиною (у середній третині волоті)	середні	5	
27	Волоть: щільність (за досягання)	щільна	7	
28	Волоть: форма (за досягання)	симетрична	3	
29	Шийка волоті: видима довжина над піхвою (обгорткою) (як для 21)	коротка	3	
30	Колоскова луска: забарвлення за досягання	блідо-жовте	2	
31	Колоскова луска: за довжиною (за досягання)	довга	7	
32	Зернівка: забарвлення після досягання	оранжево-червоне	6	
33	Зернівки: маса 1000 шт,	велика	7	
34	Зернівка: форма зі спинки	округла	7	
35	Зернівка: форма в профіль	еліптична	5	
36	Зернівка: розмір зародка	середній	5	
37	Зернівка: площа поверхні, вкрита плівкою	середня	5	
38	Зернівка: вміст таніну	ознака не визначалась	0	
39	Зерно: структура ендосперму (у поздовжньому розрізі)	на 3/4 склоподібна	3	
40	Зерно: забарвлення склоподібного ендосперму	жовте	3	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	4,72	6,61	
Довірчий інтервал, т/га	1,3	1,52	
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	3,8	5,49	
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,92	-1,12	
+, - до усередненої урожайності, %	-19,5	-16,9	
Тривалість періоду вегетації, діб	115	114	
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	27	26,4	
Висота рослини, см	118,7	122,6	
Стійкість до вилягання, бал	8	8	
Стійкість до обсіпання, бал	8	9	
Стійкість до посухи, бал	7	9	
Вирівняність за висотою, бал	6	6	
Стійкість проти сажки, бал	8	9	
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	8	9	
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	7	
Стійкість проти попелиці, бал	7	7	
Вміст білка, %	11,5	10	
Вміст крохмалю, %	74,5	74,6	
Блок (група стиглості)	6	6	
Напрямок використання	зерн	зерн	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Сорго звичайне (двокольорове) *Sorghum bicolor* L.**Заявка № 18018005 Назва сорту:** КВС РАСМУС **Заявник (код):** 2649 **Власник сорту (код):** 2649**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 15.12.2020**Свідчення про державну реєстрацію № 201137****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення колеоптиля	слабке	3	
2	Паросток: антоціанове забарвлення дорсального боку першого листка	слабке	3	
3	Паросток: антоціанове забарвлення піхви першого листка	слабке	3	
4	Листок: антоціанове забарвлення пластинки (стадія п'ятого листка)	слабке	3	
5	Рослина: час виявлення волоті (50% рослин з волоттю)	середній	5	
6	Рослина: за висотою під час виявлення волоті	низька	3	
7	Листок: зелене забарвлення пластинки (за викидання волоті)	помірне	5	
8	Прапорцевий листок: поширення знебарвлення середньої жилки (як для 7)	помірне	5	
9	Прапорцевий листок: зелене забарвлення середньої жилки в порівнянні з пластинкою листка (якщо не знебарвлена, як для 7)	світліше	1	
10	Прапорцевий листок: жовте забарвлення середньої жилки (як для 7)	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Колоскова луска: забарвлення під час цвітіння	жовто-зелене	3	
12	Колоскова луска: антоціанове забарвлення (під час цвітіння)	відсутнє або дуже слабке	1	
13	Колоскова луска: антоціанове забарвлення опушення (як для 12)	відсутнє або дуже слабке	1	
14	Нижня квіткова луска: розвиток остюка (як для 12)	слабкий	3	
15	Приймочка: антоціанове забарвлення (як для 12)	відсутнє або дуже слабке	1	
16	Приймочка: жовте забарвлення (як для 12)	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Приймочка: за довжиною (як для 12)	коротка	3	
18	Квітка з квітконіжкою: квітка за довжиною (як для 12)	середня	5	
19	Волоть: щільність в кінці цвітіння	нещільна	3	
20	Сухі тичинки: забарвлення (після цвітіння)	оранжево-червоне	4	
21	Рослина: за висотою (за досягання)	низька	3	
22	Стебло: діаметр (верхня третина рослини за досягання)	малий	3	
23	Листок: за довжиною пластинки третього листка від верхівки (як для 21)	середній	5	
24	Листок: за шириною пластинки третього листка від верхівки (як для 21)	середній	5	
25	Волоть: за довжиною без шийки (як для 21)	довга	7	
26	Волоть: гілочки за довжиною (у середній третині волоті)	середні	5	
27	Волоть: щільність (за досягання)	щільна	7	
28	Волоть: форма (за досягання)	симетрична	3	
29	Шийка волоті: видима довжина над піхвою (обгорткою) (як для 21)	відсутня або дуже коротка	1	
30	Колоскова луска: забарвлення за досягання	блід-жовте	2	
31	Колоскова луска: за довжиною (за досягання)	середня	5	
32	Зернівка: забарвлення після досягання	червоно-коричнє	8	
33	Зернівки: маса 1000 шт,	велика	7	
34	Зернівка: форма зі спинки	округла	7	
35	Зернівка: форма в профіль	вузькоеліптична	3	
36	Зернівка: розмір зародка	середній	5	
37	Зернівка: площа поверхні, вкрита плівкою	середня	5	
38	Зернівка: вміст таніну	ознака не визначалась	0	
39	Зерно: структура ендосперму (у поздовжньому розрізі)	на 1/2 склоподібна	5	
40	Зерно: забарвлення склоподібного ендосперму	блід-жовте	2	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	4,72	6,61	
Довірчий інтервал, т/га	1,3	1,52	
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	4,59	5,68	
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,13	-0,93	
+, - до усередненої урожайності, %	-2,8	-14,1	
Тривалість періоду вегетації, днів	113	110	
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	27	29,7	
Висота рослини, см	110,5	103,1	
Стійкість до вилягання, бал	9	9	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	7	9	
Вирівняність за висотою, бал	7	5	
Стійкість проти сажки, бал	9	8	
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	9	8	
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	8	8	
Стійкість проти попелиці, бал	7	6	
Вміст білка, %	10,1	9,9	
Вміст крохмалю, %	73,3	75,4	
Блок (група стиглості)	6	6	
Напрямок використання	зерн	зерн	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Сорго звичайне (двокольорове) *Sorghum bicolor* L.

Заявка № 18018001 Назва сорту: РЖТ АЛИГГАТОР **Заявник (код):** 1783 **Власник сорту (код):** 1783

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201258

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення колеоптиля	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Паросток: антоціанове забарвлення дорсального боку першого листка	відсутнє або дуже слабке	1	
3	Паросток: антоціанове забарвлення піхви першого листка	відсутнє або дуже слабке	1	
4	Листок: антоціанове забарвлення пластинки (стадія п'ятого листка)	відсутнє або дуже слабке	1	
5	Рослина: час виявлення волоті (50% рослин з волоттю)	середній	5	
6	Рослина: за висотою під час виявлення волоті	низька	3	
7	Листок: зелене забарвлення пластинки (за викидання волоті)	помірне	5	
8	Прапорцевий листок: поширення знебарвлення середньої жилки (як для 7)	помірне	5	
9	Прапорцевий листок: зелене забарвлення середньої жилки в порівнянні з пластинкою листка (якщо не знебарвлена, як для 7)	ознака не визначалась	0	
10	Прапорцевий листок: жовте забарвлення середньої жилки (як для 7)	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Колоскова луска: забарвлення під час цвітіння	зелено-жовте	4	
12	Колоскова луска: антоціанове забарвлення (під час цвітіння)	відсутнє або дуже слабке	1	
13	Колоскова луска: антоціанове забарвлення опушення (як для 12)	відсутнє або дуже слабке	1	
14	Нижня квіткова луска: розвиток остюка (як для 12)	відсутній або дуже слабкий	1	
15	Приймочка: антоціанове забарвлення (як для 12)	відсутнє або дуже слабке	1	
16	Приймочка: жовте забарвлення (як для 12)	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Приймочка: за довжиною (як для 12)	дуже коротка	1	
18	Квітка з квітконіжкою: квітка за довжиною (як для 12)	середня	5	
19	Волоть: щільність в кінці цвітіння	нещільна	3	
20	Сухі тичинки: забарвлення (після цвітіння)	оранжеве	3	
21	Рослина: за висотою (за досягання)	низька	3	
22	Стебло: діаметр (верхня третина рослини за досягання)	малий	3	
23	Листок: за довжиною пластинки третього листка від верхівки (як для 21)	середній	5	
24	Листок: за шириною пластинки третього листка від верхівки (як для 21)	вузький	3	
25	Волоть: за довжиною без шийки (як для 21)	середня	5	
26	Волоть: гілочки за довжиною (у середній третині волоті)	середні	5	
27	Волоть: щільність (за досягання)	помірна	5	
28	Волоть: форма (за досягання)	ширша в нижній частині	4	
29	Шийка волоті: видима довжина над піхвою (обгорткою) (як для 21)	коротка	3	
30	Колоскова луска: забарвлення за досягання	блідо-коричнєве	4	
31	Колоскова луска: за довжиною (за досягання)	середня	5	
32	Зернівка: забарвлення після досягання	біле	1	
33	Зернівки: маса 1000 шт,	велика	7	
34	Зернівка: форма зі спинки	округла	7	
35	Зернівка: форма в профіль	еліптична	5	
36	Зернівка: розмір зародка	малий	3	
37	Зернівка: площа поверхні, вкрита плівкою	мала	3	
38	Зернівка: вміст таніну	ознака не визначалась	0	
39	Зерно: структура ендосперму (у поздовжньому розрізі)	на 3/4 склоподібна	3	
40	Зерно: забарвлення склоподібного ендосперму	блідо-жовте	2	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	4,65	5,73	
Довірчий інтервал, т/га	1,28	1,67	
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,77	7,6	
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,12	1,87	
+, - до усередненої урожайності, %	24	32,6	
Тривалість періоду вегетації, діб	102	98	
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	28,1	27,7	
Висота рослини, см	109,8	108,2	
Стійкість до вилягання, бал	9	9	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	8	9	
Вирівняність за висотою, бал	7	6	
Стійкість проти сажки, бал	9	9	
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	9	8	
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	9	8	
Стійкість проти попелиці, бал	7	6	
Вміст білка, %	10,9	9,7	
Вміст крохмалю, %	73,3	76,4	
Блок (група стиглості)	4	4	
Напрямок використання	зерн	зерн	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Сорго звичайне (двокольорове) *Sorghum bicolor* L.**Заявка № 18018009 Назва сорту:** Сентініл ІГ **Заявник (код):** 2554 **Власник сорту (код):** 2554**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 22.12.2020**Свідцтво про державну реєстрацію № 201817****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення колеоптиля	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Паросток: антоціанове забарвлення дорсального боку першого листка	відсутнє або дуже слабке	1	
3	Паросток: антоціанове забарвлення піхви першого листка	відсутнє або дуже слабке	1	
4	Листок: антоціанове забарвлення пластинки (стадія п'ятого листка)	відсутнє або дуже слабке	1	
5	Рослина: час виявлення волоті (50% рослин з волоттю)	середній	5	
6	Рослина: за висотою під час виявлення волоті	низька	3	
7	Листок: зелене забарвлення пластинки (за викидання волоті)	помірне	5	
8	Прапорцевий листок: поширення знебарвлення середньої жилки (як для 7)	слабке	3	
9	Прапорцевий листок: зелене забарвлення середньої жилки в порівнянні з пластинкою листка (якщо не знебарвлена, як для 7)	однакове	2	
10	Прапорцевий листок: жовте забарвлення середньої жилки (як для 7)	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Колоскова луска: забарвлення під час цвітіння	біло-зелене	2	
12	Колоскова луска: антоціанове забарвлення (під час цвітіння)	відсутнє або дуже слабке	1	
13	Колоскова луска: антоціанове забарвлення опушення (як для 12)	відсутнє або дуже слабке	1	
14	Нижня квіткова луска: розвиток остюка (як для 12)	відсутній або дуже слабкий	1	
15	Приймочка: антоціанове забарвлення (як для 12)	відсутнє або дуже слабке	1	
16	Приймочка: жовте забарвлення (як для 12)	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Приймочка: за довжиною (як для 12)	коротка	3	
18	Квітка з квітконіжкою: квітка за довжиною (як для 12)	середня	5	
19	Волоть: щільність в кінці цвітіння	помірна	5	
20	Сухі тичинки: забарвлення (після цвітіння)	червоне	5	
21	Рослина: за висотою (за досягання)	низька	3	
22	Стебло: діаметр (верхня третина рослини за досягання)	малий	3	
23	Листок: за довжиною пластинки третього листка від верхівки (як для 21)	короткий	3	
24	Листок: за шириною пластинки третього листка від верхівки (як для 21)	середній	5	
25	Волоть: за довжиною без шийки (як для 21)	середня	5	
26	Волоть: гілочка за довжиною (у середній третині волоті)	середні	5	
27	Волоть: щільність (за досягання)	щільна	7	
28	Волоть: форма (за досягання)	ширша у верхівковій частині	2	
29	Шийка волоті: видима довжина над піхвою (обгорткою) (як для 21)	довга	7	
30	Колоскова луска: забарвлення за досягання	червонувато-коричневе	5	
31	Колоскова луска: за довжиною (за досягання)	середня	5	
32	Зернівка: забарвлення після досягання	світло-коричневе	7	
33	Зернівки: маса 1000 шт,	велика	7	
34	Зернівка: форма зі спинки	округла	7	
35	Зернівка: форма в профіль	еліптична	5	
36	Зернівка: розмір зародка	середній	5	
37	Зернівка: площа поверхні, вкрита плівкою	середня	5	
38	Зернівка: вміст таніну	ознака не визначалась	0	
39	Зерно: структура ендосперму (у поздовжньому розрізі)	на 1/2 склоподібна	5	
40	Зерно: забарвлення склоподібного ендосперму	оранжеве	4	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	4,65	5,73	
Довірчий інтервал, т/га	1,28	1,67	
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,55	6,9	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,9	1,17	
+, - до усередненої урожайності, %	19,3	20,5	
Тривалість періоду вегетації, діб	99	99	
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	27,8	26,1	
Висота рослини, см	123,1	108,8	
Стійкість до вилягання, бал	7	9	
Стійкість до обсіпання, бал	8	9	
Стійкість до посухи, бал	7	9	
Вирівняність за висотою, бал	8	6	
Стійкість проти сажки, бал	9	9	
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	9	7	
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	9	8	
Стійкість проти попелиці, бал	7	6	
Вміст білка, %	10,7	10	
Вміст крохмалю, %	73,5	74,1	
Блок (група стиглості)	4	4	
Напрямок використання	зерн	зерн	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Сорго звичайне (двокольорове) *Sorghum bicolor* L.

Заявка № 18018006 Назва сорту: Сріблясте Заявник (код): 2260 Власник сорту (код): 2260

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201259

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення колеоптиля	слабке	3	
2	Паросток: антоціанове забарвлення дорсального боку першого листка	слабке	3	
3	Паросток: антоціанове забарвлення піхви першого листка	слабке	3	
4	Листок: антоціанове забарвлення пластинки (стадія п'ятого листка)	слабке	3	
5	Рослина: час виявлення волоті (50% рослин з волоттю)	ранній	3	
6	Рослина: за висотою під час виявлення волоті	низька	3	
7	Листок: зелене забарвлення пластинки (за викидання волоті)	помірне	5	
8	Прапорцевий листок: поширення знебарвлення середньої жилки (як для 7)	слабке	3	
9	Прапорцевий листок: зелене забарвлення середньої жилки в порівнянні з пластинкою листка (якщо не знебарвлена, як для 7)	світліше	1	
10	Прапорцевий листок: жовте забарвлення середньої жилки (як для 7)	ознака не визначалась	0	
11	Колоскова луска: забарвлення під час цвітіння	зелено-жовте	4	
12	Колоскова луска: антоціанове забарвлення (під час цвітіння)	відсутнє або дуже слабке	1	
13	Колоскова луска: антоціанове забарвлення опушення (як для 12)	відсутнє або дуже слабке	1	
14	Нижня квіткова луска: розвиток остюка (як для 12)	сильний	7	
15	Приймочка: антоціанове забарвлення (як для 12)	відсутнє або дуже слабке	1	
16	Приймочка: жовте забарвлення (як для 12)	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Приймочка: за довжиною (як для 12)	коротка	3	
18	Квітка з квітконіжкою: квітка за довжиною (як для 12)	середня	5	
19	Волоть: щільність в кінці цвітіння	нещільна	3	
20	Сухі тичинки: забарвлення (після цвітіння)	тьмяно-жовте	1	
21	Рослина: за висотою (за досягання)	низька	3	
22	Стебло: діаметр (верхня третина рослини за досягання)	малий	3	
23	Листок: за довжиною пластинки третього листка від верхівки (як для 21)	короткий	3	
24	Листок: за шириною пластинки третього листка від верхівки (як для 21)	вузький	3	
25	Волоть: за довжиною без шийки (як для 21)	середня	5	
26	Волоть: гілочки за довжиною (у середній третині волоті)	довгі	7	
27	Волоть: щільність (за досягання)	нещільна	3	
28	Волоть: форма (за досягання)	ширша в нижній частині	4	
29	Шийка волоті: видима довжина над піхвою (обгорткою) (як для 21)	середня	5	
30	Колоскова луска: забарвлення за досягання	біле	1	
31	Колоскова луска: за довжиною (за досягання)	дуже довга	9	
32	Зернівка: забарвлення після досягання	сірувате	2	
33	Зернівки: маса 1000 шт,	середня	5	
34	Зернівка: форма зі спинки	еліптична	5	
35	Зернівка: форма в профіль	еліптична	5	
36	Зернівка: розмір зародка	середній	5	
37	Зернівка: площа поверхні, вкрита плівкою	середня	5	
38	Зернівка: вміст таніну	ознака не визначалась	0	
39	Зерно: структура ендосперму (у поздовжньому розрізі)	на 1/2 склоподібна	5	
40	Зерно: забарвлення склоподібного ендосперму	фіолетове	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	4,65	5,73	
Довірчий інтервал, т/га	1,28	1,67	
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	3,87	3,78	
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,78	-1,95	
+, - до усередненої урожайності, %	-16,9	-34	
Тривалість періоду вегетації, діб	103	100	
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	21,8	24,6	
Висота рослини, см	122	111,5	
Стійкість до вилягання, бал	9	9	
Стійкість до обсіпання, бал	9	8	
Стійкість до посухи, бал	7	7	
Вирівняність за висотою, бал	6	6	
Стійкість проти сажки, бал	9	9	
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	9	7	
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	9	8	
Стійкість проти попелиці, бал	7	5	
Вміст білка, %	13	11,7	
Вміст крохмалю, %	67,9	73,6	
Блок (група стиглості)	4	4	
Напрямок використання	зерн	зерн	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ: ОЛІЙНІ ТА ПРЯДИВНІ

Арахіс підземний

Гірчиця сарептська (яра)

Коноплі посівні

Льон звичайний, довгунець

Льон низький (олійний, кудряш)

Ріпак (озимий)

Ріпак (озимий) – батьківський компонент

Ріпак (ярий)

Соняшник однорічний

Соняшник однорічний – батьківський компонент



Вид: Арахіс підземний *Arachis hypogaea* L.

Заявка № 20031001 **Назва сорту:** Кремена **Заявник (код):** 2675 **Власник сорту (код):** 2675

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 30.11.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200852

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус	прямий	1	
2	Рослина: щільність	щільна	7	
3	Стебло: антоціанове забарвлення	відсутнє або слабке	1	
4	Головне стебло: квітки	наявні	9	
5	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
6	Листочок: за довжиною	короткий	1	
7	Листочок: розміщення найширшої частини	ближче до верхівки	2	
8	Листочок: форма верхівки	широко загострена	2	
9	Гілки першого порядку: характер цвітіння	переривчасте	1	
10	Біб: перетяжки	відсутні або дуже мілкі	1	
11	Біб: ступінь чарункватості	слабкий	1	
12	Біб: кількість насінин	дві	1	
13	Насінина: основне забарвлення насіннєвої шкірки	червоне	3	
14	Насінина: вторинне забарвлення насіннєвої шкірки	відсутнє	1	
15	Маса 100 насінин	велика	3	
16	Шкаралупа: за товщиною	тонка	1	
17	Час досягання	ранній	3	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожайність бобів (за стандартної вологості 11%), т/га – 5. Урожайність ядра, т/га – 3,5. Кількість бобів на рослині, шт. – 30. Міцність прикріплення бобів, бал (1–9) – 7. Придатність до механізованого збирання, бал (1–9) – 8. Середня маса одного бобу, г – 2,2. Маса 1000 насінин, г – 700. Вміст у ядрах, %: білка – 32, олії – 49. Посухостійкість, бал (1–9) – 7. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): фузаріозне в'янення (*Fusarium* Sp.) – 8, бактеріоз бобів (*Pseudomonas solanacearum* E.F.Smith) – 8, борошниста роса (*Oidium arachidis* A.) – 9. Стійкість проти шкідників, бал (1–9) – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.

Вид: Арахіс підземний *Arachis hypogaea* L.

Заявка № 20031002 Назва сорту: Цветеліна **Заявник (код):** 2675 **Власник сорту (код):** 2675

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 30.11.2020

Свідчення про державну реєстрацію № 200853

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус	напівпрямий	2	
2	Рослина: щільність	щільна	7	
3	Стебло: антоціанове забарвлення	відсутнє або слабке	1	
4	Головне стебло: квітки	наявні	9	
5	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	1	
6	Листочок: за довжиною	середній	2	
7	Листочок: розміщення найширшої частини	ближче до верхівки	2	
8	Листочок: форма верхівки	широко загострена	2	
9	Гілки першого порядку: характер цвітіння	переривчасте	1	
10	Біб: перетяжки	мілкі	2	
11	Біб: ступінь чарункватості	слабкий	1	
12	Біб: кількість насінин	дві	1	
13	Насінина: основне забарвлення насіннєвої шкірки	червоне	3	
14	Насінина: вторинне забарвлення насіннєвої шкірки	відсутнє	1	
15	Маса 100 насінин	велика	3	
16	Шкаралупа: за товщиною	тонка	1	
17	Час досягання	ранній	3	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожайність бобів (за стандартної вологості 11%), т/га – 5,5. Урожайність ядра, т/га – 3,6. Кількість бобів на рослині, шт. – 26. Міцність прикріплення бобів, бал (1–9) – 7. Придатність до механізованого збирання, бал (1–9) – 8. Середня маса одного бобу, г – 2,8. Маса 1000 насінин, г – 750. Вміст у ядрах, %: білка – 32, олії – 49. Посухостійкість, бал (1–9) – 7. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): фузаріозне в'янення (*Fusarium* Sp.) – 3, бактеріоз бобів (*Pseudomonas solanacearum* E.F.Smith) – 7, борошниста роса (*Oidium arachidis* A.) – 9. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): горіховий довгоносик – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.

Вид: Гірчиця сарептська (яра) *Brassica juncea* (L.) Czern.

Заявка № 19032001 Назва сорту: Корона **Заявник (код):** 2458 **Власник сорту (код):** 2458

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 08.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200966

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Насіння: ефірність	висока	9	
3	Насіння: забарвлення	жовте	3	
4	Насіння: маса 1000 шт.	середня	5	
5	Сім'ядолі: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
6	Листок розетковий: розмір пластинки	малий	1	
7	Листок розетковий: форма листкової пластинки	оберненояцеподібна	3	
8	Листок розетковий: за розсіченістю листкової пластинки	цілісний	1	
9	Листок: за формою краю листкової пластинки	виїмчастий	3	
10	Листок: опушення	відсутнє	1	
11	Листок: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
12	Листок: восковий наліт	відсутній	1	
13	Рослина: за висотою	середня	5	
14	Стебло: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
15	Стебло: восковий наліт	відсутній	1	
16	Рослина: форма суцвіття	киติця	1	
17	Квітка: забарвлення пелюсток	золотисто-жовте	3	
18	Стручок: за довжиною	середній	5	
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5	
20	Тривалість періоду вегетації	середня	5	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожайність насіння (за стандартної вологості 14%), т/га – 2,6. Урожайність зеленої маси, т/га – 27. Тривалість періоду вегетації, діб – 87. Вміст олії, % – 44, білка, % – 26. Посухостійкість, бали (1–9) – 9. Холодостійкість, бали (1–9) – 8. Стійкість до осипання, бали (1–9) – 8. Стійкість проти хвороб, бали (1–9): філостиктоз – 8, борошниста роса – 9, біла гниль – 9, пероноспороз – 9, септоріоз – 9. Стійкість проти заселення (пошкодження) шкідниками, бали (1–9): гірчичний клоп – 9, гірчичний листоїд – 8, хрестоцвіті блішки – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Гірчиця сарептська (яра) *Brassica juncea* (L.) Czern.

Заявка № 19032002 Назва сорту: Сінтіум **Заявник (код):** 2654 **Власник сорту (код):** 2654

Дата пріоритету: 09.12.2019

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 17.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201146

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	наявна	9	
2	Насіння: ефірність	висока	9	
3	Насіння: забарвлення	жовте	3	
4	Насіння: маса 1000 шт.	мала	3	
5	Сім'ядолі: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
6	Листок розетковий: розмір пластинки	великий	9	
7	Листок розетковий: форма листової пластинки	ліроподібна	1	
8	Листок розетковий: за розсіченістю листової пластинки	цілісний	1	
9	Листок: за формою краю листової пластинки	зубчастий	2	
10	Листок: опушення	відсутнє	1	
11	Листок: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
12	Листок: восковий наліт	відсутній	1	
13	Рослина: за висотою	висока	7	
14	Стебло: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
15	Стебло: восковий наліт	відсутній	1	
16	Рослина: форма суцвіття	китиця	1	
17	Квітка: забарвлення пелюсток	золотисто-жовте	3	
18	Стручок: за довжиною	довгий	7	
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5	
20	Тривалість періоду вегетації	мала	3	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожайність насіння (за стандартної вологості 14%), т/га – 2,3. Урожайність зеленої маси, т/га – 57. Тривалість періоду вегетації, діб – 79. Вміст олії, % – 42, білка, % – 21. Посухостійкість, бали (1–9) – 9. Холодостійкість, бали (1–9) – 9. Стійкість до осипання, бали (1–9) – 9. Стійкість проти хвороб, бали (1–9): філостиктоз – 9, борошниста роса – 7, біла гниль – 9, пероноспороз – 9, септоріоз – 7. Стійкість проти заселення (пошкодження) шкідниками, бали (1–9): гірчичний клоп – 7, гірчичний листоїд – 7, хрестоцвіті блішки – 5.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Конопля посівна *Cannabis sativa* L.

Заявка № 19080001 Назва сорту: Артеміда **Заявник (код):** 2289 **Власник сорту (код):** 2289

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 30.11.2020 **Патент № 200756**

Дата пріоритету: 29.01.2019

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 24.11.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200885

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Сім'ядоля: форма	середньообернено-яйцеподібна	2	
2	Сім'ядоля: забарвлення	світло-зелене	2	
3	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
4	Рослина: антоціанове забарвлення верхівки	відсутнє або дуже слабе	1	
5	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	1	
6	Листок: черешок за довжиною	середній	2	
7	Листок: антоціанове забарвлення черешка	відсутнє або дуже слабе	1	
8	Листок: кількість листочків	середня	2	
9	Центральна листкова пластинка: за довжиною	довга	7	
10	Центральна листкова пластинка: за шириною	широка	7	
11	Час цвітіння чоловічих суцвіть	ранній	3	
12	Суцвіття: антоціанове забарвлення чоловічих суцвіть	відсутнє або дуже слабе	1	
13	Суцвіття: вміст ТГК	відсутній або дуже низький	1	
14	Рослина: співвідношення гермафродитних рослин	велике	5	
15	Рослина: співвідношення жіночих рослин	мале	1	
16	Рослина: співвідношення чоловічих рослин	мале	1	
17	Рослина: за природною висотою	висока	7	
18	Головне стебло: забарвлення	помірно зелене	2	
19	Головне стебло: міжвузля за довжиною	довгі	7	
20	Головне стебло: за товщиною	товсте	3	
21	Головне стебло: борізки за глибиною	середні	2	
22	Головне стебло: серцевина в поперечному перерізі	товста	3	
23	Насіння: маса 1000 шт.	середня	3	
24	Насінина: забарвлення шкірки	сіро-коричневе	3	
25	Насінина: мармуровість	слабка	3	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Тривалість періоду вегетації до технічної стиглості, діб – 95. Тривалість періоду вегетації до біологічної стиглості, діб – 124. Висота рослин, см – 259,2. Урожайність насіння, т/га – 1,29. Технічна довжина стебел, см – 190,0. Урожайність стебел, т/га – 8,28, волокна, т/га – 2,52. ТГК не виявлено. Вміст олії в насінні, % – 36,8. Стабільність ознаки однодомності (вміст рослин плосконі), % – 0. Вміст волокна, % – 30,3. Стійкість проти фузаріозу, бал – 7. Стійкість проти конопляної блішки, бал – 7, стеблового метелика, бал – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Льон звичайний, довгунець *Linum usitatissimum* L.

Заявка № 15081004 Назва сорту: Сіверський **Заявник (код):** 1869 **Власник сорту (код):** 1869

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 24.12.2020

Свідцтво про державну реєстрацію № 201790

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Пелюстка: забарвлення у фазі пуп'янка	фіолетове	4	
2	Час початку цвітіння	ранній	3	
3	Віночок: розташування пелюсток	перекриваються	3	
4	Віночок: забарвлення	світло-рожеве	2	
5	Квітка: розмір віночка	малий	3	
6	За винятком сортів з білим віночком. Квітка: форма серединки віночка	округла	1	
7	Пелюстка: за довжиною	дуже довга	9	
8	Пелюстка: за шириною	широка	7	
9	Пелюстка: відношення довжина/ширина	середнє	5	
10	Тичинка: забарвлення дистальної частини нитки	блакитне	2	
11	Тичинка: забарвлення базальної частини нитки	блакитне	2	
12	Пиляк: забарвлення	блакитнувате	4	
13	Маточка: забарвлення	біле	1	
14	Рослина: за висотою	висока	7	
15	Коробочка: розмір	великий	7	
16	Коробочка: вічність несправжніх перетинок	наявна	9	
17	Коробочка: за довжиною	довга	7	
18	Коробочка: за шириною	широка	7	
19	Коробочка: відношення довжина/ширина	помірно велике	7	
20	Стебло: за довжиною від підсім'ядольного коліна до першої гілочки	середнє	5	
21	Стебло: за довжиною від підсім'ядольного коліна до верхівкової коробочки	довге	7	
22	Насіння: маса 1000 шт	середня	5	
23	Насіння: забарвлення	коричнєве	3	
24	Насіння: за довжиною	довга	4	
25	Насіння: за шириною	вузька	2	
26	Насіння: відношення довжина/ширина	помірно мале	2	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожайність соломки, т/га – 5,9. Вихід волокна з соломки, % – 27,4. Номер волокна – 14. Вміст довгого волокна, % – 18,7. Гнучкість волокна, мм – 42,6. Розривне навантаження, даН – 18,4. Довжина жмені, см – 70,6. Урожайність насіння (за стандартної вологості 12%), т/га – 1. Маса 1000 насінин, г – 4,8. Стійкість до вилягання, бал (1–9) – 8. Посухостійкість, бал (1–9) – 7. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): вертицильозне в'янення (вілт) (*Verticillium dahliae* Kleb.) – 0, фузаріозне в'янення (*Fusarium lini* Bolley.) – 5, іржа (*Melampsora lini* (Ehrenb.) Lev.) – 0, пасмо (*Phlyctaena linicola* Speg.) – 0, антракноз (*Colletotrichum lini* Manns et Bolley) – 5. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): льонова білшка (*Aphtona euphorbiae* Schrnk.) – 3, льоновий трипс (*Thrips lini* Ladurean.) – 5, льонова плодожерка (*Cochylis epilana* Duponchel) – 0.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Льон звичайний, довгунець *Linum usitatissimum* L.

Заявка № 17081002 Назва сорту: Усівський **Заявник (код):** 2289 **Власник сорту (код):** 2289

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 24.11.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200890

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Пелюстка: забарвлення у фазі пуп'янка	фіолетове	4	
2	Час початку цвітіння	ранній	3	
3	Віночок: розташування пелюсток	перекриваються	3	
4	Віночок: забарвлення	блакитно-фіолетове	6	
5	Квітка: розмір віночка	малий	3	
6	За винятком сортів з білим віночком. Квітка: форма серединки віночка	округла	1	
7	Пелюстка: за довжиною	коротка	3	
8	Пелюстка: за шириною	середня	5	
9	Пелюстка: відношення довжина/ширина	середнє	5	
10	Тичинка: забарвлення дистальної частини нитки	біле	1	
11	Тичинка: забарвлення базальної частини нитки	блакитне	2	
12	Пиляк: забарвлення	блакитнувате	4	
13	Маточка: забарвлення	біле	1	
14	Рослина: за висотою	висока	7	
15	Коробочка: розмір	середній	5	
16	Коробочка: вічність несправжніх перетинків	відсутня	1	
17	Коробочка: за довжиною	середня	5	
18	Коробочка: за шириною	широка	7	
19	Коробочка: відношення довжина/ширина	середнє	5	
20	Стебло: за довжиною від підсідьдольного коліна до першої гілочки	довге	7	
21	Стебло: за довжиною від підсідьдольного коліна до верхівкової коробочки	довге	7	
22	Насіння: маса 1000 шт	середня	5	
23	Насіння: забарвлення	коричнєве	3	
24	Насіння: за довжиною	коротка	2	
25	Насіння: за шириною	середня	3	
26	Насіння: відношення довжина/ширина	помірно мале	2	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожайність соломки, т/га – 6,4. Вихід волокна з соломки, % – 25. Номер волокна – 12. Вміст довгого волокна, % – 18,6. Гнучкість волокна, мм – 51,3. Розривне навантаження, даН – 21,6. Довжина жмені, см – 69,9. Урожайність насіння (за стандартної вологості 12%), т/га – 0,72. Маса 1000 насінин, г – 4,60. Стійкість до вилягання, бал (1–9) – 8. Посухостійкість, бал (1–9) – 7. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): вертицильозне в'янення (вілт) (*Verticillium dahliae* Kleb.) – 0, фузаріозне в'янення (*Fusarium lini* Bolley.) – 6, іржа (*Melampsora lini* (Ehrenb.) Lev.) – 0, пасмо (*Phlyctaena linicola* Speg.) – 0, антракноз (*Colletotrichum lini* Manns et Bolley) – 5. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): льонова білшка (*Aphtona euphorbiae* Schrnk.) – 0, льоновий трипс (*Thrips lini* Ladurean.) – 0, льонова плодожерка (*Cochylis epilina* Duponchel) – 0.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Льон низький (олійний, кудряш) *Linum humile* Mill.

Заявка № 19035001 Назва сорту: Парус **Заявник (код):** 2458 **Власник сорту (код):** 2458

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 24.11.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200891

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: за висотою, враховуючи гілочки (під час цвітіння)	середня	5	
2	Стебло: за довжиною, не враховуючи коротких гілочок (під час повного розвитку)	середнє	5	
3	Квітка: розмір віночка (на початку цвітіння)	малий	3	
4	Чашолисток: плямистість (у фазі пуп'янка)	слабка	3	
5	Пелюстка: забавлення у фазі пуп'янка (перед розкриттям квітки)	фіолетове	5	
6	Квітка: забарвлення віночка (за повного цвітіння)	блідо-блакитне	2	
7	Пелюстка: позадонний згин	відсутній	1	
8	Тичинка: забарвлення дистальної частини нитки (одразу після розкриття квітки)	блакитне	2	
9	Піляк: забарвлення (як для 8)	голубувате	4	
10	Стовпчики маточки: забарвлення основи (як для 8)	блакитне	3	
11	Коробочка: розмір	середній	5	
12	Коробочка: в'ячистість несправжніх перетинок	відсутня	1	
13	Насіння: маса 1000 шт.	середня	5	
14	Насінина: забарвлення	жовте	2	
15	Час початку цвітіння (перша квітка розкрилась на 10 % рослин)	середній	5	
16	Квітка: за формою	відкрита	1	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожайність насіння (за стандартної вологості 8–12%), т/га – 2,1. Маса 1000 насінин, г – 8,0. Вміст олії в насінні, % – 50. Вміст в олії: ліноленової кислоти, % – 47, лінолевої кислоти, % – 21, олеїнової кислоти, % – 18. Стійкість до вилягання, бал (1–9) – 9. Стійкість до посухи, бал (1–9) – 9. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): вертицильозне в'янення (вілт) (*Verticillium dahliae* Kleb.) – 9, фузаріозне в'янення (*Fusarium lini* Bolley.) – 9, іржа (*Melampsora lini* (Ehrenb.) Lev.) – 9, пасмо (*Phlyctaena linicola* Speg.) – 9. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): льонова блішка (*Aphtona euphorbiae* Schrnk.) – 9, льоновий трипс (*Thrips lini* Ladurean.) – 9, льонова плодожерка (*Cochylis epilinaea* Duponchel) – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus* L. *oleifera*

Заявка № 18040020 Назва сорту: АЛІВІО Заявник (код): 2602 Власник сорту (код): 2602

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 13.11.2020 Патент № 200714

Дата пріоритету: 03.05.2018

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.10.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200834

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядолі: за довжиною	короткі	3	
3	Сім'ядолі: за шириною	вузькі	3	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня	5	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середня	5	
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	короткі	3	
14	Квітка: пелюстки за шириною	вузькі	3	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5	
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	довга	7	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5	
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	коротка	3	
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	сильна	7	
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2	3,36	2,47
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,33	2,97	2,31
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,33	-0,4	-0,16
+, - до усередненої урожайності, %	16,2	-11,6	-6,5
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	282	286	306
Висота рослини, см	124,8	114,2	115,9
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	4,9	5,6	5,6
Вміст білка, %	20,6	21,2	19,4
Вміст олії, %	45,6	44,3	45,8
Вміст ерукової кислоти, %	0	0	0
Вміст глюкозинолатів, %	0,7	0,7	0,6
Стійкість до вилягання, бал	8	9	9
Стійкість до обсіпання, бал	8	8	7
Стійкість до посухи, бал	7	9	8
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	7	7
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал	8	9	7
Стійкість проти квіткоїду ріпакового, бал	7	8	6
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	9	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	8	7
Блок	1	1	1
Напрямок використання	олн	олн	олн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus* L. *oleifera*

Заявка № 18040041 Назва сорту: Батис Заявник (код): 807 Власник сорту (код): 807

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 02.12.2020

Свідчення про державну реєстрацію № 200987

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядолі: за довжиною	короткі	3	
3	Сім'ядолі: за шириною	вузькі	3	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	мала	3	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	довгий	7	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середня	5	
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5	
14	Квітка: пелюстки за шириною	вузькі	3	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5	
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	коротка	3	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5	
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	середня	5	
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	слабка	3	
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2	3,36	2,47
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,23	2,92	2,56
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,23	-0,45	0,09
+, - до усередненої урожайності, %	11,2	-13,2	3,7
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	281	285	306
Висота рослини, см	118,6	107,4	115
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	4,3	5,7	4,7
Вміст білка, %	20,3	18,4	17,8
Вміст олії, %	46,5	47,1	47,4
Вміст ерукової кислоти, %	0	0	0
Вміст глюкозинолатів, %	0,6	0,7	0,7
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість до обсіпання, бал	8	7	7
Стійкість до посухи, бал	8	9	8
Зимостійкість: польова оцінка, бал	7	6	7
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал	8	9	7
Стійкість проти квіткоїду ріпакового, бал	7	8	6
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	9	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	8	7
Блок	1	1	1
Напрямок використання	олн	олн	олн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СП.

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus* L. *oleifera*

Заявка № 18040010 Назва сорту: ВІОЛІН **Заявник (код):** 912 **Власник сорту (код):** 912

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 09.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201107

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядолі: за довжиною	короткі	3	
3	Сім'ядолі: за шириною	середні	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня	5	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середня	5	
11	Рослина: час початку цвітіння	ранній	3	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	довгі	7	
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7	
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	довга	7	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	довгий	7	
19	Стручок: носик за довжиною	довгий	7	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	довга	7	
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	помірна	5	
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2	3,36	2,47
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,17	2,76	2,12
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,16	-0,61	-0,34
+, - до усередненої урожайності, %	8	-17,7	-13,9
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	282	285	305
Висота рослини, см	125,3	115,2	116,3
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	4,4	5,2	4,5
Вміст білка, %	20,4	19,5	19,2
Вміст олії, %	45,9	46,7	46,1
Вміст ерукової кислоти, %	0	0	0
Вміст глюкозинолатів, %	0,6	0,6	0,6
Стійкість до вилягання, бал	8	9	8
Стійкість до обсіпання, бал	7	8	7
Стійкість до посухи, бал	8	8	8
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	6	7
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал	8	9	6
Стійкість проти квіткоїду ріпакового, бал	7	8	6
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	9	7
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	8	7
Блок	1	1	1
Напрямок використання	олн	олн	олн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus L. oleifera***Заявка № 18040047 Назва сорту:** Галілеус **Заявник (код):** 2524 **Власник сорту (код):** 2524**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.10.2020**Свідцтво про державну реєстрацію № 200838****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядолі: за довжиною	середні	5	
3	Сім'ядолі: за шириною	широкі	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	велика	7	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	довгий	7	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середня	5	
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5	
14	Квітка: пелюстки за шириною	вузькі	3	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7	
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	довга	7	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5	
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	коротка	3	
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	слабка	3	
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2	3,36	2,47
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,05	3,1	2,07
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,04	-0,27	-0,4
+, - до усередненої урожайності, %	2	-7,7	-16,1
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	281	286	304
Висота рослини, см	119,6	109,6	115
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	4,4	5,9	5
Вміст білка, %	20,9	20,8	18,7
Вміст олії, %	46	45,2	46,2
Вміст ерукової кислоти, %	0	0	0,1
Вміст глюкозинолатів, %	0,6	0,5	0,5
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість до обсіпання, бал	8	8	7
Стійкість до посухи, бал	7	9	8
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	6	7
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал	8	9	8
Стійкість проти квіткоїду ріпакового, бал	7	8	7
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	8	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	8	7
Блок	1	1	1
Напрямок використання	олн	олн	олн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus* L. *oleifera*

Заявка № 18040043 Назва сорту: Дайнемік **Заявник (код):** 807 **Власник сорту (код):** 807

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 02.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200988

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядолі: за довжиною	короткі	3	
3	Сім'ядолі: за шириною	вузькі	3	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	велика	7	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	довгий	7	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середня	5	
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5	
14	Квітка: пелюстки за шириною	вузькі	3	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5	
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	довга	7	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5	
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	середня	5	
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	сильна	7	
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2	3,36	2,47
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,52	2,88	2,74
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,51	-0,49	0,27
+, - до усередненої урожайності, %	25,3	-14,3	11
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	281	284	304
Висота рослини, см	123,7	114,4	116,3
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	4,5	5	4,6
Вміст білка, %	20,7	20,8	19,1
Вміст олії, %	46,1	45,7	45,7
Вміст ерукової кислоти, %	0	0	0
Вміст глюкозинолатів, %	0,7	0,6	0,5
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість до обсіпання, бал	8	7	7
Стійкість до посухи, бал	8	9	8
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	6	8
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал	8	9	8
Стійкість проти квіткоїду ріпакового, бал	7	8	7
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	9	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	8	8
Блок	1	1	1
Напрямок використання	олн	олн	олн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СП.

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus L. oleifera***Заявка № 18040044 Назва сорту:** Донат **Заявник (код):** 807 **Власник сорту (код):** 807**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 02.12.2020**Свідчення про державну реєстрацію № 200989****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядолі: за довжиною	короткі	3	
3	Сім'ядолі: за шириною	вузькі	3	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня	5	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середня	5	
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5	
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7	
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	коротка	3	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5	
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	коротка	3	
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	помірна	5	
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2	3,36	2,47
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,44	3,18	2,87
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,43	-0,19	0,4
+, - до усередненої урожайності, %	21,2	-5,4	16,2
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	282	286	305
Висота рослини, см	118,5	108,2	112
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	4,2	5	5
Вміст білка, %	20,1	19,2	18,8
Вміст олії, %	46,1	46,2	46,6
Вміст ерукової кислоти, %	0	0	0
Вміст глюкозинолатів, %	0,6	0,7	0,6
Стійкість до вилягання, бал	8	9	9
Стійкість до обсіпання, бал	8	8	8
Стійкість до посухи, бал	8	9	8
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	7	8
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал	8	9	8
Стійкість проти квіткоїду ріпакового, бал	7	8	7
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	9	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	8	7
Блок	1	1	1
Напрямок використання	олн	олн	олн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СП.

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus* L. *oleifera*

Заявка № 18040049 **Назва сорту:** ЕС АМАДЕО **Заявник (код):** 806 **Власник сорту (код):** 806

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.10.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200840

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядолі: за довжиною	короткі	3	
3	Сім'ядолі: за шириною	вузькі	3	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня	5	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	вузький	3	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	коротка	3	
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5	
14	Квітка: пелюстки за шириною	вузькі	3	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5	
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	середня	5	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5	
19	Стручок: носик за довжиною	короткий	3	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	коротка	3	
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	сильна	7	
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізно-літньої сівби	ознака не визначається	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2	3,36	2,47
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,28	2,49	2,51
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,28	-0,88	0,04
+, - до усередненої урожайності, %	13,7	-26,1	1,7
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	281	286	303
Висота рослини, см	121,4	114,4	118,4
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	4,3	5,4	4,6
Вміст білка, %	21,9	21,7	20,2
Вміст олії, %	44,8	44,4	45,3
Вміст ерукової кислоти, %	0	0	0,1
Вміст глюкозинолатів, %	0,7	0,5	0,5
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість до обсіпання, бал	8	8	7
Стійкість до посухи, бал	8	8	8
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	6	8
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал	8	9	8
Стійкість проти квіткоїду ріпакового, бал	7	8	7
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	8	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	8	7
Блок	1	1	1
Напрямок використання	олн	олн	олн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СП.

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus L. oleifera***Заявка № 18040048 Назва сорту:** ЕС НАВІГО **Заявник (код):** 806 **Власник сорту (код):** 806**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 23.10.2020**Свідцтво про державну реєстрацію № 200839****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядолі: за довжиною	короткі	3	
3	Сім'ядолі: за шириною	вузькі	3	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	мала	3	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середня	5	
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5	
14	Квітка: пелюстки за шириною	вузькі	3	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5	
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	середня	5	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	короткий	3	
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	середня	5	
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	слабка	3	
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2	3,36	2,47
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,41	2,5	2,71
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,4	-0,87	0,24
+, - до усередненої урожайності, %	20,1	-25,7	9,8
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	281	288	305
Висота рослини, см	123,6	111,6	117,6
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	4,2	4,7	5
Вміст білка, %	21,3	20,9	18,3
Вміст олії, %	45,3	45,2	47,1
Вміст ерукової кислоти, %	0	0	0
Вміст глюкозинолатів, %	0,6	0,8	0,7
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість до обсіпання, бал	8	7	8
Стійкість до посухи, бал	8	8	8
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	6	8
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал	8	9	8
Стійкість проти квіткоїду ріпакового, бал	7	8	6
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	9	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	8	7
Блок	1	1	1
Напрямок використання	олн	олн	олн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СП.

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus* L. *oleifera*

Заявка № 17040022 Назва сорту: ІНВ1170 **Заявник (код):** 2602 **Власник сорту (код):** 2602

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 20.11.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200933

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядолі: за довжиною	короткі	3	
3	Сім'ядолі: за шириною	середні	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	велика	7	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	вузький	3	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	довга	7	
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5	
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7	
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	середня	5	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5	
19	Стручок: носик за довжиною	довгий	7	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	коротка	3	
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1	
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,97	3,32	2,47
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,32	3,6	2,74
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,35	0,28	0,27
+, - до усередненої урожайності, %	17,8	8,4	10,9
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	282	315	298
Висота рослини, см	127,5	111,8	122,1
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	4,5	5,6	5,2
Вміст білка, %	20,9	19	17,3
Вміст олії, %	45,4	46,3	48,6
Вміст ерукової кислоти, %	0,1	0	0
Вміст глюкостінолатів, %	0,7	0,8	0,6
Стійкість до вилягання, бал	8	9	9
Стійкість до обсіпання, бал	8	8	7
Стійкість до посухи, бал	8	8	8
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	6	7
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал	8	9	8
Стійкість проти квіткоїду ріпакового, бал	7	7	7
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	9	7
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	9	7
Блок	1	1	1
Напрямок використання	олн	олн	олн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus L. oleifera***Заявка № 17040015 Назва сорту:** ІНВ1188 **Заявник (код):** 2602 **Власник сорту (код):** 2602**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 20.11.2020**Свідчення про державну реєстрацію № 200931****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядолі: за довжиною	короткі	3	
3	Сім'ядолі: за шириною	середні	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	велика	7	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	довга	7	
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5	
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7	
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	довга	7	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5	
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	середня	5	
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	помірна	5	
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,97	3,32	2,47
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,56	3,79	2,75
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,59	0,47	0,28
+, - до усередненої урожайності, %	29,9	14,2	11,3
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	281	315	299
Висота рослини, см	131	109,8	126,9
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	4,9	5,5	5,3
Вміст білка, %	20,2	19,1	16,5
Вміст олії, %	45,5	45,8	48,3
Вміст ерукової кислоти, %	0	0	0
Вміст глюкозинолатів, %	0,7	0,7	0,7
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість до обсіпання, бал	8	7	7
Стійкість до посухи, бал	8	7	8
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	6	7
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал	8	9	8
Стійкість проти квіткоїду ріпакового, бал	8	7	6
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	9	7
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	9	7
Блок	1	1	1
Напрямок використання	олн	олн	олн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus* L. *oleifera*

Заявка № 17040021 **Назва сорту:** ІНВ1199 **Заявник (код):** 2602 **Власник сорту (код):** 2602

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 20.11.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200932

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядолі: за довжиною	короткі	3	
3	Сім'ядолі: за шириною	середні	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	велика	7	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	довга	7	
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5	
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7	
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	дуже довга	9	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5	
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	коротка	3	
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1	
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,97	3,32	2,47
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,5	3,52	2,82
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,53	0,2	0,35
+, - до усередненої урожайності, %	26,9	6,0	14,2
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	282	312	299
Висота рослини, см	125,4	120,2	120,5
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	4,9	5,2	4,9
Вміст білка, %	21	18,3	17,2
Вміст олії, %	45,8	47	47,8
Вміст ерукової кислоти, %	0	0	0
Вміст глюкозинолатів, %	0,8	0,9	0,7
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість до обсіпання, бал	8	8	8
Стійкість до посухи, бал	8	8	8
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	6	7
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал	8	9	8
Стійкість проти квіткоїду ріпакового, бал	7	8	6
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	9	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	9	7
Блок	1	1	1
Напрямок використання	олн	олн	олн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus* L. *oleifera*

Заявка № 18040024 Назва сорту: ІНВ1266 КЛ Заявник (код): 2602 Власник сорту (код): 2602

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 13.11.2020 Патент № 200716

Дата пріоритету: 03.05.2018

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.10.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200836

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядолі: за довжиною	середні	5	
3	Сім'ядолі: за шириною	середні	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня	5	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середня	5	
11	Рослина: час початку цвітіння	ранній	3	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	довгі	7	
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7	
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	довга	7	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5	
19	Стручок: носик за довжиною	довгий	7	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	середня	5	
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	слабка	3	
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	с	л	п
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2	3,36	2,47
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,46	2,98	2,74
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,46	-0,39	0,27
+, - до усередненої урожайності, %	22,7	-11,2	10,9
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	281	286	305
Висота рослини, см	120,2	116,6	114,9
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	4,6	5,6	4,9
Вміст білка, %	20,7	20,3	19,1
Вміст олії, %	46,4	45,7	46,4
Вміст ерукової кислоти, %	0	0,1	0
Вміст глюкозинолатів, %	0,7	0,7	0,5
Стійкість до вилягання, бал	8	9	9
Стійкість до обсіпання, бал	8	8	8
Стійкість до посухи, бал	8	9	8
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	6	8
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал	8	9	7
Стійкість проти квіткоїду ріпакового, бал	7	8	6
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	9	7
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	8	7
Блок	1	1	1
Напрямок використання	олн	олн	олн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СП.

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus* L. *oleifera*

Заявка № 17040016 Назва сорту: ІНВУЕЛО **Заявник (код):** 2602 **Власник сорту (код):** 2602

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 17.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201225

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядолі: за довжиною	середні	5	
3	Сім'ядолі: за шириною	середні	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	велика	7	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	вузький	3	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середня	5	
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5	
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7	
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	дуже довга	9	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5	
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	середня	5	
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	слабка	3	
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,97	3,32	2,47
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,46	3,61	2,78
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,49	0,29	0,31
+, - до усередненої урожайності, %	24,9	8,7	12,6
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	281	313	299
Висота рослини, см	134,1	117,3	125,6
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	5	5,4	5
Вміст білка, %	20,5	17,8	16,7
Вміст олії, %	45,3	46,5	48,1
Вміст ерукової кислоти, %	0	0	0
Вміст глюкостінолатів, %	0,8	0,6	0,6
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість до обсіпання, бал	8	7	7
Стійкість до посухи, бал	8	8	8
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	7	7
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал	8	9	7
Стійкість проти квіткоїду ріпакового, бал	7	7	6
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	9	7
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	9	7
Блок	1	1	1
Напрямок використання	олн	олн	олн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus* L. *oleifera***Заявка №** 18040021 **Назва сорту:** KBITO **Заявник (код):** 2602 **Власник сорту (код):** 2602**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 13.11.2020 **Патент №** 200715**Дата пріоритету:** 03.05.2018**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 27.10.2020**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 200835**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядолі: за довжиною	середні	5	
3	Сім'ядолі: за шириною	середні	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня	5	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середня	5	
11	Рослина: час початку цвітіння	пізній	7	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	короткі	3	
14	Квітка: пелюстки за шириною	вузькі	3	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5	
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	середня	5	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5	
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	коротка	3	
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	помірна	5	
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2	3,36	2,47
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,14	2,76	2,17
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,14	-0,62	-0,29
+, - до усередненої урожайності, %	6,9	-18	-11,9
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	281	286	305
Висота рослини, см	124,5	114,2	106,1
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	4,8	5,6	4,7
Вміст білка, %	21	20,9	19,3
Вміст олії, %	45,1	44	45,1
Вміст ерукової кислоти, %	0	0	0
Вміст глюкозинолатів, %	0,7	0,7	0,6
Стійкість до вилягання, бал	8	9	9
Стійкість до обсіпання, бал	8	8	8
Стійкість до посухи, бал	8	9	8
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	7	8
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал	7	9	8
Стійкість проти квіткоїду ріпакового, бал	7	8	6
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	9	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	8	7
Блок	1	1	1
Напрямок використання	олн	олн	олн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus* L. *oleifera*

Заявка № 18040039 Назва сорту: Людгер Заявник (код): 807 Власник сорту (код): 807

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 02.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200985

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядолі: за довжиною	короткі	3	
3	Сім'ядолі: за шириною	вузькі	3	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня	5	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середня	5	
11	Рослина: час початку цвітіння	ранній	3	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	довгі	7	
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7	
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	довга	7	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5	
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	середня	5	
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	сильна	7	
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2	3,36	2,47
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,19	3,06	2,48
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,18	-0,31	0,01
+, - до усередненої урожайності, %	9,1	-8,8	0,4
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	282	284	305
Висота рослини, см	119,2	110,6	115,3
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	4,1	5,1	4,6
Вміст білка, %	20	18,2	18,1
Вміст олії, %	46,5	47,3	47
Вміст ерукової кислоти, %	0	0	0,1
Вміст глюкостінолатів, %	0,6	0,8	0,6
Стійкість до вилягання, бал	8	9	9
Стійкість до обсіпання, бал	8	8	6
Стійкість до посухи, бал	8	9	8
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	7	8
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал	8	9	7
Стійкість проти квіткоїду ріпакового, бал	7	8	6
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	8	7
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	8	7
Блок	1	1	1
Напрямок використання	олн	олн	олн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СП.

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus* L. *oleifera*

Заявка № 18040006 Назва сорту: ПАРКУРС Заявник (код): 912 Власник сорту (код): 912

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 09.12.2020

Свідство про державну реєстрацію № 201106

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядолі: за довжиною	короткі	3	
3	Сім'ядолі: за шириною	вузькі	3	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	мала	3	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середня	5	
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5	
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5	
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	середня	5	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5	
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	середня	5	
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1	
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2	3,36	2,47
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,22	2,86	2,28
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,22	-0,51	-0,18
+, - до усередненої урожайності, %	10,6	-14,8	-7,4
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	281	286	307
Висота рослини, см	118,9	114,6	116,9
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	4,3	5,4	4,5
Вміст білка, %	20,2	19,1	17,9
Вміст олії, %	45,8	46,7	47
Вміст ерукової кислоти, %	0	0	0,1
Вміст глюкозинолатів, %	0,6	0,7	0,6
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість до обсіпання, бал	8	7	7
Стійкість до посухи, бал	7	8	8
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	6	7
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал	8	9	8
Стійкість проти квіткоїду ріпакового, бал	7	8	6
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	9	7
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	8	7
Блок	1	1	1
Напрямок використання	олн	олн	олн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus* L. *oleifera*

Заявка № 18040035 Назва сорту: ПХ131 Заявник (код): 9 Власник сорту (код): 9

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 16.10.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201109

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядолі: за довжиною	середні	5	
3	Сім'ядолі: за шириною	середні	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня	5	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	довгий	7	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	широкий	7	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	довга	7	
11	Рослина: час початку цвітіння	ранній	3	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5	
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7	
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	довга	7	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5	
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	середня	5	
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1	
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2	3,36	2,47
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,11	2,78	2,09
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,1	-0,59	-0,37
+, - до усередненої урожайності, %	4,8	-17,5	-15,2
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	281	286	308
Висота рослини, см	112,8	107,6	112,1
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	4,5	5,4	5,2
Вміст білка, %	21,1	19,6	19,1
Вміст олії, %	46,1	47	46,6
Вміст ерукової кислоти, %	0	0	0
Вміст глюкостінолатів, %	0,6	0,7	0,7
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість до обсіпання, бал	7	8	8
Стійкість до посухи, бал	7	8	8
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	7	7
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал	8	9	7
Стійкість проти квіткоїду ріпакового, бал	7	8	6
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	9	7
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	8	7
Блок	1	1	1
Напрямок використання	олн	олн	олн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus* L. *oleifera***Заявка № 18040029 Назва сорту:** СИ ІОБА **Заявник (код):** 1959 **Власник сорту (код):** 1959**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 27.10.2020**Свідцтво про державну реєстрацію № 201224****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядолі: за довжиною	короткі	3	
3	Сім'ядолі: за шириною	вузькі	3	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	мала	3	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	довгий	7	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середня	5	
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	короткі	3	
14	Квітка: пелюстки за шириною	вузькі	3	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5	
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	середня	5	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	короткий	3	
19	Стручок: носик за довжиною	короткий	3	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	коротка	3	
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	сильна	7	
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2	3,36	2,47
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,42	2,91	2,63
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,41	-0,46	0,17
+, - до усередненої урожайності, %	20,5	-13,2	6,8
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	282	285	305
Висота рослини, см	121,1	111,2	117,3
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	4,6	6,1	5,2
Вміст білка, %	20,9	20,7	19,3
Вміст олії, %	45,5	45,2	46
Вміст ерукової кислоти, %	0	0	0
Вміст глюкозинолатів, %	0,7	0,8	0,6
Стійкість до вилягання, бал	8	9	9
Стійкість до обсіпання, бал	8	8	7
Стійкість до посухи, бал	8	9	8
Зимостійкість: польова оцінка, бал	7	7	7
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал	8	9	7
Стійкість проти квіткоїду ріпакового, бал	7	8	6
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	9	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	8	7
Блок	1	1	1
Напрямок використання	олн	олн	олн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СП.

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus* L. *oleifera*

Заявка № 18040028 **Назва сорту:** СИ ФЛОРІАН **Заявник (код):** 1959 **Власник сорту (код):** 1959

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.10.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201223

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядолі: за довжиною	середні	5	
3	Сім'ядолі: за шириною	середні	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня	5	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	короткий	3	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	вузький	3	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середня	5	
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5	
14	Квітка: пелюстки за шириною	вузькі	3	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7	
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	коротка	3	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5	
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	коротка	3	
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	помірна	5	
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2	3,36	2,47
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,48	3,13	2,62
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,48	-0,25	0,16
+, - до усередненої урожайності, %	23,8	-6,9	6,4
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	280	286	306
Висота рослини, см	120	114,8	108,9
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	4,3	5,1	4,8
Вміст білка, %	20,4	19,8	18,8
Вміст олії, %	46,1	46	46,5
Вміст ерукової кислоти, %	0	0	0,1
Вміст глюкостінолатів, %	0,6	0,7	0,7
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість до обсіпання, бал	8	7	7
Стійкість до посухи, бал	8	9	8
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	7	7
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал	8	9	7
Стійкість проти квіткоїду ріпакового, бал	7	8	6
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	8	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	8	7
Блок	1	1	1
Напрямок використання	олн	олн	олн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СП.

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus L. oleifera***Заявка № 18040046 Назва сорту:** Сімплекс КЛ **Заявник (код):** 807 **Власник сорту (код):** 807**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 02.12.2020**Свідчення про державну реєстрацію № 200990****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядолі: за довжиною	короткі	3	
3	Сім'ядолі: за шириною	вузькі	3	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	мала	3	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	широкий	7	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середня	5	
11	Рослина: час початку цвітіння	пізній	7	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5	
14	Квітка: пелюстки за шириною	вузькі	3	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	низька	3	
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	середня	5	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	довгий	7	
19	Стручок: носик за довжиною	довгий	7	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	середня	5	
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	слабка	3	
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2	3,36	2,47
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,17	2,81	2,49
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,17	-0,56	0,02
+, - до усередненої урожайності, %	8	-16,4	1
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	282	286	304
Висота рослини, см	122,5	117	114,7
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	4,5	5,3	4,5
Вміст білка, %	21,2	21	18,7
Вміст олії, %	45,1	44,5	46
Вміст ерукової кислоти, %	0	0	0
Вміст глюкозинолатів, %	0,6	0,5	0,6
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість до обсіпання, бал	7	8	7
Стійкість до посухи, бал	7	8	8
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	7	8
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал	8	9	8
Стійкість проти квіткоїду ріпакового, бал	7	8	7
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	9	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	8	7
Блок	1	1	1
Напрямок використання	олн	олн	олн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СП.

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus* L. *oleifera*

Заявка № 18040026 Назва сорту: ТАЛЕЛ КЛ Заявник (код): 2602 Власник сорту (код): 2602

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 13.11.2020 Патент № 200717

Дата пріоритету: 03.05.2018

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.10.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200837

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядолі: за довжиною	середні	5	
3	Сім'ядолі: за шириною	вузькі	3	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня	5	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	довгий	7	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	довга	7	
11	Рослина: час початку цвітіння	пізні	7	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	довгі	7	
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	низька	3	
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	середня	5	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5	
19	Стручок: носик за довжиною	довгий	7	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	середня	5	
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1	
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2	3,36	2,47
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,42	2,93	2,61
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,41	-0,44	0,15
+, - до усередненої урожайності, %	20,2	-12,7	6
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	281	287	306
Висота рослини, см	118,3	115	113
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	4,9	5,6	4,9
Вміст білка, %	20,6	20	19,2
Вміст олії, %	45,8	45,7	45,9
Вміст ерукової кислоти, %	0	0	0
Вміст глюкозинолатів, %	0,7	0,8	0,6
Стійкість до вилягання, бал	8	9	9
Стійкість до обсіпання, бал	8	8	7
Стійкість до посухи, бал	8	9	8
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	7	7
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал	8	9	8
Стійкість проти квіткоїду ріпакового, бал	7	8	7
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	9	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	9	7
Блок	1	1	1
Напрямок використання	олн	олн	олн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СП.

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus* L. *oleifera***Заявка №** 18040011 **Назва сорту:** ТЕМПО **Заявник (код):** 912 **Власник сорту (код):** 912**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 09.12.2020**Свідчення про державну реєстрацію №** 201108**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядолі: за довжиною	короткі	3	
3	Сім'ядолі: за шириною	вузькі	3	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня	5	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середня	5	
11	Рослина: час початку цвітіння	ранній	3	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	довгі	7	
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7	
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	довга	7	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5	
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	середня	5	
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	помірна	5	
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2	3,36	2,47
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,25	3,02	2,6
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,24	-0,35	0,14
+, - до усередненої урожайності, %	11,8	-10,3	5,6
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	281	285	306
Висота рослини, см	124,1	123,2	119,3
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	4,5	5,9	5,2
Вміст білка, %	20,9	20,6	20,1
Вміст олії, %	45,4	45,2	45,6
Вміст ерукової кислоти, %	0	0	0
Вміст глюкозинолатів, %	0,6	0,6	0,6
Стійкість до вилягання, бал	8	9	9
Стійкість до обсіпання, бал	8	7	7
Стійкість до посухи, бал	8	8	8
Зимостійкість: польова оцінка, бал	7	7	8
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал	8	9	7
Стійкість проти квіткоїду ріпакового, бал	7	8	6
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	9	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	9	7
Блок	1	1	1
Напрямок використання	олн	олн	олн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СП.

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus* L. *oleifera*

Заявка № 18040040 **Назва сорту:** Шопен **Заявник (код):** 807 **Власник сорту (код):** 807

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 02.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200986

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядолі: за довжиною	короткі	3	
3	Сім'ядолі: за шириною	вузькі	3	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	мала	3	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середня	5	
11	Рослина: час початку цвітіння	пізній	7	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5	
14	Квітка: пелюстки за шириною	вузькі	3	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7	
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	коротка	3	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5	
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	середня	5	
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	слабка	3	
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2	3,36	2,47
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,1	2,9	2,75
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,1	-0,47	0,28
+, - до усередненої урожайності, %	4,6	-13,9	11,5
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	280	285	306
Висота рослини, см	123,7	115,4	119,4
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	4,3	5,1	4,9
Вміст білка, %	20,4	20,1	18,9
Вміст олії, %	45,9	46,2	46,7
Вміст ерукової кислоти, %	0	0	0
Вміст глюкостінолатів, %	0,6	0,6	0,6
Стійкість до вилягання, бал	8	9	9
Стійкість до обсіпання, бал	7	8	7
Стійкість до посухи, бал	8	8	8
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	7	8
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал	8	9	8
Стійкість проти квіткоїду ріпакового, бал	7	8	6
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	9	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	8	7
Блок	1	1	1
Напрямок використання	олн	олн	олн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СП.

Вид: Ріпак (озимий) – батьківський компонент *Brassica napus* L. *oleifera*

Заявка № 18940004 Назва сорту: ЕСР1064 **Заявник (код):** 806 **Власник сорту (код):** 806

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.10.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200841

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядоля: за довжиною	коротка	3	
3	Сім'ядоля: за шириною	вузька	3	
4	Листок: інтенсивність зеленого кольору	помірний	5	
5	Листок: наявність часток	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня кількість	5	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	короткий	3	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	вузький	3	
10	Сорти тільки з часточковими листками. Листок: довжина черешка	короткий	3	
11	Рослина: час цвітіння	середній	5	
12	Квітка: колір пелюсток	жовтий	3	
13	Квітка: довжина пелюсток	короткі	3	
14	Квітка: ширина пелюсток	середні	5	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5	
17	Рослина: загальна довжина (бічні пагони включно)	коротка	3	
18	Стручок: за довжиною (між ніжкою і зубцем)	короткий	3	
19	Стручок: довжина зубця	короткий	3	
20	Стручок: довжина ніжки	коротка	3	
21	Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби	слабка	3	
22	Тенденція формування суцвіття в рік пізньолітньої сівби	ознака не визначається	0	

Вид: Ріпак (озимий) – батьківський компонент *Brassica napus L. oleifera*

Заявка № 18940005 Назва сорту: ЕСФ2014ЦМС **Заявник (код):** 806 **Власник сорту (код):** 806

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.10.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200842

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядоля: за довжиною	середня	5	
3	Сім'ядоля: за шириною	середня	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого кольору	помірний	5	
5	Листок: наявність часток	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня кількість	5	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	короткий	3	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5	
10	Сорти тільки з часточковими листками. Листок: довжина черешка	короткий	3	
11	Рослина: час цвітіння	середній	5	
12	Квітка: колір пелюсток	жовтий	3	
13	Квітка: довжина пелюсток	середні	5	
14	Квітка: ширина пелюсток	вузькі	3	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5	
17	Рослина: загальна довжина (бічні пагони включно)	середня	5	
18	Стручок: за довжиною (між ніжкою і зубцем)	короткий	3	
19	Стручок: довжина зубця	короткий	3	
20	Стручок: довжина ніжки	середня	5	
21	Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби	слабка	3	
22	Тенденція формування суцвіття в рік пізньолітньої сівби	ознака не визначається	0	

Вид: Ріпак (ярий) *Brassica napus* L. *oleifera*

Заявка № 15041011 Назва сорту: ІНВ110 КЛ Заявник (код): 2602 Власник сорту (код): 2602

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 30.11.2020

Свідчення про державну реєстрацію № 200934

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядоля: за довжиною	коротка	3	
3	Сім'ядоля: за шириною	вузька	3	
4	Листок: інтенсивність зеленого кольору	світлий	3	
5	Листок: наявність часток	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	мало	3	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	короткий	3	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	вузький	3	
10	Сорти тільки з часточковими листками. Листок: довжина черешка	короткий	3	
11	Рослина: час цвітіння	ранній	3	
12	Квітка: колір пелюсток	жовтий	3	
13	Квітка: довжина пелюсток	короткі	3	
14	Квітка: ширина пелюсток	вузькі	3	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5	
17	Рослина: загальна довжина (бічні пагони включно)	середня	5	
18	Стручок: за довжиною (між ніжкою і зубцем)	середній	5	
19	Стручок: довжина зубця	короткий	3	
20	Стручок: довжина ніжки	середня	5	
21	Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби	ознака не визначається	0	
22	Тенденція формування суцвіття в рік пізньолітньої сівби	відсутня або дуже слабка	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		2,03	1,64
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га		1,94	1,58
+, - до усередненої урожайності, т/га		-0,09	-0,06
+, - до усередненої урожайності, %		-4,4	-3,7
Довірчий інтервал, т/га		0,1	0,07
Тривалість періоду вегетації, діб		107	105
Висота рослини, см		108,2	111,2
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г		3,7	4,1
Вміст білка, %		26,9	25,9
Вміст олії, %		41	42,2
Вміст ерукової кислоти, %		0	0
Вміст глюкозинолатів, %		0,6	0,6
Стійкість до вилягання, бал		9	6
Стійкість до обсіпання, бал		7	6
Стійкість до посухи, бал		7	7
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал		9	8
Стійкість проти квіткоїду ріпакового, бал		7	7
Стійкість проти бактеріозу, бал		9	7
Стійкість проти пероноспорозу, бал		8	7
Блок		1	1
Напрямок використання		олн	олн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Ріпак (ярий) *Brassica napus* L. *oleifera*

Заявка № 18041004 Назва сорту: Караміно КЛ Заявник (код): 912 Власник сорту (код): 912

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201229

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядоля: за довжиною	середня	5	
3	Сім'ядоля: за шириною	вузька	3	
4	Листок: інтенсивність зеленого кольору	помірний	5	
5	Листок: наявність часток	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня кількість	5	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	довгий	7	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	широкий	7	
10	Сорти тільки з часточковими листками. Листок: довжина черешка	довгий	7	
11	Рослина: час цвітіння	середній	5	
12	Квітка: колір пелюсток	жовтий	3	
13	Квітка: довжина пелюсток	довгі	7	
14	Квітка: ширина пелюсток	широкі	7	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7	
17	Рослина: загальна довжина (бічні пагони включно)	довга	7	
18	Стручок: за довжиною (між ніжкою і зубцем)	довгий	7	
19	Стручок: довжина зубця	середній	5	
20	Стручок: довжина ніжки	довга	7	
21	Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби	ознака не визначається	0	
22	Тенденція формування суцвіття в рік пізньолітньої сівби	відсутня або дуже слабка	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		2,03	1,64
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га		2,01	1,78
+, - до усередненої урожайності, т/га		-0,02	0,14
+, - до усередненої урожайності, %		-0,8	8,6
Довірчий інтервал, т/га		0,1	0,07
Тривалість періоду вегетації, діб		113	102
Висота рослини, см		102	116,5
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г		4,6	4,2
Вміст білка, %		23,8	23,8
Вміст олії, %		43,9	44,7
Вміст ерукової кислоти, %		0	0
Вміст глюкозинолатів, %		0,7	0,6
Стійкість до вилягання, бал		8	6
Стійкість до обсіпання, бал		7	7
Стійкість до посухи, бал		7	8
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал		9	8
Стійкість проти квіткоїду ріпакового, бал		7	6
Стійкість проти бактеріозу, бал		8	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал		8	8
Блок		1	1
Напрямок використання		олн	олн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Ріпак (ярий) *Brassica napus* L. *oleifera***Заявка № 18041002 Назва сорту:** Клауд КЛ **Заявник (код):** 912 **Власник сорту (код):** 912**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 18.12.2020**Свідчення про державну реєстрацію № 201227****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядоля: за довжиною	середня	5	
3	Сім'ядоля: за шириною	середня	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого кольору	помірний	5	
5	Листок: наявність часток	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня кількість	5	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	довгий	7	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	широкий	7	
10	Сорти тільки з часточковими листками. Листок: довжина черешка	довгий	7	
11	Рослина: час цвітіння	ранній	3	
12	Квітка: колір пелюсток	жовтий	3	
13	Квітка: довжина пелюсток	довгі	7	
14	Квітка: ширина пелюсток	середні	5	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7	
17	Рослина: загальна довжина (бічні пагони включно)	довга	7	
18	Стручок: за довжиною (між ніжкою і зубцем)	середній	5	
19	Стручок: довжина зубця	середній	5	
20	Стручок: довжина ніжки	середня	5	
21	Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби	ознака не визначається	0	
22	Тенденція формування суцвіття в рік пізньолітньої сівби	відсутня або дуже слабка	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		2,03	1,64
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га		1,85	1,67
+, - до усередненої урожайності, т/га		-0,18	0,03
+, - до усередненої урожайності, %		-8,9	1,7
Довірчий інтервал, т/га		0,1	0,07
Тривалість періоду вегетації, діб		113	100
Висота рослини, см		105,5	114,2
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г		4,9	4,1
Вміст білка, %		24,4	24,6
Вміст олії, %		43,8	43,9
Вміст ерукової кислоти, %		0	0
Вміст глюкозинолатів, %		0,6	0,6
Стійкість до вилягання, бал		8	6
Стійкість до обсіпання, бал		7	7
Стійкість до посухи, бал		6	8
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал		9	8
Стійкість проти квіткоїду ріпакового, бал		7	6
Стійкість проти бактеріозу, бал		8	6
Стійкість проти пероноспорозу, бал		8	7
Блок		1	1
Напрямок використання		олн	олн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: П.

Вид: Ріпак (ярий) *Brassica napus* L. *oleifera*

Заявка № 18041003 Назва сорту: Колет КЛ Заявник (код): 912 Власник сорту (код): 912

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201228

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядоля: за довжиною	коротка	3	
3	Сім'ядоля: за шириною	вузька	3	
4	Листок: інтенсивність зеленого кольору	помірний	5	
5	Листок: наявність часток	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня кількість	5	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	довгий	7	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	широкий	7	
10	Сорти тільки з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середній	5	
11	Рослина: час цвітіння	середній	5	
12	Квітка: колір пелюсток	жовтий	3	
13	Квітка: довжина пелюсток	довгі	7	
14	Квітка: ширина пелюсток	широкі	7	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7	
17	Рослина: загальна довжина (бічні пагони включно)	довга	7	
18	Стручок: за довжиною (між ніжкою і зубцем)	довгий	7	
19	Стручок: довжина зубця	середній	5	
20	Стручок: довжина ніжки	довга	7	
21	Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби	ознака не визначається	0	
22	Тенденція формування суцвіття в рік пізньолітньої сівби	відсутня або дуже слабка	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		2,03	1,64
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га		1,85	1,81
+, - до усередненої урожайності, т/га		-0,18	0,17
+, - до усередненої урожайності, %		-9,1	10,6
Довірчий інтервал, т/га		0,1	0,07
Тривалість періоду вегетації, діб		112	101
Висота рослини, см		106,7	113,2
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г		4,4	4,4
Вміст білка, %		24	24,5
Вміст олії, %		44	44,3
Вміст ерукової кислоти, %		0	0
Вміст глюкозинолатів, %		0,7	0,6
Стійкість до вилягання, бал		8	6
Стійкість до обсіпання, бал		7	7
Стійкість до посухи, бал		7	8
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал		9	8
Стійкість проти квіткоїду ріпакового, бал		7	7
Стійкість проти бактеріозу, бал		8	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал		9	8
Блок		1	1
Напрямок використання		олн	олн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: П.

Вид: Ріпак (ярий) *Brassica napus* L. *oleifera***Заявка №** 17041009 **Назва сорту:** Перформер **Заявник (код):** 2602 **Власник сорту (код):** 2602**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 30.11.2020**Свідчення про державну реєстрацію №** 200935**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядоля: за довжиною	коротка	3	
3	Сім'ядоля: за шириною	вузька	3	
4	Листок: інтенсивність зеленого кольору	помірний	5	
5	Листок: наявність часток	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	мало	3	
7	Листок: зубчастість краю	слабка	3	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	короткий	3	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	вузький	3	
10	Сорти тільки з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середній	5	
11	Рослина: час цвітіння	ранній	3	
12	Квітка: колір пелюсток	жовтий	3	
13	Квітка: довжина пелюсток	короткі	3	
14	Квітка: ширина пелюсток	вузькі	3	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5	
17	Рослина: загальна довжина (бічні пагони включно)	середня	5	
18	Стручок: за довжиною (між ніжкою і зубцем)	середній	5	
19	Стручок: довжина зубця	короткий	3	
20	Стручок: довжина ніжки	коротка	3	
21	Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби	ознака не визначається	0	
22	Тенденція формування суцвіття в рік пізньолітньої сівби	слабка	3	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		2,03	1,64
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га		1,71	1,78
+, - до усередненої урожайності, т/га		-0,32	0,14
+, - до усередненої урожайності, %		-15,8	8,8
Довірчий інтервал, т/га		0,1	0,07
Тривалість періоду вегетації, діб		109	104
Висота рослини, см		107,7	118
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г		4	3,8
Вміст білка, %		26,3	25,8
Вміст олії, %		41,6	42,2
Вміст ерукової кислоти, %		0	0
Вміст глюкозинолатів, %		0,8	0,6
Стійкість до вилягання, бал		9	5
Стійкість до обсіпання, бал		7	7
Стійкість до посухи, бал		7	8
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал		9	7
Стійкість проти квіткоїду ріпакового, бал		7	7
Стійкість проти бактеріозу, бал		8	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал		9	6
Блок		1	1
Напрямок використання		олн	олн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: П.

Вид: Ріпак (ярий) *Brassica napus* L. *oleifera*

Заявка № 17041013 Назва сорту: Чеві КЛ Заявник (код): 912 Власник сорту (код): 912

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201226

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядоля: за довжиною	коротка	3	
3	Сім'ядоля: за шириною	вузька	3	
4	Листок: інтенсивність зеленого кольору	помірний	5	
5	Листок: наявність часток	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня кількість	5	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	короткий	3	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	вузький	3	
10	Сорти тільки з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середній	5	
11	Рослина: час цвітіння	ранній	3	
12	Квітка: колір пелюсток	жовтий	3	
13	Квітка: довжина пелюсток	короткі	3	
14	Квітка: ширина пелюсток	вузькі	3	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5	
17	Рослина: загальна довжина (бічні пагони включно)	середня	5	
18	Стручок: за довжиною (між ніжкою і зубцем)	середній	5	
19	Стручок: довжина зубця	короткий	3	
20	Стручок: довжина ніжки	середня	5	
21	Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби	ознака не визначається	0	
22	Тенденція формування суцвіття в рік пізньолітньої сівби	відсутня або дуже слабка	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		1,99	1,78
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га		1,93	1,84
+, - до усередненої урожайності, т/га		-0,06	0,07
+, - до усередненої урожайності, %		-3	3,8
Довірчий інтервал, т/га		0,1	0,08
Тривалість періоду вегетації, діб		103	101
Висота рослини, см		107,3	103,5
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г		4,3	3,9
Вміст білка, %		24,2	24,8
Вміст олії, %		43,3	43,4
Вміст ерукової кислоти, %		0	0
Вміст глюкозинолатів, %		0,6	0,5
Стійкість до вилягання, бал		8	8
Стійкість до обсіпання, бал		8	8
Стійкість до посухи, бал		8	7
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал		9	8
Стійкість проти квіткоїду ріпакового, бал		8	6
Стійкість проти бактеріозу, бал		9	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал		9	7
Блок		1	1
Напрямок використання		олн	олн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: П.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.**Заявка № 18039115 Назва сорту:** Алекса СУ **Заявник (код):** 2537 **Власник сорту (код):** 2537**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 17.12.2020**Свідцтво про державну реєстрацію №** 201236**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	широкояйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F., <i>Helianthi</i> Novot)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,12	2,53	
Довірчий інтервал, т/га	0,08	0,08	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,45	3,92	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,33	1,39	
+, - до усередненої урожайності, %	15,7	54,8	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	53,4	63,8	
Діаметр кошика, см	16,1	19,4	
Висота рослини, см	150,4	162,7	
Ступінь нахилу кошика, бал	7	7	
Тривалість періоду вегетації, днів	125	127	
Стійкість до вилягання, бал	9	9	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	7	8	
Стійкість проти вовчка, бал	8	8	
Стійкість проти іржі, бал	7	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти фомозу, бал	9	8	
Вміст олії, %	46,8	50	
Вміст білка, %	19,2	14,2	
Лушпинність, %	31,5	28,4	
Блок (Група стиглості)	4	4	
Напрямок використання	олн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.**Заявка №** 18039057 **Назва сорту:** АУСТІН **Заявник (код):** 1783 **Власник сорту (код):** 1783**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 18.12.2020**Свідцтво про державну реєстрацію №** 201232**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	сильне	7	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	широкоюйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	дуже довга	9	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькоюйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F., <i>Helianthi</i> Novot)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,08	2,38	
Довірчий інтервал, т/га	0,03	0,03	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,66	3,64	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,58	1,26	
+, - до усередненої урожайності, %	27,9	53,1	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	67,7	74,4	
Діаметр кошика, см	15,4	16,4	
Висота рослини, см	140,7	160,9	
Ступінь нахилу кошика, бал	7	8	
Тривалість періоду вегетації, днів	112	113	
Стійкість до вилягання, бал	7	9	
Стійкість до обсіпання, бал	8	9	
Стійкість до посухи, бал	7	8	
Стійкість проти вовчка, бал	9	8	
Стійкість проти іржі, бал	5	7	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	9	8	
Вміст олії, %	48,3	52	
Вміст білка, %	17,9	14,6	
Лушпинність, %	25,8	25,2	
Блок (Група стиглості)	2	2	
Напрямок використання	олн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.**Заявка № 18039106 Назва сорту:** Барон **Заявник (код):** 2267 **Власник сорту (код):** 2267**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 17.12.2020**Свідчення про державну реєстрацію № 201234****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	широкоотрикутна	5	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	широкояйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	хвилясте	3	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	коротка	3	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F., <i>Helianthi</i> Novot)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,16	2,61	
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,4	3,98	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,24	1,37	
+, - до усередненої урожайності, %	11,3	52,6	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	60,9	71,9	
Діаметр кошика, см	15,9	20,1	
Висота рослини, см	168,9	183,3	
Ступінь нахилу кошика, бал	7	8	
Тривалість періоду вегетації, днів	118	125	
Стійкість до вилягання, бал	8	8	
Стійкість до обсіпання, бал	9	8	
Стійкість до посухи, бал	6	8	
Стійкість проти вовчка, бал	5	8	
Стійкість проти іржі, бал	8	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	9	8	
Вміст олії, %	48,9	50,6	
Вміст білка, %	15,8	12,7	
Лушпинність, %	29	29,8	
Блок (Група стиглості)	3	3	
Напрямок використання	олн	олн	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.**Заявка № 18039007 Назва сорту:** Булерія **Заявник (код):** 2312 **Власник сорту (код):** 2312**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 17.12.2020**Свідцтво про державну реєстрацію № 201242****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	дрібні	3	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	загострена	8	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	коротка	3	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу з прямим стеблом	6	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпю	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F., <i>Helianthi</i> Novot)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,11	2,39	
Довірчий інтервал, т/га	0,04	0,05	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,11	3,19	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0	0,8	
+, - до усередненої урожайності, %	0	33,3	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	62	60,5	
Діаметр кошика, см	16,8	16,8	
Висота рослини, см	158	173,4	
Ступінь нахилу кошика, бал	7	7	
Тривалість періоду вегетації, днів	117	117	
Стійкість до вилягання, бал	9	9	
Стійкість до обсіпання, бал	9	8	
Стійкість до посухи, бал	8	9	
Стійкість проти вовчка, бал	9	9	
Стійкість проти іржі, бал	8	7	
Стійкість проти білої гнилі, бал	8	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти фомозу, бал	8	9	
Вміст олії, %	46,5	50,5	
Вміст білка, %	17	13,7	
Лушпинність, %	27,5	26,3	
Блок (Група стиглості)	ср	ср	
Напрямок використання	олійний		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.**Заявка № 18039033 Назва сорту:** ВАДОР **Заявник (код):** 924 **Власник сорту (код):** 924**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 15.12.2020**Свідцтво про державну реєстрацію №** 201116**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	сильно виражені	3	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	веретиноподібні	1	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	зігнуте за довжиною	2	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	сильна	7	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу з прямим стеблом	6	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкоюяцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F., <i>Helianthi</i> Novot)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,16	2,61	
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,57	4,03	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,41	1,42	
+, - до усередненої урожайності, %	18,9	54,4	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	65,8	74,6	
Діаметр кошика, см	15,3	18,9	
Висота рослини, см	164,9	175,9	
Ступінь нахилу кошика, бал	8	8	
Тривалість періоду вегетації, днів	120	125	
Стійкість до вилягання, бал	7	9	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	8	8	
Стійкість проти вовчка, бал	6	8	
Стійкість проти іржі, бал	8	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти фомозу, бал	9	9	
Вміст олії, %	46,3	45,8	
Вміст білка, %	18,4	15,4	
Лушпинність, %	30,3	32,6	
Блок (Група стиглості)	3	3	
Напрямок використання	олн	олн	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.**Заявка № 18039023 Назва сорту:** Гранд Адмірал **Заявник (код):** 2467 2468 **Власник сорту (код):** 2467 2468**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 23.12.2020**Свідоцтво про державну реєстрацію № 201803****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко випукла	4	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	широкояйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	дуже охоплює	3	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F., <i>Helianthi</i> Novot)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,11	2,39	
Довірчий інтервал, т/га	0,04	0,05	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,4	3,08	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,29	0,69	
+, - до усередненої урожайності, %	13,6	28,8	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	68,8	65,2	
Діаметр кошика, см	16,6	16,4	
Висота рослини, см	158,7	177,6	
Ступінь нахилу кошика, бал	7	8	
Тривалість періоду вегетації, днів	117	118	
Стійкість до вилягання, бал	9	9	
Стійкість до обсіпання, бал	8	9	
Стійкість до посухи, бал	8	9	
Стійкість проти вовчка, бал	7	9	
Стійкість проти іржі, бал	8	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	8	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти фомозу, бал	8	9	
Вміст олії, %	45,3	49,6	
Вміст білка, %	16,7	14,2	
Лушпинність, %	28,6	27,2	
Блок (Група стиглості)	ср	ср	
Напрямок використання	олійний		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.**Заявка № 18039132 Назва сорту:** Гуара **Заявник (код):** 2267 **Власник сорту (код):** 2267**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 17.12.2020**Свідцтво про державну реєстрацію № 201238****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3	
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	сильне	7	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	зігнуте за довжиною	2	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	дуже охоплює	3	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F., <i>Helianthi</i> Novot)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,12	2,53	
Довірчий інтервал, т/га	0,08	0,08	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,35	3,76	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,23	1,23	
+, - до усередненої урожайності, %	10,9	48,6	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	56,9	57,7	
Діаметр кошика, см	16,1	18,1	
Висота рослини, см	169,9	170,8	
Ступінь нахилу кошика, бал	7	8	
Тривалість періоду вегетації, днів	125	127	
Стійкість до вилягання, бал	6	9	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	6	8	
Стійкість проти вовчка, бал	9	8	
Стійкість проти іржі, бал	7	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти фомозу, бал	9	9	
Вміст олії, %	47	48,6	
Вміст білка, %	18,6	14,3	
Лушпинність, %	28,1	28,4	
Блок (Група стиглості)	4	4	
Напрямок використання	олн	олн	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.**Заявка № 18039116 Назва сорту:** Даверо СУ **Заявник (код):** 2537 **Власник сорту (код):** 2537**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 17.12.2020**Свідцтво про державну реєстрацію № 201237****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від ланцетної до вузькотрикутної	2	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабо виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	веретиноподібні	1	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	зігнуте за довжиною	2	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	сильно виражені	3	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F., <i>Helianthi</i> Novot)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,12	2,53	
Довірчий інтервал, т/га	0,08	0,08	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,73	3,76	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,61	1,23	
+, - до усередненої урожайності, %	29	48,4	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	59,4	62,8	
Діаметр кошика, см	17,3	19,7	
Висота рослини, см	158,3	167,1	
Ступінь нахилу кошика, бал	7	8	
Тривалість періоду вегетації, днів	126	127	
Стійкість до вилягання, бал	7	9	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	7	8	
Стійкість проти вовчка, бал	8	7	
Стійкість проти іржі, бал	6	7	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	7	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	9	9	
Вміст олії, %	45,4	48,1	
Вміст білка, %	19,3	14,7	
Лушпинність, %	30,2	32	
Блок (Група стиглості)	4	4	
Напрямок використання	олн	олн	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.**Заявка №** 18039037 **Назва сорту:** ДЖУЛІУС **Заявник (код):** 924 **Власник сорту (код):** 924**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 15.12.2020**Свідчення про державну реєстрацію №** 201118**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	великі	7	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	широкоотрикутна	5	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу з прямим стеблом	6	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F., <i>Helianthi</i> Novot)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,08	2,38	
Довірчий інтервал, т/га	0,03	0,03	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,66	3,29	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,58	0,91	
+, - до усередненої урожайності, %	27,7	38,3	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	55,6	54,9	
Діаметр кошика, см	15,9	16	
Висота рослини, см	151,2	162,9	
Ступінь нахилу кошика, бал	6	8	
Тривалість періоду вегетації, днів	113	115	
Стійкість до вилягання, бал	8	9	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	7	8	
Стійкість проти вовчка, бал	8	7	
Стійкість проти іржі, бал	4	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	8	8	
Вміст олії, %	45,9	47,9	
Вміст білка, %	18,7	15,9	
Лушпинність, %	30,3	30,5	
Блок (Група стиглості)	2	2	
Напрямок використання	олн	олн	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.**Заявка №** 17039060 **Назва сорту:** ЄС Бонум **Заявник (код):** 2287 **Власник сорту (код):** 2287**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 01.12.2020**Свідцтво про державну реєстрацію №** 200991**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	помірна	5	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу з сильно зігнутим стеблом	8	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F., <i>Helianthi</i> Novot)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,16	2,61	
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,7	4,4	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,54	1,79	
+, - до усередненої урожайності, %	25,2	68,6	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	56,7	63,5	
Діаметр кошика, см	15,1	17,1	
Висота рослини, см	163,6	175,5	
Ступінь нахилу кошика, бал	7	8	
Тривалість періоду вегетації, днів	119	121	
Стійкість до вилягання, бал	8	8	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	6	8	
Стійкість проти вовчка, бал	9	8	
Стійкість проти іржі, бал	7	7	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти фомозу, бал	9	9	
Вміст олії, %	45,3	48,3	
Вміст білка, %	18	16,6	
Лушпинність, %	30,4	29,3	
Блок (Група стиглості)	3	3	
Напрямок використання	олн	олн	
Вміст олеїнової кислоти (для ВОЛ), %	16,3	12,2	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.**Заявка №** 17039063 **Назва сорту:** ЄС Ортус **Заявник (код):** 2287 **Власник сорту (код):** 2287**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 01.12.2020**Свідцтво про державну реєстрацію №** 200994**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко випукла	4	
8	Листок: форма верхівки	широкоотрикутна	5	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	тупий	3	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	дуже охоплює	3	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу з сильно зігнутим стеблом	8	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F., <i>Helianthi</i> Novot)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,16	2,61	
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,85	4,39	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,69	1,78	
+, - до усередненої урожайності, %	31,8	68	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	55,3	58,3	
Діаметр кошика, см	16	17,9	
Висота рослини, см	177,1	184,7	
Ступінь нахилу кошика, бал	7	8	
Тривалість періоду вегетації, днів	120	122	
Стійкість до вилягання, бал	9	9	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	7	8	
Стійкість проти вовчка, бал	7	9	
Стійкість проти іржі, бал	5	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	9	9	
Вміст олії, %	48,3	50	
Вміст білка, %	17,3	15,7	
Лушпинність, %	28,7	24,2	
Блок (Група стиглості)	3	3	
Напрямок використання	олн	олн	
Вміст олеїнової кислоти (для ВОЛ), %	13,9	15,2	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.**Заявка №** 17039062 **Назва сорту:** ЄС Прімум **Заявник (код):** 2287 **Власник сорту (код):** 2287**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 01.12.2020**Свідчення про державну реєстрацію №** 200993**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу з сильно зігнутим стеблом	8	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F., <i>Helianthi</i> Novot)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,08	2,38	
Довірчий інтервал, т/га	0,03	0,03	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,09	4,17	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,01	1,79	
+, - до усередненої урожайності, %	0,6	75,2	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	53,4	64,8	
Діаметр кошика, см	16,4	18,5	
Висота рослини, см	176,5	197,1	
Ступінь нахилу кошика, бал	7	7	
Тривалість періоду вегетації, днів	113	115	
Стійкість до вилягання, бал	8	8	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	5	8	
Стійкість проти вовчка, бал	6	9	
Стійкість проти іржі, бал	6	9	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	9	9	
Вміст олії, %	45,4	46,6	
Вміст білка, %	17,4	16,7	
Лушпинність, %	33,5	27,1	
Блок (Група стиглості)	2	2	
Напрямок використання	олн	олн	
Вміст олеїнової кислоти (для ВОЛ), %	12,9	13,1	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.**Заявка №** 17039064 **Назва сорту:** ЄС Фортем **Заявник (код):** 2287 **Власник сорту (код):** 2287**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 01.12.2020**Свідцтво про державну реєстрацію №** 200995**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середній	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	коротка	3	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу з сильно зігнутим стеблом	8	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкоюйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F., <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,08	2,38	
Довірчий інтервал, т/га	0,03	0,03	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,62	4,08	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,54	1,7	
+, - до усередненої урожайності, %	25,8	71,4	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	57,5	61	
Діаметр кошика, см	16,9	18,2	
Висота рослини, см	184,1	202,8	
Ступінь нахилу кошика, бал	7	8	
Тривалість періоду вегетації, днів	113	115	
Стійкість до вилягання, бал	8	8	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	7	8	
Стійкість проти вовчка, бал	7	9	
Стійкість проти іржі, бал	5	7	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти фомозу, бал	9	9	
Вміст олії, %	45,7	47,5	
Вміст білка, %	16,9	16,5	
Лушпинність, %	30,4	29,2	
Блок (Група стиглості)	2	2	
Напрямок використання	олн	олн	
Вміст олеїнової кислоти (для ВОЛ), %	13,7	13,5	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.**Заявка № 17039061 Назва сорту:** ЄС Харді **Заявник (код):** 2287 **Власник сорту (код):** 2287**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 01.12.2020**Свідчення про державну реєстрацію № 200992****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	широкоотрикутна	5	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	помірна	5	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкоюйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабко виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F., <i>Helianthi</i> Novot)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,16	2,61	
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,72	4,17	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,56	1,56	
+, - до усередненої урожайності, %	25,9	59,8	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	53,8	60,3	
Діаметр кошика, см	15	18,5	
Висота рослини, см	174,4	181,2	
Ступінь нахилу кошика, бал	7	8	
Тривалість періоду вегетації, днів	119	121	
Стійкість до вилягання, бал	8	8	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	7	8	
Стійкість проти вовчка, бал	8	9	
Стійкість проти іржі, бал	5	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	9	9	
Вміст олії, %	46,3	48,4	
Вміст білка, %	17,3	16	
Лушпинність, %	29,6	28,8	
Блок (Група стиглості)	3	3	
Напрямок використання	олн	олн	
Вміст олеїнової кислоти (для ВОЛ), %	14,1	10,3	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.**Заявка № 19039015 Назва сорту:** ЗУР0 162 **Заявник (код):** 2537 **Власник сорту (код):** 2537**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 17.12.2020**Свідчення про державну реєстрацію № 201240****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	широкоотрикутна	5	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	ранній	3	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	щільно	7	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	дуже охоплює	3	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу з сильно зігнутим стеблом	8	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	сильно виражені	3	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F., <i>Helianthi</i> Novot)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,16	2,61	
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,57	3,66	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,41	1,05	
+, - до усередненої урожайності, %	19,2	40,1	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	60,7	62,4	
Діаметр кошика, см	15,3	18,8	
Висота рослини, см	163	166,9	
Ступінь нахилу кошика, бал	7	9	
Тривалість періоду вегетації, днів	120	125	
Стійкість до вилягання, бал	5	9	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	8	8	
Стійкість проти вовчка, бал	9	8	
Стійкість проти іржі, бал	8	7	
Стійкість проти білої гнилі, бал	8	8	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти фомозу, бал	9	9	
Вміст олії, %	47,3	49,8	
Вміст білка, %	16,9	13,7	
Лушпинність, %	27,4	31,6	
Блок (Група стиглості)	3	3	
Напрямок використання	олн	олн	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.**Заявка № 16039079 Назва сорту:** Каледонія КЛ **Заявник (код):** 485 **Власник сорту (код):** 485**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 15.12.2020**Свідчення про державну реєстрацію № 201110****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	дрібні	3	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3	
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	зігнуте за довжиною	2	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу з сильно зігнутим стеблом	8	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабко виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F., <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, ц/га	22,5	24,1	-
Довірчий інтервал (ц/га), ±	1,9	2,4	-
Урожайність, ц/га	20,8	25,9	-
± до усередненої урожайності сортів за 5 попередніх років, ц/га	-1,7	1,8	-
± до усередненої урожайності сортів за 5 попередніх років, %	-7,6	7,5	-
Тривалість періоду вегетації, діб	120	115	-
Маса 1000 сім'янок, г	56,0	56,8	-
Висота рослин, см	149	172	-
Стійкість до вилягання, бал	8	9	-
Стійкість проти білої гнилі, бал	8	9	-
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	8	-
Стійкість до вовчка, бал	8	9	-
Стійкість до іржі, бал	8	8	-
Стійкість до фомозу, бал	8	8	-
Вміст олії, %	47,0	47,6	-
Вміст білка, %	15,9	16,1	-
Лушпинність, %	30,3	26,6	-
Вміст олеїнової кислоти, %	85,7	81,9	-
Напрямок використання: високоолеїновий			
Блок: високоолеїновий (середньоранньостиглий)			

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.**Заявка № 19039014 Назва сорту:** Катрін **Заявник (код):** 2576 2676 **Власник сорту (код):** 2576 2676**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 17.12.2020**Свідцтво про державну реєстрацію № 201239****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3	
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	ранній	3	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	щільно	7	
16	Язичкові квітки: за формою	широкоюйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькоюйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	сіре	3	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабо виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F., <i>Helianthi</i> Novot)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,16	2,61	
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,3	3,71	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,14	1,1	
+, - до усередненої урожайності, %	6,6	42	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	54,8	59,4	
Діаметр кошика, см	15,7	17,8	
Висота рослини, см	159,8	174,5	
Ступінь нахилу кошика, бал	7	8	
Тривалість періоду вегетації, днів	119	121	
Стійкість до вилягання, бал	8	8	
Стійкість до обсіпання, бал	9	8	
Стійкість до посухи, бал	5	8	
Стійкість проти вовчка, бал	8	8	
Стійкість проти іржі, бал	4	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	8	9	
Вміст олії, %	46,1	48,5	
Вміст білка, %	17,6	15,6	
Лушпинність, %	32,9	28,2	
Блок (Група стиглості)	3	3	
Напрямок використання	олн	олн	
Вміст олеїнової кислоти (для ВОЛ), %	44,3	47	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.**Заявка № 18039052 Назва сорту:** КВС АМОРЕС КЛ **Заявник (код):** 2649 **Власник сорту (код):** 2649**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 15.12.2020**Свідчення про державну реєстрацію № 201122****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3	
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	веретиноподібні	1	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	зігнуте за довжиною	2	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	коротка	3	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу з сильно зігнутим стеблом	8	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F., <i>Helianthi</i> Novot)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,12	2,53	
Довірчий інтервал, т/га	0,08	0,08	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,42	4,19	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,3	1,66	
+, - до усередненої урожайності, %	14	65,5	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	54,5	62	
Діаметр кошика, см	16	19	
Висота рослини, см	180	180,9	
Ступінь нахилу кошика, бал	7	8	
Тривалість періоду вегетації, днів	124	126	
Стійкість до вилягання, бал	6	9	
Стійкість до обсіпання, бал	8	9	
Стійкість до посухи, бал	7	8	
Стійкість проти вовчка, бал	6	8	
Стійкість проти іржі, бал	6	7	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	9	8	
Вміст олії, %	43,5	46	
Вміст білка, %	18,3	14,7	
Лушпинність, %	33,8	29,6	
Блок (Група стиглості)	4	4	
Напрямок використання	олн	олн	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 18039093 Назва сорту: КВС АПАЧІ КЛ Заявник (код): 2649 Власник сорту (код): 2649

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.12.2020

Свідцтво про державну реєстрацію № 201124

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	загострена	8	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	сіре	3	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F., <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,12	2,53	
Довірчий інтервал, т/га	0,08	0,08	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,49	4,03	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,37	1,5	
+, - до усередненої урожайності, %	17,7	59,1	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	54,9	61,7	
Діаметр кошика, см	15,7	19,3	
Висота рослини, см	154,7	168,3	
Ступінь нахилу кошика, бал	7	8	
Тривалість періоду вегетації, днів	123	125	
Стійкість до вилягання, бал	5	9	
Стійкість до обсіпання, бал	8	9	
Стійкість до посухи, бал	7	8	
Стійкість проти вовчка, бал	6	8	
Стійкість проти іржі, бал	8	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	9	8	
Вміст олії, %	44,8	47,7	
Вміст білка, %	18,3	14	
Лушпинність, %	31,1	35	
Блок (Група стиглості)	4	4	
Напрямок використання	олн	олн	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.**Заявка №** 18039092 **Назва сорту:** КВС ПЕРСЕУС КЛ **Заявник (код):** 2649 **Власник сорту (код):** 2649**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 15.12.2020**Свідцтво про державну реєстрацію №** 201123**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F., <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,08	2,38	
Довірчий інтервал, т/га	0,03	0,03	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,32	3,7	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,24	1,32	
+, - до усередненої урожайності, %	11,8	55,5	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	52,7	54,2	
Діаметр кошика, см	17,2	16,2	
Висота рослини, см	134,7	150,9	
Ступінь нахилу кошика, бал	6	8	
Тривалість періоду вегетації, днів	112	113	
Стійкість до вилягання, бал	8	9	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	6	8	
Стійкість проти вовчка, бал	9	8	
Стійкість проти іржі, бал	6	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	9	8	
Вміст олії, %	45,9	49,4	
Вміст білка, %	19,1	14,7	
Лушпинність, %	27,5	29,7	
Блок (Група стиглості)	2	2	
Напрямок використання	олн	олн	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.**Заявка №** 18039050 **Назва сорту:** КВС ЦЕЗАРЕС КЛ **Заявник (код):** 2649 **Власник сорту (код):** 2649**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 30.11.2020**Свідчення про державну реєстрацію №** 200940**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F., <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,16	2,61	
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,74	3,74	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,58	1,13	
+, - до усередненої урожайності, %	26,7	43,1	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	51,5	53,5	
Діаметр кошика, см	15,3	18,8	
Висота рослини, см	156,8	173,3	
Ступінь нахилу кошика, бал	6	7	
Тривалість періоду вегетації, днів	119	124	
Стійкість до вилягання, бал	7	8	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	8	8	
Стійкість проти вовчка, бал	6	8	
Стійкість проти іржі, бал	8	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	9	8	
Вміст олії, %	47,7	51,4	
Вміст білка, %	16,9	13,5	
Лушпинність, %	25,4	26,8	
Блок (Група стиглості)	3	3	
Напрямок використання	олн	олн	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.**Заявка №** 17039068 **Назва сорту:** КДВ 2017 **Заявник (код):** 2265 **Власник сорту (код):** 2265**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 15.12.2020**Свідчення про державну реєстрацію №** 201111**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	широкоотрикутна	5	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюяцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкоюяцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F., <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,11	2,39	
Довірчий інтервал, т/га	0,04	0,05	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,51	3,39	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,4	1	
+, - до усередненої урожайності, %	19,1	41,7	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	57	59,3	
Діаметр кошика, см	15,7	16,2	
Висота рослини, см	168	178,2	
Ступінь нахилу кошика, бал	6	7	
Тривалість періоду вегетації, днів	120	117	
Стійкість до вилягання, бал	9	8	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	8	9	
Стійкість проти вовчка, бал	8	9	
Стійкість проти іржі, бал	8	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	8	8	
Стійкість проти фомозу, бал	8	9	
Вміст олії, %	46,3	48,7	
Вміст білка, %	17,7	14,9	
Лушпинність, %	25,9	25,1	
Блок (Група стиглості)	ср	ср	
Напрямок використання	олійний		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.**Заявка №** 18039036 **Назва сорту:** Кімера СТ **Заявник (код):** 924 **Власник сорту (код):** 924**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 15.12.2020**Свідцтво про державну реєстрацію №** 201117**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	сильне	7	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу з прямим стеблом	6	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F., <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,07	2,34	
Довірчий інтервал, т/га	0,09	0,09	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,47	3,48	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,4	1,14	
+, - до усередненої урожайності, %	19,6	48,6	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	58,2	67,9	
Діаметр кошика, см	14,9	16,7	
Висота рослини, см	148,5	162,3	
Ступінь нахилу кошика, бал	7	8	
Тривалість періоду вегетації, днів	104	111	
Стійкість до вилягання, бал	7	9	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	7	8	
Стійкість проти вовчка, бал	8	7	
Стійкість проти іржі, бал	3	7	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти фомозу, бал	8	9	
Вміст олії, %	44,9	47,2	
Вміст білка, %	17,3	15,5	
Лушпинність, %	31,1	31,3	
Блок (Група стиглості)	1	1	
Напрямок використання	олн	олн	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.**Заявка № 18039031 Назва сорту:** КОНКВЕСТ **Заявник (код):** 924 **Власник сорту (код):** 924**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 15.12.2020**Свідчення про державну реєстрацію № 201115****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	загострена	8	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	дуже охоплює	3	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	сильно виражені	3	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F., <i>Helianthi</i> Novot)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,07	2,34	
Довірчий інтервал, т/га	0,09	0,09	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,96	3,42	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,89	1,08	
+, - до усередненої урожайності, %	43	46,2	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	60,8	64,3	
Діаметр кошика, см	16,9	17,5	
Висота рослини, см	163	163,5	
Ступінь нахилу кошика, бал	5	7	
Тривалість періоду вегетації, днів	107	113	
Стійкість до вилягання, бал	9	9	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	7	8	
Стійкість проти вовчка, бал	7	8	
Стійкість проти іржі, бал	6	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти фомозу, бал	9	9	
Вміст олії, %	46,4	48,2	
Вміст білка, %	17,3	13,4	
Лушпинність, %	30,7	31	
Блок (Група стиглості)	1	1	
Напрямок використання	олн	олн	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 18039112 Назва сорту: Ласса Заявник (код): 2539 Власник сорту (код): 2539

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 17.12.2020

Свідцтво про державну реєстрацію № 201804

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	дрібні	3	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	щільно	7	
16	Язичкові квітки: за формою	широкоюйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	зігнуте за довжиною	2	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	сильна	7	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галушення (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галушення (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькоюйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobancha cumana</i>)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F., <i>Helianthi</i> Novot)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,08	2,38	
Довірчий інтервал, т/га	0,03	0,03	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,25	2,74	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,17	0,36	
+, - до усередненої урожайності, %	8,1	15,2	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	51,3	55,9	
Діаметр кошика, см	16,8	16,1	
Висота рослини, см	162,9	175,5	
Ступінь нахилу кошика, бал	6	8	
Тривалість періоду вегетації, днів	115	116	
Стійкість до вилягання, бал	7	8	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	6	8	
Стійкість проти вовчка, бал	6	7	
Стійкість проти іржі, бал	7	7	
Стійкість проти білої гнилі, бал	8	8	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	9	8	
Вміст олії, %	49	50,5	
Вміст білка, %	16,9	15,1	
Лушпинність, %	27,1	27,1	
Блок (Група стиглості)	2	2	
Напрямок використання	олн	олн	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.**Заявка № 18039059 Назва сорту:** ЛГ50455 КЛП **Заявник (код):** 793 **Власник сорту (код):** 793**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 30.11.2020**Свідчення про державну реєстрацію № 200945****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	сильне	7	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	широкояйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	коротка	3	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу з сильно зігнутим стеблом	8	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	великий	7	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F., <i>Helianthi</i> Novot)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,08	2,38	
Довірчий інтервал, т/га	0,03	0,03	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,64	3,78	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,56	1,4	
+, - до усередненої урожайності, %	26,8	58,9	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	59,9	66,1	
Діаметр кошика, см	15,4	17,4	
Висота рослини, см	158,6	176,2	
Ступінь нахилу кошика, бал	7	8	
Тривалість періоду вегетації, днів	112	114	
Стійкість до вилягання, бал	5	9	
Стійкість до обсіпання, бал	8	9	
Стійкість до посухи, бал	6	8	
Стійкість проти вовчка, бал	8	9	
Стійкість проти іржі, бал	5	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	9	9	
Вміст олії, %	48,1	49,9	
Вміст білка, %	17,4	15,3	
Лушпинність, %	27,2	29,7	
Блок (Група стиглості)	2	2	
Напрямок використання	олн	олн	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.**Заявка № 18039060 Назва сорту:** ЛГ50479 CX **Заявник (код):** 793 **Власник сорту (код):** 793**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 30.11.2020**Свідцтво про державну реєстрацію № 200942****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	сильне	7	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	ознака не визначалась	0	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	сильно виражені	3	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F., <i>Helianthi</i> Novot)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,16	2,61	
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,4	3,7	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,24	1,09	
+, - до усередненої урожайності, %	11,3	41,7	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	53,2	53,2	
Діаметр кошика, см	14,2	18,5	
Висота рослини, см	164	175,7	
Ступінь нахилу кошика, бал	6	7	
Тривалість періоду вегетації, днів	118	124	
Стійкість до вилягання, бал	9	8	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	8	8	
Стійкість проти вовчка, бал	7	9	
Стійкість проти іржі, бал	7	7	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	9	9	
Вміст олії, %	48	49,8	
Вміст білка, %	16,1	12,1	
Лушпинність, %	27,3	30,4	
Блок (Група стиглості)	3	3	
Напрямок використання	олн	олн	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.**Заявка №** 18039062 **Назва сорту:** ЛГ50529 CX **Заявник (код):** 793 **Власник сорту (код):** 793**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 30.11.2020**Свідцтво про державну реєстрацію №** 200943**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	широкоюйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	коротка	3	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	дуже охоплює	3	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькоюйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	сіре	3	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпю	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobancha cumana</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F., <i>Helianthi</i> Novot)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,16	2,61	
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,51	4	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,35	1,39	
+, - до усередненої урожайності, %	16	53,2	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	56,8	56,3	
Діаметр кошика, см	14,9	17,1	
Висота рослини, см	173,8	181,6	
Ступінь нахилу кошика, бал	7	7	
Тривалість періоду вегетації, днів	118	123	
Стійкість до вилягання, бал	9	7	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	7	8	
Стійкість проти вовчка, бал	7	8	
Стійкість проти іржі, бал	8	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	9	9	
Вміст олії, %	46,7	49,5	
Вміст білка, %	17,6	13,7	
Лушпинність, %	33,8	33	
Блок (Група стиглості)	3	3	
Напрямок використання	олн	олн	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.**Заявка № 18039061 Назва сорту:** ЛГ50586 КЛП **Заявник (код):** 793 **Власник сорту (код):** 793**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 30.11.2020**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200944****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	веретиноподібні	1	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	зігнуте за довжиною	2	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	дуже охоплює	3	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	великий	7	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F., <i>Helianthi</i> Novot)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,16	2,61	
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,77	4,46	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,61	1,85	
+, - до усередненої урожайності, %	28,5	70,8	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	63,1	69,6	
Діаметр кошика, см	15,6	17,9	
Висота рослини, см	180	190,8	
Ступінь нахилу кошика, бал	7	8	
Тривалість періоду вегетації, днів	119	122	
Стійкість до вилягання, бал	9	8	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	7	8	
Стійкість проти вовчка, бал	9	9	
Стійкість проти іржі, бал	8	7	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти фомозу, бал	9	9	
Вміст олії, %	46,7	47,8	
Вміст білка, %	17	14,1	
Лушпинність, %	29	31,4	
Блок (Група стиглості)	3	3	
Напрямок використання	олн	олн	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.**Заявка № 17039126 Назва сорту:** Марвін **Заявник (код):** 2291 **Власник сорту (код):** 2291**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 17.12.2020**Свідоцтво про державну реєстрацію № 201241****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	дрібні	3	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	загострена	8	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	дуже охоплює	3	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	сіре	3	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабо виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobancha cumana</i>)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F., <i>Helianthi</i> Novot)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,08	2,33	
Довірчий інтервал, т/га	0,02	0,03	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,38	2,88	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,3	0,55	
+, - до усередненої урожайності, %	14,4	23,5	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	54,7	58,4	
Діаметр кошика, см	16,9	16,3	
Висота рослини, см	148,1	169,4	
Ступінь нахилу кошика, бал	7	7	
Тривалість періоду вегетації, днів	114	110	
Стійкість до вилягання, бал	8	9	
Стійкість до обсіпання, бал	8	8	
Стійкість до посухи, бал	8	9	
Стійкість проти вовчка, бал	8	9	
Стійкість проти іржі, бал	7	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти фомозу, бал	8	9	
Вміст олії, %	45,3	50,2	
Вміст білка, %	14,4	15,1	
Лушпинність, %	27,6	22,7	
Блок (Група стиглості)	рс	рс	
Напрямок використання	олійний		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.**Заявка № 18039028 Назва сорту:** МАРИСАН **Заявник (код):** 924 **Власник сорту (код):** 924**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 02.12.2020**Свідцтво про державну реєстрацію № 200996****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	великі	7	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	щільно	7	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	дуже довга	9	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	дуже охоплює	3	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу з прямим стеблом	6	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	сильно виражені	3	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F., <i>Helianthi</i> Novot)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,16	2,61	
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,42	3,5	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,26	0,89	
+, - до усередненої урожайності, %	12,1	34	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	58,1	65,6	
Діаметр кошика, см	15,4	16,7	
Висота рослини, см	168,9	179	
Ступінь нахилу кошика, бал	7	8	
Тривалість періоду вегетації, днів	118	124	
Стійкість до вилягання, бал	6	9	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	8	8	
Стійкість проти вовчка, бал	9	7	
Стійкість проти іржі, бал	7	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	8	8	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	9	9	
Вміст олії, %	45,7	48,2	
Вміст білка, %	18,7	14,6	
Лушпинність, %	31,8	28,5	
Блок (Група стиглості)	3	3	
Напрямок використання	олн	олн	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.**Заявка № 18039034 Назва сорту:** МАС 810Б **Заявник (код):** 924 **Власник сорту (код):** 924**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 02.12.2020**Свідцтво про державну реєстрацію № 200997****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	веретиноподібні	1	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	зігнуте за довжиною	2	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	дуже охоплює	3	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F., <i>Helianthi</i> Novot)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,07	2,34	
Довірчий інтервал, т/га	0,09	0,09	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,76	3,98	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,69	1,64	
+, - до усередненої урожайності, %	33,3	70,2	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	56	62,4	
Діаметр кошика, см	15,1	17,2	
Висота рослини, см	160,8	169,4	
Ступінь нахилу кошика, бал	6	7	
Тривалість періоду вегетації, днів	106	111	
Стійкість до вилягання, бал	9	9	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	8	8	
Стійкість проти вовчка, бал	7	7	
Стійкість проти іржі, бал	8	7	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	9	8	
Вміст олії, %	47,7	50,3	
Вміст білка, %	16,6	14,7	
Лушпинність, %	30,4	29,3	
Блок (Група стиглості)	1	1	
Напрямок використання	олн	олн	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 18039035 Назва сорту: MAC 865IP Заявник (код): 924 Власник сорту (код): 924

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 02.12.2020

Свідцтво про державну реєстрацію № 200998

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	ранній	3	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	коротка	3	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпю	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F., <i>Helianthi</i> Novot)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,16	2,61	
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	3,39	4,47	
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,23	1,86	
+, - до усередненої урожайності, %	56,9	71,1	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	63,9	75,2	
Діаметр кошика, см	16,9	18,8	
Висота рослини, см	170,1	176,4	
Ступінь нахилу кошика, бал	7	8	
Тривалість періоду вегетації, днів	119	125	
Стійкість до вилягання, бал	8	9	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	9	8	
Стійкість проти вовчка, бал	4	8	
Стійкість проти іржі, бал	8	7	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти фомозу, бал	9	9	
Вміст олії, %	45	45	
Вміст білка, %	17,1	16,3	
Лушпинність, %	33,4	34,3	
Блок (Група стиглості)	3	3	
Напрямок використання	олн	олн	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.**Заявка № 18039047 Назва сорту:** МАС 920КП **Заявник (код):** 924 **Власник сорту (код):** 924**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 15.12.2020**Свідчення про державну реєстрацію № 201121****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	великий	7	
36	Сім'янка: форма	вузькоюйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабо виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпю	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F., <i>Helianthi</i> Novot)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,16	2,61	
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	3,05	3,97	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,89	1,36	
+, - до усередненої урожайності, %	41,4	52,1	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	62,1	60,2	
Діаметр кошика, см	15,3	17,5	
Висота рослини, см	167,2	179,2	
Ступінь нахилу кошика, бал	7	8	
Тривалість періоду вегетації, днів	119	125	
Стійкість до вилягання, бал	7	8	
Стійкість до обсіпання, бал	9	8	
Стійкість до посухи, бал	8	8	
Стійкість проти вовчка, бал	6	7	
Стійкість проти іржі, бал	8	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти фомозу, бал	9	9	
Вміст олії, %	46,8	47,5	
Вміст білка, %	17,1	14,4	
Лушпинність, %	30,2	28,3	
Блок (Група стиглості)	3	3	
Напрямок використання	олн	олн	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 18039026 Назва сорту: П63ГГ142 Заявник (код): 9 Власник сорту (код): 9

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.12.2020

Свідцтво про державну реєстрацію № 201114

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	широкояйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	великий	7	
36	Сім'янка: форма	видовжена	1	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F., <i>Helianthi</i> Novot)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,23	2,91	
Довірчий інтервал, т/га	0,28	0,28	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,48	4,16	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,25	1,25	
+, - до усередненої урожайності, %	11,3	43,1	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	56	65,6	
Діаметр кошика, см	16,8	17,4	
Висота рослини, см	173,4	185,6	
Ступінь нахилу кошика, бал	7	8	
Тривалість періоду вегетації, днів	113	117	
Стійкість до вилягання, бал	7	8	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	6	8	
Стійкість проти вовчка, бал	5	9	
Стійкість проти іржі, бал	4	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	9	9	
Вміст олії, %	45	48,1	
Вміст білка, %	16,5	13,3	
Лушпинність, %	32,7	31,2	
Блок (Група стиглості)	6	6	
Напрямок використання	ВОЛ	ВОЛ	
Вміст олеїнової кислоти (для ВОЛ), %	82,3	84,8	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.**Заявка № 18039024 Назва сорту:** П64ГГ150 **Заявник (код):** 9 **Власник сорту (код):** 9**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 15.12.2020**Свідчення про державну реєстрацію № 201112****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	зігнуте за довжиною	2	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	дуже охоплює	3	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу з прямим стеблом	6	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	великий	7	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F., <i>Helianthi</i> Novot)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,53	3,07	
Довірчий інтервал, т/га	0,45	0,58	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,98	4,53	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,45	1,46	
+, - до усередненої урожайності, %	17,9	47,7	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	58,1	64,7	
Діаметр кошика, см	17,4	19,3	
Висота рослини, см	168	182,1	
Ступінь нахилу кошика, бал	6	8	
Тривалість періоду вегетації, днів	120	121	
Стійкість до вилягання, бал	8	8	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	7	8	
Стійкість проти вовчка, бал	7	8	
Стійкість проти іржі, бал	9	9	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	9	8	
Вміст олії, %	47,9	49,3	
Вміст білка, %	15,8	13,5	
Лушпинність, %	30,7	25,5	
Блок (Група стиглості)	7	7	
Напрямок використання	ВОЛ	ВОЛ	
Вміст олеїнової кислоти (для ВОЛ), %	82,3	82,3	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.**Заявка №** 18039025 **Назва сорту:** П64ЛЕ153 **Заявник (код):** 9 **Власник сорту (код):** 9**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 15.12.2020**Свідцтво про державну реєстрацію №** 201113**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	широкоюйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	хвилясте	3	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	дуже охоплює	3	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу з прямим стеблом	6	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькоюйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F., <i>Helianthi</i> Novot)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,16	2,61	
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	3,13	4,24	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,97	1,63	
+, - до усередненої урожайності, %	45,1	62,6	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	63,3	66,4	
Діаметр кошика, см	15,2	18,2	
Висота рослини, см	158,1	172,2	
Ступінь нахилу кошика, бал	5	8	
Тривалість періоду вегетації, днів	119	122	
Стійкість до вилягання, бал	9	9	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	8	8	
Стійкість проти вовчка, бал	9	8	
Стійкість проти іржі, бал	8	7	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	9	9	
Вміст олії, %	48,3	50	
Вміст білка, %	16,4	13,4	
Лушпинність, %	28,9	29,4	
Блок (Група стиглості)	3	3	
Напрямок використання	олн	олн	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.**Заявка № 18039027 Назва сорту:** П64ЛЛ155 **Заявник (код):** 9 **Власник сорту (код):** 9**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 15.12.2020**Свідоцтво про державну реєстрацію № 201126****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	сильне	7	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	щільно	7	
16	Язичкові квітки: за формою	широкоюйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	дуже охоплює	3	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу з прямим стеблом	6	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькоюйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F., <i>Helianthi</i> Novot)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,16	2,61	
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,83	3,83	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,67	1,22	
+, - до усередненої урожайності, %	31,2	46,8	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	61,9	67,2	
Діаметр кошика, см	15,4	17,8	
Висота рослини, см	166,6	173,2	
Ступінь нахилу кошика, бал	6	8	
Тривалість періоду вегетації, днів	119	124	
Стійкість до вилягання, бал	6	8	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	8	8	
Стійкість проти вовчка, бал	6	8	
Стійкість проти іржі, бал	9	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	9	9	
Вміст олії, %	48,8	50,2	
Вміст білка, %	16,4	13,6	
Лушпинність, %	26,4	29,4	
Блок (Група стиглості)	3	3	
Напрямок використання	олн	олн	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.**Заявка № 18039045 Назва сорту:** Реасан **Заявник (код):** 2232 **Власник сорту (код):** 2232**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 15.12.2020**Свідчення про державну реєстрацію № 201119****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	широкояйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	сильно виражені	3	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F., <i>Helianthi</i> Novot)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,16	2,61	
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,44	3,79	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,28	1,18	
+, - до усередненої урожайності, %	12,9	45,4	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	51,1	53	
Діаметр кошика, см	14,8	18,5	
Висота рослини, см	146,9	158,6	
Ступінь нахилу кошика, бал	6	8	
Тривалість періоду вегетації, днів	120	125	
Стійкість до вилягання, бал	9	8	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	7	8	
Стійкість проти вовчка, бал	6	7	
Стійкість проти іржі, бал	8	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти фомозу, бал	9	9	
Вміст олії, %	47,5	48,9	
Вміст білка, %	17,8	14,7	
Лушпинність, %	28,1	32,3	
Блок (Група стиглості)	3	3	
Напрямок використання	олн	олн	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.**Заявка №** 18039055 **Назва сорту:** РЖТ КАПІТОЛЛ **Заявник (код):** 1783 **Власник сорту (код):** 1783**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 02.12.2020**Свідцтво про державну реєстрацію №** 200941**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7	
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	сильне	7	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	широкояйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F., <i>Helianthi</i> Novot)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,23	2,91	
Довірчий інтервал, т/га	0,28	0,28	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,25	4,17	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,02	1,26	
+, - до усередненої урожайності, %	0,9	43,2	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	49,8	56,4	
Діаметр кошика, см	16,9	18,7	
Висота рослини, см	134,6	154,4	
Ступінь нахилу кошика, бал	6	7	
Тривалість періоду вегетації, днів	111	114	
Стійкість до вилягання, бал	9	9	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	7	8	
Стійкість проти вовчка, бал	7	9	
Стійкість проти іржі, бал	5	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	8	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	9	9	
Вміст олії, %	45,5	49,1	
Вміст білка, %	16,3	13,3	
Лушпинність, %	32,1	27,2	
Блок (Група стиглості)	6	6	
Напрямок використання	ВОЛ	ВОЛ	
Вміст олеїнової кислоти (для ВОЛ), %	79,1	82,6	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.**Заявка № 18039103 Назва сорту:** Текадра **Заявник (код):** 2537 **Власник сорту (код):** 2537**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 17.12.2020**Свідцтво про державну реєстрацію №** 201233**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	дрібні	3	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	зігнуте за довжиною	2	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	сильна	7	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галузнення (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галузнення (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу з сильно зігнутим стеблом	8	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F., <i>Helianthi</i> Novot)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,12	2,53	
Довірчий інтервал, т/га	0,08	0,08	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,77	3,94	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,65	1,41	
+, - до усередненої урожайності, %	30,8	55,8	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	58,5	61,5	
Діаметр кошика, см	16,1	18,4	
Висота рослини, см	152	169,2	
Ступінь нахилу кошика, бал	8	8	
Тривалість періоду вегетації, днів	125	125	
Стійкість до вилягання, бал	9	9	
Стійкість до обсіпання, бал	9	8	
Стійкість до посухи, бал	6	8	
Стійкість проти вовчка, бал	7	8	
Стійкість проти іржі, бал	9	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти фомозу, бал	9	8	
Вміст олії, %	46,5	48,5	
Вміст білка, %	17,9	14,7	
Лушпинність, %	31,5	28,6	
Блок (Група стиглості)	4	4	
Напрямок використання	олн	олн	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.**Заявка № 18039064 Назва сорту:** ТРАВЕЛЛЕР **Заявник (код):** 1783 **Власник сорту (код):** 1783**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 02.12.2020**Свідчення про державну реєстрацію № 200946****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	дрібні	3	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	загострена	8	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	сильне	7	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	широкояйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галузнення (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галузнення (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу з сильно зігнутим стеблом	8	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F., <i>Helianthi</i> Novot)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,08	2,38	
Довірчий інтервал, т/га	0,03	0,03	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,55	3,72	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,47	1,34	
+, - до усередненої урожайності, %	22,5	56,5	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	61	63,7	
Діаметр кошика, см	16,3	16,3	
Висота рослини, см	146,8	153,4	
Ступінь нахилу кошика, бал	7	8	
Тривалість періоду вегетації, днів	112	114	
Стійкість до вилягання, бал	4	9	
Стійкість до обсіпання, бал	8	9	
Стійкість до посухи, бал	8	6	
Стійкість проти вовчка, бал	9	7	
Стійкість проти іржі, бал	8	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	9	8	
Вміст олії, %	49,3	53,4	
Вміст білка, %	16,8	12,9	
Лушпинність, %	30,3	25,4	
Блок (Група стиглості)	2	2	
Напрямок використання	олн	олн	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.**Заявка № 18039008 Назва сорту:** Тріполі **Заявник (код):** 2312 **Власник сорту (код):** 2312**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 17.12.2020**Свідчення про державну реєстрацію № 201231****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	ранній	3	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	коротка	3	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	сильна	7	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галузнення (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галузнення (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу з прямим стеблом	6	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькоюйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F., <i>Helianthi</i> Novot)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,13	2,45	
Довірчий інтервал, т/га	0,06	0,07	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	1,78	3,23	
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,35	0,78	
+, - до усередненої урожайності, %	-16,3	31,9	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	61,2	62,7	
Діаметр кошика, см	17,7	18,6	
Висота рослини, см	159,1	169,5	
Ступінь нахилу кошика, бал	8	7	
Тривалість періоду вегетації, днів	122	122	
Стійкість до вилягання, бал	8	8	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	8	9	
Стійкість проти вовчка, бал	9	9	
Стійкість проти іржі, бал	8	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти фомозу, бал	8	9	
Вміст олії, %	43,7	46,8	
Вміст білка, %	18,2	12,9	
Лушпинність, %	29,9	26,4	
Блок (Група стиглості)	сс	сс	
Напрямок використання	олійний		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.**Заявка № 18039121 Назва сорту:** Уносан **Заявник (код):** 2011 **Власник сорту (код):** 2011**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 15.12.2020**Свідцтво про державну реєстрацію №** 201125**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	широкоюйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	коротка	3	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькоюйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F., <i>Helianthi</i> Novot)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,12	2,53	
Довірчий інтервал, т/га	0,08	0,08	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,3	3,77	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,18	1,24	
+, - до усередненої урожайності, %	8,7	49,1	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	47	54,4	
Діаметр кошика, см	16,3	19,1	
Висота рослини, см	163,9	171,7	
Ступінь нахилу кошика, бал	5	7	
Тривалість періоду вегетації, днів	124	127	
Стійкість до вилягання, бал	9	9	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	6	8	
Стійкість проти вовчка, бал	8	8	
Стійкість проти іржі, бал	7	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	8	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти фомозу, бал	9	9	
Вміст олії, %	49	49,8	
Вміст білка, %	16,9	14,4	
Лушпинність, %	28,8	29,6	
Блок (Група стиглості)	4	4	
Напрямок використання	олн	олн	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.**Заявка № 18039046 Назва сорту:** Флорасан **Заявник (код):** 2232 **Власник сорту (код):** 2232**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 15.12.2020**Свідцтво про державну реєстрацію № 201120****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	широкояйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	сильна	7	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутих стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	сильно виражені	3	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F., <i>Helianthi</i> Novot)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,16	2,61	
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,97	4,18	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,81	1,57	
+, - до усередненої урожайності, %	37,5	60,2	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	59,8	61,7	
Діаметр кошика, см	16,6	18,9	
Висота рослини, см	152,8	165,5	
Ступінь нахилу кошика, бал	6	8	
Тривалість періоду вегетації, днів	118	125	
Стійкість до вилягання, бал	8	9	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	7	8	
Стійкість проти вовчка, бал	7	8	
Стійкість проти іржі, бал	8	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти фомозу, бал	9	9	
Вміст олії, %	45,8	48,1	
Вміст білка, %	17	13,9	
Лушпинність, %	31,7	30,4	
Блок (Група стиглості)	3	3	
Напрямок використання	олн	олн	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.**Заявка № 18039107 Назва сорту:** Фортасол **Заявник (код):** 2267 **Власник сорту (код):** 2267**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 17.12.2020**Свідцтво про державну реєстрацію № 201235****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	широкояйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубочасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубочасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубочасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубочасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	коротка	3	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу з сильно зігнутим стеблом	8	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobancha cumana</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F., <i>Helianthi</i> Novot)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,12	2,53	
Довірчий інтервал, т/га	0,08	0,08	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,76	4,05	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,64	1,52	
+, - до усередненої урожайності, %	30	60	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	61,8	62,3	
Діаметр кошика, см	17,2	20,1	
Висота рослини, см	165,5	168,3	
Ступінь нахилу кошика, бал	7	8	
Тривалість періоду вегетації, днів	125	125	
Стійкість до вилягання, бал	9	8	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	7	8	
Стійкість проти вовчка, бал	8	7	
Стійкість проти іржі, бал	7	9	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти фомозу, бал	9	9	
Вміст олії, %	48,4	50	
Вміст білка, %	19	14,5	
Лушпинність, %	28,4	29,9	
Блок (Група стиглості)	4	4	
Напрямок використання	олн	олн	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.**Заявка № 18039113 Назва сорту:** ФОРТЕРА **Заявник (код):** 2440 **Власник сорту (код):** 2440**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 23.12.2020**Свідцтво про державну реєстрацію № 201800****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3	
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	щільно	7	
16	Язичкові квітки: за формою	широкояйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубочасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубочасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубочасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубочасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F., <i>Helianthi</i> Novot)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,08	2,38	
Довірчий інтервал, т/га	0,03	0,03	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,57	3,38	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,49	1	
+, - до усередненої урожайності, %	23,3	42,1	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	54,4	60,8	
Діаметр кошика, см	17,4	16,9	
Висота рослини, см	158,3	167,6	
Ступінь нахилу кошика, бал	6	7	
Тривалість періоду вегетації, днів	115	117	
Стійкість до вилягання, бал	9	9	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	8	8	
Стійкість проти вовчка, бал	8	7	
Стійкість проти іржі, бал	6	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти фомозу, бал	9	9	
Вміст олії, %	45,2	48,5	
Вміст білка, %	17	13,5	
Лушпинність, %	30,1	30,7	
Блок (Група стиглості)	2	2	
Напрямок використання	олн	олн	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 18039153 Назва сорту: Хайсан 189 СУ Заявник (код): 2554 Власник сорту (код): 2554

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 22.12.2020

Свідцтво про державну реєстрацію № 201802

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3	
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	дуже ранній	1	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	широкояйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галушення (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галушення (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	сильно виражені	3	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F., <i>Helianthi</i> Novot)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,12	2,53	
Довірчий інтервал, т/га	0,08	0,08	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,39	3,57	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,27	1,04	
+, - до усередненої урожайності, %	12,6	41,2	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	55,5	64,3	
Діаметр кошика, см	16,5	18,8	
Висота рослини, см	157,1	169,6	
Ступінь нахилу кошика, бал	6	8	
Тривалість періоду вегетації, днів	126	127	
Стійкість до вилягання, бал	8	8	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	7	8	
Стійкість проти вовчка, бал	5	7	
Стійкість проти іржі, бал	7	7	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	9	8	
Вміст олії, %	49,2	51	
Вміст білка, %	17,3	14,4	
Лушпинність, %	29,9	27,1	
Блок (Група стиглості)	4	4	
Напрямок використання	олн	олн	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 18039151 Назва сорту: Хайсан 195 IT Заявник (код): 2554 Власник сорту (код): 2554

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 22.12.2020

Свідцтво про державну реєстрацію № 201805

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	великі	7	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3	
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	дуже ранній	1	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	щільно	7	
16	Язичкові квітки: за формою	широкоюйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	зігнуте за довжиною	2	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галузнення (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галузнення (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькоюйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабо виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F., <i>Helianthi</i> Novot)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,16	2,61	
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,41	3,64	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,25	1,03	
+, - до усередненої урожайності, %	11,8	39,6	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	48	66,1	
Діаметр кошика, см	14,6	18,6	
Висота рослини, см	162,8	168	
Ступінь нахилу кошика, бал	7	7	
Тривалість періоду вегетації, днів	118	121	
Стійкість до вилягання, бал	8	9	
Стійкість до обсіпання, бал	8	8	
Стійкість до посухи, бал	7	8	
Стійкість проти вовчка, бал	9	7	
Стійкість проти іржі, бал	8	7	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	9	9	
Вміст олії, %	45,9	46,7	
Вміст білка, %	17,4	14,5	
Лушпинність, %	28,5	23,7	
Блок (Група стиглості)	3	3	
Напрямок використання	олн	олн	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 18039152 Назва сорту: Хайсан 268 IT Заявник (код): 2554 Власник сорту (код): 2554

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 22.12.2020

Свідцтво про державну реєстрацію № 201801

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	великі	7	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7	
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	дуже ранній	1	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	дуже охоплює	3	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	сильно виражені	3	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F., <i>Helianthi</i> Novot)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,16	2,61	
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,47	4	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,31	1,39	
+, - до усередненої урожайності, %	14,6	53,4	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	50,7	62,7	
Діаметр кошика, см	15,3	19,2	
Висота рослини, см	160,7	172,1	
Ступінь нахилу кошика, бал	7	8	
Тривалість періоду вегетації, днів	119	124	
Стійкість до вилягання, бал	9	8	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	7	8	
Стійкість проти вовчка, бал	9	8	
Стійкість проти іржі, бал	7	7	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	8	9	
Вміст олії, %	46,5	49,4	
Вміст білка, %	17,9	15	
Лушпинність, %	28,2	26,6	
Блок (Група стиглості)	3	3	
Напрямок використання	олн	олн	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.**Заявка № 18039018 Назва сорту:** ХОРОЛ **Заявник (код):** 2458 **Власник сорту (код):** 2458**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 22.12.2020**Свідцтво про державну реєстрацію № 201806****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	ранній	3	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	широкоюйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	коротка	3	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькоюйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F., <i>Helianthi</i> Novot)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,11	2,39	
Довірчий інтервал, т/га	0,04	0,05	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,39	3,5	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,28	1,11	
+, - до усередненої урожайності, %	13,5	46,3	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	58,4	64,6	
Діаметр кошика, см	17,3	18,6	
Висота рослини, см	150,7	165,2	
Ступінь нахилу кошика, бал	7	7	
Тривалість періоду вегетації, днів	117	119	
Стійкість до вилягання, бал	8	8	
Стійкість до обсіпання, бал	9	8	
Стійкість до посухи, бал	8	9	
Стійкість проти вовчка, бал	8	9	
Стійкість проти іржі, бал	8	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти фомозу, бал	8	9	
Вміст олії, %	46,4	51,3	
Вміст білка, %	18,6	15,5	
Лушпинність, %	26,3	23,1	
Блок (Група стиглості)	ср	ср	
Напрямок використання	олійний		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 14939029 Назва сорту: 85П10Р **Заявник (код):** 485 **Власник сорту (код):** 485

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 17.12.2020

Свідчення про державну реєстрацію № 201248

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	сильно увігнута	1	
8	Листок: форма верхівки	від ланцетної до вузькотрикутної	2	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	ранній	3	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	зігнуте за довжиною	2	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	світла	3	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	сильно охоплює	3	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабо виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanchе cumana</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 19939036 **Назва сорту:** АС ХДЖ 9 **Заявник (код):** 2576 2676 **Власник сорту (код):** 2576 2676

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 17.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201257

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	загострена	8	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3	
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	ранній	3	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	зігнуте за довжиною	2	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	помірна	5	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галузнення (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галузнення (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькоюйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobancha cumana</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 18939024 Назва сорту: AC15A **Заявник (код):** 2467 2468 **Власник сорту (код):** 2467 2468

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 01.10.2020

Свідчення про державну реєстрацію № 200948

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	сильно виражені	3	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	ранній	3	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	широкоюйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	низька	3	
29	Рослина: галушення (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галушення (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	вертикальне	3	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькоюйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 18939007 Назва сорту: ДС 33 А **Заявник (код):** 2458 **Власник сорту (код):** 2458

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 22.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201814

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	великі	7	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	плескатий	3	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькоюйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 18939006 Назва сорту: ДС 33 Б **Заявник (код):** 2458 **Власник сорту (код):** 2458

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 22.12.2020

Свідчення про державну реєстрацію № 201813

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	великі	7	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	сильно виражені	3	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3	
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	ранній	3	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	широкоюйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	коротка	3	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	вертикальне	3	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкоюйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 18939013 Назва сорту: ДС 53 Б **Заявник (код):** 2458 **Власник сорту (код):** 2458

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 22.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201816

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	сильно випукла	5	
8	Листок: форма верхівки	широкоотрикутна	5	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	веретеноподібні	1	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	сильна	7	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	вертикальне	3	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькоюяцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабо виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабо виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobancha cumana</i>)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. f. <i>halianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 18939011 Назва сорту: ДС 78 В **Заявник (код):** 2458 **Власник сорту (код):** 2458

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 22.12.2020

Свідчення про державну реєстрацію № 201809

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	сильно виражені	3	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середній	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галузнення (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галузнення (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	видовжена	1	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	сіре	3	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабо виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 18939009 Назва сорту: ДС 8 Б **Заявник (код):** 2458 **Власник сорту (код):** 2458

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 22.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201815

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3	
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	помірна	5	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	дуже довга	9	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	помірно коричневе	5	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 18939005 Назва сорту: ДС 83 А **Заявник (код):** 2458 **Власник сорту (код):** 2458

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 22.12.2020

Свідчення про державну реєстрацію № 201812

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	великі	7	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	тупий	3	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	нещільно	3	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	низька	3	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	сіре	3	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 18939008 Назва сорту: ДС 88 В **Заявник (код):** 2458 **Власник сорту (код):** 2458

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 22.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201808

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабо виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3	
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	сильно охоплює	3	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галузнення (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галузнення (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	плескатий	3	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	видовжена	1	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабо виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobancha cumana</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. f. <i>halianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 19939035 Назва сорту: ДСЗЗАДС53Б **Заявник (код):** 2458 **Власник сорту (код):** 2458

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 22.12.2020

Свідцтво про державну реєстрацію № 201811

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3	
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	ранній	3	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкоюйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпю	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobancha cumana</i>)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 19939034 **Назва сорту:** ДС83АДС58Б **Заявник (код):** 2458 **Власник сорту (код):** 2458

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 22.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201810

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	окремі або дуже дрібні	1	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	пізній	7	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	помірна	5	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	дуже довга	9	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу з прямим стеблом	6	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькоюйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	темно-коричневе	6	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	біле	1	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobancha cumana</i>)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 18939112 Назва сорту: EX500СУЛ **Заявник (код):** 2267 **Власник сорту (код):** 2267

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 17.12.2020

Свідцтво про державну реєстрацію № 201252

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	пізній	7	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу з сильно зігнутим стеблом	8	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 18939079 Назва сорту: ЛГ13013МЖА **Заявник (код):** 793 **Власник сорту (код):** 793

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 17.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201256

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	відсутня або дуже слабка	1	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабо виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	нещільно	3	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	хвилясте	3	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	дуже довга	9	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галузнення (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галузнення (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	великий	7	
36	Сім'янка: форма	вузькоюйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	світло-коричневе	4	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабо виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	коричневе	3	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobancha cumana</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 18939025 Назва сорту: ОВ10Б **Заявник (код):** 2467 2468 **Власник сорту (код):** 2467 2468

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.12.2020

Свідцтво про державну реєстрацію № 201807

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
5	Листок: пухирчастість	відсутня або дуже слабка	1	
6	Листок: зубці	дрібні	3	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	широкоюйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	світла	3	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	сильно охоплює	3	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3	
32	Кошик: положення	вертикальне	3	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькоюйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабо виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 18939072 Назва сорту: P10019MI Заявник (код): 1435 Власник сорту (код): 1435

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 17.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201249

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	сильно увігнута	1	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	ранній	3	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	коротка	3	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	низька	3	
29	Рослина: галузнення (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галузнення (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	сіре	3	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабо виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobancha cumana</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 18939076 Назва сорту: Р4НП8МЖІ **Заявник (код):** 1435 **Власник сорту (код):** 1435

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 17.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201245

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	дрібні	3	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	малі	3	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3	
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	сильне	7	
14	Час цвітіння	пізній	7	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	помірна	5	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	світла	3	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	на рівні	2	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	малий	3	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	плескатий	3	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	сіре	3	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабо виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobancha cumana</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 18939075 Назва сорту: Р5ХИЗМЖС **Заявник (код):** 1435 **Власник сорту (код):** 1435

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 17.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201244

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3	
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	пізній	7	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	світла	3	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галузнення (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галузнення (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	видовжена	1	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	коричнєве	3	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanchе cumanа</i>)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>halianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 18939074 Назва сорту: P8035M2Ж **Заявник (код):** 1435 **Власник сорту (код):** 1435

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 17.12.2020

Свідчення про державну реєстрацію № 201250

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	відсутня або дуже слабка	1	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3	
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	відсутнє або дуже слабе	1	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	коротка	3	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	низька	3	
29	Рослина: галушення (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галушення (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 18939073 **Назва сорту:** Р8035МЖС **Заявник (код):** 1435 **Власник сорту (код):** 1435

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 17.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201243

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	малий	3	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	сильно увігнута	1	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	коротка	3	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	низька	3	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькоюйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Сійкість проти вовчка (<i>Orobancha cumana</i>)	наявна	9	
44	Сійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. f. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 18939156 Назва сорту: Рф1010 **Заявник (код):** 2537 **Власник сорту (код):** 2537

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 17.12.2020

Свідцтво про державну реєстрацію № 201253

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	сильно увігнута	1	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	нещільно	3	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	дуже довга	9	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	низька	3	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	вертикальне	3	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	великий	7	
36	Сім'янка: форма	вузькоюйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабо виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 18939158 Назва сорту: Рф1018 **Заявник (код):** 2537 **Власник сорту (код):** 2537

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 17.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201247

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	великі	7	
7	Листок: форма поперечного перерізу	сильно увігнута	1	
8	Листок: форма верхівки	від ланцетної до вузькотрикутної	2	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	нещільно	3	
16	Язичкові квітки: за формою	широкояйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	низька	3	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobancha cumana</i>)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 18939155 Назва сорту: Рф1136 **Заявник (код):** 2537 **Власник сорту (код):** 2537

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 17.12.2020

Свідчення про державну реєстрацію № 201254

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	вузькотрикутна	3	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	сильне	7	
14	Час цвітіння	дуже ранній	1	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	широкояйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	світла	3	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	сильно охоплює	3	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3	
32	Кошик: положення	обернене донизу з сильно зігнутим стеблом	8	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	плескатий	3	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 18939157 Назва сорту: Рф3074 **Заявник (код):** 2537 **Власник сорту (код):** 2537

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 17.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201246

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	окремі або дуже дрібні	1	
7	Листок: форма поперечного перерізу	сильно увігнута	1	
8	Листок: форма верхівки	загострена	8	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3	
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	сильна	7	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькоюйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабо виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobancha cumana</i>)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 18939078 Назва сорту: СФ1561М2СА **Заявник (код):** 1435 **Власник сорту (код):** 1435

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 17.12.2020

Свідцтво про державну реєстрацію № 201255

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	дрібні	3	
7	Листок: форма поперечного перерізу	сильно увігнута	1	
8	Листок: форма верхівки	загострена	8	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	помірна	5	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабо виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 17939049 Назва сорту: ТРІ3751Р **Заявник (код):** 924 **Власник сорту (код):** 924

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201127

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	малий	3	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	малі	3	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	відсутнє або дуже слабке	1	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	нещільно	3	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	зігнуте за довжиною	2	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	коротка	3	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	сильно охоплює	3	
28	Рослина: за висотою	низька	3	
29	Рослина: галузнення (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галузнення (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3	
32	Кошик: положення	вертикальне	3	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	плескатий	3	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	видовжена	1	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobancha cumana</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 18939063 Назва сорту: ТРІ4748Р **Заявник (код):** 924 **Власник сорту (код):** 924

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.12.2020

Свідчення про державну реєстрацію № 201133

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	пурпурове	3	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	помірна	5	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	світла	3	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	деформований	6	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабо виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobancha cumana</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 18939036 Назва сорту: ТРІ4757Р **Заявник (код):** 924 **Власник сорту (код):** 924

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201129

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	сильне	7	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	пурпурове	3	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	сильна	7	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	світла	3	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3	
32	Кошик: положення	обернене донизу з сильно зігнутим стеблом	8	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькоюйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабко виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабко виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobancha cumana</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. f. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 18939037 Назва сорту: ТРІ4760Р **Заявник (код):** 924 **Власник сорту (код):** 924

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.12.2020

Свідчення про державну реєстрацію № 201135

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	сильно увігнута	1	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	нещільно	3	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	помірна	5	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	світла	3	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	сильно охоплює	3	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3	
32	Кошик: положення	вертикальне	3	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабо виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 18939038 Назва сорту: TP04385P **Заявник (код):** 924 **Власник сорту (код):** 924

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201130

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3	
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	нещільно	3	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	помірна	5	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	світла	3	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3	
32	Кошик: положення	обернене донизу з сильно зігнутим стеблом	8	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	видовжена	1	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobancha cumana</i>)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 18939041 Назва сорту: ТФІ3719А **Заявник (код):** 924 **Власник сорту (код):** 924

Дата пріоритету: 25.10.2018

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.12.2020

Свідцтво про державну реєстрацію № 201132

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3	
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	нешільно	3	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	сильно охоплює	3	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галузнення (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галузнення (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanchе сumana</i>)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>halianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 18939154 Назва сорту: ТФ03188 **Заявник (код):** 924 **Власник сорту (код):** 924

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201134

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	дрібні	3	
7	Листок: форма поперечного перерізу	сильно увігнута	1	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3	
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	нещільно	3	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	світла	3	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькоюйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobancha cumana</i>)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 18939035 Назва сорту: ТФ03288 ТФ03188 Заявник (код): 924 Власник сорту (код): 924

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.12.2020

Свідцтво про державну реєстрацію № 201128

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	сильно увігнута	1	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3	
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	відсутнє або дуже слабе	1	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	нещільно	3	
16	Язичкові квітки: за формою	веретеноподібні	1	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубочасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубочасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубочасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3	
23	Трубочасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	дуже довга	9	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	світла	3	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	великий	7	
36	Сім'янка: форма	широкоюяцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 18939040 Назва сорту: ТФС3780А **Заявник (код):** 924 **Власник сорту (код):** 924

Дата пріоритету: 25.10.2018

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201131

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3	
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	світла	3	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	низька	3	
29	Рослина: галузнення (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галузнення (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу з сильно зігнутим стеблом	8	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькоюйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабо виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка (<i>Orobancha cumana</i>)	відсутня	1	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 18939077 Назва сорту: Ф5ДНЗМКА **Заявник (код):** 1435 **Власник сорту (код):** 1435

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 17.12.2020

Свідцтво про державну реєстрацію № 201251

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3	
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	пізній	7	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галушення (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галушення (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	великий	7	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	відсутня	1	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ: БУРЯК (КОРМОВИЙ, ЦУКРОВИЙ)

Буряк цукровий



Вид: Буряк цукровий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *altissima* Doell

Заявка № 18069020 Назва сорту: АЛЬБЕРІНА КВС Заявник (код): 2649 Власник сорту (код): 2649

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.12.2020

Свідчення про державну реєстрацію № 201010

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Клубочок: тип ростковості	одноростковий	1	
2	Рослина: плоідність	диплоїд	2	
3	Паросток: антоціанове забарвлення	наявне	9	
4	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
5	Паросток: переважає забарвлення (понад 50%)	рожеве	5	
6	Рослина: тип розетки	напіврозлога	3	
7	Листок: за довжиною (черешок з пластинкою)	середній	5	
8	Листок: черешок за довжиною (відносно довжини пластинки)	середній	5	
9	Листок: за розміром пластинки	середній	5	
10	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
11	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
13	Листкова пластинка: хвилястість країв	помірна	5	
14	Листкова пластинка: характер поверхні	помірно гофрована	5	
15	Листкова пластинка: блиск	сильний	7	
16	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
17	Листкова пластинка: форма верхівки	тупа	2	
18	Черешок: за шириною	середній	5	
19	Черешок: забарвлення	зелене	2	
20	Черешок: забарвлення основи	білувато-зелене	1	
21	Рослина: квітконосні стебла	наявні	9	
22	Час початку розвитку квітконосного стебла	пізній	7	
23	Коренеплід: розмір	середній	5	
24	Коренеплід: за довжиною	довгий	7	
25	Коренеплід: форма	ширококонічна	3	
26	Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт	повністю заглиблений	3	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднений збір цукру сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		10,3	9,5
Збір цукру, т/га		14	12,8
+, - до усередненого збору цукру, т/га		3,7	3,3
+, - до усередненого збору цукру, %		36	34,3
Довірчий інтервал (збір цукру), т/га		0,1	0,1
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		56	50,7
Урожайність, т/га		68,8	69,9
+, - до усередненої урожайності, т/га		12,8	19,2
+, - до усередненої урожайності, %		22,8	38
Довірчий інтервал, т/га		0,8	1,2
Цукристість, %		20,5	17,7
Придатність до механізованого збирання, бал		9	9
Заглиблення коренеплідів у ґрунт, %		92,9	81,2
Стійкість до цвітушності, бал		9	9
Ураженість коренієм, бал		1	1
Стійкість проти церкоспорозу, бал		7	7
Ураженість кореневими гнилями, бал		1	2
Напрямок використання		ТХН	ТХН

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Буряк цукровий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *altissima* Doell

Заявка № 18069024 Назва сорту: БЕНІАМІНА КВС **Заявник (код):** 2649 **Власник сорту (код):** 2649

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201012

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Клубочок: тип ростковості	одноростковий	1	
2	Рослина: плоідність	диплоїд	2	
3	Паросток: антоціанове забарвлення	наявне	9	
4	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
5	Паросток: переважаюче забарвлення (понад 50%)	рожеве	5	
6	Рослина: тип розетки	розлога	5	
7	Листок: за довжиною (черешок з пластинкою)	середній	5	
8	Листок: черешок за довжиною (відносно довжини пластинки)	середній	5	
9	Листок: за розміром пластинки	середній	5	
10	Листкова пластинка: за довжиною	довга	7	
11	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
13	Листкова пластинка: хвилястість країв	сильна	7	
14	Листкова пластинка: характер поверхні	помірно гофрована	5	
15	Листкова пластинка: блиск	сильний	7	
16	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
17	Листкова пластинка: форма верхівки	тупа	2	
18	Черешок: за шириною	вузький	3	
19	Черешок: забарвлення	зелене	2	
20	Черешок: забарвлення основи	білувато-зелене	1	
21	Рослина: квітконосні стебла	наявні	9	
22	Час початку розвитку квітконосного стебла	пізній	7	
23	Коренеплід: розмір	середній	5	
24	Коренеплід: за довжиною	довгий	7	
25	Коренеплід: форма	вузькоконічна	2	
26	Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт	заглиблений на 3/4	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднений збір цукру сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		10,3	9,5
Збір цукру, т/га		13,4	13,3
+, - до усередненого збору цукру, т/га		3	3,8
+, - до усередненого збору цукру, %		29,4	40,3
Довірчий інтервал (збір цукру), т/га		0,1	0,1
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		56	50,7
Урожайність, т/га		64,8	74
+, - до усередненої урожайності, т/га		8,8	23,3
+, - до усередненої урожайності, %		15,7	45,9
Довірчий інтервал, т/га		0,8	1,2
Цукристість, %		20,7	17,7
Придатність до механізованого збирання, бал		8	9
Заглиблення коренеплідів у ґрунт, %		88,7	79,2
Стійкість до цвітушності, бал		9	9
Ураженість коренеюдомом, бал		1	1
Стійкість проти церкоспорозу, бал		7	8
Ураженість кореневими гнилями, бал		1	1
Напрямок використання		тхн	тхн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Буряк цукровий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *altissima* Doell

Заявка № 18069026 Назва сорту: СМАРТ ДЖЕРБА КВС Заявник (код): 2649 Власник сорту (код): 2649

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.12.2020

Свідцтво про державну реєстрацію № 201014

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Клубочок: тип ростковості	одноростковий	1	
2	Рослина: плідність	диплоїд	2	
3	Паросток: антоціанове забарвлення	наявне	9	
4	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
5	Паросток: переважає забарвлення (понад 50%)	рожеве	5	
6	Рослина: тип розетки	розлога	5	
7	Листок: за довжиною (черешок з пластинкою)	короткий	3	
8	Листок: черешок за довжиною (відносно довжини пластинки)	середній	5	
9	Листок: за розміром пластинки	середній	5	
10	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
11	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
13	Листкова пластинка: хвилястість країв	помірна	5	
14	Листкова пластинка: характер поверхні	помірно гофрована	5	
15	Листкова пластинка: блиск	сильний	7	
16	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
17	Листкова пластинка: форма верхівки	тупа	2	
18	Черешок: за шириною	широкий	7	
19	Черешок: забарвлення	зелене	2	
20	Черешок: забарвлення основи	білувато-зелене	1	
21	Рослина: квітконосні стебла	наявні	9	
22	Час початку розвитку квітконосного стебла	пізній	7	
23	Коренеплід: розмір	середній	5	
24	Коренеплід: за довжиною	довгий	7	
25	Коренеплід: форма	ширококонічна	3	
26	Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт	заглиблений на 3/4	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднений збір цукру сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		10,3	9,5
Збір цукру, т/га		12,2	11,6
+, - до усередненого збору цукру, т/га		1,8	2,1
+, - до усередненого збору цукру, %		17,8	21,8
Довірчий інтервал (збір цукру), т/га		0,1	0,1
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		56	50,7
Урожайність, т/га		61,2	66,3
+, - до усередненої урожайності, т/га		5,1	15,6
+, - до усередненої урожайності, %		9,1	30,8
Довірчий інтервал, т/га		0,8	1,2
Цукристість, %		20	17
Придатність до механізованого збирання, бал		8	8
Заглиблення коренеплідів у ґрунт, %		87,6	72
Стійкість до цвітушності, бал		9	9
Ураженість коренієм, бал		1	2
Стійкість проти церкоспорозу, бал		8	7
Ураженість кореневими гнилями, бал		1	2
Напрямок використання		ТХН	ТХН

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Буряк цукровий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *altissima* Doell

Заявка № 18069019 Назва сорту: СМАРТ ДЖІНЕВРА КВС **Заявник (код):** 2649 **Власник сорту (код):** 2649

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201009

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Клубочок: тип ростковості	одноростковий	1	
2	Рослина: плоідність	диплоїд	2	
3	Паросток: антоціанове забарвлення	наявне	9	
4	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
5	Паросток: переважаюче забарвлення (понад 50%)	рожеве	5	
6	Рослина: тип розетки	розлога	5	
7	Листок: за довжиною (черешок з пластинкою)	короткий	3	
8	Листок: черешок за довжиною (відносно довжини пластинки)	короткий	3	
9	Листок: за розміром пластинки	середній	5	
10	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
11	Листкова пластинка: за шириною	вузька	3	
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
13	Листкова пластинка: хвилястість країв	слабка	3	
14	Листкова пластинка: характер поверхні	слабко гофрована	3	
15	Листкова пластинка: блиск	помірний	5	
16	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
17	Листкова пластинка: форма верхівки	тупа	2	
18	Черешок: за шириною	вузький	3	
19	Черешок: забарвлення	біле	1	
20	Черешок: забарвлення основи	білувато-зелене	1	
21	Рослина: квітконосні стебла	наявні	9	
22	Час початку розвитку квітконосного стебла	пізній	7	
23	Коренеплід: розмір	середній	5	
24	Коренеплід: за довжиною	середній	5	
25	Коренеплід: форма	ширококонічна	3	
26	Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт	повністю заглиблений	3	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднений збір цукру сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		10,3	9,5
Збір цукру, т/га		13,3	10,9
+, - до усередненого збору цукру, т/га		3	1,4
+, - до усередненого збору цукру, %		28,9	15
Довірчий інтервал (збір цукру), т/га		0,1	0,1
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		56	50,7
Урожайність, т/га		65,4	61,3
+, - до усередненої урожайності, т/га		9,4	10,6
+, - до усередненої урожайності, %		16,8	21
Довірчий інтервал, т/га		0,8	1,2
Цукристість, %		20,3	17,3
Придатність до механізованого збирання, бал		8	9
Заглиблення коренеплідів у ґрунт, %		91	77,2
Стійкість до цвітушності, бал		9	9
Ураженість коренеїдом, бал		1	1
Стійкість проти церкоспорозу, бал		7	6
Ураженість кореневими гнилями, бал		1	2
Напрямок використання		ТХН	ТХН

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Буряк цукровий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *altissima* Doell

Заявка № 18069021 Назва сорту: СМАРТ ІБЕРІЯ КВС Заявник (код): 2649 Власник сорту (код): 2649

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.12.2020

Свідчення про державну реєстрацію № 201011

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Клубочок: тип ростковості	одноростковий	1	
2	Рослина: плідність	диплоїд	2	
3	Паросток: антоціанове забарвлення	наявне	9	
4	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
5	Паросток: переважає забарвлення (понад 50%)	рожеве	5	
6	Рослина: тип розетки	напівпохила	7	
7	Листок: за довжиною (черешок з пластинкою)	короткий	3	
8	Листок: черешок за довжиною (відносно довжини пластинки)	середній	5	
9	Листок: за розміром пластинки	малий	3	
10	Листкова пластинка: за довжиною	коротка	3	
11	Листкова пластинка: за шириною	вузька	3	
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
13	Листкова пластинка: хвилястість країв	слабка	3	
14	Листкова пластинка: характер поверхні	слабко гофрована	3	
15	Листкова пластинка: блиск	помірний	5	
16	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
17	Листкова пластинка: форма верхівки	тупа	2	
18	Черешок: за шириною	вузький	3	
19	Черешок: забарвлення	зелене	2	
20	Черешок: забарвлення основи	білувато-зелене	1	
21	Рослина: квітконосні стебла	наявні	9	
22	Час початку розвитку квітконосного стебла	пізній	7	
23	Коренеплід: розмір	середній	5	
24	Коренеплід: за довжиною	довгий	7	
25	Коренеплід: форма	овально-конічна	5	
26	Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт	повністю заглиблений	3	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднений збір цукру сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		10,3	9,5
Збір цукру, т/га		12,3	10,6
+, - до усередненого збору цукру, т/га		2	1,1
+, - до усередненого збору цукру, %		18,9	11,9
Довірчий інтервал (збір цукру), т/га		0,1	0,1
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		56	50,7
Урожайність, т/га		60,4	61,5
+, - до усередненої урожайності, т/га		4,4	10,8
+, - до усередненої урожайності, %		7,8	21,2
Довірчий інтервал, т/га		0,8	1,2
Цукристість, %		20,3	17
Придатність до механізованого збирання, бал		8	9
Заглиблення коренеплідів у ґрунт, %		91,2	83,3
Стійкість до цвітушності, бал		9	9
Ураженість коренієм, бал		1	1
Стійкість проти церкоспорозу, бал		7	6
Ураженість кореневими гнилями, бал		1	2
Напрямок використання		ТХН	ТХН

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Буряк цукровий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *altissima* Doell

Заявка № 18069015 Назва сорту: СМАРТ ЛАТОРІЯ КВС **Заявник (код):** 2649 **Власник сорту (код):** 2649

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201007

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Клубочок: тип ростковості	одноростковий	1	
2	Рослина: плоідність	диплоїд	2	
3	Паросток: антоціанове забарвлення	наявне	9	
4	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
5	Паросток: переважаюче забарвлення (понад 50%)	рожеве	5	
6	Рослина: тип розетки	розлога	5	
7	Листок: за довжиною (черешок з пластинкою)	короткий	3	
8	Листок: черешок за довжиною (відносно довжини пластинки)	дуже короткий	1	
9	Листок: за розміром пластинки	середній	5	
10	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
11	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
13	Листкова пластинка: хвилястість країв	слабка	3	
14	Листкова пластинка: характер поверхні	слабко гофрована	3	
15	Листкова пластинка: блиск	сильний	7	
16	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
17	Листкова пластинка: форма верхівки	тупа	2	
18	Черешок: за шириною	середній	5	
19	Черешок: забарвлення	біле	1	
20	Черешок: забарвлення основи	білувато-зелене	1	
21	Рослина: квітконосні стебла	наявні	9	
22	Час початку розвитку квітконосного стебла	пізній	7	
23	Коренеплід: розмір	середній	5	
24	Коренеплід: за довжиною	довгий	7	
25	Коренеплід: форма	ширококонічна	3	
26	Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт	повністю заглиблений	3	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднений збір цукру сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		10,3	9,5
Збір цукру, т/га		13,2	11
+, - до усередненого збору цукру, т/га		2,9	1,5
+, - до усередненого збору цукру, %		28,3	15,7
Довірчий інтервал (збір цукру), т/га		0,1	0,1
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		56	50,7
Урожайність, т/га		65	64
+, - до усередненої урожайності, т/га		9	13,3
+, - до усередненої урожайності, %		16,1	26,3
Довірчий інтервал, т/га		0,8	1,2
Цукристість, %		20,3	16,9
Придатність до механізованого збирання, бал		7	9
Заглиблення коренеплідів у ґрунт, %		87,6	80,2
Стійкість до цвітушності, бал		9	9
Ураженість коренеїдом, бал		1	1
Стійкість проти церкоспорозу, бал		7	7
Ураженість кореневими гнилями, бал		1	2
Напрямок використання		ТХН	ТХН

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Буряк цукровий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *altissima* Doell

Заявка № 18069025 Назва сорту: СМАРТ ЛЕОНА КВС Заявник (код): 2649 Власник сорту (код): 2649

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.12.2020

Свідство про державну реєстрацію № 201013

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Клубочок: тип ростковості	одноростковий	1	
2	Рослина: плоідність	диплоїд	2	
3	Паросток: антоціанове забарвлення	наявне	9	
4	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
5	Паросток: переважає забарвлення (понад 50%)	рожеве	5	
6	Рослина: тип розетки	розлога	5	
7	Листок: за довжиною (черешок з пластинкою)	короткий	3	
8	Листок: черешок за довжиною (відносно довжини пластинки)	короткий	3	
9	Листок: за розміром пластинки	малий	3	
10	Листкова пластинка: за довжиною	коротка	3	
11	Листкова пластинка: за шириною	вузька	3	
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
13	Листкова пластинка: хвилястість країв	слабка	3	
14	Листкова пластинка: характер поверхні	помірно гофрована	5	
15	Листкова пластинка: блиск	помірний	5	
16	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
17	Листкова пластинка: форма верхівки	тупа	2	
18	Черешок: за шириною	вузький	3	
19	Черешок: забарвлення	зелене	2	
20	Черешок: забарвлення основи	білувато-зелене	1	
21	Рослина: квітконосні стебла	наявні	9	
22	Час початку розвитку квітконосного стебла	пізній	7	
23	Коренеплід: розмір	великий	7	
24	Коренеплід: за довжиною	середній	5	
25	Коренеплід: форма	ширококонічна	3	
26	Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт	заглиблений на 3/4	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднений збір цукру сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		10,3	9,5
Збір цукру, т/га		14,1	12,1
+, - до усередненого збору цукру, т/га		3,8	2,6
+, - до усередненого збору цукру, %		36,8	27
Довірчий інтервал (збір цукру), т/га		0,1	0,1
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		56	50,7
Урожайність, т/га		69	65,9
+, - до усередненої урожайності, т/га		12,9	15,2
+, - до усередненої урожайності, %		23,1	30
Довірчий інтервал, т/га		0,8	1,2
Цукристість, %		20,5	17,8
Придатність до механізованого збирання, бал		8	9
Заглиблення коренеплідів у ґрунт, %		88,6	80,2
Стійкість до цвітущості, бал		9	9
Ураженість коренеїдом, бал		1	2
Стійкість проти церкоспорозу, бал		7	7
Ураженість кореневими гнилями, бал		1	2
Напрямок використання		ТХН	ТХН

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Буряк цукровий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *altissima* Doell

Заявка № 18069016 Назва сорту: СМАРТ ЯСНА КВС **Заявник (код):** 2649 **Власник сорту (код):** 2649

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201008

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Клубочок: тип ростковості	одноростковий	1	
2	Рослина: плоідність	диплоїд	2	
3	Паросток: антоціанове забарвлення	наявне	9	
4	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
5	Паросток: переважаюче забарвлення (понад 50%)	рожеве	5	
6	Рослина: тип розетки	напіврозлога	3	
7	Листок: за довжиною (черешок з пластинкою)	середній	5	
8	Листок: черешок за довжиною (відносно довжини пластинки)	середній	5	
9	Листок: за розміром пластинки	середній	5	
10	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
11	Листкова пластинка: за шириною	вузька	3	
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
13	Листкова пластинка: хвилястість країв	помірна	5	
14	Листкова пластинка: характер поверхні	помірно гофрована	5	
15	Листкова пластинка: блиск	помірний	5	
16	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
17	Листкова пластинка: форма верхівки	тупа	2	
18	Черешок: за шириною	середній	5	
19	Черешок: забарвлення	біле	1	
20	Черешок: забарвлення основи	білувато-зелене	1	
21	Рослина: квітконосні стебла	наявні	9	
22	Час початку розвитку квітконосного стебла	пізній	7	
23	Коренеплід: розмір	середній	5	
24	Коренеплід: за довжиною	довгий	7	
25	Коренеплід: форма	ширококонічна	3	
26	Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт	повністю заглиблений	3	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднений збір цукру сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		10,3	9,5
Збір цукру, т/га		12,9	10
+, - до усередненого збору цукру, т/га		2,6	0,5
+, - до усередненого збору цукру, %		25	5,7
Довірчий інтервал (збір цукру), т/га		0,1	0,1
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		56	50,7
Урожайність, т/га		63,1	60,2
+, - до усередненої урожайності, т/га		7,1	9,5
+, - до усередненої урожайності, %		12,7	18,7
Довірчий інтервал, т/га		0,8	1,2
Цукристість, %		20,5	16,6
Придатність до механізованого збирання, бал		8	9
Заглиблення коренеплідів у ґрунт, %		88,9	82
Стійкість до цвітущості, бал		9	9
Ураженість коренеюдом, бал		1	2
Стійкість проти церкоспорозу, бал		6	6
Ураженість кореневими гнилями, бал		1	1
Напрямок використання		ТХН	ТХН

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Буряк цукровий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *altissima* Doell

Заявка № 18069033 Назва сорту: ФДР19Б1123 Заявник (код): 796 Власник сорту (код): 796

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.12.2020

Свідчення про державну реєстрацію № 201143

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Клубочок: тип ростковості	одноростковий	1	
2	Рослина: плоідність	диплоїд	2	
3	Паросток: антоціанове забарвлення	наявне	9	
4	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
5	Паросток: переважає забарвлення (понад 50%)	рожеве	5	
6	Рослина: тип розетки	напіврозлога	3	
7	Листок: за довжиною (черешок з пластинкою)	середній	5	
8	Листок: черешок за довжиною (відносно довжини пластинки)	середній	5	
9	Листок: за розміром пластинки	середній	5	
10	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
11	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
13	Листкова пластинка: хвилястість країв	помірна	5	
14	Листкова пластинка: характер поверхні	помірно гофрована	5	
15	Листкова пластинка: блиск	помірний	5	
16	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
17	Листкова пластинка: форма верхівки	гостра	1	
18	Черешок: за шириною	середній	5	
19	Черешок: забарвлення	біле	1	
20	Черешок: забарвлення основи	білувато-зелене	1	
21	Рослина: квітконосні стебла	відсутні	1	
22	Час початку розвитку квітконосного стебла	ознака не визначається	0	
23	Коренеплід: розмір	середній	5	
24	Коренеплід: за довжиною	середній	5	
25	Коренеплід: форма	ширококонічна	3	
26	Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт	заглиблений на 3/4	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднений збір цукру сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		10,3	9,5
Збір цукру, т/га		12	10,5
+, - до усередненого збору цукру, т/га		1,7	1
+, - до усередненого збору цукру, %		16,1	10,9
Довірчий інтервал (збір цукру), т/га		0,1	0,1
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		56	50,7
Урожайність, т/га		58,3	60
+, - до усередненої урожайності, т/га		2,3	9,3
+, - до усередненої урожайності, %		4,1	18,3
Довірчий інтервал, т/га		0,8	1,2
Цукристість, %		20,5	17,4
Придатність до механізованого збирання, бал		8	9
Заглиблення коренеплідів у ґрунт, %		90,8	80
Стійкість до цвітушності, бал		9	9
Ураженість коренієм, бал		1	1
Стійкість проти церкоспорозу, бал		7	6
Ураженість кореневими гнилями, бал		1	2
Напрямок використання		ТХН	ТХН

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Буряк цукровий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *altissima* Doell

Заявка № 18069034 **Назва сорту:** ФДР19Б2094 **Заявник (код):** 796 **Власник сорту (код):** 796

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201144

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Клубочок: тип ростковості	одноростковий	1	
2	Рослина: плоідність	диплоїд	2	
3	Паросток: антоціанове забарвлення	наявне	9	
4	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
5	Паросток: переважаюче забарвлення (понад 50%)	оранжеве	4	
6	Рослина: тип розетки	напіврозлога	3	
7	Листок: за довжиною (черешок з пластинкою)	середній	5	
8	Листок: черешок за довжиною (відносно довжини пластинки)	середній	5	
9	Листок: за розміром пластинки	середній	5	
10	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
11	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
13	Листкова пластинка: хвилястість країв	помірна	5	
14	Листкова пластинка: характер поверхні	помірно гофрована	5	
15	Листкова пластинка: блиск	помірний	5	
16	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
17	Листкова пластинка: форма верхівки	гостра	1	
18	Черешок: за шириною	середній	5	
19	Черешок: забарвлення	біле	1	
20	Черешок: забарвлення основи	білувато-зелене	1	
21	Рослина: квітконосні стебла	відсутні	1	
22	Час початку розвитку квітконосного стебла	ознака не визначається	0	
23	Коренеплід: розмір	середній	5	
24	Коренеплід: за довжиною	середній	5	
25	Коренеплід: форма	овально-конічна	5	
26	Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт	заглиблений на 3/4	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднений збір цукру сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		10,3	9,5
Збір цукру, т/га		12,2	9,9
+, - до усередненого збору цукру, т/га		1,9	0,4
+, - до усередненого збору цукру, %		18	4,2
Довірчий інтервал (збір цукру), т/га		0,1	0,1
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		56	50,7
Урожайність, т/га		59	58,3
+, - до усередненої урожайності, т/га		3	7,6
+, - до усередненої урожайності, %		5,3	15
Довірчий інтервал, т/га		0,8	1,2
Цукристість, %		20,7	16,7
Придатність до механізованого збирання, бал		8	9
Заглиблення коренеплідів у ґрунт, %		89,3	79
Стійкість до цвітушності, бал		9	9
Ураженість коренідом, бал		1	1
Стійкість проти церкоспорозу, бал		5	7
Ураженість кореневими гнилями, бал		1	2
Напрямок використання		тхн	тхн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Буряк цукровий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *altissima* Doell

Заявка № 18069035 Назва сорту: ФДР19Б4027 Заявник (код): 796 Власник сорту (код): 796

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.12.2020

Свідчення про державну реєстрацію № 201145

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Клубочок: тип ростковості	одноростковий	1	
2	Рослина: плоідність	диплоїд	2	
3	Паросток: антоціанове забарвлення	наявне	9	
4	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
5	Паросток: переважає забарвлення (понад 50%)	рожеве	5	
6	Рослина: тип розетки	розлога	5	
7	Листок: за довжиною (черешок з пластинкою)	середній	5	
8	Листок: черешок за довжиною (відносно довжини пластинки)	середній	5	
9	Листок: за розміром пластинки	середній	5	
10	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
11	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
13	Листкова пластинка: хвилястість країв	слабка	3	
14	Листкова пластинка: характер поверхні	помірно гофрована	5	
15	Листкова пластинка: блиск	помірний	5	
16	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
17	Листкова пластинка: форма верхівки	гостра	1	
18	Черешок: за шириною	середній	5	
19	Черешок: забарвлення	біле	1	
20	Черешок: забарвлення основи	білувато-зелене	1	
21	Рослина: квітконосні стебла	відсутні	1	
22	Час початку розвитку квітконосного стебла	ознака не визначається	0	
23	Коренеплід: розмір	середній	5	
24	Коренеплід: за довжиною	середній	5	
25	Коренеплід: форма	ширококонічна	3	
26	Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт	заглиблений на 3/4	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднений збір цукру сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		10,3	9,5
Збір цукру, т/га		12,1	10,3
+, - до усередненого збору цукру, т/га		1,8	0,8
+, - до усередненого збору цукру, %		17	8
Довірчий інтервал (збір цукру), т/га		0,1	0,1
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		56	50,7
Урожайність, т/га		57,5	56
+, - до усередненої урожайності, т/га		1,4	5,3
+, - до усередненої урожайності, %		2,6	10,5
Довірчий інтервал, т/га		0,8	1,2
Цукристість, %		21,1	17,8
Придатність до механізованого збирання, бал		8	9
Заглиблення коренеплідів у ґрунт, %		90,2	80,5
Стійкість до цвітущості, бал		9	9
Ураженість коренеюдомом, бал		1	1
Стійкість проти церкоспорозу, бал		7	7
Ураженість кореневими гнилями, бал		1	2
Напрямок використання		ТХН	ТХН

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ: КАРТОПЛЯ

Картопля



Вид: Картопля *Solanum tuberosum* L.**Заявка № 18088018 Назва сорту:** 7 ФОР 7 **Заявник (код):** 801 **Власник сорту (код):** 801**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 30.11.2020**Свідчення про державну реєстрацію № 200882****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Світловий паросток: розмір	середній	5	
2	Світловий паросток: форма	широкоциліндрична	4	
3	Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення основи	сильна	7	
4	Світловий паросток: співвідношення блакитного в антоціановому забарвленні основи	середнє	2	
5	Світловий паросток: опушення основи	помірне	5	
6	Світловий паросток: розмір верхівки порівняно з основою	мала	3	
7	Світловий паросток: форма верхівки	закрита	1	
8	Світловий паросток: антоціанове забарвлення верхівки	слабке	3	
9	Світловий паросток: опушення верхівки	слабке	3	
10	Світловий паросток: кількість кореневих кінчиків	середня кількість	5	
11	Світловий паросток: бічні пагони за довжиною	короткі	3	
12	Рослина: тип розвитку	проміжний	2	
13	Рослина: габітус	напіврозлогий	5	
14	Стебло: антоціанове забарвлення	помірне	5	
15	Листок: загальний розмір	середній	5	
16	Листок: за відкритістю	проміжний	3	
17	Листок: виявлення вторинних листочків	слабке	3	
18	Листок: зелене забарвлення	помірне	5	
19	Листок: поширення антоціанового забарвлення жилок на верхньому боці	слабке	3	
20	Друга пара бічних листочків: розмір	дуже великий	9	
21	Друга пара бічних листочків: за шириною	вузькі	3	
22	Верхівкові і бічні листочки: частота зрощення	рідко	3	
23	Листочок: хвилястість краю	помірна	5	
24	Листочок: заглиблення жилок	глибоке	7	
25	Листочок: глянуватість верхнього боку	глянуватий	7	
26	Листочок: опушення пластинки на верхівці розетки	наявне	9	
27	Бутон: антоціанове забарвлення	слабке	3	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: рясність цвітіння	обрідне	3	
30	Суцвіття: розмір	середній	5	
31	Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки	помірне	5	
32	Віночок квітки: розмір	середній	5	
33	Віночок квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення внутрішнього боку	помірна	5	
34	Віночок квітки: співвідношення блакитного у антоціановому забарвленні внутрішнього боку	відсутнє або мале	1	
35	Віночок: поширення антоціанового забарвлення на внутрішньому боці	велике	7	
36	Рослина: час досягання	ранній	3	
37	Бульба: форма	короткоовальна	2	
38	Бульба: вічка за глибиною	мілкі	3	
39	Бульба: забарвлення шкірки	жовте	2	
40	Бульба: забарвлення основи вічка	жовте	2	
41	Бульба: забарвлення м'якоті	біле	1	
42	Лише сорти із світло-бежевою і жовтою шкіркою. Бульба: антоціанове забарвлення шкірки під впливом світла	відсутнє або дуже слабке	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		22,92	20,87
Урожайність, т/га		23,4	17,59
+, - до усередненої урожайності, т/га		0,48	-3,28
+, - до усередненої урожайності, %		2,1	-15,7
Довірчий інтервал, т/га		4,16	2,49
Тривалість періоду вегетації, днів		95	80
Середня маса товарної бульби, г		94,6	99,8
Вміст крохмалю, %		14,3	13,3
Збір крохмалю, т/га		37,8	26,6
Вміст сухої речовини, %		21,8	20,2
Дегустаційна оцінка, бал		6	4
Придатність до механізованого збирання, бал		9	9
Лежкість, бал		7	8
Товарність бульб, %		76,1	88,5
Стійкість проти макроспоріозу, бал		7	9
Стійкість проти фітофторозу, бал		4	3
Стійкість до звичайного патотипу раку, 1 - нестійкий, 9 - стійкий, бал		9	9
Блок (Група стиглості)		7	7
Напрямок використання		стл	стл
Якість		ск	ск

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.

Вид: Картопля *Solanum tuberosum* L.

Заявка № 18088020 Назва сорту: АЛЮЕТТ Заявник (код): 1652 Власник сорту (код): 1652

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 04.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201018

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Світловий паросток: розмір	великий	7	
2	Світловий паросток: форма	яйцеподібна	2	
3	Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення основи	сильна	7	
4	Світловий паросток: співвідношення блакитного в антоціановому забарвленні основи	середнє	2	
5	Світловий паросток: опушення основи	сильне	7	
6	Світловий паросток: розмір верхівки порівняно з основою	середня	5	
7	Світловий паросток: форма верхівки	відкрита	5	
8	Світловий паросток: антоціанове забарвлення верхівки	помірне	5	
9	Світловий паросток: опушення верхівки	помірне	5	
10	Світловий паросток: кількість кореневих кінчиків	середня кількість	5	
11	Світловий паросток: бічні пагони за довжиною	середні	5	
12	Рослина: тип розвитку	стебловий	1	
13	Рослина: габітус	прямий	3	
14	Стебло: антоціанове забарвлення	сильне	7	
15	Листок: загальний розмір	середній	5	
16	Листок: за відкритістю	проміжний	3	
17	Листок: виявлення вторинних листочків	помірне	5	
18	Листок: зелене забарвлення	темне	7	
19	Листок: поширення антоціанового забарвлення жилок на верхньому боці	сильне	7	
20	Друга пара бічних листочків: розмір	дуже великий	9	
21	Друга пара бічних листочків: за шириною	середні	5	
22	Верхівкові і бічні листочки: частота зрощення	часто	7	
23	Листочок: хвилястість краю	помірна	5	
24	Листочок: заглиблення жилок	середнє	5	
25	Листочок: глянуватість верхнього боку	помірно глянуватий	5	
26	Листочок: опушення пластинки на верхівці розетки	наявне	9	
27	Бутон: антоціанове забарвлення	сильне	7	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: яскравість цвітіння	яскраве	7	
30	Суцвіття: розмір	великий	7	
31	Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки	дуже сильне	9	
32	Віночок квітки: розмір	великий	7	
33	Віночок квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення внутрішнього боку	сильна	7	
34	Віночок квітки: співвідношення блакитного у антоціановому забарвленні внутрішнього боку	відсутнє або мале	1	
35	Віночок: поширення антоціанового забарвлення на внутрішньому боці	велике	7	
36	Рослина: час досягання	середній	5	
37	Бульба: форма	короткоовальна	2	
38	Бульба: вічка за глибиною	мілкі	3	
39	Бульба: забарвлення шкірки	червоне	3	
40	Бульба: забарвлення основи вічка	червоне	3	
41	Бульба: забарвлення м'якоті	темно-жовте	5	
42	Лише сорти із світло-бежевою і жовтою шкіркою. Бульба: антоціанове забарвлення шкірки під впливом світла	ознака не визначається	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		22,96	19,03
Урожайність, т/га		25,11	28,14
+, - до усередненої урожайності, т/га		2,15	9,11
+, - до усередненої урожайності, %		9,4	47,9
Довірчий інтервал, т/га		1,7	0,73
Тривалість періоду вегетації, діб		110	96
Середня маса товарної бульби, г		92,7	98,5
Вміст крохмалю, %		15,2	15,3
Збір крохмалю, т/га		37,4	43,3
Вміст сухої речовини, %		23,3	22,9
Дегустаційна оцінка, бал		7	6
Придатність до механізованого збирання, бал		8	9
Лежкість, бал		7	9
Товарність бульб, %		77,8	87,1
Стійкість проти макроспоріозу, бал		7	9
Стійкість проти фітофторозу, бал		7	4
Стійкість до звичайного патотипу раку, 1 - нестійкий, 9 - стійкий, бал		9	9
Блок (група стиглості)		8	8
Напрямок використання		унів	унів
Якість		ск	ск

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Картопля *Solanum tuberosum* L.**Заявка № 17088005 Назва сорту:** Княжа **Заявник (код):** 369 **Власник сорту (код):** 369**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 16.12.2020**Свідчення про державну реєстрацію № 201160****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Світловий паросток: розмір	великий	7	
2	Світловий паросток: форма	сферична	1	
3	Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення основи	слабка	3	
4	Світловий паросток: співвідношення блакитного в антоціановому забарвленні основи	відсутнє або дуже мале	1	
5	Світловий паросток: опушення основи	відсутнє або дуже слабке	1	
6	Світловий паросток: розмір верхівки порівняно з основою	середня	5	
7	Світловий паросток: форма верхівки	проміжна	3	
8	Світловий паросток: антоціанове забарвлення верхівки	відсутнє або дуже слабке	1	
9	Світловий паросток: опушення верхівки	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Світловий паросток: кількість кореневих кінчиків	мало	3	
11	Світловий паросток: бічні пагони за довжиною	короткі	3	
12	Рослина: тип розвитку	листяний	3	
13	Рослина: габітус	напіврозлогий	5	
14	Стебло: антоціанове забарвлення	слабке	3	
15	Листок: загальний розмір	малий	3	
16	Листок: за відкритістю	проміжний	3	
17	Листок: виявлення вторинних листочків	помірне	5	
18	Листок: зелене забарвлення	помірне	5	
19	Листок: поширення антоціанового забарвлення жилок на верхньому боці	слабке	3	
20	Друга пара бічних листочків: розмір	дуже великий	9	
21	Друга пара бічних листочків: за шириною	середні	5	
22	Верхівкові і бічні листочки: частота зрощення	рідко	3	
23	Листочок: хвилястість краю	помірна	5	
24	Листочок: заглиблення жилок	глибоке	7	
25	Листочок: глянуватість верхнього боку	глянуватий	7	
26	Листочок: опушення пластинки на верхівці розетки	наявне	9	
27	Бутон: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: рясність цвітіння	рясне	7	
30	Суцвіття: розмір	великий	7	
31	Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки	відсутнє або дуже слабке	1	
32	Віночок квітки: розмір	великий	7	
33	Віночок квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення внутрішнього боку	відсутнє або дуже слабка	1	
34	Віночок квітки: співвідношення блакитного у антоціановому забарвленні внутрішнього боку	відсутнє або мале	1	
35	Віночок: поширення антоціанового забарвлення на внутрішньому боці	відсутнє або дуже мале	1	
36	Рослина: час досягання	середній	5	
37	Бульба: форма	куляста	1	
38	Бульба: вічка за глибиною	глибокі	7	
39	Бульба: забарвлення шкірки	жовте	2	
40	Бульба: забарвлення основи вічка	жовте	2	
41	Бульба: забарвлення м'якоті	світло-жовте	3	
42	Лише сорти із світло-бежевою і жовтою шкіркою. Бульба: антоціанове забарвлення шкірки під впливом світла	дуже сильне	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		22,96	19,03
Урожайність, т/га		18,05	18,88
+, - до усередненої урожайності, т/га		-4,91	-0,15
+, - до усередненої урожайності, %		-21,4	-0,8
Довірчий інтервал, т/га		1,7	0,73
Тривалість періоду вегетації, діб		109	97
Середня маса товарної бульби, г		85,3	94,2
Вміст крохмалю, %		16,9	15,7
Збір крохмалю, т/га		30	29,4
Вміст сухої речовини, %		25,5	23,1
Дегустаційна оцінка, бал		6	6
Придатність до механізованого збирання, бал		8	9
Лежкість, бал		7	7
Товарність бульб, %		69,7	82,9
Стійкість проти макроспоріозу, бал		7	8
Стійкість проти фітофторозу, бал		6	3
Стійкість до звичайного патотипу раку, 1 - нестійкий, 9 - стійкий, бал		9	9
Блок (Група стиглості)		8	8
Напрямок використання		стл	стл
Якість		пк	ск

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Картопля *Solanum tuberosum* L.

Заявка № 18088024 Назва сорту: ЛАУДІН Заявник (код): 1652 Власник сорту (код): 1652

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 04.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201022

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Світловий паросток: розмір	великий	7	
2	Світловий паросток: форма	яйцеподібна	2	
3	Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення основи	помірна	5	
4	Світловий паросток: співвідношення блакитного в антоціановому забарвленні основи	відсутнє або дуже мале	1	
5	Світловий паросток: опушення основи	слабке	3	
6	Світловий паросток: розмір верхівки порівняно з основою	мала	3	
7	Світловий паросток: форма верхівки	проміжна	3	
8	Світловий паросток: антоціанове забарвлення верхівки	слабке	3	
9	Світловий паросток: опушення верхівки	слабке	3	
10	Світловий паросток: кількість кореневих кінчиків	мало	3	
11	Світловий паросток: бічні пагони за довжиною	середні	5	
12	Рослина: тип розвитку	проміжний	2	
13	Рослина: габітус	розлогий	7	
14	Стебло: антоціанове забарвлення	слабке	3	
15	Листок: загальний розмір	середній	5	
16	Листок: за відкритістю	проміжний	3	
17	Листок: виявлення вторинних листочків	помірне	5	
18	Листок: зелене забарвлення	помірне	5	
19	Листок: поширення антоціанового забарвлення жилок на верхньому боці	слабке	3	
20	Друга пара бічних листочків: розмір	дуже великий	9	
21	Друга пара бічних листочків: за шириною	широкі	7	
22	Верхівкові і бічні листочки: частота зрощення	середньо	5	
23	Листочок: хвилястість краю	слабка	3	
24	Листочок: заглиблення жилок	середнє	5	
25	Листочок: глянуватість верхнього боку	помірно глянуватий	5	
26	Листочок: опушення пластинки на верхівці розетки	наявне	9	
27	Бутон: антоціанове забарвлення	середнє	5	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: яскравість цвітіння	помірне	5	
30	Суцвіття: розмір	середній	5	
31	Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки	слабке	3	
32	Віночок квітки: розмір	середній	5	
33	Віночок квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення внутрішнього боку	відсутнє або дуже слабка	1	
34	Віночок квітки: співвідношення блакитного у антоціановому забарвленні внутрішнього боку	відсутнє або мале	1	
35	Віночок: поширення антоціанового забарвлення на внутрішньому боці	відсутнє або дуже мале	1	
36	Рослина: час досягання	середній	5	
37	Бульба: форма	короткоовальна	2	
38	Бульба: вічка за глибиною	мілкі	3	
39	Бульба: забарвлення шкірки	жовте	2	
40	Бульба: забарвлення основи вічка	жовте	2	
41	Бульба: забарвлення м'якоті	темно-жовте	5	
42	Лише сорти із світло-бежевою і жовтою шкіркою. Бульба: антоціанове забарвлення шкірки під впливом світла	слабке	3	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		22,96	19,03
Урожайність, т/га		25,35	17,41
+, - до усередненої урожайності, т/га		2,39	-1,62
+, - до усередненої урожайності, %		10,4	-8,5
Довірчий інтервал, т/га		1,7	0,73
Тривалість періоду вегетації, діб		112	89
Середня маса товарної бульби, г		90,6	79,8
Вміст крохмалю, %		16,3	13,7
Збір крохмалю, т/га		41,3	24,1
Вміст сухої речовини, %		24,8	20,6
Дегустаційна оцінка, бал		6	6
Придатність до механізованого збирання, бал		8	9
Лежкість, бал		7	9
Товарність бульб, %		79,5	77
Стійкість проти макроспоріозу, бал		7	8
Стійкість проти фітофторозу, бал		7	3
Стійкість до звичайного патотипу раку, 1 - нестійкий, 9 - стійкий, бал		9	9
Блок (група стиглості)		8	8
Напрямок використання		стл	стл
Якість		пк	ск

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.

Вид: Картопля *Solanum tuberosum* L.**Заявка № 18088016 Назва сорту:** Містерія **Заявник (код):** 1710 **Власник сорту (код):** 1710**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 10.12.2020 **Патент №** 200755**Дата пріоритету:** 02.11.2018**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 10.12.2020**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 201161**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Світловий паросток: розмір	середній	5	
2	Світловий паросток: форма	сферична	1	
3	Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення основи	дуже сильна	9	
4	Світловий паросток: співвідношення блакитного в антоціановому забарвленні основи	велике	3	
5	Світловий паросток: опушення основи	дуже сильне	9	
6	Світловий паросток: розмір верхівки порівняно з основою	середня	5	
7	Світловий паросток: форма верхівки	закрита	1	
8	Світловий паросток: антоціанове забарвлення верхівки	сильне	7	
9	Світловий паросток: опушення верхівки	дуже сильне	9	
10	Світловий паросток: кількість кореневих кінчиків	мало	3	
11	Світловий паросток: бічні пагони за довжиною	середні	5	
12	Рослина: тип розвитку	проміжний	2	
13	Рослина: габітус	напіврозлогий	5	
14	Стебло: антоціанове забарвлення	сильне	7	
15	Листок: загальний розмір	середній	5	
16	Листок: за відкритістю	проміжний	3	
17	Листок: виявлення вторинних листочків	помірне	5	
18	Листок: зелене забарвлення	помірне	5	
19	Листок: поширення антоціанового забарвлення жилок на верхньому боці	сильне	7	
20	Друга пара бічних листочків: розмір	дуже великий	9	
21	Друга пара бічних листочків: за шириною	середні	5	
22	Верхівкові і бічні листочки: частота зрощення	відсутні або дуже рідко	1	
23	Листочок: хвилястість краю	помірна	5	
24	Листочок: заглиблення жилок	середнє	5	
25	Листочок: глянуватість верхнього боку	помірно глянуватий	5	
26	Листочок: опушення пластинки на верхівці розетки	наявне	9	
27	Бутон: антоціанове забарвлення	слабке	3	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: рясність цвітіння	помірне	5	
30	Суцвіття: розмір	середній	5	
31	Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки	помірне	5	
32	Віночок квітки: розмір	великий	7	
33	Віночок квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення внутрішнього боку	помірна	5	
34	Віночок квітки: співвідношення блакитного у антоціановому забарвленні внутрішнього боку	відсутнє або мале	1	
35	Віночок: поширення антоціанового забарвлення на внутрішньому боці	середнє	5	
36	Рослина: час досягання	середній	5	
37	Бульба: форма	куляста	1	
38	Бульба: вічка за глибиною	мілкі	3	
39	Бульба: забарвлення шкірки	чорно-фіолетове	8	
40	Бульба: забарвлення основи вічка	жовте	2	
41	Бульба: забарвлення м'якоті	світло-жовте	3	
42	Лише сорти із світло-бежевою і жовтою шкіркою. Бульба: антоціанове забарвлення шкірки під впливом світла	ознака не визначається	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га			
Урожайність, т/га	22,96	19,03	
+, - до усередненої урожайності, т/га	17,69	21,07	
+, - до усередненої урожайності, %	-5,27	2,04	
Довірчий інтервал, т/га	-23	10,7	
Тривалість періоду вегетації, діб	1,7	0,73	
Середня маса товарної бульби, г	108	94	
Вміст крохмалю, %	109,5	110,2	
Збір крохмалю, т/га	14,9	13,2	
Вміст сухої речовини, %	28,1	28,4	
Дегустаційна оцінка, бал	23	21,1	
Придатність до механізованого збирання, бал	5	4	
Лежкість, бал	9	9	
Товарність бульб, %	6	9	
Стійкість проти макроспоріозу, бал	81,8	83,2	
Стійкість проти фітофторозу, бал	7	8	
Стійкість до звичайного патотипу раку, 1 - нестійкий, 9 - стійкий, бал	6	6	
Блок (група стиглості)	9	9	
Напрямок використання	8	8	
Якість	стл	стл	
	ск	ск	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: П.

Вид: Картопля *Solanum tuberosum* L.

Заявка № 18088021 Назва сорту: ПАРАДІЗО Заявник (код): 1652 Власник сорту (код): 1652

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 04.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201019

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Світловий паросток: розмір	великий	7	
2	Світловий паросток: форма	конічна	3	
3	Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення основи	слабка	3	
4	Світловий паросток: співвідношення блакитного в антоціановому забарвленні основи	відсутнє або дуже мале	1	
5	Світловий паросток: опушення основи	слабке	3	
6	Світловий паросток: розмір верхівки порівняно з основою	мала	3	
7	Світловий паросток: форма верхівки	закрита	1	
8	Світловий паросток: антоціанове забарвлення верхівки	помірне	5	
9	Світловий паросток: опушення верхівки	слабке	3	
10	Світловий паросток: кількість кореневих кінчиків	мало	3	
11	Світловий паросток: бічні пагони за довжиною	короткі	3	
12	Рослина: тип розвитку	стебловий	1	
13	Рослина: габітус	прямий	3	
14	Стебло: антоціанове забарвлення	сильне	7	
15	Листок: загальний розмір	малий	3	
16	Листок: за відкритістю	закритий	1	
17	Листок: виявлення вторинних листочків	слабке	3	
18	Листок: зелене забарвлення	помірне	5	
19	Листок: поширення антоціанового забарвлення жилок на верхньому боці	помірне	5	
20	Друга пара бічних листочків: розмір	дуже великий	9	
21	Друга пара бічних листочків: за шириною	середній	5	
22	Верхівкові і бічні листочки: частота зрощення	середньо	5	
23	Листочок: хвилястість краю	відсутня або дуже слабка	1	
24	Листочок: заглиблення жилок	середнє	5	
25	Листочок: глянуватість верхнього боку	не глянуватий	3	
26	Листочок: опушення пластинки на верхівці розетки	наявне	9	
27	Бутон: антоціанове забарвлення	середнє	5	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: яскравість цвітіння	рясне	7	
30	Суцвіття: розмір	середній	5	
31	Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки	помірне	5	
32	Віночок квітки: розмір	великий	7	
33	Віночок квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення внутрішнього боку	помірна	5	
34	Віночок квітки: співвідношення блакитного у антоціановому забарвленні внутрішнього боку	відсутнє або мале	1	
35	Віночок: поширення антоціанового забарвлення на внутрішньому боці	середнє	5	
36	Рослина: час досягання	середній	5	
37	Бульба: форма	овальна	3	
38	Бульба: вічка за глибиною	мілкі	3	
39	Бульба: забарвлення шкірки	жовте	2	
40	Бульба: забарвлення основи вічка	жовте	2	
41	Бульба: забарвлення м'якоті	світло-жовте	3	
42	Лише сорти із світло-бежевою і жовтою шкіркою. Бульба: антоціанове забарвлення шкірки під впливом світла	сильне	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		22,96	19,03
Урожайність, т/га		26,41	28,7
+, - до усередненої урожайності, т/га		3,45	9,67
+, - до усередненої урожайності, %		15	50,8
Довірчий інтервал, т/га		1,7	0,73
Тривалість періоду вегетації, діб		109	96
Середня маса товарної бульби, г		99	99,3
Вміст крохмалю, %		13,9	11,5
Збір крохмалю, т/га		37,2	33,2
Вміст сухої речовини, %		21,2	18,4
Дегустаційна оцінка, бал		7	5
Придатність до механізованого збирання, бал		8	9
Лежкість, бал		7	9
Товарність бульби, %		76,6	89,3
Стійкість проти макроспоріозу, бал		7	9
Стійкість проти фітофторозу, бал		7	6
Стійкість до звичайного патотипу раку, 1 - нестійкий, 9 - стійкий, бал		9	9
Блок (група стиглості)		8	8
Напрямок використання		стл	стл
Якість		ск	нк

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Картопля *Solanum tuberosum* L.**Заявка №** 18088023 **Назва сорту:** РАНОМІ **Заявник (код):** 1652 **Власник сорту (код):** 1652**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 04.12.2020**Свідчення про державну реєстрацію №** 201021**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Світловий паросток: розмір	великий	7	
2	Світловий паросток: форма	яйцеподібна	2	
3	Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення основи	помірна	5	
4	Світловий паросток: співвідношення блакитного в антоціановому забарвленні основи	відсутнє або дуже мале	1	
5	Світловий паросток: опушення основи	помірне	5	
6	Світловий паросток: розмір верхівки порівняно з основою	мала	3	
7	Світловий паросток: форма верхівки	закрита	1	
8	Світловий паросток: антоціанове забарвлення верхівки	помірне	5	
9	Світловий паросток: опушення верхівки	слабке	3	
10	Світловий паросток: кількість кореневих кінчиків	мало	3	
11	Світловий паросток: бічні пагони за довжиною	середні	5	
12	Рослина: тип розвитку	проміжний	2	
13	Рослина: габітус	напіврозлогий	5	
14	Стебло: антоціанове забарвлення	слабке	3	
15	Листок: загальний розмір	середній	5	
16	Листок: за відкритістю	проміжний	3	
17	Листок: виявлення вторинних листочків	помірне	5	
18	Листок: зелене забарвлення	помірне	5	
19	Листок: поширення антоціанового забарвлення жилок на верхньому боці	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Друга пара бічних листочків: розмір	дуже великий	9	
21	Друга пара бічних листочків: за шириною	середні	5	
22	Верхівкові і бічні листочки: частота зрощення	середньо	5	
23	Листочок: хвилястість краю	слабка	3	
24	Листочок: заглиблення жилок	середнє	5	
25	Листочок: глясуватість верхнього боку	помірно глясуватий	5	
26	Листочок: опушення пластинки на верхівці розетки	наявне	9	
27	Бутон: антоціанове забарвлення	слабке	3	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: рясність цвітіння	помірне	5	
30	Суцвіття: розмір	середній	5	
31	Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки	відсутнє або дуже слабке	1	
32	Віночок квітки: розмір	великий	7	
33	Віночок квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення внутрішнього боку	відсутнє або дуже слабка	1	
34	Віночок квітки: співвідношення блакитного у антоціановому забарвленні внутрішнього боку	відсутнє або мале	1	
35	Віночок: поширення антоціанового забарвлення на внутрішньому боці	відсутнє або дуже мале	1	
36	Рослина: час досягання	ранній	3	
37	Бульба: форма	короткоовальна	2	
38	Бульба: вічка за глибиною	середні	5	
39	Бульба: забарвлення шкірки	жовте	2	
40	Бульба: забарвлення основи вічка	жовте	2	
41	Бульба: забарвлення м'якоті	помірно жовте	4	
42	Лише сорти із світло-бежевою і жовтою шкіркою. Бульба: антоціанове забарвлення шкірки під впливом світла	слабке	3	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		22,92	20,87
Урожайність, т/га		28,48	22,81
+, - до усередненої урожайності, т/га		5,56	1,94
+, - до усередненої урожайності, %		24,2	9,3
Довірчий інтервал, т/га		4,16	2,49
Тривалість періоду вегетації, днів		91	80
Середня маса товарної бульби, г		94,8	93,2
Вміст крохмалю, %		14,4	12,4
Збір крохмалю, т/га		45,7	32,9
Вміст сухої речовини, %		22,2	19,7
Дегустаційна оцінка, бал		6	6
Придатність до механізованого збирання, бал		9	9
Лежкість, бал		7	9
Товарність бульби, %		78,7	91,9
Стійкість проти макроспоріозу, бал		7	8
Стійкість проти фітофторозу, бал		4	2
Стійкість до звичайного патотипу раку, 1 - нестійкий, 9 - стійкий, бал		9	9
Блок (Група стиглості)		7	7
Напрямок використання		стл	стл
Якість		ск	нк

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Картопля *Solanum tuberosum* L.

Заявка № 18088019 Назва сорту: Родріга Заявник (код): 1508 Власник сорту (код): 1508

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 30.11.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200883

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Світловий паросток: розмір	великий	7	
2	Світловий паросток: форма	широкоциліндрична	4	
3	Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення основи	помірна	5	
4	Світловий паросток: співвідношення блакитного в антоціановому забарвленні основи	відсутнє або дуже мале	1	
5	Світловий паросток: опушення основи	помірне	5	
6	Світловий паросток: розмір верхівки порівняно з основою	середня	5	
7	Світловий паросток: форма верхівки	проміжна	3	
8	Світловий паросток: антоціанове забарвлення верхівки	помірне	5	
9	Світловий паросток: опушення верхівки	помірне	5	
10	Світловий паросток: кількість кореневих кінчиків	середня кількість	5	
11	Світловий паросток: бічні пагони за довжиною	короткі	3	
12	Рослина: тип розвитку	проміжний	2	
13	Рослина: габітус	напіврозлогий	5	
14	Стебло: антоціанове забарвлення	помірне	5	
15	Листок: загальний розмір	малий	3	
16	Листок: за відкритістю	проміжний	3	
17	Листок: виявлення вторинних листочків	помірне	5	
18	Листок: зелене забарвлення	помірне	5	
19	Листок: поширення антоціанового забарвлення жилок на верхньому боці	помірне	5	
20	Друга пара бічних листочків: розмір	дуже великий	9	
21	Друга пара бічних листочків: за шириною	середні	5	
22	Верхівкові і бічні листочки: частота зрощення	рідко	3	
23	Листочок: хвилястість краю	слабка	3	
24	Листочок: заглиблення жилок	середнє	5	
25	Листочок: глянуватість верхнього боку	помірно глянуватий	5	
26	Листочок: опушення пластинки на верхівці розетки	наявне	9	
27	Бутон: антоціанове забарвлення	середнє	5	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: рясність цвітіння	рясне	7	
30	Суцвіття: розмір	великий	7	
31	Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки	сильне	7	
32	Віночок квітки: розмір	великий	7	
33	Віночок квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення внутрішнього боку	помірна	5	
34	Віночок квітки: співвідношення блакитного у антоціановому забарвленні внутрішнього боку	відсутнє або мале	1	
35	Віночок: поширення антоціанового забарвлення на внутрішньому боці	велике	7	
36	Рослина: час досягання	середній	5	
37	Бульба: форма	короткоовальна	2	
38	Бульба: вічка за глибиною	мілкі	3	
39	Бульба: забарвлення шкірки	червоне	3	
40	Бульба: забарвлення основи вічка	жовте	2	
41	Бульба: забарвлення м'якоті	помірно жовте	4	
42	Лише сорти із світло-бежевою і жовтою шкіркою. Бульба: антоціанове забарвлення шкірки під впливом світла	ознака не визначається	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		22,96	19,03
Урожайність, т/га		27,04	23,98
+, - до усередненої урожайності, т/га		4,08	4,95
+, - до усередненої урожайності, %		17,8	26
Довірчий інтервал, т/га		1,7	0,73
Тривалість періоду вегетації, діб		109	88
Середня маса товарної бульби, г		92,2	77
Вміст крохмалю, %		14,3	12,3
Збір крохмалю, т/га		40	30
Вміст сухої речовини, %		22	19,8
Дегустаційна оцінка, бал		7	5
Придатність до механізованого збирання, бал		8	9
Лежкість, бал		7	9
Товарність бульб, %		76,6	84,3
Стійкість проти макроспоріозу, бал		7	8
Стійкість проти фітофторозу, бал		7	3
Стійкість до звичайного патотипу раку, 1 - нестійкий, 9 - стійкий, бал		9	9
Блок (група стиглості)		8	8
Напрямок використання		стл	стл
Якість		ск	нк

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Картопля *Solanum tuberosum* L.**Заявка № 18088022 Назва сорту:** ФОНТАНЕ **Заявник (код):** 1652 **Власник сорту (код):** 1652**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 04.12.2020**Свідцтво про державну реєстрацію № 201020****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Світловий паросток: розмір	середній	5	
2	Світловий паросток: форма	яйцеподібна	2	
3	Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення основи	дуже сильна	9	
4	Світловий паросток: співвідношення блакитного в антоціановому забарвленні основи	середнє	2	
5	Світловий паросток: опушення основи	слабке	3	
6	Світловий паросток: розмір верхівки порівняно з основою	середня	5	
7	Світловий паросток: форма верхівки	відкрита	5	
8	Світловий паросток: антоціанове забарвлення верхівки	дуже сильне	9	
9	Світловий паросток: опушення верхівки	помірне	5	
10	Світловий паросток: кількість кореневих кінчиків	мало	3	
11	Світловий паросток: бічні пагони за довжиною	короткі	3	
12	Рослина: тип розвитку	проміжний	2	
13	Рослина: габітус	напіврозлогий	5	
14	Стебло: антоціанове забарвлення	помірне	5	
15	Листок: загальний розмір	середній	5	
16	Листок: за відкритістю	проміжний	3	
17	Листок: виявлення вторинних листочків	помірне	5	
18	Листок: зелене забарвлення	помірне	5	
19	Листок: поширення антоціанового забарвлення жилок на верхньому боці	помірне	5	
20	Друга пара бічних листочків: розмір	дуже великий	9	
21	Друга пара бічних листочків: за шириною	середні	5	
22	Верхівкові і бічні листочки: частота зрощення	рідко	3	
23	Листочок: хвилястість краю	слабка	3	
24	Листочок: заглиблення жилок	середнє	5	
25	Листочок: глянуватість верхнього боку	помірно глянуватий	5	
26	Листочок: опушення пластинки на верхівці розетки	наявне	9	
27	Бутон: антоціанове забарвлення	середнє	5	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: яскравість цвітіння	рясне	7	
30	Суцвіття: розмір	великий	7	
31	Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки	помірне	5	
32	Віночок квітки: розмір	великий	7	
33	Віночок квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення внутрішнього боку	відсутнє або дуже слабка	1	
34	Віночок квітки: співвідношення блакитного у антоціановому забарвленні внутрішнього боку	відсутнє або мале	1	
35	Віночок: поширення антоціанового забарвлення на внутрішньому боці	відсутнє або дуже мале	1	
36	Рослина: час досягання	середній	5	
37	Бульба: форма	короткоовальна	2	
38	Бульба: вічка за глибиною	мілкі	3	
39	Бульба: забарвлення шкірки	жовте	2	
40	Бульба: забарвлення основи вічка	жовте	2	
41	Бульба: забарвлення м'якоті	помірно жовте	4	
42	Лише сорти із світло-бежевою і жовтою шкіркою. Бульба: антоціанове забарвлення шкірки під впливом світла	помірне	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		22,96	19,03
Урожайність, т/га		22,16	21,17
+, - до усередненої урожайності, т/га		-0,8	2,14
+, - до усередненої урожайності, %		-3,5	11,3
Довірчий інтервал, т/га		1,7	0,73
Тривалість періоду вегетації, діб		112	95
Середня маса товарної бульби, г		83,5	83,7
Вміст крохмалю, %		19,1	15,9
Збір крохмалю, т/га		43,5	34,9
Вміст сухої речовини, %		28,3	24
Дегустаційна оцінка, бал		7	6
Придатність до механізованого збирання, бал		9	9
Лежкість, бал		7	9
Товарність бульб, %		77,8	83,8
Стійкість проти макроспоріозу, бал		7	9
Стійкість проти фітофторозу, бал		7	4
Стійкість до звичайного патотипу раку, 1 - нестійкий, 9 - стійкий, бал		9	9
Блок (група стиглості)		8	8
Напрямок використання		унів	унів
Якість		пк	ск

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Картопля *Solanum tuberosum* L.

Заявка № 19088001 Назва сорту: Шері Заявник (код): 2584 Власник сорту (код): 2584

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 01.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200970

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Світловий паросток: розмір	малий	3	
2	Світловий паросток: форма	яйцеподібна	2	
3	Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення основи	дуже сильна	9	
4	Світловий паросток: співвідношення блакитного в антоціановому забарвленні основи	середнє	2	
5	Світловий паросток: опушення основи	сильне	7	
6	Світловий паросток: розмір верхівки порівняно з основою	середня	5	
7	Світловий паросток: форма верхівки	закрита	1	
8	Світловий паросток: антоціанове забарвлення верхівки	помірне	5	
9	Світловий паросток: опушення верхівки	помірне	5	
10	Світловий паросток: кількість кореневих кінчиків	мало	3	
11	Світловий паросток: бічні пагони за довжиною	короткі	3	
12	Рослина: тип розвитку	листяковий	3	
13	Рослина: габітус	напіврозлогий	5	
14	Стебло: антоціанове забарвлення	сильне	7	
15	Листок: загальний розмір	середній	5	
16	Листок: за відкритістю	проміжний	3	
17	Листок: виявлення вторинних листочків	помірне	5	
18	Листок: зелене забарвлення	помірне	5	
19	Листок: поширення антоціанового забарвлення жилок на верхньому боці	сильне	7	
20	Друга пара бічних листочків: розмір	дуже великий	9	
21	Друга пара бічних листочків: за шириною	середній	5	
22	Верхівкові і бічні листочки: частота зрощення	середньо	5	
23	Листочок: хвилястість краю	слабка	3	
24	Листочок: заглиблення жилок	середнє	5	
25	Листочок: глянуватість верхнього боку	глянсуватий	7	
26	Листочок: опушення пластинки на верхівці розетки	наявне	9	
27	Бутон: антоціанове забарвлення	слабке	3	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: яскравість цвітіння	відсутнє або дуже обриднє	1	
30	Суцвіття: розмір	середній	5	
31	Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки	сильне	7	
32	Віночок квітки: розмір	великий	7	
33	Віночок квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення внутрішнього боку	помірна	5	
34	Віночок квітки: співвідношення блакитного у антоціановому забарвленні внутрішнього боку	відсутнє або мале	1	
35	Віночок: поширення антоціанового забарвлення на внутрішньому боці	середнє	5	
36	Рослина: час досягання	ранній	3	
37	Бульба: форма	дуже видовжена	6	
38	Бульба: вічка за глибиною	дуже мілкі	1	
39	Бульба: забарвлення шкірки	червоне	3	
40	Бульба: забарвлення основи вічка	червоне	3	
41	Бульба: забарвлення м'якоті	частково червоне	7	
42	Лише сорти із світло-бежевою і жовтою шкіркою. Бульба: антоціанове забарвлення шкірки під впливом світла	ознака не визначається	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		22,92	20,87
Урожайність, т/га		25,14	17,81
+, - до усередненої урожайності, т/га		2,22	-3,06
+, - до усередненої урожайності, %		9,7	-14,7
Довірчий інтервал, т/га		4,16	2,49
Тривалість періоду вегетації, діб		92	78
Середня маса товарної бульби, г		71,4	73,2
Вміст крохмалю, %		17	15,3
Збір крохмалю, т/га		47,2	31,8
Вміст сухої речовини, %		25,5	22,8
Дегустаційна оцінка, бал		6	5
Придатність до механізованого збирання, бал		8	9
Лежкість, бал		8	9
Товарність бульби, %		75,9	88
Стійкість проти макроспоріозу, бал		7	8
Стійкість проти фітофторозу, бал		6	3
Стійкість до звичайного патотипу раку, 1 - нестійкий, 9 - стійкий, бал		9	9
Блок (група стиглості)		7	7
Напрямок використання		стл	стл
Якість		пк	ск

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ: КОРМОВІ

Горошок посівний (ярий)
Кострице-райграсовий гібрид
Люпин вузьколистий
Люцерна посівна
Пажитниця багаторічна
Сорго суданське
Тритикале (дворучка)



Вид: Горошок посівний (ярий) *Vicia sativa* L.

Заявка № 17177001 Назва сорту: Володимир **Заявник (код):** 1669 **Власник сорту (код):** 1669

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 16.11.2020 **Патент №** 200739

Дата пріоритету: 01.11.2017

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 09.11.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200861

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Сіянець: співвідношення довжини/ширини листочків другого справжнього листка	середнє	5	
2	Сіянець: антоціанове забарвлення основи стебла	наявне	9	
3	Сіянець: інтенсивність антоціанового забарвлення основи стебла	слабка	3	
4	Рослина: інтенсивність зеленого забарвлення листків	помірна	5	
5	Час початку цвітіння	середній	5	
6	Стебло: опушення верхнього міжвузля	відсутнє	1	
7	Стебло: антоціанове забарвлення пазух листків	відсутнє або дуже слабке	1	
8	Листок: форма верхівки листочків	пряма	5	
9	Листок: листочок за шириною	середній	5	
10	Прилисток: антоціанове забарвлення залозок	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Квітка: забарвлення паруса	темно-фіолетове	5	
12	Біб: опушення	відсутнє або дуже слабке	1	
13	Біб: за довжиною (без дзьобика)	середній	5	
14	Біб: за шириною	вузький	3	
15	Біб: дзьобик за довжиною	короткий	3	
16	Біб: кількість насіннєвих зачатків	середня	5	
17	Насіння: маса	велика	7	
18	Насінина: за форма	овальна	2	
19	Насіння: основне забарвлення насіннєвої оболонки	сіро-коричнєве	3	
20	Насіння: коричнева орнаментация	відсутня	1	
21	Насіння: виявлення коричневої орнаментации	ознака не визначається	0	
22	Насінина: блакитно-чорна орнаментация	відсутня	1	
23	Насінина: виявлення блакитно-чорної орнаментации	ознака не визначається	0	
24	Насінина: забарвлення сім'ядолей	оранжеве	2	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, ц/га		56,6	65,5
Довірчий інтервал, ц/га (±)		5	6,2
Урожайність, ц/га		50,2	62,9
+, - до усередненого значення за п'ять попередніх років, ц/га		6,4	-2,6
+, - до усередненого значення за п'ять попередніх років, %		11,3	-3,9
Тривалість періоду вегетації, діб		67	60
Урожайність насіння, ц/га		24,5	16,1
Стійкість до вилягання, бал		6	6
Стійкість до посухи, бал		8	8
Стійкість проти аскохітозу, бал		8	9
Стійкість проти іржі, бал		8	9
Залистяність, %		60,7	59,6
Вміст сирого протеїну, %		21,8	21,1
Напрямок використання		корм	корм

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.

Вид: Кострице-райграсовий гібрид × *Festulolium* Aschers. et Graebn.

Заявка № 20240002 Назва сорту: ПАНІЯ ДС **Заявник (код):** 2669 **Власник сорту (код):** 2669

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201023

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: плідність	тетраплоїд	4	
2	Рослина: габітус без яровизації	проміжний	5	
3	Листок: за довжиною	середній	5	
4	Листок: за шириною	середній	5	
5	Рослина: за шириною після яровизації	середня	5	
6	Рослина: габітус після яровизації	проміжний	5	
7	Рослина: за висотою після яровизації	середня	5	
8	Рослина: час виявлення суцвіття	ранній	3	
9	Рослина: за природною висотою за появи суцвіття	середня	5	
10	Прапорцевий листок: за довжиною	середній	5	
11	Прапорцевий листок: за шириною	середній	5	
12	Рослина: найдовше стебло, включно із суцвіттям за довжиною (за повного розвитку)	середнє	5	
13	Рослина: верхнє міжвузля за довжиною	середнє	5	
14	Суцвіття: за довжиною	довге	7	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожайність насіння (за стандартної вологості 14%), т/га – 0,8. Урожайність зеленої маси/збір сухої речовини, т/га – 14,5. Вміст білка, % – 10,1, клітковини, % – 26,1. Висота рослин, см – 90. Період від сівби (відновлення весняної вегетації) до збиральної стиглості, діб – 115. Зимостійкість, бали (1–9) – 6. Посухостійкість, бали (1–9) – 4. Маса 1000 насінин, г – 4,2. Стійкість до вилягання, бали (1–9) – 6. Стійкість до обсіпання, бали (1–9) – 3. Стійкість до хвороб, бали (1–9): борошниста роса – 5, сажка – 8, стеблова іржа – 5,5, антракноз – 9, бура іржа – 5, снігова пліснява – 6.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ПЛ.

Вид: Люпин вузьколистий *Lupinus angustifolius* L.

Заявка № 18403001 Назва сорту: Юліан **Заявник (код):** 1809 **Власник сорту (код):** 1809

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.11.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200892

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насінина: гірка речовина	ознака не визначалась	0	
2	Рослина: за висотою у вегетативній стадії	низька	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення до фази бутонізації	слабка	3	
4	Стебло: антоціанове забарвлення до фази бутонізації	слабке	3	
5	Час цвітіння	ранній	3	
6	Рослина: за висотою у фазі початку цвітіння	середня	5	
7	Центральний листок: за довжиною	короткий	3	
8	Центральний листок: за шириною	вузький	3	
9	Квітка: забарвлення крил	біле	1	
10	Квітка: забарвлення кінчика човника	синьо-чорне	2	
11	Рослина: тип росту	детермінантний	1	
12	Біб: час настання зеленої стиглості	ранній	3	
13	Рослина: за висотою прикріплення першого суцвіття, за зеленої стиглості (від поверхні ґрунту до першого суцвіття)	дуже низька	1	
14	Рослина: за висотою у зеленій стиглості	низька	3	
15	Біб: за довжиною	середній	5	
16	Час достигання	ранній	3	
17	Насінина: орнаментация	відсутня	1	
18	Насінина: забарвлення орнаментации	ознака не визначається	0	
19	Насінина: розподіл орнаментации	ознака не визначається	0	
20	За винятком сортів з бровою. Насінина: щільність орнаментации	ознака не визначається	0	
21	Насінина: маса 100 шт.	велика	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сухої речовини сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років		5,23	4,16
Урожайність сухої речовини, т/га		4,87	5,59
+, - до усередненої урожайності сухої речовини, т/га		-0,36	1,43
+, - до усередненої урожайності сухої речовини, %		-6,9	34,3
Довірчий інтервал, т/га		1,24	1,05
Тривалість періоду вегетації, діб		61	60
Вміст білка (сирого протеїну), %		19	19
Стійкість до вилягання, бал		8	9
Стійкість до посухи, бал		8	7
Стійкість проти фузаріозу, бал		8	8
Стійкість проти сірої гнилі, бал		9	9
Стійкість проти бурі плямистості, бал		9	8
Стійкість проти антракнозу, бал		9	8
Залистяність, %		64,8	66,8
Блок		1	1
Напрямок використання		корм	корм

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: П.

Вид: Люцерна посівна *Medicago sativa* L.

Заявка № 17196001 Назва сорту: Адорна Заявник (код): 1694 Власник сорту (код): 2537

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.10.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200814

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус восени першого року (2 тижні до рівнодення)	напівпрямий	3	
2	Рослина: за природною висотою через 2 тижні після осіннього рівнодення після сівби (скошування за 2 тижні до рівнодення)	висока	7	
3	Рослина: за природною висотою через 6 тижнів після осіннього рівнодення (скошування за 2 тижні після рівнодення)	висока	7	
4	Рослина: за природною висотою навесні (один місяць після початку відростання другого року після сівби)	середня	5	
5	Час початку цвітіння	ранній	3	
6	Квітка: частота рослин з дуже темно-синьо-фіолетовими квітками	низька	3	
7	Квітка: частота рослин із змішаними квітками	низька	3	
8	Квітка: частота рослин з кремовими, білими або жовтими квітками	відсутня або дуже низька	1	
9	Рослина: за довжиною найдовшого стебла за повного цвітіння (включаючи повністю сформоване суцвіття)	довга	7	
10	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 1-го скошування	висока	7	
11	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 2-го скошування	середня	5	
12	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 3-го скошування	висока	7	
13	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 4-го скошування	висока	7	
14	Рослина: за природною висотою через 2 тижні після наступного дня осіннього рівнодення у рік сівби (скошування за 2 тижні до рівнодення)	висока	7	
15	Рослина: за природною висотою через 6 тижнів після наступного дня осіннього рівнодення у рік сівби (скошування за 2 тижні після рівнодення)	висока	7	
16	Рослина: тенденція до зростання під час зими	стан спокою клас 7	7	
17	Стійкість проти <i>Verticillium albo-atrum</i>	наявна	9	
18	Стійкість проти <i>Ditylenchus dipsaci</i>	наявна	9	
19	Стійкість проти <i>Colletotrichum trifolii</i>	наявна	9	
20	Стійкість проти <i>Phytophthora medicaginis</i>	наявна	9	
21	Стійкість проти <i>Acyrtosiphon kondoi</i>	наявна	9	
22	Стійкість проти <i>Therioaphis maculata</i>	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, ц/га	54,4	101,3	120,2
Довірчий інтервал, ц/га (±)	3,4	5,3	6,7
Урожайність сухої речовини, ц/га	77,5	102,9	92,2
+ , - до усередненого значення за п'ять попередніх років, ц/га	23,1	1,6	-28
+ , - до усередненого значення за п'ять попередніх років, %	42,5	1,6	-23,3
Тривалість періоду вегетації, діб	96	144	74
Зимостійкість: польова оцінка, бал	9	8	7
Стійкість до вилягання, бал	9	7	8
Стійкість до посухи, бал	8	7	8
Стійкість проти стеблової іржі, бал	8	8	8
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	8	9
Стійкість проти фузаріозного в'янення, бал	8	8	8
Залистяність, %	42,9	65,1	40,4
Вміст сирого протеїну, %	19,4	20,6	18,5
Напрямок використання	корм	корм	корм

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Люцерна посівна *Medicago sativa* L.

Заявка № 15196002 Назва сорту: Кураж **Заявник (код):** 1990 **Власник сорту (код):** 1990

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 17.11.2020 **Патент № 200689**

Дата пріоритету: 25.11.2015

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 17.11.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200894

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус восени першого року (2 тижні до рівнодення)	проміжний	5	
2	Рослина: за природною висотою через 2 тижні після осіннього рівнодення після сівби (скошування за 2 тижні до рівнодення)	середня	5	
3	Рослина: за природною висотою через 6 тижнів після осіннього рівнодення (скошування за 2 тижні після рівнодення)	середня	5	
4	Рослина: за природною висотою навесні (один місяць після початку відростання другого року після сівби)	середня	5	
5	Час початку цвітіння	середній	5	
6	Квітка: частота рослин з дуже темно-синьо-фіолетовими квітками	низька	3	
7	Квітка: частота рослин із змішаними квітками	низька	3	
8	Квітка: частота рослин з кремовими, білими або жовтими квітками	відсутня або дуже низька	1	
9	Рослина: за довжиною найдовшого стебла за повного цвітіння (включаючи повністю сформоване суцвіття)	довга	7	
10	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 1-го скошування	висока	7	
11	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 2-го скошування	середня	5	
12	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 3-го скошування	середня	5	
13	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 4-го скошування	середня	5	
14	Рослина: за природною висотою через 2 тижні після наступного дня осіннього рівнодення у рік сівби (скошування за 2 тижні до рівнодення)	низька	3	
15	Рослина: за природною висотою через 6 тижнів після наступного дня осіннього рівнодення у рік сівби (скошування за 2 тижні після рівнодення)	середня	5	
16	Рослина: тенденція до зростання під час зими	стан спокою клас 5	5	
17	Стійкість проти <i>Verticillium albo-atrum</i>	наявна	9	
18	Стійкість проти <i>Ditylenchus dipsaci</i>	наявна	9	
19	Стійкість проти <i>Colletotrichum trifolii</i>	наявна	9	
20	Стійкість проти <i>Phytophthora medicaginis</i>	наявна	9	
21	Стійкість проти <i>Acyrtosiphon kondoi</i>	наявна	9	
22	Стійкість проти <i>Therioaphis maculata</i>	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, ц/га	54,4	101,3	120,2
Довірчий інтервал, ц/га (±)	3,4	5,3	6,7
Урожайність, ц/га	72,2	88,2	80,5
+, - до усередненого значення за п'ять попередніх років, ц/га	17,8	-13,1	-40,0
+, - до усередненого значення за п'ять попередніх років, %	32,7	-12,9	-33,3
Тривалість періоду вегетації, діб	96	121	74
Зимостійкість: польова оцінка, бал	9	7	7
Стійкість до вилягання, бал	9	7	8
Стійкість до посухи, бал	8	7	7
Стійкість проти стеблової іржі, бал	8	8	8
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	8	9
Стійкість проти фузаріозного в'янення, бал	8	9	8
Залистяність, %	42,5	52,4	40,3
Вміст сирого протеїну, %	18,8	20,5	19,5
Напрямок використання	корм	корм	корм

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.

Вид: Люцерна посівна *Medicago sativa* L.

Заявка № 16196001 Назва сорту: Родена Заявник (код): 1669 Власник сорту (код): 1669

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 09.11.2020

Свідцтво про державну реєстрацію № 200895

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус восени першого року (2 тижні до рівнодення)	проміжний	5	
2	Рослина: за природною висотою через 2 тижні після осіннього рівнодення після сівби (скошування за 2 тижні до рівнодення)	середня	5	
3	Рослина: за природною висотою через 6 тижнів після осіннього рівнодення (скошування за 2 тижні після рівнодення)	середня	5	
4	Рослина: за природною висотою навесні (один місяць після початку відростання другого року після сівби)	коротка	3	
5	Час початку цвітіння	середній	5	
6	Квітка: частота рослин з дуже темно-синьо-фіолетовими квітками	низька	3	
7	Квітка: частота рослин із змішаними квітками	низька	3	
8	Квітка: частота рослин з кремовими, білими або жовтими квітками	відсутня або дуже низька	1	
9	Рослина: за довжиною найдовшого стебла за повного цвітіння (включаючи повністю сформоване суцвіття)	середня	5	
10	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 1-го скошування	середня	5	
11	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 2-го скошування	середня	5	
12	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 3-го скошування	середня	5	
13	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 4-го скошування	низька	3	
14	Рослина: за природною висотою через 2 тижні після наступного дня осіннього рівнодення у рік сівби (скошування за 2 тижні до рівнодення)	низька	3	
15	Рослина: за природною висотою через 6 тижнів після наступного дня осіннього рівнодення у рік сівби (скошування за 2 тижні після рівнодення)	низька	3	
16	Рослина: тенденція до зростання під час зими	ознака не визначається	0	
17	Стійкість проти <i>Verticillium albo-atrum</i>	наявна	9	
18	Стійкість проти <i>Ditylenchus dipsaci</i>	наявна	9	
19	Стійкість проти <i>Colletotrichum trifolii</i>	наявна	9	
20	Стійкість проти <i>Phytophthora medicaginis</i>	наявна	9	
21	Стійкість проти <i>Acyrtosiphon kondoi</i>	наявна	9	
22	Стійкість проти <i>Therioaphis maculata</i>	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, ц/га	54,4	101,3	120,2
Довірчий інтервал, ц/га (±)	3,4	5,3	6,7
Урожайність, ц/га	79,8	90,1	81,9
+, - до усередненого значення за п'ять попередніх років, ц/га	25,4	-11,2	-38,3
+, - до усередненого значення за п'ять попередніх років, %	46,7	-11	-31,9
Тривалість періоду вегетації, діб	95	128	74
Зимостійкість: польова оцінка, бал	9	8	7
Стійкість до вилягання, бал	9	7	8
Стійкість до посухи, бал	8	7	7
Стійкість проти стеблової іржі, бал	8	8	8
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	8	9
Стійкість проти фузаріозного в'янення, бал	8	8	8
Залистяність, %	43,4	62,7	40,2
Вміст сирого протеїну, %	17,7	19,7	19,3
Напрямок використання	корм	корм	корм

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.

Вид: Пажитниця багаторічна *Lolium perenne* L.

Заявка № 20222002 Назва сорту: ЄЛЕНА ДС **Заявник (код):** 2669 **Власник сорту (код):** 2669

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201104

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Плоїдність	тетраплоїд	4	
2	Рослина: габітус (без яровизації)	проміжний	5	
3	Листок: за довжиною	середній	5	
4	Листок: за шириною (під час вегетації)	середній	5	
5	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
6	Рослина: за шириною (після яровизації)	середня	5	
7	Рослина: габітус (після яровизації)	проміжний	5	
8	Рослина: за висотою (після яровизації)	середня	5	
9	Лише сорти Lmw та Lr. Рослина: час появи суцвіття (без яровизації)	ознака не визначається	0	
10	Рослина: тенденція до утворення суцвіть (без яровизації)	відсутня або дуже слабка	1	
11	Лише сорти Lp, Lm і та Lb. Рослина: час викидання суцвіття (після яровизації)	середній	5	
12	Рослина: за природною висотою під час появи суцвіть	висока	7	
13	Рослина: за шириною під час появи суцвіть	середня	5	
14	Прапорцевий листок: за довжиною	довгий	7	
15	Прапорцевий листок: за шириною	широкий	7	
16	Прапорцевий листок: відношення довжина/ширина	велике	7	
17	Рослина: за довжиною найдовшого стебла, включно із суцвіттям включно (за повного виявлення)	довге	7	
18	Рослина: за довжиною верхнього міжвузля	довге	7	
19	Суцвіття: за довжиною	довге	7	
20	Суцвіття: кількість колосків	велика	7	
21	Суцвіття: за щільністю	щільне	7	
22	Суцвіття: за довжиною зовнішньої луски базального колоска	середня	5	
23	Суцвіття: за довжиною базального колоска без ості	середня	5	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожайність насіння (за стандартної вологості 14%), т/га – 0,89. Урожайність зеленої маси/збір сухої речовини, т/га – 12,0. Вміст білка у сухій речовині, % – 12,2. Вміст клітковини у сухій речовині, % – 20,9. Період від сходів (весняного відростання) до збиральної стиглості, діб – 120. Висота рослин, см – 85. Маса 1000 насінин, г – 4,1. Тривалість продуктивного довголіття, років – 3. Стійкість до вилягання, бал (1–9) – 5. Стійкість до обсіпання, бал (1–9) – 3. Зимостійкість, бал (1–9) – 5. Посухостійкість, бал (1–9) – 4. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошнеста роса – 8, іржа стеблова – 7, іржа лінійна – 6, снігова пліснява – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ПЛ.

Вид: Сорго суданське *Sorghum sudanense* (Piper.) Stapf**Заявка № 17227001 Назва сорту:** Мурашка **Заявник (код):** 2260 **Власник сорту (код):** 2260**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 18.12.2020**Свідоцтво про державну реєстрацію № 201260****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення колеоптиля	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Паросток: антоціанове забарвлення дорсального боку першого листка	відсутнє або дуже слабке	1	
3	Паросток: антоціанове забарвлення пазухи першого листка	відсутнє або дуже слабке	1	
4	Листок: антоціанове забарвлення пластинки (стадія 3-4 листка)	відсутнє або дуже слабке	1	
5	Рослина: час початку виявлення волоті (25% рослин з волотями)	ранній	3	
6	Рослина: форма куща (перед виявленням волотей)	помірно розлога	5	
7	Рослина: за висотою під час виявлення волоті	висока	7	
8	Листок: зелене забарвлення пластинки (за виявлення волоті)	світле	3	
9	Прапорцевий листок: поширення знебарвлення середньої жилки (як для 8)	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Прапорцевий листок: інтенсивність зеленого забарвлення середньої жилки у порівнянні з пластинкою листка (якщо не знебарвлена, як для 8)	світліше	1	
11	Прапорцевий листок: жовте забарвлення середньої жилки (як для 8)	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Колоскова луска: забарвлення під час цвітіння	жовте	5	
13	Колоскова луска: антоціанове забарвлення (під час цвітіння)	відсутнє або дуже слабке	1	
14	Колоскова луска: антоціанове забарвлення опушення (як для 13)	відсутнє або дуже слабке	1	
15	Нижня квіткова луска: розвиток остюка (як для 13)	слабкий	3	
16	Приймочка: антоціанове забарвлення (як для 13)	сильне	7	
17	Приймочка: жовте забарвлення (як для 13)	сильне	7	
18	Приймочка: за довжиною (як для 13)	дуже довга	9	
19	Квітка з квітконіжкою: за довжиною (як для 13)	довга	7	
20	Волоть: щільність наприкінці цвітіння	дуже нещільна	1	
21	Сухі тичинки: забарвлення (після цвітіння)	оранжеве	3	
22	Рослина: за висотою (за досягання)	середня	5	
23	Стебло: за товщиною (верхньої третини рослини за досягання)	тонке	3	
24	Листок: за довжиною пластинки третього листка від верхівки (за досягання)	короткий	3	
25	Листок: за шириною пластинки (як для 24)	дуже вузький	1	
26	Волоть: за довжиною без шийки (як для 24)	дуже довга	9	
27	Волоть: гілочки: за довжиною (у середній третині волоті)	довгі	7	
29	Волоть: форма (за досягання)	поникла	6	
30	Шийка волоті: видима довжина над пазухою (обгорткою) (як для 22)	довга	7	
31	Колоскова луска: забарвлення за досягання	чорне	7	
32	Колоскова луска: за довжиною (за досягання)	дуже довга	9	
33	Зернівка: забарвлення після досягання	жовтувато-біле	3	
34	Насіння: маса 1000 шт. (лише для суданської трави)	мала	3	
35	Зернівка: форма зі спинки	вузькоеліптична	3	
36	Зернівка: форма в профіль	вузькоеліптична	3	
37	Зернівка: розмір зародка	малий	3	
38	Зернівка: поверхня, вкрита насінневою шкіркою	мала	3	
39	Зернівка: вміст таніну	ознака не визначалась	0	
40	Зерно: структура ендосперму (у позовжньому розрізі)	на 1/2 склоподібна	5	
41	Зерно: забарвлення склоподібного ендосперму	жовте	3	

За інформацією наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Урожайність насіння (за стандартної вологості), т/га – 1,5. Урожайність зеленої маси / збір сухої речовини, т/га – 65,0.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Тритикале (дворучка) *Triticosecale* Witt.

Заявка № 18622001 Назва сорту: Олександра Заявник (код): 1581 Власник сорту (код): 1581

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 17.11.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201822

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: плоідність	гексаплоїд	6	
2	Колеоптіль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
3	Рослина: габітус	напівпрямий	3	
4	Рослина: кількість рослин з похилими прапорцевими листками	мала	3	
5	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
6	Початок колосіння (перший колосок помітний у 50% рослин)	середнє	5	
7	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
8	Остюки: антоціанове забарвлення	слабке	3	
9	Пиляки: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Прапорцевий листок: листкова пластинка за довжиною	середня	5	
11	Прапорцевий листок: листкова пластинка за шириною	середня	5	
12	Колос: сизий наліт	помірний	5	
13	Стебло: інтенсивність опушення верхнього (підколосового) міжвузля	слабке	3	
14	Рослина: за висотою (разом зі стеблом, колосом та остюками)	середня	5	
15	Колос: розміщення остюків	у верхній половині	2	
16	Остюки: довжина відносно колоса	короткі	3	
17	Нижня колоскова луска: кільцевий зубець за довжиною (колосок із середньої третини колоса)	дуже короткий	1	
18	Нижня колоскова луска: розмір другого зубця (як для 17)	відсутній або дуже малий	1	
19	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні (як для 17)	відсутнє	1	
20	Соломина: за виповненням (поперечний переріз між основою колоса і верхнім вузлом)	порожниста	3	
21	Колос: забарвлення	біле	1	
22	Колос: за щільністю	помірно щільний	5	
23	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	5	
24	Колос: за шириною (вигляд збоку)	середній	5	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	ознака не визначалась	0	
26	Тип розвитку	дворучка (альтернативний)	2	
27	Колос: за формою	напівбулавоподібний	3	
28	Колос: остюки	наявні	9	
29	Вісь колосу: за міцністю	гнучка	9	
30	Колосок: кількість квіток	середня	5	
31	Колосок: плідність квіток	плідні	1	
32	Зернівка: за формою	видовжена	5	
33	Зернівка: забарвлення	світло-коричневе	3	
34	Зернівка: за характером поверхні	слабо зморшкувата	7	
35	Зернівка: за крупністю	середня	5	
36	Колос: положення в просторі	напівпоникле	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га		4,75	4,27
Тривалість періоду вегетації, діб		10,2	10,4
Висота рослини, см		9,02	9,15
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г		44,2	39,2
Череззерниця, %		0,73	0,5
Вміст білка, %		13,7	13,7
Вміст пророслих зерен, %		0	2,5
Стійкість до вилягання, бал		8	8
Стійкість до обсіпання, бал		9	9
Стійкість до посухи, бал		9	7
Стійкість проти борошністої роси, бал		8	8
Стійкість проти бурі іржі, бал		9	8
Стійкість проти корневих гнилей, бал		9	8
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал		8	8
Блок		1	1
Напрямок використання		зерн	зерн
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га		6,39	5,36
Тривалість періоду вегетації, діб		27,1	28,1
Висота рослини, см		9,17	10,83
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г		45,9	39,4
Череззерниця, %		0,58	0,55
Вміст білка, %		11,5	13,1
Вміст морозобійних зерен, %		0	1,5
Стійкість до вилягання, бал		8	6
Стійкість до обсіпання, бал		9	9
Стійкість до посухи, бал		9	8
Стійкість проти борошністої роси, бал		8	9
Стійкість проти бурі іржі, бал		8	8

Показник	Значення		
	С	Л	П
Стійкість проти корневих гнилей, бал		9	9
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал		8	8
Зимостійкість: польова оцінка, бал		8	8
Блок		1	1
Напрямок використання		зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ: ОВОЧЕВІ

*Баклажан
Буги́ла кервель
Бу́ряк столовий
Гарбуз звичайний
Дворя́тник тонколистий
Диня звичайна
Кавун звичайний
Ка́пуста білоголова
Ка́пуста броколі
Ка́пуста цвітна
Кукурудза розлусна
Кукурудза цукрова
Морква
Огі́рок посівний
Перець однорічний (солодкий)
Помі́дор їстівний
Сала́т посівний листковий
Сала́т посівний ромен
Сала́т посівний стебловий
Цибу́ля городня
Цибу́ля запашна
Цибу́ля слизун*



Вид: Баклажан *Solanum melongena* L.

Заявка № 17093001 Назва сорту: Віронік **Заявник (код):** 1781 **Власник сорту (код):** 1781

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 10.12.2020 **Патент №** 200736

Дата пріоритету: 16.01.2017

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 10.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201270

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилія	наявне	9	
2	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилія	помірне	5	
3	Рослина: габітус	напівпрямий	3	
4	Рослина: за висотою	середня	5	
5	Рослина: стебло за довжиною (від сім'ядолей до вузла до 1-ої квітки)	середнє	5	
6	Стебло: антоціанове забарвлення	наявне	9	
7	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
8	Стебло: опушення	слабке	3	
9	Листкова пластинка: розмір	середній	5	
10	Листкова пластинка: хвилястість краю	помірна	5	
11	Листкова пластинка: пухирчастість	помірна	5	
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
13	Суцвіття: кількість квіток	від одної до трьох	1	
14	Квітка: розмір	середній	5	
15	Квітка: інтенсивність пурпурового забарвлення	помірна	5	
16	Плід: за довжиною	середній	5	
17	Плід: максимальний діаметр	середній	5	
18	Плід: відношення довжина / діаметр	середнє	5	
19	Плід: основна форма	оберненояцеподібна	3	
20	Плід: розмір рубця маточки	малий	3	
21	Плід: верхівка	округла	3	
22	Плід: виїмка рубця приймочки маточки за глибиною	мілка	3	
23	Лише для сортів з циліндричною формою плодів. Плід: вигин	ознака не визначається	0	
24	Плід: забарвлення шкірки в збиральній стиглості	фіолетове	3	
25	Лише для сортів із зеленим і фіолетовим забарвленням шкірки. Плід: інтенсивність забарвлення шкірки (як для 24)	сильна	7	
26	Плід: глянуватість (як для 24)	помірна	5	
27	Плід: плямистість	відсутня	1	
28	Плід: смугастість	відсутня	1	
29	Плід: помітність смуг	ознака не визначається	0	
30	Плід: щільність смуг	ознака не визначається	0	
31	Плід: ребристість	відсутня або дуже слабка	1	
32	Плід: квітконіжка за довжиною	середня	5	
33	Плід: антоціанове забарвлення під чашечкою	відсутнє	1	
34	Плід: інтенсивність антоціанового забарвлення під чашечкою	ознака не визначається	0	
35	Плід: розмір чашечки	середній	5	
36	Плід: антоціанове забарвлення чашечки	наявне	9	
37	Плід: інтенсивність антоціанового забарвлення чашечки	дуже слабка	1	
38	Плід: шипуватість чашечки	слабка	3	
39	Плід: зморшуватість чашечки	помірна	5	
40	Плід: забарвлення м'якоті	білувате	1	
41	Плід: забарвлення шкірки за фізіологічної стиглості	вохристе	3	
42	Час початку цвітіння	середній	5	
43	Час фізіологічної стиглості	середній	5	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 40. Період від сівби до початку достигання, діб – 105. Період плодоношення, діб – 90. Вміст сухої речовини в плодах, % – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП, ЗГр.

Вид: Баклажан *Solanum melongena* L.

Заявка № 20093003 **Назва сорту:** Джокер **Заявник (код):** 2226 **Власник сорту (код):** 2226

Дата пріоритету: 10.02.2020

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201006

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилля	відсутнє	1	
2	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилля	ознака не визначається	0	
3	Рослина: габітус	пряmostoячий	1	
4	Рослина: за висотою	висока	7	
5	Рослина: стебло за довжиною (від сім'ядолей до вузла до 1-ої квітки)	довге	7	
6	Стебло: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
7	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
8	Стебло: опушення	слабке	3	
9	Листкова пластинка: розмір	середній	5	
10	Листкова пластинка: хвилястість краю	помірна	5	
11	Листкова пластинка: пухирчастість	слабка	3	
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
13	Суцвіття: кількість квіток	понад три	2	
14	Квітка: розмір	середній	5	
15	Квітка: інтенсивність пурпурового забарвлення	помірна	5	
16	Плід: за довжиною	середній	5	
17	Плід: максимальний діаметр	середній	5	
18	Плід: відношення довжина / діаметр	середнє	5	
19	Плід: основна форма	грушоподібна	4	
20	Плід: розмір рубця маточки	малий	3	
21	Плід: верхівка	округла	3	
22	Плід: виїмка рубця приймочки маточки за глибиною	мілка	3	
23	Лише для сортів з циліндричною формою плодів. Плід: вигин	ознака не визначається	0	
24	Плід: забарвлення шкірки в збиральній стиглості	фіолетове	3	
25	Лише для сортів із зеленим і фіолетовим забарвленням шкірки. Плід: інтенсивність забарвлення шкірки (як для 24)	дуже сильна	9	
26	Плід: глянуватість (як для 24)	сильна	7	
27	Плід: плямистість	відсутня	1	
28	Плід: смугастість	відсутня	1	
29	Плід: помітність смуг	ознака не визначається	0	
30	Плід: щільність смуг	ознака не визначається	0	
31	Плід: ребристість	відсутня або дуже слабка	1	
32	Плід: квітконіжка за довжиною	середня	5	
33	Плід: антоціанове забарвлення під чашечкою	відсутнє	1	
34	Плід: інтенсивність антоціанового забарвлення під чашечкою	ознака не визначається	0	
35	Плід: розмір чашечки	середній	5	
36	Плід: антоціанове забарвлення чашечки	відсутнє	1	
37	Плід: інтенсивність антоціанового забарвлення чашечки	ознака не визначається	0	
38	Плід: шипуватість чашечки	відсутня або дуже слабка	1	
39	Плід: зморшкуватість чашечки	слабка	3	
40	Плід: забарвлення м'якоті	білувате	1	
41	Плід: забарвлення шкірки за фізіологічної стиглості	коричнєве	4	
42	Час початку цвітіння	ранній	3	
43	Час фізіологічної стиглості	ранній	3	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 40. Період від сівби до початку достигання, діб – 65. Період плодоношення, діб – 120. Вміст сухої речовини в плодах, % – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3Гр.

Вид: Баклажан *Solanum melongena* L.

Заявка № 19093004 Назва сорту: Мінерва Заявник (код): 2659 Власник сорту (код): 2659

Дата пріоритету: 27.12.2019

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 20.10.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200804

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилля	наявне	9	
2	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилля	дуже слабке	1	
3	Рослина: габітус	прямостоячий	1	
4	Рослина: за висотою	середня	5	
5	Рослина: стебло за довжиною (від сім'ядолей до вузла до 1-ої квітки)	середнє	5	
6	Стебло: антоціанове забарвлення	наявне	9	
7	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
8	Стебло: опушення	помірне	5	
9	Листкова пластинка: розмір	середній	5	
10	Листкова пластинка: хвилястість краю	помірна	5	
11	Листкова пластинка: пухирчастість	слабка	3	
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
13	Суцвіття: кількість квіток	від одної до трьох	1	
14	Квітка: розмір	великий	7	
15	Квітка: інтенсивність пурпурового забарвлення	помірна	5	
16	Плід: за довжиною	довгий	7	
17	Плід: максимальний діаметр	великий	7	
18	Плід: відношення довжина / діаметр	велике	7	
19	Плід: основна форма	еліптична	6	
20	Плід: розмір рубця маточки	середній	5	
21	Плід: верхівка	округла	3	
22	Плід: виїмка рубця приймочки маточки за глибиною	відсутня або дуже мілка	1	
23	Лише для сортів з циліндричною формою плодів. Плід: вигин	ознака не визначається	0	
24	Плід: забарвлення шкірки в збиральній стиглості	фіолетове	3	
25	Лише для сортів із зеленим і фіолетовим забарвленням шкірки. Плід: інтенсивність забарвлення шкірки (як для 24)	сильна	7	
26	Плід: глянуватість (як для 24)	сильна	7	
27	Плід: плямистість	відсутня	1	
28	Плід: смугастість	відсутня	1	
29	Плід: помітність смуг	ознака не визначається	0	
30	Плід: щільність смуг	ознака не визначається	0	
31	Плід: ребристість	відсутня або дуже слабка	1	
32	Плід: квітконіжка за довжиною	середня	5	
33	Плід: антоціанове забарвлення під чашечкою	наявне	9	
34	Плід: інтенсивність антоціанового забарвлення під чашечкою	сильна	7	
35	Плід: розмір чашечки	середній	5	
36	Плід: антоціанове забарвлення чашечки	наявне	9	
37	Плід: інтенсивність антоціанового забарвлення чашечки	слабка	3	
38	Плід: шипуватість чашечки	відсутня або дуже слабка	1	
39	Плід: зморшкуватість чашечки	слабка	3	
40	Плід: забарвлення м'якоті	зеленувате	2	
41	Плід: забарвлення шкірки за фізіологічної стиглості	коричнєве	4	
42	Час початку цвітіння	ранній	3	
43	Час фізіологічної стиглості	ранній	3	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 150. Період від сівби до початку достигання, діб – 90. Період плодоношення, діб – 6. Вміст сухої речовини в плодах, % – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3Гр.

Вид: Баклажан *Solanum melongena* L.

Заявка № 19093003 **Назва сорту:** СВ1574ЕВ **Заявник (код):** 1852 **Власник сорту (код):** 1852

Дата пріоритету: 22.11.2019

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.10.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200803

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилля	наявне	9	
2	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилля	помірне	5	
3	Рослина: габітус	ознака не визначалась	0	
4	Рослина: за висотою	середня	5	до високої
5	Рослина: стебло за довжиною (від сім'ядолей до вузла до 1-ої квітки)	довге	7	
6	Стебло: антоціанове забарвлення	наявне	9	
7	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірне	5	
8	Стебло: опушення	помірне	5	до сильного
9	Листкова пластинка: розмір	малий	3	до середнього
10	Листкова пластинка: хвилястість краю	слабка	3	до помірної
11	Листкова пластинка: пухирчастість	помірне	5	
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	до помірної
13	Суцвіття: кількість квіток	від одної до трьох	1	
14	Квітка: розмір	середній	5	до великого
15	Квітка: інтенсивність пурпурового забарвлення	помірне	5	до сильної
16	Плід: за довжиною	середній	5	до довгого
17	Плід: максимальний діаметр	середній	5	до великого
18	Плід: відношення довжина / діаметр	середнє	5	
19	Плід: основна форма	оберненояйцеподібна	3	до грушоподібної
20	Плід: розмір рубця маточки	середній	5	до великого
21	Плід: верхівка	округла	3	
22	Плід: виїмка рубця приймочки маточки за глибиною	мілка	3	до середньої
23	Лише для сортів з циліндричною формою плодів. Плід: вигин	ознака не визначається	0	
24	Плід: забарвлення шкірки в збиральній стиглості	фіолетове	3	
25	Лише для сортів із зеленим і фіолетовим забарвленням шкірки. Плід: інтенсивність забарвлення шкірки (як для 24)	дуже сильна	9	
26	Плід: глянуватість (як для 24)	сильна	7	
27	Плід: плямистість	відсутня	1	
28	Плід: смугастість	відсутня	1	
29	Плід: помітність смуг	ознака не визначається	0	
30	Плід: щільність смуг	ознака не визначається	0	
31	Плід: ребристість	відсутня або дуже слабка	1	
32	Плід: квітконіжка за довжиною	середня	5	до довгої
33	Плід: антоціанове забарвлення під чашечкою	наявне	9	
34	Плід: інтенсивність антоціанового забарвлення під чашечкою	сильна	7	до дуже сильного
35	Плід: розмір чашечки	середній	5	до великого
36	Плід: антоціанове забарвлення чашечки	відсутнє	1	
37	Плід: інтенсивність антоціанового забарвлення чашечки	ознака не визначається	0	
38	Плід: шипуватість чашечки	відсутня або дуже слабка	1	до слабкої
39	Плід: зморшкуватість чашечки	помірне	5	
40	Плід: забарвлення м'якоті	зеленувате	2	
41	Плід: забарвлення шкірки за фізіологічної стиглості	ознака не визначалась	0	
42	Час початку цвітіння	ранній	3	
43	Час фізіологічної стиглості	ознака не визначалась	0	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 800. Період від сівби до початку достигання, діб – 115. Період плодоношення, діб – 35. Вміст сухої речовини в плодах, % – 7,5.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3Гр.

Вид: Буги́ла кервель *Anthriscus cerefolium* (L.) Hoffm.

Заявка № 19549001 Назва сорту: Жайворонок **Заявник (код):** 1708 **Власник сорту (код):** 1708

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 11.12.2020 **Патент № 200737**

Дата пріоритету: 08.07.2019

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 17.11.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200855

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: за висотою	висока	7	
2	Рослина: галуження	слабке	3	
3	Рослина: кількість розеткових листків	мала	3	
4	Листок: зелене забарвлення	світле	2	
5	Стебло: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
6	Листок: форма	ромбічна	2	
7	Листок: за цупкістю	не цупкий	3	
8	Листок: кількість часток	середня	5	
9	Листок: за довжиною	середній	5	
10	Листок: за шириною	середній	5	
11	Суцвіття (складний зонтик): кількість зонтиків II-го порядку	мала	3	
12	Суцвіття: опушення променів	наявне	9	
13	Суцвіття: діаметр	середній	5	
14	Квітка: забарвлення пелюсток	біле	1	
15	Насінина: забарвлення	чорне	1	
16	Час початку цвітіння	середній	5	
17	Рослина: тривалість періоду від сходів до споживчої стиглості	коротка	3	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожайність товарної продукції, т/га – 21,2. Урожайність насіння, т/га – 0,15. Тривалість періоду від повних сходів до споживчої стиглості, діб – 26. Вміст сухої речовини в зеленій масі, % – 17,06, загального цукру, % – 2,95, вітаміну С, мг/100 г – 52,92. Дегустаційна оцінка, бал (1–9) – 9. Стійкість до посухи, бал (1–9) – 7. Стійкість до вилягання, бал (1–9) – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Буряк столовий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *conditiva* Alef.

Заявка № 18122002 Назва сорту: Бреско **Заявник (код):** 751 **Власник сорту (код):** 751

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.11.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200856

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Супліддя	одноросткове	1	
2	Паросток: червоне забарвлення гіпокотилля	наявне	9	
3	Листок: положення черешка	пряме	1	
4	Листок: положення пластинки	напівпряме	3	
5	Листок: за довжиною (включно з черешком)	короткий	3	
6	Листкова пластинка: за довжиною	коротка	3	
7	Листкова пластинка: за шириною	вузька	3	
8	Листкова пластинка: форма	еліптична	5	
9	Листкова пластинка: забарвлення	в основному зелене	1	
10	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Листкова пластинка: червоне забарвлення жилок	сильне	7	
12	Листкова пластинка: хвилястість краю	помірна	5	
13	Листкова пластинка: пухирчастість	помірна	5	
14	Листковий черешок: за шириною основи (біля місця прикріплення до кореня)	середній	5	
15	Листковий черешок: основний забарвлення зворотнього боку	пурпурове	4	
16	Коренеплід: заглиблення у ґрунт	середнє	5	
17	Коренеплід: форма поздовжнього розрізу	округла	3	
18	Коренеплід: за довжиною	короткий	3	
19	Коренеплід: за шириною	вузький	3	
20	Коренеплід: відношення довжина / ширина	середнє	3	
21	Коренеплід: форма кінчика	загострена	1	
22	Коренеплід: окорковіння шкірки	слабке	3	
23	Коренеплід: зовнішнє забарвлення	бордове	4	
24	Коренеплід: основне забарвлення м'якоті	пурпурове	4	
25	Коренеплід: інтенсивність основного забарвлення м'якоті	помірна	5	
26	Коренеплід: виявлення кілець	помірне	5	
27	Тенденція до стрілкування (за ранньої сівби)	відсутня або дуже слабка	1	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 87. Товарна врожайність, т/га – 82. Маса товарного коренеплоду, г – 210. Вміст сухої речовини в плоді, % – 12,5, загального цукру, % – 8,5.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Гарбуз звичайний *Cucurbita pepo* L.

Заявка № 17150002 Назва сорту: ГЛ Класік Заявник (код): 2524 Власник сорту (код): 2524

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 20.11.2020

Свідцтво про державну реєстрацію № 200857

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: форма сім'ядолей	широкоеліптична	3	
2	Паросток: інтенсивність зеленого забарвлення сім'ядолей	слабка	3	
3	Паросток: форма поперечного перерізу сім'ядолі	пряма	2	
4	Рослина: габітус	плетистий	3	
5	Рослина: галузнення	наявне	9	
6	Рослина: ступінь галузнення	помірний	5	
7	Лише куцові сорти. Рослина: положення черешка (за виключенням нижніх зовнішніх листків)	ознака не визначається	0	
8	Стебло: забарвлення	цілком зелене	1	
9	Стебло: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
10	Стебло: крапчастість	відсутня	1	
11	Стебло: вусяки	добре розвинені	2	
12	Листкова пластинка: розмір	середній	5	
13	Листкова пластинка: розсіченість	помірна	5	
14	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	сильна	7	
15	Листкова пластинка: срібляста плямистість	відсутня	1	
16	Листкова пластинка: поверхня, охоплена сріблястою плямистістю	ознака не визначається	0	
17	Черешок: за довжиною	середній	5	
18	Черешок: кількість шипів	велика	7	
19	Жіноча квітка: кільце всередині віночка	наявне	9	
20	Жіноча квітка: забарвлення кільця всередині віночка	зелене	2	
21	Лише сорти з зеленим забарвленням кільця всередині віночка. Жіноча квітка: інтенсивність забарвлення	слабка	3	
22	Чоловіча квітка: кільце всередині віночка	наявне	9	
23	Чоловіча квітка: забарвлення кільця всередині віночка	жовте	1	
24	Лише сорти з зеленим забарвленням кільця всередині віночка. Чоловіча квітка: інтенсивність забарвлення	ознака не визначається	0	
25	Лише сорти типу цукіні. Молодий плід: відношення довжини до максимального діаметра	ознака не визначається	0	
26	Лише сорти типу цукіні та цукіні кулястого. Молодий плід: переважаюча форма	ознака не визначається	0	
27	Молодий плід: основне забарвлення шкірки (за винятком забарвлення ребер або боріздок)	кремове	2	
28	Лише сорти з жовтим забарвленням шкірки. Молодий плід: інтенсивність жовтого забарвлення шкірки (як для 27)	ознака не визначається	0	
29	Лише сорти із зеленим забарвленням шкірки. Молодий плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки (як для 27)	ознака не визначається	0	
30	Плід: переважна форма	поперечно широко-еліптична	3	
31,1	Лише сорти типу патисон. Плід: за довжиною	ознака не визначається	0	
31,2	Лише сорти типу жолудь. Плід: за довжиною	ознака не визначається	0	
31,3	Лише сорти типу з шийкою. Плід: за довжиною	ознака не визначається	0	
31,4	Лише сорти типу цукіні. Плід: за довжиною	ознака не визначається	0	
32,1	Лише сорти типу патисон. Плід: максимальний діаметр	ознака не визначається	0	
32,2	Лише сорти типу жолудь. Плід: максимальний діаметр	ознака не визначається	0	
32,3	Лише сорти типу цукіні. Плід: максимальний діаметр	ознака не визначається	0	
33,1	Лише сорти типу патисон. Плід: відношення довжини до найбільшого діаметра	ознака не визначається	0	
33,2	Лише сорти типу жолудь. Плід: відношення довжини до найбільшого діаметра	ознака не визначається	0	
33,3	Лише сорти типу цукіні. Плід: відношення довжини до найбільшого діаметра	ознака не визначається	0	
34,1	Лише сорти типу гарбуз. Плід: розмір	середній	5	
34,2	Лише сорти типу Rondini. Плід: розмір	ознака не визначається	0	
35	Лише сорти типу мініатюрний гарбуз. Плід: форма плодоніжки	ознака не визначається	0	
36	Лише сорти типу патисон. Плід: вираження екваторіального краю	ознака не визначається	0	
37	Лише сорти типу патисон. Плід: позиція (положення) екваторіального краю	ознака не визначається	0	
38	Лише сорти типу патисон. Плід: форма плодоніжки	ознака не визначається	0	
39	Лише сорти типу патисон. Плід: форма верхівки	ознака не визначається	0	
40	Лише сорти типу жолудь. Плід: положення найбільшого діаметра	ознака не визначається	0	
41	Лише сорти типу жолудь. Плід: форма плодоніжки	ознака не визначається	0	
42	Лише сорти типу з шийкою. Плід: шийка за довжиною	ознака не визначається	0	
43	Лише сорти типу з шийкою. Плід: відношення діаметра шийки до найбільшого діаметра	ознака не визначається	0	
44	Лише сорти типу з шийкою. Плід: викривлення шийки	ознака не визначається	0	
45	Лише сорти типу з шийкою і цукіні. Плід: апікальний кінець	ознака не визначається	0	
46	Плід: боріздки	наявні	9	
47	Плід: боріздки за глибиною	мілкі	3	
48	Плід: ребра	наявні	9	
49	Плід: ступінь виявлення ребер	слабкий	3	
50	Плід: основне забарвлення шкірки (за виключенням забарвлення плям, крапок, смужок і смуг)	жовте	3	
51	Лише сорти з жовтим забарвленням шкірки. Плід: інтенсивність жовтого забарвлення шкірки (як для 50)	помірна	5	
52	Лише сорти з зеленим забарвленням шкірки. Плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки (як для 50)	ознака не визначається	0	
53	Лише сорти з двома основними забарвленнями шкірки. Плід: поширення зеленого забарвлення	ознака не визначається	0	

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
54	Плід: смужки на борізках	наявні	9	
55	Плід: забарвлення смужок на борізках	жовті	2	
56	Плід: забарвлення ребер у порівнянні з основним забарвленням шкірки (як для 50)	темніше	2	
57	Плід: плямистість	наявна	9	
58	Плід: розмір основних плям	великий	7	
59	Плід: вторинне зелене забарвлення між ребрами (за виключенням плям)	відсутнє	1	
60	Плід: інтенсивність вторинного зеленого забарвлення між ребрами	ознака не визначається	0	
61	Плід: поширення вторинного зеленого забарвлення між ребрами	ознака не визначається	0	
62	Плід: бородавки на шкірці	відсутні	1	
63	Плід: кількість бородавок на шкірці	ознака не визначається	0	
64	Плід: розмір квіткового рубця	малий	3	
65	Плід: плодоніжка за довжиною	середня	5	
66	Плід: забарвлення плодоніжки	зелене	2	
67	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плодоніжки	сильна	7	
68	Плід: крапчастість плодоніжки	наявна	9	
69	Стиглий плід: основне забарвлення шкірки (за виключенням забарвлення крапок, плям, смуг і смужечок)	оранжеве	5	
70	Стиглий плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (лише жовтого чи оранжевого)	слабка	3	
71	Стиглий плід: вторинне забарвлення шкірки (як для 69)	жовте	3	
72	Стиглий плід: зелений відтінок (лише білого і кремового)	ознака не визначається	0	
73	Стиглий плід: переважаючий зелений відтінок (як для 72)	ознака не визначається	0	
74	Стиглий плід: забарвлення м'якоті	кремове	1	
75	Стиглий плід: здерев'яніння шкірки	наявне	9	
76	Стиглий плід: структура м'якоті	не волокниста	1	
77	Насінина: розмір	великий	7	
78	Насінина: форма	еліптична	5	
79	Насінина: лушпиння	відсутнє	1	
80	Насінина: наявне лушпиння	ознака не визначається	0	
81	Насінина: забарвлення	ознака не визначається	0	

За інформацією наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Товарна врожайність плодів, т/га – 0,6. Вміст сухої речовини, % – 52. Тривалість періоду до досягання, діб – 108.

Ураженість хворобами: борошнистою росою, % – 10, плямистістю бактеріальною, % – 2.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Дворядник тонколистий *Diplotaxis tenuifolia* (L.) DC.

Заявка № 19582001 Назва сорту: Молодість **Заявник (код):** 1708 **Власник сорту (код):** 1708

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 11.12.2020 **Патент № 200741**

Дата пріоритету: 08.07.2019

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 17.11.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200864

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Листок: положення	горизонтальне	5	
2	Листок: колір пластинки	сіро-зелений	2	
3	Листок: інтенсивність забарвлення	темне	7	
4	Листок: за довжиною	середній	5	
5	Листок: за шириною	середній	5	
6	Листок: розсіченість	сильна	7	
7	Листок: ширина первинних часток	вузькі	3	
8	Листок: вторинне розчленування	помірне	2	
9	Час цвітіння	середній	5	
10	Рослина: за висотою (у фазі цвітіння)	середня	5	
11	Квітка: інтенсивність жовтого забарвлення	помірне	5	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна врожайність зелених листків, т/га – 28. Тривалість періоду від сходів до збирання врожаю, діб – 36. Вміст вітаміну С, мг/100 г – 94,83, йоду, мг/100 г – 18,5, заліза, мг/100 г – 1,5. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): пероноспороз (*Erysiphe communis* (Wallr.) Schltdl.) – 7, плямистість (*Alternaria* spp.) – 7, сіра гниль (*Botrytis cinerea* Pers.) – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Диня звичайна *Cucumis melo* L.

Заявка № 19147020 Назва сорту: Ареналес Заявник (код): 840 Власник сорту (код): 840

Дата пріоритету: 24.12.2019

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201016

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: гіпокотиль за довжиною (фаза першого справжнього листка)	середній	5	
2	Паросток: розмір сім'ядоль (як для 1)	середній	5	
3	Паросток: інтенсивність зеленого забарвлення сім'ядолей (як для 1)	помірна	5	
4	Листкова пластинка: розмір	середній	5	
5	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
6	Листкова пластинка: вираженість лопатей	помірна	5	
7	Листкова пластинка: верхівкова лопать за довжиною	середня	5	
8	Листкова пластинка: зубчастість країв	помірна	5	
9	Листкова пластинка: пухирчастість	слабка	3	
10	Черешок: положення (у фазі 3-х листків)	пряме	3	
11	Черешок: за довжиною	середній	5	
12	Квітка: стать (за повного цвітіння)	андромонеоційні	2	
13	Молодий плід: відтінок зеленого забарвлення шкірки	зелений	3	
14	Молодий плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки	помірна	5	
15	Молодий плід: щільність крапок	щільна	7	
16	Молодий плід: розмір крапок	малий	3	
17	Молодий плід: контрастність крапок і основного забарвлення	помірна	5	
18	Молодий плід: вираженість забарвлення боріздок	відсутня або дуже слабка	1	
19	Молодий плід: інтенсивність забарвлення боріздок	ознака не визначається	0	
20	Молодий плід: плодоніжка за довжиною	коротка	3	
21	Плід: плодоніжка за товщиною (на відстані 1 см від плоду)	середня	5	
22	Молодий плід: поширення темнішої площі навколо плодоніжки	середнє	5	
23	Плід: зміна забарвлення шкірки від молодого плоду до стиглого плоду або не змінюється взагалі	на дуже пізніх стадіях розвитку	3	
24	Плід: за довжиною	довгий	7	
25	Плід: діаметр	середній	5	
26	Плід: відношення довжина/діаметр	велике	7	
27	Плід: місце найбільшого діаметра	у центрі	2	
28	Плід: форма поздовжнього розрізу	помірноеліптична	2	
29	Плід: основне забарвлення шкірки (за досягання)	зелене	3	
30	Плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (за досягання)	сильна	7	
31	Плід: відтінок основного забарвлення шкірки (за досягання)	відсутній або дуже слабкий	1	
32	Плід: щільність крапок	щільна	7	
33	Плід: розмір крапок	малий	3	
34	Плід: забарвлення крапок	жовте	2	
35	Плід: інтенсивність забарвлення крапок	помірна	5	
36	Плід: щільність плям	нещільна	3	
37	Плід: розмір плям	малий	3	
38	Плід: бородавки	відсутні	1	
39	Плід: міцність прикріплення плодоніжки до стиглого плоду	сильна	7	
40	Плід: форма основи	загострена	1	
41	Плід: форма верхівки	загострена	1	
42	Плід: розмір маточкового рубця	середній	5	
43	Плід: борізки	відсутні або дуже слабо виражені	1	
44	Плід: борізки за шириною	ознака не визначається	0	
45	Плід: борізки за глибиною	ознака не визначається	0	
46	Плід: забарвлення боріздок	ознака не визначається	0	
47	Плід: зморшуватість поверхні	помірна	5	
48	Плід: коркове утворення	наявне	9	
49	Плід: корковий шар за товщиною	тонкий	3	
50	Плід: візерунок коркового утворення	лише лініями	3	
51	Плід: щільність візерунку коркового утворення	дуже нещільна	1	
52	Плід: швидкість зміни забарвлення шкірки плоду від технічної до біологічної стиглості	відсутня або дуже низька	1	
53	Плід: м'якість в поздовжньому розрізі за товщиною (в місці максимального діаметра плоду)	середня	5	
54	Плід: основне забарвлення м'якоті	біле	1	
55	Лише для сортів з оранжевим забарвленням м'якоті. Плід: інтенсивність оранжевого забарвлення м'якоті	ознака не визначається	0	
56	Лише для сортів із білим, зеленувато-білим, зеленим, жовтувато-білим забарвленням м'якоті. Плід: вторинне оранжево-рожеве забарвлення м'якоті	слабке	3	
57	Плід: консистенція м'якоті	середня	5	
58	Лише для сортів, що змінюють забарвлення шкірки плоду від технічної до біологічної стиглості. Плід: відтінок забарвлення шкірки (за біологічної стиглості)	ознака не визначається	0	
59	Лише для сортів, що змінюють забарвлення шкірки плоду від технічної до біологічної стиглості з жовтим або оранжево-жовтим забарвленням шкірки. Плід: інтенсивність жовтого забарвлення шкірки (за біологічної стиглості)	ознака не визначається	0	
60	Насінина: за довжиною	довга	7	
61	Насінина: за шириною	широка	7	

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
62	Насінина: форма	не подібна до форми кедрового горішка	1	
63	Насінина: забарвлення	кремово-жовте	2	
64	Лише для сортів з кремово-жовтим забарвленням насіння. Насінина: інтенсивність забарвлення	помірна	5	
65	Час цвітіння чоловічих квіток	пізній	7	
66	Час цвітіння жіночих квіток	середній	5	
67	Час достигання	пізній	7	
68	Термін зберігання плоду	тривалий	7	
69	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>melonis</i>	наявна	9	
70	Стійкість до <i>Sphaerotheca fuliginea</i> (<i>Podosphaera xanthii</i>) (борошнистої роси)	наявна	9	
71	Стійкість до <i>Erysiphe cichoracearum</i> (<i>Golovinomyces cichoracearum</i>) (борошнистої роси)	високо стійкий	3	
72	Стійкість до колоній (<i>Aphis gossypii</i>)	ознака не визначалась	0	
73	Стійкість до вірусу жовтої мозаїки цукіні (ZYMV)	ознака не визначалась	0	
74	Стійкість до кільчастого вірусу папайї (PRSV)	ознака не визначалась	0	
75	Стійкість до вірусу некротичної плямистості дині (MNSV)	наявна	9	
76	Стійкість до вірусу мозаїки огірка (CMV)	ознака не визначалась	0	

За інформацією наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 50. Період від садіння 30-ти денної розсади до останнього збирання плодів, діб – 90.
Вміст сухої речовини в плодах, % – 6, загального цукру, % – 14.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП, ЗГр.

Вид: Диня звичайна *Cucumis melo* L.

Заявка № 19147001 Назва сорту: Дейра Заявник (код): 840 Власник сорту (код): 840

Дата пріоритету: 30.01.2019

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 20.11.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200865

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: гіпокотиль за довжиною (фаза першого справжнього листка)	короткий	3	
2	Паросток: розмір сім'ядоль (як для 1)	середній	5	
3	Паросток: інтенсивність зеленого забарвлення сім'ядолей (як для 1)	сильна	7	
4	Листкова пластинка: розмір	малий	3	
5	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
6	Листкова пластинка: вираженість лопатей	помірна	5	
7	Листкова пластинка: верхівкова лопать за довжиною	коротка	3	
8	Листкова пластинка: зубчастість країв	слабка	3	
9	Листкова пластинка: пухирчастість	помірна	5	
10	Черешок: положення (у фазі 3-х листків)	напівпряме	5	
11	Черешок: за довжиною	середній	5	
12	Квітка: стать (за повного цвітіння)	моноєційні	1	
13	Молодий плід: відтінок зеленого забарвлення шкірки	сірувато-зелений	4	
14	Молодий плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки	сильна	7	
15	Молодий плід: щільність крапок	помірної щільності	5	
16	Молодий плід: розмір крапок	середній	5	
17	Молодий плід: контрастність крапок і основного забарвлення	слабка	3	
18	Молодий плід: вираженість забарвлення боріздов	помірна	5	
19	Молодий плід: інтенсивність забарвлення боріздов	помірна	5	
20	Молодий плід: плодоніжка за довжиною	середня	5	
21	Плід: плодоніжка за товщиною (на відстані 1 см від плоду)	середня	5	
22	Молодий плід: поширення темнішої площі навколо плодоніжки	середнє	5	
23	Плід: зміна забарвлення шкірки від молодого плоду до стиглого	на пізніх стадіях розвитку плоду	2	
24	Плід: за довжиною	довгий	7	
25	Плід: діаметр	середній	5	
26	Плід: відношення довжина/діаметр	середнє	5	
27	Плід: місце найбільшого діаметра	у центрі	2	
28	Плід: форма поздовжнього розрізу	помірноеліптична	2	
29	Плід: основне забарвлення шкірки (за досягання)	жовте	2	
30	Плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (за досягання)	сильна	7	
31	Плід: відтінок основного забарвлення шкірки (за досягання)	вохристий	5	
32	Плід: щільність крапок	відсутня або дуже нещільна	1	
33	Плід: розмір крапок	ознака не визначається	0	
34	Плід: забарвлення крапок	ознака не визначається	0	
35	Плід: інтенсивність забарвлення крапок	ознака не визначається	0	
36	Плід: щільність плям	нещільна	3	
37	Плід: розмір плям	малий	3	
38	Плід: бородавки	відсутні	1	
39	Плід: міцність прикріплення плодоніжки до стиглого плоду	дуже слабка	1	
40	Плід: форма основи	заокруглена	2	
41	Плід: форма верхівки	заокруглена	2	
42	Плід: розмір маточкового рубця	малий	3	
43	Плід: боріздки	відсутні або дуже слабо виражені	1	
44	Плід: боріздки за шириною	ознака не визначається	0	
45	Плід: боріздки за глибиною	ознака не визначається	0	
46	Плід: забарвлення боріздов	ознака не визначається	0	
47	Плід: зморшуватість поверхні	сильна	7	
48	Плід: коркове утворення	наявне	9	
49	Плід: корковий шар за товщиною	тонкий	3	
50	Плід: візерунок коркового утворення	лініями і сіткою	4	
51	Плід: щільність візерунку коркового утворення	нещільна	3	
52	Плід: швидкість зміни забарвлення шкірки плоду від технічної до біологічної стиглості	низька	3	
53	Плід: м'якість в поздовжньому розрізі за товщиною (в місці максимального діаметра плоду)	середня	5	
54	Плід: основне забарвлення м'якоті	зеленувато-біле	2	
55	Лише для сортів з оранжевим забарвленням м'якоті. Плід: інтенсивність оранжевого забарвлення м'якоті	ознака не визначається	0	
56	Лише для сортів із білим, зеленувато-білим, зеленим, жовтувато-білим забарвленням м'якоті. Плід: вторинне оранжево-рожеве забарвлення м'якоті	слабке	3	
57	Плід: консистенція м'якоті	м'яка	3	
58	Лише для сортів, що змінюють забарвлення шкірки плоду від технічної до біологічної стиглості. Плід: відтінок забарвлення шкірки (за біологічної стиглості)	оранжево-жовтий	2	
59	Лише для сортів, що змінюють забарвлення шкірки плоду від технічної до біологічної стиглості з жовтим або оранжево-жовтим забарвленням шкірки. Плід: інтенсивність жовтого забарвлення шкірки (за біологічної стиглості)	помірна	5	
60	Насінина: за довжиною	середня	5	
61	Насінина: за шириною	середня	5	

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
62	Насінина: форма	не подібна до форми кедрового горішка	1	
63	Насінина: забарвлення	кремово-жовте	2	
64	Лише для сортів з кремово-жовтим забарвленням насіння. Насінина: інтенсивність забарвлення	слабка	3	
65	Час цвітіння чоловічих квіток	ранній	3	
66	Час цвітіння жіночих квіток	ранній	3	
67	Час достигання	дуже ранній	1	
68	Термін зберігання плоду	короткий	3	
69	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>melonis</i>	ознака не визначалась	0	
70	Стійкість до <i>Sphaerotheca fuliginea</i> (<i>Podosphaera xanthii</i>) (борошнистої роси)	ознака не визначалась	0	
71	Стійкість до <i>Erysiphe cichoracearum</i> (<i>Golovinomyces cichoracearum</i>) (борошнистої роси)	ознака не визначалась	0	
72	Стійкість до колоній (<i>Aphis gossypii</i>)	ознака не визначалась	0	
73	Стійкість до вірусу жовтої мозаїки цукіні (ZYMV)	ознака не визначалась	0	
74	Стійкість до кільчастого вірусу папайї (PRSV)	ознака не визначалась	0	
75	Стійкість до вірусу некротичної плямистості дині (MNSV)	ознака не визначалась	0	
76	Стійкість до вірусу мозаїки огірка (CMV)	ознака не визначалась	0	

За інформацією наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 105. Період від садіння 30-ти денної розсади до останнього збирання плодів, діб – 60. Період від повних сходів до першого збирання, діб – 45. Вміст сухої речовини в плодах, % – 8,1, загального цукру, % – 18.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Диня звичайна *Cucumis melo* L.

Заявка № 19147014 Назва сорту: Лукстар Заявник (код): 840 Власник сорту (код): 840

Дата пріоритету: 24.12.2019

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201015

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: гіпокотиль за довжиною (фаза першого справжнього листка)	середній	5	
2	Паросток: розмір сім'ядоль (як для 1)	середній	5	
3	Паросток: інтенсивність зеленого забарвлення сім'ядолей (як для 1)	сильна	7	
4	Листкова пластинка: розмір	середній	5	
5	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
6	Листкова пластинка: вираженість лопатей	помірна	5	
7	Листкова пластинка: верхівкова лопать за довжиною	коротка	3	
8	Листкова пластинка: зубчастість країв	слабка	3	
9	Листкова пластинка: пухирчастість	помірна	5	
10	Черешок: положення (у фазі 3-х листків)	напівпряме	5	
11	Черешок: за довжиною	середній	5	
12	Квітка: стать (за повного цвітіння)	моноєційні	1	
13	Молодий плід: відтінок зеленого забарвлення шкірки	зелений	3	
14	Молодий плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки	сильна	7	
15	Молодий плід: щільність крапок	дуже щільна	9	
16	Молодий плід: розмір крапок	малий	3	
17	Молодий плід: контрастність крапок і основного забарвлення	помірна	5	
18	Молодий плід: вираженість забарвлення боріздок	відсутня або дуже слабка	1	
19	Молодий плід: інтенсивність забарвлення боріздок	ознака не визначається	0	
20	Молодий плід: плодоніжка за довжиною	коротка	3	
21	Плід: плодоніжка за товщиною (на відстані 1 см від плоду)	середня	5	
22	Молодий плід: поширення темнішої площі навколо плодоніжки	відсутнє або дуже мале	1	
23	Плід: зміна забарвлення шкірки від молодого плоду до стиглого	на пізніх стадіях розвитку плоду	2	
24	Плід: за довжиною	дуже довгий	9	
25	Плід: діаметр	дуже великий	9	
26	Плід: відношення довжина/діаметр	велике	7	
27	Плід: місце найбільшого діаметра	у центрі	2	
28	Плід: форма поздовжнього розрізу	помірноеліптична	2	
29	Плід: основне забарвлення шкірки (за досягання)	жовте	2	
30	Плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (за досягання)	помірна	5	
31	Плід: відтінок основного забарвлення шкірки (за досягання)	вохристий	5	
32	Плід: щільність крапок	щільна	7	
33	Плід: розмір крапок	малий	3	
34	Плід: забарвлення крапок	жовте	2	
35	Плід: інтенсивність забарвлення крапок	слабка	3	
36	Плід: щільність плям	відсутня або дуже нещільна	1	
37	Плід: розмір плям	ознака не визначається	0	
38	Плід: бородавки	відсутні	1	
39	Плід: міцність прикріплення плодоніжки до стиглого плоду	помірна	5	
40	Плід: форма основи	заокруглена	2	
41	Плід: форма верхівки	заокруглена	2	
42	Плід: розмір маточкового рубця	малий	3	
43	Плід: борізки	відсутні або дуже слабко виражені	1	
44	Плід: борізки за шириною	ознака не визначається	0	
45	Плід: борізки за глибиною	ознака не визначається	0	
46	Плід: забарвлення боріздок	ознака не визначається	0	
47	Плід: зморшуватість поверхні	слабка	3	
48	Плід: коркове утворення	наявне	9	
49	Плід: корковий шар за товщиною	середній	5	
50	Плід: візерунок коркового утворення	лише сіткою	5	
51	Плід: щільність візерунку коркового утворення	середньої щільності	5	
52	Плід: швидкість зміни забарвлення шкірки плоду від технічної до біологічної стиглості	середня	5	
53	Плід: м'якість в поздовжньому розрізі за товщиною (в місці максимального діаметра плоду)	середня	5	
54	Плід: основне забарвлення м'якоті	біле	1	
55	Лише для сортів з оранжевим забарвленням м'якоті. Плід: інтенсивність оранжевого забарвлення м'якоті	ознака не визначається	0	
56	Лише для сортів із білим, зеленувато-білим, зеленим, жовтувато-білим забарвленням м'якоті. Плід: вторинне оранжево-рожеве забарвлення м'якоті	відсутнє або дуже слабке	1	
57	Плід: консистенція м'якоті	тверда	7	
58	Лише для сортів, що змінюють забарвлення шкірки плоду від технічної до біологічної стиглості. Плід: відтінок забарвлення шкірки (за біологічної стиглості)	оранжево-жовтий	2	
59	Лише для сортів, що змінюють забарвлення шкірки плоду від технічної до біологічної стиглості з жовтим або оранжево-жовтим забарвленням шкірки. Плід: інтенсивність жовтого забарвлення шкірки (за біологічної стиглості)	сильна	7	
60	Насінина: за довжиною	середня	5	
61	Насінина: за шириною	середня	5	

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
62	Насінина: форма	не подібна до форми кедрового горішка	1	
63	Насінина: забарвлення	кремово-жовте	2	
64	Лише для сортів з кремово-жовтим забарвленням насіння. Насінина: інтенсивність забарвлення	помірна	5	
65	Час цвітіння чоловічих квіток	ранній	3	
66	Час цвітіння жіночих квіток	ранній	3	
67	Час достигання	ранній	3	
68	Термін зберігання плоду	короткий	3	
69	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>melonis</i>	наявна	9	
70	Стійкість до <i>Sphaerotheca fuliginea</i> (<i>Podosphaera xanthii</i>) (борошнистої роси)	наявна	9	
71	Стійкість до <i>Erysiphe cichoracearum</i> (<i>Golovinomyces cichoracearum</i>) (борошнистої роси)	високо стійкий	3	
72	Стійкість до колоній (<i>Aphis gossypii</i>)	відсутня	1	
73	Стійкість до вірусу жовтої мозаїки цукіні (ZYMV)	відсутня	1	
74	Стійкість до кільчастого вірусу папайї (PRSV)	відсутня	1	
75	Стійкість до вірусу некротичної плямистості дині (MNSV)	відсутня	1	
76	Стійкість до вірусу мозаїки огірка (CMV)	відсутня	1	

За інформацією наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 50. Період від садіння 30-ти денної розсади до останнього збирання плодів, діб – 30.
Вміст сухої речовини в плодах, % – 6, загального цукру, % – 12.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП, ЗГр.

Вид: Диня звичайна *Cucumis melo* L.

Заявка № 18147005 Назва сорту: МАІЛЛОТ Заявник (код): 1050 Власник сорту (код): 1050

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 08.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201149

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: гіпокотиль за довжиною (фаза першого справжнього листка)	дуже довгий	9	
2	Паросток: розмір сім'ядоль (як для 1)	великий	7	
3	Паросток: інтенсивність зеленого забарвлення сім'ядолей (як для 1)	помірна	5	
4	Листкова пластинка: розмір	малий	3	
5	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
6	Листкова пластинка: вираженість лопатей	помірна	5	
7	Листкова пластинка: верхівкова лопать за довжиною	середня	5	
8	Листкова пластинка: зубчастість країв	слабка	3	
9	Листкова пластинка: пухирчастість	помірна	5	
10	Черешок: положення (у фазі 3-х листків)	напівпряме	5	
11	Черешок: за довжиною	короткий	3	
12	Квітка: стать (за повного цвітіння)	моноеційні	1	
13	Молодий плід: відтінок зеленого забарвлення шкірки	жовтувато-зелений	2	
14	Молодий плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки	дуже слабка	1	
15	Молодий плід: щільність крапок	відсутня або дуже нещільна	1	
16	Молодий плід: розмір крапок	ознака не визначається	0	
17	Молодий плід: контрастність крапок і основного забарвлення	ознака не визначається	0	
18	Молодий плід: вираженість забарвлення боріздки	відсутня або дуже слабка	1	
19	Молодий плід: інтенсивність забарвлення боріздки	ознака не визначається	0	
20	Молодий плід: плодоніжка за довжиною	коротка	3	
21	Плід: плодоніжка за товщиною (на відстані 1 см від плоду)	середня	5	
22	Молодий плід: поширення темнішої площі навколо плодоніжки	відсутнє або дуже мале	1	
23	Плід: зміна забарвлення шкірки від молодого плоду до стиглого	на ранніх стадіях розвитку плоду	1	
24	Плід: за довжиною	середній	5	
25	Плід: діаметр	середній	5	
26	Плід: відношення довжина/діаметр	середнє	5	
27	Плід: місце найбільшого діаметра	у центрі	2	
28	Плід: форма поздовжнього розрізу	яйцеподібна	1	
29	Плід: основне забарвлення шкірки (за досягання)	жовте	2	
30	Плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (за досягання)	слабка	3	
31	Плід: відтінок основного забарвлення шкірки (за досягання)	відсутній або дуже слабкий	1	
32	Плід: щільність крапок	помірної щільності	5	
33	Плід: розмір крапок	малий	3	
34	Плід: забарвлення крапок	жовте	2	
35	Плід: інтенсивність забарвлення крапок	слабка	3	
36	Плід: щільність плям	відсутня або дуже нещільна	1	
37	Плід: розмір плям	ознака не визначається	0	
38	Плід: бородавки	відсутні	1	
39	Плід: міцність прикріплення плодоніжки до стиглого плоду	сильна	7	
40	Плід: форма основи	загострена	1	
41	Плід: форма верхівки	загострена	1	
42	Плід: розмір маточкового рубця	середній	5	
43	Плід: боріздки	відсутні або дуже слабо виражені	1	
44	Плід: боріздки за шириною	ознака не визначається	0	
45	Плід: боріздки за глибиною	ознака не визначається	0	
46	Плід: забарвлення боріздки	ознака не визначається	0	
47	Плід: зморшкуватість поверхні	помірна	5	
48	Плід: коркове утворення	відсутнє	1	
49	Плід: корковий шар за товщиною	ознака не визначається	0	
50	Плід: візерунок коркового утворення	ознака не визначається	0	
51	Плід: щільність візерунку коркового утворення	ознака не визначається	0	
52	Плід: швидкість зміни забарвлення шкірки плоду від технічної до біологічної стиглості	низька	3	
53	Плід: м'якоть в поздовжньому розрізі за товщиною (в місці максимального діаметра плоду)	товста	7	
54	Плід: основне забарвлення м'якоті	зеленувато-біле	2	
55	Лише для сортів з оранжевим забарвленням м'якоті. Плід: інтенсивність оранжевого забарвлення м'якоті	ознака не визначається	0	
56	Лише для сортів із білим, зеленувато-білим, зеленим, жовтувато-білим забарвленням м'якоті. Плід: вторинне оранжево-рожеве забарвлення м'якоті	слабке	3	
57	Плід: консистенція м'якоті	середня	5	
58	Лише для сортів, що змінюють забарвлення шкірки плоду від технічної до біологічної стиглості. Плід: відтінок забарвлення шкірки (за біологічної стиглості)	жовтий	1	
59	Лише для сортів, що змінюють забарвлення шкірки плоду від технічної до біологічної стиглості з жовтим або оранжево-жовтим забарвленням шкірки. Плід: інтенсивність жовтого забарвлення шкірки (за біологічної стиглості)	сильна	7	
60	Насінина: за довжиною	середня	5	
61	Насінина: за шириною	середня	5	
62	Насінина: форма	не подібна до форми кедрового горішка	1	

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
63	Насінина: забарвлення	кремово-жовте	2	
64	Лише для сортів з кремово-жовтим забарвленням насіння. Насінина: інтенсивність забарвлення	помірна	5	
65	Час цвітіння чоловічих квіток	ранній	3	
66	Час цвітіння жіночих квіток	середній	5	
67	Час достигання	пізній	7	
68	Термін зберігання плоду	тривалий	7	
69	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>melonis</i>	ознака не визначалась	0	
70	Стійкість до <i>Sphaerotheca fuliginea</i> (<i>Podosphaera xanthii</i>) (борошнистої роси)	ознака не визначалась	0	
71	Стійкість до <i>Erysiphe cichoracearum</i> (<i>Golovinomyces cichoracearum</i>) (борошнистої роси)	ознака не визначалась	0	
72	Стійкість до колоній (<i>Aphis gossypii</i>)	ознака не визначалась	0	
73	Стійкість до вірусу жовтої мозаїки цукіні (ZYMV)	ознака не визначалась	0	
74	Стійкість до кільчастого вірусу папайї (PRSV)	ознака не визначалась	0	
75	Стійкість до вірусу некротичної плямистості дині (MNSV)	ознака не визначалась	0	
76	Стійкість до вірусу мозаїки огірка (CMV)	ознака не визначалась	0	

За інформацією наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 35. Період від садіння 30-ти денної розсади до останнього збирання плодів, діб – 90. Період від повних сходів до першого збирання, діб – 35. Вміст сухої речовини в плодах, % – 19, загального цукру, % – 13.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Диня звичайна *Cucumis melo* L.

Заявка № 18147004 Назва сорту: МАКАБЕО Заявник (код): 1050 Власник сорту (код): 1050

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 08.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201148

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: гіпокотиль за довжиною (фаза першого справжнього листка)	довгий	7	
2	Паросток: розмір сім'ядоль (як для 1)	великий	7	
3	Паросток: інтенсивність зеленого забарвлення сім'ядолей (як для 1)	помірна	5	
4	Листкова пластинка: розмір	малий	3	
5	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
6	Листкова пластинка: вираженість лопатей	помірна	5	
7	Листкова пластинка: верхівкова лопать за довжиною	середня	5	
8	Листкова пластинка: зубчастість країв	слабка	3	
9	Листкова пластинка: пухирчастість	слабка	3	
10	Черешок: положення (у фазі 3-х листків)	пряме	3	
11	Черешок: за довжиною	короткий	3	
12	Квітка: стать (за повного цвітіння)	андромонеційні	2	
13	Молодий плід: відтінок зеленого забарвлення шкірки	жовтувато-зелений	2	
14	Молодий плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки	сильна	7	
15	Молодий плід: щільність крапок	нещільна	3	
16	Молодий плід: розмір крапок	малий	3	
17	Молодий плід: контрастність крапок і основного забарвлення	помірна	5	
18	Молодий плід: вираженість забарвлення боріздки	відсутня або дуже слабка	1	
19	Молодий плід: інтенсивність забарвлення боріздки	ознака не визначається	0	
20	Молодий плід: плодоніжка за довжиною	коротка	3	
21	Плід: плодоніжка за товщиною (на відстані 1 см від плоду)	тонка	3	
22	Молодий плід: поширення темнішої площі навколо плодоніжки	мале	3	
23	Плід: зміна забарвлення шкірки від молодого плоду до стиглого плоду або не змінюється взагалі	на дуже пізніх стадіях розвитку	3	
24	Плід: за довжиною	довгий	7	
25	Плід: діаметр	дуже малий	1	
26	Плід: відношення довжина/діаметр	від малого до середнього	4	
27	Плід: місце найбільшого діаметра	ближче до плодоніжки	1	
28	Плід: форма поздовжнього розрізу	яйцеподібна	1	
29	Плід: основне забарвлення шкірки (за досягання)	зелене	3	
30	Плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (за досягання)	помірна	5	
31	Плід: відтінок основного забарвлення шкірки (за досягання)	жовтуватий	3	
32	Плід: щільність крапок	щільна	7	
33	Плід: розмір крапок	малий	3	
34	Плід: забарвлення крапок	жовте	2	
35	Плід: інтенсивність забарвлення крапок	помірна	5	
36	Плід: щільність плям	нещільна	3	
37	Плід: розмір плям	малий	3	
38	Плід: бородавки	відсутні	1	
39	Плід: міцність прикріплення плодоніжки до стиглого плоду	дуже сильна	9	
40	Плід: форма основи	загострена	1	
41	Плід: форма верхівки	загострена	1	
42	Плід: розмір маточкового рубця	малий	3	
43	Плід: боріздки	відсутні або дуже слабко виражені	1	
44	Плід: боріздки за шириною	ознака не визначається	0	
45	Плід: боріздки за глибиною	ознака не визначається	0	
46	Плід: забарвлення боріздки	ознака не визначається	0	
47	Плід: зморшкуватість поверхні	помірна	5	
48	Плід: коркове утворення	наявне	9	
49	Плід: корковий шар за товщиною	тонкий	3	
50	Плід: візерунок коркового утворення	лише лініями	3	
51	Плід: щільність візерунку коркового утворення	нещільна	3	
52	Плід: швидкість зміни забарвлення шкірки плоду від технічної до біологічної стиглості	відсутня або дуже низька	1	
53	Плід: м'якість в поздовжньому розрізі за товщиною (в місці максимального діаметра плоду)	товста	7	
54	Плід: основне забарвлення м'якоті	зеленувато-біле	2	
55	Лише для сортів з оранжевим забарвленням м'якоті. Плід: інтенсивність оранжевого забарвлення м'якоті	ознака не визначається	0	
56	Лише для сортів із білим, зеленувато-білим, зеленим, жовтувато-білим забарвленням м'якоті. Плід: вторинне оранжево-рожеве забарвлення м'якоті	відсутнє або дуже слабке	1	
57	Плід: консистенція м'якоті	тверда	7	
58	Лише для сортів, що змінюють забарвлення шкірки плоду від технічної до біологічної стиглості. Плід: відтінок забарвлення шкірки (за біологічної стиглості)	ознака не визначається	0	
59	Лише для сортів, що змінюють забарвлення шкірки плоду від технічної до біологічної стиглості з жовтим або оранжево-жовтим забарвленням шкірки. Плід: інтенсивність жовтого забарвлення шкірки (за біологічної стиглості)	ознака не визначається	0	
60	Насінина: за довжиною	коротка	3	
61	Насінина: за шириною	середня	5	
62	Насінина: форма	не подібна до форми кедрового горішка	1	

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
63	Насінина: забарвлення	кремово-жовте	2	
64	Лише для сортів з кремово-жовтим забарвленням насіння. Насінина: інтенсивність забарвлення	слабка	3	
65	Час цвітіння чоловічих квіток	середній	5	
66	Час цвітіння жіночих квіток	середній	5	
67	Час достигання	дуже пізній	9	
68	Термін зберігання плоду	дуже тривалий	9	
69	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>melonis</i>	ознака не визначалась	0	
70	Стійкість до <i>Sphaerotheca fuliginea</i> (<i>Podosphaera xanthii</i>) (борошнистої роси)	ознака не визначалась	0	
71	Стійкість до <i>Erysiphe cichoracearum</i> (<i>Golovinomyces cichoracearum</i>) (борошнистої роси)	ознака не визначалась	0	
72	Стійкість до колоній (<i>Aphis gossypii</i>)	ознака не визначалась	0	
73	Стійкість до вірусу жовтої мозаїки цукіні (ZYMV)	ознака не визначалась	0	
74	Стійкість до кільчастого вірусу папайї (PRSV)	ознака не визначалась	0	
75	Стійкість до вірусу некротичної плямистості дині (MNSV)	ознака не визначалась	0	
76	Стійкість до вірусу мозаїки огірка (CMV)	ознака не визначалась	0	

За інформацією наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 42. Період від садіння 30-ти денної розсади до останнього збирання плодів, діб – 95. Період від повних сходів до першого збирання, діб – 40. Вміст сухої речовини в плодах, % – 21, загального цукру, % – 15.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Диня звичайна *Cucumis melo* L.

Заявка № 18147007 Назва сорту: МІМ03А Заявник (код): 1050 Власник сорту (код): 1050

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 08.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201150

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: гіпокотиль за довжиною (фаза першого справжнього листка)	середній	5	
2	Паросток: розмір сім'ядоль (як для 1)	середній	5	
3	Паросток: інтенсивність зеленого забарвлення сім'ядолей (як для 1)	помірна	5	
4	Листкова пластинка: розмір	малий	3	
5	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
6	Листкова пластинка: вираженість лопатей	помірна	5	
7	Листкова пластинка: верхівкова лопать за довжиною	довга	7	
8	Листкова пластинка: зубчастість країв	помірна	5	
9	Листкова пластинка: пухирчастість	помірна	5	
10	Черешок: положення (у фазі 3-х листків)	напівпряме	5	
11	Черешок: за довжиною	короткий	3	
12	Квітка: стать (за повного цвітіння)	андромонеційні	2	
13	Молодий плід: відтінок зеленого забарвлення шкірки	білувато-зелений	1	
14	Молодий плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки	слабка	3	
15	Молодий плід: щільність крапок	відсутня або дуже нещільна	1	
16	Молодий плід: розмір крапок	ознака не визначається	0	
17	Молодий плід: контрастність крапок і основного забарвлення	ознака не визначається	0	
18	Молодий плід: вираженість забарвлення боріздки	відсутня або дуже слабка	1	
19	Молодий плід: інтенсивність забарвлення боріздки	ознака не визначається	0	
20	Молодий плід: плодоніжка за довжиною	коротка	3	
21	Плід: плодоніжка за товщиною (на відстані 1 см від плоду)	середня	5	
22	Молодий плід: поширення темнішої площі навколо плодоніжки	відсутнє або дуже мале	1	
23	Плід: зміна забарвлення шкірки від молодого плоду до стиглого	на ранніх стадіях розвитку плоду	1	
24	Плід: за довжиною	середній	5	
25	Плід: діаметр	дуже малий	1	
26	Плід: відношення довжина/діаметр	мале	3	
27	Плід: місце найбільшого діаметра	у центрі	2	
28	Плід: форма поздовжнього розрізу	яйцеподібна	1	
29	Плід: основне забарвлення шкірки (за досягання)	жовте	2	
30	Плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (за досягання)	слабка	3	
31	Плід: відтінок основного забарвлення шкірки (за досягання)	відсутній або дуже слабкий	1	
32	Плід: щільність крапок	відсутня або дуже нещільна	1	
33	Плід: розмір крапок	ознака не визначається	0	
34	Плід: забарвлення крапок	ознака не визначається	0	
35	Плід: інтенсивність забарвлення крапок	ознака не визначається	0	
36	Плід: щільність плям	відсутня або дуже нещільна	1	
37	Плід: розмір плям	ознака не визначається	0	
38	Плід: бородавки	відсутні	1	
39	Плід: міцність прикріплення плодоніжки до стиглого плоду	помірна	5	
40	Плід: форма основи	загострена	1	
41	Плід: форма верхівки	загострена	1	
42	Плід: розмір маточкового рубця	малий	3	
43	Плід: боріздки	відсутні або дуже слабо виражені	1	
44	Плід: боріздки за шириною	ознака не визначається	0	
45	Плід: боріздки за глибиною	ознака не визначається	0	
46	Плід: забарвлення боріздки	ознака не визначається	0	
47	Плід: зморшкуватість поверхні	помірна	5	
48	Плід: коркове утворення	відсутнє	1	
49	Плід: корковий шар за товщиною	ознака не визначається	0	
50	Плід: візерунок коркового утворення	ознака не визначається	0	
51	Плід: щільність візерунку коркового утворення	ознака не визначається	0	
52	Плід: швидкість зміни забарвлення шкірки плоду від технічної до біологічної стиглості	відсутня або дуже низька	1	
53	Плід: м'якість в поздовжньому розрізі за товщиною (в місці максимального діаметра плоду)	товста	7	
54	Плід: основне забарвлення м'якоті	зеленувато-біле	2	
55	Лише для сортів з оранжевим забарвленням м'якоті. Плід: інтенсивність оранжевого забарвлення м'якоті	ознака не визначається	0	
56	Лише для сортів із білим, зеленувато-білим, зеленим, жовтувато-білим забарвленням м'якоті. Плід: вторинне оранжево-рожеве забарвлення м'якоті	слабке	3	
57	Плід: консистенція м'якоті	м'яка	3	
58	Лише для сортів, що змінюють забарвлення шкірки плоду від технічної до біологічної стиглості. Плід: відтінок забарвлення шкірки (за біологічної стиглості)	жовтий	1	
59	Лише для сортів, що змінюють забарвлення шкірки плоду від технічної до біологічної стиглості з жовтим або оранжево-жовтим забарвленням шкірки. Плід: інтенсивність жовтого забарвлення шкірки (за біологічної стиглості)	сильна	7	
60	Насінина: за довжиною	коротка	3	
61	Насінина: за шириною	широка	7	
62	Насінина: форма	не подібна до форми кедрового горішка	1	

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
63	Насінина: забарвлення	кремово-жовте	2	
64	Лише для сортів з кремово-жовтим забарвленням насіння. Насінина: інтенсивність забарвлення	слабка	3	
65	Час цвітіння чоловічих квіток	ранній	3	
66	Час цвітіння жіночих квіток	ранній	3	
67	Час достигання	середній	5	
68	Термін зберігання плоду	тривалий	7	
69	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>melonis</i>	ознака не визначалась	0	
70	Стійкість до <i>Sphaerotheca fuliginea</i> (<i>Podosphaera xanthii</i>) (борошнистої роси)	ознака не визначалась	0	
71	Стійкість до <i>Erysiphe cichoracearum</i> (<i>Golovinomyces cichoracearum</i>) (борошнистої роси)	ознака не визначалась	0	
72	Стійкість до колоній (<i>Aphis gossypii</i>)	ознака не визначалась	0	
73	Стійкість до вірусу жовтої мозаїки цукіні (ZYMV)	ознака не визначалась	0	
74	Стійкість до кільчастого вірусу папайї (PRSV)	ознака не визначалась	0	
75	Стійкість до вірусу некротичної плямистості дині (MNSV)	ознака не визначалась	0	
76	Стійкість до вірусу мозаїки огірка (CMV)	ознака не визначалась	0	

За інформацією наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 45. Період від садіння 30-ти денної розсади до останнього збирання плодів, діб – 95. Період від повних сходів до першого збирання, діб – 40. Вміст сухої речовини в плодах, % – 20, загального цукру, % – 14.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Кавун звичайний *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai

Заявка № 18146012 Назва сорту: Бретона **Заявник (код):** 1730 **Власник сорту (код):** 1730

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 20.11.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200869

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Плоїдність	диплоїд	2	
2	Сім'ядолі: форма	вузькоеліптична	1	
3	Сім'ядолі: розмір	малий	3	
4	Сім'ядолі: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
5	Сім'ядолі: плями	відсутні	1	
6	Рослина: міжвузля за довжиною	середні	5	
7	Листкова пластинка: за довжиною (на повністю розвиненому 3-му листку)	середня	5	
8	Листкова пластинка: за шириною	широка	7	
9	Листкова пластинка: відношення довжина/ширина	мале	3	
10	Листкова пластинка: забарвлення	сіро-зелене	3	
11	Листкова пластинка: інтенсивність забарвлення	помірна	5	
12	Листок: ступінь розсіченості (вище першої квітки)	помірний	5	
13	Листкова пластинка: розсіченість краю листка за глибиною (листок з центральної третини рослини вище першої квітки)	середня	5	
14	Листкова пластинка: пухирчастість (на 10-15 листках)	слабка	3	
15	Листкова пластинка: мармуровість	сильна	3	
16	Черешок: за довжиною	середній	5	
17	Зав'язь: розмір (під час цвітіння)	середній	5	
18	Зав'язь: опушення	слабке	3	
19	Плід: маса	велика	7	
20	Плід: форма поздовжнього розрізу	широкоеліптична	2	
21	Плід: основне забарвлення шкірки	зелене	2	
22	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки	слабка	3	
23	Плід: розмір сліду прикріплення плодоніжки	малий	3	
24	Плід: заглиблення біля основи	мілке	3	
25	Плід: форма апікальної частини	від зрізаної до заокругленої	2	
26	Плід: заглиблення верхівки	мілке	3	
27	Плід: розмір рубця маточки	малий	3	
28	Плід: поширення борозенок	відсутні	1	
29	Плід: борозенки	відсутні або дуже слабкі	1	
30	Плід: вираження смуг	сильне	7	
31	Плід: характер смуг	чітко виражений	3	
32	Плід: інтенсивність забарвлення смуг	сильна	7	
33	Плід: смуги за шириною	середні	5	
34	Плід: інтенсивність мармуровості	слабка	3	
35	Плід: зовнішній шар оплодня за товщиною	середній	5	
36	Плід: основне забарвлення м'якоті	червоне	6	
37	Плід: інтенсивність основного забарвлення м'якоті	сильна	7	
38	Плід: м'якість за твердістю	помірна	5	
39	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Плід: кількість насінин	середня	2	
40	Насінина: розмір	малий	3	
41	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: основне забарвлення оболонки	кремове	2	
42	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: вторинне забарвлення оболонки	відсутнє	1	
43	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: характер розміщення вторинного забарвлення оболонки	ознака не визначається	0	
44	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: відношення зони вторинного забарвлення до основного забарвлення	ознака не визначається	0	
45	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: плями біля рубця	середні	5	
46	Час початку цвітіння жіночих квіток	ранній	3	
47	Початок достигання (у 50% рослин не менше одного стиглого плоду)	ранній	3	
48	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>niveum</i> (E.F. Smith) Snyder et Hansen	ознака не визначалась	0	
49	Стійкість до <i>Colletotrichum lagenarium</i> (passerini) Ellis et Halsted	ознака не визначалась	0	
50	Листкова пластинка: розмір	середній	3	
51	Листкова пластинка: забарвлення жилок	зелене	1	
52	Плід: вираження прожилок	слабке	3	
53	Плід: смуги за характером	однокольорові з прожилками і мармуровістю	3	
54	Плід: основне забарвлення смуг	темно-зелене	5	
55	Плід: восковий наліт	слабкий	3	
56	Лише триплоїдні сорти. Насіннєва оболонка: за розміром	ознака не визначається	0	
57	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: за довжиною	коротка	3	
58	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: відношення довжина/ширина	мале	3	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 53. Вміст сухої речовини в плоді, % – 9, загального цукру, % – 12. Період від садіння 30-ти денної розсади до останнього збирання, діб – 90. Період від повних сходів до першого збирання, діб – 69.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кавун звичайний *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai

Заявка № 18146007 Назва сорту: ГЕРКУЛЕС Заявник (код): 1050 Власник сорту (код): 1050

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 08.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201151

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Плоїдність	диплоїд	2	
2	Сім'ядолі: форма	еліптична	2	
3	Сім'ядолі: розмір	малий	3	
4	Сім'ядолі: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Сім'ядолі: плями	відсутні	1	
6	Рослина: міжвузля за довжиною	середні	5	
7	Листкова пластинка: за довжиною (на повністю розвиненому 3-му листку)	коротка	3	
8	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
9	Листкова пластинка: відношення довжина/ширина	мале	3	
10	Листкова пластинка: забарвлення	сіро-зелене	3	
11	Листкова пластинка: інтенсивність забарвлення	помірна	5	
12	Листок: ступінь розсіченості (вище першої квіткі)	помірний	5	
13	Листкова пластинка: розсіченість краю листка за глибиною (листок з центральної третини рослини вище першої квіткі)	мілка	3	
14	Листкова пластинка: пухирчастість (на 10-15 листках)	слабка	3	
15	Листкова пластинка: мармуровість	помірна	2	
16	Черешок: за довжиною	короткий	3	
17	Зав'язь: розмір (під час цвітіння)	середній	5	
18	Зав'язь: опушення	помірне	5	
19	Плід: маса	від великої до дуже великої	8	
20	Плід: форма поздовжнього розрізу	широкоеліптична	2	
21	Плід: основне забарвлення шкірки	зелене	2	
22	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки	слабка	3	
23	Плід: розмір сліду прикріплення плодоніжки	середній	5	
24	Плід: заглиблення біля основи	мілке	3	
25	Плід: форма апікальної частини	від зрізаної до заокругленої	2	
26	Плід: заглиблення верхівки	мілке	3	
27	Плід: розмір рубця маточки	малий	3	
28	Плід: поширення борозенок	відсутні	1	
29	Плід: борозенки	відсутні або дуже слабкі	1	
30	Плід: вираження смуг	сильне	7	
31	Плід: характер смуг	чітко виражений	3	
32	Плід: інтенсивність забарвлення смуг	сильна	7	
33	Плід: смуги за шириною	широкі	7	
34	Плід: інтенсивність мармуровості	помірна	5	
35	Плід: зовнішній шар оплодня за товщиною	середній	5	
36	Плід: основне забарвлення м'якоті	червоне	6	
37	Плід: інтенсивність основного забарвлення м'якоті	сильна	7	
38	Плід: м'якоть за твердістю	помірна	5	
39	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Плід: кількість насінин	середня	2	
40	Насінина: розмір	малий	3	
41	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: основне забарвлення оболонки	червоно-коричнє	5	
42	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: вторинне забарвлення оболонки	наявне	9	
43	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: характер розміщення вторинного забарвлення оболонки	тільки крапками	1	
44	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: відношення зони вторинного забарвлення до основного забарвлення	середнє	5	
45	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: плями біля рубця	середні	5	
46	Час початку цвітіння жіночих квіток	середній	5	
47	Початок достигання (у 50% рослин не менше одного стиглого плоду)	середній	5	
48	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>niveum</i> (E.F. Smith) Snyder et Hansen	ознака не визначалась	0	
49	Стійкість до <i>Colletotrichum lagenarium</i> (passerini) Ellis et Halsted	ознака не визначалась	0	
50	Листкова пластинка: розмір	середній	3	
51	Листкова пластинка: забарвлення жилок	зелене	1	
52	Плід: вираження прожилок	помірне	5	
53	Плід: смуги за характером	однокольорові з прожилками і мармуровістю	3	
54	Плід: основне забарвлення смуг	темно-зелене	5	
55	Плід: восковий наліт	відсутній або дуже слабкий	1	
56	Лише триплоїдні сорти. Насіннєва оболонка: за розміром	ознака не визначається	0	
57	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: за довжиною	коротка	3	
58	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: відношення довжина/ширина	дуже мале	1	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 65. Вміст сухої речовини в плоді, % – 12,3, загального цукру, % – 7,4. Період від садіння 30-ти денної розсади до останнього збирання, діб – 65. Період від повних сходів до першого збирання, діб – 58.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Кавун звичайний *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai

Заявка № 18146011 Назва сорту: Лузітана **Заявник (код):** 1730 **Власник сорту (код):** 1730

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 20.11.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200870

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Плоїдність	диплоїд	2	
2	Сім'ядолі: форма	вузькоеліптична	1	
3	Сім'ядолі: розмір	малий	3	
4	Сім'ядолі: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
5	Сім'ядолі: плями	відсутні	1	
6	Рослина: міжвузля за довжиною	середні	5	
7	Листкова пластинка: за довжиною (на повністю розвиненому 3-му листку)	середня	5	
8	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
9	Листкова пластинка: відношення довжина/ширина	середнє	5	
10	Листкова пластинка: забарвлення	сіро-зелене	3	
11	Листкова пластинка: інтенсивність забарвлення	слабка	3	
12	Листок: ступінь розсіченості (вище першої квітки)	помірний	5	
13	Листкова пластинка: розсіченість краю листка за глибиною (листок з центральної третини рослини вище першої квітки)	середня	5	
14	Листкова пластинка: пухирчастість (на 10-15 листках)	помірна	5	
15	Листкова пластинка: мармуровість	сильна	3	
16	Черешок: за довжиною	середній	5	
17	Зав'язь: розмір (під час цвітіння)	середній	5	
18	Зав'язь: опушення	помірне	5	
19	Плід: маса	від середньої до великої	6	
20	Плід: форма поздовжнього розрізу	широкоеліптична	2	
21	Плід: основне забарвлення шкірки	зелене	2	
22	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки	слабка	3	
23	Плід: розмір сліду прикріплення плодоніжки	малий	3	
24	Плід: заглиблення біля основи	мілке	3	
25	Плід: форма апікальної частини	заокруглена	3	
26	Плід: заглиблення верхівки	мілке	3	
27	Плід: розмір рубця маточки	малий	3	
28	Плід: поширення борозенок	відсутні	1	
29	Плід: борозенки	слабкі	3	
30	Плід: вираження смуг	сильне	7	
31	Плід: характер смуг	помірно виражений	2	
32	Плід: інтенсивність забарвлення смуг	сильна	7	
33	Плід: смуги за шириною	широкі	7	
34	Плід: інтенсивність мармуровості	слабка	3	
35	Плід: зовнішній шар оплодня за товщиною	середній	5	
36	Плід: основне забарвлення м'якоті	червоне	6	
37	Плід: інтенсивність основного забарвлення м'якоті	сильна	7	
38	Плід: м'якість за твердістю	помірна	5	
39	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Плід: кількість насінин	середня	2	
40	Насінина: розмір	середній	5	
41	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: основне забарвлення оболонки	коричневе	6	
42	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: вторинне забарвлення оболонки	наявне	9	
43	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: характер розміщення вторинного забарвлення оболонки	тільки крапками	1	
44	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: відношення зони вторинного забарвлення до основного забарвлення	середнє	5	
45	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: плями біля рубця	середні	5	
46	Час початку цвітіння жіночих квіток	ранній	3	
47	Початок достигання (у 50% рослин не менше одного стиглого плоду)	ранній	3	
48	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>niveum</i> (E.F. Smith) Snyder et Hansen	ознака не визначалась	0	
49	Стійкість до <i>Colletotrichum lagenarium</i> (passerini) Ellis et Halsted	ознака не визначалась	0	
50	Листкова пластинка: розмір	середній	3	
51	Листкова пластинка: забарвлення жилок	зелене	1	
52	Плід: вираження прожилок	слабке	3	
53	Плід: смуги за характером	однокольорові	1	
54	Плід: основне забарвлення смуг	темно-зелене	5	
55	Плід: восковий наліт	слабкий	3	
56	Лише триплоїдні сорти. Насіннева оболонка: за розміром	ознака не визначається	0	
57	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: за довжиною	середня	5	
58	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: відношення довжина/ширина	мале	3	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 52. Вміст сухої речовини в плоді, % – 10, загального цукру, % – 11. Період від садіння 30-ти денної розсади до останнього збирання, діб – 98. Період від повних сходів до першого збирання, діб – 68.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Капуста білоголова *Brassica oleracea* L. var. *alba* DC.

Заявка № 18096005 Назва сорту: Аструс Плюс **Заявник (код):** 1852 **Власник сорту (код):** 1852

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 25.11.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200874

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: за висотою	висока	7	
1,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0	
1,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0	
2,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: найбільший діаметр (разом із зовнішніми листками)	середній	5	
2,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0	
2,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0	
3	Рослина: зовнішнє стебло за довжиною	коротке	3	
4	Рослина: положення зовнішніх листків	напівпряме	3	
5,1	Лише для сортів капусти білоголової. Зовнішній листок: розмір	середній	5	
5,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: розмір	ознака не визначається	0	
5,3	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір	ознака не визначається	0	
6	Зовнішній листок: форма пластинки	поперечноширокоеліптична	4	
7	Зовнішній листок: профіль верхньої частини пластинки	увігнутий	1	
8,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	помірний	2	
8,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	ознака не визначається	0	
9,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: розмір пухирців	середній	5	
9,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір пухирців	ознака не визначається	0	
10	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: гофрованість	ознака не визначається	0	
11	Зовнішній листок: забарвлення (з восковим нальотом)	сіро-зелене	3	
12	Зовнішній листок: інтенсивність забарвлення	помірна	5	
13	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: зеленкуватість	ознака не визначається	0	
14	Зовнішній листок: восковий наліт	сильний	7	
15	Зовнішній листок: ступінь хвилястості краю	помірний	5	
16	Зовнішній листок: вигин краю	наявний	9	
17	Головка: форма поздовжнього розрізу	округла	3	
18	Головка: форма основи у поздовжньому розрізі	округла	1	
19	Головка: за довжиною	середня	5	
20	Головка: діаметр	середній	5	
21	Головка: розміщення найбільшого діаметра	посередині	2	
22	Головка: ступінь покриття	частково покритий	2	
23	Лише для сортів капусти савойської. Головка: пухирчастість покривного листка	ознака не визначається	0	
24	Головка: вигин краю покривного листка	наявний	9	
25	Головка: забарвлення покривного листка	сіро-зелене	3	
26	Головка: інтенсивність забарвлення покривного листка	помірна	5	
27	Лише сорти капусти білоголової і савойської. Головка: антоціанове забарвлення покривних листків	відсутнє або дуже слабке	1	
28	Головка: внутрішнє забарвлення	білувате	1	
29	Лише сорти капусти червоноголової. Головка: інтенсивність внутрішнього забарвлення	ознака не визначається	0	
30	Головка: за щільністю	щільна	7	
31	Головка: внутрішня структура	тонка	3	
32	Головка: довжина внутрішнього стебла відносно довжини головки	середня	5	
33,1	Лише сорти капусти білоголової. Час збирання стиглості	середній	5	
33,2	Лише сорти капусти червоноголової. Час збирання стиглості	ознака не визначається	0	
33,3	Лише сорти капусти савойської. Час збирання стиглості	ознака не визначається	0	
34	Час розтріскування головки після досягання	пізній	7	
35	Чоловіча стерильність	ознака не визначалась	0	
36	Стійкість до раси 1 <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>conglutinans</i>	ознака не визначалась	0	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 120. Період від сівби до початку достигання, діб – 100. Вміст вітаміну С, мг % – 40, загального цукру, % – 4, сухої речовини, % – 11. Стійкість до хвороб, балів (1–9): бактеріоз слизовий – 5, бактеріоз судинний – 5.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Капуста білоголова *Brassica oleracea* L. var. *alba* DC.

Заявка № 18096016 Назва сорту: Ботран **Заявник (код):** 751 **Власник сорту (код):** 751

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.11.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200876

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: за висотою	висока	7	
1,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0	
1,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0	
2,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: найбільший діаметр (разом із зовнішніми листками)	середній	5	
2,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0	
2,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0	
3	Рослина: зовнішнє стебло за довжиною	коротке	3	
4	Рослина: положення зовнішніх листків	напівпряме	3	
5,1	Лише для сортів капусти білоголової. Зовнішній листок: розмір	середній	5	
5,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: розмір	ознака не визначається	0	
5,3	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір	ознака не визначається	0	
6	Зовнішній листок: форма пластинки	поперечноширокоеліптична	4	
7	Зовнішній листок: профіль верхньої частини пластинки	увігнутий	1	
8,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	помірний	2	
8,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	ознака не визначається	0	
9,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: розмір пухирців	середній	5	
9,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір пухирців	ознака не визначається	0	
10	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: гофрованість	ознака не визначається	0	
11	Зовнішній листок: забарвлення (з восковим нальотом)	сіро-зелене	3	
12	Зовнішній листок: інтенсивність забарвлення	помірна	5	
13	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: зеленкуватість	ознака не визначається	0	
14	Зовнішній листок: восковий наліт	сильний	7	
15	Зовнішній листок: ступінь хвилястості краю	помірний	5	
16	Зовнішній листок: вигин краю	відсутній	1	
17	Головка: форма поздовжнього розрізу	округла	3	
18	Головка: форма основи у поздовжньому розрізі	округла	1	
19	Головка: за довжиною	середня	5	
20	Головка: діаметр	середній	5	
21	Головка: розміщення найбільшого діаметра	посередині	2	
22	Головка: ступінь покриття	покритий	3	
23	Лише для сортів капусти савойської. Головка: пухирчастість покривного листка	ознака не визначається	0	
24	Головка: вигин краю покривного листка	наявний	9	
25	Головка: забарвлення покривного листка	сіро-зелене	3	
26	Головка: інтенсивність забарвлення покривного листка	помірна	5	
27	Лише сорти капусти білоголової і савойської. Головка: антоціанове забарвлення покривних листків	відсутнє або дуже слабке	1	
28	Головка: внутрішнє забарвлення	білувате	1	
29	Лише сорти капусти червоноголової. Головка: інтенсивність внутрішнього забарвлення	ознака не визначається	0	
30	Головка: за щільністю	щільна	7	
31	Головка: внутрішня структура	тонка	3	
32	Головка: довжина внутрішнього стебла відносно довжини головки	середня	5	
33,1	Лише сорти капусти білоголової. Час збирання стиглості	середній	5	
33,2	Лише сорти капусти червоноголової. Час збирання стиглості	ознака не визначається	0	
33,3	Лише сорти капусти савойської. Час збирання стиглості	ознака не визначається	0	
34	Час розтріскування головки після досягання	пізній	7	
35	Чоловіча стерильність	ознака не визначалась	0	
36	Стійкість до раси 1 <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>conglutinans</i>	ознака не визначалась	0	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 90. Період від сівби до початку досягання, діб – 83. Вміст вітаміну С, мг % – 45, загального цукру, % – 4,8, сухої речовини, % – 8,2. Стійкість до хвороб, балів (1–9): бактеріоз слизовий – 8, бактеріоз судинний – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Капуста білоголова *Brassica oleracea* L. var. *alba* DC.**Заявка № 18096019 Назва сорту:** Владіма **Заявник (код):** 1730 **Власник сорту (код):** 1730**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 25.11.2020**Свідчення про державну реєстрацію № 200878****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: за висотою	висока	7	
1,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0	
1,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0	
2,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: найбільший діаметр (разом із зовнішніми листками)	середній	5	
2,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0	
2,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0	
3	Рослина: зовнішнє стебло за довжиною	коротке	3	
4	Рослина: положення зовнішніх листків	напівпряме	3	
5,1	Лише для сортів капусти білоголової. Зовнішній листок: розмір	середній	5	
5,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: розмір	ознака не визначається	0	
5,3	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір	ознака не визначається	0	
6	Зовнішній листок: форма пластинки	поперечноширокоеліптична	4	
7	Зовнішній листок: профіль верхньої частини пластинки	увігнутий	1	
8,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	відсутній або дуже слабкий	1	
8,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	ознака не визначається	0	
9,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: розмір пухирців	середній	5	
9,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір пухирців	ознака не визначається	0	
10	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: гофрованість	ознака не визначається	0	
11	Зовнішній листок: забарвлення (з восковим нальотом)	сіро-зелене	3	
12	Зовнішній листок: інтенсивність забарвлення	помірна	5	
13	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: зеленкуватість	ознака не визначається	0	
14	Зовнішній листок: восковий наліт	сильний	7	
15	Зовнішній листок: ступінь хвилястості краю	помірний	5	
16	Зовнішній листок: вигин краю	відсутній	1	
17	Головка: форма позадонного розрізу	широкообернено-яйцеподібна	5	
18	Головка: форма основи у позадонному розрізі	округла	1	
19	Головка: за довжиною	середня	5	
20	Головка: діаметр	середній	5	
21	Головка: розміщення найбільшого діаметра	ближче до верхівки	1	
22	Головка: ступінь покриття	покритий	3	
23	Лише для сортів капусти савойської. Головка: пухирчастість покривного листа	ознака не визначається	0	
24	Головка: вигин краю покривного листа	наявний	9	
25	Головка: забарвлення покривного листа	сіро-зелене	3	
26	Головка: інтенсивність забарвлення покривного листа	помірна	5	
27	Лише сорти капусти білоголової і савойської. Головка: антоціанове забарвлення покривних листків	відсутнє або дуже слабке	1	
28	Головка: внутрішнє забарвлення	білувате	1	
29	Лише сорти капусти червоноголової. Головка: інтенсивність внутрішнього забарвлення	ознака не визначається	0	
30	Головка: за щільністю	дуже щільна	9	
31	Головка: внутрішня структура	тонка	3	
32	Головка: довжина внутрішнього стебла відносно довжини головки	середня	5	
33,1	Лише сорти капусти білоголової. Час збиральної стиглості	пізній	7	
33,2	Лише сорти капусти червоноголової. Час збиральної стиглості	ознака не визначається	0	
33,3	Лише сорти капусти савойської. Час збиральної стиглості	ознака не визначається	0	
34	Час розтріскування головки після досягання	пізній	7	
35	Чоловіча стерильність	ознака не визначалась	0	
36	Стійкість до раси 1 <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>conglutinans</i>	ознака не визначалась	0	

За інформацією наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 90. Період від сівби до початку достигання, діб – 130. Лежкість, балів (1–9) – 7. Вміст вітаміну С, мг % – 35, загального цукру, % – 3,2, сухої речовини, % – 5. Стійкість до хвороб, балів (1–9): бактеріоз слизовий – 3, бактеріоз судинний – 3.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Капуста білоголова *Brassica oleracea* L. var. *alba* DC.

Заявка № 18096010 Назва сорту: ДЕРБЕНТ **Заявник (код):** 1050 **Власник сорту (код):** 1050

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 08.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201154

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: за висотою	висока	7	
1,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0	
1,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0	
2,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: найбільший діаметр (разом із зовнішніми листками)	середній	5	
2,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0	
2,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0	
3	Рослина: зовнішнє стебло за довжиною	коротке	3	
4	Рослина: положення зовнішніх листків	напівпряме	3	
5,1	Лише для сортів капусти білоголової. Зовнішній листок: розмір	великий	7	
5,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: розмір	ознака не визначається	0	
5,3	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір	ознака не визначається	0	
6	Зовнішній листок: форма пластинки	оберненояйцеподібна	5	
7	Зовнішній листок: профіль верхньої частини пластинки	увігнутий	1	
8,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	помірний	2	
8,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	ознака не визначається	0	
9,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: розмір пухирців	середній	5	
9,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір пухирців	ознака не визначається	0	
10	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: гофрованість	ознака не визначається	0	
11	Зовнішній листок: забарвлення (з восковим нальотом)	сіро-зелене	3	
12	Зовнішній листок: інтенсивність забарвлення	помірна	5	
13	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: зеленкуватість	ознака не визначається	0	
14	Зовнішній листок: восковий наліт	сильний	7	
15	Зовнішній листок: ступінь хвилястості краю	слабкий	3	
16	Зовнішній листок: вигин краю	відсутній	1	
17	Головка: форма поздовжнього розрізу	широкообернено-яйцеподібна	5	
18	Головка: форма основи у поздовжньому розрізі	округла	1	
19	Головка: за довжиною	середня	5	
20	Головка: діаметр	середній	5	
21	Головка: розміщення найбільшого діаметра	ближче до верхівки	1	
22	Головка: ступінь покриття	покритий	3	
23	Лише для сортів капусти савойської. Головка: пухирчастість покривного листка	ознака не визначається	0	
24	Головка: вигин краю покривного листка	наявний	9	
25	Головка: забарвлення покривного листка	сіро-зелене	3	
26	Головка: інтенсивність забарвлення покривного листка	помірна	5	
27	Лише сорти капусти білоголової і савойської. Головка: антоціанове забарвлення покривних листків	відсутнє або дуже слабке	1	
28	Головка: внутрішнє забарвлення	білувате	1	
29	Лише сорти капусти червоноголової. Головка: інтенсивність внутрішнього забарвлення	ознака не визначається	0	
30	Головка: за щільністю	дуже щільна	9	
31	Головка: внутрішня структура	тонка	3	
32	Головка: довжина внутрішнього стебла відносно довжини головки	довга	7	
33,1	Лише сорти капусти білоголової. Час збиральної стиглості	пізній	7	
33,2	Лише сорти капусти червоноголової. Час збиральної стиглості	ознака не визначається	0	
33,3	Лише сорти капусти савойської. Час збиральної стиглості	ознака не визначається	0	
34	Час розтріскування головки після досягання	пізній	7	
35	Чоловіча стерильність	ознака не визначалась	0	
36	Стійкість до раси 1 <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>conglutinans</i>	ознака не визначалась	0	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 200. Період від сівби до початку досягання, діб – 160. Вміст вітаміну С, мг % – 50, загального цукру, % – 4, сухої речовини, % – 9. Стійкість до хвороб, балів (1–9): бактеріоз слизовий – 5, бактеріоз судинний – 6.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Капуста білоголова *Brassica oleracea* L. var. *alba* DC.

Заявка № 18096021 Назва сорту: Дулісма **Заявник (код):** 1730 **Власник сорту (код):** 1730

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 25.11.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200877

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: за висотою	висока	7	
1,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0	
1,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0	
2,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: найбільший діаметр (разом із зовнішніми листками)	середній	5	
2,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0	
2,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0	
3	Рослина: зовнішнє стебло за довжиною	коротке	3	
4	Рослина: положення зовнішніх листків	напівпряме	3	
5,1	Лише для сортів капусти білоголової. Зовнішній листок: розмір	середній	5	
5,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: розмір	ознака не визначається	0	
5,3	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: розмір	ознака не визначається	0	
6	Зовнішній листок: форма пластинки	поперечноширокоеліптична	4	
7	Зовнішній листок: профіль верхньої частини пластинки	увігнутий	1	
8,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	відсутній або дуже слабкий	1	
8,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	ознака не визначається	0	
9,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: розмір пухирців	середній	5	
9,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір пухирців	ознака не визначається	0	
10	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: гофрованість	ознака не визначається	0	
11	Зовнішній листок: забарвлення (з восковим нальотом)	сіро-зелене	3	
12	Зовнішній листок: інтенсивність забарвлення	помірна	5	
13	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: зеленкуватість	ознака не визначається	0	
14	Зовнішній листок: восковий наліт	сильний	7	
15	Зовнішній листок: ступінь хвилястості краю	помірний	5	
16	Зовнішній листок: вигин краю	відсутній	1	
17	Головка: форма позадвужного розрізу	широкообернено-яйцеподібна	5	
18	Головка: форма основи у позадвужному розрізі	округла	1	
19	Головка: за довжиною	середня	5	
20	Головка: діаметр	середній	5	
21	Головка: розміщення найбільшого діаметра	ближче до верхівки	1	
22	Головка: ступінь покриття	покритий	3	
23	Лише для сортів капусти савойської. Головка: пухирчастість покривного листка	ознака не визначається	0	
24	Головка: вигин краю покривного листка	наявний	9	
25	Головка: забарвлення покривного листка	сіро-зелене	3	
26	Головка: інтенсивність забарвлення покривного листка	помірна	5	
27	Лише сорти капусти білоголової і савойської. Головка: антоціанове забарвлення покривних листків	відсутнє або дуже слабке	1	
28	Головка: внутрішнє забарвлення	білувате	1	
29	Лише сорти капусти червоноголової. Головка: інтенсивність внутрішнього забарвлення	ознака не визначається	0	
30	Головка: за щільністю	дуже щільна	9	
31	Головка: внутрішня структура	тонка	3	
32	Головка: довжина внутрішнього стебла відносно довжини головки	довга	7	
33,1	Лише сорти капусти білоголової. Час збиральної стиглості	пізній	7	
33,2	Лише сорти капусти червоноголової. Час збиральної стиглості	ознака не визначається	0	
33,3	Лише сорти капусти савойської. Час збиральної стиглості	ознака не визначається	0	
34	Час розтріскування головки після досягання	пізній	7	
35	Чоловіча стерильність	ознака не визначалась	0	
36	Стійкість до раси 1 <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>conglutinans</i>	ознака не визначалась	0	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 120. Період від сівби до початку досягання, діб – 135. Вміст вітаміну С, мг % – 35, загального цукру, % – 3,6, сухої речовини, % – 5,2. Стійкість до хвороб, балів (1–9): бактеріоз слизовий – 3, бактеріоз судинний – 3.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Капуста білоголова *Brassica oleracea* L. var. *alba* DC.

Заявка № 18096001 Назва сорту: Ірма **Заявник (код):** 2200 2485 **Власник сорту (код):** 2200 2485

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 02.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200969

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: за висотою	середня	5	
1,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0	
1,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0	
2,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: найбільший діаметр (разом із зовнішніми листками)	середній	5	
2,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0	
2,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0	
3	Рослина: зовнішнє стебло за довжиною	коротке	3	
4	Рослина: положення зовнішніх листків	напівпряме	3	
5,1	Лише для сортів капусти білоголової. Зовнішній листок: розмір	середній	5	
5,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: розмір	ознака не визначається	0	
5,3	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір	ознака не визначається	0	
6	Зовнішній листок: форма пластинки	округла	3	
7	Зовнішній листок: профіль верхньої частини пластинки	увігнутий	1	
8,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	помірний	2	
8,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	ознака не визначається	0	
9,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: розмір пухирців	середній	5	
9,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір пухирців	ознака не визначається	0	
10	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: гофрованість	ознака не визначається	0	
11	Зовнішній листок: забарвлення (з восковим нальотом)	зелене	2	
12	Зовнішній листок: інтенсивність забарвлення	помірна	5	
13	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: зеленкуватість	ознака не визначається	0	
14	Зовнішній листок: восковий наліт	помірний	5	
15	Зовнішній листок: ступінь хвилястості краю	слабкий	3	
16	Зовнішній листок: вигин краю	наявний	9	
17	Головка: форма поздовжнього розрізу	округла	3	
18	Головка: форма основи у поздовжньому розрізі	округла	1	
19	Головка: за довжиною	середня	5	
20	Головка: діаметр	середній	5	
21	Головка: розміщення найбільшого діаметра	посередині	2	
22	Головка: ступінь покриття	покритий	3	
23	Лише для сортів капусти савойської. Головка: пухирчастість покривного листка	ознака не визначається	0	
24	Головка: вигин краю покривного листка	наявний	9	
25	Головка: забарвлення покривного листка	зелене	2	
26	Головка: інтенсивність забарвлення покривного листка	помірна	5	
27	Лише сорти капусти білоголової і савойської. Головка: антоціанове забарвлення покривних листків	відсутнє або дуже слабке	1	
28	Головка: внутрішнє забарвлення	білувате	1	
29	Лише сорти капусти червоноголової. Головка: інтенсивність внутрішнього забарвлення	ознака не визначається	0	
30	Головка: за щільністю	щільна	7	
31	Головка: внутрішня структура	тонка	3	
32	Головка: довжина внутрішнього стебла відносно довжини головки	середня	5	
33,1	Лише сорти капусти білоголової. Час збирання стиглості	ранній	3	
33,2	Лише сорти капусти червоноголової. Час збирання стиглості	ознака не визначається	0	
33,3	Лише сорти капусти савойської. Час збирання стиглості	ознака не визначається	0	
34	Час розтріскування головки після досягання	середній	5	
35	Чоловіча стерильність	ознака не визначалась	0	
36	Стійкість до раси 1 <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>conglutinans</i>	ознака не визначалась	0	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 62. Період від сівби до початку достигання, діб – 55. Лежкість, балів (1–9) – 3. Вміст вітаміну С, мг % – 30,1, загального цукру, % – 4,5, сухої речовини, % – 7,5. Стійкість до хвороб, балів (1–9): бактеріоз слизовий – 8, бактеріоз судинний – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Капуста білоголова *Brassica oleracea* L. var. *alba* DC.

Заявка № 18096011 Назва сорту: КВАЛІТАТОР **Заявник (код):** 1050 **Власник сорту (код):** 1050

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 08.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201155

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: за висотою	висока	7	
1,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0	
1,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0	
2,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: найбільший діаметр (разом із зовнішніми листками)	середній	5	
2,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0	
2,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0	
3	Рослина: зовнішнє стебло за довжиною	коротке	3	
4	Рослина: положення зовнішніх листків	напівпряме	3	
5,1	Лише для сортів капусти білоголової. Зовнішній листок: розмір	середній	5	
5,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: розмір	ознака не визначається	0	
5,3	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір	ознака не визначається	0	
6	Зовнішній листок: форма пластинки	оберненояйцеподібна	5	
7	Зовнішній листок: профіль верхньої частини пластинки	увігнутий	1	
8,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	відсутній або дуже слабкий	1	
8,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	ознака не визначається	0	
9,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: розмір пухирців	середній	5	
9,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір пухирців	ознака не визначається	0	
10	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: гофрованість	ознака не визначається	0	
11	Зовнішній листок: забарвлення (з восковим нальотом)	сіро-зелене	3	
12	Зовнішній листок: інтенсивність забарвлення	помірна	5	
13	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: зеленкуватість	ознака не визначається	0	
14	Зовнішній листок: восковий наліт	сильний	7	
15	Зовнішній листок: ступінь хвилястості краю	помірний	5	
16	Зовнішній листок: вигин краю	наявний	9	
17	Головка: форма позадонного розрізу	широкообернено-яйцеподібна	5	
18	Головка: форма основи у позадонному розрізі	округла	1	
19	Головка: за довжиною	середня	5	
20	Головка: діаметр	середній	5	
21	Головка: розміщення найбільшого діаметра	ближче до верхівки	1	
22	Головка: ступінь покриття	покритий	3	
23	Лише для сортів капусти савойської. Головка: пухирчастість покривного листа	ознака не визначається	0	
24	Головка: вигин краю покривного листа	наявний	9	
25	Головка: забарвлення покривного листа	сіро-зелене	3	
26	Головка: інтенсивність забарвлення покривного листа	помірна	5	
27	Лише сорти капусти білоголової і савойської. Головка: антоціанове забарвлення покривних листків	відсутнє або дуже слабке	1	
28	Головка: внутрішнє забарвлення	білувате	1	
29	Лише сорти капусти червоноголової. Головка: інтенсивність внутрішнього забарвлення	ознака не визначається	0	
30	Головка: за щільністю	дуже щільна	9	
31	Головка: внутрішня структура	тонка	3	
32	Головка: довжина внутрішнього стебла відносно довжини головки	довга	7	
33,1	Лише сорти капусти білоголової. Час збиральної стиглості	пізній	7	
33,2	Лише сорти капусти червоноголової. Час збиральної стиглості	ознака не визначається	0	
33,3	Лише сорти капусти савойської. Час збиральної стиглості	ознака не визначається	0	
34	Час розтріскування головки після досягання	пізній	7	
35	Чоловіча стерильність	ознака не визначалась	0	
36	Стійкість до раси 1 <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>conglutinans</i>	ознака не визначалась	0	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 160. Період від сівби до початку досягання, діб – 140. Вміст вітаміну С, мг % – 50, загального цукру, % – 4, сухої речовини, % – 8. Стійкість до хвороб, балів (1–9): бактеріоз слизовий – 5, бактеріоз судинний – 5.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Капуста білоголова *Brassica oleracea* L. var. *alba* DC.

Заявка № 18096013 Назва сорту: КІЛАСІС **Заявник (код):** 1959 **Власник сорту (код):** 1959

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 08.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201157

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: за висотою	висока	7	
1,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0	
1,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0	
2,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: найбільший діаметр (разом із зовнішніми листками)	середній	5	
2,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0	
2,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0	
3	Рослина: зовнішнє стебло за довжиною	коротке	3	
4	Рослина: положення зовнішніх листків	напівпряме	3	
5,1	Лише для сортів капусти білоголової. Зовнішній листок: розмір	середній	5	
5,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: розмір	ознака не визначається	0	
5,3	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір	ознака не визначається	0	
6	Зовнішній листок: форма пластинки	поперечноширокоеліптична	4	
7	Зовнішній листок: профіль верхньої частини пластинки	увігнутий	1	
8,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	відсутній або дуже слабкий	1	
8,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	ознака не визначається	0	
9,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: розмір пухирців	середній	5	
9,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір пухирців	ознака не визначається	0	
10	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: гофрованість	ознака не визначається	0	
11	Зовнішній листок: забарвлення (з восковим нальотом)	сіро-зелене	3	
12	Зовнішній листок: інтенсивність забарвлення	помірна	5	
13	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: зеленкуватість	ознака не визначається	0	
14	Зовнішній листок: восковий наліт	сильний	7	
15	Зовнішній листок: ступінь хвилястості краю	слабкий	3	
16	Зовнішній листок: вигин краю	відсутній	1	
17	Головка: форма поздовжнього розрізу	округла	3	
18	Головка: форма основи у поздовжньому розрізі	округла	1	
19	Головка: за довжиною	середня	5	
20	Головка: діаметр	середній	5	
21	Головка: розміщення найбільшого діаметра	посередині	2	
22	Головка: ступінь покриття	покритий	3	
23	Лише для сортів капусти савойської. Головка: пухирчастість покривного листка	ознака не визначається	0	
24	Головка: вигин краю покривного листка	наявний	9	
25	Головка: забарвлення покривного листка	сіро-зелене	3	
26	Головка: інтенсивність забарвлення покривного листка	помірна	5	
27	Лише сорти капусти білоголової і савойської. Головка: антоціанове забарвлення покривних листків	відсутнє або дуже слабке	1	
28	Головка: внутрішнє забарвлення	білувате	1	
29	Лише сорти капусти червоноголової. Головка: інтенсивність внутрішнього забарвлення	ознака не визначається	0	
30	Головка: за щільністю	дуже щільна	9	
31	Головка: внутрішня структура	тонка	3	
32	Головка: довжина внутрішнього стебла відносно довжини головки	середня	5	
33,1	Лише сорти капусти білоголової. Час збирання стиглості	пізній	7	
33,2	Лише сорти капусти червоноголової. Час збирання стиглості	ознака не визначається	0	
33,3	Лише сорти капусти савойської. Час збирання стиглості	ознака не визначається	0	
34	Час розтріскування головки після досягання	пізній	7	
35	Чоловіча стерильність	ознака не визначалась	0	
36	Стійкість до раси 1 <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>conglutinans</i>	ознака не визначалась	0	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 160. Вміст вітаміну С, мг % – 50, загального цукру, % – 4, сухої речовини, % – 8. Стійкість до хвороб, балів (1–9): бактеріоз слизовий – 5, бактеріоз судинний – 5.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Капуста білоголова *Brassica oleracea* L. var. *alba* DC.

Заявка № 18096009 Назва сорту: КІЛАСТРЕСС **Заявник (код):** 1050 **Власник сорту (код):** 1050

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 08.12.2020

Свідцтво про державну реєстрацію № 201153

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: за висотою	висока	7	
1,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0	
1,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0	
2,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: найбільший діаметр (разом із зовнішніми листками)	середній	5	
2,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0	
2,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0	
3	Рослина: зовнішнє стебло за довжиною	коротке	3	
4	Рослина: положення зовнішніх листків	напівпряме	3	
5,1	Лише для сортів капусти білоголової. Зовнішній листок: розмір	середній	5	
5,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: розмір	ознака не визначається	0	
5,3	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: розмір	ознака не визначається	0	
6	Зовнішній листок: форма пластинки	поперечноширокоеліптична	4	
7	Зовнішній листок: профіль верхньої частини пластинки	увігнутий	1	
8,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	відсутній або дуже слабкий	1	
8,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	ознака не визначається	0	
9,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: розмір пухирців	середній	5	
9,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір пухирців	ознака не визначається	0	
10	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: гофрованість	ознака не визначається	0	
11	Зовнішній листок: забарвлення (з восковим нальотом)	сіро-зелене	3	
12	Зовнішній листок: інтенсивність забарвлення	помірна	5	
13	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: зеленкуватість	ознака не визначається	0	
14	Зовнішній листок: восковий наліт	сильний	7	
15	Зовнішній листок: ступінь хвилястості краю	слабкий	3	
16	Зовнішній листок: вигин краю	відсутній	1	
17	Головка: форма позадонного розрізу	широкообернено-яйцеподібна	5	
18	Головка: форма основи у позадонному розрізі	округла	1	
19	Головка: за довжиною	середня	5	
20	Головка: діаметр	середній	5	
21	Головка: розміщення найбільшого діаметра	ближче до верхівки	1	
22	Головка: ступінь покриття	покритий	3	
23	Лише для сортів капусти савойської. Головка: пухирчастість покривного листка	ознака не визначається	0	
24	Головка: вигин краю покривного листка	відсутній	1	
25	Головка: забарвлення покривного листка	сіро-зелене	3	
26	Головка: інтенсивність забарвлення покривного листка	помірна	5	
27	Лише сорти капусти білоголової і савойської. Головка: антоціанове забарвлення покривних листків	відсутнє або дуже слабке	1	
28	Головка: внутрішнє забарвлення	білувате	1	
29	Лише сорти капусти червоноголової. Головка: інтенсивність внутрішнього забарвлення	ознака не визначається	0	
30	Головка: за щільністю	дуже щільна	9	
31	Головка: внутрішня структура	тонка	3	
32	Головка: довжина внутрішнього стебла відносно довжини головки	середня	5	
33,1	Лише сорти капусти білоголової. Час збиральної стиглості	пізній	7	
33,2	Лише сорти капусти червоноголової. Час збиральної стиглості	ознака не визначається	0	
33,3	Лише сорти капусти савойської. Час збиральної стиглості	ознака не визначається	0	
34	Час розтріскування головки після досягання	пізній	7	
35	Чоловіча стерильність	ознака не визначалась	0	
36	Стійкість до раси 1 <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>conglutinans</i>	ознака не визначалась	0	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 180. Період від сівби до початку досягання, діб – 155. Вміст вітаміну С, мг % – 50, загального цукру, % – 4, сухої речовини, % – 8. Стійкість до хвороб, балів (1–9): бактеріоз слизовий – 6, бактеріоз судинний – 6.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Капуста білоголова *Brassica oleracea* L. var. *alba* DC.

Заявка № 18096008 Назва сорту: ЛАУДА Заявник (код): 1959 Власник сорту (код): 1959

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 08.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201152

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: за висотою	середня	5	
1,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0	
1,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0	
2,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: найбільший діаметр (разом із зовнішніми листками)	малий	3	
2,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0	
2,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0	
3	Рослина: зовнішнє стебло за довжиною	коротке	3	
4	Рослина: положення зовнішніх листків	напівпряме	3	
5,1	Лише для сортів капусти білоголової. Зовнішній листок: розмір	середній	5	
5,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: розмір	ознака не визначається	0	
5,3	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір	ознака не визначається	0	
6	Зовнішній листок: форма пластинки	округла	3	
7	Зовнішній листок: профіль верхньої частини пластинки	увігнутий	1	
8,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	помірний	2	
8,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	ознака не визначається	0	
9,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: розмір пухирців	середній	5	
9,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір пухирців	ознака не визначається	0	
10	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: гофрованість	ознака не визначається	0	
11	Зовнішній листок: забарвлення (з восковим нальотом)	зелене	2	
12	Зовнішній листок: інтенсивність забарвлення	помірна	5	
13	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: зеленкуватість	ознака не визначається	0	
14	Зовнішній листок: восковий наліт	помірний	5	
15	Зовнішній листок: ступінь хвилястості краю	слабкий	3	
16	Зовнішній листок: вигин краю	наявний	9	
17	Головка: форма поздовжнього розрізу	округла	3	
18	Головка: форма основи у поздовжньому розрізі	округла	1	
19	Головка: за довжиною	коротка	3	
20	Головка: діаметр	малий	3	
21	Головка: розміщення найбільшого діаметра	посередині	2	
22	Головка: ступінь покриття	непокритий	1	
23	Лише для сортів капусти савойської. Головка: пухирчастість покривного листка	ознака не визначається	0	
24	Головка: вигин краю покривного листка	наявний	9	
25	Головка: забарвлення покривного листка	зелене	2	
26	Головка: інтенсивність забарвлення покривного листка	помірна	5	
27	Лише сорти капусти білоголової і савойської. Головка: антоціанове забарвлення покривних листків	відсутнє або дуже слабке	1	
28	Головка: внутрішнє забарвлення	білувате	1	
29	Лише сорти капусти червоноголової. Головка: інтенсивність внутрішнього забарвлення	ознака не визначається	0	
30	Головка: за щільністю	середня	5	
31	Головка: внутрішня структура	тонка	3	
32	Головка: довжина внутрішнього стебла відносно довжини головки	середня	5	
33,1	Лише сорти капусти білоголової. Час збиральної стиглості	дуже ранній	1	
33,2	Лише сорти капусти червоноголової. Час збиральної стиглості	ознака не визначається	0	
33,3	Лише сорти капусти савойської. Час збиральної стиглості	ознака не визначається	0	
34	Час розтріскування головки після досягання	середній	5	
35	Чоловіча стерильність	ознака не визначалась	0	
36	Стійкість до раси 1 <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>conglutinans</i>	ознака не визначалась	0	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 65. Період від сівби до початку досягання, діб – 75. Вміст вітаміну С, мг % – 50, загального цукру, % – 5, сухої речовини, % – 6. Стійкість до хвороб, балів (1–9): бактеріоз слизовий – 5, бактеріоз судинний – 6.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.

Вид: Капуста білоголова *Brassica oleracea* L. var. *alba* DC.

Заявка № 18096003 Назва сорту: Оксілус **Заявник (код):** 1852 **Власник сорту (код):** 1852

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 25.11.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200872

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: за висотою	висока	7	
1,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0	
1,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0	
2,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: найбільший діаметр (разом із зовнішніми листками)	середній	5	
2,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0	
2,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0	
3	Рослина: зовнішнє стебло за довжиною	коротке	3	
4	Рослина: положення зовнішніх листків	напівпряме	3	
5,1	Лише для сортів капусти білоголової. Зовнішній листок: розмір	середній	5	
5,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: розмір	ознака не визначається	0	
5,3	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір	ознака не визначається	0	
6	Зовнішній листок: форма пластинки	округла	3	
7	Зовнішній листок: профіль верхньої частини пластинки	увігнутий	1	
8,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	помірний	2	
8,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	ознака не визначається	0	
9,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: розмір пухирців	середній	5	
9,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір пухирців	ознака не визначається	0	
10	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: гофрованість	ознака не визначається	0	
11	Зовнішній листок: забарвлення (з восковим нальотом)	сіро-зелене	3	
12	Зовнішній листок: інтенсивність забарвлення	помірна	5	
13	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: зеленкуватість	ознака не визначається	0	
14	Зовнішній листок: восковий наліт	сильний	7	
15	Зовнішній листок: ступінь хвилястості краю	помірний	5	
16	Зовнішній листок: вигин краю	наявний	9	
17	Головка: форма поздовжнього розрізу	округла	3	
18	Головка: форма основи у поздовжньому розрізі	округла	1	
19	Головка: за довжиною	середня	5	
20	Головка: діаметр	середній	5	
21	Головка: розміщення найбільшого діаметра	посередині	2	
22	Головка: ступінь покриття	покритий	3	
23	Лише для сортів капусти савойської. Головка: пухирчастість покривного листка	ознака не визначається	0	
24	Головка: вигин краю покривного листка	наявний	9	
25	Головка: забарвлення покривного листка	сіро-зелене	3	
26	Головка: інтенсивність забарвлення покривного листка	помірна	5	
27	Лише сорти капусти білоголової і савойської. Головка: антоціанове забарвлення покривних листків	відсутнє або дуже слабе	1	
28	Головка: внутрішнє забарвлення	білувате	1	
29	Лише сорти капусти червоноголової. Головка: інтенсивність внутрішнього забарвлення	ознака не визначається	0	
30	Головка: за щільністю	дуже щільна	9	
31	Головка: внутрішня структура	тонка	3	
32	Головка: довжина внутрішнього стебла відносно довжини головки	середня	5	
33,1	Лише сорти капусти білоголової. Час збиральної стиглості	середній	5	
33,2	Лише сорти капусти червоноголової. Час збиральної стиглості	ознака не визначається	0	
33,3	Лише сорти капусти савойської. Час збиральної стиглості	ознака не визначається	0	
34	Час розтріскування головки після досягання	пізній	7	
35	Чоловіча стерильність	ознака не визначалась	0	
36	Стійкість до раси 1 <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>conglutinans</i>	ознака не визначалась	0	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 85. Період від сівби до початку досягання, діб – 90. Вміст вітаміну С, мг % – 45, загального цукру, % – 4, сухої речовини, % – 10. Стійкість до хвороб, балів (1–9): бактеріоз слизовий – 6, бактеріоз судинний – 5.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Капуста білоголова *Brassica oleracea* L. var. *alba* DC.

Заявка № 18096017 Назва сорту: Раніні **Заявник (код):** 751 **Власник сорту (код):** 751

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 24.11.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200871

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: за висотою	середня	5	
1,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0	
1,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0	
2,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: найбільший діаметр (разом із зовнішніми листками)	малий	3	
2,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0	
2,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0	
3	Рослина: зовнішнє стебло за довжиною	коротке	3	
4	Рослина: положення зовнішніх листків	напівпряме	3	
5,1	Лише для сортів капусти білоголової. Зовнішній листок: розмір	середній	5	
5,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: розмір	ознака не визначається	0	
5,3	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір	ознака не визначається	0	
6	Зовнішній листок: форма пластинки	округла	3	
7	Зовнішній листок: профіль верхньої частини пластинки	увігнутий	1	
8,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	помірний	2	
8,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	ознака не визначається	0	
9,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: розмір пухирців	середній	5	
9,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір пухирців	ознака не визначається	0	
10	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: гофрованість	ознака не визначається	0	
11	Зовнішній листок: забарвлення (з восковим нальотом)	зелене	2	
12	Зовнішній листок: інтенсивність забарвлення	помірна	5	
13	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: зеленкуватість	ознака не визначається	0	
14	Зовнішній листок: восковий наліт	помірний	5	
15	Зовнішній листок: ступінь хвилястості краю	слабкий	3	
16	Зовнішній листок: вигин краю	наявний	9	
17	Головка: форма поздовжнього розрізу	округла	3	
18	Головка: форма основи у поздовжньому розрізі	округла	1	
19	Головка: за довжиною	коротка	3	
20	Головка: діаметр	малий	3	
21	Головка: розміщення найбільшого діаметра	посередині	2	
22	Головка: ступінь покриття	непокритий	1	
23	Лише для сортів капусти савойської. Головка: пухирчастість покривного листка	ознака не визначається	0	
24	Головка: вигин краю покривного листка	наявний	9	
25	Головка: забарвлення покривного листка	зелене	2	
26	Головка: інтенсивність забарвлення покривного листка	помірна	5	
27	Лише сорти капусти білоголової і савойської. Головка: антоціанове забарвлення покривних листків	відсутнє або дуже слабке	1	
28	Головка: внутрішнє забарвлення	білувате	1	
29	Лише сорти капусти червоноголової. Головка: інтенсивність внутрішнього забарвлення	ознака не визначається	0	
30	Головка: за щільністю	щільна	7	
31	Головка: внутрішня структура	тонка	3	
32	Головка: довжина внутрішнього стебла відносно довжини головки	довга	7	
33,1	Лише сорти капусти білоголової. Час збирання стиглості	ранній	3	
33,2	Лише сорти капусти червоноголової. Час збирання стиглості	ознака не визначається	0	
33,3	Лише сорти капусти савойської. Час збирання стиглості	ознака не визначається	0	
34	Час розтріскування головки після досягання	ранній	3	
35	Чоловіча стерильність	ознака не визначалась	0	
36	Стійкість до раси 1 <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>conglutinans</i>	ознака не визначалась	0	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 50. Період від сівби до початку досягання, діб – 55. Вміст вітаміну С, мг % – 46, загального цукру, % – 4,3, сухої речовини, % – 8,5. Стійкість до хвороб, балів (1–9): бактеріоз слизовий – 8, бактеріоз судинний – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Капуста білоголова *Brassica oleracea* L. var. *alba* DC.

Заявка № 18096012 Назва сорту: РОСБЕРГ **Заявник (код):** 1959 **Власник сорту (код):** 1959

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 08.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201156

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: за висотою	середня	5	
1,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0	
1,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0	
2,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: найбільший діаметр (разом із зовнішніми листками)	малий	3	
2,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0	
2,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0	
3	Рослина: зовнішнє стебло за довжиною	коротке	3	
4	Рослина: положення зовнішніх листків	напівпряме	3	
5,1	Лише для сортів капусти білоголової. Зовнішній листок: розмір	середній	5	
5,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: розмір	ознака не визначається	0	
5,3	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір	ознака не визначається	0	
6	Зовнішній листок: форма пластинки	округла	3	
7	Зовнішній листок: профіль верхньої частини пластинки	увігнутий	1	
8,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	помірний	2	
8,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	ознака не визначається	0	
9,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: розмір пухирців	середній	5	
9,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір пухирців	ознака не визначається	0	
10	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: гофрованість	ознака не визначається	0	
11	Зовнішній листок: забарвлення (з восковим нальотом)	зелене	2	
12	Зовнішній листок: інтенсивність забарвлення	помірна	5	
13	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: зеленкуватість	ознака не визначається	0	
14	Зовнішній листок: восковий наліт	помірний	5	
15	Зовнішній листок: ступінь хвилястості краю	слабкий	3	
16	Зовнішній листок: вигин краю	наявний	9	
17	Головка: форма поздовжнього розрізу	округла	3	
18	Головка: форма основи у поздовжньому розрізі	округла	1	
19	Головка: за довжиною	коротка	3	
20	Головка: діаметр	малий	3	
21	Головка: розміщення найбільшого діаметра	посередині	2	
22	Головка: ступінь покриття	непокритий	1	
23	Лише для сортів капусти савойської. Головка: пухирчастість покривного листа	ознака не визначається	0	
24	Головка: вигин краю покривного листа	наявний	9	
25	Головка: забарвлення покривного листа	зелене	2	
26	Головка: інтенсивність забарвлення покривного листа	помірна	5	
27	Лише сорти капусти білоголової і савойської. Головка: антоціанове забарвлення покривних листків	відсутнє або дуже слабке	1	
28	Головка: внутрішнє забарвлення	білувате	1	
29	Лише сорти капусти червоноголової. Головка: інтенсивність внутрішнього забарвлення	ознака не визначається	0	
30	Головка: за щільністю	щільна	7	
31	Головка: внутрішня структура	тонка	3	
32	Головка: довжина внутрішнього стебла відносно довжини головки	середня	5	
33,1	Лише сорти капусти білоголової. Час збиральної стиглості	дуже ранній	1	
33,2	Лише сорти капусти червоноголової. Час збиральної стиглості	ознака не визначається	0	
33,3	Лише сорти капусти савойської. Час збиральної стиглості	ознака не визначається	0	
34	Час розтріскування головки після досягання	середній	5	
35	Чоловіча стерильність	ознака не визначалась	0	
36	Стійкість до раси 1 <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>conglutinans</i>	ознака не визначалась	0	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 70. Період від сівби до початку досягання, діб – 80. Вміст вітаміну С, мг % – 45, загальної цукру, % – 5, сухої речовини, % – 6. Стійкість до хвороб, балів (1–9): бактеріоз слизовий – 5, бактеріоз судинний – 6.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Капуста білоголова *Brassica oleracea* L. var. *alba* DC.

Заявка № 18096015 Назва сорту: Таліс **Заявник (код):** 751 **Власник сорту (код):** 751

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.11.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200875

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: за висотою	середня	5	
1,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0	
1,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0	
2,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: найбільший діаметр (разом із зовнішніми листками)	малий	3	
2,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0	
2,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0	
3	Рослина: зовнішнє стебло за довжиною	коротке	3	
4	Рослина: положення зовнішніх листків	напівпряме	3	
5,1	Лише для сортів капусти білоголової. Зовнішній листок: розмір	середній	5	
5,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: розмір	ознака не визначається	0	
5,3	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір	ознака не визначається	0	
6	Зовнішній листок: форма пластинки	округла	3	
7	Зовнішній листок: профіль верхньої частини пластинки	увігнутий	1	
8,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	помірний	2	
8,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	ознака не визначається	0	
9,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: розмір пухирців	середній	5	
9,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір пухирців	ознака не визначається	0	
10	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: гофрованість	ознака не визначається	0	
11	Зовнішній листок: забарвлення (з восковим нальотом)	зелене	2	
12	Зовнішній листок: інтенсивність забарвлення	помірна	5	
13	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: зеленкуватість	ознака не визначається	0	
14	Зовнішній листок: восковий наліт	помірний	5	
15	Зовнішній листок: ступінь хвилястості краю	слабкий	3	
16	Зовнішній листок: вигин краю	наявний	9	
17	Головка: форма поздовжнього розрізу	широкоеліптична	4	
18	Головка: форма основи у поздовжньому розрізі	округла	1	
19	Головка: за довжиною	середня	5	
20	Головка: діаметр	середній	5	
21	Головка: розміщення найбільшого діаметра	посередині	2	
22	Головка: ступінь покриття	непокритий	1	
23	Лише для сортів капусти савойської. Головка: пухирчастість покривного листка	ознака не визначається	0	
24	Головка: вигин краю покривного листка	наявний	9	
25	Головка: забарвлення покривного листка	зелене	2	
26	Головка: інтенсивність забарвлення покривного листка	помірна	5	
27	Лише сорти капусти білоголової і савойської. Головка: антоціанове забарвлення покривних листків	відсутнє або дуже слабке	1	
28	Головка: внутрішнє забарвлення	білувате	1	
29	Лише сорти капусти червоноголової. Головка: інтенсивність внутрішнього забарвлення	ознака не визначається	0	
30	Головка: за щільністю	щільна	7	
31	Головка: внутрішня структура	тонка	3	
32	Головка: довжина внутрішнього стебла відносно довжини головки	середня	5	
33,1	Лише сорти капусти білоголової. Час збирання стиглості	ранній	3	
33,2	Лише сорти капусти червоноголової. Час збирання стиглості	ознака не визначається	0	
33,3	Лише сорти капусти савойської. Час збирання стиглості	ознака не визначається	0	
34	Час розтріскування головки після досягання	середній	5	
35	Чоловіча стерильність	ознака не визначалась	0	
36	Стійкість до раси 1 <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>conglutinans</i>	ознака не визначалась	0	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 48. Період від сівби до початку досягання, діб – 50. Вміст вітаміну С, мг % – 44, загального цукру, % – 4,6, сухої речовини, % – 8,4. Стійкість до хвороб, балів (1–9): бактеріоз слизовий – 8, бактеріоз судинний – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Капуста білоголова *Brassica oleracea* L. var. *alba* DC.

Заявка № 18096004 Назва сорту: Тропікана **Заявник (код):** 1852 **Власник сорту (код):** 1852

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 25.11.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200873

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: за висотою	дуже висока	9	
1,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0	
1,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0	
2,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: найбільший діаметр (разом із зовнішніми листками)	середній	5	
2,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0	
2,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0	
3	Рослина: зовнішнє стебло за довжиною	коротке	3	
4	Рослина: положення зовнішніх листків	напівпряме	3	
5,1	Лише для сортів капусти білоголової. Зовнішній листок: розмір	великий	7	
5,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: розмір	ознака не визначається	0	
5,3	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір	ознака не визначається	0	
6	Зовнішній листок: форма пластинки	округла	3	
7	Зовнішній листок: профіль верхньої частини пластинки	увігнутий	1	
8,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	помірний	2	
8,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	ознака не визначається	0	
9,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: розмір пухирців	середній	5	
9,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір пухирців	ознака не визначається	0	
10	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: гофрованість	ознака не визначається	0	
11	Зовнішній листок: забарвлення (з восковим нальотом)	сіро-зелене	3	
12	Зовнішній листок: інтенсивність забарвлення	помірна	5	
13	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: зеленкуватість	ознака не визначається	0	
14	Зовнішній листок: восковий наліт	сильний	7	
15	Зовнішній листок: ступінь хвилястості краю	слабкий	3	
16	Зовнішній листок: вигин краю	наявний	9	
17	Головка: форма поздовжнього розрізу	округла	3	
18	Головка: форма основи у поздовжньому розрізі	округла	1	
19	Головка: за довжиною	середня	5	
20	Головка: діаметр	середній	5	
21	Головка: розміщення найбільшого діаметра	посередині	2	
22	Головка: ступінь покриття	покритий	3	
23	Лише для сортів капусти савойської. Головка: пухирчастість покривного листка	ознака не визначається	0	
24	Головка: вигин краю покривного листка	наявний	9	
25	Головка: забарвлення покривного листка	сіро-зелене	3	
26	Головка: інтенсивність забарвлення покривного листка	помірна	5	
27	Лише сорти капусти білоголової і савойської. Головка: антоціанове забарвлення покривних листків	відсутнє або дуже слабе	1	
28	Головка: внутрішнє забарвлення	білувате	1	
29	Лише сорти капусти червоноголової. Головка: інтенсивність внутрішнього забарвлення	ознака не визначається	0	
30	Головка: за щільністю	щільна	7	
31	Головка: внутрішня структура	тонка	3	
32	Головка: довжина внутрішнього стебла відносно довжини головки	середня	5	
33,1	Лише сорти капусти білоголової. Час збирання стиглості	середній	5	
33,2	Лише сорти капусти червоноголової. Час збирання стиглості	ознака не визначається	0	
33,3	Лише сорти капусти савойської. Час збирання стиглості	ознака не визначається	0	
34	Час розтріскування головки після досягання	пізній	7	
35	Чоловіча стерильність	ознака не визначалась	0	
36	Стійкість до раси 1 <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>conglutinans</i>	ознака не визначалась	0	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 80. Період від сівби до початку достигання, діб – 90. Вміст вітаміну С, мг % – 42, загального цукру, % – 4,5, сухої речовини, % – 11. Стійкість до хвороб, балів (1–9): бактеріоз слизовий – 5, бактеріоз судинний – 6.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Капуста броколі *Brassica oleracea* L. convar. *botrytis* (L.) Alef. var. *cymosa* Duch.

Заявка № 19136001 Назва сорту: Вавілон **Заявник (код):** 2020 **Власник сорту (код):** 2020

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201272

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: кількість стебел	одне	1	
2	Рослина: за висотою (за збиральної стиглості)	низька	3	
3	Листок: положення (на початку формування головки)	горизонтальне	5	
4	Листок: за довжиною (включаючи черешок)	короткий	3	
5	Листок: за шириною	середній	5	
6	Листок: кількість часток	середня	5	
7	Листкова пластинка: забарвлення	сіро-зелене	2	
8	Листкова пластинка: інтенсивність забарвлення	слабка	3	
9	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення	наявне	9	
10	Листкова пластинка: хвилястість краю	помірна	5	
11	Листкова пластинка: зубчастість краю	помірна	5	
12	Листкова пластинка: пухирчастість	слабка	3	
13	Черешок: антоціанове забарвлення	наявне	9	
14	Черешок: за довжиною	короткий	3	
15	Головка: гілочки від основи за довжиною (за виключенням стебла)	короткі	3	
16	Головка: розмір	середній	5	
17	Головка: форма поперечного розрізу	поперечношироко-еліптична	2	
18	Головка: забарвлення	сіро-зелене	3	
19	Головка: інтенсивність забарвлення	слабка	3	
20	Головка: антоціанове забарвлення	наявне	9	
21	Головка: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
22	Головка: горбкуватість	помірна	5	
23	Головка: структура тканини	м'яка	3	
24	Головка: за щільністю	щільна	7	
25	Головка: покривний листок	відсутній	1	
26	Рослина: вторинні головки (за збирання)	наявні	9	
27	Рослина: опуклість вторинних головок (як для озн. 26)	помірна	5	
28	Квітка: забарвлення	жовте	2	
29	Квітка: інтенсивність жовтого забарвлення	помірна	5	
30	Час збиральної стиглості (50% рослин)	середній	5	
31	Час початку цвітіння (50% рослин мають щонайменше 10% квіток)	пізній	7	
32	Чоловіча стерильність	наявна	9	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна врожайність, т/га – 20. Тривалість періоду до досягання, діб – 75. Стійкість до хвороб, балів (1–9): бактеріоз судинний – 6.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Капуста броколі *Brassica oleracea* L. convar. *botrytis* (L.) Alef. var. *cymosa* Duch.

Заявка № 20136001 Назва сорту: Самоа **Заявник (код):** 2226 **Власник сорту (код):** 2226

Дата пріоритету: 10.02.2020

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201017

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: кількість стебел	одне	1	
2	Рослина: за висотою (за збиральною стиглістю)	середня	5	
3	Листок: положення (на початку формування головки)	напівпряме	3	
4	Листок: за довжиною (включаючи черешок)	середній	5	
5	Листок: за шириною	широкий	7	
6	Листок: кількість часток	середня	5	
7	Листкова пластинка: забарвлення	сіро-зелене	2	
8	Листкова пластинка: інтенсивність забарвлення	сильна	7	
9	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
10	Листкова пластинка: хвилястість краю	слабка	3	
11	Листкова пластинка: зубчастість краю	слабка	3	
12	Листкова пластинка: пухирчастість	слабка	3	
13	Черешок: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
14	Черешок: за довжиною	довгий	7	
15	Головка: галузки від основи за довжиною (за виключенням стебла)	короткі	3	
16	Головка: розмір	великий	7	
17	Головка: форма позовдовжнього розрізу	поперечно-еліптична	3	
18	Головка: забарвлення	блакитно-зелене	4	
19	Головка: інтенсивність забарвлення	помірна	5	
20	Головка: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
21	Головка: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
22	Головка: горбкуватість	слабка	3	
23	Головка: структура тканини	помірна	5	
24	Головка: за щільністю	помірна	5	
25	Головка: покривний листок	відсутній	1	
26	Рослина: вторинні головки (за збирання)	відсутні	1	
27	Рослина: опуклість вторинних головок (як для озн. 26)	ознака не визначається	0	
28	Квітка: забарвлення	жовте	2	
29	Квітка: інтенсивність жовтого забарвлення	слабка	3	
30	Час збиральної стиглості (50% рослин)	ранній	3	
31	Час початку цвітіння (50% рослин мають щонайменше 10% квіток)	середній	5	
32	Чоловіча стерильність	відсутня	1	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна врожайність, т/га – 28. Тривалість періоду до досягання, діб – 7. Стійкість до хвороб, балів (1–9): бактеріоз судинний – 2.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЗГр.

Вид: Капуста броколі *Brassica oleracea* L. convar. *botrytis* (L.) Alef. var. *cymosa* Duch.

Заявка № 19136002 Назва сорту: СТИРЛІНГ **Заявник (код):** 2020 **Власник сорту (код):** 2020

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201271

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: кількість стебел	одне	1	
2	Рослина: за висотою (за збиральної стиглості)	середня	5	
3	Листок: положення (на початку формування головки)	горизонтальне	5	
4	Листок: за довжиною (включаючи черешок)	середній	5	
5	Листок: за шириною	середній	5	
6	Листок: кількість часток	середня	5	
7	Листкова пластинка: забарвлення	блакитно-зелене	3	
8	Листкова пластинка: інтенсивність забарвлення	помірна	5	
9	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
10	Листкова пластинка: хвилястість краю	помірна	5	
11	Листкова пластинка: зубчастість краю	помірна	5	
12	Листкова пластинка: пухирчастість	помірна	5	
13	Черешок: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
14	Черешок: за довжиною	середній	5	
15	Головка: галузки від основи за довжиною (за виключенням стебла)	короткі	3	
16	Головка: розмір	середній	5	
17	Головка: форма позовжнього розрізу	поперечношироко-еліптична	2	
18	Головка: забарвлення	блакитно-зелене	4	
19	Головка: інтенсивність забарвлення	сильна	7	
20	Головка: антоціанове забарвлення	наявне	9	
21	Головка: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
22	Головка: горбкуватість	помірна	5	
23	Головка: структура тканини	помірна	5	
24	Головка: за щільністю	щільна	7	
25	Головка: покривний листок	відсутній	1	
26	Рослина: вторинні головки (за збирання)	відсутні	1	
27	Рослина: опуклість вторинних головок (як для озн. 26)	ознака не визначається	0	
28	Квітка: забарвлення	жовте	2	
29	Квітка: інтенсивність жовтого забарвлення	помірна	5	
30	Час збиральної стиглості (50% рослин)	пізній	7	
31	Час початку цвітіння (50% рослин мають щонайменше 10% квіток)	пізній	7	
32	Чоловіча стерильність	наявна	9	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна врожайність, т/га – 22. Тривалість періоду до досягання, діб – 82. Стійкість до хвороб, балів (1–9): бактеріоз судинний – 5.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Капуста цвітна *Brassica oleracea* L. convar. *botrytis* (L.) Alef. var. *botrytis* L.

Заявка № 18101013 Назва сорту: Арієнзо **Заявник (код):** 1730 **Власник сорту (код):** 1730

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 25.11.2020

Свідчення про державну реєстрацію № 200881

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилі	наявне	9	
2	Рослина: за висотою (за збирання)	низька	3	
3	Стебло: за довжиною (до місця прикріплення першого листка)	коротке	3	
4	Листок: положення	напівпряме	3	
5	Листок: за довжиною	короткий	3	
6	Листок: за шириною	середній	5	
7	Листок: відношення ширина/довжина	середнє	5	
8	Листок: часточковість	відсутня	1	
9	Листок: забарвлення (з восковим нальотом, якщо є)	сіро-зелене	2	
10	Листок: інтенсивність забарвлення (як для 9)	помірна	5	
11	Листок: закручування верхівки	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Листок: форма поперечного перерізу	увігнута	1	
13	Листок: пухирчатість	помірна	5	
14	Листок: гофрованість біля головної жилки	помірна	5	
15	Листок: хвилястість краю	помірна	5	
16	Головка: покриття внутрішніми листками	частково покрита	2	
17	Головка: за висотою	середня	5	
18	Головка: діаметр	середній	5	
19	Головка: форма позовжнього розрізу	поперечно помірно-еліптична	3	
20	За винятком сортів з трикутною головою. Головка: закручування краю	сильне	7	
21	Головка: забарвлення	білувате	1	
22	Головка: горбкуватість	сильна	7	
23	Головка: текстура	помірна	5	
24	Головка: антоціанове забарвлення після збиральної стиглості	відсутнє	1	
25	Квітка: забарвлення	біле	1	
26	Скоростиглість: за весняного садіння	середня	5	
27	Скоростиглість: за літнього садіння	ознака не визначалась	0	
28	Чоловіча стерильність	ознака не визначалась	0	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 50. Товарна врожайність, т/га – 20. Період від повних сходів до початку достигання, діб – 75. Період плодоношення, діб – 10. Вміст білка, % – 2, вітаміну С, мг % – 50, загального цукру, % – 2,1, сухої речовини, % – 5. Стійкість до хвороб, балів (1–9): бактеріоз слизовий – 3, бактеріоз судинний – 3.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Капуста цвітна *Brassica oleracea* L. convar. *botrytis* (L.) Alef. var. *botrytis* L.

Заявка № 18101009 Назва сорту: ГРІН СТОРМ **Заявник (код):** 1050 **Власник сорту (код):** 1050

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 08.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201159

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилля	наявне	9	
2	Рослина: за висотою (за збирання)	низька	3	
3	Стебло: за довжиною (до місця прикріплення першого листка)	коротке	3	
4	Листок: положення	горизонтальне	5	
5	Листок: за довжиною	короткий	3	
6	Листок: за шириною	вузький	3	
7	Листок: відношення ширина/довжина	велике	7	
8	Листок: часточковість	відсутня	1	
9	Листок: забарвлення (з восковим нальотом, якщо є)	блакитно-зелене	3	
10	Листок: інтенсивність забарвлення (як для 9)	помірна	5	
11	Листок: закручування верхівки	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Листок: форма поперечного перерізу	увігнута	1	
13	Листок: пухирчатість	помірна	5	
14	Листок: гофрованість біля головної жилки	сильна	7	
15	Листок: хвилястість краю	помірна	5	
16	Головка: покриття внутрішніми листками	відкрита	1	
17	Головка: за висотою	середня	5	
18	Головка: діаметр	середній	5	
19	Головка: форма поздовжнього розрізу	поперечно помірно-еліптична	3	
20	За винятком сортів з трикутною головкою. Головка: закручування краю	слабке	3	
21	Головка: забарвлення	зелене	4	
22	Головка: горбкуватість	сильна	7	
23	Головка: текстура	груба	7	
24	Головка: антоціанове забарвлення після збиральної стиглості	відсутнє	1	
25	Квітка: забарвлення	ознака не визначалась	0	
26	Скоростиглість: за весняного садіння	середня	5	
27	Скоростиглість: за літнього садіння осіннього типу	від дуже раннього до раннього	2	
28	Чоловіча стерильність	ознака не визначалась	0	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 130. Товарна врожайність, т/га – 40. Період від повних сходів до початку достигання, діб – 70. Період плодоношення, діб – 10. Вміст білка, % – 2, вітаміну С, мг % – 50, загального цукру, % – 5, сухої речовини, % – 11. Стійкість до хвороб, балів (1–9): бактеріоз слизовий – 5, бактеріоз судинний – 5.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Капуста цвітня *Brassica oleracea* L. convar. *botrytis* (L.) Alef. var. *botrytis* L.

Заявка № 18101002 Назва сорту: Моментум **Заявник (код):** 1852 **Власник сорту (код):** 1852

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 25.11.2020

Свідчення про державну реєстрацію № 200879

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилі	наявне	9	
2	Рослина: за висотою (за збирання)	низька	3	
3	Стебло: за довжиною (до місця прикріплення першого листка)	середнє	5	
4	Листок: положення	напівпряме	3	
5	Листок: за довжиною	короткий	3	
6	Листок: за шириною	середній	5	
7	Листок: відношення ширина/довжина	середнє	5	
8	Листок: часточковість	відсутня	1	
9	Листок: забарвлення (з восковим нальотом, якщо є)	сіро-зелене	2	
10	Листок: інтенсивність забарвлення (як для 9)	помірна	5	
11	Листок: закручування верхівки	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Листок: форма поперечного перерізу	увігнута	1	
13	Листок: пухирчатість	помірна	5	
14	Листок: гофрованість біля головної жилки	помірна	5	
15	Листок: хвилястість краю	помірна	5	
16	Головка: покриття внутрішніми листками	частково покрита	2	
17	Головка: за висотою	середня	5	
18	Головка: діаметр	середній	5	
19	Головка: форма позовжнього розрізу	поперечно помірно-еліптична	3	
20	За винятком сортів з трикутною головою. Головка: закручування краю	помірне	5	
21	Головка: забарвлення	білувате	1	
22	Головка: горбкуватість	сильна	7	
23	Головка: текстура	помірна	5	
24	Головка: антоціанове забарвлення після збиральної стиглості	відсутнє	1	
25	Квітка: забарвлення	біле	1	
26	Скоростиглість: за весняного садіння	від ранньої до середньої	4	
27	Скоростиглість: за літнього садіння осіннього типу	від дуже раннього до раннього	2	
28	Чоловіча стерильність	ознака не визначалась	0	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 40. Товарна врожайність, т/га – 38. Період від повних сходів до початку досягання, діб – 100. Період плодоношення, діб – 15. Вміст білка, % – 2, вітаміну С, мг % – 60, загального цукру, % – 2, сухої речовини, % – 10. Стійкість до хвороб, балів (1–9): бактеріоз слизовий – 6, бактеріоз судинний – 6.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Капуста цвітня *Brassica oleracea* L. convar. *botrytis* (L.) Alef. var. *botrytis* L.

Заявка № 18101010 Назва сорту: ТРАЙДЕНТ **Заявник (код):** 2020 **Власник сорту (код):** 2020

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.11.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200880

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилля	наявне	9	
2	Рослина: за висотою (за збирання)	низька	3	
3	Стебло: за довжиною (до місця прикріплення першого листка)	коротке	3	
4	Листок: положення	напівпряме	3	
5	Листок: за довжиною	короткий	3	
6	Листок: за шириною	середній	5	
7	Листок: відношення ширина/довжина	середнє	5	
8	Листок: часточковість	відсутня	1	
9	Листок: забарвлення (з восковим нальотом, якщо є)	сіро-зелене	2	
10	Листок: інтенсивність забарвлення (як для 9)	помірна	5	
11	Листок: закручування верхівки	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Листок: форма поперечного перерізу	увігнута	1	
13	Листок: пухирчатість	помірна	5	
14	Листок: гофрованість біля головної жилки	помірна	5	
15	Листок: хвилястість краю	помірна	5	
16	Головка: покриття внутрішніми листками	частково покрита	2	
17	Головка: за висотою	середня	5	
18	Головка: діаметр	середній	5	
19	Головка: форма поздовжнього розрізу	поперечно помірно-еліптична	3	
20	За винятком сортів з трикутною головкою. Головка: закручування краю	сильне	7	
21	Головка: забарвлення	білувате	1	
22	Головка: горбкуватість	помірна	5	
23	Головка: текстура	помірна	5	
24	Головка: антоціанове забарвлення після збиральної стиглості	відсутнє	1	
25	Квітка: забарвлення	біле	1	
26	Скоростиглість: за весняного садіння	середня	5	
27	Скоростиглість: за літнього садіння осіннього типу	від раннього до середнього	4	
28	Чоловіча стерильність	ознака не визначалась	0	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 80. Товарна врожайність, т/га – 78. Період від повних сходів до початку достигання, діб – 80. Період плодоношення, діб – 15. Вміст білка, % – 1,9, вітаміну С, мг % – 48, загального цукру, % – 2, сухої речовини, % – 7,5. Стійкість до хвороб, балів (1–9): бактеріоз слизовий – 5, бактеріоз судинний – 6.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Капуста цвітна *Brassica oleracea* L. convar. *botrytis* (L.) Alef. var. *botrytis* L.

Заявка № 18101004 Назва сорту: ФЛЕЙМ СТАР **Заявник (код):** 1959 **Власник сорту (код):** 1959

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 08.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201158

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилля	наявне	9	
2	Рослина: за висотою (за збирання)	низька	3	
3	Стебло: за довжиною (до місця прикріплення першого листка)	середнє	5	
4	Листок: положення	напівпряме	3	
5	Листок: за довжиною	короткий	3	
6	Листок: за шириною	середній	5	
7	Листок: відношення ширина/довжина	середнє	5	
8	Листок: часточковість	відсутня	1	
9	Листок: забарвлення (з восковим нальотом, якщо є)	блакитно-зелене	3	
10	Листок: інтенсивність забарвлення (як для 9)	помірна	5	
11	Листок: закручування верхівки	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Листок: форма поперечного перерізу	увігнута	1	
13	Листок: пухирчатість	помірна	5	
14	Листок: гофрованість біля головної жилки	помірна	5	
15	Листок: хвилястість краю	помірна	5	
16	Головка: покриття внутрішніми листками	частково покрита	2	
17	Головка: за висотою	середня	5	
18	Головка: діаметр	середній	5	
19	Головка: форма позовдовжнього розрізу	поперечно помірно-еліптична	3	
20	За винятком сортів з трикутною головою. Головка: закручування краю	помірне	5	
21	Головка: забарвлення	оранжеве	3	
22	Головка: горбкуватість	сильна	7	
23	Головка: текстура	помірна	5	
24	Головка: антоціанове забарвлення після збиральної стиглості	відсутнє	1	
25	Квітка: забарвлення	жовте	2	
26	Скоростиглість: за весняного садіння	середня	5	
27	Скоростиглість: за літнього садіння	середній осінній тип	5	
28	Чоловіча стерильність	ознака не визначалась	0	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 140. Товарна врожайність, т/га – 45. Період від повних сходів до початку достигання, діб – 105. Період плодоношення, діб – 8. Вміст білка, % – 2, вітаміну С, мг % – 65, загального цукру, % – 5,5, сухої речовини, % – 9,5. Стійкість до хвороб, балів (1–9): бактеріоз слизовий – 5, бактеріоз судинний – 6.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.

Вид: Кукурудза розлусна *Zea mays* L. ssp. *evarta* Sturt.

Заявка № 18163001 Назва сорту: ДН Карамель **Заявник (код):** 2260 **Власник сорту (код):** 2260

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 10.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201207

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	помірно похиле	5	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	середня кількість	5	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	розлусний	7	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	проміжний	2	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

ФАО – 270. Загальна врожайність, т/га – 3. Екструдивність, % – 96.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза цукрова *Zea mays* L. ssp. *saccharata* Sturt.

Заявка № 19103004 Назва сорту: Білий Кролик **Заявник (код):** 2424 **Власник сорту (код):** 2424

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 08.12.2020 **Патент №** 200771

Дата пріоритету: 04.01.2019

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 08.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200973

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	великий	7	
6	Листок: положення пластинки у просторі	помірно похиле	5	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	дуже ранній	1	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	дуже ранній	1	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	відсутнє або дуже слабке	1	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	щільне	7	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	середня	5	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	до середнього
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	два	2	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	помірна	5	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	середня	5	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	середня	5	
36	Качан: тип зернівки	цукровий	6	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	помірна	3	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	і біле
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	ознака не визначається	0	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна врожайність качанів, т/га – 12,4. Група стиглості: 2 – середня. Висота прикріплення першого нижнього качана, см – 57. Вміст загального цукру, % – 23,4. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): бактеріоз (*Bacillus zeae* Burr.) – 7, сажка летюча (*Sorosporium reilianum* Mc. Alp.) – 8, сажка пухирчата (*Ustilago zeae* Beckm.) – 7, фузаріоз (*Fusarium moniliforme* Sheldon.) – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза цукрова *Zea mays* L. ssp. *saccharata* Sturt.

Заявка № 19103001 Назва сорту: ДМС Шафран **Заявник (код):** 2558 **Власник сорту (код):** 2558

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 22.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201789

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення півхи	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	помірно похиле	5	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	дуже ранній	1	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	великий	7	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	дуже ранній	1	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	відсутнє або дуже слабке	1	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	щільне	7	
19	Листок: антоціанове забарвлення півхи	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	до довгої
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	до середньої
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	середня	5	до довгої
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	до середнього
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	до середньої кількості
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	одне	1	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	слабка	3	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	середня	5	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	середня	5	
36	Качан: тип зернівки	цукровий	6	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	помірна	3	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	ознака не визначається	0	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна врожайність качанів, т/га – 10,4. Група стиглості: 1 – рання. Висота прикріплення першого нижнього качана, см – 70. Вміст загального цукру, % – 28. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): бактеріоз (*Bacillus zeae* Burr.) – 9, сажка летюча (*Sorosporium reilianum* Mc. Alp.) – 8, сажка пухирчаста (*Ustilago zeae* Beckm.) – 8, фузаріоз (*Fusarium moniliforme* Sheldon.) – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза цукрова *Zea mays* L. ssp. *saccharata* Sturt.

Заявка № 18103010 Назва сорту: ДН Шугарін **Заявник (код):** 2260 **Власник сорту (код):** 2260

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 10.12.2020

Свідчення про державну реєстрацію № 201208

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	великий	7	
6	Листок: положення пластинки у просторі	помірно похиле	5	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	ранній	3	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	відсутнє або дуже слабке	1	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	до щільного
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	до середнього
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	одне	1	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	помірна	5	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	середня	5	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	середня	5	
36	Качан: тип зернівки	цукровий	6	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	помірна	3	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	ознака не визначається	0	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна врожайність качанів, т/га – 6. Група стиглості: 2 – середня. Висота прикріплення першого нижнього качана, см – 48. Вміст загального цукру, % – 21,0. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): бактеріоз (*Bacillus zeae* Burr.) – 9, сажка летюча (*Sorosporium reilianum* Mc. Alp.) – 9, сажка пухирчата (*Ustilago zeae* Beckm.) – 9, фузаріоз (*Fusarium moniliforme* Sheldon.) – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза цукрова *Zea mays* L. ssp. *saccharata* Sturt.

Заявка № 18103009 Назва сорту: КАМБЕРЛЕНД **Заявник (код):** 2087 **Власник сорту (код):** 2662

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.11.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200888

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення півхи	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	великий	7	
6	Листок: положення пластинки у просторі	помірно похиле	5	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	середня кількість	5	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	відсутнє або дуже слабке	1	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	щільне	7	
19	Листок: антоціанове забарвлення півхи	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	середня	5	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	два	2	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	помірна	5	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	середня	5	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	середня	5	
36	Качан: тип зернівки	цукровий	6	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	помірна	3	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	ознака не визначається	0	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна врожайність качанів, т/га – 17. Група стиглості: 2 – середня. Висота прикріплення першого нижнього качана, см – 40. Вміст загального цукру, % – 7,6. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): бактеріоз (*Bacillus zeae* Burr.) – 5, сажка летюча (*Sorosporium reilianum* Mc. Alp.) – 6, сажка пухирчаста (*Ustilago zeae* Beckm.) – 5, фузаріоз (*Fusarium moniliforme* Sheldon.) – 6.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза цукрова *Zea mays* L. ssp. *saccharata* Sturt.

Заявка № 17103004 Назва сорту: Мессенджер **Заявник (код):** 1852 **Власник сорту (код):** 1852

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 25.11.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200887

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	сильно похиле	7	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	великий	7	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	щільне	7	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	одне	1	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	помірна	5	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	довга	7	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	середня	5	
36	Качан: тип зернівки	цукровий	6	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	помірна	3	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	ознака не визначається	0	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабе	1	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна врожайність качанів, т/га – 21. Група стиглості: 2 – середня. Висота прикріплення першого нижнього качана, см – 60. Вміст загального цукру, % – 22. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): бактеріоз (*Bacillus zeae* Burr.) – 5, сажка летюча (*Sorosporium reilianum* Mc. Alp.) – 5, сажка пухирчаста (*Ustilago zeae* Beckm.) – 4, фузаріоз (*Fusarium moniliforme* Sheldon.) – 5.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза цукрова *Zea mays* L. ssp. *saccharata* Sturt.

Заявка № 19103003 Назва сорту: НБМ 2020 **Заявник (код):** 2424 **Власник сорту (код):** 2424

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 08.12.2020 **Патент №** 200770

Дата пріоритету: 04.01.2019

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 08.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200972

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	помірно похиле	5	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	ранній	3	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	відсутнє або дуже слабке	1	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	щільне	7	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	до середньої
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	середня	5	до довгої
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	одне	1	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	слабка	3	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	середня	5	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	середня	5	
36	Качан: тип зернівки	цукровий	6	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	помірна	3	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	ознака не визначається	0	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна врожайність качанів, т/га – 12,1. Група стиглості: 2 – середня. Висота прикріплення першого нижнього качана, см – 52. Вміст загального цукру, % – 23,7. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): бактеріоз (*Bacillus zea* Burr.) – 8, сажка летюча (*Sorosporium reilianum* Mc. Alp.) – 8, сажка пухирчата (*Ustilago zea* Beckm.) – 8, фузаріоз (*Fusarium moniliforme* Sheldon.) – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза цукрова *Zea mays* L. ssp. *saccharata* Sturt.

Заявка № 19103002 Назва сорту: Роттердам **Заявник (код):** 2424 **Власник сорту (код):** 2424

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 08.12.2020 **Патент №** 200769

Дата пріоритету: 04.01.2019

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 08.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200971

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	помірно похиле	5	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	дуже ранній	1	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	дуже ранній	1	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	відсутнє або дуже слабке	1	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	щільне	7	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	одне	1	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	помірна	5	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	середня	5	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	середня	5	
36	Качан: тип зернівки	цукровий	6	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	помірна	3	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	ознака не визначається	0	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна врожайність качанів, т/га – 12,6. Група стиглості: 1 – рання. Висота прикріплення першого нижнього качана, см – 48. Вміст загального цукру, % – 22,7. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): бактеріоз (*Bacillus zeae* Burr.) – 7, сажка летюча (*Sorosporium reilianum* Mc. Alp.) – 8, сажка пухирчаста (*Ustilago zeae* Beckm.) – 7, фузаріоз (*Fusarium moniliforme* Sheldon.) – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Морква *Daucus carota* L.

Заявка № 17109006 Назва сорту: Карлано **Заявник (код):** 1852 **Власник сорту (код):** 1852

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201103

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Листки: розетка за шириною	вузька	3	
2	Листок: положення	напівпряме	3	
3	Листок: за довжиною (включаючи черешок)	довгий	7	
4	Листок: розсіченість	помірна	5	
5	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
6	Листок: антоціанове забарвлення черешка	відсутнє	1	
7	Коренеплід: за довжиною	довгий	7	
8	Коренеплід: за шириною	середній	5	
9	Коренеплід: відношення довжина/ширина	велике	7	
10	Коренеплід: форма позовдовжнього розрізу	вузькотрикутна	4	
11	Сорти оцінені за ознаками 7, 8, 10. Коренеплід: тенденція до кінчної форми	дуже слабка	1	
12	Коренеплід: форма плеча	від плескатої до округлої	2	
13	Коренеплід: кінчик (за повного розвитку)	ледь загострений	2	
14	Коренеплід: забарвлення поверхні	оранжеве	3	
15	За винятком сортів із білим зовнішнім забарвленням коренеплоду. Коренеплід: інтенсивність забарвлення поверхні	помірна	5	
16	Коренеплід: антоціанове забарвлення поверхні плеча	відсутнє	1	
17	Коренеплід: площа зеленого забарвлення поверхні плеча	відсутній або дуже мала	1	
18	Коренеплід: борошенчастість поверхні	слабка	3	
19	Коренеплід: діаметр серцевини відносно загального діаметра	середній	5	
20	Коренеплід: забарвлення серцевини	оранжеве	3	
21	За винятком сортів із білою серцевиною. Коренеплід: інтенсивність забарвлення серцевини	помірна	5	
22	Коренеплід: забарвлення флоєми	оранжеве	3	
23	За винятком сортів із білою флоємою. Коренеплід: інтенсивність забарвлення флоєми	помірна	5	
24	Коренеплід: забарвлення серцевини порівняно із забарвленням флоєми	однакове	2	
25	Коренеплід: інтенсивність зеленого забарвлення внутрішньої частини (у позовдовжньому розрізі)	слабка	3	
26	Коренеплід: надземна частина	відсутня або дуже мала	1	
27	Тільки сорти з тупими кінчиками. Коренеплід: час розвитку заокругленого кінчика	ознака не визначається	0	
28	Коренеплід: час забарвлення кінчика в позовдовжньому розрізі	середній	5	
29	Рослина: тенденція до стрілкування	відсутня або дуже слабка	1	
30	Рослина: висота першого зонтика під час його цвітіння	ознака не визначалась	0	
31	Рослина: частка рослин з чоловічою стерильністю	велика	3	
32	Рослина: тип чоловічої стерильності	пелюсткові пиляки	2	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна врожайність, т/га – 80. Тривалість періоду до досягання, діб – 75. Стійкість до хвороб, балів (1–9): гниль суха – 8, альтернатив – 7, гниль біла – 7, гниль мокра бактеріальна – 8. Вміст сухої речовини, % – 13,1, загального цукру, % – 6,9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Морква *Daucus carota* L.

Заявка № 18109002 Назва сорту: Каспі Заявник (код): 751 Власник сорту (код): 751

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.11.2020

Свідцтво про державну реєстрацію № 200896

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Листки: розетка за шириною	середня	5	
2	Листок: положення	напівпряме	3	
3	Листок: за довжиною (включаючи черешок)	довгий	7	
4	Листок: розсіченість	помірна	5	
5	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
6	Листок: антоціанове забарвлення черешка	відсутнє	1	
7	Коренеплід: за довжиною	середній	5	
8	Коренеплід: за шириною	середній	5	
9	Коренеплід: відношення довжина/ширина	середнє	5	
10	Коренеплід: форма позовжнього розрізу	майже трикутна	3	
11	Сорти оцінені за ознаками 7, 8, 10. Коренеплід: тенденція до конічної форми	середня	5	
12	Коренеплід: форма плеча	плеската	1	
13	Коренеплід: кінчик (за повного розвитку)	ледь загострений	2	
14	Коренеплід: забарвлення поверхні	оранжеве	3	
15	За винятком сортів із білим зовнішнім забарвленням коренеплоду. Коренеплід: інтенсивність забарвлення поверхні	помірна	5	
16	Коренеплід: антоціанове забарвлення поверхні плеча	наявне	9	
17	Коренеплід: площа зеленого забарвлення поверхні плеча	мала	3	
18	Коренеплід: борозенчастість поверхні	слабка	3	
19	Коренеплід: діаметр серцевини відносно загального діаметра	великий	7	
20	Коренеплід: забарвлення серцевини	оранжеве	3	
21	За винятком сортів із білою серцевиною. Коренеплід: інтенсивність забарвлення серцевини	помірна	5	
22	Коренеплід: забарвлення флоєми	оранжеве	3	
23	За винятком сортів із білою флоємою. Коренеплід: інтенсивність забарвлення флоєми	помірна	5	
24	Коренеплід: забарвлення серцевини порівняно із забарвленням флоєми	темніше	3	
25	Коренеплід: інтенсивність зеленого забарвлення внутрішньої частини (у позовжньому розрізі)	слабка	3	
26	Коренеплід: надземна частина	відсутня або дуже мала	1	
27	Тільки сорти з тупими кінчиками. Коренеплід: час розвитку заокругленого кінчика	ознака не визначається	0	
28	Коренеплід: час забарвлення кінчика в позовжньому розрізі	середній	5	
29	Рослина: тенденція до стрілкування	відсутня або дуже слабка	1	
30	Рослина: висота першого зонтика під час його цвітіння	ознака не визначалась	0	
31	Рослина: частка рослин з чоловічою стерильністю	велика	3	
32	Рослина: тип чоловічої стерильності	пелюсткові пиляки	2	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна врожайність, т/га – 80. Тривалість періоду до досягання, діб – 107. Стійкість до хвороб, балів (1–9): гниль суха – 7, альтернативіоз – 7, гниль біла – 7, гниль мокра бактеріальна – 7. Вміст сухої речовини, % – 6,7, загального цукру, % – 5,6.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Морква *Daucus carota* L.

Заявка № 18109004 Назва сорту: Небіда **Заявник (код):** 751 **Власник сорту (код):** 751

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.11.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200897

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Листки: розетка за шириною	середня	5	
2	Листок: положення	горизонтальне	5	
3	Листок: за довжиною (включаючи черешок)	середній	5	
4	Листок: розсіченість	помірна	5	
5	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
6	Листок: антоціанове забарвлення черешка	наявне	9	
7	Коренеплід: за довжиною	довгий	7	
8	Коренеплід: за шириною	середній	5	
9	Коренеплід: відношення довжина/ширина	середнє	5	
10	Коренеплід: форма поздовжнього розрізу	від вузькотрикутної до вузьковидовженої	5	
11	Сорти оцінені за ознаками 7, 8, 10. Коренеплід: тенденція до конічної форми	середня	5	
12	Коренеплід: форма плеча	округла	3	
13	Коренеплід: кінчик (за повного розвитку)	тупий	1	
14	Коренеплід: забарвлення поверхні	оранжеве	3	
15	За винятком сортів із білим зовнішнім забарвленням коренеплоду. Коренеплід: інтенсивність забарвлення поверхні	помірна	5	
16	Коренеплід: антоціанове забарвлення поверхні плеча	наявне	9	
17	Коренеплід: площа зеленого забарвлення поверхні плеча	мала	3	
18	Коренеплід: борошенчастість поверхні	слабка	3	
19	Коренеплід: діаметр серцевини відносно загального діаметра	дуже великий	9	
20	Коренеплід: забарвлення серцевини	оранжеве	3	
21	За винятком сортів із білою серцевиною. Коренеплід: інтенсивність забарвлення серцевини	помірна	5	
22	Коренеплід: забарвлення флоєми	оранжеве	3	
23	За винятком сортів із білою флоємою. Коренеплід: інтенсивність забарвлення флоєми	помірна	5	
24	Коренеплід: забарвлення серцевини порівняно із забарвленням флоєми	світліше	1	
25	Коренеплід: інтенсивність зеленого забарвлення внутрішньої частини (у поздовжньому розрізі)	помірна	5	
26	Коренеплід: надземна частина	мала	3	
27	Тільки сорти з тупими кінчиками. Коренеплід: час розвитку заокругленого кінчика	середній	5	
28	Коренеплід: час забарвлення кінчика в поздовжньому розрізі	середній	5	
29	Рослина: тенденція до стрілкування	відсутня або дуже слабка	1	
30	Рослина: висота першого зонтика під час його цвітіння	ознака не визначалась	0	
31	Рослина: частка рослин з чоловічою стерильністю	велика	3	
32	Рослина: тип чоловічої стерильності	пелюсткові пиляки	2	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна врожайність, т/га – 85. Тривалість періоду до досягання, діб – 130. Стійкість до хвороб, балів (1–9): гниль суха – 7, альтернаріоз – 7, гниль біла – 7, гниль мокра бактеріальна – 7. Вміст сухої речовини, % – 7, загального цукру, % – 5,5.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Морква *Daucus carota* L.

Заявка № 17109005 Назва сорту: Руфіна **Заявник (код):** 2200 2201 **Власник сорту (код):** 2200 2201

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 02.12.2020

Свідцтво про державну реєстрацію № 200974

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Листки: розетка за шириною	вузька	3	
2	Листок: положення	горизонтальне	5	
3	Листок: за довжиною (включаючи черешок)	довгий	7	
4	Листок: розсіченість	тонка	3	
5	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
6	Листок: антоціанове забарвлення черешка	наявне	9	
7	Коренеплід: за довжиною	довгий	7	
8	Коренеплід: за шириною	середній	5	
9	Коренеплід: відношення довжина/ширина	середнє	5	
10	Коренеплід: форма позовжнього розрізу	від вузькотрикутної до вузьковидовженої	5	
11	Сорти оцінені за ознаками 7, 8, 10. Коренеплід: тенденція до кінчної форми	сильна	7	
12	Коренеплід: форма плеча	плеската	1	
13	Коренеплід: кінчик (за повного розвитку)	ледь загострений	2	
14	Коренеплід: забарвлення поверхні	оранжеве	3	
15	За винятком сортів із білим зовнішнім забарвленням коренеплоду. Коренеплід: інтенсивність забарвлення поверхні	сильна	7	
16	Коренеплід: антоціанове забарвлення поверхні плеча	наявне	9	
17	Коренеплід: площа зеленого забарвлення поверхні плеча	мала	3	
18	Коренеплід: борошенчастість поверхні	середня	5	
19	Коренеплід: діаметр серцевини відносно загального діаметра	великий	7	
20	Коренеплід: забарвлення серцевини	оранжеве	3	
21	За винятком сортів із білою серцевиною. Коренеплід: інтенсивність забарвлення серцевини	помірна	5	
22	Коренеплід: забарвлення флоєми	оранжеве	3	
23	За винятком сортів із білою флоємою. Коренеплід: інтенсивність забарвлення флоєми	помірна	5	
24	Коренеплід: забарвлення серцевини порівняно із забарвленням флоєми	однакове	2	
25	Коренеплід: інтенсивність зеленого забарвлення внутрішньої частини (у позовжньому розрізі)	слабка	3	
26	Коренеплід: надземна частина	відсутня або дуже мала	1	
27	Тільки сорти з тупими кінчиками. Коренеплід: час розвитку заокругленого кінчика	ознака не визначається	0	
28	Коренеплід: час забарвлення кінчика в позовжньому розрізі	середній	5	
29	Рослина: тенденція до стрілкування	відсутня або дуже слабка	1	
30	Рослина: висота першого зонтика під час його цвітіння	ознака не визначалась	0	
31	Рослина: частка рослин з чоловічою стерильністю	велика	3	
32	Рослина: тип чоловічої стерильності	пелюсткові пиляки	2	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна врожайність, т/га – 54. Тривалість періоду до досягання, діб – 80. Стійкість до хвороб, балів (1–9): гниль суха – 8, альтернаріоз – 6, гниль біла – 7, гниль мокра бактеріальна – 7. Вміст сухої речовини, % – 10,3, загального цукру, % – 9,3.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Огірок посівний *Cucumis sativus* L.

Заявка № 18110014 Назва сорту: Бридж **Заявник (код):** 1730 **Власник сорту (код):** 1730

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 20.11.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200902

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Сім'ядолі: гіркота	відсутня	1	
2	Рослина: тип росту	детермінантний	1	
3	Рослина: загальна довжина перших 15 міжвузлів	коротка	3	
4	Листкова пластинка: положення	горизонтальне	2	
5	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
6	Листкова пластинка: відношення довжина апікальної лопаті / довжина пластинки	помірне	5	
7	Листкова пластинка: форма апікальної лопаті	прямокутна	2	
8	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
9	Листкова пластинка: пухирчатість	слабка	3	
10	Листок: хвилястість краю	відсутня або слабка	1	
11	Листкова пластинка: зубчастість краю	слабка	3	
12	Час розвитку жіночих квіток (80% рослин з щонайменше однією жіночою квіткою)	ранній	3	
13	Рослина: виявлення статі	гіноєційність	3	
14	Рослина: кількість жіночих квіток на вузлі	переважно 1	1	
15	Зав'язь: забарвлення зовнішнього покриву	біле	1	
16	Партенокарпія	наявна	9	
17	Плід: за довжиною	середній	5	
18	Плід: діаметр	середній	5	
19	Плід: відношення довжина/діаметр	середнє	5	
20	Плід: відношення діаметра серцевини до діаметра плоду	середнє	5	
21	Плід: форма поперечного перерізу	від округлої до кутастої	2	
22	Плід: форма основи	тупа	3	
23	Лише для сортів із шийкою. Плід: шийка за довжиною	ознака не визначається	0	
24	Плід: форма верхівки	округла	3	
25	Плід: основне забарвлення шкірки у фазі технічної стиглості	зелене	3	
26	За винятком білоплідних сортів. Плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (як для 25)	сильна	7	
27	Плід: ребристість	відсутня або слабка	1	
28	Плід: борозенки	відсутні	1	
29	Плід: зморшкуватість	наявна	9	
30	Плід: ступінь зморшкуватості	слабкий	3	
31	Плід: тип покриву	лише шипики	3	
32	Плід: покрив за щільністю	помірний	5	
33	Лише сорти з білою зав'яззю (ozn. 15). Плід: забарвлення зовнішнього покриву	біле	1	
34	Плід: горбочки	наявні	9	
35	Плід: розмір горбочків	малий	3	
36	Плід: смужки за довжиною	короткі	3	
37	Плід: плями	наявні	9	
38	Плід: характер поширення плям	рівномірно поширені	3	
39	Плід: довжина плям відносно довжини плоду	1/2 довжини	2	
40	Плід: щільність плям	помірної щільності	5	
41	Плід: наліт	помірний	5	
42	Плід: плодоніжка за довжиною	середня	5	
43	Плід: основне забарвлення шкірки у фазі фізіологічної стиглості	жовте	2	
44	Стійкість проти <i>Cladosporium cucumerinum</i>	ознака не визначалась	0	
45	Стійкість проти звичайної мозаїки огірка (<i>Cucumis Mosaic Virus (CMV)</i>)	ознака не визначалась	0	
46	Стійкість проти борошнистої роси (<i>Podosphaera xanthii</i>)	ознака не визначалась	0	
47	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	ознака не визначалась	0	
48	Стійкість проти бурої плямистості (<i>Corynespora melonis</i>)	ознака не визначалась	0	
49	Стійкість проти вірусу пожовтіння судин огірка (<i>CVYV</i>)	ознака не визначалась	0	
50	Стійкість проти вірусу зеленої крапчастої мозаїки огірка (<i>Cucumber Green Mottle Mosaic Virus (CGMMV)</i>)	ознака не визначалась	0	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 128,3. Вміст сухої речовини в плоді, % – 3. Тривалість періоду від повних сходів до початку споживчої стиглості, діб – 45. Тривалість періоду плодоношення, діб – 65.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Огірок посівний *Cucumis sativus* L.

Заявка № 18110002 Назва сорту: Джокер Заявник (код): 2485 2200 Власник сорту (код): 2485 2200

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 02.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200975

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Сім'ядолі: гіркота	відсутня	1	
2	Рослина: тип росту	детермінантний	1	
3	Рослина: загальна довжина перших 15 міжвузлів	середня	5	
4	Листкова пластинка: положення	горизонтальне	2	
5	Листкова пластинка: за довжиною	коротка	3	
6	Листкова пластинка: відношення довжина апікальної лопаті / довжина пластинки	мале	3	
7	Листкова пластинка: форма апікальної лопаті	прямокутна	2	
8	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	темна	7	
9	Листкова пластинка: пухирчатість	помірна	5	
10	Листок: хвилястість краю	помірна	2	
11	Листкова пластинка: зубчастість краю	слабка	3	
12	Час розвитку жіночих квіток (80% рослин з щонайменше однією жіночою квіткою)	ранній	3	
13	Рослина: виявлення статі	субгіномоноєційність	2	
14	Рослина: кількість жіночих квіток на вузлі	переважно 1	1	
15	Зав'язь: забарвлення зовнішнього покриву	біле	1	
16	Партенокарпія	наявна	9	
17	Плід: за довжиною	середній	5	
18	Плід: діаметр	середній	5	
19	Плід: відношення довжина/діаметр	середнє	5	
20	Плід: відношення діаметра серцевини до діаметра плоду	середнє	5	
21	Плід: форма поперечного перерізу	округла	1	
22	Плід: форма основи	тупа	3	
23	Лише для сортів із шийкою. Плід: шийка за довжиною	ознака не визначається	0	
24	Плід: форма верхівки	округла	3	
25	Плід: основне забарвлення шкірки у фазі технічної стиглості	зелене	3	
26	За винятком білоплідних сортів. Плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (як для 25)	помірна	5	
27	Плід: ребристість	помірна	2	
28	Плід: борозенки	наявні	9	
29	Плід: зморшкуватість	наявна	9	
30	Плід: ступінь зморшкуватості	слабкий	3	
31	Плід: тип покриву	лише шипики	3	
32	Плід: покрив за щільністю	щільний	7	
33	Лише сорти з білою зав'яззю (ozn. 15). Плід: забарвлення зовнішнього покриву	біле	1	
34	Плід: горбочки	наявні	9	
35	Плід: розмір горбочків	середній	5	
36	Плід: смужки за довжиною	короткі	3	
37	Плід: плями	наявні	9	
38	Плід: характер поширення плям	переважно смугами	2	
39	Плід: довжина плям відносно довжини плоду	виключаючи місце навколо плодоніжки	4	
40	Плід: щільність плям	щільна	7	
41	Плід: наліт	слабкий	3	
42	Плід: плодоніжка за довжиною	середня	5	
43	Плід: основне забарвлення шкірки у фазі фізіологічної стиглості	жовте	2	
44	Стійкість проти <i>Cladosporium cucumerinum</i>	ознака не визначалась	0	
45	Стійкість проти звичайної мозаїки огірка (<i>Cucumis Mosaic Virus (CMV)</i>)	ознака не визначалась	0	
46	Стійкість проти борошнистої роси (<i>Podosphaera xanthii</i>)	ознака не визначалась	0	
47	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	ознака не визначалась	0	
48	Стійкість проти бурі плямистості (<i>Corynespora melonis</i>)	ознака не визначалась	0	
49	Стійкість проти вірусу пожовтіння судин огірка (<i>CVYV</i>)	ознака не визначалась	0	
50	Стійкість проти вірусу зеленої крапчастої мозаїки огірка (<i>Cucumber Green Mottle Mosaic Virus (CGMMV)</i>)	ознака не визначалась	0	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 70. Вміст сухої речовини в плоді, % – 4,7. Тривалість періоду від повних сходів до початку споживчої стиглості, дбб – 45. Тривалість періоду плодоношення, дбб – 55.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Огірок посівний *Cucumis sativus* L.

Заявка № 18110003 **Назва сорту:** Джуніор **Заявник (код):** 2485 **2200** **Власник сорту (код):** 2485 **2200**

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 02.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200976

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Сім'ядолі: гіркота	відсутня	1	
2	Рослина: тип росту	детермінантний	1	
3	Рослина: загальна довжина перших 15 міжвузлів	середня	5	
4	Листкова пластинка: положення	горизонтальне	2	
5	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
6	Листкова пластинка: відношення довжина апікальної лопаті / довжина пластинки	велике	7	
7	Листкова пластинка: форма апікальної лопаті	прямокутна	2	
8	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
9	Листкова пластинка: пухирчатість	помірна	5	
10	Листок: хвилястість краю	відсутня або слабка	1	
11	Листкова пластинка: зубчастість краю	слабка	3	
12	Час розвитку жіночих квіток (80% рослин з щонайменше однією жіночою квіткою)	ранній	3	
13	Рослина: виявлення статі	гіноєційність	3	
14	Рослина: кількість жіночих квіток на вузлі	переважно 1	1	
15	Зав'язь: забарвлення зовнішнього покриву	біле	1	
16	Партенокарпія	наявна	9	
17	Плід: за довжиною	середній	5	
18	Плід: діаметр	великий	7	
19	Плід: відношення довжина/діаметр	середнє	5	
20	Плід: відношення діаметра серцевини до діаметра плоду	середнє	5	
21	Плід: форма поперечного перерізу	округла	1	
22	Плід: форма основи	тупа	3	
23	Лише для сортів із шийкою. Плід: шийка за довжиною	ознака не визначається	0	
24	Плід: форма верхівки	округла	3	
25	Плід: основне забарвлення шкірки у фазі технічної стиглості	зелене	3	
26	За винятком білоплідних сортів. Плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (як для 25)	помірна	5	
27	Плід: ребристість	помірна	2	
28	Плід: борозенки	відсутні	1	
29	Плід: зморшкуватість	наявна	9	
30	Плід: ступінь зморшкуватості	дуже слабкий	1	
31	Плід: тип покриву	лише шипики	3	
32	Плід: покрив за щільністю	помірний	5	
33	Лише сорти з білою зав'яззю (ozn. 15). Плід: забарвлення зовнішнього покриву	біле	1	
34	Плід: горбочки	наявні	9	
35	Плід: розмір горбочків	малий	3	
36	Плід: смужки за довжиною	короткі	3	
37	Плід: плями	наявні	9	
38	Плід: характер поширення плям	рівномірно поширені	3	
39	Плід: довжина плям відносно довжини плоду	1/2 довжини	2	
40	Плід: щільність плям	нещільна	3	
41	Плід: наліт	слабкий	3	
42	Плід: плодоніжка за довжиною	середня	5	
43	Плід: основне забарвлення шкірки у фазі фізіологічної стиглості	жовте	2	
44	Стійкість проти <i>Cladosporium cucumerinum</i>	ознака не визначалась	0	
45	Стійкість проти звичайної мозаїки огірка (<i>Cucumis Mosaic Virus</i> (CMV))	ознака не визначалась	0	
46	Стійкість проти борошнистої роси (<i>Podosphaera xanthii</i>)	ознака не визначалась	0	
47	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	ознака не визначалась	0	
48	Стійкість проти бурої плямистості (<i>Corynespora melonis</i>)	ознака не визначалась	0	
49	Стійкість проти вірусу пожовтіння судин огірка (CVYV)	ознака не визначалась	0	
50	Стійкість проти вірусу зеленої крапчастої мозаїки огірка (<i>Cucumber Green Mottle Mosaic Virus</i>) (CGMMV)	ознака не визначалась	0	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 65. Вміст сухої речовини в плоді, % – 4,8. Тривалість періоду від повних сходів до початку споживчої стиглості, діб – 45. Тривалість періоду плодоношення, діб – 50.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Огірок посівний *Cucumis sativus* L.

Заявка № 15110011 Назва сорту: Сармат **Заявник (код):** 1708 **Власник сорту (код):** 1708

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.08.2020 **Патент №** 200245

Дата пріоритету: 03.11.2015

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.10.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200816

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Сім'ядолі: гіркота	наявна	9	
2	Рослина: тип росту	індетермінантний	2	
3	Рослина: загальна довжина перших 15 міжвузлів	середня	5	
4	Листкова пластинка: положення	поникле	3	
5	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	до великої
6	Листкова пластинка: відношення довжина апікальної лопаті / довжина пластинки	помірне	5	
7	Листкова пластинка: форма апікальної лопаті	прямокутна	2	
8	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	світла	3	
9	Листкова пластинка: пухирчатість	слабка	3	
10	Листок: хвилястість краю	помірна	2	
11	Листкова пластинка: зубчастість краю	слабка	3	
12	Час розвитку жіночих квіток (80% рослин з щонайменше однією жіночою квіткою)	середній	5	
13	Рослина: виявлення статі	моноєційність	1	
14	Рослина: кількість жіночих квіток на вузлі	переважно 1	1	
15	Зав'язь: забарвлення зовнішнього покриву	біле	1	
16	Партенокарпія	відсутня	1	
17	Плід: за довжиною	середній	5	
18	Плід: діаметр	середній	5	до великого
19	Плід: відношення довжина/діаметр	мале	3	до середнього
20	Плід: відношення діаметра серцевини до діаметра плоду	середнє	5	
21	Плід: форма поперечного перерізу	від округлої до кутастої	2	
22	Плід: форма основи	тупа	3	
23	Лише для сортів із шийкою. Плід: шийка за довжиною	ознака не визначається	0	
24	Плід: форма верхівки	тупа	2	
25	Плід: основне забарвлення шкірки у фазі технічної стиглості	зелене	3	
26	За винятком білоплідних сортів. Плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (як для 25)	слабка	3	
27	Плід: ребристість	помірна	2	
28	Плід: борозенки	відсутні	1	
29	Плід: зморшкуватість	наявна	9	
30	Плід: ступінь зморшкуватості	слабкий	3	
31	Плід: тип покриву	лише шипики	3	
32	Плід: покрив за щільністю	нещільний	3	
33	Лише сорти з білою зав'яззю (озн. 15). Плід: забарвлення зовнішнього покриву	біле	1	
34	Плід: горбочки	наявні	9	
35	Плід: розмір горбочків	великий	7	
36	Плід: смужки за довжиною	довгі	7	
37	Плід: плями	наявні	9	
38	Плід: характер поширення плям	рівномірно поширені	3	
39	Плід: довжина плям відносно довжини плоду	виключаючи місце навколо плдоніжки	4	
40	Плід: щільність плям	щільна	7	
41	Плід: наліт	слабкий	3	
42	Плід: плдоніжка за довжиною	середня	5	
43	Плід: основне забарвлення шкірки у фазі фізіологічної стиглості	оранжеве	4	
44	Стійкість проти <i>Cladosporium cucumerinum</i>	ознака не визначалась	0	
45	Стійкість проти звичайної мозаїки огірка (<i>Cucumis Mosaic Virus (CMV)</i>)	ознака не визначалась	0	
46	Стійкість проти борошнистої роси (<i>Podosphaera xanthii</i>)	ознака не визначалась	0	
47	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	ознака не визначалась	0	
48	Стійкість проти бурі плямистості (<i>Corynespora melonis</i>)	ознака не визначалась	0	
49	Стійкість проти вірусу пожовтіння судин огірка (<i>CVYV</i>)	ознака не визначалась	0	
50	Стійкість проти вірусу зеленої крапчастої мозаїки огірка (<i>Cucumber Green Mottle Mosaic Virus (CGMMV)</i>)	ознака не визначалась	0	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність – 42,2 т/га.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Перець однорічний (солодкий) *Capsicum annuum* L.

Заявка № 19113007 Назва сорту: Даціана **Заявник (код):** 2659 **Власник сорту (код):** 2659

Дата пріоритету: 27.12.2019

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 20.10.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200817

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилля	наявне	9	
2	Рослина: габітус	прямий	1	
3	Рослина: за довжиною стебла	довга	7	
4	Рослина: укорочені міжвузля (у верхній частині)	відсутні	1	
5	Тільки для сортів з укороченими міжвузлями. Рослина: кількість міжвузлів між першою квіткою та укороченими міжвузлями	ознака не визначається	0	
6	Тільки для сортів без укорочених міжвузлів. Рослина: міжвузля за довжиною (на пагонах I-го порядку)	дуже довгі	9	
7	Рослина: антоціанове забарвлення вузлів	наявне	9	
8	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення вузлів	помірна	5	
9	Стебло: опушення вузлів	слабке	3	
10	Рослина: за висотою	дуже висока	9	
11	Листок: пластинка за довжиною	дуже довга	9	
12	Листок: пластинка за шириною	широка	7	
13	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
14	Листок: форма	ланцетна	1	
15	Листок: хвилястість краю	слабка	3	
16	Листок: пухирчастість	слабка	3	
17	Листок: форма поперечного перерізу	увігнута	3	
18	Листок: глянуватість	слабка	3	
19	Квітконіжка: положення	напівпонижле	2	
20	Квітка: антоціанове забарвлення пелюсток	наявне	9	
21	Плід: забарвлення (перед досяганням)	жовтувате	2	
22	Плід: інтенсивність забарвлення (перед досяганням)	слабка	3	
23	Плід: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
24	Плід: положення	понижле	3	
25	Плід: за довжиною	дуже довгий	9	
26	Плід: діаметр	дуже великий	9	
27	Плід: відношення довжина/діаметр	велике	7	
28	Плід: форма поздовжнього розрізу	прямокутна	5	
29	Плід: форма поперечного перерізу (на рівні прикріплення насіння) базальної частини	округла	3	
30	Плід: хвилястість перикарпію в базальній частині	сильна	7	
31	Плід: хвилястість перикарпію (за винятком базальної частини)	слабка	3	
32	Плід: структура поверхні	гладенька або злегка зморшкувата	1	
33	Плід: забарвлення (за досягання)	жовте	1	
34	Плід: інтенсивність забарвлення (за досягання)	помірна	5	
35	Плід: глянуватість	сильна	7	
36	Плід: порожнина в плодоніжці	наявна	9	
37	Плід: порожнина в плодоніжці за глибиною	середня	5	
38	Плід: форма верхівки	заокруглена	3	
39	Плід: міждольні канавки за глибиною	глибокі	7	
40	Плід: кількість долей	три-чотири	4	
41	Плід: м'якоть за товщиною	середня	5	
42	Плодоніжка: за довжиною	дуже довга	9	
43	Плодоніжка: за товщиною	товста	7	
44	Чашечка: зовнішній вигляд	необгортаюча	1	
45	Плід: капсицин у плаценті	відсутній	1	
46	Час початку цвітіння (перша квітка на другому квітковому вузлі)	ранній	3	
47	Час досягання	дуже ранній	1	
48,1	Стійкість проти Tobamovirus: Штам збудника 0 (Tobacco MosaicVirus (0))	наявна	9	
48,2	Стійкість проти Tobamovirus: Штам збудника 1-2 (Tomato MosaicVirus (1-2))	відсутня	1	
48,3	Стійкість проти Tobamovirus: Штам збудника 1-2-3 (Pepper Mild Mottle Virus (1-2-3))	відсутня	1	
49,1	Стійкість проти Potato Virus Y (PVY): Штами збудника 0, 1, 1-2	відсутня	1	
49,2	Стійкість до Potato Virus: Патотип 1	ознака не визначалась	0	
49,3	Стійкість до Potato Virus: Патотип 1-2	ознака не визначалась	0	
50	Стійкість проти Phytophthora capsici	ознака не визначалась	0	
51	Стійкість проти Cucumber Mosaic Virus (CMV)	ознака не визначалась	0	
52	Стійкість проти Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV)	ознака не визначалась	0	
53	Стійкість проти Xanthomonas campestris pv. vesicatoria	ознака не визначалась	0	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна врожайність, т/га – 60. Тривалість періоду до досягання, діб – 65. Товщина стінки плоду, мм – 5. Середня маса плоду, г – 140. Вміст вітаміну С, мг/100 г – 110, загального цукру, % – 8,5, клітковини, % – 2, сухої речовини, % – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3Гр.

Вид: Перець однорічний (солодкий) *Capsicum annuum* L.

Заявка № 16113001 Назва сорту: Любаша **Заявник (код):** 1781 **Власник сорту (код):** 1781

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 10.12.2020 **Патент №** 200781

Дата пріоритету: 16.02.2016

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 10.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201791

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилія	наявне	9	
2	Рослина: габітус	напівпрямий	2	
3	Рослина: за довжиною стебла	середня	5	
4	Рослина: укорочені міжвузля (у верхній частині)	відсутні	1	
5	Тільки для сортів з укороченими міжвузлями. Рослина: кількість міжвузлів між першою квіткою та укороченими міжвузлями	ознака не визначається	0	
6	Тільки для сортів без укорочених міжвузлів. Рослина: міжвузля за довжиною (на пагонах I-го порядку)	середні	5	
7	Рослина: антоціанове забарвлення вузлів	наявне	9	
8	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення вузлів	помірна	5	
9	Стебло: опушення вузлів	слабке	3	
10	Рослина: за висотою	низька	3	
11	Листок: пластинка за довжиною	довга	7	
12	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
13	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
14	Листок: форма	овальна	2	
15	Листок: хвилястість краю	помірна	5	
16	Листок: пухирчастість	помірна	5	
17	Листок: форма поперечного перерізу	увігнута	3	
18	Листок: глясватість	помірна	5	
19	Квітконіжка: положення	поникле	3	
20	Квітка: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє	1	
21	Плід: забарвлення (перед досяганням)	зеленувато-біле	1	
22	Плід: інтенсивність забарвлення (перед досяганням)	слабка	3	
23	Плід: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
24	Плід: положення	поникле	3	
25	Плід: за довжиною	середній	5	
26	Плід: діаметр	середній	5	
27	Плід: відношення довжина/діаметр	середнє	5	
28	Плід: форма поздовжнього розрізу	трикутна	7	
29	Плід: форма поперечного перерізу (на рівні прикріплення насіння) базальної частини	округла	3	
30	Плід: хвилястість перикарпію в базальній частині	відсутня або дуже слабка	1	
31	Плід: хвилястість перикарпію (за винятком базальної частини)	відсутня або дуже слабка	1	
32	Плід: структура поверхні	гладенька або злегка зморшувата	1	
33	Плід: забарвлення (за досягання)	червоне	3	
34	Плід: інтенсивність забарвлення (за досягання)	помірна	5	
35	Плід: глясватість	помірна	5	
36	Плід: порожнина в плодоніжці	наявна	9	
37	Плід: порожнина в плодоніжці за глибиною	мілка	3	
38	Плід: форма верхівки	загострена	2	
39	Плід: міждольні канавки за глибиною	мілкі	3	
40	Плід: кількість долей	три-чотири	4	
41	Плід: м'якоть за товщиною	середня	5	
42	Плодоніжка: за довжиною	коротка	3	
43	Плодоніжка: за товщиною	середня	5	
44	Чашечка: зовнішній вигляд	необгортаюча	1	
45	Плід: капсулин у плаценті	відсутній	1	
46	Час початку цвітіння (перша квітка на другому квітковому вузлі)	середній	5	
47	Час досягання	середній	5	
48,1	Стійкість проти Tobamovirus: Штам збудника 0 (Tobacco MosaicVirus (0))	ознака не визначалась	0	
48,2	Стійкість проти Tobamovirus: Штам збудника 1-2 (Tomato MosaicVirus (1-2))	ознака не визначалась	0	
48,3	Стійкість проти Tobamovirus: Штам збудника 1-2-3 (Pepper Mild Mottle Virus (1-2-3))	ознака не визначалась	0	
49,1	Стійкість проти Potato Virus Y (PVY): Штами збудника 0, 1, 1-2	ознака не визначалась	0	
49,2	Стійкість до Potato Virus: Патотип 1	ознака не визначалась	0	
49,3	Стійкість до Potato Virus: Патотип 1-2	ознака не визначалась	0	
50	Стійкість проти Phytophthora capsici	ознака не визначалась	0	
51	Стійкість проти Cucumber Mosaic Virus (CMV)	ознака не визначалась	0	
52	Стійкість проти Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV)	ознака не визначалась	0	
53	Стійкість проти Xanthomonas campestris pv. vesicatoria	ознака не визначалась	0	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна врожайність, т/га – 42,2. Товщина стінки плоду, мм – 7. Середня маса плоду, г – 82. Вміст вітаміну С, мг/100 г – 133,1, загального цукру, % – 3,9, клітковини, % – 1,5, сухої речовини, % – 6,8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП, 3Гр.

Вид: Перець однорічний (солодкий) *Capsicum annuum* L.

Заявка № 19113008 Назва сорту: Напока **Заявник (код):** 2659 **Власник сорту (код):** 2659

Дата пріоритету: 27.12.2019

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 20.10.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200818

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилля	наявне	9	
2	Рослина: габітус	напівпрямий	2	
3	Рослина: за довжиною стебла	довга	7	
4	Рослина: укорочені міжвузля (у верхній частині)	відсутні	1	
5	Тільки для сортів з укороченими міжвузлями. Рослина: кількість міжвузлів між першою квіткою та укороченими міжвузлями	ознака не визначається	0	
6	Тільки для сортів без укорочених міжвузлів. Рослина: міжвузля за довжиною (на пагонах I-го порядку)	довгі	7	
7	Рослина: антоціанове забарвлення вузлів	наявне	9	
8	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення вузлів	помірна	5	
9	Стебло: опушення вузлів	слабке	3	
10	Рослина: за висотою	дуже висока	9	
11	Листок: пластинка за довжиною	дуже довга	9	
12	Листок: пластинка за шириною	широка	7	
13	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	дуже сильна	9	
14	Листок: форма	овальна	2	
15	Листок: хвилястість краю	слабка	3	
16	Листок: пухирчастість	слабка	3	
17	Листок: форма поперечного перерізу	увігнута	3	
18	Листок: глянуватість	слабка	3	
19	Квітконіжка: положення	напівпоникле	2	
20	Квітка: антоціанове забарвлення пелюсток	наявне	9	
21	Плід: забарвлення (перед досяганням)	зелене	3	
22	Плід: інтенсивність забарвлення (перед досяганням)	слабка	3	
23	Плід: антоціанове забарвлення	наявне	9	
24	Плід: положення	поникле	3	
25	Плід: за довжиною	довгий	7	
26	Плід: діаметр	великий	7	
27	Плід: відношення довжина/діаметр	велике	7	
28	Плід: форма поперечного розрізу	трикутна	7	
29	Плід: форма поперечного перерізу (на рівні прикріплення насіння) базальної частини	еліптична	1	
30	Плід: хвилястість перикарпію в базальній частині	помірна	5	
31	Плід: хвилястість перикарпію (за винятком базальної частини)	слабка	3	
32	Плід: структура поверхні	гладенька або злегка зморшувата	1	
33	Плід: забарвлення (за досяганням)	червоне	3	
34	Плід: інтенсивність забарвлення (за досяганням)	сильна	7	
35	Плід: глянуватість	сильна	7	
36	Плід: порожнина в плодоніжці	наявна	9	
37	Плід: порожнина в плодоніжці за глибиною	глибока	7	
38	Плід: форма верхівки	загострена	2	
39	Плід: міждольні канавки за глибиною	мілкі	3	
40	Плід: кількість долей	переважно дві	1	
41	Плід: м'якість за товщиною	тонка	3	
42	Плодоніжка: за довжиною	дуже довга	9	
43	Плодоніжка: за товщиною	дуже товста	9	
44	Чашечка: зовнішній вигляд	необгортаюча	1	
45	Плід: капсицин у плаценті	відсутній	1	
46	Час початку цвітіння (перша квітка на другому квітковому вузлі)	середній	5	
47	Час досягання	середній	5	
48,1	Стійкість проти Tobamovirus: Штам збудника 0 (Tobacco MosaicVirus (0))	наявна	9	
48,2	Стійкість проти Tobamovirus: Штам збудника 1-2 (Tomato MosaicVirus (1-2))	відсутня	1	
48,3	Стійкість проти Tobamovirus: Штам збудника 1-2-3 (Pepper Mild Mottle Virus (1-2-3))	відсутня	1	
49,1	Стійкість проти Potato Virus Y (PVY): Штами збудника 0, 1, 1-2	відсутня	1	
49,2	Стійкість до Potato Virus: Патотип 1	ознака не визначалась	0	
49,3	Стійкість до Potato Virus: Патотип 1-2	ознака не визначалась	0	
50	Стійкість проти Phytophthora capsici	відсутня	1	
51	Стійкість проти Cucumber Mosaic Virus (CMV)	відсутня	1	
52	Стійкість проти Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV)	відсутня	1	
53	Стійкість проти Xanthomonas campestris pv. vesicatoria	відсутня	1	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна врожайність, т/га – 105. Тривалість періоду до досягання, дів – 80. Товщина стінки плоду, мм – 6. Середня маса плоду, г – 190. Вміст вітаміну С, мг/100 г – 105, загального цукру, % – 8, клітковини, % – 2, сухої речовини, % – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЗГр.

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.**Заявка № 19115028 Назва сорту:** АНТЕЛАІСІ **Заявник (код):** 1852 **Власник сорту (код):** 1852**Дата пріоритету:** 22.11.2019**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 27.10.2020**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200819****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилі	наявне	9	
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2	
3	Лише детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	ознака не визначається	0	
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	помірне	5	
5	Лише індетермінантні сорти. Стебло: міжвузля за довжиною між 1 і 4 суцвіттям	середнє	5	
6	Листок: положення (у середній третині рослини)	горизонтальне	5	
7	Листок: за довжиною	середній	5	
8	Листок: за шириною	середній	5	
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2	
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5	
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
12	Листок: глянуватість (як для 6)	помірна	5	
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	слабка	3	
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	середній	5	
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	горизонтальне	5	
16	Суцвіття: за типом	переважно не галузисте	1	
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1	
18	Квітка: опушення приймочки маточки	наявне	9	
19	Квітка: забарвлення	жовте	1	
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9	
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар. Квітконіжка: за довжиною (від відокремлюючого шару до чашечки)	середня	5	
22	Плід: розмір	великий	7	до дуже великого
23	Плід: відношення довжини до діаметра	мале	3	
24	Плід: форма поперечного розрізу	сплюснута	2	
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	помірна	5	
26	Плід: форма поперечного перерізу	не кругляста	1	
27	Плід: заглиблення біля плодоніжки	милке	3	
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	середній	5	
29	Плід: розмір квіткового рубця	малий	3	
30	Плід: форма кінця плоду	гостра	5	
31	Плід: розмір серцевини в поперечному перерізі	великий	7	
32	Плід: перикарпій за товщиною	товстий	7	
33	Плід: кількість насінневих камер	більше шести	5	
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1	
35	Плід: розмір зеленого плеча (як для 34)	ознака не визначається	0	
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0	
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (за винятком плеча) (перед досяганням)	помірна	5	
38	Плід: забарвлення (за досягання)	рожеве	4	
39	Плід: забарвлення м'якоті (за досягання)	рожеве	4	
40	Плід: за твердістю	помірний	5	
41	Плід: термін лежкості	короткий	3	
42	Час цвітіння	пізній	7	
43	Час досягання	пізній	7	
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	ознака не визначалась	0	
45	Наявність сріблястості	ознака не визначалась	0	
46	Стійкість проти <i>Meloidogyne incognita</i>	наявна	9	
47	Стійкість проти <i>Verticillium dahliae</i>	відсутня	1	
48	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i>	наявна	9	
49	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>radicis lycopersici</i>	наявна	9	
50	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> (<i>Fulvia fulva</i>)	ознака не визначалась	0	
51	Стійкість проти <i>Tomato Mosaic Virus</i>	ознака не визначалась	0	
52	Стійкість проти <i>Phytophthora infestans</i>	ознака не визначалась	0	
53	Стійкість проти <i>Pyrenochaeta lycopersici</i>	ознака не визначалась	0	
54	Стійкість проти <i>Stemphylium</i> spp.	наявна	9	
55	Стійкість проти <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i>	ознака не визначалась	0	
56	Стійкість проти <i>Ralstonia solanacearum</i>	ознака не визначалась	0	
57	Стійкість проти <i>Tomato Yellow Leaf Curl Virus</i>	наявна	9	
58	Стійкість проти <i>Tomato Spotted Wilt Virus</i>	відсутня	1	
59	Стійкість проти <i>Leveillula taurica</i>	ознака не визначалась	0	
60	Стійкість проти <i>Oidium lycopersicum</i>	ознака не визначалась	0	
61	Стійкість проти <i>Tomato torrado virus</i> (ToTV)	наявна	9	
62	Лише індетермінантні сорти. Рослина: за висотою	висока	7	
63	Плід: зелені смуги (перед досяганням)	відсутні	1	
64	Плід: глянуватість шкірки	помірна	2	
65	Плід: епідерміс	знебарвлений	1	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 200. Вміст каротину, мг% – 6, сухої речовини в плоді, % – 6, вітаміну С, мг% – 25, загального цукру, % – 5. Загальна кислотність, % – 0,5. Маса товарного плоду, г – 220. Період від повних сходів до початку дозрівання, діб – 68. Тривалість періоду плодоношення, діб – 86.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3Гр.

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.**Заявка № 19115006 Назва сорту:** Гонг **Заявник (код):** 2529 **Власник сорту (код):** 1418**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 30.11.2020**Свідцтво про державну реєстрацію № 200908****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилія	наявне	9	
2	Рослина: тип розвитку	детермінантний	1	
3	Лише детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	середня	5	
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	слабке	3	
5	Лише індетермінантні сорти. Стебло: міжвузля за довжиною між 1 і 4 суцвіттям	ознака не визначається	0	
6	Листок: положення (у середній третині рослини)	горизонтальне	5	
7	Листок: за довжиною	довгий	7	
8	Листок: за шириною	середній	5	
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2	
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5	
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
12	Листок: глянуватість (як для б)	слабка	3	
13	Листок: пухирчастість (як для б)	слабка	3	
14	Листок: розмір пухирів (як для б)	середній	5	
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	горизонтальне	5	
16	Суцвіття: за типом	переважно не галузисте	1	
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1	
18	Квітка: опушення приймочки маточки	відсутнє або дуже слабе	1	
19	Квітка: забарвлення	жовте	1	
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	відсутній	1	
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар. Квітконіжка: за довжиною (від відокремлюючого шару до чашечки)	ознака не визначається	0	
22	Плід: розмір	середній	5	
23	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє	5	
24	Плід: форма повздовжнього розрізу	кустаста (видовжена)	4	
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	слабка	3	
26	Плід: форма поперечного перерізу	кругляста	2	
27	Плід: заглиблення біля плодоніжки	мілке	3	
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	малий	3	
29	Плід: розмір квіткового рубця	дуже малий	1	
30	Плід: форма кінця плоду	від плескатої до гострої	4	
31	Плід: розмір серцевини в поперечному перерізі	малий	3	
32	Плід: перикарпій за товщиною	товстий	7	
33	Плід: кількість насінневих камер	дві-три	2	
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1	
35	Плід: розмір зеленого плеча (як для 34)	ознака не визначається	0	
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0	
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (за винятком плеча) (перед досяганням)	слабка	3	
38	Плід: забарвлення (за досягання)	червоне	5	
39	Плід: забарвлення м'якоті (за досягання)	червоне	5	
40	Плід: за твердістю	твердий	7	
41	Плід: термін лежкості	тривалий	7	
42	Час цвітіння	ранній	3	
43	Час досягання	середній	5	
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	середній	5	
45	Наявність сріблястості	ознака не визначалась	0	
46	Стійкість проти <i>Meloidogyne incognita</i>	наявна	9	
47	Стійкість проти <i>Verticillium dahliae</i>	наявна	9	
48	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i>	ознака не визначалась	0	
49	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>radicis lycopersici</i>	ознака не визначалась	0	
50	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> (<i>Fulvia fulva</i>)	ознака не визначалась	0	
51	Стійкість проти Tomato Mosaic Virus	відсутня	1	
52	Стійкість проти <i>Phytophthora infestans</i>	ознака не визначалась	0	
53	Стійкість проти <i>Pyrenochaeta lycopersici</i>	ознака не визначалась	0	
54	Стійкість проти <i>Stemphylium</i> spp.	ознака не визначалась	0	
55	Стійкість проти <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i>	ознака не визначалась	0	
56	Стійкість проти <i>Ralstonia solanacearum</i>	ознака не визначалась	0	
57	Стійкість проти Tomato Yellow Leaf Curl Virus	ознака не визначалась	0	
58	Стійкість проти Tomato Spotted Wilt Virus	ознака не визначалась	0	
59	Стійкість проти <i>Leveillula taurica</i>	ознака не визначалась	0	
60	Стійкість проти <i>Oidium lycopersicum</i>	ознака не визначалась	0	
61	Стійкість проти Tomato torrado virus (ToTV)	ознака не визначалась	0	
62	Лише індетермінантні сорти. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0	
63	Плід: зелені смуги (перед досяганням)	відсутні	1	
64	Плід: глянуватість шкірки	помірна	2	
65	Плід: епідерміс	жовтий	2	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 90. Вміст каротину, мг% – 7, вітаміну С, мг% – 22, загального цукру, % – 15. Загальна кислотність, % – 0,2. Маса товарного плоду, г – 80. Тривалість періоду плодоношення, діб – 25.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.**Заявка № 19115005 Назва сорту:** Едімар **Заявник (код):** 2529 **Власник сорту (код):** 1418**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 30.11.2020**Свідцтво про державну реєстрацію № 200907****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилія	наявне	9	
2	Рослина: тип розвитку	детермінантний	1	
3	Лише детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	середня	5	
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	відсутнє або дуже слабе	1	
5	Лише індетермінантні сорти. Стебло: міжвузля за довжиною між 1 і 4 суцвіттям	ознака не визначається	0	
6	Листок: положення (у середній третині рослини)	горизонтальне	5	
7	Листок: за довжиною	довгий	7	
8	Листок: за шириною	широкий	7	
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2	
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	великий	7	
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
12	Листок: глянуватість (як для б)	слабка	3	
13	Листок: пухирчастість (як для б)	помірна	5	
14	Листок: розмір пухирів (як для б)	малий	3	
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	піднесене	3	
16	Суцвіття: за типом	переважно не галузисте	1	
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1	
18	Квітка: опушення приймочки маточки	відсутнє або дуже слабе	1	
19	Квітка: забарвлення	жовте	1	
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	відсутній	1	
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар. Квітконіжка: за довжиною (від відокремлюючого шару до чашечки)	ознака не визначається	0	
22	Плід: розмір	середній	5	
23	Плід: відношення довжини до діаметра	мале	3	
24	Плід: форма повздовжнього розрізу	кустаста (видовжена)	4	
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	слабка	3	
26	Плід: форма поперечного перерізу	кругляста	2	
27	Плід: заглиблення біля плодоніжки	мілке	3	
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	середній	5	
29	Плід: розмір квіткового рубця	дуже малий	1	
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3	
31	Плід: розмір серцевини в поперечному перерізі	малий	3	
32	Плід: перикарпій за товщиною	товстий	7	
33	Плід: кількість насінневих камер	дві-три	2	
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1	
35	Плід: розмір зеленого плеча (як для 34)	ознака не визначається	0	
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0	
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (за винятком плеча) (перед досяганням)	слабка	3	
38	Плід: забарвлення (за досягання)	червоне	5	
39	Плід: забарвлення м'якоті (за досягання)	червоне	5	
40	Плід: за твердістю	помірний	5	
41	Плід: термін лежкості	тривалий	7	
42	Час цвітіння	ранній	3	
43	Час досягання	середній	5	
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	середній	5	
45	Наявність сріблястості	ознака не визначалась	0	
46	Стійкість проти <i>Meloidogyne incognita</i>	наявна	9	
47	Стійкість проти <i>Verticillium dahliae</i>	наявна	9	
48	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i>	ознака не визначалась	0	
49	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>radicis lycopersici</i>	ознака не визначалась	0	
50	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> (<i>Fulvia fulva</i>)	ознака не визначалась	0	
51	Стійкість проти Tomato Mosaic Virus	відсутня	1	
52	Стійкість проти <i>Phytophthora infestans</i>	ознака не визначалась	0	
53	Стійкість проти <i>Pyrenochaeta lycopersici</i>	ознака не визначалась	0	
54	Стійкість проти <i>Stemphylium</i> spp.	ознака не визначалась	0	
55	Стійкість проти <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i>	ознака не визначалась	0	
56	Стійкість проти <i>Ralstonia solanacearum</i>	ознака не визначалась	0	
57	Стійкість проти Tomato Yellow Leaf Curl Virus	ознака не визначалась	0	
58	Стійкість проти Tomato Spotted Wilt Virus	ознака не визначалась	0	
59	Стійкість проти <i>Leveillula taurica</i>	ознака не визначалась	0	
60	Стійкість проти <i>Oidium lycopersicum</i>	ознака не визначалась	0	
61	Стійкість проти Tomato torrado virus (ToTV)	ознака не визначалась	0	
62	Лише індетермінантні сорти. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0	
63	Плід: зелені смуги (перед досяганням)	відсутні	1	
64	Плід: глянуватість шкірки	помірна	2	
65	Плід: епідерміс	жовтий	2	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 105. Вміст каротину, мг% – 7, вітаміну С, мг% – 22, загального цукру, % – 15. Загальна кислотність, % – 0,2. Маса товарного плоду, г – 90. Тривалість періоду плодоношення, діб – 25.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.**Заявка № 19115033 Назва сорту:** МАКАН **Заявник (код):** 2020 **Власник сорту (код):** 2020**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 23.12.2020**Свідцтво про державну реєстрацію № 201795****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилія	наявне	9	
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2	
3	Лише детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	ознака не визначається	0	
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	слабке	3	
5	Лише індетермінантні сорти. Стебло: міжвузля за довжиною між 1 і 4 суцвіттям	середнє	5	
6	Листок: положення (у середній третині рослини)	горизонтальне	5	
7	Листок: за довжиною	середній	5	
8	Листок: за шириною	середній	5	
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2	
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5	
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
12	Листок: глянуватість (як для 6)	помірна	5	
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	слабка	3	
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	малий	3	
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	горизонтальне	5	
16	Суцвіття: за типом	переважно не галузисте	1	
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1	
18	Квітка: опушення приймочки маточки	наявне	9	
19	Квітка: забарвлення	жовте	1	
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9	
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар. Квітконіжка: за довжиною (від відокремлюючого шару до чашечки)	середня	5	
22	Плід: розмір	великий	7	
23	Плід: відношення довжини до діаметра	мале	3	
24	Плід: форма повздовжнього розрізу	сплюснута	2	
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	слабка	3	
26	Плід: форма поперечного перерізу	кругла	2	
27	Плід: заглиблення біля плодоніжки	відсутнє або дуже мілке	1	
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	середній	5	
29	Плід: розмір квіткового рубця	середній	5	
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3	
31	Плід: розмір серцевини в поперечному перерізі	середній	5	
32	Плід: перикарпій за товщиною	середній	5	
33	Плід: кількість насінневих камер	чотири, п'ять або шість	4	
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1	
35	Плід: розмір зеленого плеча (як для 34)	ознака не визначається	0	
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0	
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (за винятком плеча) (перед досяганням)	помірна	5	
38	Плід: забарвлення (за досягання)	рожеве	4	
39	Плід: забарвлення м'якоті (за досягання)	червоне	5	
40	Плід: за твердістю	твердий	7	
41	Плід: термін лежкості	помірний	5	
42	Час цвітіння	ранній	3	
43	Час досягання	ранній	3	
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	низький	3	
45	Наявність сріблястості	сприятливий	9	
46	Стійкість проти <i>Meloidogyne incognita</i>	наявна	9	
47	Стійкість проти <i>Verticillium dahliae</i>	наявна	9	
48	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i>	наявна	9	
49	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>radicis</i> <i>lycopersici</i>	відсутня	1	
50	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> (<i>Fulvia fulva</i>)	наявна	9	
51	Стійкість проти <i>Tomato Mosaic Virus</i>	наявна	9	
52	Стійкість проти <i>Phytophthora infestans</i>	наявна	9	
53	Стійкість проти <i>Pyrenochaeta lycopersici</i>	відсутня	1	
54	Стійкість проти <i>Stemphylium</i> spp.	наявна	9	
55	Стійкість проти <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i>	наявна	9	
56	Стійкість проти <i>Ralstonia solanacearum</i>	відсутня	1	
57	Стійкість проти <i>Tomato Yellow Leaf Curl Virus</i>	наявна	9	
58	Стійкість проти <i>Tomato Spotted Wilt Virus</i>	наявна	9	
59	Стійкість проти <i>Leveillula taurica</i>	відсутня	1	
60	Стійкість проти <i>Oidium lycopersicum</i>	наявна	9	
61	Стійкість проти <i>Tomato torrado virus</i> (ToTV)	наявна	9	
62	Лише індетермінантні сорти. Рослина: за висотою	низька	3	
63	Плід: зелені смуги (перед досяганням)	відсутні	1	
64	Плід: глянуватість шкірки	помірна	2	
65	Плід: епідерміс	знебарвлений	1	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 390. Вміст каротину, мг% – 1,3, сухої речовини в плоді, % – 5,5, вітаміну С, мг% – 19, загального цукру, % – 5,6. Загальна кислотність, % – 0,8. Маса товарного плоду, г – 300. Період від повних сходів до початку дозрівання, діб – 60.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3Гр.

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.**Заявка № 16115005 Назва сорту:** Севен **Заявник (код):** 1781 **Власник сорту (код):** 1781**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 10.12.2020 **Патент №** 200784**Дата пріоритету:** 16.02.2016**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 10.12.2020**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 201794**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилі	наявне	9	
2	Рослина: тип розвитку	детермінантний	1	
3	Лише детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	середня	5	
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	відсутнє або дуже слабке	1	
5	Лише індетермінантні сорти. Стебло: міжвузля за довжиною між 1 і 4 суцвіттям	ознака не визначається	0	
6	Листок: положення (у середній третині рослини)	напівпряме	3	
7	Листок: за довжиною	середній	5	
8	Листок: за шириною	середній	5	
9	Листок: за розсіченістю	перистий	1	
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	великий	7	
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
12	Листок: глянуватість (як для 6)	слабка	3	
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	помірна	5	
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	малий	3	
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	піднесене	3	
16	Суцвіття: за типом	переважно не галузисте	1	
17	Квітка: фасціяція (перша квітка суцвіття)	відсутня	1	
18	Квітка: опушення приймочки маточки	відсутнє або дуже слабке	1	
19	Квітка: забарвлення	жовте	1	
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9	
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар. Квітконіжка: за довжиною (від відокремлюючого шару до чашечки)	середня	5	
22	Плід: розмір	великий	7	
23	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє	5	
24	Плід: форма повздовжнього розрізу	сплюснута	2	
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	помірна	5	
26	Плід: форма поперечного перерізу	кругляста	2	
27	Плід: заглиблення біля плодоніжки	помірне	5	
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	великий	7	
29	Плід: розмір квіткового рубця	малий	3	
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3	
31	Плід: розмір серцевини в поперечному перерізі	дуже великий	9	
32	Плід: перикарпій за товщиною	середній	5	
33	Плід: кількість насіннєвих камер	чотири, п'ять або шість	4	
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1	
35	Плід: розмір зеленого плеча (як для 34)	ознака не визначається	0	
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0	
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (за винятком плеча) (перед досяганням)	слабка	3	
38	Плід: забарвлення (за досягання)	червоне	5	
39	Плід: забарвлення м'якоті (за досягання)	червоне	5	
40	Плід: за твердістю	помірний	5	
41	Плід: термін лежкості	помірний	5	
42	Час цвітіння	середній	5	
43	Час досягання	пізній	7	
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	середній	5	
45	Наявність сріблястості	сприятливий	9	
46	Стійкість проти <i>Meloidogyne incognita</i>	ознака не визначалась	0	
47	Стійкість проти <i>Verticillium dahliae</i>	ознака не визначалась	0	
48	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i>	ознака не визначалась	0	
49	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>radicis lycopersici</i>	ознака не визначалась	0	
50	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> (<i>Fulvia fulva</i>)	ознака не визначалась	0	
51	Стійкість проти <i>Tomato Mosaic Virus</i>	ознака не визначалась	0	
52	Стійкість проти <i>Phytophthora infestans</i>	ознака не визначалась	0	
53	Стійкість проти <i>Pyrenochaeta lycopersici</i>	ознака не визначалась	0	
54	Стійкість проти <i>Stemphylium</i> spp.	ознака не визначалась	0	
55	Стійкість проти <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i>	ознака не визначалась	0	
56	Стійкість проти <i>Ralstonia solanacearum</i>	ознака не визначалась	0	
57	Стійкість проти <i>Tomato Yellow Leaf Curl Virus</i>	ознака не визначалась	0	
58	Стійкість проти <i>Tomato Spotted Wilt Virus</i>	ознака не визначалась	0	
59	Стійкість проти <i>Leveillula taurica</i>	ознака не визначалась	0	
60	Стійкість проти <i>Oidium lycopersicum</i>	ознака не визначалась	0	
61	Стійкість проти <i>Tomato torrado virus</i> (ToTV)	ознака не визначалась	0	
62	Лише індетермінантні сорти. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0	
63	Плід: зелені смуги (перед досяганням)	відсутні	1	
64	Плід: глянуватість шкірки	помірна	2	
65	Плід: епідерміс	знебарвлений	1	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 87,7. Вміст сухої речовини в плоді, % – 5,9, вітаміну С, мг% – 25, загального цукру, % – 3,96. Загальна кислотність, % – 0,5. Маса товарного плоду, г – 130. Період від повних сходів до початку дозрівання, діб – 113.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.**Заявка № 16115004 Назва сорту:** Танок **Заявник (код):** 1781 **Власник сорту (код):** 1781**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 10.12.2020 **Патент №** 200783**Дата пріоритету:** 16.02.2016**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 10.12.2020**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 201793**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилі	наявне	9	
2	Рослина: тип розвитку	детермінантний	1	
3	Лише детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	середня	5	
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	відсутнє або дуже слабке	1	
5	Лише індетермінантні сорти. Стебло: міжвузля за довжиною між 1 і 4 суцвіттям	ознака не визначається	0	
6	Листок: положення (у середній третині рослини)	напівпоникле	7	
7	Листок: за довжиною	короткий	3	
8	Листок: за шириною	середній	5	
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2	
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5	
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
12	Листок: глянуватість (як для 6)	слабка	3	
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	слабка	3	
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	малий	3	
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	горизонтальне	5	
16	Суцвіття: за типом	переважно не галузисте	1	
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1	
18	Квітка: опушення приймочки маточки	відсутнє або дуже слабке	1	
19	Квітка: забарвлення	жовте	1	
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	відсутній	1	
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар. Квітконіжка: за довжиною (від відокремлюючого шару до чашечки)	ознака не визначається	0	
22	Плід: розмір	середній	5	
23	Плід: відношення довжини до діаметра	дуже велике	9	
24	Плід: форма повздовжнього розрізу	циліндрична	5	
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	відсутня або дуже слабка	1	
26	Плід: форма поперечного перерізу	кругляста	2	
27	Плід: заглиблення біля плодоніжки	мілке	3	
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	малий	3	
29	Плід: розмір квіткового рубця	дуже малий	1	
30	Плід: форма кінця плоду	гостра	5	
31	Плід: розмір серцевини в поперечному перерізі	дуже малий	1	
32	Плід: перикарпій за товщиною	середній	5	
33	Плід: кількість насіннєвих камер	дві-три	2	
34	Плід: зелене плече (перед достиганням)	відсутнє	1	
35	Плід: розмір зеленого плеча (як для 34)	ознака не визначається	0	
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед достиганням)	ознака не визначається	0	
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (за винятком плеча) (перед достиганням)	слабка	3	
38	Плід: забарвлення (за достигання)	червоне	5	
39	Плід: забарвлення м'якоті (за достигання)	червоне	5	
40	Плід: за твердістю	помірний	5	
41	Плід: термін лежкості	помірний	5	
42	Час цвітіння	середній	5	
43	Час достигання	ранній	3	
44	Плід: вміст сухої речовини (за достигання)	низький	3	
45	Наявність сріблястості	сприятливий	9	
46	Стійкість проти <i>Meloidogyne incognita</i>	ознака не визначалась	0	
47	Стійкість проти <i>Verticillium dahliae</i>	ознака не визначалась	0	
48	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i>	ознака не визначалась	0	
49	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>radicis lycopersici</i>	ознака не визначалась	0	
50	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> (<i>Fulvia fulva</i>)	ознака не визначалась	0	
51	Стійкість проти <i>Tomato Mosaic Virus</i>	ознака не визначалась	0	
52	Стійкість проти <i>Phytophthora infestans</i>	ознака не визначалась	0	
53	Стійкість проти <i>Pyrenochaeta lycopersici</i>	ознака не визначалась	0	
54	Стійкість проти <i>Stemphylium</i> spp.	ознака не визначалась	0	
55	Стійкість проти <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i>	ознака не визначалась	0	
56	Стійкість проти <i>Ralstonia solanacearum</i>	ознака не визначалась	0	
57	Стійкість проти <i>Tomato Yellow Leaf Curl Virus</i>	ознака не визначалась	0	
58	Стійкість проти <i>Tomato Spotted Wilt Virus</i>	ознака не визначалась	0	
59	Стійкість проти <i>Leveillula taurica</i>	ознака не визначалась	0	
60	Стійкість проти <i>Oidium lycopersicum</i>	ознака не визначалась	0	
61	Стійкість проти <i>Tomato torrado virus</i> (ToTV)	ознака не визначалась	0	
62	Лише індетермінантні сорти. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0	
63	Плід: зелені смуги (перед достиганням)	відсутні	1	
64	Плід: глянуватість шкірки	помірна	2	
65	Плід: епідерміс	жовтий	2	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 58. Вміст каротину, мг% – 1,2, сухої речовини в плоді, % – 4,8, вітаміну С, мг% – 21, загального цукру, % – 3,1. Загальна кислотність, % – 0,4. Маса товарного плоду, г – 71. Період від повних сходів до початку дозрівання, діб – 102. Тривалість періоду плодоношення, діб – 40.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.

Заявка № 19115004 Назва сорту: Фабер Заявник (код): 2529 Власник сорту (код): 1418

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 30.11.2020

Свідцтво про державну реєстрацію № 200906

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилі	наявне	9	
2	Рослина: тип розвитку	детермінантний	1	
3	Лише детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	мала	3	
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	відсутнє або дуже слабке	1	
5	Лише індетермінантні сорти. Стебло: міжвузля за довжиною між 1 і 4 суцвіттям	ознака не визначається	0	
6	Листок: положення (у середній третині рослини)	горизонтальне	5	
7	Листок: за довжиною	середній	5	
8	Листок: за шириною	середній	5	
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2	
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	великий	7	
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
12	Листок: глясуватість (як для б)	слабка	3	
13	Листок: пухирчастість (як для б)	помірна	5	
14	Листок: розмір пухирів (як для б)	середній	5	
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	піднесене	3	
16	Суцвіття: за типом	переважно не галузисте	1	
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1	
18	Квітка: опушення приймочки маточки	наявне	9	
19	Квітка: забарвлення	жовте	1	
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	відсутній	1	
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар. Квітконіжка: за довжиною (від відокремлюючого шару до чашечки)	ознака не визначається	0	
22	Плід: розмір	середній	5	
23	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє	5	
24	Плід: форма повздовжнього розрізу	куста (видовжена)	4	
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	слабка	3	
26	Плід: форма поперечного перерізу	кругла	2	
27	Плід: заглиблення біля плодоніжки	милке	3	
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	середній	5	
29	Плід: розмір квіткового рубця	дуже малий	1	
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3	
31	Плід: розмір серцевини в поперечному перерізі	малий	3	
32	Плід: перикарпій за товщиною	товстий	7	
33	Плід: кількість насіннєвих камер	дві-три	2	
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1	
35	Плід: розмір зеленого плеча (як для 34)	ознака не визначається	0	
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0	
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (за винятком плеча) (перед досяганням)	слабка	3	
38	Плід: забарвлення (за досягання)	червоне	5	
39	Плід: забарвлення м'якоті (за досягання)	червоне	5	
40	Плід: за твердістю	помірний	5	
41	Плід: термін лежкості	тривалий	7	
42	Час цвітіння	ранній	3	
43	Час досягання	ранній	3	
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	високий	7	
45	Наявність сріблястості	ознака не визначалась	0	
46	Стійкість проти <i>Meloidogyne incognita</i>	наявна	9	
47	Стійкість проти <i>Verticillium dahliae</i>	наявна	9	
48	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i>	наявна	9	
49	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>radicis lycopersici</i>	ознака не визначалась	0	
50	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> (<i>Fulvia fulva</i>)	ознака не визначалась	0	
51	Стійкість проти Tomato Mosaic Virus	відсутня	1	
52	Стійкість проти <i>Phytophthora infestans</i>	ознака не визначалась	0	
53	Стійкість проти <i>Pyrenochaeta lycopersici</i>	ознака не визначалась	0	
54	Стійкість проти <i>Stemphylium</i> spp.	ознака не визначалась	0	
55	Стійкість проти <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i>	ознака не визначалась	0	
56	Стійкість проти <i>Ralstonia solanacearum</i>	ознака не визначалась	0	
57	Стійкість проти Tomato Yellow Leaf Curl Virus	ознака не визначалась	0	
58	Стійкість проти Tomato Spotted Wilt Virus	ознака не визначалась	0	
59	Стійкість проти <i>Leveillula taurica</i>	ознака не визначалась	0	
60	Стійкість проти <i>Oidium lycopersicum</i>	ознака не визначалась	0	
61	Стійкість проти Tomato torrado virus (ToTV)	ознака не визначалась	0	
62	Лише індетермінантні сорти. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0	
63	Плід: зелені смуги (перед досяганням)	відсутні	1	
64	Плід: глясуватість шкірки	помірна	2	
65	Плід: епідерміс	жовтий	2	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 105. Вміст каротину, мг% – 7, вітаміну С, мг% – 25, загального цукру, % – 15. Загальна кислотність, % – 0,2. Маса товарного плоду, г – 80. Період від повних сходів до початку дозрівання, діб – 85. Тривалість періоду плодоношення, діб – 25.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.

Заявка № 16115002 Назва сорту: Янтарний богатир **Заявник (код):** 1781 **Власник сорту (код):** 1781

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 10.12.2020 **Патент № 200782**

Дата пріоритету: 16.02.2016

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 10.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201792

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилія	наявне	9	
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2	
3	Лише детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	ознака не визначається	0	
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	відсутнє або дуже слабке	1	
5	Лише індетермінантні сорти. Стебло: міжвузля за довжиною між 1 і 4 суцвіттям	середнє	5	
6	Листок: положення (у середній третині рослини)	напівпряме	3	
7	Листок: за довжиною	середній	5	
8	Листок: за шириною	середній	5	
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2	
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5	
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
12	Листок: глянуватість (як для 6)	слабка	3	
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	помірна	5	
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	малий	3	
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	піднесене	3	
16	Суцвіття: за типом	переважно не галузисте	1	
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1	
18	Квітка: опушення приймочки маточки	відсутнє або дуже слабке	1	
19	Квітка: забарвлення	жовте	1	
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9	
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар. Квітконіжка: за довжиною (від відокремлюючого шару до чашечки)	середня	5	
22	Плід: розмір	великий	7	
23	Плід: відношення довжини до діаметра	мале	3	
24	Плід: форма повздовжнього розрізу	сплюснута	2	
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	помірна	5	
26	Плід: форма поперечного перерізу	кругляста	2	
27	Плід: заглиблення біля плодоніжки	помірне	5	
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	великий	7	
29	Плід: розмір квіткового рубця	малий	3	
30	Плід: форма кінця плоду	від заглибленої до плескатої	2	
31	Плід: розмір серцевини в поперечному перерізі	дуже великий	9	
32	Плід: перикарпій за товщиною	середній	5	
33	Плід: кількість насінневих камер	чотири, п'ять або шість	4	
34	Плід: зелене плече (перед достиганням)	відсутнє	1	
35	Плід: розмір зеленого плеча (як для 34)	ознака не визначається	0	
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед достиганням)	ознака не визначається	0	
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (за винятком плеча) (перед достиганням)	слабка	3	
38	Плід: забарвлення (за достигання)	оранжеве	3	
39	Плід: забарвлення м'якоті (за достигання)	оранжеве	3	
40	Плід: за твердістю	помірний	5	
41	Плід: термін лежкості	помірний	5	
42	Час цвітіння	середній	5	
43	Час достигання	середній	5	
44	Плід: вміст сухої речовини (за достигання)	низький	3	
45	Наявність сріблястості	сприятливий	9	
46	Стійкість проти <i>Meloidogyne incognita</i>	ознака не визначалась	0	
47	Стійкість проти <i>Verticillium dahliae</i>	ознака не визначалась	0	
48	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i>	ознака не визначалась	0	
49	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>radicis lycopersici</i>	ознака не визначалась	0	
50	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> (<i>Fulvia fulva</i>)	ознака не визначалась	0	
51	Стійкість проти <i>Tomato Mosaic Virus</i>	ознака не визначалась	0	
52	Стійкість проти <i>Phytophthora infestans</i>	ознака не визначалась	0	
53	Стійкість проти <i>Pyrenochaeta lycopersici</i>	ознака не визначалась	0	
54	Стійкість проти <i>Stemphylium</i> spp.	ознака не визначалась	0	
55	Стійкість проти <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i>	ознака не визначалась	0	
56	Стійкість проти <i>Ralstonia solanacearum</i>	ознака не визначалась	0	
57	Стійкість проти <i>Tomato Yellow Leaf Curl Virus</i>	ознака не визначалась	0	
58	Стійкість проти <i>Tomato Spotted Wilt Virus</i>	ознака не визначалась	0	
59	Стійкість проти <i>Leveillula taurica</i>	ознака не визначалась	0	
60	Стійкість проти <i>Oidium lycopersicum</i>	ознака не визначалась	0	
61	Стійкість проти <i>Tomato torrado virus</i> (ToTV)	ознака не визначалась	0	
62	Лише індетермінантні сорти. Рослина: за висотою	висока	7	
63	Плід: зелені смуги (перед достиганням)	відсутні	1	
64	Плід: глянуватість шкірки	помірна	2	
65	Плід: епідерміс	жовтий	2	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 110,9. Вміст каротину, мг% – 1,01, вітаміну С, мг% – 19, загального цукру, % – 3,98. Загальна кислотність, % – 0,43. Маса товарного плоду, г – 150. Період від повних сходів до початку дозрівання, діб – 106. Тривалість періоду плодоношення, діб – 70.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Салат посівний листовий *Lactuca sativa* L. var. *secalina*

Заявка № 19120007 Назва сорту: Бартімер **Заявник (код):** 753 **Власник сорту (код):** 753

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 02.11.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200843

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насінина: забарвлення	чорне	3	
2	Сіянець: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
3	Сіянець: сім'ядолі за розміром (за повного розвитку)	середні	5	
4	Сіянець: форма сім'ядолей	еліптична	5	
5	Листок: положення у стадії 10-12 листків	напівпряме	3	
6	Листкова пластинка: за розсіченістю краю (як для 5)	нерозсічена	1	
7	Рослина: діаметр	середній	5	
8	Рослина: утворення головки	не утворює	1	
9	Тільки сорти із закритою головою. Головка: перекриття верхньої частини листків	ознака не визначається	0	
10	Головка: за щільністю	ознака не визначається	0	
11	Головка: розмір	ознака не визначається	0	
12	Лише для сортів маслянистоголовчастого типу у теплицях. Головка: закриття основи	ознака не визначається	0	
13	Головка: форма поздовжнього розрізу	ознака не визначається	0	
14	Листок: за товщиною	тонкий	3	
15	Листок: положення за збиральною стиглості (зовнішні листки у головчастого салату або сформовані листки для листового і стеблового салатів)	напівпряме	3	
16	Листок: форма	поперечно-вузькоеліптична	6	
17	Листок: форма верхівки	округла	3	
18	Листок: відтінок зеленого забарвлення зовнішніх листків	жовтуватий	2	
19	Листок: інтенсивність забарвлення зовнішніх листків	слабка	3	
20	Листок: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
21	Листок: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
22	Листок: поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
23	Листок: тип поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
24	Листок: глянуватість верхнього боку	слабка	3	
25	Листок: пухирчастість	слабка	3	
26	Листок: розмір пухирів	малий	3	
27	Листкова пластинка: хвилястість краю	дуже сильна	9	
28	Листкова пластинка: розсіченість краю верхівки	наявна	9	
29	Листкова пластинка: розсіченість краю верхівки за глибиною	мілька	3	
30	Листкова пластинка: ступінь розсіченості краю верхівки	дуже сильна	9	
31	Тільки сорти з мількою розсіченістю краю верхівки. Листкова пластинка: тип розсіченості	зубчаста	2	
32	Листкова пластинка: жилкування	віялоподібне	2	
33	Пазушне жилкування	відсутнє або дуже слабке	1	
34	Час збиральної стиглості	середній	5	
35	Час початку з'явлення квітконоса в умовах довгого дня	дуже пізній	9	
36	Рослина: за висотою (квітуча рослина)	середня	5	
37	Рослина: фасціація (під час цвітіння)	наявна	9	
38	Стебло: інтенсивність фасціації (під час цвітіння)	слабка	3	
39	Стійкість проти борошнистої роси (<i>Bremia lactucae</i>) Izolate B1:16	наявна	9	
40	Стійкість проти вірусу мозаїки салату (LMV) Патотип Ls 1	наявна	9	
41	Стійкість проти попелиці (види <i>Aphis gossypii</i> , <i>A. fabae</i> , <i>Myzodes persicae</i>)	відсутня	1	
42	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lactucae</i>	стійкий (наявна)	9	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна врожайність, т/га – 24. Тривалість періоду до досягання, діб – 55. Стійкість до хвороб, балів (1–9): несправжня борошниста роса – 7, борошниста роса – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП, ЗГр.

Вид: Салат посівний листовий *Lactuca sativa* L. var. *secalina*

Заявка № 19120010 Назва сорту: Вишиванка **Заявник (код):** 1708 **Власник сорту (код):** 1708

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 17.11.2020 **Патент №** 200720

Дата пріоритету: 12.09.2019

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 17.11.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200937

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насінина: забарвлення	чорне	3	
2	Сіянець: антоціанове забарвлення	наявне	9	
3	Сіянець: сім'ядолі за розміром (за повного розвитку)	середні	5	
4	Сіянець: форма сім'ядолей	широкоеліптична	7	
5	Листок: положення у стадії 10-12 листків	напівпряме	3	
6	Листкова пластинка: за розсіченістю краю (як для 5)	розчленована	3	
7	Рослина: діаметр	середній	5	
8	Рослина: утворення головки	не утворює	1	
9	Тільки сорти із закритою головою. Головка: перекриття верхньої частини листків	ознака не визначається	0	
10	Головка: за щільністю	ознака не визначається	0	
11	Головка: розмір	ознака не визначається	0	
12	Лише для сортів маслянистоголовчастого типу у теплицях. Головка: закриття основи	ознака не визначається	0	
13	Головка: форма позаднього розрізу	ознака не визначається	0	
14	Листок: за товщиною	середній	5	
15	Листок: положення за збиральною стиглості (зовнішні листки у головчастого салату або сформовані листки для листового і стеблового салатів)	напівпряме	3	
16	Листок: форма	широкоромбоподібна	8	
17	Листок: форма верхівки	тупа	2	
18	Листок: відтінок зеленого забарвлення зовнішніх листків	червонуватий	4	
19	Листок: інтенсивність забарвлення зовнішніх листків	сильна	7	
20	Листок: антоціанове забарвлення	наявне	9	
21	Листок: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
22	Листок: поширення антоціанового забарвлення	суцільне	2	
23	Листок: тип поширення антоціанового забарвлення	тільки дифузне	1	
24	Листок: глянуватість верхнього боку	помірна	5	
25	Листок: пухирчастість	слабка	3	
26	Листок: розмір пухирів	малий	3	
27	Листкова пластинка: хвилястість краю	помірна	5	
28	Листкова пластинка: розсіченість краю верхівки	відсутня	1	
29	Листкова пластинка: розсіченість краю верхівки за глибиною	ознака не визначається	0	
30	Листкова пластинка: ступінь розсіченості краю верхівки	ознака не визначається	0	
31	Тільки сорти з мілкою розсіченістю краю верхівки. Листкова пластинка: тип розсіченості	ознака не визначається	0	
32	Листкова пластинка: жилкування	невіялоподібне	1	
33	Пазушне жилкування	відсутнє або дуже слабке	1	
34	Час збиральної стиглості	середній	5	
35	Час початку з'явлення квітконоса в умовах довгого дня	середній	5	
36	Рослина: за висотою (квітуча рослина)	середня	5	
37	Рослина: фасціація (під час цвітіння)	відсутня	1	
38	Стебло: інтенсивність фасціації (під час цвітіння)	ознака не визначається	0	
39	Стійкість проти борошнистої роси (<i>Bremia lactucae</i>) Ізолат B1:16	наявна	9	
40	Стійкість проти вірусу мозаїки салату (LMV) Патотип Ls 1	наявна	9	
41	Стійкість проти попелиці (види <i>Aphis gossypii</i> , <i>A. fabae</i> , <i>Myzodes persicae</i>)	наявна	9	
42	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lactucae</i>	стійкий (наявна)	9	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна врожайність, т/га – 16,5. Тривалість періоду до достигання, діб – 37.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Салат посівний листовий *Lactuca sativa* L. var. *secalina*

Заявка № 19120019 Назва сорту: Кулхард **Заявник (код):** 1730 **Власник сорту (код):** 1730

Дата пріоритету: 17.09.2019

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201230

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насінина: забарвлення	біле	1	
2	Сіянець: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
3	Сіянець: сім'ядолі за розміром (за повного розвитку)	середні	5	
4	Сіянець: форма сім'ядолей	вузькоеліптична	3	
5	Листок: положення у стадії 10-12 листків	напівпряме	3	
6	Листкова пластинка: за розсіченістю краю (як для 5)	нерозсічена	1	
7	Рослина: діаметр	великий	7	
8	Рослина: утворення головки	не утворює	1	
9	Тільки сорти із закритою головкою. Головка: перекриття верхньої частини листків	ознака не визначається	0	
10	Головка: за щільністю	ознака не визначається	0	
11	Головка: розмір	ознака не визначається	0	
12	Лише для сортів маслянистоголовчастого типу у теплицях. Головка: закриття основи	ознака не визначається	0	
13	Головка: форма поздовжнього розрізу	ознака не визначається	0	
14	Листок: за товщиною	середній	5	
15	Листок: положення за збиральною стиглості (зовнішні листки у головчастого салату або сформовані листки для листового і стеблових салатів)	напівпряме	3	
16	Листок: форма	оберненояцеподібна	7	
17	Листок: форма верхівки	округла	3	
18	Листок: відтінок зеленого забарвлення зовнішніх листків	відсутній	1	
19	Листок: інтенсивність забарвлення зовнішніх листків	помірна	5	
20	Листок: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
21	Листок: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
22	Листок: поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
23	Листок: тип поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
24	Листок: глянуватість верхнього боку	помірна	5	
25	Листок: пухирчастість	сильна	7	
26	Листок: розмір пухирів	малий	3	
27	Листкова пластинка: хвилястість краю	помірна	5	
28	Листкова пластинка: розсіченість краю верхівки	наявна	9	
29	Листкова пластинка: розсіченість краю верхівки за глибиною	мілька	3	
30	Листкова пластинка: ступінь розсіченості краю верхівки	помірна	5	
31	Тільки сорти з мількою розсіченістю краю верхівки. Листкова пластинка: тип розсіченості	зубчаста	2	
32	Листкова пластинка: жилкування	віялоподібне	2	
33	Пазушне гілкування	слабке	3	
34	Час збиральної стиглості	середній	5	
35	Час початку з'явлення квітконоса в умовах довгого дня	дуже пізній	9	
36	Рослина: за висотою (квітуча рослина)	середня	5	
37	Рослина: фасціація (під час цвітіння)	відсутня	1	
38	Стебло: інтенсивність фасціації (під час цвітіння)	ознака не визначається	0	
39	Стійкість проти борошнистої роси (<i>Bremia lactucae</i>) Isolate B1:16	наявна	9	
40	Стійкість проти вірусу мозаїки салату (LMV) Патотип Ls 1	відсутня	1	
41	Стійкість проти попелиці (види <i>Aphis gossypii</i> , <i>A. fabae</i> , <i>Myzodes persicae</i>)	відсутня	1	
42	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lactucae</i>	сприйнятливий (відсутня)	1	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна врожайність, т/га – 24,8. Тривалість періоду до досягання, діб – 32. Стійкість до хвороб, балів (1–9): несправжня борошниста роса – 8, борошниста роса – 8, біла гниль – 7, септоріоз – 6.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Салат посівний листовий *Lactuca sativa* L. var. *secalina*

Заявка № 19120009 Назва сорту: Лель Заявник (код): 1708 Власник сорту (код): 1708

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 17.11.2020 Патент № 200719

Дата пріоритету: 12.09.2019

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 17.11.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200936

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насінина: забарвлення	чорне	3	
2	Сіянець: антоціанове забарвлення	наявне	9	
3	Сіянець: сім'ядолі за розміром (за повного розвитку)	малі	3	
4	Сіянець: форма сім'ядолей	широкоеліптична	7	
5	Листок: положення у стадії 10-12 листків	напівпряме	3	
6	Листкова пластинка: за розсіченістю краю (як для 5)	часточкова	2	
7	Рослина: діаметр	середній	5	
8	Рослина: утворення головки	не утворює	1	
9	Тільки сорти із закритою головою. Головка: перекриття верхньої частини листків	ознака не визначається	0	
10	Головка: за щільністю	ознака не визначається	0	
11	Головка: розмір	ознака не визначається	0	
12	Лише для сортів маслянистоголовчастого типу у теплицях. Головка: закриття основи	ознака не визначається	0	
13	Головка: форма позаднього розрізу	ознака не визначається	0	
14	Листок: за товщиною	середній	5	
15	Листок: положення за збиральною стиглості (зовнішні листки у головчастого салату або сформовані листки для листового і стеблових салатів)	напівпряме	3	
16	Листок: форма	широкоеліптична	3	
17	Листок: форма верхівки	округла	3	
18	Листок: відтінок зеленого забарвлення зовнішніх листків	червонуватий	4	
19	Листок: інтенсивність забарвлення зовнішніх листків	сильна	7	
20	Листок: антоціанове забарвлення	наявне	9	
21	Листок: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
22	Листок: поширення антоціанового забарвлення	суцільне	2	
23	Листок: тип поширення антоціанового забарвлення	дифузне і плямами	3	
24	Листок: глянуватість верхнього боку	сильна	7	
25	Листок: пухирчастість	слабка	3	
26	Листок: розмір пухирів	середній	5	
27	Листкова пластинка: хвилястість краю	слабка	3	
28	Листкова пластинка: розсіченість краю верхівки	наявна	9	
29	Листкова пластинка: розсіченість краю верхівки за глибиною	мілка	3	
30	Листкова пластинка: ступінь розсіченості краю верхівки	слабка	3	
31	Тільки сорти з мілкою розсіченістю краю верхівки. Листкова пластинка: тип розсіченості	синусоїдна (городчаста)	1	
32	Листкова пластинка: жилкування	невіялоподібне	1	
33	Пазушне жилкування	відсутнє або дуже слабке	1	
34	Час збиральної стиглості	середній	5	
35	Час початку з'явлення квітконоса в умовах довгого дня	середній	5	
36	Рослина: за висотою (квітуча рослина)	середня	5	
37	Рослина: фасціація (під час цвітіння)	відсутня	1	
38	Стебло: інтенсивність фасціації (під час цвітіння)	ознака не визначається	0	
39	Стійкість проти борошнистої роси (<i>Bremia lactucae</i>) Ізолат B1:16	наявна	9	
40	Стійкість проти вірусу мозаїки салату (LMV) Патотип Ls 1	наявна	9	
41	Стійкість проти попелиці (види <i>Aphis gossypii</i> , <i>A. fabae</i> , <i>Myzodes persicae</i>)	наявна	9	
42	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lactucae</i>	стійкий (наявна)	9	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна врожайність, т/га – 16. Тривалість періоду до досягання, діб – 38.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Салат посівний ромен *Lactuca sativa* L. var. *longifolia*

Заявка № 19546003 Назва сорту: Лотус **Заявник (код):** 1730 **Власник сорту (код):** 1730

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 30.11.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200938

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насінина: забарвлення	біле	1	
2	Сіянець: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
3	Сіянець: сім'ядолі за розміром (за повного розвитку)	ознака не визначалась	0	
4	Сіянець: форма сім'ядолей	ознака не визначалась	0	
5	Листок: положення у стадії 10-12 листків	пряме	1	
6	Листкова пластинка: за розсіченістю краю	нерозсічена	1	
7	Рослина: діаметр	середній	5	
8	Рослина: утворення головки	закрита головка	3	
9	Тільки сорти із закритою головкою. Головка: перекриття верхньої частини листків	сильне	7	
10	Головка: за щільністю	щільна	7	
11	Головка: розмір	середній	5	
12	Лише для сортів маслянистоголовчастого типу у теплицях. Головка: закриття основи	ознака не визначається	0	
13	Головка: форма позовжнього розрізу	вузькоеліптична	1	
14	Листок: за товщиною	середній	5	
15	Листок: положення за збиральною стиглості (зовнішні листки у головчастого салату або сформовані листки для листового і стеблового салатів)	пряме	1	
16	Листок: форма	оберненояцеподібна	7	
17	Листок: форма верхівки	округла	3	
18	Листок: відтінок зеленого забарвлення зовнішніх листків	відсутній	1	
19	Листок: інтенсивність забарвлення зовнішніх листків	помірне	5	
20	Листок: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
21	Листок: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
22	Листок: поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
23	Листок: тип поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
24	Листок: глянуватість з верхнього боку	слабка	3	
25	Листок: пухирчастість	помірна	5	
26	Листок: розмір пухирів	малий	3	
27	Листкова пластинка: хвилястість краю	відсутня або дуже слабка	1	
28	Листкова пластинка: розсіченість краю верхівки	відсутня	1	
29	Листкова пластинка: розсіченість краю верхівки за глибиною	ознака не визначається	0	
30	Листкова пластинка: ступінь розсіченості краю верхівки	ознака не визначається	0	
31	Тільки сорти з мілкою розсіченістю краю верхівки. Листкова пластинка: тип розсіченості	ознака не визначається	0	
32	Листкова пластинка: жилкування	нев'ялоподібне	1	
33	Пазушне жилкування	помірне	5	
34	Час збиральної стиглості	пізній	7	
35	Час початку з'явлення квітконоса в умовах довгого дня	пізній	7	
36	Рослина: за висотою (квітуча рослина)	ознака не визначалась	0	
37	Рослина: фасціація (під час цвітіння)	наявна	9	
38	Стебло: інтенсивність фасціації (під час цвітіння)	слабка	3	
39	Стійкість до борошнистої роси (<i>Bremia lactucae</i>) Isolate B1:16	наявна	9	
40	Стійкість проти вірусу мозаїки салату (LMV) Патотип Ls 1	наявна	9	
41	Стійкість проти попелиць (види <i>Aphis gossypii</i> , <i>A. fabae</i> , <i>Myzodes persicae</i>)	ознака не визначалась	0	
42	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lactucae</i>	ознака не визначалась	0	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна врожайність, т/га – 22,7. Середня маса плоду, г – 478. Щільність головки, балів (1–9) – 5. Тривалість періоду до достигання, діб – 54. Лежкість, % – 83. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): несправжня борошниста роса – 8, борошниста роса – 7, антракноз – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЗГр.

Вид: Салат посівний стебловий *Lactuca sativa* L. var. *angustana*

Заявка № 19518001 Назва сорту: Лелека **Заявник (код):** 1708 **Власник сорту (код):** 1708

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 17.11.2020 **Патент №** 200721

Дата пріоритету: 12.09.2019

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 17.11.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200939

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насінина: забарвлення	біле	1	
2	Сіянець: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
3	Сіянець: сім'ядолі за розміром (за повного розвитку)	середні	5	
4	Сіянець: форма сім'ядолей	еліптична	5	
5	Листок: положення у стадії 10-12 листків	розлоге	5	
6	Листкова пластинка: за розсіченістю краю (як для 5)	нерозсічена	1	
7	Рослина: діаметр	великий	7	
8	Рослина: утворення головки	не утворює	1	
9	Тільки сорти із закритою головою. Головка: ступінь перекриття верхньої частини листків	ознака не визначається	0	
10	Головка: за щільністю	ознака не визначається	0	
11	Головка: розмір	ознака не визначається	0	
12	Лише для сортів маслянистоголовчастого типу у теплицях. Головка: закриття основи	ознака не визначається	0	
13	Головка: форма позаднього розрізу	ознака не визначається	0	
14	Листок: за товщиною	середній	5	
15	Листок: положення за збиральною стиглості (зовнішні листки у головчастого салату або сформовані листки для листового і стеблових салатів)	горизонтальне	5	
16	Листок: форма	вузькоеліптична	1	
17	Листок: форма верхівки	гостра	1	
18	Листок: відтінок зеленого забарвлення зовнішніх листків	жовтуватий	2	
19	Листок: інтенсивність забарвлення зовнішніх листків	світласлабка	3	
20	Листок: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
21	Листок: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
22	Листок: поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
23	Листок: тип поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
24	Листок: глясுவатість верхнього боку	слабка	3	
25	Листок: пухирчастість	помірна	5	
26	Листок: розмір пухирів	середній	5	
27	Листкова пластинка: хвилястість краю	слабка	3	
28	Листкова пластинка: розсіченість краю верхівки	відсутня	1	
29	Листкова пластинка: розсіченість краю верхівки за глибиною	ознака не визначається	0	
30	Листкова пластинка: ступінь розсіченості краю верхівки	ознака не визначається	0	
31	Тільки сорти з мілкою розсіченістю краю верхівки. Листкова пластинка: тип розсіченості	ознака не визначається	0	
32	Листкова пластинка: жилкування	невіялоподібне	1	
33	Пазушне жилкування	відсутнє або дуже слабе	1	
34	Час збиральної стиглості	середній	5	
35	Час початку з'явлення квітконоса в умовах довгого дня	пізній	7	
36	Рослина: за висотою (квітуча рослина)	висока	7	
37	Рослина: фасціація (під час цвітіння)	відсутня	1	
38	Стебло: інтенсивність фасціації (під час цвітіння)	ознака не визначається	0	
39	Стійкість до борошнистої роси (<i>Bremia lactucae</i>) Izolate B1:16	наявна	9	
40	Стійкість проти вірусу мозаїки салату (LMV) Патотип Ls 1	наявна	9	
41	Стійкість проти попелиць (види <i>Aphisgossypii</i> , <i>A. fabae</i> , <i>Myzodespersicae</i>)	наявна	9	
42	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lactucae</i>	стійкий (наявна)	9	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна врожайність, т/га – 35,6. Тривалість періоду до досягання, діб – 65. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): несправжня борошниста роса – 9, борошниста роса – 7, біла гниль – 9, септоріоз – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Цибуля городня *Allium cepa* L.

Заявка № 18106013 Назва сорту: Венус **Заявник (код):** 2529 **Власник сорту (код):** 1418

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 20.11.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200954

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: кількість листків на псевдостеблі	середня	5	
2	Листки: положення	пряме	1	
3	Листки: восковий наліт	сильний	7	
4	Листки: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листки: зігнутість	відсутня або слабка	1	
6,1	Тільки сорти цибулі городньої. Листок: за довжиною	середній	5	
6,2	Тільки сорти цибулі шалот. Листок: за довжиною	ознака не визначається	0	
7,1	Тільки сорти цибулі городньої. Листок: діаметр	середній	5	
7,2	Тільки сорти цибулі шалот. Листок: діаметр	ознака не визначається	0	
8	Тільки сорти цибулі городньої. Псевдостебло: за довжиною (до найвищого зеленого листка)	середнє	5	
9	Тільки сорти цибулі городньої. Псевдостебло: діаметр (посередині довжини)	середній	5	
10	Тільки сорти, що розмножуються насінням. Цибулина: тенденція до розщеплення на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулини)	відсутня або дуже слабка	1	
11	Цибулина: ступінь розщеплення на цибулинки (із сухою шкіркою навколо кожної цибулини)	відсутній або дуже слабкий	1	
12,1	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: розмір	середній	5	
12,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулинка: розмір	ознака не визначається	0	
13,1	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: за висотою	середня	5	
13,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулинка: за висотою	ознака не визначається	0	
14,1	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: діаметр	середній	5	
14,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулинка: діаметр	ознака не визначається	0	
15,1	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: відношення висота / діаметр	середнє	5	
15,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулинка: відношення висота / діаметр	ознака не визначається	0	
16	Цибулина/цибулинка: позиція максимального діаметра	посередині	2	
17	Цибулина/цибулинка: шийка за шириною	вузька	3	
18	Цибулина/цибулинка: форма (поздовжнього розрізу)	округла	4	
19	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: форма верхівки (як для 18)	округла	4	
20	Цибулина/цибулинка: форма основи (як для 18)	округла	3	
21	Цибулина/цибулинка: міцність тримання сухої шкірки після збирання	помірна	5	
22	Цибулина/цибулинка: суха шкірка за товщиною	тонка	3	
23	Цибулина/цибулинка: основне забарвлення сухої шкірки	біле	1	
24	За винятком сортів із білою сухою шкіркою. Цибулина/цибулинка: інтенсивність основного забарвлення сухої шкірки	ознака не визначається	0	
25	Цибулина/цибулинка: відтінок забарвлення сухої шкірки (на додаток до основного забарвлення)	відсутній	1	
26	Цибулина/цибулинка: забарвлення соковитих лусок	відсутнє	1	
27	Цибулина/цибулинка: кількість точок зростання на кг	мала	3	
28	Цибулина/цибулинка: вміст сухої речовини	низький	3	
29	Тільки сорти цибулі городньої. Тенденція до стрілкування за весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1	
30	Тільки сорти цибулі городньої. Час стрілкування за весняної сівби	ознака не визначається	0	
31	Тільки сорти цибулі городньої. Тенденція до стрілкування за сівби восени	помірна	5	
32	Тільки сорти цибулі городньої. Час стрілкування за сівби восени	середній	5	
33	Тільки сорти цибулі городньої. Час збиральної стиглості за сівби восени (листя обпало на 80% рослин)	середній	5	
34,1	Тільки сорти цибулі городньої. Час збиральної стиглості за весняної сівби (як для 33)	середній	5	
34,2	Тільки сорти цибулі шалот. Час збиральної стиглості (як для 33)	ознака не визначається	0	
35	Час проростання за зберігання цибулини	середній	5	
36	Чоловіча стерильність	ознака не визначалась	0	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 80. Товарна врожайність, т/га – 72. Тривалість вегетації рослин, діб – 115. Маса цибулини, г – 230. Вміст в цибуліні: вітаміну С, мг/100 г с.р. – 30, загального цукру % – 10. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): гнилі – 8, несправжня борошниста роса (*Peronospora Schleidenii* Unger.) – 9. Стійкість проти заселення (пошкодження) шкідниками, бал (1–9): цибулева муха (*Delia antiqua* Mg.) – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Цибуля городня *Allium cepa* L.

Заявка № 19106004 Назва сорту: Іроко Заявник (код): 840 Власник сорту (код): 840

Дата пріоритету: 30.01.2019

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 20.11.2020

Свідство про державну реєстрацію № 200957

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: кількість листків на псевдостеблі	середня	5	
2	Листки: положення	пряме	1	
3	Листки: восковий наліт	сильний	7	
4	Листки: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листки: зігнутість	відсутня або слабка	1	
6,1	Тільки сорти цибулі городньої. Листок: за довжиною	середній	5	
6,2	Тільки сорти цибулі шалот. Листок: за довжиною	ознака не визначається	0	
7,1	Тільки сорти цибулі городньої. Листок: діаметр	середній	5	
7,2	Тільки сорти цибулі шалот. Листок: діаметр	ознака не визначається	0	
8	Тільки сорти цибулі городньої. Псевдостебло: за довжиною (до найвищого зеленого листка)	довге	7	
9	Тільки сорти цибулі городньої. Псевдостебло: діаметр (посередині довжини)	середній	5	
10	Тільки сорти, що розмножуються насінням. Цибулина: тенденція до розщеплення на цибулини (з сухою шкіркою навколо кожної цибулини)	відсутня або дуже слабка	1	
11	Цибулина: ступінь розщеплення на цибулини (із сухою шкіркою навколо кожної цибулини)	ознака не визначалась	0	
12,1	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: розмір	великий	7	
12,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулинка: розмір	ознака не визначається	0	
13,1	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: за висотою	висока	7	
13,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулинка: за висотою	ознака не визначається	0	
14,1	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: діаметр	великий	7	
14,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулинка: діаметр	ознака не визначається	0	
15,1	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: відношення висота/діаметр	середнє	5	
15,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулинка: відношення висота/діаметр	ознака не визначається	0	
16	Цибулина/цибулинка: позиція максимального діаметра	посередині	2	
17	Цибулина/цибулинка: шийка за шириною	вузька	3	
18	Цибулина/цибулинка: форма (поздовжнього розрізу)	округла	4	
19	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: форма верхівки (як для 18)	округла	4	
20	Цибулина/цибулинка: форма основи (як для 18)	округла	3	
21	Цибулина/цибулинка: міцність тримання сухої шкірки після збирання	помірна	5	
22	Цибулина/цибулинка: суха шкірка за товщиною	середня	5	
23	Цибулина/цибулинка: основне забарвлення сухої шкірки	коричневе	5	
24	За винятком сортів із білою сухою шкіркою. Цибулина/цибулинка: інтенсивність основного забарвлення сухої шкірки	помірна	5	
25	Цибулина/цибулинка: відтінок забарвлення сухої шкірки (на додаток до основного забарвлення)	коричнюватий	5	
26	Цибулина/цибулинка: забарвлення соковитих лусок	зеленувате	2	
27	Цибулина/цибулинка: кількість точок зростання на кг	мала	3	
28	Цибулина/цибулинка: вміст сухої речовини	середній	5	
29	Тільки сорти цибулі городньої. Тенденція до стрілкування за весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1	
30	Тільки сорти цибулі городньої. Час стрілкування за весняної сівби	ознака не визначається	0	
31	Тільки сорти цибулі городньої. Тенденція до стрілкування за сівби восени	помірна	5	
32	Тільки сорти цибулі городньої. Час стрілкування за сівби восени	середній	5	
33	Тільки сорти цибулі городньої. Час збиральної стиглості за сівби восени (листя обпало на 80% рослин)	середній	5	
34,1	Тільки сорти цибулі городньої. Час збиральної стиглості за весняної сівби (як для 33)	середній	5	
34,2	Тільки сорти цибулі шалот. Час збиральної стиглості (як для 33)	ознака не визначається	0	
35	Час проростання за зберігання цибулин	пізній	7	
36	Чоловіча стерильність	відсутня або дуже низька	1	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 70. Товарна врожайність, т/га – 65. Тривалість вегетації рослин, діб – 115. Маса цибулини, г – 150. Вміст в цибуліні: вітаміну С, мг/100 г с.р. – 8,1, сухої речовини, % – 11, загального цукру % – 7,5. Лежкість, діб – 120. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): гнилі – 7, несправжня борошниста роса (*Peronospora Schleidenii* Unger.) – 8. Стійкість проти заселення (пошкодження) шкідниками, бал (1–9): цибулева муха (*Delia antiqua* Mg.) – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Цибуля городня *Allium cepa* L.

Заявка № 18106001 Назва сорту: Кореон 1 **Заявник (код):** 2455 **Власник сорту (код):** 2455

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 03.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201001

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: кількість листків на псевдостеблі	мала	3	
2	Листки: положення	напівпряме	3	
3	Листки: восковий наліт	сильний	7	
4	Листки: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листки: зігнутість	відсутня або слабка	1	
6,1	Тільки сорти цибулі городньої. Листок: за довжиною	короткий	3	
6,2	Тільки сорти цибулі шалот. Листок: за довжиною	ознака не визначається	0	
7,1	Тільки сорти цибулі городньої. Листок: діаметр	малий	3	
7,2	Тільки сорти цибулі шалот. Листок: діаметр	ознака не визначається	0	
8	Тільки сорти цибулі городньої. Псевдостебло: за довжиною (до найвищого зеленого листка)	коротке	3	
9	Тільки сорти цибулі городньої. Псевдостебло: діаметр (посередині довжини)	малий	3	
10	Тільки сорти, що розмножуються насінням. Цибулина: тенденція до розщеплення на цибулини (з сухою шкіркою навколо кожної цибулини)	відсутня або дуже слабка	1	
11	Цибулина: ступінь розщеплення на цибулини (із сухою шкіркою навколо кожної цибулини)	ознака не визначалась	0	
12,1	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: розмір	середній	5	
12,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулинка: розмір	ознака не визначається	0	
13,1	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: за висотою	середня	5	
13,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулинка: за висотою	ознака не визначається	0	
14,1	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: діаметр	середній	5	
14,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулинка: діаметр	ознака не визначається	0	
15,1	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: відношення висота/діаметр	середнє	5	
15,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулинка: відношення висота/діаметр	ознака не визначається	0	
16	Цибулина/цибулинка: позиція максимального діаметра	посередині	2	
17	Цибулина/цибулинка: шийка за шириною	вузька	3	
18	Цибулина/цибулинка: форма (поzdовжнього розрізу)	округла	4	
19	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: форма верхівки (як для 18)	округла	4	
20	Цибулина/цибулинка: форма основи (як для 18)	округла	3	
21	Цибулина/цибулинка: міцність тримання сухої шкірки після збирання	помірна	5	
22	Цибулина/цибулинка: суха шкірка за товщиною	тонка	3	
23	Цибулина/цибулинка: основне забарвлення сухої шкірки	коричневе	5	
24	За винятком сортів із білою сухою шкіркою. Цибулина/цибулинка: інтенсивність основного забарвлення сухої шкірки	помірна	5	
25	Цибулина/цибулинка: відтінок забарвлення сухої шкірки (на додаток до основного забарвлення)	коричнюватий	5	
26	Цибулина/цибулинка: забарвлення соковитих лусок	зеленувате	2	
27	Цибулина/цибулинка: кількість точок зростання на кг	ознака не визначалась	0	
28	Цибулина/цибулинка: вміст сухої речовини	низький	3	
29	Тільки сорти цибулі городньої. Тенденція до стрілкування за весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1	
30	Тільки сорти цибулі городньої. Час стрілкування за весняної сівби	ознака не визначається	0	
31	Тільки сорти цибулі городньої. Тенденція до стрілкування за сівби восени	відсутня або дуже слабка	1	
32	Тільки сорти цибулі городньої. Час стрілкування за сівби восени	ознака не визначається	0	
33	Тільки сорти цибулі городньої. Час збиральної стиглості за сівби восени (листя обпало на 80% рослин)	середній	5	
34,1	Тільки сорти цибулі городньої. Час збиральної стиглості за весняної сівби (як для 33)	ранній	3	
34,2	Тільки сорти цибулі шалот. Час збиральної стиглості (як для 33)	ознака не визначається	0	
35	Час проростання за зберігання цибулини	ранній	3	
36	Чоловіча стерильність	низька	2	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 80. Товарна врожайність, т/га – 80. Вміст в цибулині: вітаміну С, мг/100 г с.р. – 12, загального цукру % – 12,3. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): гнилі – 4, несправжня борошниста роса (*Peronospora Schleidenii* Unger.) – 4. Стійкість проти заселення (пошкодження) шкідниками, бал (1–9): цибулева муха (*Delia antiqua* Mg.) – 2.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Цибуля городня *Allium cepa* L.

Заявка № 19106003 Назва сорту: Мінді Заявник (код): 840 Власник сорту (код): 840

Дата пріоритету: 30.01.2019

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 20.11.2020

Свідство про державну реєстрацію № 200956

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: кількість листків на псевдостеблі	середня	5	
2	Листки: положення	пряме	1	
3	Листки: восковий наліт	сильний	7	
4	Листки: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листки: зігнутість	відсутня або слабка	1	
6,1	Тільки сорти цибулі городньої. Листок: за довжиною	середній	5	
6,2	Тільки сорти цибулі шалот. Листок: за довжиною	ознака не визначається	0	
7,1	Тільки сорти цибулі городньої. Листок: діаметр	середній	5	
7,2	Тільки сорти цибулі шалот. Листок: діаметр	ознака не визначається	0	
8	Тільки сорти цибулі городньої. Псевдостебло: за довжиною (до найвищого зеленого листка)	середнє	5	
9	Тільки сорти цибулі городньої. Псевдостебло: діаметр (посередині довжини)	середній	5	
10	Тільки сорти, що розмножуються насінням. Цибулина: тенденція до розщеплення на цибулини (з сухою шкіркою навколо кожної цибулини)	відсутня або дуже слабка	1	
11	Цибулина: ступінь розщеплення на цибулини (із сухою шкіркою навколо кожної цибулини)	відсутній або дуже слабкий	1	
12,1	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: розмір	великий	7	
12,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулинка: розмір	ознака не визначається	0	
13,1	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: за висотою	висока	7	
13,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулинка: за висотою	ознака не визначається	0	
14,1	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: діаметр	великий	7	
14,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулинка: діаметр	ознака не визначається	0	
15,1	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: відношення висота/діаметр	середнє	5	
15,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулинка: відношення висота/діаметр	ознака не визначається	0	
16	Цибулина/цибулинка: позиція максимального діаметра	посередині	2	
17	Цибулина/цибулинка: шийка за шириною	вузька	3	
18	Цибулина/цибулинка: форма (поздовжнього розрізу)	округла	4	
19	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: форма верхівки (як для 18)	округла	4	
20	Цибулина/цибулинка: форма основи (як для 18)	округла	3	
21	Цибулина/цибулинка: міцність тримання сухої шкірки після збирання	помірна	5	
22	Цибулина/цибулинка: суха шкірка за товщиною	середня	5	
23	Цибулина/цибулинка: основне забарвлення сухої шкірки	коричнєве	5	
24	За винятком сортів із білою сухою шкіркою. Цибулина/цибулинка: інтенсивність основного забарвлення сухої шкірки	помірна	5	
25	Цибулина/цибулинка: відтінок забарвлення сухої шкірки (на додаток до основного забарвлення)	коричнюватий	5	
26	Цибулина/цибулинка: забарвлення соковитих лусок	зеленувате	2	
27	Цибулина/цибулинка: кількість точок зростання на кг	мала	3	
28	Цибулина/цибулинка: вміст сухої речовини	середній	5	
29	Тільки сорти цибулі городньої. Тенденція до стрілкування за весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1	
30	Тільки сорти цибулі городньої. Час стрілкування за весняної сівби	ознака не визначається	0	
31	Тільки сорти цибулі городньої. Тенденція до стрілкування за сівби восени	помірна	5	
32	Тільки сорти цибулі городньої. Час стрілкування за сівби восени	середній	5	
33	Тільки сорти цибулі городньої. Час збиральної стиглості за сівби восени (листя обпало на 80% рослин)	середній	5	
34,1	Тільки сорти цибулі городньої. Час збиральної стиглості за весняної сівби (як для 33)	середній	5	
34,2	Тільки сорти цибулі шалот. Час збиральної стиглості (як для 33)	ознака не визначається	0	
35	Час проростання за зберігання цибулин	середній	5	
36	Чоловіча стерильність	відсутня або дуже низька	1	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 70. Товарна врожайність, т/га – 65. Тривалість вегетації рослин, діб – 115. Маса цибулини, г – 150. Вміст в цибуліні: вітаміну С, мг/100 г с.р. – 8,1, сухої речовини, % – 11, загального цукру % – 7,5. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): гнилі – 7, несправжня борошниста роса (*Peronospora Schleidenii* Unger.) – 8. Стійкість проти заселення (пошкодження) шкідниками, бал (1–9): цибулева муха (*Delia antiqua* Mg.) – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Цибуля городня *Allium cepa* L.

Заявка № 18106010 Назва сорту: Міннесота **Заявник (код):** 1852 **Власник сорту (код):** 1852

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 20.11.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200952

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: кількість листків на псевдостеблі	мала	3	
2	Листки: положення	пряме	1	
3	Листки: восковий наліт	сильний	7	
4	Листки: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листки: зігнутість	відсутня або слабка	1	
6,1	Тільки сорти цибулі городньої. Листок: за довжиною	середній	5	
6,2	Тільки сорти цибулі шалот. Листок: за довжиною	ознака не визначається	0	
7,1	Тільки сорти цибулі городньої. Листок: діаметр	середній	5	
7,2	Тільки сорти цибулі шалот. Листок: діаметр	ознака не визначається	0	
8	Тільки сорти цибулі городньої. Псевдостебло: за довжиною (до найвищого зеленого листка)	середнє	5	
9	Тільки сорти цибулі городньої. Псевдостебло: діаметр (посередині довжини)	середній	5	
10	Тільки сорти, що розмножуються насінням. Цибулина: тенденція до розщеплення на цибулини (з сухою шкіркою навколо кожної цибулини)	відсутня або дуже слабка	1	
11	Цибулина: ступінь розщеплення на цибулини (із сухою шкіркою навколо кожної цибулини)	відсутній або дуже слабкий	1	
12,1	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: розмір	середній	5	
12,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулинка: розмір	ознака не визначається	0	
13,1	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: за висотою	середня	5	
13,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулинка: за висотою	ознака не визначається	0	
14,1	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: діаметр	середній	5	
14,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулинка: діаметр	ознака не визначається	0	
15,1	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: відношення висота/діаметр	середнє	5	
15,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулинка: відношення висота/діаметр	ознака не визначається	0	
16	Цибулина/цибулинка: позиція максимального діаметра	посередині	2	
17	Цибулина/цибулинка: шийка за шириною	вузька	3	
18	Цибулина/цибулинка: форма (поздовжнього розрізу)	округла	4	
19	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: форма верхівки (як для 18)	округла	4	
20	Цибулина/цибулинка: форма основи (як для 18)	округла	3	
21	Цибулина/цибулинка: міцність тримання сухої шкірки після збирання	помірна	5	
22	Цибулина/цибулинка: суха шкірка за товщиною	середня	5	
23	Цибулина/цибулинка: основне забарвлення сухої шкірки	коричневе	5	
24	За винятком сортів із білою сухою шкіркою. Цибулина/цибулинка: інтенсивність основного забарвлення сухої шкірки	помірна	5	
25	Цибулина/цибулинка: відтінок забарвлення сухої шкірки (на додаток до основного забарвлення)	коричнюватий	5	
26	Цибулина/цибулинка: забарвлення соковитих лусок	зеленувате	2	
27	Цибулина/цибулинка: кількість точок зростання на кг	мала	3	
28	Цибулина/цибулинка: вміст сухої речовини	низький	3	
29	Тільки сорти цибулі городньої. Тенденція до стрілкування за весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1	
30	Тільки сорти цибулі городньої. Час стрілкування за весняної сівби	ознака не визначається	0	
31	Тільки сорти цибулі городньої. Тенденція до стрілкування за сівби восени	помірна	5	
32	Тільки сорти цибулі городньої. Час стрілкування за сівби восени	середній	5	
33	Тільки сорти цибулі городньої. Час збиральної стиглості за сівби восени (листя обпало на 80% рослин)	середній	5	
34,1	Тільки сорти цибулі городньої. Час збиральної стиглості за весняної сівби (як для 33)	середній	5	
34,2	Тільки сорти цибулі шалот. Час збиральної стиглості (як для 33)	ознака не визначається	0	
35	Час проростання за зберігання цибулини	середній	5	
36	Чоловіча стерильність	висока	3	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 92. Товарна урожайність, т/га – 88. Тривалість вегетації рослин, діб – 115. Маса цибулини, г – 125. Вміст в цибулині: вітаміну С, мг/100 г с.р. – 35, загального цукру % – 8. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): гнилі – 5, несправжня борошниста роса (*Peronospora Schleidenii* Unger.) – 6. Стійкість проти заселення (пошкодження) шкідниками, бал (1–9): цибулева муха (*Delia antiqua* Mg.) – 4.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Цибуля городня *Allium cepa* L.**Заявка № 18106017 Назва сорту:** Надійна **Заявник (код):** 1990 **Власник сорту (код):** 1990**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 09.12.2020**Свідцтво про державну реєстрацію № 200999****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: кількість листків на псевдостеблі	велика	7	
2	Листки: положення	напівпряме	3	
3	Листки: восковий наліт	сильний	7	
4	Листки: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
5	Листки: зігнутість	відсутня або слабка	1	
6,1	Тільки сорти цибулі городньої. Листок: за довжиною	середній	5	
6,2	Тільки сорти цибулі шалот. Листок: за довжиною	ознака не визначається	0	
7,1	Тільки сорти цибулі городньої. Листок: діаметр	середній	5	
7,2	Тільки сорти цибулі шалот. Листок: діаметр	ознака не визначається	0	
8	Тільки сорти цибулі городньої. Псевдостебло: за довжиною (до найвищого зеленого листка)	середнє	5	
9	Тільки сорти цибулі городньої. Псевдостебло: діаметр (посередині довжини)	середній	5	
10	Тільки сорти, що розмножуються насінням. Цибулина: тенденція до розщеплення на цибулини (з сухою шкіркою навколо кожної цибулини)	відсутня або дуже слабка	1	
11	Цибулина: ступінь розщеплення на цибулини (із сухою шкіркою навколо кожної цибулини)	відсутній або дуже слабкий	1	
12,1	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: розмір	середній	5	
12,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулинка: розмір	ознака не визначається	0	
13,1	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: за висотою	середня	5	
13,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулинка: за висотою	ознака не визначається	0	
14,1	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: діаметр	середній	5	
14,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулинка: діаметр	ознака не визначається	0	
15,1	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: відношення висота/діаметр	середнє	5	
15,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулинка: відношення висота/діаметр	ознака не визначається	0	
16	Цибулина/цибулинка: позиція максимального діаметра	посередині	2	
17	Цибулина/цибулинка: шийка за шириною	вузька	3	
18	Цибулина/цибулинка: форма (поздовжнього розрізу)	округла	4	
19	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: форма верхівки (як для 18)	округла	4	
20	Цибулина/цибулинка: форма основи (як для 18)	слабко конусоподібна	4	
21	Цибулина/цибулинка: міцність тримання сухої шкірки після збирання	помірна	5	
22	Цибулина/цибулинка: суха шкірка за товщиною	середня	5	
23	Цибулина/цибулинка: основне забарвлення сухої шкірки	коричнєве	5	
24	За винятком сортів із білою сухою шкіркою. Цибулина/цибулинка: інтенсивність основного забарвлення сухої шкірки	помірна	5	
25	Цибулина/цибулинка: відтінок забарвлення сухої шкірки (на додаток до основного забарвлення)	коричнюватий	5	
26	Цибулина/цибулинка: забарвлення соковитих лусок	зеленувате	2	
27	Цибулина/цибулинка: кількість точок зростання на кг	мала	3	
28	Цибулина/цибулинка: вміст сухої речовини	середній	5	
29	Тільки сорти цибулі городньої. Тенденція до стрілкування за весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1	
30	Тільки сорти цибулі городньої. Час стрілкування за весняної сівби	ознака не визначається	0	
31	Тільки сорти цибулі городньої. Тенденція до стрілкування за сівби восени	сильна	7	
32	Тільки сорти цибулі городньої. Час стрілкування за сівби восени	ранній	3	
33	Тільки сорти цибулі городньої. Час збиральної стиглості за сівби восени (листя обпало на 80% рослин)	середній	5	
34,1	Тільки сорти цибулі городньої. Час збиральної стиглості за весняної сівби (як для 33)	середній	5	
34,2	Тільки сорти цибулі шалот. Час збиральної стиглості (як для 33)	ознака не визначається	0	
35	Час проростання за зберігання цибулин	пізній	7	
36	Чоловіча стерильність	відсутня або дуже низька	1	

За інформацією наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 37,6. Товарна врожайність, т/га – 35,2. Тривалість вегетації рослин, діб – 90. Маса цибулини, г – 80. Вміст в цибуліні: вітаміну С, мг/100 г с.р. – 11,5, загального цукру % – 8,6. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): гнилі – 7, несправжня борошниста роса (*Peronospora Schleidenii* Unger.) – 5. Стійкість проти заселення (пошкодження) шкідниками, бал (1–9): цибулева муха (*Delia antiqua* Mg.) – 5.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Цибуля городня *Allium cepa* L.

Заявка № 19106005 **Назва сорту:** Ногал **Заявник (код):** 840 **Власник сорту (код):** 840

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 20.11.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200958

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: кількість листків на псевдостеблі	середня	5	
2	Листки: положення	від прямого до напівпрямого	2	
3	Листки: восковий наліт	помірний	5	
4	Листки: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
5	Листки: зігнутість	відсутня або слабка	1	
6,1	Тільки сорти цибулі городньої. Листок: за довжиною	середній	5	
6,2	Тільки сорти цибулі шалот. Листок: за довжиною	ознака не визначається	0	
7,1	Тільки сорти цибулі городньої. Листок: діаметр	середній	5	
7,2	Тільки сорти цибулі шалот. Листок: діаметр	ознака не визначається	0	
8	Тільки сорти цибулі городньої. Псевдостебло: за довжиною (до найвищого зеленого листка)	середнє	5	
9	Тільки сорти цибулі городньої. Псевдостебло: діаметр (посередині довжини)	середній	5	
10	Тільки сорти, що розмножуються насінням. Цибулина: тенденція до розщеплення на цибулини (з сухою шкіркою навколо кожної цибулини)	відсутня або дуже слабка	1	
11	Цибулина: ступінь розщеплення на цибулини (із сухою шкіркою навколо кожної цибулини)	ознака не визначалась	0	
12,1	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: розмір	середній	5	
12,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулинка: розмір	ознака не визначається	0	
13,1	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: за висотою	висока	7	
13,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулинка: за висотою	ознака не визначається	0	
14,1	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: діаметр	великий	7	
14,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулинка: діаметр	ознака не визначається	0	
15,1	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: відношення висота/діаметр	середнє	5	
15,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулинка: відношення висота/діаметр	ознака не визначається	0	
16	Цибулина/цибулинка: позиція максимального діаметра	посередині	2	
17	Цибулина/цибулинка: шийка за шириною	вузька	3	
18	Цибулина/цибулинка: форма (поздовжнього розрізу)	округла	4	
19	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: форма верхівки (як для 18)	округла	4	
20	Цибулина/цибулинка: форма основи (як для 18)	округла	3	
21	Цибулина/цибулинка: міцність тримання сухої шкірки після збирання	помірна	5	
22	Цибулина/цибулинка: суха шкірка за товщиною	середня	5	
23	Цибулина/цибулинка: основне забарвлення сухої шкірки	коричневе	5	
24	За винятком сортів із білою сухою шкіркою. Цибулина/цибулинка: інтенсивність основного забарвлення сухої шкірки	помірна	5	
25	Цибулина/цибулинка: відтінок забарвлення сухої шкірки (на додаток до основного забарвлення)	коричнюватий	5	
26	Цибулина/цибулинка: забарвлення соковитих лусок	зеленувате	2	
27	Цибулина/цибулинка: кількість точок зростання на кг	ознака не визначалась	0	
28	Цибулина/цибулинка: вміст сухої речовини	середній	5	
29	Тільки сорти цибулі городньої. Тенденція до стрілкування за весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1	
30	Тільки сорти цибулі городньої. Час стрілкування за весняної сівби	ознака не визначається	0	
31	Тільки сорти цибулі городньої. Тенденція до стрілкування за сівби восени	ознака не визначалась	0	
32	Тільки сорти цибулі городньої. Час стрілкування за сівби восени	ознака не визначається	0	
33	Тільки сорти цибулі городньої. Час збиральної стиглості за сівби восени (листя обпало на 80% рослин)	ознака не визначалась	0	
34,1	Тільки сорти цибулі городньої. Час збиральної стиглості за весняної сівби (як для 33)	середній	5	
34,2	Тільки сорти цибулі шалот. Час збиральної стиглості (як для 33)	ознака не визначається	0	
35	Час проростання за зберігання цибулини	ознака не визначалась	0	
36	Чоловіча стерильність	відсутня або дуже низька	1	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 85. Товарна врожайність, т/га – 75. Тривалість вегетації рослин, діб – 105. Маса цибулини, г – 160. Вміст в цибулині: вітаміну С, мг/100 г с.р. – 8,1, сухої речовини, % – 11, загального цукру % – 7,5. Лежкість, діб – 140. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): гнилі – 7, несправжня борошниста роса (*Peronospora Schleidenii* Unger.) – 8. Стійкість проти заселення (пошкодження) шкідниками, бал (1–9): цибулева муха (*Delia antiqua* Mg.) – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Цибуля городня *Allium cepa* L.

Заявка № 18106011 Назва сорту: Ред Флойд **Заявник (код):** 1852 **Власник сорту (код):** 1852

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 20.11.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200953

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: кількість листків на псевдостеблі	мала	3	
2	Листки: положення	пряме	1	
3	Листки: восковий наліт	сильний	7	
4	Листки: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
5	Листки: зігнутість	відсутня або слабка	1	
6,1	Тільки сорти цибулі городньої. Листок: за довжиною	середній	5	
6,2	Тільки сорти цибулі шалот. Листок: за довжиною	ознака не визначається	0	
7,1	Тільки сорти цибулі городньої. Листок: діаметр	середній	5	
7,2	Тільки сорти цибулі шалот. Листок: діаметр	ознака не визначається	0	
8	Тільки сорти цибулі городньої. Псевдостебло: за довжиною (до найвищого зеленого листка)	середнє	5	
9	Тільки сорти цибулі городньої. Псевдостебло: діаметр (посередині довжини)	малий	3	
10	Тільки сорти, що розмножуються насінням. Цибулина: тенденція до розщеплення на цибулини (з сухою шкіркою навколо кожної цибулини)	відсутня або дуже слабка	1	
11	Цибулина: ступінь розщеплення на цибулини (із сухою шкіркою навколо кожної цибулини)	відсутній або дуже слабкий	1	
12,1	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: розмір	середній	5	
12,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулинка: розмір	ознака не визначається	0	
13,1	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: за висотою	середня	5	
13,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулинка: за висотою	ознака не визначається	0	
14,1	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: діаметр	середній	5	
14,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулинка: діаметр	ознака не визначається	0	
15,1	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: відношення висота/діаметр	середнє	5	
15,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулинка: відношення висота/діаметр	ознака не визначається	0	
16	Цибулина/цибулинка: позиція максимального діаметра	посередині	2	
17	Цибулина/цибулинка: шийка за шириною	вузька	3	
18	Цибулина/цибулинка: форма (поздовжнього розрізу)	ромбічна	7	
19	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: форма верхівки (як для 18)	округла	4	
20	Цибулина/цибулинка: форма основи (як для 18)	слабко конусоподібна	4	
21	Цибулина/цибулинка: міцність тримання сухої шкірки після збирання	помірна	5	
22	Цибулина/цибулинка: суха шкірка за товщиною	середня	5	
23	Цибулина/цибулинка: основне забарвлення сухої шкірки	червоне	7	
24	За винятком сортів із білою сухою шкіркою. Цибулина/цибулинка: інтенсивність основного забарвлення сухої шкірки	сильна	7	
25	Цибулина/цибулинка: відтінок забарвлення сухої шкірки (на додаток до основного забарвлення)	пурпуровий	8	
26	Цибулина/цибулинка: забарвлення соковитих лусок	червонувате	3	
27	Цибулина/цибулинка: кількість точок зростання на кг	мала	3	
28	Цибулина/цибулинка: вміст сухої речовини	низький	3	
29	Тільки сорти цибулі городньої. Тенденція до стрілкування за весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1	
30	Тільки сорти цибулі городньої. Час стрілкування за весняної сівби	ознака не визначається	0	
31	Тільки сорти цибулі городньої. Тенденція до стрілкування за сівби восени	помірна	5	
32	Тільки сорти цибулі городньої. Час стрілкування за сівби восени	середній	5	
33	Тільки сорти цибулі городньої. Час збиральної стиглості за сівби восени (листя обпало на 80% рослин)	середній	5	
34,1	Тільки сорти цибулі городньої. Час збиральної стиглості за весняної сівби (як для 33)	середній	5	
34,2	Тільки сорти цибулі шалот. Час збиральної стиглості (як для 33)	ознака не визначається	0	
35	Час проростання за зберігання цибулин	ранній	3	
36	Чоловіча стерильність	висока	3	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 95. Товарна врожайність, т/га – 91. Тривалість вегетації рослин, діб – 102. Маса цибулини, г – 160. Вміст в цибулині: вітаміну С, мг/100 г с.р. – 35, загального цукру % – 7. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): гнилі – 5, несправжня борошниста роса (*Peronospora Schleidenii* Unger.) – 7. Стійкість проти заселення (пошкодження) шкідниками, бал (1–9): цибулева муха (*Delia antiqua* Mg.) – 4.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Цибуля городня *Allium cepa* L.

Заявка № 18106009 Назва сорту: Сакраменто **Заявник (код):** 1852 **Власник сорту (код):** 1852

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 20.11.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200951

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: кількість листків на псевдостеблі	мала	3	
2	Листки: положення	пряме	1	
3	Листки: восковий наліт	сильний	7	
4	Листки: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листки: зігнутість	відсутня або слабка	1	
6,1	Тільки сорти цибулі городньої. Листок: за довжиною	середній	5	
6,2	Тільки сорти цибулі шалот. Листок: за довжиною	ознака не визначається	0	
7,1	Тільки сорти цибулі городньої. Листок: діаметр	середній	5	
7,2	Тільки сорти цибулі шалот. Листок: діаметр	ознака не визначається	0	
8	Тільки сорти цибулі городньої. Псевдостебло: за довжиною (до найвищого зеленого листка)	коротке	3	
9	Тільки сорти цибулі городньої. Псевдостебло: діаметр (посередині довжини)	середній	5	
10	Тільки сорти, що розмножуються насінням. Цибулина: тенденція до розщеплення на цибулини (з сухою шкіркою навколо кожної цибулини)	відсутня або дуже слабка	1	
11	Цибулина: ступінь розщеплення на цибулини (із сухою шкіркою навколо кожної цибулини)	відсутній або дуже слабкий	1	
12,1	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: розмір	середній	5	
12,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулинка: розмір	ознака не визначається	0	
13,1	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: за висотою	середня	5	
13,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулинка: за висотою	ознака не визначається	0	
14,1	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: діаметр	середній	5	
14,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулинка: діаметр	ознака не визначається	0	
15,1	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: відношення висота/діаметр	середнє	5	
15,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулинка: відношення висота/діаметр	ознака не визначається	0	
16	Цибулина/цибулинка: позиція максимального діаметра	посередині	2	
17	Цибулина/цибулинка: шийка за шириною	вузька	3	
18	Цибулина/цибулинка: форма (поздовжнього розрізу)	округла	4	
19	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: форма верхівки (як для 18)	округла	4	
20	Цибулина/цибулинка: форма основи (як для 18)	округла	3	
21	Цибулина/цибулинка: міцність тримання сухої шкірки після збирання	помірна	5	
22	Цибулина/цибулинка: суха шкірка за товщиною	середня	5	
23	Цибулина/цибулинка: основне забарвлення сухої шкірки	коричневе	5	
24	За винятком сортів із білою сухою шкіркою. Цибулина/цибулинка: інтенсивність основного забарвлення сухої шкірки	помірна	5	
25	Цибулина/цибулинка: відтінок забарвлення сухої шкірки (на додаток до основного забарвлення)	коричнюватий	5	
26	Цибулина/цибулинка: забарвлення соковитих лусок	зеленувате	2	
27	Цибулина/цибулинка: кількість точок зростання на кг	мала	3	
28	Цибулина/цибулинка: вміст сухої речовини	середній	5	
29	Тільки сорти цибулі городньої. Тенденція до стрілкування за весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1	
30	Тільки сорти цибулі городньої. Час стрілкування за весняної сівби	ознака не визначається	0	
31	Тільки сорти цибулі городньої. Тенденція до стрілкування за сівби восени	слабка	3	
32	Тільки сорти цибулі городньої. Час стрілкування за сівби восени	пізній	7	
33	Тільки сорти цибулі городньої. Час збиральної стиглості за сівби восени (листя обпало на 80% рослин)	середній	5	
34,1	Тільки сорти цибулі городньої. Час збиральної стиглості за весняної сівби (як для 33)	середній	5	
34,2	Тільки сорти цибулі шалот. Час збиральної стиглості (як для 33)	ознака не визначається	0	
35	Час проростання за зберігання цибулини	пізній	7	
36	Чоловіча стерильність	висока	3	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 102. Товарна врожайність, т/га – 96. Тривалість вегетації рослин, діб – 112. Маса цибулини, г – 160. Вміст в цибулині: вітаміну С, мг/100 г с.р. – 30, сухої речовини, % – 12,5, загального цукру % – 8. Лежкість, діб – 180. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): гнилі – 4, несправжня борошниста роса (*Peronospora Schleidenii* Unger.) – 5. Стійкість проти заселення (пошкодження) шкідниками, бал (1–9): цибулева муха (*Delia antiqua* Mg.) – 5.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Цибуля городня *Allium cepa* L.

Заявка № 17106012 Назва сорту: СВ4058НЮ **Заявник (код):** 1852 **Власник сорту (код):** 1852

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 25.11.2020

Свідцтво про державну реєстрацію № 200959

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: кількість листків на псевдостеблі	велика	7	
2	Листки: положення	пряме	1	
3	Листки: восковий наліт	сильний	7	
4	Листки: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листки: зігнутість	відсутня або слабка	1	
6,1	Тільки сорти цибулі городньої. Листок: за довжиною	довгий	7	
6,2	Тільки сорти цибулі шалот. Листок: за довжиною	ознака не визначається	0	
7,1	Тільки сорти цибулі городньої. Листок: діаметр	середній	5	
7,2	Тільки сорти цибулі шалот. Листок: діаметр	ознака не визначається	0	
8	Тільки сорти цибулі городньої. Псевдостебло: за довжиною (до найвищого зеленого листка)	середнє	5	
9	Тільки сорти цибулі городньої. Псевдостебло: діаметр (посередині довжини)	середній	5	
10	Тільки сорти, що розмножуються насінням. Цибулина: тенденція до розщеплення на цибулини (з сухою шкіркою навколо кожної цибулини)	відсутня або дуже слабка	1	
11	Цибулина: ступінь розщеплення на цибулини (із сухою шкіркою навколо кожної цибулини)	відсутній або дуже слабкий	1	
12,1	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: розмір	великий	7	
12,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулинка: розмір	ознака не визначається	0	
13,1	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: за висотою	висока	7	
13,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулинка: за висотою	ознака не визначається	0	
14,1	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: діаметр	великий	7	
14,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулинка: діаметр	ознака не визначається	0	
15,1	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: відношення висота/діаметр	середнє	5	
15,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулинка: відношення висота/діаметр	ознака не визначається	0	
16	Цибулина/цибулинка: позиція максимального діаметра	посередині	2	
17	Цибулина/цибулинка: шийка за шириною	вузька	3	
18	Цибулина/цибулинка: форма (поздовжнього розрізу)	округла	4	
19	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: форма верхівки (як для 18)	округла	4	
20	Цибулина/цибулинка: форма основи (як для 18)	округла	3	
21	Цибулина/цибулинка: міцність тримання сухої шкірки після збирання	слабка	3	
22	Цибулина/цибулинка: суха шкірка за товщиною	середня	5	
23	Цибулина/цибулинка: основне забарвлення сухої шкірки	біле	1	
24	За винятком сортів із білою сухою шкіркою. Цибулина/цибулинка: інтенсивність основного забарвлення сухої шкірки	ознака не визначається	0	
25	Цибулина/цибулинка: відтінок забарвлення сухої шкірки (на додаток до основного забарвлення)	відсутній	1	
26	Цибулина/цибулинка: забарвлення соковитих лусок	відсутнє	1	
27	Цибулина/цибулинка: кількість точок зростання на кг	мала	3	
28	Цибулина/цибулинка: вміст сухої речовини	низький	3	
29	Тільки сорти цибулі городньої. Тенденція до стрілкування за весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1	
30	Тільки сорти цибулі городньої. Час стрілкування за весняної сівби	ознака не визначається	0	
31	Тільки сорти цибулі городньої. Тенденція до стрілкування за сівби восени	помірна	5	
32	Тільки сорти цибулі городньої. Час стрілкування за сівби восени	середній	5	
33	Тільки сорти цибулі городньої. Час збиральної стиглості за сівби восени (листя обпало на 80% рослин)	середній	5	
34,1	Тільки сорти цибулі городньої. Час збиральної стиглості за весняної сівби (як для 33)	середній	5	
34,2	Тільки сорти цибулі шалот. Час збиральної стиглості (як для 33)	ознака не визначається	0	
35	Час проростання за зберігання цибулин	середній	5	
36	Чоловіча стерильність	висока	3	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 80. Товарна врожайність, т/га – 75. Тривалість вегетації рослин, діб – 115. Маса цибулини, г – 180. Вміст в цибулині: вітаміну С, мг/100 г с.р. – 35, загального цукру % – 9,4. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): гнилі – 6, несправжня борошниста роса (*Peronospora Schleidenii* Unger.) – 5. Стійкість проти заселення (пошкодження) шкідниками, бал (1–9): цибулева муха (*Delia antiqua* Mg.) – 6.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Цибуля городня *Allium cepa* L.

Заявка № 17106010 Назва сорту: Такмарк **Заявник (код):** 861 **Власник сорту (код):** 861

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 16.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201265

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: кількість листків на псевдостеблі	середня	5	
2	Листки: положення	пряме	1	
3	Листки: восковий наліт	сильний	7	
4	Листки: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
5	Листки: зігнутість	відсутня або слабка	1	
6,1	Тільки сорти цибулі городньої. Листок: за довжиною	середній	5	
6,2	Тільки сорти цибулі шалот. Листок: за довжиною	ознака не визначається	0	
7,1	Тільки сорти цибулі городньої. Листок: діаметр	середній	5	
7,2	Тільки сорти цибулі шалот. Листок: діаметр	ознака не визначається	0	
8	Тільки сорти цибулі городньої. Псевдостебло: за довжиною (до найвищого зеленого листка)	середнє	5	
9	Тільки сорти цибулі городньої. Псевдостебло: діаметр (посередині довжини)	середній	5	
10	Тільки сорти, що розмножуються насінням. Цибулина: тенденція до розщеплення на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулини)	відсутня або дуже слабка	1	
11	Цибулина: ступінь розщеплення на цибулинки (із сухою шкіркою навколо кожної цибулини)	відсутній або дуже слабкий	1	
12,1	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: розмір	середній	5	
12,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулинка: розмір	ознака не визначається	0	
13,1	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: за висотою	середня	5	
13,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулинка: за висотою	ознака не визначається	0	
14,1	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: діаметр	середній	5	
14,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулинка: діаметр	ознака не визначається	0	
15,1	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: відношення висота/діаметр	середнє	5	
15,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулинка: відношення висота/діаметр	ознака не визначається	0	
16	Цибулина/цибулинка: позиція максимального діаметра	посередині	2	
17	Цибулина/цибулинка: шийка за шириною	вузька	3	
18	Цибулина/цибулинка: форма (поздовжнього розрізу)	округла	4	
19	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: форма верхівки (як для 18)	округла	4	
20	Цибулина/цибулинка: форма основи (як для 18)	округла	3	
21	Цибулина/цибулинка: міцність тримання сухої шкірки після збирання	помірна	5	
22	Цибулина/цибулинка: суха шкірка за товщиною	середня	5	
23	Цибулина/цибулинка: основне забарвлення сухої шкірки	коричневе	5	
24	За винятком сортів із білою сухою шкіркою. Цибулина/цибулинка: інтенсивність основного забарвлення сухої шкірки	помірна	5	
25	Цибулина/цибулинка: відтінок забарвлення сухої шкірки (на додаток до основного забарвлення)	коричнюватий	5	
26	Цибулина/цибулинка: забарвлення соковитих лусок	зеленувате	2	
27	Цибулина/цибулинка: кількість точок зростання на кг	мала	3	
28	Цибулина/цибулинка: вміст сухої речовини	середній	5	
29	Тільки сорти цибулі городньої. Тенденція до стрілкування за весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1	
30	Тільки сорти цибулі городньої. Час стрілкування за весняної сівби	ознака не визначається	0	
31	Тільки сорти цибулі городньої. Тенденція до стрілкування за сівби восени	помірна	5	
32	Тільки сорти цибулі городньої. Час стрілкування за сівби восени	середній	5	
33	Тільки сорти цибулі городньої. Час збиральної стиглості за сівби восени (листя обпало на 80% рослин)	середній	5	
34,1	Тільки сорти цибулі городньої. Час збиральної стиглості за весняної сівби (як для 33)	ранній	3	
34,2	Тільки сорти цибулі шалот. Час збиральної стиглості (як для 33)	ознака не визначається	0	
35	Час проростання за зберігання цибулини	середній	5	
36	Чоловіча стерильність	відсутня або дуже низька	1	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 80. Товарна врожайність, т/га – 78. Тривалість вегетації рослин, днів – 85. Маса цибулини, г – 150. Вміст в цибулині: вітаміну С, мг/100 г с.р. – 9, сухої речовини, % – 12,5, загального цукру % – 6,5. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): гнилі – 4, несправжня борошниста роса (*Peronospora Schleidenii* Unger.) – 8. Стійкість проти заселення (пошкодження) шкідниками, бал (1–9): цибулева муха (*Delia antiqua* Mg.) – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Цибуля городня *Allium cepa* L.

Заявка № 18106014 Назва сорту: Фабула Заявник (код): 2529 Власник сорту (код): 1418

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 20.11.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200955

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: кількість листків на псевдостеблі	середня	5	
2	Листки: положення	від прямого до напівпрямого	2	
3	Листки: восковий наліт	сильний	7	
4	Листки: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
5	Листки: зігнутість	відсутня або слабка	1	
6,1	Тільки сорти цибулі городньої. Листок: за довжиною	середній	5	
6,2	Тільки сорти цибулі шалот. Листок: за довжиною	ознака не визначається	0	
7,1	Тільки сорти цибулі городньої. Листок: діаметр	середній	5	
7,2	Тільки сорти цибулі шалот. Листок: діаметр	ознака не визначається	0	
8	Тільки сорти цибулі городньої. Псевдостебло: за довжиною (до найвищого зеленого листка)	коротке	3	
9	Тільки сорти цибулі городньої. Псевдостебло: діаметр (посередині довжини)	середній	5	
10	Тільки сорти, що розмножуються насінням. Цибулина: тенденція до розщеплення на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулини)	відсутня або дуже слабка	1	
11	Цибулина: ступінь розщеплення на цибулинки (із сухою шкіркою навколо кожної цибулини)	відсутній або дуже слабкий	1	
12,1	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: розмір	середній	5	
12,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулинка: розмір	ознака не визначається	0	
13,1	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: за висотою	середня	5	
13,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулинка: за висотою	ознака не визначається	0	
14,1	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: діаметр	середній	5	
14,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулинка: діаметр	ознака не визначається	0	
15,1	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: відношення висота/діаметр	середнє	5	
15,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулинка: відношення висота/діаметр	ознака не визначається	0	
16	Цибулина/цибулинка: позиція максимального діаметра	посередині	2	
17	Цибулина/цибулинка: шийка за шириною	вузька	3	
18	Цибулина/цибулинка: форма (поздовжнього розрізу)	округла	4	
19	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: форма верхівки (як для 18)	округла	4	
20	Цибулина/цибулинка: форма основи (як для 18)	округла	3	
21	Цибулина/цибулинка: міцність тримання сухої шкірки після збирання	помірна	5	
22	Цибулина/цибулинка: суха шкірка за товщиною	тонка	3	
23	Цибулина/цибулинка: основне забарвлення сухої шкірки	червоне	7	
24	За винятком сортів із білою сухою шкіркою. Цибулина/цибулинка: інтенсивність основного забарвлення сухої шкірки	сильна	7	
25	Цибулина/цибулинка: відтінок забарвлення сухої шкірки (на додаток до основного забарвлення)	пурпуровий	8	
26	Цибулина/цибулинка: забарвлення соковитих лусок	червонувате	3	
27	Цибулина/цибулинка: кількість точок зростання на кг	мала	3	
28	Цибулина/цибулинка: вміст сухої речовини	низький	3	
29	Тільки сорти цибулі городньої. Тенденція до стрілкування за весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1	
30	Тільки сорти цибулі городньої. Час стрілкування за весняної сівби	ознака не визначається	0	
31	Тільки сорти цибулі городньої. Тенденція до стрілкування за сівби восени	помірна	5	
32	Тільки сорти цибулі городньої. Час стрілкування за сівби восени	пізній	7	
33	Тільки сорти цибулі городньої. Час збиральної стиглості за сівби восени (листя обпало на 80% рослин)	середній	5	
34,1	Тільки сорти цибулі городньої. Час збиральної стиглості за весняної сівби (як для 33)	ранній	3	
34,2	Тільки сорти цибулі шалот. Час збиральної стиглості (як для 33)	ознака не визначається	0	
35	Час проростання за зберігання цибулин	середній	5	
36	Чоловіча стерильність	ознака не визначалась	0	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 60. Товарна врожайність, т/га – 50. Тривалість вегетації рослин, діб – 115. Маса цибулини, г – 140. Вміст в цибуліні: вітаміну С, мг/100 г с.р. – 35, загального цукру % – 15. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): гнилі – 9, несправжня борошниста роса (*Peronospora Schleidenii* Unger.) – 8. Стійкість проти заселення (пошкодження) шкідниками, бал (1–9): цибулева муха (*Delia antiqua* Mg.) – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Цибуля городня *Allium cepa* L.

Заявка № 18106008 Назва сорту: Ялтинська **Заявник (код):** 2200 2485 **Власник сорту (код):** 2200 2485

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 02.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201000

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: кількість листків на псевдостеблі	середня	5	
2	Листки: положення	напівпряме	3	
3	Листки: восковий наліт	сильний	7	
4	Листки: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
5	Листки: зігнутість	відсутня або слабка	1	
6,1	Тільки сорти цибулі городньої. Листок: за довжиною	середній	5	
6,2	Тільки сорти цибулі шалот. Листок: за довжиною	ознака не визначається	0	
7,1	Тільки сорти цибулі городньої. Листок: діаметр	середній	5	
7,2	Тільки сорти цибулі шалот. Листок: діаметр	ознака не визначається	0	
8	Тільки сорти цибулі городньої. Псевдостебло: за довжиною (до найвищого зеленого листка)	середнє	5	
9	Тільки сорти цибулі городньої. Псевдостебло: діаметр (посередині довжини)	середній	5	
10	Тільки сорти, що розмножуються насінням. Цибулина: тенденція до розщеплення на цибулини (з сухою шкіркою навколо кожної цибулини)	відсутня або дуже слабка	1	
11	Цибулина: ступінь розщеплення на цибулини (із сухою шкіркою навколо кожної цибулини)	відсутній або дуже слабкий	1	
12,1	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: розмір	середній	5	
12,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулинка: розмір	ознака не визначається	0	
13,1	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: за висотою	низька	3	
13,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулинка: за висотою	ознака не визначається	0	
14,1	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: діаметр	великий	7	
14,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулинка: діаметр	ознака не визначається	0	
15,1	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: відношення висота/діаметр	мале	3	
15,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулинка: відношення висота/діаметр	ознака не визначається	0	
16	Цибулина/цибулинка: позиція максимального діаметра	посередині	2	
17	Цибулина/цибулинка: шийка за шириною	вузька	3	
18	Цибулина/цибулинка: форма (поздовжнього розрізу)	поперечно-вузькоеліптична	9	
19	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: форма верхівки (як для 18)	плеската	2	
20	Цибулина/цибулинка: форма основи (як для 18)	плеската	2	
21	Цибулина/цибулинка: міцність тримання сухої шкірки після збирання	помірна	5	
22	Цибулина/цибулинка: суха шкірка за товщиною	тонка	3	
23	Цибулина/цибулинка: основне забарвлення сухої шкірки	червоне	7	
24	За винятком сортів із білою сухою шкіркою. Цибулина/цибулинка: інтенсивність основного забарвлення сухої шкірки	сильна	7	
25	Цибулина/цибулинка: відтінок забарвлення сухої шкірки (на додаток до основного забарвлення)	пурпуровий	8	
26	Цибулина/цибулинка: забарвлення соковитих лусок	червонувате	3	
27	Цибулина/цибулинка: кількість точок зростання на кг	мала	3	
28	Цибулина/цибулинка: вміст сухої речовини	середній	5	
29	Тільки сорти цибулі городньої. Тенденція до стрілкування за весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1	
30	Тільки сорти цибулі городньої. Час стрілкування за весняної сівби	ознака не визначається	0	
31	Тільки сорти цибулі городньої. Тенденція до стрілкування за сівби восени	помірна	5	
32	Тільки сорти цибулі городньої. Час стрілкування за сівби восени	середній	5	
33	Тільки сорти цибулі городньої. Час збиральної стиглості за сівби восени (листя обпало на 80% рослин)	середній	5	
34,1	Тільки сорти цибулі городньої. Час збиральної стиглості за весняної сівби (як для 33)	середній	5	
34,2	Тільки сорти цибулі шалот. Час збиральної стиглості (як для 33)	ознака не визначається	0	
35	Час проростання за зберігання цибулини	ознака не визначалась	0	
36	Чоловіча стерильність	низька	2	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 119. Товарна врожайність, т/га – 104. Тривалість вегетації рослин, діб – 100. Маса цибулини, г – 200. Вміст в цибулині: вітаміну С, мг/100 г с.р. – 11,1, загального цукру % – 7,2. Лежкість, діб – 120. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): гнилі – 7, несправжня борошниста роса (*Peronospora Schleidenii* Unger.) – 8. Стійкість проти заселення (пошкодження) шкідниками, бал (1–9): цибулева муха (*Delia antiqua* Mg.) – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Цибуля запашна *Allium odorum* L.

Заявка № 19167001 Назва сорту: Вишукана **Заявник (код):** 1708 **Власник сорту (код):** 1708

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 17.11.2020 **Патент №** 200732

Дата пріоритету: 08.07.2019

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 17.11.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200960

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: за висотою	висока	7	
2	Рослина: кількість листків на псевдостеблі	велика	7	
3	Листок: положення у просторі	напівпряме	2	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: восковий наліт	слабкий	3	
6	Листок: за довжиною	середній	5	
7	Листок: за шириною	середній	5	
8	Рослина: час початку цвітіння	ранній	3	
9	Квітконос: за довжиною	середній	5	
10	Квітконос: крильця	наявні	9	
11	Квітконос: форма у поперечному перерізі	округлотрикутна з двома крильцями	1	
12	Суцвіття: кількість квіток	середня	5	
13	Суцвіття: забарвлення	біле	1	
14	Суцвіття: форма	широкопучкувата	2	
15	Суцвіття: квітконіжка за довжиною	середня	5	
16	Листочки оцвітини: за довжиною	довгі	7	
17	Насінина: за довжиною	середня	5	
18	Насінина: за шириною	середня	5	
19	Насіння: маса 1000 шт.	середня	5	
20	Цибулина: форма	циліндрична	3	
21	Рослина: чоловіча стерильність	відсутня	1	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 20,4. Товарна врожайність, т/га – 20,2. Тривалість вегетації рослин, діб – 150. Довжина рослини, см – 95. Довжина листка, см – 35. Довжина несправжнього стебла, см – 15. Діаметр несправжнього стебла, см – 0,8. Вміст у листках: вітаміну С, мг/100 г с.р. – 22,9, загального цукру, % – 2,7, сухої речовини, % – 11,8. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): гнилі – 7. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): цибулева муха – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Цибуля слизун *Allium nutans* L.

Заявка № 19444001 Назва сорту: Удай **Заявник (код):** 1708 **Власник сорту (код):** 1708

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 17.11.2020 **Патент № 200733**

Дата пріоритету: 08.07.2019

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 17.11.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200961

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: за висотою	висока	7	
2	Рослина: довжина псевдостебла з листками	висока	7	
3	Рослина: кількість листків	багато	7	
4	Листок: положення в просторі	напівпряме	2	
5	Листки: інтенсивність воскового нальоту	помірний	5	
6	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	темне	7	
7	Листки: відтінок зеленого забарвлення	голубуватий	3	
8	Листок: за довжиною	довгий	7	
9	Листок: за шириною	середній	5	
10	Листок: викривлення	помірне	5	
11	Псевдостебло: за довжиною	коротке	3	
12	Псевдостебло: довжина етіольованої частини	середня	5	
13	Псевдостебло: за діаметром	тонке	3	
14	Псевдостебло: наявність антоціанового забарвлення	відсутнє	1	
15	Псевдостебло: утворення повітряних цибулинок	дуже слабке	3	
16	Рослина: ступінь стрілкування	сильне	7	
17	Квітконос: за довжиною	довгий	7	
18	Час початку цвітіння	середній	5	
19	Суцвіття: за формою	округле	2	
20	Суцвіття: діаметр	середній	5	
21	Суцвіття: за щільністю	щільне	7	
22	Суцвіття: кількість квіток	багато	7	
23	Суцвіття: квітконіжка за довжиною	середня	5	
24	Суцвіття: квітконіжка за формою у поперечному перерізі	округла	2	
25	Насіння: маса 1000 шт.	середня	5	
26	Кількість псевдопагонів у кущі	багато	7	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 25,8. Товарна врожайність, т/га – 25. Тривалість вегетації рослин, діб – 130. Довжина рослини, см – 98. Довжина листка, см – 55. Вміст у листках: вітаміну С, мг/100 г – 26,6, сухої речовини, % – 11,4, загального цукру, % – 3.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ: ІНШІ

Гісон лікарський



Вид: Гісоп лікарський *Hyssopus officinalis* L.

Заявка № 19450001 Назва сорту: Небокрай **Заявник (код):** 1708 **Власник сорту (код):** 1708

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 05.10.2020 **Патент № 200634**

Дата пріоритету: 08.07.2019

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.10.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200805

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Сходи: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Рослина: за висотою	середня	5	
3	Рослина: габітус	напівпрямий	2	
4	Рослина: діаметр куща	великий	7	
5	Рослина: кількість стебел	середня	5	
6	Рослина: залістяність	сильна	7	
7	Стебло: за діаметром	середнє	5	
8	Стебло: кількість гілочок 1-го порядку	мала	3	
9	Листки: положення	напіввертикальне	2	
10	Листок: опушення	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Листок: забарвлення	темно-зелене з сизим відтінком	4	
12	Листок: за довжиною	довгий	7	
13	Листок: за шириною	широкий	7	
14	Листкова пластинка: глясுவатість	сильна	7	
15	Листкова пластинка: пухирчастість	слабка	3	
16	Рослина: час початку цвітіння (від відновлення вегетації)	ранній	3	
17	Рослина: тривалість періоду цвітіння	довга	7	
18	Суцвіття (несправжня кільчатка): кількість квіток	середня	5	
19	Квітка: за довжиною	середня	5	
20	Суцвіття: за довжиною	середнє	5	
21	Суцвіття: за щільністю	щільне	7	
22	Суцвіття: квітки за забарвленням	сині	3	
23	Рослина: час настання повної стиглості плодів	пізній	7	
24	Насіння: маса 1000 шт.	середня	5	
25	Насінина: за довжиною	коротка	1	
26	Насінина: за шириною	середня	3	
27	Вміст ефірної олії в сирій масі	середній	5	
28	Ефірна олія: вміст ізопінокамфону	середній	5	
29	Ефірна олія: вміст пінокамфону	середній	5	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Висота рослин, см – 70,0. Тривалість періоду вегетації, діб – 150. Тривалість періоду від весняного відростання до цвітіння в другий та наступні роки вегетації, діб – 65. Урожайність надземної маси, т/га – 28,7. Вміст у зеленій масі у період до цвітіння: сухої речовини, % – 12,31, загального цукру, % – 2,46, аскорбінової кислоти, мг/100 г – 15,71. Вміст у зеленій масі у фазі масового цвітіння: сухої речовини, % – 36,08, загального цукру, % – 3,76, аскорбінової кислоти, мг/100 г – 14,14. Продуктивне довголіття, років – 5. Стійкість до вилягання, бал (1–9) – 7. Зимостійкість, бал (1–9) – 9. Посухостійкість, бал (1–9) – 7. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками не виявлено.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

ПЛОДОВІ ТА ЯГІДНІ

Аронія чорноплідна
Горіх грецький
Обліпиха крушиновидна
Суниця садова
Яблуня домашня



Вид: Аронія чорноплідна *Aronia melanocarpa* (Michx.) Elliott.

Заявка № 19624001 Назва сорту: Всеслава **Заявник (код):** 2466 **Власник сорту (код):** 2466

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 22.10.2020 **Патент № 200676**

Дата пріоритету: 03.07.2019

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 22.10.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200854

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Кущ: габітус	прямий	1	
2	Кущ: сила росту пагона	велика	7	
3	Пагін однорічний: забарвлення	червоно-буре	1	
4	Кущ: кількість пагонів	велика	7	
5	Листок: за довжиною	довгий	7	
6	Листок: за шириною	широкий	7	
7	Листок: співвідношення довжина / ширина	середнє	5	
8	Листок: форма	еліптична	1	
9	Листок: розсіченість	наявна	9	
10	Листок: опушення нижнього боку	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Листок: глянуватість	наявна	9	
12	Листок: антоціанове забарвлення черешка	наявне	9	
13	Суцвіття (складний щиток): діаметр	великий	7	
14	Суцвіття: за щільністю	щільне	7	
15	Квітка: забарвлення пелюсток	біле	1	
16	Плід: форма	сплюснутоокругла	2	
17	Плід: забарвлення	чорно-пурпурове	1	
18	Плід: діаметр	великий	7	
19	Плід: восковий наліт	наявний	9	
20	Час початку цвітіння	ранній	3	
21	Плоди: час достигання	ранній	3	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Життєва форма: 1 – кущ. Сила росту: 5 – середня. Група стиглості: 3 – рання. Дружність достигання ягід, бал (1–9) – 7. Урожайність ягід, т/га – 15,0. Продуктивність куща/дерева, кг – 9,0. Вміст в ягоді: пектинових речовин, % – 0,85, фенольних сполук, мг/100 г – 456,8, вітаміну Р, мг/100 г – 314,6, вітаміну С, мг/100 г – 86,0, загального цукру, % – 9,5. Загальна кислотність, % – 2,7. Дегустаційна оцінка, бал (1–9) – 7. Зимостійкість, бал (1–9) – 9. Посухостійкість, бал (1–9) – 7. Збудників хвороб не виявлено. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): плодова горобинна міль (*Argyresthia conjugella* Zeller) – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Горіх грецький *Juglans regia* L.**Заявка № 19284005 Назва сорту:** Подільський **Заявник (код):** 2623 2466 **Власник сорту (код):** 2623 2466**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 22.10.2020 **Патент №** 200684**Дата пріоритету:** 03.07.2019**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 22.10.2020**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 200858**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Дерево: за силою росту	середнє	5	
2	Дерево: габітус	прямий	1	
3	Дерево: щільність розміщення гілок	середня	5	
4	Дерево: переважаюче розташування генеративних бруньок (плодоношення по периферії дерева)	на верхівці однорічного пагона	1	
5	Однорічний пагін: забарвлення	зелено-коричнє	3	
6	Листок: форма бічних листочків	еліптична	5	
7	Квітка: кількість чоловічих суцвіть	середня	5	
8	Горіх: розмір	дуже великий	9	
9	Горіх: форма у поздовжньому розрізі (через шов)	широкоеліптична	7	
10	Горіх: форма в поздовжньому розрізі перпендикулярно до шва	широкоеліптична	7	
11	Горіх: форма у поперечному перерізі	округла	2	
12	Горіх: коефіцієнт округлості	середній	5	
13	Горіх: форма основи перпендикулярно до шва	зрізана	3	
14	Горіх: форма верхівки (як для 13)	виймча	4	
15	Горіх: виступ апікального кінчика	середній	5	
16	Горіх: положення «сідельця» на шві	у верхній половині	1	
17	Горіх: помітність «сідельця» на шві	слабка	3	
18	Горіх: «сідельце» на шві за шириною	середнє	5	
19	Горіх: боріздка вздовж «сідельця» на шві за глибиною	мілка	3	
20	Горіх: структура поверхні шкаралупи	рельєфна	4	
21	Горіх: шкаралупа за товщиною	тонка	3	
22	Горіх: міцність з'єднання двох половинок шкаралупи	дуже слабка	1	
23	Горіх: первинна і вторинна роз'єднуючі перетинки за товщиною	тонкі	3	
24	Ядро: легкість видалення зі шкаралупи	дуже легко	1	
25	Ядро: за інтенсивністю основного забарвлення	слабка	3	
26	Ядро: розмір	великий	7	
27	Ядро: відсоткове відношення до загальної маси горіха	середнє	5	
28	Час досягання	середній	5	
29	Час початку листопаду	середній	5	
30	Листок: стійкість до опадання	не стійкий	1	
31	Оплодень: стійкість до опадання	не стійкий	1	
32	Час розпускання вегетативних бруньок	середній	5	
33	Час цвітіння чоловічих квіток	ранній	3	
34	Час цвітіння жіночих квіток	від раннього до середнього	4	
35	Час цвітіння чоловічих квіток порівняно із жіночими	раніше (протандрічний)	1	

За інформацією наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Середня врожайність, т/га – 6,6. Середній урожай з дерева, кг – 95,0. Середня маса плоду, г – 24,1. Зимостійкість, бал (1–9) – 9. Посухостійкість, бал (1–9) – 9. Настання знімальної стиглості, діб – 137. Виповненість горіха, бал (1–9) – 8. Твердість шкаралупи, бал (1–9) – 5. Вихід ядра, % – 46,1. Легкість видалення ядра, бал (1–9) – 9. Вміст жиру, % – 67,13, білка, % – 17,81, вуглеводів, % – 11,10. Дегустаційна оцінка, бал (1–9) – 8. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): горіхова попелиця – 9, горіхова міль – 9. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): бура плямистість – 8, чорна плямистість – 9. Група досягання – сс.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Горіх грецький *Juglans regia* L.

Заявка № 19284003 Назва сорту: Подільський Бокоплідний **Заявник (код):** 2623 2466

Власник сорту (код): 2623 2466

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 22.10.2020 **Патент №** 200682

Дата пріоритету: 03.07.2019

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 22.10.2020

Свідчення про державну реєстрацію № 200859

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Дерево: за силою росту	слабке	3	
2	Дерево: габітус	напівпрямий	2	
3	Дерево: щільність розміщення гілок	середня	5	
4	Дерево: переважаюче розташування генеративних бруньок (плодоношення на бічних плодкових пагонах)	уздовж однорічного пагона	3	
5	Однорічний пагін: забарвлення	зелено-коричнєве	3	
6	Листок: форма бічних листочків	еліптична	5	
7	Квітка: кількість чоловічих суцвіть	мала	3	
8	Горіх: розмір	середній	5	
9	Горіх: форма у поздовжньому розрізі (через шов)	яйцеподібна	4	
10	Горіх: форма в поздовжньому розрізі перпендикулярно до шва	яйцеподібна	4	
11	Горіх: форма у поперечному перерізі	еліптична	3	
12	Горіх: коефіцієнт округлості	малий	3	
13	Горіх: форма основи перпендикулярно до шва	округла	2	
14	Горіх: форма верхівки (як для 13)	округла	2	
15	Горіх: виступ апікального кінчика	середній	5	
16	Горіх: положення «сідельця» на шві	за всією довжиною	3	
17	Горіх: помітність «сідельця» на шві	сильна	7	
18	Горіх: «сідельце» на шві за шириною	середнє	5	
19	Горіх: боріздка вздовж «сідельця» на шві за глибиною	середня	5	
20	Горіх: структура поверхні шкаралупи	помірно борозенчаста	2	
21	Горіх: шкаралупа за товщиною	дуже тонка	1	
22	Горіх: міцність з'єднання двох половинок шкаралупи	дуже слабка	1	
23	Горіх: первинна і вторинна роз'єднуючі перетинки за товщиною	тонкі	3	
24	Ядро: легкість видалення зі шкаралупи	дуже легко	1	
25	Ядро: за інтенсивністю основного забарвлення	слабка	3	
26	Ядро: розмір	середній	5	
27	Ядро: відсоткове відношення до загальної маси горіха	дуже велике	9	
28	Час досягання	від раннього до середнього	4	
29	Час початку листопаду	середній	5	
30	Листок: стійкість до опадання	не стійкий	1	
31	Оплодень: стійкість до опадання	не стійкий	1	
32	Час розпускання вегетативних бруньок	середній	5	
33	Час цвітіння чоловічих квіток	від раннього до середнього	4	
34	Час цвітіння жіночих квіток	від раннього до середнього	4	
35	Час цвітіння чоловічих квіток порівняно із жіночими	одночасно (гомогамний)	2	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Середня врожайність, т/га – 6,5. Середній урожай з дерева, кг – 23,0. Середня маса плоду, г – 12,0. Зимостійкість, бал (1–9) – 9. Посухостійкість, бал (1–9) – 9. Настання знімальної стиглості, діб – 124. Виповненість горіха, бал (1–9) – 8. Твердість шкаралупи, бал (1–9) – 7. Вихід ядра, % – 67,0. Легкість видалення ядра, бал (1–9) – 9. Вміст жиру, % – 66,15, білка, % – 18,27, вуглеводів, % – 10,84. Дегустаційна оцінка, бал (1–9) – 8. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): горіхова попелиця – 9, горіхова міль – 9. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): бура плямистість – 8, чорна плямистість – 8. Група досягання – рсдн.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Горіх грецький *Juglans regia* L.**Заявка № 19284004 Назва сорту:** Стрижавський Паперовий **Заявник (код):** 2623 2466**Власник сорту (код):** 2623 2466**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 22.10.2020 **Патент №** 200683**Дата пріоритету:** 03.07.2019**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 22.10.2020**Свідцтво про державну реєстрацію №** 200860**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Дерево: за силою росту	слабке	3	
2	Дерево: габітус	розлогий	3	
3	Дерево: щільність розміщення гілок	середня	5	
4	Дерево: переважаюче розташування генеративних бруньок (плодоношення на бічних плодкових пагонах)	уздовж однорічного пагона	3	
5	Однорічний пагін: забарвлення	зелено-коричнє	3	
6	Листок: форма бічних листочків	еліптична	5	
7	Квітка: кількість чоловічих суцвіть	мала	3	
8	Горіх: розмір	середній	5	
9	Горіх: форма у поздовжньому розрізі (через шов)	широкоеліптична	7	
10	Горіх: форма в поздовжньому розрізі перпендикулярно до шва	широкоеліптична	7	
11	Горіх: форма у поперечному перерізі	округла	2	
12	Горіх: коефіцієнт округлості	середній	5	
13	Горіх: форма основи перпендикулярно до шва	округла	2	
14	Горіх: форма верхівки (як для 13)	округла	2	
15	Горіх: виступ апікального кінчика	середній	5	
16	Горіх: положення «сідельця» на шві	у верхній половині	1	
17	Горіх: помітність «сідельця» на шві	слабка	3	
18	Горіх: «сідельце» на шві за шириною	середнє	5	
19	Горіх: боріздка вздовж «сідельця» на шві за глибиною	середня	5	
20	Горіх: структура поверхні шкаралупи	помірно борозенчаста	2	
21	Горіх: шкаралупа за товщиною	дуже тонка	1	
22	Горіх: міцність з'єднання двох половинок шкаралупи	дуже слабка	1	
23	Горіх: первинна і вторинна роз'єднуючі перетинки за товщиною	тонкі	3	
24	Ядро: легкість видалення зі шкаралупи	дуже легко	1	
25	Ядро: за інтенсивністю основного забарвлення	слабка	3	
26	Ядро: розмір	середній	5	
27	Ядро: відсоткове відношення до загальної маси горіха	велике	7	
28	Час досягання	від раннього до середнього	4	
29	Час початку листопаду	середній	5	
30	Листок: стійкість до опадання	не стійкий	1	
31	Оплодень: стійкість до опадання	не стійкий	1	
32	Час розпускання вегетативних бруньок	середній	5	
33	Час цвітіння чоловічих квіток	від раннього до середнього	4	
34	Час цвітіння жіночих квіток	від раннього до середнього	4	
35	Час цвітіння чоловічих квіток порівняно із жіночими	одночасно (гомогамний)	2	

За інформацією наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Середня врожайність, т/га – 5,1. Середній урожай з дерева, кг – 18,0. Середня маса плоду, г – 12,0. Зимостійкість, бал (1–9) – 9. Посухостійкість, бал (1–9) – 9. Настання знімальної стиглості, діб – 127. Виповненість горіха, бал (1–9) – 9. Твердість шкаралупи, бал (1–9) – 7. Вихід ядра, % – 54,3. Легкість видалення ядра, бал (1–9) – 9. Вміст жиру, % – 65,24, білка, % – 18,63, вуглеводів, % – 10,30. Дегустаційна оцінка, бал (1–9) – 8. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): горіхова попелиця – 9, горіхова міль – 9. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): бура плямистість – 8, чорна плямистість – 9. Група досягання – рсдн.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Обліпіха крушиновидна *Hippophae rhamnoides* L.

Заявка № 18299008 Назва сорту: Обрій **Заявник (код):** 1601 **Власник сорту (код):** 1601

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 09.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201209

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: стать	чоловіча	2	
2	Рослина: життєва форма	дерево	1	
3	Рослина: положення гілок	вертикальне	1	
4	Рослина: за силою росту	дуже сильна	9	
5	Рослина: щільність крони	щільна	7	
6	Рослина: розташування суцвіть	на однорічних і старіших пагонах	2	
7	Однорічний пагін: за товщиною	середній	5	
8	Пагін: кількість колючок (від середньої частини до верхівки)	мала	3	
9	Пагін: колючки за довжиною	короткі	3	
10	Листкова пластинка: форма	вузькоеліптична	2	
11	Листкова пластинка: розмір	великий	7	
12	Листкова пластинка: хвилястість краю	відсутня	1	
13	Листкова пластинка: забарвлення верхнього боку	зелене	1	
14	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	середня	2	
15	Листкова пластинка: опушення нижнього боку	слабке	3	
16	Плід: розмір	ознака не визначається	0	
17	Плід: форма	ознака не визначається	0	
18	Плід: забарвлення шкірки	ознака не визначається	0	
19	Плід: опушення	ознака не визначається	0	
20	Плід: плодоніжка за довжиною	ознака не визначається	0	
21	Час початку цвітіння	пізній	7	
22	Час початку дозрівання плодів	ознака не визначається	0	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Життєва форма: 9 – дерево. Час початку цвітіння: 7 – пізній. Зимостійкість, бал (1–9) – 8. Посухостійкість, бал (1–9) – 9. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): парша – 8, кільцевий некроз – 8, фузаріоз сіянців – 9. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): обліпіховий галовий кліщ – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Суниця садова *Fragaria ananassa* Duch.

Заявка № 19294001 Назва сорту: ФІ1309 Заявник (код): 1993 Власник сорту (код): 1993

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 24.11.2020 Патент № 200810

Дата пріоритету: 17.04.2019

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус	напівпрямий	2	
2	Рослина: щільність розміщення листків	середня	5	
3	Рослина: сила росту	сильна	7	
4	Рослина: положення суцвіття відносно листків	на одному рівні	2	
5	Рослина: кількість вусів	велика	7	
6	Вуса: антоціанове забарвлення	помірне	5	
7	Вуса: щільність опушення	середня	5	
8	Листок: розмір	великий	7	
9	Листок: забарвлення верхнього боку	зелене	3	
10	Листок: пухирчастість	помірна	2	
11	Листок: глянуватість	сильна	3	
12	Листок: строкатість	відсутня	1	
13	Верхівковий листочок: довжина відносно ширини	довша	3	
14	Верхівковий листочок: форма основи	тупа	2	
15	Верхівковий листочок: форма краю	зубчаста	1	
16	Верхівковий листочок: форма поперечного перерізу	увігнута	1	
17	Черешок: за довжиною	середній	5	
18	Черешок: положення волосків	горизонтальне	3	
19	Прилисток: антоціанове забарвлення	помірне	5	
20	Суцвіття: кількість квіток	середня	5	
21	Квітконіжка: положення волосків	спрямоване догори	1	
22	Квітка: діаметр	середній	5	
23	Квітка: розташування пелюсток віночка	торкаються	2	
24	Квітка: розмір чашечки відносно віночка	менший	1	
25	Квітка: тичинки	наявні	9	
26	Пелюстка: довжина відносно ширини	коротша	2	
27	Пелюстка: забарвлення верхнього боку	біле	2	
28	Плід: довжина відносно ширини	довша	4	
29	Плід: розмір	великий	7	
30	Плід: форма	конічна	2	
31	Плід: різниця форми між верхівковими та іншими плодами	помірна	5	
32	Плід: забарвлення	червоне	5	
33	Плід: рівномірність забарвлення	злегка нерівномірний	2	
34	Плід: глянуватість	сильна	3	
35	Плід: нерівність поверхні	слабко виражена	2	
36	Плід: ширина вільної від сім'янок зони	середня	5	
37	Плід: положення сім'янок	нарівні з поверхнею	2	
38	Плід: положення чашечки	на рівні плоду	2	
39	Плід: положення чошолістків	донизу	3	
40	Плід: діаметр чашечки порівняно з діаметром плоду	дещо більший	4	
41	Плід: прилягання чашечки до плоду	сильне	7	
42	Плід: твердість	помірна	5	
43	Плід: забарвлення м'якоті (за винятком серцевини)	червоне	5	
44	Плід: забарвлення серцевини	червоне	3	
45	Плід: повітряна комірка	середня	2	
46	Час початку цвітіння	середній	5	
47	Час початку достигання плодів	середній	5	
48	Тип плодоношення	неремонтантний	1	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожайність, т/га – 30,0. Середня маса ягоди, г – 21,0. Вміст вітаміну С, мг/100 г сирової маси – 57,3, загального цукру, % – 5,1, пектинових речовин, % – 0,84, сухих розчинних речовин, % – 12,41, фенольних сполук, мг/100 г сирової маси – 243,0. Загальна кислотність, % – 0,43. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса (*Sphaerotheca fragariae* Magn. f. Jacz) – 8, сіра гниль (*Botrytis cinerea* Pers.) – 8, бура плямистість (*Marssonina potentillae* (Desm.) P. Magn. f. *fragariae* (Lib.) Ohl.) – 7, біла плямистість (*Ramularia tulasnei* Sacc.) – 7. Стійкість проти пошкодження (заселення) шкідниками, бал (1–9): малиново-суничний довгоносик (*Anthonomus rubi* Hrbst.) – 7, суничний кліщ (*Tarsonemus fragariae* Zimm.) – 7. Зимостійкість, бал (1–9) – 7. Ступінь підмерзання, бал (1–9) – 1. Стійкість квіток до пізньо-весняних заморозків, бал (1–9) – 8. Ремонтантність: 1 – відсутня. Стійкість до посухи, бал (1–9) – 7. Група достигання: 4 – середня. Транспортельність ягід, бал (1–9) – 8. Схема садіння, м – 1,0 × 0,25. Загальна дегустаційна оцінка ягід, бал (1–9) – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Яблуня домашня *Malus domestica* Borkh.

Заявка № 18263003 Назва сорту: Дміана **Заявник (код):** 1601 **Власник сорту (код):** 1601

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 09.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201266

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Дерево: сила росту	слабка	3	
2	Дерево: тип	розгалужений	2	
3	Тільки для сортів з розгалуженим типом дерева. Дерево: габітус	розлогий	2	
4	Дерево: тип плодоношення	на коротких і довгих пагонах	2	
5	Однорічний пагін: за товщиною	середній	5	
6	Однорічний пагін: міжвузля за довжиною	середні	5	
7	Однорічний пагін: забарвлення з під сонячного боку	помірно-коричнєве	4	
8	Однорічний пагін: опушення (на периферичній половині пагона)	помірне	5	
9	Однорічний пагін: кількість сочевичок	мала	1	
10	Листкова пластинка: положення відносно пагона	спрямоване назовні	2	
11	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
12	Листкова пластинка: за шириною	широка	7	
13	Листкова пластинка: відношення довжина / ширина	мале	3	
14	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
15	Листкова пластинка: форма краю (верхня половина)	пилчастий тип 1	3	
16	Листкова пластинка: опушення нижнього боку	відсутнє або слабке	1	
17	Черешок: за довжиною	середній	5	
18	Черешок: площа антоціанового забарвлення від основи	велика	7	
19	Квітка: переважаюче забарвлення у стадії пуп'янка	світло-рожеве	3	
20	Квітка: діаметр (пелюстки розправлені)	середній	5	
21	Квітка: розташування пелюсток	перекриваються	3	
22	Квітка: положення приймочок відносно пиляків	вище	3	
23	Молодий плід: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
24	Плід: розмір	від малого до середнього	4	
25	Плід: за висотою	середній	5	
26	Плід: діаметр	середній	5	
27	Плід: відношення висота / діаметр	середнє	5	
28	Плід: основна форма	конічна	2	
29	Плід: ребристість	відсутня або слабка	1	
30	Плід: огрубіння й нерівності на кінці чашечки	помірні	2	
31	Плід: розмір чашечки	великий	7	
32	Плід: чашолисток за довжиною	середній	5	
33	Плід: наліт на шкірці	відсутній або слабкий	1	
34	Плід: маслянистість шкірки	помірна	2	
35	Плід: основне забарвлення	жовто-зелене	5	
36	Плід: відносна площа покривного забарвлення	середня	5	
37	Плід: відтінок покривного забарвлення (без нальоту)	рожево-червоний	2	
38	Плід: інтенсивність покривного забарвлення	помірна	5	
39	Плід: характер покривного забарвлення	з рум'янцем, смугастий і крапчастий	7	
40	Плід: смуги за шириною	середні	5	
41	Плід: площа заіржавлення навколо плдоніжки	відсутня або мала	1	
42	Плід: площа заіржавлення на щічках	відсутня або мала	1	
43	Плід: площа заіржавлення навколо чашечки	відсутня або мала	1	
44	Плід: кількість сочевичок	велика	7	
45	Плід: розмір сочевичок	великий	7	
46	Плід: плдоніжка за довжиною	середня	5	
47	Плід: плдоніжка за товщиною	середня	5	
48	Плід: лійка плдоніжки за глибиною	глибока	7	
49	Плід: лійка плдоніжки за шириною	середня	5	
50	Плід: причашечкове заглиблення за глибиною	середнє	5	
51	Плід: причашечкове заглиблення за шириною	широке	7	
52	Плід: твердість м'якоті	дуже тверда	9	
53	Плід: забарвлення м'якоті	кремове	2	
54	Плід: відкритість насінних комірок (у поперечному перерізі)	напіввідкриті	2	
55	Час початку цвітіння	середній	5	
56	Час збирання врожаю	середній	5	
57	Час споживчої стиглості	середній	5	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожайність, т/га – 35,8. Середній урожай з дерева, кг – 48,4. Маса плоду середня, г – 155,0, максимальна, г – 190,0. Вміст вітаміну С, мг/100 г сирової маси – 1,75, загального цукру, % – 12,62, пектинових речовин, % – 0,84, сухих розчинних речовин, % – 15,2. Загальна кислотність, % – 0,35. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса (*Podosphaera leucotricha* (Ellis & Everh.) E.S. Salmon.) – 9, парша (*Venturia inaequalis* (Cooke) G. Winter.) – 9, моніліоз (*Monilinia fructigena* Pers.) – 7. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): сіра попелиця яблуні (*Dysaphis devecta* Walk.) – 5, яблунева плодожерка (*Carposcapsa pomonella* L.) – 4. Зимостійкість, бал (1–9) – 8. Ступінь підмерзання, бал (1–9) – 1. Вимерзання квіткових бруньок, бал (1–9) – 1. Стійкість до посухи, бал (1–9) – 9. Група стиглості: 9 – пізньозимовий. Напрямок використання: 3 – універсальний. Тривалість періоду зберігання, діб – 210. Транспортувальність, бал (1–9) – 9. Схема садіння, м – 3 × 4,5. Загальна дегустаційна оцінка плодів, бал (1–9) – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Яблуня домашня *Malus domestica* Borkh.

Заявка № 18263006 Назва сорту: Мілана **Заявник (код):** 348 **Власник сорту (код):** 348

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 09.10.2020 **Патент № 200674**

Дата пріоритету: 17.12.2018

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 09.10.2020

Свідство про державну реєстрацію № 200845

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Дерево: сила росту	помірна	5	
2	Дерево: тип	розгалужений	2	
3	Тільки для сортів з розгалуженим типом дерева. Дерево: габітус	плакучий	4	
4	Дерево: тип плодоношення	на коротких і довгих пагонах	2	
5	Однорічний пагін: за товщиною	середній	5	
6	Однорічний пагін: міжвузля за довжиною	середні	5	
7	Однорічний пагін: забарвлення з під сонячного боку	помірно-коричневе	4	
8	Однорічний пагін: опушення (на периферичній половині пагона)	помірне	5	
9	Однорічний пагін: кількість сочевичок	середня	3	
10	Листкова пластинка: положення відносно пагона	спрямоване догори	1	
11	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
12	Листкова пластинка: за шириною	широка	7	
13	Листкова пластинка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
14	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
15	Листкова пластинка: форма краю (верхня половина)	городчаста	1	
16	Листкова пластинка: опушення нижнього боку	сильне	3	
17	Черешок: за довжиною	середній	5	
18	Черешок: площа антоціанового забарвлення від основи	середня	5	
19	Квітка: переважає забарвлення у стадії пуп'янка	темно-рожеве	4	
20	Квітка: діаметр (пелюстки розправлені)	середній	5	
21	Квітка: розташування пелюсток	вільне	1	
22	Квітка: положення приймочок відносно пиляків	вище	3	
23	Молодий плід: антоціанове забарвлення	помірне	5	
24	Плід: розмір	від малого до середнього	4	
25	Плід: за висотою	середній	5	
26	Плід: діаметр	середній	5	
27	Плід: відношення висота / діаметр	велике	7	
28	Плід: основна форма	циліндрична	4	
29	Плід: ребристість	помірна	2	
30	Плід: огрубіння й нерівності на кінці чашечки	помірні	2	
31	Плід: розмір чашечки	середній	5	
32	Плід: чашолисток за довжиною	короткий	3	
33	Плід: наліт на шкірці	помірний	2	
34	Плід: маслянистість шкірки	помірна	2	
35	Плід: основне забарвлення	жовто-зелене	5	
36	Плід: відносна площа покривного забарвлення	мала	3	
37	Плід: відтінок покривного забарвлення (без нальоту)	рожево-червоний	2	
38	Плід: інтенсивність покривного забарвлення	помірна	5	
39	Плід: характер покривного забарвлення	з рум'янцем, смугастий і крапчастий	7	
40	Плід: смуги за шириною	широкі	7	
41	Плід: площа заіржавлення навколо плідоніжки	відсутня або мала	1	
42	Плід: площа заіржавлення на щічках	відсутня або мала	1	
43	Плід: площа заіржавлення навколо чашечки	відсутня або мала	1	
44	Плід: кількість сочевичок	середня	5	
45	Плід: розмір сочевичок	середній	5	
46	Плід: плідоніжка за довжиною	середня	5	
47	Плід: плідоніжка за товщиною	середня	5	
48	Плід: лійка плідоніжки за глибиною	неглибока	3	
49	Плід: лійка плідоніжки за шириною	середня	5	
50	Плід: причашечкове заглиблення за глибиною	середнє	5	
51	Плід: причашечкове заглиблення за шириною	середнє	5	
52	Плід: твердість м'якоті	середня	5	
53	Плід: забарвлення м'якоті	жовтувате	3	
54	Плід: відкритість насінних комірок (у поперечному перерізі)	повністю відкриті	3	
55	Час початку цвітіння	пізній	7	
56	Час збирання врожаю	середній	5	
57	Час споживої стиглості	від раннього до середнього	4	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожайність, т/га – 67,0. Середній урожай з дерева, кг – 100,0. Маса плоду середня, г – 97,8, максимальна, г – 118,4. Вміст вітаміну С, мг/100 г сирої маси – 3,36, загального цукру, % – 5,02, пектинових речовин, % – 0,84, сухих розчинних речовин, % – 16,95. Загальна кислотність, % – 2,1. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса (*Podosphaera leucotricha* (Ellis & Everh.) E.S. Salmon.) – 7, парша (*Venturia inaequalis* (Cooke) G. Winter.) – 7, моніліоз (*Monilinia fructigena* Pers.) – 8. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): сіра попелиця яблуні (*Dysaphis devecta* Walk.) – 7, яблунева плодожерка (*Carpocapsa pomonella* L.) – 7. Зимостійкість, бал (1–9) – 8. Ступінь підмерзання, бал (1–9) – 2. Вимерзання квіткових бруньок, бал (1–9) – 1. Стійкість до посухи, бал (1–9) – 9. Група стиглості: 4 – ранньоосінній. Напрямок використання: 3 – універсальний. Тривалість періоду зберігання, днів – 45. Транспортабельність, бал (1–9) – 8. Схема садіння, м – 3 × 5. Загальна дегустаційна оцінка плодів, бал (1–9) – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

ДЕКОРАТИВНІ ТА ЛІКАРСЬКІ

*Півонія
Троянда*



Вид: Півонія *Paeonia* L.**Заявка № 16329002 Назва сорту:** Загадка Херсонеса **Заявник (код):** 348 **Власник сорту (код):** 348**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 18.12.2020**Свідчення про державну реєстрацію № 201210****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: за висотою	середня	5	
2	Рослина: габітус	напіврозлогий	2	
3	Стебло: наявність антоціанового забарвлення	наявне	9	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: антоціанове забарвлення черешка	наявне	9	
6	Листок: хвилястість краю листової пластинки	відсутня або дуже слабка	3	
7	Листок: опушення нижнього боку	відсутнє	1	
8	Квітка: за типом	повна	3	
9	Квітка: кількість пелюсток	дуже велика	9	
10	Тільки для сортів з японською формою квітки: видозміна тичинок за формою	ознака не визначається	0	
11	Квітка: діаметр	середній	5	
12	Квітка: за профілем	чашкоподібна	2	
13	Квітка: кількість на стеблі	декілька	2	
14	Квітка: група кольорів	рожева	2	
15	Пелюстка крайова: забарвлення	світло-червоно-рожеве	16	
16	Пелюстка центральна: забарвлення	світло-червоно-рожеве	16	
17	Пелюстка центральна: за шириною	широка	7	
18	Пелюстка крайова: за ступенем розсіченості краю	цілісна	1	
19	Пелюстка центральна: за ступенем розсіченості краю	цілісна	3	
20	Квітка: стійкість забарвлення до вигорання	сильна	3	
21	Квітка: аромат	слабкий	3	
22	Квітка: тичинки	відсутні	1	
23	Тичинка: домінуюче забарвлення тичинкової нитки	ознака не визначається	0	
24	Квітка: маточки	відсутні	1	
25	Маточка: домінуюче забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
26	Маточка: опушення	ознака не визначається	0	
27	Плодоношення	відсутнє	1	
28	Час початку цвітіння	пізній	9	

За інформацією наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Декоративність, бал (11–99) – 91. Життєва форма: 1 – трав'яниста. Висота рослини, см – 70,0. Діаметр квітки, см – 16,0. Тривалість періоду цвітіння рослини, днів – 8. Коефіцієнт вегетативного розмноження, значення – 75. Морозостійкість, бал (1–9) – 9. Зимостійкість, бал (1–9) – 9. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): сіра гниль – 8. Стійкість проти пошкодження (заселення) шкідниками, бал (1–9): оленка волохата – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Півонія *Paeonia* L.

Заявка № 16329003 Назва сорту: Корсар **Заявник (код):** 348 **Власник сорту (код):** 348

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201211

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: за висотою	середня	5	
2	Рослина: габітус	розлогий	3	
3	Стебло: наявність антоціанового забарвлення	наявне	9	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: антоціанове забарвлення черешка	наявне	9	
6	Листок: хвилястість краю листової пластинки	відсутня або дуже слабка	3	
7	Листок: опушення нижнього боку	відсутнє	1	
8	Квітка: за типом	повна	3	
9	Квітка: кількість пелюсток	середня	5	
10	Тільки для сортів з японською формою квітки: видозміна тичинок за формою	ознака не визначається	0	
11	Квітка: діаметр	середній	5	
12	Квітка: за профілем	висока сферична (видовжена)	3	
13	Квітка: кількість на стеблі	декілька	2	
14	Квітка: група кольорів	червона	3	
15	Пелюстка крайова: забарвлення	пурпурове	27	
16	Пелюстка центральна: забарвлення	пурпурове	27	
17	Пелюстка центральна: за шириною	середня	5	
18	Пелюстка крайова: за ступенем розсіченості краю	цілісна	1	
19	Пелюстка центральна: за ступенем розсіченості краю	цілісна	3	
20	Квітка: стійкість забарвлення до вигорання	середня	2	
21	Квітка: аромат	специфічний	9	
22	Квітка: тичинки	наявні	9	
23	Тичинка: домінуюче забарвлення тичинкової нитки	рожеве	3	
24	Квітка: маточки	наявні	9	
25	Маточка: домінуюче забарвлення приймочки	кремове	1	
26	Маточка: опушення	відсутнє	1	
27	Плодоношення	наявне	9	
28	Час початку цвітіння	середньоранній	5	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Декоративність, бал (11–99) – 90,0. Життєва форма: 1 – трав'яниста. Висота рослини, см – 75. Діаметр квітки, см – 16. Тривалість періоду цвітіння рослини, днів – 7. Коефіцієнт вегетативного розмноження, % – 85. Морозостійкість, бал (1–9) – 9. Зимостійкість, бал (1–9) – 9. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): сіра гниль – 8. Стійкість проти пошкодження (заселення) шкідниками, бал (1–9): оленка волохата – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Троянда *Rosa* L.

Заявка № 17339008 Назва сорту: КОРкут0159 Заявник (код): 2303 Власник сорту (код): 2303

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.10.2020

Свідство про державну реєстрацію № 200949

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: тип росту	ознака не визначається	0	
2	Рослина: габітус (за винятком плетистих сортів)	ознака не визначається	0	
3	Рослина: за висотою (під час другої хвилі цвітіння)	середня	5	
4	Молодий пагін: антоціанове забарвлення	наявне	9	
5	Молодий пагін: інтенсивність антоціанового забарвлення	середня	5	до сильної
6	Стебло: кількість шипів (за винятком дуже малих і тоненьких, як волосина)	відсутні	1	до малої
7	Шипи: домінуюче забарвлення	червонувате	3	
8	Листок: розмір	середній	5	до великого
9	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
10	Листок: антоціанове забарвлення	ознака не визначається	0	
11	Листок: глясуватість верхнього боку	помірна	5	
12	Листкова пластинка: хвилястість краю	помірна	5	
13	Верхівковий листочок: форма пластинки	еліптична	2	
14	Верхівковий листочок: форма основи пластинки	гостра	1	
15	Верхівковий листочок: форма верхівки пластинки	загострена	1	
16	Квітконосний пагін: квітучі бічні пагони	ознака не визначається	0	
17	Квітконосний пагін: кількість квітучих бічних пагонів	ознака не визначається	0	
18	Лише для сортів з неквітучими бічними пагонами. Квітконосний пагін: кількість квіток	ознака не визначається	0	
19	Лише для сортів з квітучими бічними пагонами. Квітконосний пагін: кількість квіток на пагоні	ознака не визначається	0	
20	Бутон: форма в поздовжньому розрізі	ознака не визначається	0	
21	Квітка: за типом	ознака не визначається	0	
22	Квітка: кількість пелюсток	середня	5	
23	Квітка: група кольору	червона	10	
24	Лише для сортів з повними квітками. Квітка: забарвлення середини	ознака не визначається	0	
25	Лише для сортів з повними квітками. Квітка: щільність пелюсток	ознака не визначається	0	
26	Квітка: діаметр	середній	5	
27	Квітка: форма	неправильно-округла	2	
28	Квітка: профіль верхньої частини	плескато-випуклий	2	
29	Квітка: профіль нижньої частини	випуклий	4	
30	Квітка: аромат	відсутній або дуже слабкий	1	
31	Чашолисток: розчленування	сильне	7	
32	Пелюстка: послідовне розгортання	наявне	9	
33	Пелюстка: форма	округла	5	
34	Пелюстка: зубчастість	відсутня або дуже слабка	1	до слабкої
35	Пелюстка: завершення країв	помірне	5	
36	Пелюстка: хвилястість	слабка	3	
37	Пелюстка: розмір	ознака не визначається	0	
38	Пелюстка: за довжиною	середня	5	до довгої
39	Пелюстка: за шириною	середня	5	до широкої
40	Пелюстка: кількість кольорів на внутрішньому боці (за виключенням плями на основі)	один	1	
41	Лише для сортів з одним забарвленням на внутрішньому боці пелюстки. Пелюстка: розміщення забарвлення (за винятком плями на основі)	рівномірне	2	
42	Пелюстка основне забарвлення на внутрішньому боці (основне забарвлення з найбільшою площею зайнятої поверхні)	червоне	21	
43	Лише для сортів з двома або більше кольорами з внутрішнього боку пелюстки. Пелюстка: вторинне забарвлення (за виключенням плями на основі)	ознака не визначається	0	
44	Лише для сортів з двома або більше кольорами з внутрішнього боку. Пелюстка: третинне забарвлення (за виключенням плями на основі)	ознака не визначається	0	
45	Тільки для різнокольорових сортів. Пелюстка: розташування вторинного забарвлення на внутрішньому боці	ознака не визначається	0	
46	Тільки для різнокольорових сортів. Пелюстка: розташування третинного забарвлення на внутрішньому боці	ознака не визначається	0	
47	Пелюстка: пляма на основі з внутрішнього боку	відсутня	1	
48	Пелюстка: розмір плям на основі з внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
49	Пелюстка: забарвлення плям на основі з внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
50	Пелюстка: основне забарвлення зовнішнього боку (тільки якщо чітко відрізняється від забарвлення внутрішнього боку)	ознака не визначається	0	
51	Зовнішня тичинка: домінуюче забарвлення тичинкової нитки	червоне	7	
52	Плід: розмір (пелюстки обпали)	ознака не визначається	0	
53	Плід (гіпантій): форма поздовжнього розрізу	ознака не визначається	0	
54	Плід (гіпантій): забарвлення під час достигання	ознака не визначається	0	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Висота рослини, см – 140,0. Кількість квіток на пагоні, шт. – 1. Діаметр квітки, см – 5,0. Повнота квітки (кількість пелюсток), шт. – 45. Аромат квітки, бал (1–9) – 1. Тривалість цвітіння рослини, діб – 45. Зимостійкість, бал (1–9) – 5. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): іржа (*Phragmidium disciflorum* Y.) – 9, борошниста роса (*Sphaerotheca pannosa* var. *rosae* Wor.) – 7, інфекційний опік (*Coniothyrium wernsdorffii* Lanb.) – 8, чорна плямистість (*Marssonina rosae* (Lib.) Died.) – 9, сіра гниль (*Botrytis cinerea* Pers.) – 7. Стійкість проти пошкодження (заселення) шкідниками, бал (1–9): трояндова цикадка (*Typhlocyba rosae* L.) – 9, трояндова попелиця (*Macrosiphum rosae* L.) – 9, оленка волохата (*Epicometis hirta* Poda) – 9, бронзівка золотава (*Cetonia aurata* L.) – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЗГр.

Інші

Павловнія



Вид: Павловнія *Paulownia* Sieb. et Zucc.

Заявка № 20649002 Назва сорту: ЗЕ ПРО **Заявник (код):** 2692 **Власник сорту (код):** 2692

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 25.11.2020 **Патент №** 200779

Дата пріоритету: 10.04.2020

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 20.11.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200904

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: весняне відростання пагона	середнє	5	
2	Листок: черешок за довжиною	довгий	7	
3	Листок: забарвлення верхнього боку черешка	помірно зелене	3	
4	Черешок: кут між черешком і стеблом	середній	5	
5	Листкова пластинка: за довжиною	довга	7	
6	Листкова пластинка: за шириною	широка	7	
7	Листкова пластинка: випуклість між жилками	помірна	5	
8	Листкова пластинка: вираження лопатей	помірне	5	
9	Листкова пластинка: форма верхівки	гостра	2	
10	Листкова пластинка: опушення нижнього боку	слабке	3	
11	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	сильна	7	
12	Стебло: забарвлення у верхній третині з-під сонячного боку	коричнєве	3	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожайність сирової біомаси (за 1 рік), т/га – 40,0. Вихід сухої речовини, т/га – 21,0. Термін використання плантації, років – 25. Періодичність збирання сировини, разів – 3. Зольність пального, % – 1,2. Декоративність, бал (11–99) – 99. Коефіцієнт вегетативного розмноження (за розмноження живцями), значення – 85. Тривалість періоду цвітіння, днів – 28. Посухостійкість, бал (1–9) – 7. Холодостійкість, бал (1–9) – 9. Зимостійкість, бал (1–9) – 8. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): чорна ніжка – 7. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): злакова попелиця – 8, капустяна совка – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Павловнія *Paulownia* Sieb. et Zucc.

Заявка № 20649003 Назва сорту: ТУРБО ПРО **Заявник (код):** 2692 **Власник сорту (код):** 2692

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 25.11.2020 **Патент № 200780**

Дата пріоритету: 10.04.2020

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 20.11.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200905

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: весняне відростання пагона	раннє	3	
2	Листок: черешок за довжиною	довгий	7	
3	Листок: забарвлення верхнього боку черешка	світлокоричнево-зелене	6	
4	Черешок: кут між черешком і стеблом	середній	5	
5	Листкова пластинка: за довжиною	довга	7	
6	Листкова пластинка: за шириною	широка	7	
7	Листкова пластинка: випуклість між жилками	помірна	5	
8	Листкова пластинка: вираження лопатей	слабке	3	
9	Листкова пластинка: форма верхівки	гостра	2	
10	Листкова пластинка: опушення нижнього боку	слабке	3	
11	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	сильна	7	
12	Стебло: забарвлення у верхній третині з-під сонячного боку	сіро-коричневе	2	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожайність сирової біомаси (за 1 рік), т/га – 50,0. Вихід сухої речовини, т/га – 28,0. Термін використання плантації, років – 25. Періодичність збирання сировини, разів – 3. Зольність пального, % – 1,2. Декоративність, бал (11–99) – 99. Коефіцієнт вегетативного розмноження (за розмноження живцями), значення – 85. Тривалість періоду цвітіння, діб – 28. Посухостійкість, бал (1–9) – 7. Холодостійкість, бал (1–9) – 8. Зимостійкість, бал (1–9) – 7. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): чорна ніжка – 7. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): злакова попелиця – 8, капустяна совка – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Павловнія *Paulownia* Sieb. et Zucc.

Заявка № 20649001 Назва сорту: Фенікс **Заявник (код):** 736 **Власник сорту (код):** 736

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 26.11.2020 **Патент № 200778**

Дата пріоритету: 23.01.2020

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 30.11.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200903

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: весняне відростання пагона	середнє	5	
2	Листок: черешок за довжиною	довгий	7	
3	Листок: забарвлення верхнього боку черешка	помірно зелене	3	
4	Черешок: кут між черешком і стеблом	середній	5	
5	Листкова пластинка: за довжиною	довга	7	
6	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
7	Листкова пластинка: випуклість між жилками	сильна	7	
8	Листкова пластинка: вираження лопатей	помірне	5	
9	Листкова пластинка: форма верхівки	вузькозагострена	1	
10	Листкова пластинка: опушення нижнього боку	слабке	3	
11	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	помірна	5	
12	Стебло: забарвлення у верхній третині з-під сонячного боку	сіро-коричнєве	2	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожайність сирової біомаси, т/га – 335,0. Вихід сухої речовини, т/га – 145,0. Термін використання плантації, років – 30,0. Періодичність збирання сировини, разів – 4. Вихід енергії, ГДж/га – 2510,0. Енергетичні витрати на виробництво за рік, ГДж/га – 255,0. Теплоємність пального, МДж/кг – 18,5. Зольність пального, % – 1,0. Декоративність, бал (11–99) – 99. Коефіцієнт вегетативного розмноження, значення – 5. Тривалість періоду цвітіння, діб – 35. Посухостійкість, бал (1–9) – 9. Холодостійкість, бал (1–9) – 8. Зимостійкість, бал (1–9) – 8. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): чорна ніжка – 9. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): хрущ – 9, комоподібна щитівка – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Інші відомості

Other notifications

Інші відомості Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

Other notifications of the Ministry for development of economy, trade and agriculture of Ukraine

Відповідно до наказу Мінекономіки № 2290-20 від 09.11.2020 «Про скасування рішення про виникнення майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослини» скасовано прийняте рішення про виникнення майнового права інтелектуальної власності

ті на поширення сорту троянди РЮІЦЛ 1632Б (заявка № 17339002). Виключено з додатка до наказу Мінекономіки від 28.12.2019 № 877 «Про виникнення майнового права інтелектуальної власності на поширення сортів рослин» позицію 352.

Інші відомості Українського інституту експертизи сортів рослин

Other notifications of the Ukrainian Institute for Plant Variety Examination

Робота Методичної комісії

Методична комісія Українського інституту експертизи сортів рослин **23 грудня 2020 року** провела он-лайн засідання, в якому взяли участь: Гринів С. М., Києнко З. Б., Кондратенко Т. Є., Костенко Н. П., Лікар С. П., Меженський В. М., Ткачик С. О., Цизь О. М., Хоменко Т. М., Щербина О. З. за

ПОРЯДКОМ ДЕННИМ:

1. Розгляд проєкту Методики проведення експертизи сортів фісташки справжньої (*Pistacia vera* L.) на відмінність, однорідність і стабільність.

2. Розгляд форм Показників для визначення придатності сорту для поширення в Україні на ботанічні таксони: фісташку справжню (*Pistacia vera* L.), пшеницю однозерну (яру) (*Triticum monococcum* L.) зернового та кормового напрямку використання, кострицю тонколистку (*Festuca filiformis* Pourr) кормового напрямку використання.

3. Звіт виконання плану роботи Методичної комісії за 2020 рік. Підведення підсумків.

4. Затвердження Плану роботи Методичної комісії на 2021 рік.

5. Різне.

Схвалено:

1) Методику проведення експертизи сортів фісташки справжньої (*Pistacia vera* L.) на відмінність, однорідність і стабільність.

2) Форми Показників для визначення придатності сорту для поширення в Україні фісташки справжньої (*Pistacia vera* L.), пшениці однозерної озимого та ярого типу розвитку (*Triticum monococcum* L.) зернового та кормового напрямку використання, костриці тонколисткої (*Festuca filiformis* Pourr) кормового напрямку використання.

Перелік заявників, підтримувачів сортів, власників прав на сорти рослин

List of applicants, plant variety maintainers, plant variety rights owners

Код Code	Назва Name	Адреса Address
9	Товариство з обмеженою відповідальністю «Піонер Насіння Україна» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Pioner Nasinnia Ukraina»	вул. Спаська 30а, м. Київ, 04070, Україна vul. Spaska 30a, m. Kyiv, 04070, Ukraina
279	Ходовля Рослин Рольничих «Насьона Кобежиц» спулка з о.о. Hodowla Roslin Rolniczych «Nasiona Kobierzyc» spoilka z ograniczona odpowiedzialnoscia	вул. Спортова, 21, 55-040, Кобежице, Польща 55-040 Kobierzycze, ul. Sportowa 21
348	Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук України Natsionalnyi botanichnyi sad im. M. M. Hryshka Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy	вул. Тимірязєвська, 1, м. Київ, 01014 vul. Timiriazievskia, 1, m. Kyiv, 01014
355	Інститут фізіології рослин і генетики Національної академії наук України Instytut fiziologii roslyn i henetyky Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy	вул. Васильківська, 31/17, м. Київ, 03022 vul. Vasytkivska, 31/17, m. Kyiv, 03022
356	Кіровоградський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук Kirovohradskyi instytut ahropromyslovoho vyrobnytstva Ukrainsoi akademii ahrarnykh nauk	27602, вул. Центральна 2, п/в Сазонівка, м. Кропивницький 27602, vul. Tsentralna 2, p/v Sazonivka, m. Kropyvnytskyi
369	Львівський національний аграрний університет Lvivskyi natsionalnyi ahrarnyi universytet	М. Дубляни, Жовківський р-н, Львівська обл., 80381 M. Dubliany, Zhovkivskyi r-n, Lvivska obl., 80381
386	Полтавська державна аграрна академія Poltavska derzhavna ahrarna akademiia	Вул. Г. Сковороди, 1/3, м. Полтава, 36003 Vul. H. Skovorody, 1/3, m. Poltava, 36003
417	Подільський державний аграрно-технічний університет Podilskyi derzhavnyi ahrarno-tekhnichnyi universytet	32316, вул. Шевченка 13, м. Кам'янець-Подільський, Хмельницька обл. 32316, vul. Shevchenka 13, m. Kam'ianets-Podilskyi, Khmelnytska obl.
485	Коссад Семанс ЕС А Cussade Semences S A	З.І. Де Мо п/с 109 82303 Кассад Седекс Z.I. de Meaux, BR 109, 82303 Caussade Cedex
655	Товариство з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Колос» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Ahrofirma «Kolos»	вул. Ватутіна, 18А, с. Пустоварівка, Сквирський р-н, Київська обл., 09051 vul. Vatutina, 18A, s. Pustovarivka, Skvyrskyi r-n, Kyivska obl., 09051
672	Меосіс Лімітед MEIOSIS Limited	Бредбурн Хаус Стебл Блок, Іст Моллінг, Кент ME19 6 ДЗ Англія Bradbourne House Stable Block, East Malling, Kent, ME 19 6 DZ, England
736	Товариство з обмеженою відповідальністю «Всеукраїнський науковий інститут селекції (ВНІС)» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Vseukrainskyi naukovyi instytut selektsii (VNIS)»	вул. Ломоносова 30/2, кв. 36, м. Київ, Україна, 03022 vul. Lomonosova 30/2, kv. 36, m. Kyiv, Ukraina, 03022
751	Бейо Заден Б.В. Bejo Zaden B.V.	П.О.Бокс 50, Трамбан 1, 1749 ЗХ Варменхузен, Голандія P.O. Box 50, Trambaan 1, 1749 ZH Warmenhuizen, The Netherlands
753	Нунемс Б.В. Nunhems B.V.	Р.О. Бокс 4005,6080 АА Хаєлен, Голандія P.O. Box 4005,6080 AA Haalen, The Netherlands
793	Лімагрейн Європ Limagraйн Europe	Р.О. Бокс 4005,6080 АА Хаєлен, Голандія P.O. Box 4005,6080 AA Haalen, The Netherlands
796	САС Флорімон Депре Вев є Фіс SAS Florimond Desprez Veuve et Fils	вул. Г. Мондор Біополь Клермонт-Лімагн 63360 Сент-Безузір rue Henri Mondor Biopole Clermont-Limagne 63360 Saint-Beauzire
801	Ден Хартіг Б.В. Den Hartig B.V.	Б.П. 41. Капель, Темплеув, Франція, 59242 B.P. 41 Cappelleville, Templeuve, France, 59242
806	Євраліс Семанс Euralis Semences	Продуктивх 2 8304, м.Еммелурд, Нідерланди Produktieweg 2, 8304 AV Emmeloord, NL
807	Дойче Заатфедерелунг АГ Deutsche Saatveredelung AG	Авеню Гастон Фоебюс, 64231 Лескар Седекс, Франція Avenue Gaston Phoebus, 64231 Lescar Cedex, France
824	КВС Лохов ГмбХ KWS Lochow GmbH	Вайсенбургер штр. 5, 59557 Ліпштадт, Німеччина Weissenburger Str.5, 59557 Lippstadt, Germany
827	Криворізький ботанічний сад Національної академії наук України Kryvorizkyi botanichnyi sad Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy	Постфакс 1197, 29296 Берген, Боллерзенер Вег 5, Д-29303 Берген, Німеччина Postfach 1197, 29296 Bergen, Bollersener Weg 5 D-29303 Bergen, Germany
840	Енза Заден Біхір Б.В. Enza Zaden Bikhir B.V.	50089, м. Кривий Пір - 89, вул. Маршак, 50 50089, m. Kryvyi Pih - 89, vul. Marshaka, 50
844	Монсанто Технолоджі ЛТД MONSANTO TECHNOLOGY LLC	Халінг 1Е, 1602 ДБ, Енхуйзен, Нідерланди Haling, 1E, 1602 DB, ENKHUIZEN, The Netherlands
861	ТАКІІ ЄВРОПА Б.В. TAKII EUROPE B.V.	800Н; бульвар Ліндберг, Сент Луїс, Міссурі, США, МО 636167 800 N; Lindbergh blvd. St. Louis Missouri MO 636167
912	Норддойче Пфланцензucht Ханс-Георг Лембке КГ Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG	Хофдвер 19, 1424 ПС Де Квакел, Нідерланди Hofdweg 19, 1424 PC De Kwakel The Netherlands
921	Товариство з обмеженою відповідальністю «Рост Агро» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Rost Ahro»	24363, Хохенліт, Хольцес, Німеччина 24363 Hohenlieth, Holtsee, Germany
924	Маїсадур Семанс Maisadour Semences	39027, Полтавська обл., Глобинський р-н, с.Кириківка 39027, Poltavaska obl., Hlobynskyi r-n, s.Kyryiakivka
926	Заатен-Уніон ГмбХ Saaten-Union GmbH	Route de Saint Sever 40280 HAUT-MAUCO FRANCE Route de Saint Sever 40280 HAUT-MAUCO FRANCE
947	Сейет Плантефоредлінг І/С Sejet Planteforaedling I/S	Ейзенштрассе 12, 30916 Ізернхаген ХБ, Німеччина Eisenstrasse 12, 30916 Isernhagen HB, Germany
		Нормарксвей 67, Сейет ДК - 8700 Хорсенс, Данія Normarksvej 67, Sejet, LR - 8700 Horsens, Denmark

Код Code	Назва Name	Адреса Address
966	Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича комерційна фірма «Селекта» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu naukovo-vyrobnycha komertsiiina firma «Selekta»	49000, м. Дніпро, вул. Батумська 11 49000, m. Dnipro, vul. Batumska 11
1050	Сингента Сідз Б. В. Syngenta Seeds B. V.	Вештайнде 62/Постбус 2, НЛ - 1600 AA Енкхаїзен, Голландія. Westeinde 62/Postbus 2, NL - 1600 AA Enkhuizen, The Netherlands
1097	Бурденюк-Тарасевич Лариса Антонівна Burdeniuk-Tarasevych Larysa Antonivna	П/в Мала Вільшанка-1, Білоцерківський р-н, Київська обл., Україна, 09175 P/v Mala Vilshanka-1, Bilotserkivskiyi r-n, Kyivska obl., Ukraina, 09175
1123	Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробнича фірма «Дріада, Лтд» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu Naukovo-vyrobnycha firma «Driada, Ltd»	Вул. Розі Люксембург, 23, Херсон, Україна, 73006 Vul. Rozy Liuksemburh, 23, Kherson, Ukraina, 73006
1210	Іноземне Підприємство «НС СЕМЕ-Україна» Inozemne Pidpriemstvo «NS SEME-UKRAINA»	64032, с. Красне, Кегичівський р-н., Харківська обл., Україна 64032, s. Krasne, Kehychivskiyi r-n., Kharkivska obl., Ukraina
1219	Сингента Кроп Протекшн АГ Syngenta Crop Protection AG	Шварцвальдалее 215, 4002 Базель, Швейцарія Schwarzwaldallee 215, 4002 Basel, Switzerland
1223	Нордзаат Заатцухт ІмбХ Nordsaat Saatzzucht GmbH	Hauptstrabe L. D-38895 Bohnshausen Hauptstrabe L. D-38895 Bohnshausen
1265	Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Агро-Ритм» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Naukovo-vyrobnyche pidpriemstvo «Ahro-Rytm»	с. Солтанівка, Любашівський р-н, Одеська обл., 66521 s. Soltanivka, Liubashivskiyi r-n, Odeska obl., 66521
1282	Флорида Фаундейшн Сід Прод'юсерз, Інк. Florida Foundation Seed Producers Inc.	П/с 309, 3913 Хайвей 71 б Грінвуд, Флорида 32443 США P/c 309, 3913 Khaivei 71 b Hrinvud, Floryda 32443 SShA
1329	Голден Вест Сід Болгарія 000 Golden West Seed Bulgaria Ltd.	вул. Христово ботев, 29, с. Борисово, обл. Русе, община Сливо Поле 29, Hristovo Botev str., v. Borisovo, area Rousse, com. Slivo Pole
1400	Київський національний університет імені Тараса Шевченка Kyivskiyi natsionalnyi universytet imeni Tarasa Shevchenka	01033, м. Київ, вул. Володимирська, 64 01033, m. Kyiv, vul. Volodymyrska, 64
1433	Товариство з обмеженою відповідальністю «Агропромислова компанія «Маїс» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Ahropromyslova kompaniia «Mais»	вул. Дерев'янка, 2а, с. Боровиця, Чигиринський район, Черкаська область, Україна, 20921 vul. Derevi'anka, 2a, s. Borovytsia, Chyhyrinskyi raion, Cherkaska oblast, Ukraina, 20921
1435	Солтіс Soltis	Domaine de Sandreau, F-31700 Mondonville - France Domaine de Sandreau, F-31700 Mondonville - France
1498	Пробстдорфер Заатцухт Гез.м.б.Х. енд Ко КГ Probstdorfer Saatzzucht Ges.m.b.H & Co KG	Parkring 12, 1010 Vienna, Austria Parkring 12, 1010 Vienna, Austria
1508	Солана Гмбх унд Ко. КГ Solana GmbH & Co.KG	Альберт-Айнштайн-Рінг 5, 22761 Гамбург, Німеччина Albert-Einstein-Ring 5, 22761 Hamburg, Germany
1517	Товариство з обмеженою відповідальністю агрофірма «Українське насіння» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ahrofirma «Ukrainske nasinnia»	64032, Харківська область, Кегичівський район, с. Красне 64032, Kharkivska oblast, Kehychivskiyi raion, s. Krasne
1520	Аванта Сід Інтернешнал Advanta Seed International	Rogers House, 5 President John Kennedy St., Port-Louis, Mauritius Rogers House, 5 President John Kennedy St., Port-Louis, Mauritius
1543	Фермерське господарство «Бор» Fermerske hospodarstvo «Bor»	67624, Одеська область, Біляївський район, с. Дачне, вул. Уютна, 17 67624, Odeska oblast, Biliaivskiyi raion, s. Dachne, vul. Uytuna, 17
1564	Заатцухт Донау Гес.м.б.Х. & КоКГ Saatzzucht Donau Ges.m.b.H. & CoKG	Заатцухтштрассе 11, 2301 Пробстдорф Saatzzuchtstrasse 11, 2301 Probstdorf
1571	Уманський національний університет садівництва Umanskyi natsionalnyi universytet sadivnytstva	вул. Інститутська, 1, м. Умань, Черкаська обл., 20300 vul. Instytut'ska, 1, m. Uman, Cherkaska obl., 20300
1581	Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Національної академії аграрних наук України Instytut roslynyntstva im. V.IA. IUrieva Natsionalnoi akademii ahrarykh nauk Ukrainy	пр. Московський, 142, м. Харків, 61128, Україна pr. Moskovskiyi, 142, m. Kharkiv, 61128, Ukraina
1589	Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесла Національної академії аграрних наук України Myronivskiyi instytut pshenytsi imeni V.M. Remesla Natsionalnoi akademii ahrarykh nauk Ukrainy	с. Центральне, Миронівський р-н, Київська обл, 08853 s. Tsentralne, Myronivskiyi r-n, Kyivska obl, 08853
1591	Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннізнавства та сортовивчення Selektsiino-henetychnyi instytut – Natsionalnyi tsentr nasinnieznastva ta sortovyvchennia	Овідіопольська дорога, 3, м. Одеса, 65036 Ovidiopska doroha, 3, m. Odesa, 65036
1601	Інститут садівництва Національної академії аграрних наук України Instytut sadivnytstva Natsionalnoi akademii ahrarykh nauk Ukrainy	03027, м. Київ, смт. Новосілки, вул. Садова, 23 03027, m. Kyiv, smt. Novosilky, vul. Sadova, 23
1626	Національний науковий центр «Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України» Natsionalnyi naukovyi tsentr «Instytut zemlerobstva Natsionalnoi akademii ahrarykh nauk Ukrainy»	вул. Машинобудівників 2-б, смт. Чабани, Києво-Святошинський район, Київська обл., 08162 vul. Mashynobudivnykiv 2-b, smt. Chabany, Kyievo-Sviatoshynskiyi raion, Kyivska obl., 08162
1628	СЕСВАНДЕРХАВЕ Н.В./С.А. SESVANDERHAVE NV/SA	Індустріпарк, 15 В-3300, м.Тінен, Бельгія Industriepark, 15, B-3300, Tienen, Belgium
1635	Білоцерківська дослідно-селекційна станція Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України Bilotserkivska doslidno-selektsiina stantsiia Instytutu bioenerhetychnykh kultur i tsukrovyykh buriakiv Natsionalnoi akademii ahrarykh nauk Ukrainy	вул. Центральна, 1, с. Мала Вільшанка, Білоцерківський р-н, Київська обл., 09176 vul. Tsentralna, 1, s. Mala Vilshanka, Bilotserkivskiyi r-n, Kyivska obl., 09176

Код Code	Назва Name	Адреса Address
1652	Arpiko B.V. AGRICO B.V.	P.O. Box 70 8300 Emmeloord, The Netherlands P.O. Box 70 8300 Emmeloord, The Netherlands
1658	Інститут сільського господарства Карпатського регіону Національної академії аграрних наук України Instytut silskoho hospodarstva Karpatskoho rehionu Natsionalnoi akademii ahrarykh nauk Ukrainy	с. Оброшино, Пустомитівський р-н, Львівська обл., 81115 s. Obroshyno, Pustomytivskiy r-n, Lvivska obl., 81115
1669	Інститут кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України Instytut kormiv ta silskoho hospodarstva Podillia Natsionalnoi akademii ahrarykh nauk Ukrainy	21100, м. Вінниця, проспект Юності, 16 21100, m. Vinnytsia, prospekt IUnosti, 16
1688	Піонер Оверсіз Корпорейшн Pioneer Overseas Corporation	7100 NW 62nd Avenue, Johnston, Iowa, USA 7100 NW 62nd Avenue, Johnston, Iowa, USA
1690	Піонер Хай-Бред Інтернешнл, Інк. Pioneer Hi-Bred International, Inc.	7100 NW 62nd Avenue, Johnston, Iowa, USA 7100 NW 62nd Avenue, Johnston, Iowa, USA
1694	Заатен Уніон Румунія Срл. SAATEN UNION Romania Srl.	Стр. Іон Лука Карагіале Нр.3, 020041 Бухарест, Румунія Str.Ion Luca Caragiale NL 3, 020041 Bucharest, Romania
1698	Інститут зрошувального землеробства Національної академії аграрних наук України Instytut zroshuvanoho zemlerobstva Natsionalnoi akademii ahrarykh nauk Ukrainy	73483, Херсонська обл., м. Херсон, Дніпровський район, сел. Наддніпрянське 73483, Khersonska obl., m. Kherson, Dniprovskiy raion, sel. Naddnyprianske
1702	Інститут олійних культур Національної академії аграрних наук України Instytut oliinykh kultur Natsionalnoi akademii ahrarykh nauk Ukrainy	70417, Запорізька обл., Запорізький р-н, с. Сонячне, вул. Інститутська, 1 70417, Zaporizka obl., Zaporizkyi r-n, s. Soniachne, vul. Instytutska, 1
1708	Дослідна станція «Маяк» Інституту овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук України Doslidna stantsiia «Maiak» Instytutu ovochivnytstva i bashtannytstva Natsionalnoi akademii ahrarykh nauk Ukrainy	Чернігівська обл., Ніжинський р-н, село Крути, вул. Незалежності, 39, Україна, 16645 Chernihivska obl., Nizhynskiy r-n, selo Kruty, vul. Nezalezhnosti, 39, Ukraina, 16645
1710	Інститут картоплярства Національної академії аграрних наук України Instytut kartopliarstva Natsionalnoi akademii ahrarykh nauk Ukrainy	вул. Чкалова, 22, смт. Немішаєве, Бородянського району, Київської області, Україна, 07853 vul. Chkalova, 22, smt. Nemishaieve, Borodianskoho raionu, Kyivskoi oblasti, Ukraina, 07853
1715	Інститут рису Національної академії аграрних наук України Instytut rysu Natsionalnoi akademii ahrarykh nauk Ukrainy	вул. Студентська, 11, с. Антонівка, Скадовського району, Херсонської області, Україна, 75705 vul. Studentska, 11, s. Antonivka, Skadovskoho raionu, Khersonskoi oblasti, Ukraina, 75705
1730	Рйк Цваан Заадтеел ен Заадхандел Б.В. RIJK ZWAAN Zaadteel en Zaadhandel B.V.	Бурхемеестер Крезеелаан 40, НЛ-2678 КХ, Де Лір, Нідерланди Burgemeester Crezeelaan 40, 2678 KX De Lier, the Netherlands
1738	Веселоподільська дослідно-селекційна станція Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України Veselopodilska doslidno-selektiina stantsiia Instytutu bioenerhetychnykh kultur i tsukrovykh buriakiv Natsionalnoi akademii ahrarykh nauk Ukrainy	38251, с. Вереміївка, Семенівський р-н, Полтавська обл. 38251, s. Veremiiivka, Semenivskiy r-n, Poltavska obl.
1751	Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України Instytut bioenerhetychnykh kultur i tsukrovykh buriakiv Natsionalnoi akademii ahrarykh nauk Ukrainy	03141, м. Київ, вул. Клінічна, 25 03141, m. Kyiv, vul. Klinichna, 25
1755	Тракійський Науково-дослідний Інститут сільського господарства Trakya Agricultural Research Institute	Поштова скриня 16, 22100 Едірне, Туреччина Box: 16, 22100, Edirne, Turkey
1781	Інститут овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук України Instytut ovochivnytstva i bashtannytstva Natsionalnoi akademii ahrarykh nauk Ukrainy	вул. Інститутська, 1, селище Селекційне, Харківський р-н, Харківська обл., 62478 vul. Instytutska, 1, selyshce Selektiine, Kharkivskiy r-n, Kharkivska obl., 62478
1783	РАЖТ 2н RAGT 2n	Рю Емил Сингла - Сіте де Бурран, БП 3336, 12033 Родез Седекс 9, Франція Rue Emile Singla - Site de Bourran, BP3336, 12033 Rodez Cedex 9, France
1797	Секобра речерчес С.А.С. Secobra recherches S.A.S.	Centre De Bois Henry, 78580 Maule, France Centre De Bois Henry, 78580 Maule, France
1807	Прикарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту сільського господарства Карпатського регіону Національної академії аграрних наук України Prykarpatska derzhavna silskohospodarska doslidna stantsiia Instytutu silskoho hospodarstva Karpatskoho rehionu Natsionalnoi akademii ahrarykh nauk Ukrainy	76014, м. Івано-Франківськ, вул. Ст. Бандери, 21А 76014, m. Ivano-Frankivsk, vul. St. Bandery, 21A
1809	Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України Instytut silskohospodarskoi mikrobiologii ta ahropromysloвого vyrobnytstva Natsionalnoi akademii ahrarykh nauk Ukrainy	вул. Шевченка, 97, м. Чернівці, 14027 vul. Shevchenka, 97, m. Chernihiv, 14027
1848	Інститут сільського господарства Північного Сходу Національної академії аграрних наук України Instytut silskoho hospodarstva Pivnichnoho Skhodu Natsionalnoi akademii ahrarykh nauk Ukrainy	вул. Зелена 1, с. Сад, Сумський район, Сумська область, 42343 vul. Zelena 1, s. Sad, Sumskiy raion, Sumska oblast, 42343
1852	Монсанта Веджітл ІП Менеджмент Б. В. Monsanto Vegetable IP Management B. V.	Leeuwenhoekweg 52, 2661 CZ, Bergschenhoek, Netherlands Leeuwenhoekweg 52, 2661 CZ, Bergschenhoek, Netherlands

Код Code	Назва Name	Адреса Address
1854	Державна установа Інститут сільського господарства степової зони Національної академії аграрних наук України Derzhavna ustanova Instytut silskoho hospodarstva stepovoi zony Natsionalnoi akademii ahrarykh nauk Ukrainy	вул. Дзержинського, 14, м. Дніпро, Україна, 49600 vul. Dzerzhynskoho, 14, m. Dnipro, Ukraina, 49600
1867	Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-дослідний інститут аграрного бізнесу» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Naukovo-doslidnyi instytut ahrarynogo biznesu»	49051, Україна, м. Дніпро, вул. Калинова, 3 49051, Ukraina, m. Dnipro, vul. Kalynova, 3
1869	Дослідна станція луб'яних культур Інституту сільського господарства Північного Сходу Національної академії аграрних наук України Doslidna stantsiia lub'ianykh kultur Instytutu silskoho hospodarstva Pivnichnoho Skhodu Natsionalnoi akademii ahrarykh nauk Ukrainy	вул. Терещенків, 45, м. Глухів, Сумська обл., 41400 vul. Tereshcenkiv, 45, m. Hlukhiv, Sumska obl., 41400
1891	Акерманн Заатцухт ГмбХ і Ко. КГ Ackermann Saatzzucht GmbH & Co. KG	Marienhofstr. 13, 94342 Irlbach, Germany Marienhofstr. 13, 94342 Irlbach, Germany
1902	Семілас ФІТО, С.А. Semillas FITO, S.A.	C/Selva de Mar, 111, 08019 Barcelona, Spain C/Selva de Mar, 111, 08019 Barcelona, Spain
1904	Національний науковий центр «Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова» Національної академії аграрних наук України Natsionalnyi naukovyi tsentr «Instytut vynohradarstva i vynorobstva imeni V.IE. Tairova» Natsionalnoi akademii ahrarykh nauk Ukrainy	Вул. 40-річчя Перемоги, 27, смт. Таїрове, м. Одеса, 65496, Україна Vul. 40-richchia Peremohy, 27, smt. Tairove, m. Odesa, 65496, Ukraina
1926	Товариство з обмеженою відповідальністю «Агрооптима» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Ahrooptyma»	67652, Одеська обл., Біляївський р-н, сільрада Усатівська, комплекс, 8 км + 100 м траси Одеса-Київ-Санкт-Петербург 67652, Odeska obl., Biliaivskiy r-n, silrada Usativska, kompleks, 8 km + 100 m trasy Odesa-Kyiv-Sankt-Peterburh
1959	Сингента Партісіпейшнз АГ Syngenta Participation AG	SCHWARZWALDALLEE 215, BASEL 4058, SWITZERLAND SCHWARZWALDALLEE 215, BASEL 4058, SWITZERLAND
1974	Бетасід ГмбХ Betaseed GmbH	Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325 Frankfurt/Main, Germany Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325 Frankfurt/Main, Germany
1978	Інститут за ратарство і повтарство Institut za ratarstvo i povrtarstvo	Maksima Gorkog 30, 21 000 Novi Sad, Srbija Maksima Gorkog 30, 21 000 Novi Sad, Srbija
1985	НУСІД ЮРОП ЛТД. NUSEED EUROPE LTD.	5 TG, Manchester, United Kindom, 3000 Aviator Way 5 TG, Manchester, United Kindom, 3000 Aviator Way
1988	Закарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція Національної академії аграрних наук України Zakarpatska derzhavna silskohospodarska doslidna stantsiia Natsionalnoi akademii ahrarykh nauk Ukrainy	90252, Закарпатська обл., Берегівський район, село Велика Бакта, проспект Свободи, будинок 17 90252, Zakarpatska obl., Berehivskiy raion, selo Velyka Bakta, prospekt Svobody, budynok 17
1990	Носівська селекційно-дослідна станція Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла Національної академії аграрних наук України Nosivska selektsiino-doslidna stantsiia Myronivskoho instytutu pshenytsi imeni V.M. Remesla Natsionalnoi akademii ahrarykh nauk Ukrainy	вул. Миру, 1, с. Дослідне, Носівського району, Чернігівської області, 17131 vul. Myru, 1, s. Doslidne, Nosivskoho raionu, Chernihivskoi oblasti, 17131
1993	Фреш Форвард Холдінг БВ Fresh Forward Holding BV	Wielseweg 38a, 4024 BK, Eck en Wiel, the Netherlands Wielseweg 38a, 4024 BK, Eck en Wiel, the Netherlands
1994	Майзе Ресорч Інститут «Земун Поле» Maize Resorch Instytut «Zemun Polie»	Slobodana Bajica 1, 11185 Beograd-Zemun, Srbija Slobodana Bajica 1, 11185 Beograd-Zemun, Srbija
1998	Товариство з обмеженою відповідальністю «Одеський селекційний приватний інститут» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Odeskyi selektsiyni pryvatnyi instytut»	вул. Фрунзе, будинок 4, с. Старостине, Роздільнянський район, Одеська обл., 67420 vul. Frunze, budynok 4, s. Starostyne, Rozdilnianskyi raion, Odeska obl., 67420
2011	ЗААТБАУ ЛІНЦ еГен SAATBAU LINZ eGen	Schirmerstrasse, 19, 4060 Leonding, Austria Schirmerstrasse, 19, 4060 Leonding, Austria
2020	ХМ.КЛОЗ HM.CLAUSE	Rue Louis Saillant ZI LA MOTTE - B.P. 83, 26800, PORTES-LES-VALENCE CEDEX, France Rue Louis Saillant ZI LA MOTTE - B.P. 83, 26800, PORTES-LES-VALENCE CEDEX, France
2051	Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ АГРОСЕМ» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «KOMPANIYA AHROSEM»	«КАРАТ» Промисловий майданчик, 5-А, оф. 207, м. Вишгород, Вишгородський р-н, Київська обл., 07300 «KARAT» Promyslovyy maidanchyk, 5-A, of. 207, m. Vyshhorod, Vyshhorodskiy r-n, Kyivska obl., 07300
2062	Біотек Тохумчулук-Тарім-Юрун. Сан. ве Тіс.Лтд.Сті. Biotek Tohumculuk-Tarim-Urun. San. ve Tic.Ltd.Sti	Buyuk Kayacik Mah. K.O.S.B. 12.Sk. No:32 Selcuklu/KONYA Buyuk Kayacik Mah. K.O.S.B. 12.Sk. No:32 Selcuklu/KONYA
2070	ХАЗЕРА СІДЗ ЛТД HAZERA SEEDS LTD	79837, Israel, Berurim M.P. Shikmim 79837, Israel, Berurim M.P. Shikmim
2076	Селген, а.с. SELGEN, a.s.	Jankovcova 18, 170 37 Praha 7, Czech Republic Jankovcova 18, 170 37 Praha 7, Czech Republic
2087	ХМ.КЛОЗ, ІНК HM.CLAUSE, INC	555 Codoni Avenue, Modesto, California 95357, USA 555 Codoni Avenue, Modesto, California 95357, USA
2091	Товариство з обмеженою відповідальністю «АГРОПРОМ-ЗАКАРПАТТЯ» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «AHROPROM-ZAKARPATTIA»	вул. Садова, 21, с. Тарнівці, Ужгородський р-н, Закарпатська обл., 89420 vul. Sadova, 21, s. Tarnivtsi, Uzhhorodskiy r-n, Zakarpatska obl., 89420
2092	КВС ЗААТ СЕ KWS SAAT SE	37574 Einbeck, Grimsehlstrasse, 31, Germany 37574 Einbeck, Grimsehlstrasse, 31, Germany
2094	Дой АгроСайенс ГмбХ Dow AgroSciences GmbH	Im Rheinfeld 7, 76437 Rastatt, Germany Im Rheinfeld 7, 76437 Rastatt, Germany
2200	Приватне підприємство «Агросвіт» Pryvatne pidpryiemstvo «Ahrosvit»	вул. Промислова, 4В, м. Таврійськ, Херсонська обл., 74988 vul. Promyslova, 4V, m. Tavriisk, Khersonska obl., 74988
2201	Приватне підприємство «Науково-дослідна селекційна станція «НАСКО»» Pryvatne pidpryiemstvo «Naukovo-doslidna selektsiina stantsiia «NASKO»»	вул. Леніна, 26, с. Чорнянка, Каховський р-н, Херсонська обл., 74835 vul. Lenina, 26, s. Chornianka, Kakhovskiy r-n, Khersonska obl., 74835

Код Code	Назва Name	Адреса Address
2202	Тракія Тарімсал Арастірма Інстітутсу Trakya Tarimsal Arastirma Enstitusu	Istanbul Yolu, P.O. Box 16, 22100 Edirne, Turkey Istanbul Yolu, P.O. Box 16, 22100 Edirne, Turkey
2204	Товариство з обмеженою відповідальністю «Нептус Агро» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Nertus Agro»	вул. Северина Потоцького, 38А, кімн. 23, м. Харків vul. Severyna Pototskoho, 38A, kimn. 23, m. Kharkiv
2226	КОРА СІДС С.Р.Л. CORA SEEDS S.R.L.	Via Boscone, 1765/A, 47522 CESENA (FC), Italy Via Boscone, 1765/A, 47522 CESENA (FC), Italy
2232	ДОНАУ СААТ С.Р.Л. DONAU SAAT S.R.L.	str. Sirlului, nr.20, et.3, sector 1, Bukarest, Romania str. Sirlului, nr.20, et.3, sector 1, Bukarest, Romania
2238	ЗААТЕН-УНІОН РЕЧЕРЧ с.а.с. SAATEN-UNION RECHERCHE s.a.s.	163 Ter avenue de Flandre - BP 6 F-60190 Estrees-Saint-Denis, France 163 Ter avenue de Flandre - BP 6 F-60190 Estrees-Saint-Denis, France
2241	Хареба Олександр Володимирович Khareba Oleksandr Volodymyrovych	бульв. І. Лепсе, 30/1, кв. 18, м. Київ, 03126 bulv. I. Lepse, 30/1, kv. 18, m. Kyiv, 03126
2243	ІПМ Потейто Гроуп Лімітед IPM Potato Group Limited	Unit 412, Q House, 76 Furze Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Republic of Ireland Unit 412, Q House, 76 Furze Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Republic of Ireland
2251	Приватне підприємство «Агро-Голд» Pryvatne pidpriemstvo «Ahro-Hold»	вул. Котовського, буд. 168, корпус А, с. Кирнички, Ізмайльський р-н, Одеська обл., 68650 vul. Kotovskoho, bud. 168, korpus A, s. Kyrnychky, Izmailskyi r-n, Odeska obl., 68650
2255	КВС МОМОН РЕШЕРШ С.А.Р.Л. KWS MOMONT RECHERCHE S.A.R.L.	59246 Mons-en-Pevele, rue de Martinval, 11, France 59246 Mons-en-Pevele, rue de Martinval, 11, France
2256	ПАНАМ Франс САС PANAM France SAS	544 РУТ ДЕ ВІЛЬБРЮМЬЕР - 31340 ВІЛЬМЮР-СІОР-ТАРН 544 RTE DE VILLEBRUMIER - 31340 VILLEMUR SUR TARN
2257	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЕНЕКС УКРАЇНА» TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU «HENEKS UKRAINA»	вул. Гоголя, 12, оф. 610, м. Полтава, 36020 vul. Hoholia, 12, of. 610, m. Poltava, 36020
2258	П.Х. ПЕТЕРСЕН Заатцухт Лундсгаард ГмбХ P.H. PETERSEN Saatzzucht Lundsgaard GmbH	Streichmuehler Str. 8a, D-24977, Grundhof, Germany Streichmuehler Str. 8a, D-24977, Grundhof, Germany
2260	Державна установа Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук України Derzhavna ustanova Instytut zernovykh kultur Natsionalnoi akademii ahrarykh nauk Ukrainy	вул. Володимира Вернадського, 14, м. Дніпро, 49027 vul. Volodymyra Vernadskoho, 14, m. Dnipro, 49027
2264	Норт Американ Планта Джентетікс North American Plant Genetics	19192, Sleepy Hollow Rd, Blenheim, Ontario, Canada 19192, Sleepy Hollow Rd, Blenheim, Ontario, Canada
2265	Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «ЛНЗ-АГРО» Silskohospodarske tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «LNZ-AHRO»	вул. Заводська, 17, с. Лебедін, Шполянський р-н, Черкаська обл., 20635 vul. Zavodska, 17, s. Lebedyn, Shpolianskyi r-n, Cherkaska obl., 20635
2267	Хібрісол, С. Л. Hibrisol, S. L.	C/Genaro Parlade, 2 bajo 41013 Sevilla, Spain C/Genaro Parlade, 2 bajo 41013 Sevilla, Spain
2269	ФЛОРТЕК СІД FLORTEK SEED	Serbia, 21000 NOVI SAD, ul. Jevrejska 21 Serbia, 21000 NOVI SAD, ul. Jevrejska 21
2281	Іказідо Глобал Груп Б.В. Ikasido Global Group B.V.	ʼs-Gravenzandseweg 48, 2291 PE Wateringen, The Netherlands ʼs-Gravenzandseweg 48, 2291 PE Wateringen, The Netherlands
2284	Волинська державна сільськогосподарська дослідна станція Національної академії аграрних наук України Volynska derzhavna silskohospodarska doslidna stantsiia Natsionalnoi akademii ahrarykh nauk Ukrainy	вул. Шкільна 2, смт. Рокині, Луцький р-н, Волинська обл., 45626 vul. Shkilna 2, smt. Rokyni, Lutskyi r-n, Volynska obl., 45626
2285	Просементі С.Р.Л. Prosementi S.R.L.	Corso Magenta, 10, CAP 20123, Milano, Italy Corso Magenta, 10, CAP 20123, Milano, Italy
2287	Товариство з обмеженою відповідальністю «Євросем» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «IEvrosem»	вул. Академіка Заболотного, буд. 154 Д, м. Київ, 03143 vul. Akademika Zabolotnoho, bud. 154 D, m. Kyiv, 03143
2289	Інститут луб'яних культур Національної академії аграрних наук України Instytut lub'ianykh kultur Natsionalnoi akademii ahrarykh nauk Ukrainy	вул. Терещенків, 45, м. Глухів, Сумська обл., 41400 vul. Tereshchenkiv, 45, m. Hlukhiv, Sumskya obl., 41400
2291	Товариство з обмеженою відповідальністю «Воскор-Агро» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Voskor-Agro»	пров. І. Богуна, 5а, кв. 48, м. Умань, Черкаська обл., 20300 prov. I. Bohuna, 5a, kv. 48, m. Uman, Cherkaska obl., 20300
2301	Ланд Нідеростеррайх Заатцухт дер Ландвіртшафтліхен Фахшуле Едельхоф Land Niederosterreich Saatzzucht der Landwirtschaftlichen Fachschule Edelhof	Edelhof 1, A-3910 Zwettl, Austria Edelhof 1, A-3910 Zwettl, Austria
2302	Заатцухт Штрєнг-Енгелєн ГмбХ & Ко. КГ Zaatzucht Streng-Engelen GmbH & Co. KG	Aspachhof, D-97215 Uffenheim, Germany Aspachhof, D-97215 Uffenheim, Germany
2303	В. Кордес Шоне Розеншулен ГмбХ & Ко КГ W. Kordes' Sohne Rosenschulen GmbH & Co KG	Rosenstrasse 54, 25365 - Klein Offenseth-Sparrieshoop, Germany Rosenstrasse 54, 25365 - Klein Offenseth-Sparrieshoop, Germany
2312	Товариство з обмеженою відповідальністю «Передові Агротехнології» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Peredovi Ahrotekhnologii»	вул. Академіка Павлова, буд. 88, м. Харків, 61038 vul. Akademika Pavlova, bud. 88, m. Kharkiv, 61038
2313	Нордік Сід Германі ГмбХ Nordic Seed Germany GmbH	Kirchhorster Str. 16. DE-31688 Nienstadt Kirchhorster Str. 16. DE-31688 Nienstadt
2419	Дрісколлс, Інк. Driscoll's, Inc.	345 Westridge Drive Watsonville, California 95076 345 Westridge Drive Watsonville, California 95076
2424	Нагорняк Михайло Миколайович Nahorniak Mykhailo Mykolaiovych	вул. Станіславського, 23, кв. 72, м. Вінниця, 21022 vul. Stanislavskoho, 23, kv. 72, m. Vinnytsia, 21022
2430	Товариство з обмеженою відповідальністю «Інститут органічного землеробства» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Instytut orhanichnoho zemlerobstva»	вул. Космонавтів, 9, м. Глобіне, Полтавська обл., 39000 vul. Kosmonavtiv, 9, m. Hlobyne, Poltavskya obl., 39000

Код Code	Назва Name	Адреса Address
2431	Резніченко Сергій Олександрович Reznichenko Serhii Oleksandrovych	пров. Український, 39, м. Вознесенськ, Миколаївська обл., 56502 prov. Ukrainnyi, 39, m. Voznesensk, Mykolaivska obl., 56502
2436	Заатцхт Гляйсдорф ГмбХ Saatzucht Gleisdorf GmbH	Am Tieberhof 33, A-8200 Gleisdorf, Austria Am Tieberhof 33, A-8200 Gleisdorf, Austria
2440	АПСОВСЕМЕНТИ С.П.А. APSOVSEMENTI S.P.A.	Strada Torremenapace, 40 27058 Voghera (PV) - ITALY Strada Torremenapace, 40 27058 Voghera (PV) - ITALY
2444	Товариство з обмеженою відповідальністю «Солярис Гібриди» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Solarys Hibrydy»	вул. Академіка Заболотного, буд. 150 Г, м. Київ, 03143 vul. Akademika Zabolotnoho, bud. 150 H, m. Kyiv, 03143
2445	Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія ЛІСТ» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Kompaniia LIST»	пр-т Академіка Корольова, б. 12, кв. 12, м. Київ, 03134 pr-t Akademika Korolova, b. 12, kv. 12, m. Kyiv, 03134
2446	Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий Дом «Зоря-Плюс»» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Torhovyi Dom «Zoria-Plus»»	вул. Космічна, 66б, с. Кучерявоволодимирівка, Чаплинський р-н, Херсонська обл., 75220 vul. Kosmichna, 66b, s. Kucheriavovodymyriivka, Chaplinskyi r-n, Khersonska obl., 75220
2455	І.К.С. «Чейс Фарм» С.Р.Л. I.C.S. «CHOICE FARM» S.R.L.	MD-2059 Republic of Moldova, Chisinau city, Dubasari 2 street MD-2059 Republic of Moldova, Chisinau city, Dubasari 2 street
2458	Товариство з обмеженою відповідальністю «Терра-ІУг Україна» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Terra-IUh Ukraina»	вул. Шовковична, 12-Б, кабінет 103, м. Київ, 01021 vul. Shovkovychna, 12-B, kabinet 103, m. Kyiv, 01021
2459	Інституція Публіка Інститутул де Фітотехніе «Порумбені» Institutia Publica Institutul de Fitotehnie «Porumbeni»	4834, s. Pascani, raionul Criuleni, Republica Moldova 4834, s. Pascani, raionul Criuleni, Republica Moldova
2460	Приватне підприємство «Юагросервіс» Privatne pidpriemstvo «IUhagroservis»	вул. Шевченка, буд. 3, кв. 100, м. Ізмаїл, Одеська обл., 68600 vul. Shevchenka, bud. 3, kv. 100, m. Izmail, Odeska obl., 68600
2466	Меженський Володимир Миколайович Mezhenskyi Volodymyr Mykolaiovych	вул. Лесі Українки, буд. 6, кв. 12, сел. Пшеничне, Васильківський р-н, Київська обл., 08644 vul. Lesi Ukrainky, bud. 6, kv. 12, sel. Pshenychne, Vasytkivskyi r-n, Kyivska obl., 08644
2467	Скакун Вадим Михайлович Skakun Vadym Mykhailovych	вул. Адміральна, буд. 31Б, кв. 67, м. Миколаїв, 54001 vul. Admiralna, bud. 31B, kv. 67, m. Mykolaiv, 54001
2468	Скакун Оксана Олександрівна Skakun Oksana Oleksandriivna	вул. Адміральна, буд. 31Б, кв. 67, м. Миколаїв, 54001 vul. Admiralna, bud. 31B, kv. 67, m. Mykolaiv, 54001
2471	ТОВ «Компанія «Агролідер Україна»» TOV «Kompaniia «Ahrolider Ukraina»»	вул. Центральна, 1Б, с. Лісові Гринівці, Хмельницький р-н, Хмельницька обл., 31340 vul. Tsentralna, 1B, s. Lisovi Hrynivtsi, Khmelnytskyi r-n, Khmelnytska obl., 31340
2479	БЦ Інститут селекції і рослинництва д.д. Bc Institut za oplemenjivanje I proizvodnju billja d.d.	Rugvica, Dugoselska 7, 10370, Dugo Selo Rugvica, Dugoselska 7, 10370, Dugo Selo
2485	Фермерське господарство «Музилко В.В.» Fermerske hospodarstvo «Muzhylko V.V.»	вул. Історична, 10, кв. 4, м. Нова Каховка, Херсонська обл., 74900 vul. Istorychna, 10, kv. 4, m. Nova Kakhovka, Khersonska obl., 74900
2486	Нордік Сід А/С Nordic Seed A/S	Kornmarken 1, DK-8464 Galten, Denmark Kornmarken 1, DK-8464 Galten, Denmark
2505	Візкумне Центрум Селтон с.р.о. Vyzkumne Centrum Selton s.r.o.	Stupice 24, 250084 Sibirina Czech Republic Stupice 24, 250084 Sibirina Czech Republic
2507	Хареба Володимир Васильович Khareba Volodymyr Vasylovych	вул. Садова, буд. 19, кв. 34, с. Новосілки, Києво-Святошинський р-н, Київська обл. vul. Sadova, bud. 19, kv. 34, s. Novosilky, Kyievo-Sviatoshynskyi r-n, Kyivska obl.
2508	Сентре фор Агрікултурал Ресерч, Хунгаріан Академі оф Сієнсес, Мартонвасар Centre for Agricultural Research, Hungarian Academy of Sciences, Martonvasar	H-2462, Martonvasar, P.O.B. Brunsvik 2 Hungary H-2462, Martonvasar, P.O.B. Brunsvik 2 Hungary
2509	«СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО ІМ. АКАДЕМІКА УНАНОВА» «SELIANSKE (FERMERSKE) HOSPODARSTVO IM. AKADEMIKA UNANOVA»	с. Саражинка, Балтський р-н., Одеська обл., 66123 s. Sarazhynka, Baltskiy r-n., Odeska obl., 66123
2513	В. фон Боррис-Еккендорф ГмбХ & Ко. КГ W. von Borries-Eckendorf GmbH & Co. KG	Hovedisser Str.92 D-33818 Leopoldshohe Germany Hovedisser Str.92 D-33818 Leopoldshohe Germany
2514	Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-дослідний інститут аграрного бізнесу» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Naukovo-doslidnyi instytut aharnoho biznesu»	вул. Березинська, 80, м. Дніпро, 49130 vul. Berezynska, 80, m. Dnipro, 49130
2524	Товариство з обмеженою відповідальністю «РВА Україна» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «RVA Ukraina»	вул. Велика Кільцева, 7, с. Петропавлівська Борщагівка, Києво-Святошинський р-н., Київська обл., 08130 vul. Velyka Kiltseva, 7, s. Petropavlivska Borshchahivka, Kyievo-Sviatoshynskyi r-n., Kyivska obl., 08130
2528	Мандров Альберт Миколайович Mandrov Albert Mykolaiovych	Росія, 396313, Воронежская обл., Новоусманский р-он, с. Бабяково, ул. Лесная, д. 25 Rossiya, 396313, Voronezhskaia obl., Novousmanskii r-on, s. Babiakovo, ul. Lesnaia, d. 25
2529	ІСІ Сementi С.п.А. ISI Sementi S.p.A.	Frazione Ponte Ghiara, 8/a, 43036, Fidenza (Parma)-ITALY Frazione Ponte Ghiara, 8/a, 43036, Fidenza (Parma)-ITALY
2530	Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича комерційна фірма «Селекта» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu naukovo-vyrobnycha komertsiiina firma «Selekta»	вул. Б. Хмельницького, 4/303, м. Дніпро, 49000 vul. B. Khmelnytskoho, 4/303, m. Dnipro, 49000
2535	Приватне підприємство «Насіннева фірма «Софія»» Privatne pidpriemstvo «Nasinneva firma «Sofia»»	вул. Героїв Оборони, 10, корп. 1, кім. 5, м. Київ, 03127 vul. Heroiv Oborony, 10, korp. 1, kim. 5, m. Kyiv, 03127
2536	Канадське Міністерство Сільського Господарства та Продовольства Agriculture and Agri-Food Canada	1341 Baseline Road, Ottawa, Ontario, Canada K1A 0C5 1341 Baseline Road, Ottawa, Ontario, Canada K1A 0C5

Код Code	Назва Name	Адреса Address
2537	Заатен Уніон Румунія Срл. SAATEN UNION Romania Srl.	Str. General Praporgescu Nr. 1-5, ap. 8, 020965, Bucharest, ROMANIA
2538	Орегон Стейт Юнів'єрситі Oregon State University	Str. General Praporgescu Nr. 1-5, ap. 8, 020965, Bucharest, ROMANIA Oregon State University, Office for Commercialization and Corporate Development, A312 Kerr Oregon State University, Office for Commercialization and Corporate Development, A312 Kerr
2539	Товариство з обмеженою відповідальністю «АГРО7ТРЕЙД» Tovarystvo z обмеженою відповідальністю «АГРО7ТРЕЙД»	вул. Морозова, 15-Б, оф. 502, м. Харків, 61036 vul. Morozova, 15-B, of. 502, m. Kharkiv, 61036
2545	Сейст Плантефоредлінг І/С Sejet Planteforaedling I/S	Noerremarksvej 67, 8700 Horsens, Denmark Noerremarksvej 67, 8700 Horsens, Denmark
2546	Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробниче мале підприємство «Антарія» Tovarystvo z обмеженою відповідальністю naukovo-vyrobnyche male pidpryemstvo «Antariia»	вул. Польова, 50, смт. Чабани, Києво-Святошинський р-н, Київська обл., 08162 vul. Polova, 50, smt. Chabany, Kyievo-Sviatoshytskyi r-n, Kyivska obl., 08162
2548	ПрАТ «Екопрод» PrAT «Ekorprod»	вул. Центральна, 6-В, м. Волноваха, Донецька обл., 85700 vul. Tsentralna, 6-V, m. Volnovakha, Donetska obl., 85700
2549	Іноземне Підприємство «НС СЕМЕ - УКРАЇНА» Inozemne Pidpryemstvo «NS SEME - UKRAINA»	проспект Науки, буд. 28, м. Київ, Голосіївський р-н, 03028 prospekt Nauky, bud. 28, m. Kyiv, Holosiivskyi r-n, 03028
2551	Товариство з обмеженою відповідальністю «АФ НПП АГРОМИР» Tovarystvo z обмеженою відповідальністю «AF NPP AHRMYR»	вул. Кузнєцова, 1-Ж, с. Сороківка, Харківський р-н, Харківська обл., 62430 vul. Kuznietsova, 1-Zh, s. Sorokivka, Kharkivskyi r-n, Kharkivska obl., 62430
2552	Штрубе Д енд С ГмбХ Strube D&S GmbH	Hauptstrasse 1, 38387 Sollingen, Germany Hauptstrasse 1, 38387 Sollingen, Germany
2554	Адванта Сід Інтернешнал Advanta Seed International	C/o Multi consult, Les Cascades, Edith Cavell str. PORT LOUIS, MAURITIUS C/o Multi consult, Les Cascades, Edith Cavell str. PORT LOUIS, MAURITIUS
2555	Товариство з обмеженою відповідальністю «Сонячний настрій» Tovarystvo z обмеженою відповідальністю «Soniachnyi nastrii»	вул. Довнар-Запольського, буд. 4А, кв. 13, м. Київ, 04116 vul. Dovnar-Zapolskoho, bud. 4A, kv. 13, m. Kyiv, 04116
2556	Чурута Олег Іванович (НС 068611) Churuta Oleh Ivanovych (NS 068611)	вул. Лівобережна, 46, смт. Чорнобай, Черкаська обл., 19900 vul. Livoberezhna, 46, smt. Chornobai, Cherkaska obl., 19900
2557	Кен-Гро Дженетікс Інк. Can-Gro Genetics Inc.	P.O.Box 1353, 75 Wellington st., Clinton, Ontario, ON NOM 1L0, Canada P.O.Box 1353, 75 Wellington st., Clinton, Ontario, ON NOM 1L0, Canada
2558	Науково-виробниче фермерське господарство «КОМПАНІЯ МАІС» Naukovo-vyrobnyche fermerske hospodarstvo «KOMPANIYA MAIS»	вул. Центральна, 50, с. Зайцеве, Синельниківський р-н, Дніпропетровська обл., 52514 vul. Tsentralna, 50, s. Zaitseve, Synelnykivskyi r-n, Dnipropetrovska obl., 52514
2563	КЕМІКАЛ АГРОСАВА д.о.о. CHEMICAL AGROSAVA d.o.o.	Palmira Toljatijska 5/4, 11070 Novi Beograd, Serbia Palmira Toljatijska 5/4, 11070 Novi Beograd, Serbia
2568	Товариство з обмеженою відповідальністю «НСЦ «Золоте насіння» Tovarystvo z обмеженою відповідальністю «NSTs «Zolote nasinnia»	вул. Нижньодніпровська, б. 1, смт. Слобожанське, Дніпровський р-н, Дніпропетровська обл., 52005 vul. Nyzhnodniprovska, b. 1, smt. Slobozhanske, Dniprovskyi r-n, Dnipropetrovska obl., 52005
2569	ФармЗаат АГ FarmSaat AG	Rott 3 48351 Everswinkel Rott 3 48351 Everswinkel
2570	Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича фірма «Еліта-Селект» Tovarystvo z обмеженою відповідальністю «Naukovo-vyrobnycha firma «Elita-Selekt»	вул. Завокзальна, 6, смт. Любашівка, Любашівський р-н, Одеська обл., 66502 vul. Zavokzalna, 6, smt. Liubashivka, Liubashivskyi r-n, Odeska obl., 66502
2571	СІДЕКС ІНК. SEDEX INC.	5908, 52-Avenue South, Fargo, North Dakota 58103, USA 5908, 52-Avenue South, Fargo, North Dakota 58103, USA
2576	ТОВ «Голден Сидс» TOV «Holden Syds»	вул. Васильківська, буд. 37, м. Київ, 03040 vul. Vasytkivska, bud. 37, m. Kyiv, 03040
2584	Жермікопа Брідінг САС Germicopa Breeding SAS	1 allée Loeiz Herrieu, 29334 Quimper SEDEX, France 1 allée Loeiz Herrieu, 29334 Quimper SEDEX, France
2587	ТОВ «Хімагромаркетинг» TOV «Khimahromarketingh»	пр-т. Соборності, 15, м. Київ, 02160 pr-t. Cobornosti, 15, m. Kyiv, 02160
2594	Мереженюк Вадим Анатолійович Merezheniuk Vadym Anatoliiovych	вул. Леваневського, 38, кв. 132, м. Біла Церква, Київська обл. vul. Levanevskoho, 38, kv. 132, m. Bila Tserkva, Kyivska obl.
2595	Сич Зеновій Деонізович Sych Zenovii Deonizovych	вул. Опітна, 105, кв. 14, с. Олександрівка, Дніпропетровська обл. vul. Opytna, 105, kv. 14, s. Oleksandrivka, Dnipropetrovska obl.
2596	Кубрак Світлана Миколаївна Kubrak Svitlana Mykolaivna	вул. Героїв Чорнобиля, 5, кв. 133, м. Біла Церква, Київська обл. vul. Heroiv Chornobylia, 5, kv. 133, m. Bila Tserkva, Kyivska obl.
2597	БАСФ СЕ BASF SE	Carl-Bosch-Str. 38, 67056 Ludwigshafen, Germany Carl-Bosch-Str. 38, 67056 Ludwigshafen, Germany
2599	Товариство з обмеженою відповідальністю «Луганський Інститут Селекції і Технологій» Tovarystvo z обмеженою відповідальністю «Luhanskyi Instytut Sele- ktsii i Tekhnologii»	пр-т Академіка Корольова, б. 12, кв. 12, м. Київ, 03134 pr-t Akademika Korolova, b. 12, kv. 12, m. Kyiv, 03134
2602	БАСФ Агрікалчерал Солюшнс Сід ЮС ЛЛС BASF Agricultural Solutions Seed US LLC	100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, USA 100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, USA
2612	Михайлов Ярослав Миколайович Mykhailov Yaroslav Mykolaiovych	вул. Новоселівка, 7, м. Сватове, Луганська обл., 92600 vul. Novoselivka, 7, m. Svatove, Luhanska obl., 92600
2614	АНВ Ферт Б.В. ANV Fert B.V.	Westeinde 56. 5141 Waalwijk Westeinde 56. 5141 Waalwijk
2616	Вузкумне centrum СЕЛТОН, с.р.о. Vyzkumne centrum SELTON, s.r.o.	Stupice 24, 250 84 Sibrina, Czech Republic Stupice 24, 250 84 Sibrina, Czech Republic
2622	Кішкун Ресерч Центр Kishkun Research Tcenter	Fuzesh pusta, 42, Kishkunhalash, H-6400, Hungary Fuzesh pusta, 42, Kishkunhalash, H-6400, Hungary

Код Code	Назва Name	Адреса Address
2623	Кіндрат Володимир Васильович Kindrat Volodymyr Vasylovych	вул. Академіка Янгеля, буд.93, кв.10, м. Вінниця, 21032 vul. Akademika Ianhelia, bud.93, kv.10, m. Vinnytsia, 21032
2632	Волинська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту картоплярства Національної академії аграрних наук України Volynska derzhavna silskohospodarska doslidna stantsiia Instytutu kartopliarstva Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	вул. Шкільна, 2, смт Рокині, Луцький р-н, Волинська обл., 45626 vul. Shkilna, 2, smt Rokyni, Lutskyi r-n, Volynska obl., 45626
2640	Цибенко Ігор Васильович Tsybenko Ihor Vasylovych	с. Клопотівці, Деражнянський район, Хмельницька область, 32232 s. Klopotivtsi, Derazhnianskyi raion, Khmelnytska oblast, 32232
2641	«ГОСПОДАРСТВО МОУЛИС» «GOSPODARSTVO MOULIS»	Starcevic 6, 43 500 Daruvar, Croatia Starcevic 6, 43 500 Daruvar, Croatia
2643	Сингента Кроп Протекшн АГ Syngenta Crop Protection AG	Rosentalstrasse 67, P.O. Box-4002, Basel Rosentalstrasse 67, P.O. Box-4002, Basel
2644	Сингента Партісіпейшнз АГ Syngenta Participation AG	Rosentalstrasse 67, P.O. Box-4002, Basel Rosentalstrasse 67, P.O. Box-4002, Basel
2649	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА KWS SAAT SE & Co. KGaA	37555 Einbeck, Grimsehlstrasse, 31, Germany 37555 Einbeck, Grimsehlstrasse, 31, Germany
2653	Коссад Семанс ЕС А Caussade Semences S A	Impasse de la lere 82300 CAUSSADE France Impasse de la lere 82300 CAUSSADE France
2654	Приватне підприємство Натур Світ Pryvatne pidpriemstvo Natur Svit	Проспект Науки, 40, оф. 536, м. Харків, Україна, 61045 Prospekt Nauky, 40, of. 536, m. Kharkiv, Ukraina, 61045
2657	Нордзаат Заатцухт ГмбХ Nordsaat Saatzzucht GmbH	Bohnshauser Strabe 1, 38895 Langenstein, Germany Bohnshauser Strabe 1, 38895 Langenstein, Germany
2658	Приватне підприємство «Голд Сідс» Pryvatne pidpriemstvo «Hold Sids»	20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Магістральна, 21 20300, Cherkaska obl., m. Uman, vul. Mahistralna, 21
2659	СЦ АГРОСЕЛ СРЛ SC AGROSEL SRL	405100, Str. Laminoristilor, nr.268, Campia Turzii, Cluj, Romania 405100, Str. Laminoristilor, nr.268, Campia Turzii, Cluj, Romania
2666	Товариство з обмеженою відповідальністю «УНІ КОРН» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «UNI KORN»	вул. Академіка Заболотного, 148, м. Київ, 03143 vul. Akademika Zabolotnoho, 148, m. Kyiv, 03143
2669	УАБ Дотнува Балтік UAB Dotnuva Baltic	Parko str. 6, Akademija, LT-58350 Kedainiai district, Lithuania Parko str. 6, Akademija, LT-58350 Kedainiai district, Lithuania
2674	БТ ТОХУМДЖУЛУК ЗИРААТ ВЕ ТІС.А.С. BT TONUMCULUK ZIRAAT VE TIC.A.S.	Gulbahce Mah. Dr. Sadik Ahmet Cd. Alp Is Merkezi No: 101 Floor: 6 Osmangazi - Bursa/ Turkiye Gulbahce Mah. Dr. Sadik Ahmet Cd. Alp Is Merkezi No: 101 Floor: 6 Osmangazi - Bursa/ Turkiye
2675	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ ЛЕГІОН-АГРО» TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU «KOMPANIYA LEHION-AHRO»	18028, м. Черкаси, вул. Сурикова, буд. 10 18028, m. Cherkasy, vul. Surikova, bud. 10
2676	ТОВ «Грін Фемілі» TOV «Hrin Femili»	вул. Ломоносова, будинок 83 А, кв. 181, м. Київ, 03189, Україна vul. Lomonosova, budynok 83 A, kv. 181, m. Kyiv, 03189, Ukraina
2692	Павловнія Професіональ С.Л. Paulownia Professional S.L.	Camino Estanca S/N apartato correos 50, Alcaniz 44600, Teruel, Espana Camino Estanca S/N apartato correos 50, Alcaniz 44600, Teruel, Espana
2694	Фуглевич Ярослав Миронович Fuhlevych IAroslav Myronovych	вул. Українська, буд. 17, с. Минай, Ужгородський р-н, Закарпатська обл., 89427, Україна vul. Ukrainska, bud. 17, s. Mynai, Uzhhorodskiy r-n, Zakarpatska obl., 89427, Ukraina
2698	Університет Штату Вашингтон Washington State University	Lighty 280/286 P.O. Box 641060 Pullman, Washington 99164-1060 United of America Lighty 280/286 P.O. Box 641060 Pullman, Washington 99164-1060 United of America
2700	ТОВ Наукове-дослідне підприємство «Канбекс Груп» TOV Naukove-doslidne pidpriemstvo «Kanbeks Hrup»	вул. Кирилівська, 82, офіс 256, м. Київ vul. Kyrylivska, 82, ofis 256, m. Kyiv
2703	ГЕРБОНІС АГ HERBONIS AG	Rheinstrasse 30, 4302 Augst BL, Switzerland Rheinstrasse 30, 4302 Augst BL, Switzerland
2704	ТОВ Науковий центр «Український інститут вина» TOV Naukovyi tsentr «Ukrainskyi instytut vyna»	вул. Васильківська 37, м. Київ, Україна vul. Vasylykivska 37, m. Kyiv, Ukraina
2705	ТОВ «Виноробна компанія «Шато Чизай» TOV «Vynorobna kompaniia «Shato Chyzai»	Урочище Чизай, будинок 1, м. Берегове, Закарпатська обл., Україна Urochyshe Chyzai, budynok 1, m. Berehove, Zakarpatska obl., Ukraina
2709	ПРИВАТНЕ ОРЕНДНЕ ПЛЕМІННЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕЛІТА» PRYVATNE ORENDNE PLEMINNE PIDPRYIEMSTVO «ELITA»	вул. Стефаника, 7, м. Тетіїв, Тетіївський р-н, Київська область, 09800 vul. Stefanyka, 7, m. Tetiiv, Tetiivskiy r-n, Kyivska oblast, 09800
2714	Бачинський Анатолій Леонідович Bachynskiy Anatolii Leonidovych	вул. Лесі Українки, 26, кв. 1, м. Біла Церква, Київська обл., 09109, Україна vul. Lesi Ukrainky, 26, kv. 1, m. Bila Tserkva, Kyivska obl., 09109, Ukraina
2718	Товариство з обмеженою відповідальністю «ВВІ-Агро» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «VVI-Ahro»	вул. Приморська 56, с. Новофедорівка, Березанський район, Миколаївська область, 57437 vul. Prymorska 56, s. Novofedorivka, Berezanskyi raion, Mykolaivska oblast, 57437
2719	Юліус Кюн-Інститут Федерал Ресearч Центре фор Култіватед Плантс Julius Kuhn-Institut Federal Research Centre for Cultivated Plants	Erwin-BaurStr. 27-06484. Quedlinburg Erwin-BaurStr. 27-06484. Quedlinburg
2720	МАС СІДС MAS SEEDS	Route de Saint Sever 40280 HAUT-MAUCO FRANCE Route de Saint Sever 40280 HAUT-MAUCO FRANCE
2721	Моніч Руслан Васильович Monich Ruslan Vasylovych	вул. Гагаріна, 9, кв. 25, м. Кропивницький, 25006 vul. Haharina, 9, kv. 25, m. Kropyvnytskyi, 25006
2736	ДЕ РЮЙТЕР ІНТЕЛЛЕКТУАЛ ПРОПЕРТІ Б.В. DE RUITER INTELLECTUAL PROPERTY B.V.	Hoofdweg 81, 1424 PD De Kwakel, The Netherlands Hoofdweg 81, 1424 PD De Kwakel, The Netherlands

Загальновживані скорочення термінів

Common abbreviations

У перекладі з української на англійську мову скорочень термінів у бюлетені використано загальновживані скорочення термінів Міжнародного союзу з охорони нових сортів рослин (UPOV).	The translation from Ukrainian to English of the aberrations in the Bulletin engaged common aberration of terms by the International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV).
ПС – патент на сорт рослин (згідно з термінологією UPOV – права селекціонера),	PBR – Plant Variety Patent (according to UPOV terminology – Plant Breeder's Rights),
РС – державна реєстрація сорту рослин (згідно з термінологією UPOV – національний перелік),	NLI – Plant Variety State Registration (according to UPOV terminology – National Listing),
АС – свідоцтво про авторство на сорт рослин.	AC – Plant Variety Authorship Certificate.
Скорочені назви, скорочення термінів, які вжиті в офіційних описах та показниках господарської придатності:	Short names, aberrations as appearing in the Descriptions and Indices of Value for Cultivation and Use:
П – Полісся,	П – Woodlands,
Л – Лісостеп,	Л – Forest-Steppe,
С – Степ,	С – Steppe,
ЗГр – захищений ґрунт,	ЗГр – covered ground,
С – у трилінійних і подвійних гібридів ознаки можуть відхилятися від своїх значень у певних межах.	S – possible segregation in three-way and double-cross hybrid varieties.

Розподіл ботанічних таксонів за блоками

Кукурудза звичайна

- 1 Ранньостиглий
- 2 Середньоранній
- 3 Середньостиглий
- 4 Середньопізній
- 6 Дуже ранній

Горох посівний (зерновий)

- 3 Середньостиглий (71–80 діб)

Соняшник однорічний

- 1 Ультраранньостиглий: до 100 діб
- 2 Ранньостиглий: 101–115 діб
- 3 Середньоранньостиглий: 116–125 діб
- 4 Середньостиглий: понад 125 діб
- 6 Високоолеїновий (ранньостиглий: 101–115 діб)
- 7 Високоолеїновий (середньостиглий: 116–125 діб)

Ячмінь звичайний (ярий, озимий)

- 2 Голозерний

Ріпак (ярий, озимий)

- 1 Низькоеруковий

Сорго звичайне (двокольорове)

- 4 Ранньостиглий (до 100 діб)
- 6 Середньостиглий (111–120 діб)

Соя культурна

- 6 Ранньостиглий (91–110 діб)
- 7 Середньостиглий (111–130 діб)

Картопля

- 7 Ранньостиглий 81–100 діб
- 8 Середньостиглий 101–125 діб

Пшениця м'яка (озима)

- 1 Середньорослий
- 2 Напівкарлик
- 3 Високорослий

® патент
/ значок рівнозначності

Характеристика 1 – Напрямок використання

пер переробка
зпл заплілювач
цін цінний
ф філер
зерн зерновий
пв пивоварний
х харчовий
олн олійний
ВОЛ високоолеїновий
тхн технічний
стл столовий
конс консервний
ун універсального призначення
свж споживання у свіжому вигляді
овоч овочевий
зріз зріз
озл озеленення
корм кормовий
дкр декоративного оформлення
Е біоенергетичний напрям використання

Характеристика 2 – Група стиглості

ср середньоранній
сс середньостиглий
рс ранньостиглий
рсдн ранньосередній
зим зимовий
осін осінній
ур ультраранній

Характеристика 3 – Якість

сбіл середньобілковий
нбіл низькобілковий
скр середньокрохмальний
пк підвищенокрохмальний
вл високоолійний
сл середньоолійний
нл низькоолійний
ОО низькоеруковий, низькоглюкозинолатний
цін цінний
ф філер
слн сильний

Характеристика 4 – Метод створення

СЗ самозапилення
П перехресне запилення
С сорт-синтетик
F1 гібрид

ОФІЦІЙНЕ ВИДАННЯ
OFFICIAL PUBLICATION

ОХОРОНА ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН

PLANT VARIETY RIGHTS PROTECTION

Бюлетень
BULLETIN

Відповідальний за випуск: Павлюк Н. В.

Комп'ютерне верстання: Бойко А. І.

Номер підготували: Божок Ю. О., Бровкіна М. О., Костенко Н. П., Лашук С. О.,
Мажуга К. М., Тиха Н. В., Худолій Л. В.

Офіційні описи
та показники
господарської
придатності підготували: Баліцька Л. М., Димитров С. Г., Гринів С. М., Матус В. М.,
Мізерна Н. А., Носуля А. М., Ночвіна О. В., Руденко О. А.,
Свинарчук О. В., Симоненко Н. В., Смутьська І. В.,
Сонець Т. Д., Таганцова М. М., Хоменко Т. М.,
Юшкевич М. С.

Передплатний індекс видання – 86211.

Підписано до друку 03.02.2020

Дата друку
Формат 60x84 1/8. Папір офсетний.
Друк офсетний. Гарнітура Officina.
Умов. друк. арк. . Обл.-вид. арк..
Тираж 30 прим. Зам. №
Віддруковано з оригіналів замовника.
21027, а/с 8825, м. Вінниця, вул. Келецька, 51а.
Тел.: (0432) 603-00, 69-67-69, (096) 97-30-934, (093) 89-13-852
e-mail: info@tvoru.com.ua
<http://www.tvoru.com.ua>

**Бюлетень «Охорона прав на сорти рослин» –
офіційне видання, що містить офіційні відомості
щодо охорони прав на сорти рослин.**

Видається 6 разів на рік. Розраховано для:

- науковців;
- викладачів;
- студентів;
- заявників;
- підтримувачів;
- представників з інтелектуальної власності;
- авторів та власників сортів тощо

Передплатний індекс 86211

