

МІНАГРОПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА З ОХОРОНИ ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН

КАТАЛОГ СОРТІВ РОСЛИН
ПРИДАТНИХ ДЛЯ ПОШИРЕННЯ В УКРАЇНІ у 2004 році
(ЦУКРОВИЙ І КОРМОВИЙ БУРЯК)

Київ, 2004 р.

УДК 347.77:633(055) ББК 67.404.1 0-92

Каталог сортів рослин, придатних для поширення в Україні у 2004 році з цукрового і кормового буряку підготували:
Волкодав В.В., Бочкарьов А.М., Гончар О.М., Загинайло М.І., Ілюченко С.Н., Ілюченко О.С.

Адреса Державної служби з охорони прав на сорти рослин:

Вул. Генерала Родімцева, 15, м. Київ-41, 03041, Україна,

тел.: 257-99-33, факс: 257-99-34

e-mail: sops@sops.gov.ua www.sops.gov.ua

Каталог сортів рослин, придатних для поширення в Україні у 2004 році з цукрового і кормового буряку, – К.: Алефа, 2004. – 33 с

©Державна служба з охорони прав на сорти рослин, 2004

Підписано до друку 27. 01.2004 року. Наклад 500 пр. Формат 60х84 1/8

Папір офсетний. Гарнітура Times. Ум. др.арк. 206

Віддруковано у видавництві “Алефа” з оригінал-макету замовника.

Адреса видавництва: 01042, Україна, м. Київ, вул. Перспективна, 3, тел./факс: 268-80-30

Свідоцтво серія ДК № 306 від 28.12.2000 р

ЗМІСТ

Скорочення термінів	5
Сільськогосподарські:буряк	7
Буряк цукровий	7
Буряк кормовий	11
Заявник, підтримувач та їх адреси	13
Описи сортів, що занесені до Реєстру сортів, придатних для поширення в Україні	14
Буряк цукровий	14
Буряк кормовий	29

СКОРОЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Зона - Рекомендована зона вирощування

П	Полісся
Л	Лісостеп
С	Степ
Кр	Крим
ЗГр	захищений ґрунт
1....15	тимчасові виноградарські зони
гідроп	гідропоніка
К	Карпати
ЗГр(СТ)	захищений ґрунт (скляна теплиця)
ЗГр(ПТ)	захищений ґрунт (плівкова теплиця)

Характеристика 1 - Продуктивність

7-9	висока
5	середня
<5	нижчесередньої

Характеристика 2 - Напрямок використання

влп	весняного промислового використання
оз	озимий
ЗПВ	для зон промислової вигодівлі
уц	урожайно-цукристий
цукр	цукристий
++	технічного напрямку
спц	спеція
парф	парфумерна промисловість
пер	переробка
фарм	фармацевтична промисловість
зпл	запилювач
слн	сильний
дф	добрий філер
цін	цінний
ф	філер
зерн	зерновий
зк	зерно-кормовий
пв	пивоварний

зф	задовільний філер
х	харчовий
фж	фуражний
олн	олійний
конд	кондитерський
вол	високоолеїновий
тхн	технічний
лік	лікарський
стл	столовий
тхст	технічно-столовий
сал	салатний
конс	консервний
зс	для соління
ун	універсального призначення
свж	споживання у свіжому вигляді
сил	силовий
лп	луко-пасовищний
мед	медонос
ск	сінокопний
піщ	піщаний
закав	закавказький
зак	залуження схилів та еродованих земель
овоч	овочевий
зх	захисний
прм	промисловий
зріз	зріз
озл	озеленення
аром	ароматичний
склт	скелетний
нц	напівцукровий
корм	кормовий
він	віничний
дкр	декоративного оформлення
лпв	для літнього промислового використання
сд	сидерат
зрош	на зрошуваних землях

хп	для харчової промисловості
всш	придатний для високоштамбової культури
г	гостра
нг	напівгостра
со	солодка
цу	цукристо-урожайний

Характеристика 3 - Група стиглості

ср	середньоранній
сп	середньопізній
сс	середньостиглий
рс	ранньостиглий
пс	пізньостиглий
рсдн	ранньосередній
скс	скоростиглий
зим	зимовий
літ	літній
осін	осінній
нр	надранньостиглий

Характеристика 4 - Зимостійкість/Холодостійкість

7-9	висока
>5	вищесередньої
5	середня
<5	низька

Характеристика 5 - Стійкість до посухи

7-9	висока
5	середня
<5	низька

Характеристика 6 - Стійкість до полягання

7-9	висока
5	середня
<5	низька

Характеристика 7 - Стійкість до осипання

7-9	висока
5	середня

<5	низька
----	--------

Характеристика 8 - Стійкість до хвороб

7-9	висока
5	середня
<5	низька

Характеристика 9 - Якість

вбіл	високобілковий
сбіл	середньобілковий
вкліт	висококлітковинний
скліт	середньоклітковинний
мал	малоалкалоїдний
сал	середньоалкалоїдний
вдек	високодекоративний
дек	декоративний
вщі	з високою щільністю покриття
сщі	з середньою щільністю покриття
влеж	високолежкий
слеж	середньолежкий
вц	високоцукристий
сц	середньоцукристий
вкр	висококрохмальний
скр	середньокрохмальний
вл	високоолійний
сл	середньоолійний
боп	безопійний
лік	лікарський
о	низькоеруковий
++	високоеруковий
о+	середньоеруковий
нгл	низькоглюкозинолатний
сгл	середньоглюкозинолатний
цін	цінний
ф	філер
зрош	на зрошуваних землях
слн	сильний
слн	сильний

Сорт			Код	Зона	Характеристики								Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач		Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				
									посухи	полягання	осипання	хвороб	
Сільськогосподарські: буряк													
Буряк цукровий - 100													
Аватар	94013095	1999	948 736 /	ЛП	8	уц						5-7	сц
Аратта	94013096	2001	736 /	ЛП	8	уц						5-7	сц
Арій І	98013056	2002	736 /	Л	8	уц						5-7	сц
Анічка	00013019	2003	334 /	ЛП	8	уц						7	сц
Астро	92013057	1995	829 /	СЛП	9	уц						5-7	сц
Аббатіса	00013030	2003	736 /	СЛП	9	уц						5-7	сц
Адастра	99013039	2003	736 /	ЛП	8	уц						5-7	сц
Альтій	92013001	1998	334 / 334	С	7	уц						5-7	сц
Анданте	99013005	2002	829 /	П	8	уц						5-7	сц
Аріана	97013019	2001	938 /	СЛП	9	уц						5-7	сц
Білоцерківський однонасіінний 45	79013001	1984	335 / 334	П	8	уц						5-7	сц
БТС 903 УА	99013001	2002	1032 /	Л	8	уц						5-7	сц
БЦ-СІД	00013006	2003	334 /	ЛП	9	уц						7	сц
Білоцерківський ЧС 90	94013093	1999	335 / 334 938	ЛС	8	уц						5-7	сц
Білоцерківський ЧС 57	91013011	1995	335 / 334	Л	7	уц						5-7	сц
Білоцерківський ЧС 51	90013005	1995	128 /	Л	7	уц						5-7	сц
Верхняцький ЧС 63	91013004	1996	422 / 334	Л	7	уц						5-7	сц
Ворскла	00013013	2003	334 /	ЛП	9	уц						7	сц
Веселоподолянський однасіінний 29	71013002	1979	388 /	СЛП	8	уц						5	сц
Весто	98013049	2001	1082 /	Л	8	уц						5-7	сц
Габор	00013034	2004	829 /	СЛП	8-9	уц						7-8	вц
Гала	94013046	1993	938 /	ЛП	8	уц						5-7	сц
Галина	92013006	1998	334 /	ЛП	8	уц						5-7	сц

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації			Заявник / Підтримувач	Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)			
			посухи	полягання						осипання	хвороб		
Данієла	98013063	2002	938 /	Л	8	уц						5-7	сц
Джорджина	00013037	2004	938 /	СЛП	9	уц						7-8	вц
Джованна	99013041	2003	938 /	СЛП	9	уц						5-7	сц
Двіна	97013002	2001	749 /	ЛП	8	уц						5-7	сц
Дана	92013097	1997	879 /	Л	7	уц						5-7	сц
Екстра	91013052	1995	938 /	ЛП	8	уц						5-7	сц
Елуді	99013034	2002	796 /	П	8	цукр						5-7	вц
Емма	89013020	1994	1086 /	ЛП	8	уц						5-7	сц
Іванівсько-Веселоподільський ЧС 84	95013002	1999	394 / 334	ЛП	8	уц						5-7	сц
Іванівський ЧС 33	87013002	1993	394 / 334	ЛП	8	уц						5-7	сц
Індустріальний	81013010	1985	333 /	ЛП	7	уц						5-7	сц
Кубанський ЧС 36	88013002	1995	736 /	СЛ	8	уц						5-7	сц
КВ-Буг	98013022	2001	334 / 334	Л	8	уц						5-7	сц
Київський ЧС 62	91013001	1996	334 / 334	Л	7	уц						5-7	сц
Купнівська	95013011	2000	884 /	Л	7	уц						5-7	сц
Кий	92013031	1997	1086 /	ЛП	8	цукр						5-7	вц
Крістал	91013099	1996	788 /	ЛП	8	цукр						5-7	вс
КВ-Вінниця	98013023	2001	334 / 334	Л	8	уц						5-7	сц
КВ-Збруч	98013036	2001	1082 /	Л	8	уц						5-7	сц
Крістелла	98013045	2001	938 /	ЛП	8	уц						5-7	сц
Каверось	94013005	1998	938 /	Л	8	уц						5-7	сц
КВ-бар	98013050	2001	334 / 334	Л	8	уц						5-7	сц
Ківа	92013063	1997	938 /	СЛП	9	уц						5-7	сц
Константа	01013015	2004	334 /	СЛП	9	уц						8	вц
КВ-Марта	01013008	2004	334 /	СЛ	7-8	уц						7	сц
КВ-Умань	00013003	2003	334 /	ЛП	9	уц						7	сц

Сорт			Код	Зона	Характеристики								Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік рес- тації	Заявник / Підтримувач		Проду- ктивність	Напря- м вико- рис- тання	Група стиг- лості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				
								посу- хи	поля- ган- ня	осипан- ня	хвороб		
Куявська	01013017	2003	884 /	СЛП	9	уц					7	сц	
КВ-Дніпро	00013010	2002	334 / 334	ЛП	9	уц					7	сц	
Кобра	94013024	1999	829 /	П	8	уц					5-7	сц	
КВ-Десна	00013008	2002	334 / 334	П	8	уц					7	сц	
КВ Ялтушків	94013049	1999	938 /	ЛПС	9	уц					5-7	сц	
КВ-Степ	99013013	2002	334 / 334	С	8	ур					5-7	сц	
Львовський ЧС 35	88013001	1993	128 /	П	7	уц					5	сц	
Лазер	91013055	1997	1086 /	СЛП	9	уц					5-7	сц	
Лена	90013017	1993	938 /	ЛП	8	уц					5-7	сц	
ЛБ ЧС 39	88013005	1995	128 /	Л	7	уц					5-7	сц	
ЛВ ЧС 31	86013003	1991	128 /	ЛП	8	уц					5-7	сц	
ЛВ ЧС 40	88013006	1993	422 /	Л	7	уц					5-7	сц	
Ленора	98013064	2002	938 /	СЛП	9	уц					5-7	сц	
Лідер	95013025	2000	1086 /	ЛП	8	уц					5-7	сц	
Маестро	92013069	1996	788 /	Л	7	уц					5-7	сц	
Максим	01013004	2004	334 /	СЛП	8-9	уц					7-8	вц	
Наталка	94013019	1999	970 /	СЛ	8	уц					5-7	сц	
Оксана	94013018	1999	970 /	ЛП	8	уц					5-7	сц	
Олександрія	92013058	1997	394 / 334	ЛП	8	уц					5-7	сц	
Олівія	94013015	1999	938 /	Л	8	уц					5-7	сц	
Орікс	88013012	1993	713 /	ЛП	8	уц					5-7	сц	
Перла	88013018	1993	938 /	ЛП	8	цукр					5-7	вц	
Пірат	99013049	2003	829 /	ЛП	8	уц					5-7	сц	
Прізма	91013058	1997	788 /	ЛП	8	цукр					5-7	вц	
Роберта	95013017	2000	938 /	ЛП	8	уц					5-7	сц	
Рубін	95013032	2000	788 /	Л	7	уц					5-7	сц	
Сара	00013033	2004	879 /	СЛП	9	Цукр					8	вц	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
Назва Вид	Номер заявки	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач		Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
									посухи	полягання	осипання	хвороб	
Свіфт	98013060	2002	713 /	ЛП	8	уц						5-7	сц
Сідней	95013069	2000	788 /	Л	8	уц						5-7	сц
Соня	92013028	1997	938 /	ЛП	8	цукр						5-7	вц
Слов'янський ЧС 94	88013017	1992	304 / 334	ЛП	8	уц						5-7	сц
Серенаде	97013008	2001	1032 /	Л	7	уц						5-7	сц
Софія	01013011	2004	334 /	СЛ	8	уц						7-8	сц
Український ЧС 72	99013030	2002	334 / 334	Л	8	уц						5-7	сц
Уладівський ЧС 35	98013058	2002	736 /	Л	8	уц						5-7	сц
Уманський ЧС 90	99013045	2003	334 /	СЛП	9	цу						5-7	вц
Український ЧС 70	87013003	1992	421 / 334	СЛП	9	уц						5-7	сц
Уладівський однонасіиний 35	73013005	1979	304 / 334	П	7	уц						5	сц
УЛІВ ЧС 37	88013003	1993	304 / 334	Л	7	уц						5-7	сц
Уляна	95013024	1999	304 /	ЛП	8	уц						5-7	сц
Уманський ЧС 76	94013009	1997	421 / 334	С	7	уц						5-7	сц
Уманський ЧС 97	99013044	2003	334 /	ЛП	8	цу						5-7	вц
Хілма	89013019	1994	1086 /	ЛП	8	уц						5-7	сц
Шевченківський	99013023	2002	334 / 334	СЛ	8	ур						5-7	сц
Ювілейний	76013004	1981	421 / 334	СЛП	9	уц						5-7	сц
Ялгушківський ЧС 72	92013108	1997	872 /	ЛП	8	уц						5-7	сц
Яміра	92013098	1997	884 /	СЛ	8	уц						5-7	сц
Яхіл	01013010	2004	334 /	СЛ	8	уц						7	сц
Явір	99013008	2002	334 / 334	Л	8	уц						5-7	сц
Ялгушківський однонасіиний 30	72013012	1979	303 / 334	СЛП	9	уц						5-7	сц
Ялгушківський однонасіиний 64	94013001	1992	303 / 334	Л	7	уц						5-7	сц

Сорт			Код	Зона	Характеристики								Якість
Назва Вид	Номер заявки	Рік ресестрації	Заявник / Підтримувач		Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				
									посухи	полягання	осипання	хвороб	
Буряк кормовий - 33													
Авангард	82046003	1987	333 /	С	7	нц							7
Адра	97046004	2001	736 /	Л	7	корм							8
Барбара	92046007	1995	788 /	СЛП	9	корм							8
Болеро	90046012	1993	713 /	СЛП	9	корм							8
Веселка	99046002	2002	421 /	Л	7	корм							8
Галицький	00046002	2004	371 /	СЛП	8	корм							7-8
Донор	84046001	1988	345 /	П	7	корм							8
Дарина	99046001	2003	345 /	Л	7	корм							7
Екендорфський жовтий	37046003	1947	812 /	СЛП	8-9	корм							7-8
Кракус	95046008	1999	991 /	С	8	корм							7-8
Козіма	95046004	1999	938 /	С	7	корм							8
Київський	72046001	1979	345 /	ЛП	8	нц							8-9
Кірос	97046001	2000	788 /	Л	8	нц							7-8
Львівський жовтий	72046002	1977	371 /	СЛП	9	корм							8
Магнум	92046003	1998	788 /	ЛП	8	корм							7
Переможець	40046001	1947	387 /	СЛП	9	корм							7
Панфільський однонасінний	85046001	1990	345 /	Л	7-8	нц							8
Полтавський білий	58046001	1959	387 /	СЛП	8-9	корм							7
Полтавський 71	90046010	1995	387 /	СЛП	9	корм							6-8
Полтавський напівцукровий	82046001	1985	387 /	ЛП	8	нц							7-8
Селена	94046005	2000	345 /	Л	7	корм							8
Сонет	00046001	2004	334 /	СЛП	8	корм							7-8
Солідар	02046002	2004	991 /	СЛП	8	корм							7-9
Тамара	92046001	1999	938 /	С	8	корм							7

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
Назва Вид	Номер заявки	Рік рес-тації			Заявник / Підтримувач	Проду-ктивність	Напря-м викорис-тання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)			
			посухи	поля-гання						осипання	хвороб		
Тітан Полі	95046006	2000	991 /	Л	8	корм						7	
Тімірязівка 87	87046001	1992	164 /	Л	7	корм						6-7	
Гринізький напівцукро-вий	86046001	1992	355 /	Л	7	нц						6-7	
Уманський КБ-2	95046003	1999	421 /	СЛП	9	корм						7-8	
Уреус	95046005	1999	991 /	С	7-8	корм						7-8	
Уреус Полі	95046009	1999	991 /	С	8-9	корм						7-8	
Уманський напівцукровий	85046002	1992	421 /	СЛП	9	нц						8	
Уманський кормовий 7	00046003	2003	421 /	СЛП	9	корм						8	
Центаур Полі	95046010	1999	991 /	СЛ	9	нц						8-9	

№ п/п	Назва сортів	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач	Зона	Властивості сортів									
					Висота рослин (см)	Рісткова форма	Термін дозрівання (днів)	Врожайність (ц/га)	Зимостійкість	Холодостійкість	Стійкість до посухи	Стійкість до морозів	Стійкість до хвороб	Стійкість до шкідників

Код	Назва	Адреса заявника або підтримувача
4	Бійська дослідно-селекційна станція	П/в Зональне, Зональний р-н, Алтайський Край, Росія, 659890
128	Льговська дослідно-селекційна станція	П/в Льговська селекційна станція, Льговський р-н, Курська обл., Росія, 307320
164	Московська сільськогосподарська академія ім. К.О.Тімірязєва	Вул. Тімірязєвська, 47, Москва, Росія, 127550
303	Ялтушківська дослідно-селекційна станція Інституту цукрових буряків УААН	П/в Ялтушків, Барський р-н, Вінницька обл., 23021
304	Уладово-Люлінецька дослідно-селекційна станція Інституту цукрових буряків УААН	П/в Жовтневе, Калинівський р-н, Вінницька обл., 22412
333	Інститут молекулярної біології і генетики Національної академії наук	Вул. Заболотного, 150, Київ, 03143
334	Інститут цукрових буряків Української академії аграрних наук	Вул. Клінічна, 25, Київ, 03110
335	Білоцерківська дослідно-селекційна станція ім. О.К. Коломієць Інституту цукрових буряків УААН	П/в Мала Вільшанка, 1, Білоцерківський р-н, Київська обл., 09175
338	Панфілівська дослідна станція Інституту землеробства Української академії аграрних наук	С. Панфіли, Яготинський р-н, Київська обл., 07750
345	Інститут землеробства Української академії аграрних наук	Вул. Машинобудівників 2-б, смт. Чабани, Києво-Святошинський р-н, Київська обл., 08162
355	Інститут фізіології рослин і генетики Національної академії наук	Вул. Васильківська, 31/17, Київ, 03022
371	Інститут землеробства і тваринництва західного регіону УААН	С. Оброшино, Пустомитівський р-н, Львівська обл., 81115
387	Полтавська державна сільськогосподарська дослідна станція	Вул. Шведська, 86, Полтава, 36029
388	Веселоподільська дослідно-селекційна станція Інституту цукрових буряків УААН	П/в Вереміївка, Семенівський р-н, Полтавська обл., 38251
394	Іванівська дослідно-селекційна станція Інституту цукрових буряків УААН	П/в Сонячне, Охтирський р-н, Сумська обл., 42768
421	Філіал Інституту цукрових буряків Української академії аграрних наук	Вул. Інтернаціональна, 4, м. Умань, Черкаська обл., 20300
422	Верхняцька дослідно-селекційна станція Інституту цукрових буряків Української академії аграрних наук	П/в Верхнячка, Христинівський р-н, Черкаська обл., 20022
713	Аванта Інтернешнл Б.В., (СЕС - Європа Н.В./С.А.)	Industriepark 15, 3300 Tienen, Belgium
736	ТОВ "Всеукраїнський науковий інститут селекції (ВНІС)"	ОФ.36, вул. Ломоносова 30/2, Київ, Україна, 03022
749	Аванта Інтернешнл Б.В. (Ді Джей Ван дер Хаге Б.В.)	П.О.Бокс 1, 4421 АЖ, Капеле, Дейквельзештрат 70, Голандія. Пр.: офіс, 302, вул. Госпітальна, 12, Київ
788	Даніско Сід ГмбХ	Бреуншвайгер Штр., 22 б, Д - 38154, Кенігілутер ам Ельм, Німеччина
796	С.А. Флоримонд Депре	Б.П. 41. Капель, Темплев, Франція, 59242
812	В. фон Боріс-Екендорф ГмбХ енд Ко	Більфельдер штрассе 233, 33818 Леопольдсхохе, Німеччина
829	Фр.Штрубе Заатцухт КГ Золлінген	Поштфах 1363, 38358 Шонінген, Німеччина. Пр.: с. Хоцьки, Переяслав-Хмельницький р-н, Київська обл., 08473
872	Селект Бучани	Словаччина 91928, Бучані, Словенско
879	Інститут польовництва та овочівництва, м.Нові Сад	М. Горкого 30, 21000 Нові Сад, Югославія Пр.: "Продуктива", кор. 1, вул. Весняна 1, Сонячний, м. Запоріжжя, 332110.
884	Кутновська Годовля Бурака Цукрового Сп. з о.о.	Вул. Пшеміслава, 5, 99-300 Кутно, Польща
938	КВС ЗААТ АГ	П.О.Бокс 1463, Д - 37555 Айнбек, Німеччина. Пр.: вул. Закревського, 85 - Б, кв. 123, Київ 02232
970	Деліч Пфланценцухт ГмбХ	Болерзенер Вег 5, Д - 29303 Берген, Німеччина
991	Малополска Годовля Рослин - ХБГ - Сполка з о.о.	30-002 Краков, вул. Збозова, 4, Польща
1032	Бетасід, Інк.	1788 Маршал Роуд, Шейкопі, МН 55379, США
1082	Закрите акціонерне товариство "Ворскла"	Вул. Б.Хмельницького, 37, м. Тростянець, Сумська обл., Україна, 42600
1086	Сингента Сідс АБ (Новартіс Сідз АБ, Хиллесхег АБ)	Зокербруксваген 1, БОКС 302, С-261 23, Ландакрона, Швеція. Пр.: вул. Предславінська 19, м. Київ 03150

ОПИСИ ГІБРИДІВ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ, ЩО ЗАНЕСЕНІ ДО РЕЄСТРУ СОРТІВ, ПРИДАТНИХ ДЛЯ ПОШИРЕННЯ В УКРАЇНІ ЗА ОСТАННІ ШІСТЬ РОКІВ

Олівія – триплоїдний гібрид фірми КВС ЗААТ АГ (Німеччина).

Насіння гібрида однозародкове. Гіпокотиль 20% рослин зеленого, 80% - червоного кольору. Листя середнього розміру. Коренеплід конічної форми.

За роки випробування (1995-1997) середня врожайність коренеплодів становила 524 ц/га, цукристість – 17,5%, збір цукру з гектара – 91 ц. Найвища врожайність отримана в 1996 році на Тлумацькій ДСВС Івано-Франківської області - 679 ц/га, що більше середньо-зваженого стандарту на 42 ц/га.

Гібрид стійкий до ураження коренеїдом, толерантний до церкоспорозу, має хорошу придатність до механізованого збирання.

Рекомендований для вирощування в зоні Лісостепу.

Скандік – диплоїдний гібрид фірми Новартіс Сідс АБ (Швеція).

Насіння гібрида однозародкове. Гіпокотиль білого кольору. Листя велике. Коренеплід конічної форми.

За роки випробування (1995-1997) середня врожайність коренеплодів у зонах Лісостепу становила 511 ц/га, Полісся – 525 ц/га, цукристість відповідно 17,6; 18,0%, збір цукру з гектара 90-95 ц. Найвища врожайність отримана в 1995 році в НДЦ “Сорт” Київської області - 717 ц/га, що більше середньо-зваженого стандарту на 84 ц/га.

Гібрид стійкий до цвітущості, ураження борошнистою росою та рамуляріозом.

Рекомендований для вирощування в зонах Лісостепу та Полісся.

Білоцерківський ЧС 90 – триплоїдний гібрид Білоцерківської ДСС ІЦБ УААН створений спільно з фірмою КВС ЗААТ АГ (Німеччина).

Насіння гібрида однозародкове. Листя середнього розміру. Коренеплід конічної форми.

За роки випробування (1995-1997) середня врожайність коренеплодів становила 516 ц/га, цукристість – 17,0%, збір цукру з гектара – 89 ц. Найвища врожайність отримана в 1996 році на Тлумацькій ДСВС Івано-Франківської області - 748 ц/га, що більше середньо-зваженого стандарту на 110 ц/га.

Гібрид стійкий до цвітущості, ураження коренеїдом та церкоспорозом, має хорошу придатність до механізованого збирання, потребує високого агрофону

Рекомендований для вирощування в зоні Лісостепу.

Іванівсько-Веселоподільський ЧС 84 - триплоїдний гібрид Веселоподолянської ДСС створений спільно з Іванівською ДСС ІЦБ УААН.

Насіння гібрида однозародкове. Листя велике. Коренеплід конічної форми.

За роки випробування (1995-1997) середня врожайність коренеплодів становила 480 ц/га, цукристість – 17,5%, збір цукру з гектара – 86 ц. Найвища врожайність отримана в 1996 році на Кицманській ДСВД Чернівецької області - 685 ц/га, що більше середньо-зваженого стандарту на 51 ц/га.

Гібрид стійкий до ураження коренеїдом та церкоспорозом, схильний до цвітушності, але незначної. За роки випробування максимальна кількість стрілкуючих рослин становила 0,4%.

Рекомендований для вирощування в зоні Лісостепу.

Аватар – диплоїдний гібрид науково-виробничої фірми “Гран”

Насіння гібрида однозародкове. Листя середнього розміру. Коренеплід конічної форми.

Гібрид одержаний схрещенням трьох роздільно-квіткових (однонасінних) самонесумісних ліній з однією чоловічо-стерильною материнською лінією, які переzapилюються між собою. Сумісне збирання всіх компонентів схрещування дає змогу використовувати одержану суміш, яка включає лише гібридне насіння, на фабричні посіви.

За роки випробування (1995-1997) середня врожайність коренеплодів становила 496 ц/га, цукристість – 17,3%, збір цукру з гектара – 86 ц. Найвища врожайність отримана в 1996 році на Кицманській ДСВД Чернівецької області - 776 ц/га, що більше середньо-зваженого стандарту на 142 ц/га.

Гібрид стійкий до цвітушності, коренеїду, толерантний до церкоспорозу, має хорошу придатність до механізованого збирання.

Рекомендований для вирощування в зонах Лісостепу та Полісся.

КВ-Ялтушків – триплоїдний гібрид Ялтушківської ДСС ІЦБ УААН створений спільно з фірмою КВС ЗААТ АГ (Німеччина).

Насіння гібрида однозародкове. Гіпокотиль в 30% рослин зеленого, 70% - червоного кольору. Листя середнього розміру. Коренеплід конічної форми.

За роки випробування (1995-1997) середня врожайність коренеплодів у зонах Лісостепу становила 530 ц/га, Полісся – 564 ц/га, цукристість 17,5%, збір цукру з гектара 93-99 ц. Найвища врожайність отримана в 1995 році в НДЦ “Сорт” Київської області - 742 ц/га, що більше середньо-зваженого стандарту на 109 ц/га.

Гібрид стійкий до цвітушності, толерантний до ураження коренеїдом та церкоспорозом, має хорошу придатність до механізованого збирання.

Рекомендований для вирощування в зонах Лісостепу та Полісся.

Уляна – диплоїдний гібрид Уладово-Люлінецької ДСС ІЦБ УААН створений спільно з фірмою КВС ЗААТ АГ (Німеччина).

Насіння гібрида однозародкове. Листя малого розміру. Коренеплід конічної форми. Заглибленість в ґрунті середня.

Гібрид поєднує високу врожайність коренеплодів з високою цукристістю в різних ґрунтово-кліматичних умовах. За роки випробування (1995-1997) середня врожайність коренеплодів у зонах Лісостепу становила 546 ц/га, Полісся – 559 ц/га, цукристість відповідно 17,7; 17,9%, збір цукру з гектара 93-99 ц. Найвища врожайність отримана в 1997 році в НДЦ “Сорт” Київської області - 809 ц/га, що більше середньо-зваженого стандарту на 277 ц/га.

Гібрид стійкий до цвітущості, коренеїду та церкоспорозу. Має високу придатність до механізованого збирання. Рекомендований для вирощування в зонах Лісостепу та Полісся.

Сідней – триплоїдний гібрид фірми Даніско Сід ГмбХ (Німеччина).

Насіння гібрида однозародкове. Гіпокотиль червоно-пурпурного кольору. Листя середнього розміру. Коренеплід циліндрично-конічної форми.

За роки випробування (1997-1998) середня врожайність коренеплодів становила понад 500 ц/га, цукристість – 18,0%, збір цукру з гектара – 93 ц. Найвища врожайність отримана в 1998 році на Горохівській ДСВС Волинської області - 785 ц/га, що більше середньозваженого стандарту на 93 ц/га.

Гібрид стійкий до цвітущості, ураження коренеїдом та церкоспорозом.

Рекомендований для вирощування в зоні Лісостепу.

Рубін – триплоїдний гібрид фірми Даніско Сід ГмбХ (Німеччина).

Насіння гібрида однозародкове. Гіпокотиль червоно-пурпурного кольору. Листя велике. Коренеплід конічної форми з неглибокою борозенкою.

За роки випробування (1997-1998) середня врожайність коренеплодів становила понад 500 ц/га, цукристість – 18,0%, збір цукру з гектара – 93 ц. Найвища врожайність отримана в 1998 році на Горохівській ДСВС Волинської області - 770 ц/га, що більше середньозваженого стандарту на 78 ц/га.

Гібрид стійкий до цвітущості, ураження коренеїдом та церкоспорозом. Має високу придатність до механізованого збирання.

Рекомендований для вирощування в зоні Лісостепу.

Кутновська – триплоїдний гібрид Кутновської Ходовлі Бурая Цукрового Сп. з.о.о. (Польща), створений спільно з фірмою КВС ЗААТ АГ (Німеччина).

Насіння гібрида однозародкове. Гіпокотиль в 16% рослин зеленого, 84% - рожевого кольору. Листя середнього розміру з довгим черешком. Коренеплід конічної форми з вирівняною борізкою в місцях прикріплення корінців.

За роки випробування (1996-1998) середня врожайність коренеплодів становила понад 494 ц/га, цукристість – 17,5%, збір цукру з гектара – 86 ц. Найвища врожайність отримана в 1998 році на Горохівській ДСВС Волинської області - 715 ц/га, що більше середньозваженого стандарту на 23 ц/га.

Гібрид стійкий до цвітущості, толерантний до ураження коренеїдом та церкоспорозом, перенеспорозом та жовтухою, має хорошу придатність до механізованого збирання.

Рекомендований для вирощування в зоні Лісостепу.

Лідер – диплоїдний гібрид фірми Новартіс Сіідс АБ (Швеція) створений спільно з Уладово-Льолінецькою ДСС ІЦБ УААН.

Насіння гібрида однозародкове. Листя середнього розміру. Коренеплід конічної форми з невеликою борозенкою, що не сприяє налипанню ґрунту. Гібрид з хорошою пластичністю, поєднує високу врожайність коренеплодів з високою цукристістю.

За роки випробування (1996-1998) середня врожайність коренеплодів у зонах Лісостепу становила 480 ц/га, Полісся – 587 ц/га, цукристість відповідно 17,9; 17,9%, збір цукру з гектара 86-106 центнерів. Найвища врожайність отримана в 1997 році в Тлумацькій ДСВС Івано-Франківської області - 749 ц/га, що більше середньо-зваженого стандарту на 295 ц/га.

Гібрид стійкий до цвітущості та основних листових хвороб. Має середню стійкість до засухи.

Рекомендований для вирощування в зонах Лісостепу та Полісся.

Роберта –диплоїдний гібрид фірми КВС ЗААТ АГ (Німеччина).

Насіння гібрида однозародкове. Гіпокотиль в 30% рослин зеленого, 70% - червоного кольору. Листя та їх черешки середнього розміру. Коренеплід конічної форми.

За роки випробування (1996-1998) середня врожайність коренеплодів у зонах Лісостепу становила 511 ц/га, Полісся – 576 ц/га, цукристість відповідно 17,6; 18,5%, збір цукру з гектара 91-102 центнерів. Найвища врожайність отримана в 1998 році в Тлумацькій ДСВС Івано-Франківської області - 858 ц/га, що більше середньо-зваженого стандарту на 166 ц/га.

Гібрид стійкий до цвітущості, толерантний до ураження коренейдом та церкоспорозом, має хорошу придатність до механізованого збирання.

Рекомендований для вирощування в зонах Лісостепу та Полісся.

Наталка –триплоїдний гібрид фірми Деліч (Німеччина).

Насіння гібрида однозародкове. Листя та їх черешки середнього розміру. Коренеплід конічної форми.

За роки випробування (1995-1997) середня врожайність коренеплодів у зонах Лісостепу становила 525 ц/га, Степу – 487 ц/га, цукристість відповідно 17,9; 16,2%, збір цукру з гектара 93,2; 78,3 центнерів. Найвища врожайність отримана в 1997 році в Андрушівській ДСВС Житомирської області - 718 ц/га, що більше середньо-зваженого стандарту на 131 ц/га.

Гібрид стійкий до цвітущості, толерантний до ураження коренейдом та церкоспорозом, має хорошу придатність до механізованого збирання.

Рекомендований для вирощування в зонах Лісостепу та Степу

Оксана –триплоїдний гібрид фірми Деліч (Німеччина).

Насіння гібрида однозародкове. Листя та їх черешки середнього розміру. Коренеплід конічної форми.

За роки випробування (1995-1997) середня врожайність коренеплодів у зонах Лісостепу становила 526 ц/га, Полісся – 551 ц/га, цукристість відповідно 17,7; 17,5%, збір цукру з гектара 92,3; 96,7 центнерів. Найвища врожайність отримана в 1997 році в Тлумацькій ДСВС Івано-Франківської області - 737 ц/га, що більше середньо-зваженого стандарту на 94 ц/га.

Гібрид стійкий до цвітущості, толерантний до ураження коренейдом та церкоспорозом, має хорошу придатність до механізованого збирання.

Рекомендований для вирощування в зонах Лісостепу та Полісся.

Кобра – триплоїдний гібрид фірми Штрубе-Дікман (Німеччина).

Насіння гібрида однозародкове. Гіпокотиль в 30% рослин зеленого, 70% - червоного кольору. Листя та їх черешки середнього розміру. Коренеплід конічної форми.

За роки випробування (1996-1998) середня врожайність коренеплодів в зоні Полісся становила 551 ц/га, цукристість 17,6%, збір цукру з гектара 97,8 центнерів. Найвища врожайність отримана в 1998 році в Тлумацькій ДСВС Івано-Франківської області - 638 ц/га, що більше середньо-зваженого стандарту на 128 ц/га.

Гібрид стійкий до цвітушності, толерантний до ураження коренеїдом та церкоспорозом, має хорошу придатність до механізованого збирання.

Рекомендований для вирощування в зоні Полісся.

Двіна – триплоїдний гібрид фірми Адванта (Бельгія).

Насіння гібрида однозародкове. Гіпокотиль в 32% рослин зеленого, 68% - червоного кольору. Листя та їх черешки середнього розміру. Коренеплід конічної форми.

За роки випробування (1997-1999) середня врожайність коренеплодів у зонах Лісостепу становила 460 ц/га, Полісся – 572 ц/га, цукристість відповідно 18,0; 17,2%, збір цукру з гектара 84,2; 98,9 центнерів. Найвища врожайність отримана в 1998 році в Горохівській ДСВС Волинської області - 743 ц/га, що більше середньо-зваженого стандарту на 51 ц/га.

Гібрид толерантний до цвітушності, стійкий до ураження коренеїдом та церкоспорозом, має хорошу придатність до механізованого збирання.

Рекомендований для вирощування в зонах Лісостепу та Полісся.

Аріана – триплоїдний гібрид фірми КВС ЗААТ АГ (Німеччина).

Насіння гібрида однозародкове. Гіпокотиль в 40 % рослин зеленого, 60 % - червоного кольору. Листя та їх черешки середнього розміру. Коренеплід конічної форми.

За роки випробування (1997-1999) середня врожайність коренеплодів у зонах Степу становила 474 ц/га, Лісостепу – 465 ц/га, Полісся – 567 ц/га, цукристість відповідно 17,0; 17,7; 16,6 %, збір цукру з гектара відповідно 79,7; 81,9; 94,2 центнерів. Найвища врожайність отримана в 1998 році в Горохівській ДСВС Волинської області - 783 ц/га, що більше середньо-зваженого стандарту на 91 ц/га.

Гібрид стійкий до цвітушності, ураження коренеїдом та церкоспорозом, має хорошу придатність до механізованого збирання, має високу технологічну якість.

Рекомендований для вирощування на всій території України.

Серенаде – триплоїдний гібрид фірми Бета сид (США).

Насіння гібрида однозародкове. Гіпокотиль до 30% рослин зеленого, решта - червоного кольору. Листя середнього розміру. Коренеплід конічної форми.

За роки випробування (1997-1999) середня врожайність коренеплодів становила 470 ц/га, цукристість – 18,0 %, збір цукру з гектара – 84,2 центнерів. Найвища врожайність отримана в 1998 році на Горохівській ДСВС Волинської області - 781 ц/га, що більше середньо-зваженого стандарту на 89 ц/га.

Гібрид толерантний до цвітушності та ураження коренейдом і церкоспорозом, має хорошу придатність до механізованого збирання. Рекомендований для вирощування в зоні Лісостепу

Аратта – триплоїдний гібрид науково-виробничої фірми Гран.

Насіння гібрида однозародкове. Листя середнього розміру. Коренеплід конічної форми.

За роки випробування (1997-1999) середня врожайність коренеплодів становила 503 ц/га, цукристість – 17,6%, збір цукру з гектара – 88,6 ц Найвища врожайність отримана в 1998 році в НДЦ “Сорт” Київської області - 642 ц/га, що більше середньо-зваженого стандарту на 277 ц/га.

Гібрид толерантний до цвітушності, стійкий до коренейду та церкоспорозу, має хорошу придатність до механізованого збирання.

Рекомендований для вирощування в зонах Лісостепу та Полісся

КВ-Збруч – диплоїдний гібрид закритого акціонерного товариства Ворскла. Створений Ялтушківською ДСС ПЦБ з використанням лінії запилювача КВС ЗААТ АГ (Німеччина).

Насіння гібрида однозародкове. Гіпокотиль рожевого кольору. Листя середнього розміру. Коренеплід конічної форми.

За роки випробування (1997-1999) середня врожайність коренеплодів становила 461 ц/га, цукристість – 18,5 %, збір цукру з гектара – 85,4 центнерів. Найвища врожайність отримана в 1998 році на Тернопільській ДСВС Тернопільської області - 585 ц/га, що більше середньо-зваженого стандарту на 37 ц/га.

Гібрид стійкий до цвітушності та ураження коренейдом і церкоспорозом, має хорошу придатність до механізованого збирання.

Рекомендований для вирощування в зоні Лісостепу

Весто – диплоїдний гібрид закритого акціонерного товариства Ворскла

Насіння гібрида однозародкове. Гіпокотиль зеленого кольору. Листя середнього розміру. Коренеплід конічної форми.

За роки випробування (1998-1999) середня врожайність коренеплодів становила 473 ц/га, цукристість – 18,2%, збір цукру з гектара – 85,8 ц Найвища врожайність отримана в 1998 році на Горохівській ДСВС Волинської області - 677 ц/га, що більше середньо-зваженого стандарту на 45 ц/га.

Гібрид стійкий до цвітушності та ураження коренейдом і церкоспорозом, має хорошу придатність до механізованого збирання.

Рекомендований для вирощування в зоні Лісостепу

КВ-Бар – триплоїдний гібрид Ялтушківської ДСС ПЦБ УААН створений спільно з фірмою КВС ЗААТ АГ (Німеччина).

Насіння гібрида однозародкове. Гіпокотиль зеленого кольору. Листя середнього розміру. Коренеплід конічної форми.

За роки випробування (1998-2000) середня врожайність коренеплодів у зоні Лісостепу становила 467 ц/га, цукристість 17,9%, збір цукру з гектара 84 ц. Найвища врожайність отримана в 1998 році в Горохівській ДСВС Волинської області - 759 ц/га, що більше середньо-зваженого стандарту на 67 ц/га.

Гібрид стійкий до цвітушності, коренеїду та церкоспорозу, має хорошу придатність до механізованого збирання та високу доброякісність соку 95 %.

Рекомендований для вирощування в зоні Лісостепу.

КВ-Буг – диплоїдний гібрид Ялтушківської ДСС ІЦБ УААН, створений спільно з фірмою КВС ЗААТ АГ (Німеччина).

Насіння гібрида однозародкове. Гікопотиль рожевого кольору. Листя середнього розміру. Коренеплід конічної форми. Заглибленість в ґрунті 85%.

Гібрид поєднує високу врожайність коренеплодів з високою цукристістю в різних ґрунтово-кліматичних умовах. За роки випробування (1998-2000) середня врожайність коренеплодів у зоні Лісостепу становила 470 ц/га, цукристість 17,9%, збір цукру з гектара 84 ц Найвища врожайність отримана в 1998 році в НДЦ "Сорт" Київської області - 594 ц/га, що більше середньо-зваженого стандарту на 52 ц/га.

Гібрид стійкий до цвітушності, коренеїду та церкоспорозу. Має високу придатність до механізованого збирання та високу доброякісність соку 93%.

Рекомендований для вирощування у зоні Лісостепу.

КВ-Вінниця – диплоїдний гібрид Ялтушківської ДСС ІЦБ УААН створений спільно з фірмою КВС ЗААТ АГ (Німеччина).

Насіння гібрида однозародкове. Гікопотиль рожевого кольору. Листя середнього розміру. Коренеплід конічної форми. Заглибленість в ґрунті 85%.

Гібрид врожайно-цукристого напрямку, поєднує високу врожайність коренеплодів з високою цукристістю.. За роки випробування (1998-2000) середня врожайність коренеплодів в зоні Лісостепу становила 467 ц/га, цукристість 17,4%, збір цукру з гектара 81 ц Найвища врожайність отримана в 1999 році в Тернопільській ДСВС - 594 ц/га, що більше середньо-зваженого стандарту на 52 ц/га.

Гібрид стійкий до цвітушності, коренеїду, толерантний до церкоспорозу. Має високу придатність до механізованого збирання та високу доброякісність соку 94%.

Рекомендований для вирощування у зоні Лісостепу.

Крістелла – триплоїдний гібрид фірми КВС ЗААТ АГ (Німеччина).

Насіння гібрида однозародкове. Гіпокотиль в 20 % рослин зеленого, 80 % - червоного кольору. Листя та їх черешки середнього розміру. Коренеплід конічної форми.

За роки випробування (1998-2000) середня врожайність коренеплодів у зонах Лісостепу – 486 ц/га, Полісся – 560 ц/га, цукристість відповідно 17,8; 17,6%, збір цукру з гектара відповідно 85,3; 97,3 центнерів. Найвища врожайність отримана в 1998 році в Горохівській ДСВС Волинської області -832 ц/га, що більше середньо-зваженого стандарту на 140 ц/га.

Гібрид стійкий до цвітушності, толерантний до коренеїду та церкоспорозу, має хорошу придатність до механізованого збирання.

Рекомендований для вирощування у зонах Лісостепу та Полісся

Явір – триплоїдний гібрид Інституту цукрових буряків УААН (створений Ялтушківською ДСС спільно з фірмою Хіллесхьог (Швеція).

Насіння гібрида однозародкове. Гіпокотиль у 30% рослин зеленого, 70% - червоного кольору. Листя середнього розміру. Коренеплід конічної форми.

За роки випробування (1999-2001) середня врожайність коренеплодів становила 450 ц/га, цукристість – 17,4%, збір цукру з гектара – 78 ц. Найвища врожайність отримана в 2001 році в НДЦ “Сорт” Київської області - 676 ц/га, що більше середньо-зваженого стандарту на 46 ц/га.

Гібрид стійкий до цвітущості, толерантний до ураження коренеїдом та церкоспорозом, має хорошу придатність до механізованого збирання.

Рекомендований для вирощування в зоні Лісостепу.

КВ-Степ – диплоїдний гібрид Інституту цукрових буряків УААН (створений Ялтушківською ДСС спільно з фірмою КВС ЗААТ АГ (Німеччина).

Насіння гібрида однозародкове. Гіпокотиль рожевого кольору. Листя середнього розміру. Коренеплід конічної форми.

За роки випробування (1999-2001) середня врожайність коренеплодів становила 416 ц/га, цукристість – 16,6%, збір цукру з гектара – 75 ц. Найвища врожайність отримана в 2000 році в НДЦ “Сорт” Київської області - 689 ц/га, що більше середньо-зваженого стандарту на 19 ц/га.

Гібрид стійкий до цвітущості, ураження коренеїдом та церкоспорозом, має хорошу придатність до механізованого збирання.

Рекомендований для вирощування у зоні Степу.

Шевченківський – диплоїдний гібрид Інституту цукрових буряків УААН (створений Ялтушківською ДСС).

Насіння гібрида однозародкове. Гіпокотиль рожевого кольору. Листя середнього розміру. Коренеплід конічної форми.

За роки випробування (1999-2001) середня врожайність коренеплодів у зонах Лісостепу становила 471 ц/га, Степу – 412 ц/га, цукристість відповідно 17,0; 16,8%, збір цукру з гектара 78,7; 68,2 ц. Найвища врожайність отримана в 2001 році в НДЦ “Сорт” Київської області - 710 ц/га, що більше середньо-зваженого стандарту на 80 ц/га.

Гібрид стійкий до цвітущості, ураження коренеїдом толерантний до церкоспорозу, має хорошу придатність до механізованого збирання.

Рекомендований для вирощування у зонах Лісостепу та Степу.

Український ЧС 72 – диплоїдний гібрид Інституту цукрових буряків УААН (створений Філіалом Інституту цукрових буряків).

Насіння гібрида однозародкове. Гіпокотиль рожевого кольору. Листя середнього розміру. Коренеплід конічної форми.

За роки випробування (1999-2001) середня врожайність коренеплодів становила 463 ц/га, цукристість – 17,5%, збір цукру з гектара – 80 ц. Найвища врожайність отримана в 2000 році в НДЦ “Сорт” Київської області - 709 ц/га, що більше середньо-зваженого стандарту на 39 ц/га.

Гібрид стійкий до цвітушності, до ураження коренеїдом та толерантний до церкоспорозу, має хорошу придатність до механізованого збирання.

Рекомендований для вирощування у зоні Лісостепу.

Єлуди – триплоїдний гібрид фірми “Флорімонд деспрез” (Франція).

Насіння гібрида однозародкове. Гіпокотиль зеленого та рожевого кольору. Листя велике. Коренеплід конічної форми.

За роки випробування (1999-2001) середня врожайність коренеплодів становила 476 ц/га, цукристість – 17,3%, збір цукру з гектара – 82,2 ц. Найвища врожайність отримана в 2001 році в НДЦ “Сорт” Київської області - 662 ц/га, що більше середньо-зваженого стандарту на 32 ц/га.

Гібрид стійкий до цвітушності та толерантний до ураження коренеїдом та церкоспорозом, має високу придатність до механізованого збирання.

Рекомендований для вирощування в зоні Полісся.

Анданте – триплоїдний гібрид фірми Штрубе-Дікман (Німеччина).

Насіння гібрида однозародкове. Гіпокотиль зеленого та червоного кольору. Листя середнього розміру. Коренеплід конічної форми.

За роки випробування (1999-2001) середня врожайність коренеплодів становила 496 ц/га, цукристість – 17,8%, збір цукру з гектара – 90,5 ц. Найвища врожайність отримана в 1999 році в Тлумацькій ДСВС Івано-Франківської області - 747 ц/га, що більше середньозваженого стандарту на 240 ц/га.

Гібрид стійкий до цвітушності, ураження коренеїдом та церкоспорозом, має високу придатність до механізованого збирання.

Рекомендований для вирощування в зоні Полісся.

БТС 903 УА – диплоїдний гібрид фірми “Бетасід” (США).

Насіння гібрида однозародкове. Листя малого розміру. Коренеплід конічної форми.

За роки випробування (1999-2001) середня врожайність коренеплодів становила 454 ц/га, цукристість – 17,5%, збір цукру з гектара – 79,1 ц. Найвища врожайність отримана в 2000 році в Калинівській ДСВД Вінницької області - 582 ц/га, що більше середньозваженого стандарту на 48 ц/га.

Гібрид стійкий до цвітушності, до ураження коренеїдом та толерантний до церкоспорозу, має хорошу придатність до механізованого збирання.

Рекомендований для вирощування в зоні Лісостепу.

Арій 1 – триплоїдний гібрид ТОВ “ВНІС”

Насіння гібрида однозародкове. Гіпокотиль рожевого кольору. Листя велике. Коренеплід конічної форми.

За роки випробування (1999-2001) середня врожайність коренеплодів становила 455 ц/га, цукристість – 17,0%, збір цукру з гектара – 77,5 ц. Найвища врожайність отримана в 2000 році в НДЦ “Сорт” Київської області - 689 ц/га, що більше середньо-зваженого стандарту на 19 ц/га.

Гібрид стійкий до цвітушності, до ураження коренеїдом та церкоспорозом, має хорошу придатність до механізованого збирання.

Рекомендований для вирощування в зоні Лісостепу.

Свіфт – диплоїдний гібрид фірми “Сес Європа” (Бельгія).

Насіння гібриду однозародкове. Гіпокотиль зеленого та червоного кольору. Листя малого та середнього розміру. Коренеплід конічної форми.

За роки випробування (1999-2001) середня врожайність коренеплідів в зонах Лісостепу становила 511 ц/га, Полісся – 514 ц/га, цукристість відповідно 16,6; 17,0%, збір цукру з гектара 83,6; 87,5 цент. Найвища врожайність отримана в 2001 році в НДЦ “Сорт” Київської області - 758 ц/га, що більше середньозваженого стандарту на 128 ц/га.

Гібрид стійкий до цвітушності, ураження коренеїдом толерантний до церкоспорозу, має хорошу придатність до механізованого збирання.

Рекомендований для вирощування у зонах Лісостепу та Полісся.

Ленора – диплоїдний гібрид фірми КВС ЗААТ АГ (Німеччина).

Насіння гібрида однозародкове. Гіпокотиль в 25% рослин зеленого, 75% - червоного кольору. Листя середнього розміру. Коренеплід конічної форми.

За роки випробування (1999-2001) середня врожайність коренеплідів у зонах Степу становила 426 ц/га, Лісостепу – 516 ц/га, Полісся – 538 ц/га, цукристість відповідно 16,5; 16,5; 16,9 %, збір цукру з гектара відповідно 69,6; 83,7; 92,0 цент. Найвища врожайність отримана в 2000 році в НДЦ “Сорт” Київської області - 784 ц/га, що більше середньозваженого стандарту на 114 ц/га.

Гібрид стійкий до цвітушності, ураження коренеїдом та толерантний до церкоспорозу, має хорошу придатність до механізованого збирання.

Рекомендований для вирощування на всій території України.

Даніела – триплоїдний гібрид фірми КВС ЗААТ АГ (Німеччина).

Насіння гібрида однозародкове. Гіпокотиль в 50% рослин зеленого, 50% - червоного кольору. Листя велике. Коренеплід конічної форми.

Гібрид врожайно-цукристого напрямку, поєднує високу врожайність коренеплідів з високою цукристістю. За роки випробування (2000-2001) середня врожайність коренеплідів у зоні Лісостепу становила 486 ц/га, цукристість 16,6%, збір цукру з гектара 79,9 ц Найвища врожайність отримана 2000 році в НДЦ “Сорт” Київської області - 714 ц/га, що більше середньозваженого стандарту на 44 ц/га.

Рекомендований для вирощування в зоні Лісостепу.

КВ-Десна – триплоїдний гібрид Інституту цукрових буряків УААН (створений Ялтушківською ДСС спільно з фірмою КВС ЗААТ АГ (Німеччина).

Насіння гібрида однозародкове. Гіпокотиль рожевого кольору. Листя середнього розміру. Коренеплід конічної форми.

Гібрид врожайно-цукристого напрямку, поєднує високу врожайність коренеплодів з високою цукристістю. За роки випробування (2000-2001) середня врожайність коренеплодів у зоні Полісся становила 435 ц/га, цукристість 16,9%, збір цукру з гектара 75,2 ц. Найвища врожайність отримана в 2001 році в НДЦ "Сорт" Київської області - 608 ц/га, що більше середньозваженого стандарту на 22 ц/га.

Гібрид стійкий до різоманії, цвітущості, ураження коренеїдом, толерантний до церкоспорозу, має хорошу придатність до механізованого збирання.

Рекомендований для вирощування у зоні Полісся.

КВ-Дніпро (ПЦБ 2030) – триплоїдний гібрид Інституту цукрових буряків УААН (створений Ялтушківською ДСС спільно з фірмою КВС ЗААТ АГ (Німеччина).

Насіння гібрида однозародкове. Гіпокотиль рожевого кольору. Листя середнього розміру. Коренеплід конічної форми.

Гібрид врожайно-цукристого напрямку, поєднує високу врожайність коренеплодів з високою цукристістю коренеплодів у зонах Лісостепу становила 482 ц/га, Полісся – 448 ц/га, цукристість відповідно 16,1; 16,7%, збір цукру з гектара 77,5; 76,9 цент. Найвища врожайність отримана в 2001 році в НДЦ "Сорт" Київської області - 715 ц/га, що більше середньозваженого стандарту на 85 ц/га.

Гібрид стійкий до різоманії, цвітущості, ураження коренеїдом толерантний до церкоспорозу, має хорошу придатність до механізованого збирання.

Рекомендований для вирощування у зонах Лісостепу та Полісся.

Уладівський ЧС 35 – триплоїдний гібрид ТОВ "ВНІС"

Насіння гібрида однозародкове. Гіпокотиль рожевого кольору. Листя велике. Коренеплід конічної форми.

За роки випробування (1999-2001) середня врожайність коренеплодів становила 476 ц/га, цукристість – 16,6%, збір цукру з гектара – 78,6 ц. Найвища врожайність отримана в 2000 році в НДЦ "Сорт" Київської області - 683 ц/га, що більше середньозваженого стандарту на 13 ц/га.

Гібрид стійкий до цвітущості, до ураження коренеїдом та церкоспорозом, має хорошу придатність до механізованого збирання.

Рекомендований для вирощування в зоні Лісостепу.

Авторитетний – триплоїдний гібрид науково-виробничої фірми "Гран" (Україна)

Насіння гібрида однозародкове. Гіпокотиль рожевого кольору. Листя середнього розміру. Коренеплід конічної форми.

Гібрид урожайно-цукристого напрямку. За роки випробування (2000-2002) середня врожайність коренеплодів у зонах Лісостепу – 492 ц/га, Полісся – 427 ц/га, цукристість відповідно 15,5; 15,4%, збір цукру з гектара відповідно 75,3; 63,4 центнерів.

Гібрид стійкий до цвітущості, толерантний до ураження коренеїдом та церкоспорозом. Має хорошу придатність до механізованого збирання (8,6 балів). Заглибленість коренеплоду в ґрунті складає 86 %.

Рекомендований для вирощування в зонах Лісостепу та Полісся.

Аббатіса – диплоїдний гібрид ТОВ "Всеукраїнський науковий інститут селекції" (Україна)

Насіння гібриду однозародкове. Гіпокотиль оранжевого кольору. Листя велике. Коренеплід конічної форми.

Гібрид урожайно-цукристого напрямку. За роки випробування (2001-2002) середня врожайність коренеплодів у зонах Степу становила 431 ц/га, Лісостепу – 491 ц/га, Полісся – 438 ц/га, цукристість відповідно 16,5; 15,6; 16,5 %, збір цукру з гектара відповідно 69,9; 76,8; 72,2 центнерів.

Гібрид стійкий до цвітущості, толерантний до ураження коренеїдом та церкоспорозом. Має хорошу придатність до механізованого збирання та високу технологічну якість.

Рекомендований для вирощування на всій території України.

Анічка – диплоїдний гібрид Інституту цукрових буряків УААН (Україна)

Насіння гібрида однозародкове. Гіпокотиль рожевого кольору. Листя середнього розміру. Коренеплід конічної форми.

Гібрид урожайно-цукристого напрямку. За роки випробування (2000-2002) середня врожайність коренеплодів у зонах Лісостепу – 457 ц/га, Полісся – 434 ц/га, цукристість відповідно 16,2; 17,1%, збір цукру з гектара відповідно 73,3; 73,8 центнерів.

Гібрид толерантний до коренеїду та церкоспорозу, має хорошу придатність до механізованого збирання.

Рекомендований для вирощування в зонах Лісостепу та Полісся.

Ворскла – диплоїдний гібрид Інституту цукрових буряків УААН (Україна)

Насіння гібрида однозародкове. Гіпокотиль рожевого кольору. Листя середнього розміру. Коренеплід конічної форми.

Гібрид урожайно-цукристого напрямку. За роки випробування (2000-2002) середня врожайність коренеплодів у зонах Лісостепу – 461 ц/га, Полісся – 399 ц/га, цукристість відповідно 16,0; 17,3%, збір цукру з гектара відповідно 73,6; 68,6 центнерів.

Гібрид стійкий до коренеїду та толерантний до церкоспорозу, має хорошу придатність до механізованого збирання.

Рекомендований для вирощування в зонах Лісостепу та Полісся.

КВ-Умань – диплоїдний гібрид Інституту цукрових буряків УААН (Україна)

Гібрид урожайно-цукристого напрямку. Насіння гібриду однозародкове. Гіпокотиль рожевого кольору. Листя середнього розміру. Коренеплід конічної форми.

За роки випробування (2000-2002) середня врожайність коренеплодів в зонах Лісостепу – 444 ц/га, Полісся – 407 ц/га, цукристість відповідно 16,2; 16,7%, збір цукру з гектара відповідно 72,2; 67,8 центнерів.

Гібрид стійкий до цвітущості, толерантний до коренеїду та церкоспорозу, має хорошу придатність до механізованого збирання.

Рекомендований для вирощування в зонах Лісостепу та Полісся.

БЦ-СІД – триплоїдний гібрид Інституту цукрових буряків УААН (Україна)

Насіння гібрида однозародкове. Гіпокотиль рожевого кольору. Листя середнього розміру. Коренеплід конічної форми.

Гібрид урожайно-цукристого напрямку. За роки випробування (2000-2002) середня врожайність коренеплодів у зонах Лісостепу – 435 ц/га, Полісся – 436 ц/га, цукристість відповідно 16,1; 17,2%, збір цукру з гектара відповідно 69,8; 74,8 центнерів.

Гібрид толерантний до коренеїду та церкоспорозу, має хорошу придатність до механізованого збирання.

Рекомендований для вирощування в зонах Лісостепу та Полісся

Уманський ЧС-97 – триплоїдний гібрид Філіалу інституту цукрових буряків УААН (Україна)

Насіння гібрида однозародкове. Гіпокотиль зеленого кольору. Листя середнього розміру. Коренеплід конічної форми.

Гібрид цукристо – урожайного напрямку. За роки випробування (2000-2002) середня врожайність коренеплодів у зонах Лісостепу – 483 ц/га, Полісся – 453 ц/га, цукристість відповідно 15,9; 17,0%, збір цукру з гектара відповідно 76,6; 76,9 центнерів.

Гібрид стійкий до цвітущості, толерантний до коренеїду та церкоспорозу, має хорошу придатність до механізованого збирання. Заглибленість коренеплоду в ґрунті 93 %.

Рекомендований для вирощування в зонах Лісостепу та Полісся.

Уманський ЧС-90 – диплоїдний гібрид Філіалу інституту цукрових буряків УААН (Україна)

Насіння гібрида однозародкове. Гіпокотиль зеленого кольору. Листя середнього розміру. Коренеплід циліндрично-конічної форми.

Гібрид цукристо – урожайного напрямку. За роки випробування (2001-2002) середня врожайність коренеплодів у зонах Степу становила 370 ц/га, Лісостепу – 492 ц/га, Полісся – 427 ц/га, цукристість відповідно 16,0; 15,5; 15,4 %, збір цукру з гектара відповідно 58,6; 75,3; 63,4 центнерів.

Гібрид стійкий до цвітущості та коренеїду, толерантний до ураження церкоспорозом. Має хорошу придатність до механізованого збирання та високу технологічну якість (8,6 балів).

Рекомендований для вирощування на всій території України.

Джованна – триплоїдний гібрид фірми КВС ЗААТ АГ(Німеччина).

Насіння гібрида однозародкове. Гіпокотиль в 30% рослин зеленого, 70% - червоного кольору. Листя великого розміру. Коренеплід конічної форми.

Гібрид урожайно-цукристого напрямку. За роки випробування (2000-2002) середня врожайність коренеплодів у зонах Степу становила 459 ц/га, Лісостепу – 501 ц/га, Полісся – 425 ц/га, цукристість відповідно 16,2; 15,6; 16,5 %, збір цукру з гектара відповідно 73,2; 78,1; 70,0 центнерів.

Гібрид стійкий до ураження коренеїдом та толерантний до церкоспорозу. Має хорошу придатність до механізованого збирання.

Рекомендований для вирощування на всій території України.

Куявська – триплоїдний гібрид Кутновської Годовлі Бурака Цукрового (м. Кутно, Польща) створений спільно з фірмою КВС (Німеччина).

Насіння гібрида однозародкове. Гіпокотиль в 3% рослин білого, 97% - червоного кольору. Листя середнього розміру. Коренеплід конічної форми.

Гібрид урожайно-цукристого напрямку. За роки випробування (2001-2002) середня врожайність коренеплодів у зонах Степу становила 460 ц/га, Лісостепу – 511 ц/га, Полісся – 443 ц/га, цукристість відповідно 16,9; 15,6; 16,3 %, збір цукру з гектара відповідно 76,7; 79,8; 72,4 центнерів.

Гібрид стійкий до цвітущості та ураження коренеїдом, толерантний до церкоспорозу. Має хорошу придатність до механізованого збирання (8,6 балів).

Рекомендований для вирощування на всій території України.

Сара – диплоїдний гібрид інституту поліівництва та овочівництва (Новий Сад, Югославія)

Насіння гібрида однозародкове. Гіпокотиль зеленого кольору. Листя середнього розміру. Коренеплід циліндрично-конічної форми.

Гібрид цукристого напрямку. За роки випробування (2001-2003) середня врожайність коренеплодів у зонах Степу становила 502 ц/га, Лісостепу – 446 ц/га, Полісся – 518 ц/га, цукристість відповідно 17,1; 15,4; 17,1 %, збір цукру з гектара відповідно 85,5; 72,8; 89,7 центнерів. Втрати цукру в мелясі 1,7-2,1 %.

Гібрид стійкий до цвітушності та ураження коренеїдом, толерантний до церкоспорозу. Придатність для механізованого збирання 8-9 балів.

Рекомендований для вирощування на всій території України.

Джорджина (КВС 0148 УА) – диплоїдний гібрид фірми КВС ЗААТ АГ (Німеччина).

Насіння гібрида однозародкове. Гіпокотиль в 50% рослин зеленого, 50% - червоного кольору. Листя великого розміру. Коренеплід конічної форми.

Гібрид урожайно-цукристого напрямку. За роки випробування (2001-2003) середня врожайність коренеплодів у зонах Степу становила 507 ц/га, Лісостепу – 530 ц/га, Полісся – 487 ц/га, цукристість відповідно 16,8; 15,9; 17,6 %, збір цукру з гектара відповідно 84,4; 82,0; 86,4 центнерів. Втрати цукру в мелясі 1,9-2,0 %.

Гібрид стійкий до різоманії, цвітушності та ураження коренеїдом, толерантний до церкоспорозу. Придатність для механізованого збирання 8-9 балів.

Рекомендований для вирощування на всій території України.

Габор – триплоїдний гібрид фірми “Штубе Заатцухт” (Німеччина).

Насіння гібрида однозародкове. Гіпокотиль зеленого та червоного кольору. Листя середнього розміру. Коренеплід конічної форми.

Гібрид цукристо-урожайного напрямку. За роки випробування (2001-2003) середня врожайність коренеплодів у зонах Степу становила 480 ц/га, Лісостепу – 492 ц/га, Полісся – 448 ц/га, цукристість відповідно 17,1; 16,2; 18,1 %, збір цукру з гектара відповідно 81,6; 81,6; 81,5 центнерів. Втрати цукру в мелясі 1,9-2,0 %.

Гібрид стійкий до цвітушності та ураження коренеїдом, толерантний до церкоспорозу. Придатність для механізованого збирання 7-8 балів.

Рекомендований для вирощування на всій території України.

Максим – диплоїдний гібрид створений Ялтушківською ДСС ПЦБ УААН.

Насіння гібрида однозародкове. Гіпокотиль рожевого кольору. Листя середнього розміру. Коренеплід конічної форми.

Гібрид урожайно-цукристого напрямку. За роки випробування (2001-2003) середня врожайність коренеплодів у зонах Степу становила 495 ц/га, Лісостепу – 442 ц/га, Полісся – 440 ц/га, цукристість відповідно 17,0; 15,4; 16,9 %, збір цукру з гектара відповідно 83,7; 72,3; 74,6 центнерів. Втрати цукру в мелясі 1,9-2,2 %.

Гібрид стійкий до цвітущості та ураження коренеїдом, толерантний до церкоспорозу. Придатність для механізованого збирання 8-9 балів.

Рекомендований для вирощування на всій території України.

КВ-Марта – триплоїдний гібрид, створений Білоцерківською ДСС ІЦБ УААН спільно з фірмою “КВС” (Німеччина).

Насіння гібрида однозародкове. Гіпокотиль рожевого кольору. Листя середнього розміру. Коренеплід конічної форми.

Гібрид урожайно-цукристого напрямку. За роки випробування (2001-2003) середня врожайність коренеплодів у зонах Степу становила 468 ц/га, Лісостепу – 387 ц/га, цукристість відповідно 16,8; 15,3 %, збір цукру з гектара відповідно 78,6; 62,9 центнерів. Втрати цукру в мелясі 1,7-2,12 %.

Гібрид стійкий до цвітущості та ураження коренеїдом, толерантний до церкоспорозу. Придатність для механізованого збирання 8-9 балів.

Рекомендований для вирощування в зонах Степу та Лісостепу.

Яхіл – диплоїдний гібрид створений Ялтушківською ДСС ІЦБ УААН спільно з фірмою “Хіллесхьог” (Швеція).

Насіння гібрида однозародкове. Гіпокотиль рожевого кольору. Листя середнього розміру. Коренеплід конічної форми.

Гібрид урожайно-цукристого напрямку. За роки випробування (2001-2003) середня врожайність коренеплодів у зонах Степу становила 490 ц/га, Лісостепу – 484 ц/га, цукристість відповідно 16,9; 16,5 %, збір цукру з гектара відповідно 82,1; 78,1 центнерів. Втрати цукру в мелясі 1,8-2,3 %.

Гібрид стійкий до цвітущості та ураження коренеїдом, толерантний до церкоспорозу. Придатність для механізованого збирання 8-9 балів.

Рекомендований для вирощування в зонах Степу та Лісостепу.

Софія – триплоїдний гібрид Філіалу ІЦБ УААН (Україна)

Насіння гібрида однозародкове. Гіпокотиль білого кольору. Листя середнього розміру. Коренеплід конічної форми.

Гібрид урожайно-цукристого напрямку. За роки випробування (2001-2003) середня врожайність коренеплодів у зонах Степу становила 478 ц/га, Лісостепу – 472 ц/га, цукристість відповідно 16,7; 16,4 %, збір цукру з гектара відповідно 79,8; 78,3 центнерів. Втрати цукру в мелясі 1,8-2,1 %.

Гібрид стійкий до цвітущості та ураження коренеїдом, толерантний до церкоспорозу. Придатність для механізованого збирання 8-9 балів.

Рекомендований для вирощування в зонах Степу та Лісостепу.

Константа – диплоїдний гібрид, створений Білоцерківською ДСС ІЦБ УААН (Україна).

Насіння гібрида однозародкове. Гіпокотиль рожевого кольору. Листя середнього розміру. Коренеплід конічної форми.

Гібрид урожайно-цукристого напрямку. За роки випробування (2001-2003) середня врожайність коренеплодів у зонах Степу становила 494 ц/га, Лісостепу – 432 ц/га, Полісся – 414 ц/га, цукристість відповідно 16,7; 16,1; 17,3 %, збір цукру з гектара відповідно 82,0; 70,2; 72,5 центнерів. Втрати цукру в мелясі 1,7-2,1 %.

Гібрид стійкий до цвітушності та ураження коренеїдом, толерантний до церкоспорозу. Придатність для механізованого збирання 8-9 балів.

Рекомендований для вирощування на всій території України.

ОПИСИ СОРТІВ ТА ГІБРИДІВ КОРМОВИХ БУРЯКІВ, ЩО ЗАНЕСЕНІ ДО РЕЄСТРУ СОРТІВ, ПРИДАТНИХ ДЛЯ ПОШИРЕННЯ В УКРАЇНІ ЗА ОСТАННІ ШІСТЬ РОКІВ

Центаур-полі. Виведений Малописьською Ходовлею Рослин (Польща).

Гібрид напівцукровий, багаторостковий, анізоплоїдний. Коренеплід видовженої форми, добре виповнений з невеликою і неглибокою кореневою борозенкою в нижній частині. Забарвлення шкірки в надземній частині зелене, а в заглибленій в ґрунт – біле, м'якуш білий. Коренеплід заглиблений в ґрунт наполовину, має невелику кількість бічних корінців. Добре зберігається у кагатах.

Потенційна продуктивність гібрида понад 1000 ц/га. Вміст сухої речовини 12-14 %. Урожай сухої речовини 120-140 ц/га. Найвища врожайність отримана в 1997 році в Кіцманській ДСВД Чернівецької області 1108 ц/га, що більше середньо-зваженого стандарту на 337 ц/га.

Гібрид відносно стійкий до хвороб. Максимальне ураження за роки випробування становить: церкоспорозом – 14,5, коренеїдом – 6 %.

Рекомендований для вирощування в лісостеповій та степовій зонах.

Урсус-полі. Виведений Малописьською Ходовлею Рослин (Польща).

Гібрид кормового типу, багаторостковий, поліплоїдний. Коренеплід циліндричної форми, жовтого кольору. Заглибленість коренеплодів в ґрунт 40%, що дає можливість збирати коренеплоди вручну. При збиранні ґрунт до коренеплодів майже не прилипає.

Потенційна продуктивність гібрида понад 1000 ц/га. Вміст сухої речовини 12-14 %. Урожай сухої речовини 120-140 ц/га. Найвища врожайність отримана в 1997 році в Кіцманській ДСВД Чернівецької області 1091 ц/га, що більше середньо-зваженого стандарту на 320 ц/га.

Гібрид відносно стійкий до хвороб. Максимальне ураження за роки випробування становить: церкоспорозом – 22, коренеїдом – 7 %.

Рекомендований для вирощування в лісостеповій та степовій зонах.

Косіма. Виведений фірмою КВС ЗААТ АГ (Німеччина).

Гібрид напівцукровий, одностковий, триплоїдний. Коренеплід овальної форми, рожевого кольору. Заглибленість коренеплодів в ґрунт 70%. Гібрид з рівномірним розміщенням коренеплодів в ґрунті. Використовується для вирощування без затрат ручної праці з механізованим збиранням комбайнами для цукрових буряків. Забрудненість коренеплодів ґрунтом після збирання незначна.

Потенційна продуктивність гібрида біля 1000 ц/га. Вміст сухої речовини більше 15%. Найвища врожайність отримана в 1996 році в Глухівській ДСВД Сумської області - 939 ц/га, що більше середньо-зваженого стандарту на 40 ц/га.

Гібрид відносно стійкий до хвороб. Максимальне ураження за роки випробування становить: церкоспорозом – 22, коренеїдом – 7 %.

Рекомендований для вирощування в лісостеповій та степовій зонах.

Кракус. Виведений Малопопольською Ходовлею Рослин (Польща).

Гібрид кормового типу, багаторостковий, диплоїдний. Коренеплід циліндричної форми, жовтого кольору, м'якуш білий. Головка середня, випукла, жовто-коричнева. Заглибленість коренеплодів в ґрунті 40 %. При збиранні ґрунт до коренеплодів майже не прилипає, коренеплоди не розтріскуються. Гібрид придатний для вирощування за індустріальною технологією. Придатний для збирання як механізованим, так і ручним способом.

Потенційна продуктивність гібрида 1000 ц/га. Вміст сухої речовини 11-13 %. Урожай сухої речовини 110-130 ц/га. Найвища врожайність отримана в 1997 році в Тлумацькій ДСВС Івано-Франківської області - 1211 ц/га, що більше середньо-зваженого стандарту на 377 ц/га.

Гібрид відносно стійкий до хвороб. Максимальне ураження за роки випробування становить: церкоспорозом – 10, коренеїдом – 4 %.

Рекомендований для вирощування в лісостеповій та степовій зонах

Уманський кормовий – 2. Виведений філіалом Інституту цукрових буряків УААН (Україна).

Гібрид напівцукровий, одностковий, диплоїдний, середньостиглий. Коренеплід конічно-овальної форми, добре виповнений з невеликою і неглибокою кореневою борозенкою. Забарвлення шкірки молочно-біле, м'якуш білий. Занурений в ґрунт на 70 %. При густоті насаджень рослин 95-110 тис. шт/га придатний для збирання механізованим способом.

Потенційна продуктивність гібрида понад 1000 ц/га. Вміст сухої речовини 15-18 %. Урожай сухої речовини 150-180 ц/га. Найвища врожайність отримана в 1997 році на Тлумацькій ДСВС Івано-Франківської області - 1006 ц/га, що більше середньо-зваженого стандарту на 172 ц/га.

Гібрид відносно стійкий до хвороб. Слабо пошкоджується кореневими гнилями, борошнистою росою, жовтяницею, церкоспорозом.

Рекомендований для вирощування на всій території України..

Тіган-полі. Виведений Малопопольською Ходовлею Рослин (Польща).

Сорт кормового типу, багаторостковий, анізоплоїдний. Коренеплід овальної форми, жовто-оранжевого кольору. Заглибленість коренеплодів в ґрунті 50%, що дає можливість збирати коренеплоди як вручну, так і механізованим способом. При збиранні ґрунт до коренеплодів майже не прилипає.

Потенційна продуктивність сорту біля 1000 ц/га. Вміст сухої речовини 12%. Урожай сухої речовини 120ц/га. Найвища врожайність отримана в 1997 році в Глухівській ДСВД Сумської області - 1049 ц/га, що більше середньо-зваженого стандарту на 98 ц/га.

Сорт відносно стійкий до хвороб. Максимальне ураження за роки випробування становить: церкоспорозом 22, коренеїдом 6 %.

Рекомендований для вирощування в зоні Лісостепу.

Троя. Виведений фірмою Даніско Сід ГмбХ (Німеччина).

Гібрид напівцукровий, одностковий, триплоїдний. Коренеплід овально-конічної форми, світло жовтого кольору. Значна заглибленість (75%) та рівномірність розміщення коренеплодів в ґрунті дає можливість використовувати механізоване збирання. Забрудненість коренеплодів ґрунтом після збирання незначне.

Потенційна продуктивність гібрида біля 1000 ц/га. Вміст сухої речовини більше 17%. Найвища врожайність отримана в 1997 році в Глухівській ДСВД Сумської області - 1052 ц/га, що більше середньо-зваженого стандарту на 101 ц/га.

Гібрид відносно стійкий до церкоспорозу, мало уражується коренеїдом, толерантний до перенеспорозу, жовтухи та бурякової нематоди.

Рекомендований для вирощування в зонах Лісостепу.

Кірос. Виведений фірмою Даніско Сід ГмбХ (Німеччина).

Гібрид напіцукровий, одноростковий, триплоїдний. Коренеплід овальної форми, жовтого кольору. Значна заглибленість (70%) та рівномірність розміщення коренеплодів в ґрунті дає можливість використовувати механізоване збирання. Порівняно низька забрудненість коренеплодів ґрунтом після збирання.

Потенційна продуктивність гібрида біля 1000 ц/га. Вміст сухої речовини більше 15,5%. Найвища врожайність отримана в 1997 році на Тлумацькій ДСВС Івано-Франківської області - 965 ц/га, що більше середньо-зваженого стандарту на 130 ц/га.

Гібрид відносно стійкий до церкоспорозу, перенеспорозу та коренеїду, толерантний до жовтухи та бурякової нематоди. Цвітушність не перевищує 1%.

Рекомендований для вирощування в зонах Лісостепу.

Селена. Виведений Інститутом землеробства УААН.

Гібрид напіцукрового типу, одноростковий, диплоїдний. Коренеплід конічно-овальної форми, добре виповнений з невеликою і неглибокою кореневою борозенкою. Занурений в ґрунт на 75%. Позитивно відзивається на добрива та хорошу агротехніку. Придатний для збирання механізованим способом.

Потенційна продуктивність гібрида понад 1000 ц/га. Вміст сухої речовини 16%. Урожай сухої речовини 160 ц/га. Найвища врожайність отримана в 1996 році на Кіцманській ДСВД Чернівецької області 1050 ц/га, що більше середньо-зваженого стандарту на 125 ц/га.

Гібрид відносно стійкий до хвороб. Слабо пошкоджується корневими гнилями, борошнистою росою, жовтяницею, церкоспорозом.

Рекомендований для вирощування в зонах Лісостепу.

Адра. Виведений науково-виробничою фірмою Гран.(Україна).

Сорт кормового типу, багаторостковий, тетраплоїдний. Коренеплід циліндричної форми, добре виповнений, з невеликою і неглибокою кореневою борозенкою. Занурення в ґрунт на 30% та рівномірність розміщення коренеплодів в ґрунті дає можливість збирати коренеплоди, як вручну, так і механізованим способом. При збиранні ґрунт до коренеплодів майже не прилипає. Позитивно відзивається на добрива та хорошу агротехніку.

Потенційна продуктивність гібрида понад 1300 ц/га. Вміст сухої речовини 12%. Урожай сухої речовини 160 ц/га.

Гібрид стійкий до перенеспорозу та відносно стійкий до церкоспорозу. Слабко пошкоджується корневими гнилями, борошнистою росою, жовтяницею.

Рекомендований для вирощування в зонах Лісостепу.

Дарина. Виведений Інститутом землеробства УААН (Україна).

Сорт кормового типу, однонасінний, диплоїдний. Представляє собою генетично роздільноплідну популяцію рослин. За показниками продуктивності знаходиться на рівні багатонасінного сорту Екендорський жовтий, але відзначається хорошою придатністю до механізованого збирання. Не поступається за продуктивністю насіння багатонасінним сортам.

Однонасінність та рівномірність розміщення коренеплодів в ґрунті дає можливість вирощувати індустріальним методом, без затрат ручної праці. Позитивно відзивається на добрива та хорошу агротехніку.

Потенційна продуктивність гібриду біля 900 ц/га. Вміст сухої речовини 12%.

Гібрид стійкий до переноспорозу та відносно стійкий до церкоспорозу.

Рекомендований для вирощування в зоні Лісостепу.

Уманський кормовий – 7. Виведений філіалом Інституту цукрових буряків УААН (Україна). Представляє собою сорт-синтетик, отриманий шляхом індивідуального добору із рослин колекційного розсадника з послідовним комбінаторним схрещуванням.

Сорт-популяція кормового типу, багаторостковий, диплоїдний, середньостиглий.

Листки видовжені, черешки укорочені. Коренеплід бочковидно-подібною форми, довжиною 30-35 см, діаметром в широкому місці 20 см. Форма кінчика коренеплоду конічна. Головка коренеплоду середнього розміру, випукла, біла. Забарвлення шкірки коренеплоду молочно-біле, м'якуш білий. Занурений в ґрунт на 2/3 довжини.

Потенційна продуктивність гібрида понад 1000 ц/га. Вміст сухої речовини 13-14%, цукру 10-11%. Урожай сухої речовини 130-150 ц/га.

При зберіганні 250-270 днів, збережені коренеплоди становлять 80-90 відсотків.

Гібрид відносно стійкий до листових хвороб і кореневих гнилей. Має високу насіннєву продуктивність. При густоті насаджень рослин 95-110 тис. шт/га придатний для збирання механізованим способом. Негативно реагує на загущені посіви (>110 тис.шт/га).

Рекомендований для вирощування на всій території України.

Сонет. Виведений Інститутом цукрових буряків спільно з Інститутом землеробства УААН (Україна).

Сорт кормового типу, багатонасінний, диплоїдний. Представляє собою генетично роздільноплідну популяцію рослин. За показниками продуктивності знаходиться на рівні багатонасінного сорту Львівський жовтий. Коренеплід овально-циліндричної форми, гладенький, жовто-оранжевого кольору, м'якуш білий.

Заглибленість коренеплодів у ґрунт складає 5-7 балів. Легко витягується із землі.

Сорт пластичний, має високий компенсаційний ефект при зріджених посівах. Насіннєва продуктивність 20-25 ц/га. Сонет має продуктивний тип насінника, одностовкості 86%. Позитивно відзивається на добрива та хорошу агротехніку.

Потенційна продуктивність гібрида біля 1000 ц/га. Вміст сухої речовини 14 -15%. Стійкість до коренейду та церкоспорозу вище середньої.

Рекомендований для вирощування на всій території України.

Солідар. Виведений Малопопольською Ходовлею Рослин (Польща).

Гібрид створений шляхом схрещування одноросткової диплоїдної чоловічої стерильної лінії та багаторосткового диплоїдного кормового запилювача.

Гібрид кормового типу, одноростковий, диплоїдний. Гіпокотиль 8% білого, 17% оранжевого та 75% жовтого кольору. Листя середнього розміру, зеленого кольору з жилками жовтого кольору. Коренеплід циліндрично-конічної форми, жовтого кольору, м'якуш білий. Заглибленість коренеплодів в ґрунті 40-50%. При збиранні до коренеплодів майже не прилипає, коренеплоди не розтріскуються. Гібрид придатний для вирощування за індустріальною технологією. Придатний для збирання як механізованим, так і ручним способом.

Потенційна продуктивність гібрида понад 1000 ц/га. Вміст сухої речовини 14-15%. Гібрид відносно стійкий до хвороб. Стійкість до ураження церкоспорозом 7-8 балів, ураженість коренеїдом – 1 бал.

Рекомендований для вирощування на всій території України.

Галицький. Виведений Інститутом землеробства і тваринництва західного регіону УААН (Україна).

Сорт кормового типу, багатонасінний, диплоїдний. Створений методом індивідуального відбору з гібридної популяції. Представляє собою генетично роздільноплідну популяцію рослин. За показниками продуктивності знаходиться на рівні багатонасінного сорту Львівський жовтий.

Розетка напівстояча, середньої величини. Листові пластинки видовжено-овальні і лопатовидні, зелені. Коренеплоди овально-циліндричної форми, поверхня гладенька, жовтого кольору, м'якуш білий.

Ступінь заглибленості коренеплодів у ґрунт складає 5-7 балів. Легко витягується із землі. Лежкість коренеплодів висока біля 96-97 %.

Сорт має високу стійкість до ураження рослин буряковими блішками і листковою попелицею. Чутливий до забезпечення ґрунту поживними речовинами, особливо азотом, фосфором, калієм і кальцієм.

Потенційна продуктивність гібрида біля 1200 ц/га. Основний урожай коренеплодів формується в серпні-вересні. Вміст сухої речовини 13-15 %. Стійкість до церкоспорозу 6-7 балів, ураженість коренеїдом 1-2 бали.

Рекомендований для вирощування на всій території України.