

МІНАГРОПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА З ОХОРОНИ ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН

**КАТАЛОГ СОРТІВ РОСЛИН,
ПРИДАТНИХ ДЛЯ ПОШИРЕННЯ В УКРАЇНІ на 2004 рік**
(ОЛІЙНІ ТА ПРЯДИВНІ КУЛЬТУРИ)

Київ 2003

ЗМІСТ

Скорочення термінів.....	5	Бавовник.....	19
Сільськогосподарські: олійні та прядивні	7	Гірчиця сарептська озима	20
Соняшник	7	Заявник, представник та їх адреси	22
Соя.....	11	Описи сортів культур, що занесені до Реєстру сортів, придатних для поширення в Україні	24
Ріпак озимий	14	Соняшник	24
Ріпак ярий	15	Соя	48
Льон кудряш.....	16	Ріпак озимий	54
Рижій ярий.....	16	Ріпак ярий	55
Гірчиця сарептська	16	Молочай	56
Гірчиця біла	17	Сафлор	56
Редька олійна	17	Редька олійна	57
Мак.....	17	Гірчиця сарептська	57
Арахіс.....	18	Гірчиця біла	59
Кунжут.....	18	Рижій ярий	59
Суріпиця озима	18	Льон кудряш	60
Сафлор.....	18	Кунжут	61
Суріпиця яра.....	18	Суріпиця яра	61
Льон-довгунець.....	18	Рицина	62
Коноплі	19	Мак	63

Зона - Рекомендована зона вирощування

П	Полісся
Л	Лісостеп
С	Степ
Кр	Крим
ЗГр	захищений ґрунт
1...15	тимчасові виноградарські зони
гідроп	гідропоніка
К	Карпати
ЗГр(СТ)	захищений ґрунт (скляна теплиця)
ЗГр(ПТ)	захищений ґрунт (плівкова теплиця)

Характеристика 1 - Продуктивність

7-9	висока
5	середня
<5	нижчесередньої

Характеристика 2 - Напрямок використання

впв	весняного промислового використання
оз	озимий
ЗПВ	для зон промислової вигодівлі
уц	урожайно-цукристий
цукр	цукристий
++	технічного напрямку
спц	спеція
парф	парфумерна промисловість
пер	переробка
фарм	фармацевтична промисловість
зпл	запилювач
слн	сильний
дф	добрий філер
цін	цінний
ф	філер
зерн	зерновий
зк	зерно-кормовий
пв	пивоварний

СКОРОЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

зф	задовільний філер
х	харчовий
фж	фуражний
олн	олійний
конд	кондитерський
вол	високоолеїновий
тхн	технічний
лік	лікарський
стл	столовий
тхст	технічно-столовий
сал	салатний
конс	консервний
зс	для соління
ун	універсального призначення
свж	споживання у свіжому вигляді
сил	силовий
лп	луко-пасовищний
мед	медонос
ск	сінокопний
піщ	піщаний
закав	закавказький
зак	залуження схилів та еродованих земель
овоч	овочевий
зх	захисний
прм	промисловий
зріз	зріз
озл	озеленення
аром	ароматичний
склт	скелетний
нц	напівцукровий
корм	кормовий
він	віничний
дкр	декоративного оформлення
лпв	для літнього промислового використання
сд	сидерат
зрош	на зрошуваних землях

хп	для харчової промисловості
всш	придатний для високоштамбової культури
г	гостра
нг	напівгостра
со	солодка
цу	цукристо-урожайний

Характеристика 3 - Група стиглості

ср	середньоранній
сп	середньопізній
сс	середньостиглий
рс	ранньостиглий
пс	пізньостиглий
рсдн	ранньосередній
скс	скоростиглий
зим	зимовий
літ	літній
осін	осінній
нр	надранньостиглий

Характеристика 4 - Зимостійкість/Холодостійкість

7-9	висока
>5	вищесередньої
5	середня
<5	низька

Характеристика 5 - Стійкість до посухи

7-9	висока
5	середня
<5	низька

Характеристика 6 - Стійкість до полягання

7-9	висока
5	середня
<5	низька

Характеристика 7 - Стійкість до осипання

7-9	висока
5	середня

<5	низька
----	--------

Характеристика 8 - Стійкість до хвороб

7-9	висока
5	середня
<5	низька

Характеристика 9 - Якість

вбіл	високобілковий
сбіл	середньобілковий
вкліт	висококлітковинний
скліт	середньоклітковинний
мал	малоалкалоїдний
сал	середньоалкалоїдний
вдек	високодекоративний
дек	декоративний
вці	з високою щільністю покриття
сці	з середньою щільністю покриття
влеж	високолежкий
слеж	середньолежкий
вц	високоцукристий
сц	середньоцукристий
вкр	висококрохмальний
скр	середньокрохмальний
вл	високоолійний
сл	середньоолійний
боп	безопійний
лік	лікарський
о	низькоеруковий
++	високоеруковий
о+	середньоеруковий
нгл	низькоглюкозинолатний
сгл	середньоглюкозинолатний
цін	цінний
ф	філер
зрош	на зрошуваних землях
слн	сильний
слн	сильний

Сорт				Код	Зона	Характеристики							
Назва	Вид	Номер	Рік реєстрації			Заявник / Підтримувач	Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)		
				посухи	полягання						осипання	хвороб	

Сільськогосподарські: олійні та прядивні

Соняшник

- 124

Алієнор	98017003	2001	806 /	Л	8	олн	екс			5	7-9	8	5	вл
Байда	98017039	2003	329 /	СЛ	5	олн	екс			6	8	8	5	вл
Візіт	97017021	2000	879 /	С	5	олн	екс			5	7-9	7-9	5	вл
Гетман F1	98017041	2001	1093 /	СЛ	8	олн	екс			6	7-9	8	6	вл
Деркул	99017012	2004	1083 /	СЛ	7	олн	екс			7	8	8	7	вл
Еней	99017021	2002	404 /	СЛ	8	вол	екс			6	7-9	8	7	вл
Еврика МЛ	00017009	2004	134 /	СЛ	7	конд	екс			7	8	8	7	сл
Зубр	01017029	2004	378 /	СЛ	7	олн	екс			8	8	8	8	вл
Злива	99017008	2002	378 /	С	7	олн	екс			7	8	7-9	7	вл
Заклик	01017040	2004	1114 /	Л	7	олн	екс			8	9	8	7	вл
Запорізький 14	94017005	1999	329 /	С	5	олн	екс			5	7-9	7-9	5	вл
Кий	97017022	2000	404 /	С	7-9	олн	екс			5	8	8	7-9	вл
Красен.	97017020	2001	404 /	С	8	олн	екс			6	7-9	7-9	7	вл
Лан 105	01017015	2004	1083 /	СЛ	7	олн	екс			7	8	8	7	вл
Одеський 149	90017012	1995	378 /	СЛ	5	олн	екс			7-9	5	7-9	5	вл
ПР62А91	00017017	2003	767 /	СЛ	8	олн	екс			6	8	8	7	вл
Принтасол	94017031	2001	762 /	С	7-9	олн	екс			5	7-9	7-9	5	вл
Прометей	97017033	2001	329 /	С	5	олн	екс			5	7-9	7-9	5	вл
Ранок	99017023	2003	1110 /	Л	5	конд	екс			5	7	8	6	сл
Соната	01017031	2004	1093 /	СЛ	7	олн	екс			8	8,5	8	8	вл
Сівер	99017022	2002	404 /	С	8	олн	екс			6	8	7-9	7	вл
Сайво	99017009	2003	378 /	С	7	олн	екс			7	8	8	6	вл
Тіса	95017005	2000	879 /	С	7-9	олн	екс			5	7-9	7-9	5	вл
Українське сонечко	00017008	2004	736 /	Л	7	олн	екс			8	7	8	7	вл

Сорт				Код	Зона	Характеристики									
Назва	Вид	Номер	Рік реєстрації			Заявник / Підтримувач	Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
				посухи							полягання	осипання	хвороб		
Український скоростиглий		98017052	2001	736 /		СЛ	5	олн	ске		5	8	8	5	вл
Флорес		95017023	2000	777 /		Л	7-9	олн	ске		5	7-9	7-9	5	вл
Харківський 49		88017007	1992	404 /		СЛ	5	олн	ске	-	5	5	7-9	5	вл
Чумак		98017040	2001	216 /		СЛ	5	олн	ске		5	7	8	5	вл
Альціон		94017021	1999	806 /		СЛ	7-9	олн	ре		5	7-9	7-9	5	вл
Айтапа		00017002	2003	806 /		СЛ	8	олн	ре		6	8	8	6	вл
Альянс		95017025	1999	806 /		СЛ	7-9	олн	ре		5	7-9	7-9	5	вл
Ант		01017025	2004	404 /		СЛ	7	вол	ре		8	8	8	7.5	вл
Альзап		98017004	2001	806 /		Л	8	олн	ре		6	7-9	7-9	5	вл
Альтес РМ		98017005	2002	806 /		Л	8	олн	ре		6	7	8	5	вл
Альманзор		98017054	2002	806 /		СЛ	7-9	олн	ре		5	8	8	5	вл
Балкан		00017013	2004	879 /		Л	8	олн	ре		7	7	8	7.5	вл
Віталія		01017016	2003	886 /		СЛ	7-9	олн	ре		7	8	8	7	вл
В 206		92017049	2000	901 /		С	5	олн	ре		5	5	7-9	5	вл
Драган		02017011	2004	1141 /		Л	8	олн	ре		8	9	8	7.5	вл
Дунай		92017043	1996	879 /		С	5	олн	ре		5	7-9	7-9	5	вл
Джазі		01017038	2004	1079 /		Л	9	олн	ре		8	9	8	7.5	вл
Діаболо		01017003	2003	793 /		СЛ	7-9	олн	ре		5	8	8	7	вл
Донський 60		82017010	1987	216 /		С	8	олн	ре		7	7	8	8	вл
Енергик РМО		01017002	2004	806 /		Л	7	олн	ре		7	8	8	7	вл
Запорізький 9		91017001	1996	329 /		Л	5	олн	ре		5	5	7-9	5	вл
Знахідка		99017011	2002	1114 /		С	8	олн	ре		6	8	8	6	вл
Захист		99017010	2003	1114 /		С	8	олн	ре		6	8	8	6	вл
Запорізький кондитерський		94017001	1998	329 /		Л	5	конд	ре		5	5	7-9	5	сл
Запорізький 32		98017038	2003	329 /		СЛ	5	олн	ре		5	8	8	5	вл
Запорізький 26		97017024	2000	329 /		С	5	олн	ре		5	7-9	7-9	5	вл

Сорт				Код	Зона	Характеристики								
Назва	Вид	Номер	Рік реєстрації			Заявник / Підтримувач	Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)			
				посухи							полягання	осипання	хвороб	
Запорізький 28		97017035	2001	329 /	Л	5	олн	ре		5	7-9	7-9	5	вл
Красотка		91017023	1997	806 /	СЛ	5	олн	ре		5	7-9	7-9	5	вл
Красотка РМ		98017028	1997	806 /	СЛ	5	олн	ре		5	8	8	5	вл
Кеопс		02017002	2004	806 /	С	7	олн	ре		8	8,6	8	7	вл
Ковчег		00017007	2003	404 /	Л	8	олн	ре		6	7-9	8	7	вл
ЛІХА 250/РІ		01017011	2004	793 /	Л	7	олн	ре		8	9	8	7,5	вл
Мегасан		98017001	2001	749 /	СЛ	7	олн	ре		6	8	8	5	вл
Магнум		01017004	2003	793 /	СЛ	8	олн	ре		6	7-9	8	7	вл
Нагіл		95017011	2000	767 /	Л	7-9	олн	ре		5	7-9	7-9	5	вл
Нібас		01017013	2004	765 /	Л	7	олн	ре		7	8,8	8	7,5	вл
Ной		97017032	2001	404 /	С	8	олн	ре		5	7-9	8	7	вл
Надійний		02017008	2004	329 /	Л	9	олн	ре		7,5	8	8	7	вл
Олестар РМ		98017057	2002	806 /	Л	8	олн	ре		6	8	7-9	6	вл
Одеський 249		92017055	1998	378 /	СЛ	7-9	олн	ре		5	7-9	7-9	5	вл
Одеський 122		85017006	1989	378 /	СЛ	5	олн	ре		7-9	5	7-9	7-9	вл
ІР63А90		98017044	2001	767 /	Л	8	олн	ре		6	7-9	8	7	вл
ІР64І51(ХФ 4948)		00017019	2004	767 /	СЛ	8	вол	ре		8	9	8	8	вл
Поголянський		95017030	2000	919 /	СЛ	5	олн	ре		5	7-9	7-9	5	вл
ІР64А63(ХФ 4029)		00017020	2004	767 /	СЛ	9	олн	ре		8	9	8	8	вл
РГ 012		01017001	2004	806 /	Л	7	олн	ре		7	8	8	7	вл
Слав'янин		94017042	1999	329 /	СЛ	5	вол	ре		5	7-9	7-9	5	вл
Сонріка		94017038	1999	766 /	Л	7-9	олн	ре		5	7-9	7-9	5	вл
Сула		97017037	2001	879 /	СЛ	7-9	олн	ре		5	7-9	7-9	5	вл
Савінка		94017009	1999	1079 /	СЛ	7-9	олн	ре		5	7-9	7-9	5	вл
Світоч		92017004	1996	404 /	СЛ	5	олн	ре		5	7-9	7-9	5	вл
Тейде		98017055	2002	806 /	Л	8	вол	ре		6	8	8	7	вл
Тітанік		02017009	2004	1141 /	Л	9	олн	ре		8	9	8	7,5	вл

Сорт				Код	Зона	Характеристики								Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач		Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				
										посухи	полягання	осипання	хвороб	
Український F1		97017018	2001	736 /	СЛ	5	олн	ре		5	8	8	5	вл
Фантасол	®	97017003	1999	777 /	Л	8	олн	ре		5	8	7-9	5	вл
Франкасол	®	94017027	1999	777 /	СЛ	7-9	олн	ре		5	7-9	7-9	5	вл
Хайсан 321		92017032	2000	713 /	Л	5	олн	ре		5	7-9	7-9	5	вл
Харківський 7		92017003	1997	404 /	СЛ	5	олн	ре		5	7-9	7-9	5	вл
Аламо		94017019	1999	806 /	СЛ	7-9	олн	ер		5	7-9	7-9	5	вл
Арена		97017025	2000	1079 /	С	7-9	олн	ер		5	8	6	7	вл
Арена ПР		01017012	2003	1079 /	СЛ	8	олн	ер		6	7-9	8	7	вл
Белград		02017012	2004	1141 /	Л	8	олн	ер		8	8,5	8	7,8	вл
В 306		92017046	2000	901 /	С	5	олн	ер		5	5	7-9	5	вл
Гена		00017011	2003	879 /	СЛ	7	олн	ер		5	8	8	6	вл
Диспр		92017042	1997	879 /	СЛ	5	олн	ер		5	7-9	7-9	5	вл
Згода		92017005	1996	378 /	С	5	олн	ер		5	7-9	7-9	5	вл
Зустріч		91017002	1996	329 /	СЛ	5	олн	ер		5	7-9	7-9	5	вл
КВС Гелія 04		98017018	2002	938 /	СЛ	8	олн	ер		5	8	7-9	5	вл
Казіо		79017016	1998	1079 /	СЛ	7-9	олн	ер		5	7-9	7-9	5	вл
ЛХА 350/02		01017008	2004	793 /	СЛ	9	олн	ер		8	9	8	7	вл
Лан 26А		98017053	2001	1096 /	С	5	олн	ер		6	8	8	7	вл
ЛХА 345/08		01017006	2004	793 /	Л	8	олн	ер		8	8,7	8	8	вл
ЛХА 351/01		01017007	2004	793 /	Л	8	олн	ер		8	9	8	7,5	вл
Медальйон		97017027	2000	378 /	Л	8	олн	ер		6	8	7-9	7	вл
Мелоді		97017026	2000	1079 /	С	8	олн	ер		6	8	8	7	вл
Оріон		89017004	1993	216 /	СЛ	5	олн	ер	-	5	5	5	5	вл
Одеський 123		85017007	1990	378 /	СЛ	5	олн	ер	-	5	5	7-9	5	вл
Одеський 504		92017006	1997	378 /	СЛ	7-9	олн	ер		5	7-9	7-9	5	вл
Перформер		01017019	2003	886 /	СЛ	7-9	олн	ер		6	8	8	7	вл
Погляд		94017002	1999	404 /	С	7-9	олн	ер		5	7-9	7-9	5	вл

Сорт				Код	Зона	Характеристики								Якість
Назва	Вид	Номер	Рік ресет- рації	Заявник / Підтримувач		Проду- ктивність	Напря- м викорис- тання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				
									посухи	поля- гання	осипання	хвороб		
ПР64А44/ХФ4917		01017046	2004	767 /		СЛ	8	олн	ер	8	9	8	7.5	вл
ПР64А10 (Синонім: Міхал)		98017043	2001	767 /		С	8	олн	ер	7	7-9	8	7	вл
СФ-187		94017029	2000	777 /		С	7-9	олн	ер	5	7-9	7-9	5	вл
Супер 25		84017018	1998	749 /		Л	7-9	олн	ер	5	7-9	7-9	5	вл
Урес		92017001	1999	378 /		Л	7-9	олн	ер	5	5	7-9	5	вл
Харківський 58		90017010	1995	404 /		СЛ	7-9	олн	ер	5	7-9	7-9	5	вл
PR64A83		00017001	2002	767 /		Л	8	олн	се	5	7-9	8	7	вл
Дністр		95017003	2000	879 /		СЛ	7-9	олн	се	5	7-9	7-9	5	вл
Донецький крупнонасінний		89017003	1993	216 /		СЛ	5	конд	се	-	5	5	5	сл
Сврофлор		93017003	1998	806 /		Л	7-9	олн	се	5	7-9	7-9	5	вл
Краснодарський 885		88017005	1993	16 /		СЛ	5	вол	се	-	5	5	5	вл
НК Бріо		01017037	2004	1079 /		СЛ	9	олн	се	8	8,8	8	8	вл
Опера		98017006	2001	1079 /		С	8	олн	се	6	8	8	7	вл
Океана		01017017	2003	886 /		СЛ	8	олн	се	6	8	8	7	вл
Ортега		97017010	2002	938 /		С	7-9	олн	се	5	5	5	5	вл
Ріпасол		98017026	2001	777 /		Л	8	олн	се	6	8	8	5	вл
СНК		88017003	1993	16 /		СЛ	5	конд	се	-	5	5	5	сл
Флай		99017003	2001	777 /		СЛ	8	олн	се	5	7-9	8	7	вл
Харківський 3		90017011	1994	404 /		СЛ	5	олн	се	5	5	7-9	5	вл
Хортиця		92017045	1996	879 /		СЛ	7-9	олн	се	5	7-9	7-9	5	вл
Соя		-	62											
Слена		01018003	2004	345 /		СЛП	7-9	зерн	екс	7	7,5	7	8	сл
Кеєня		01018002	2004	432 /		СЛП	7	зерн	екс	7	7,5	7,5	8	сл
Устя		98018003	2002	345 /		П	7-9	зерн	екс	6	6	6	5	сл
Фея		01018001	2004	404 /		СЛП	7-9	зерн	екс	7	6,5	8	8	сл

Сорт				Код	Зона	Характеристики								
Назва	Вид	Номер	Рік рес- тації	Заявник / Підтримувач		Проду- ктивність	Напря- м вико- рис- тання	Група стиг- лості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
										посу- хи	поля- гання	осипання	хвороб	
Аметист		94018009	1998	399 /	СЛ	6	зерн	ре		5	6	6	5	ел
Аполон		99018002	2003	411 /	СЛП	7-9	зерн	ре		7	6	6	5	ел
Білосніжка		75018001	1981	349 /	СЛ	5	зк	ре		5	5	5	5	ел
Блискавиця		00018006	2004	355 /	СЛП	7	зерн	ре		7	8	7	8	ел
Донька		99018005	2003	378 /	СЛ	7-9	зерн	ре		7	6	6	5	ел
Київська 91		90018016	1996	345 /	Л	5	зерн	ре		5	6	5	5	ел
Краса Поділля		94018003	1999	305 /	СЛП	7	зерн	ре		5	6	6	5	ел
Київська 98		97018008	2001	345 /	ПЛ	7	зерн	ре		5	6	6	5	ел
Медєя		94018005	1998	356 /	СЛ	6	зерн	ре		6	5	5	5	ел
Мрія		95018001	1999	404 /	СЛ	7	зерн	ре		6	6	6	5	ел
Романтика		94018008	1998	404 /	СЛ	7	зерн	ре		6	6	6	5	ел
Соср 2-95		88018004	1993	221 /	СЛП	5	зерн	ре		5	5	5	5	ел
Степовичка 4		99018006	2004	309 /	СЛП	7-9	зерн	ре		7	8	7	8	ел
Фаетон		95018002	2000	411 /	СЛП	7	зерн	ре		6	6	5	5	ел
Харківська 35		86018004	1991	404 /	С	5	зк	ре		5	5	5	5	ел
Харківська 66		89018017	1994	404 /	СЛ	5	зерн	ре		5	6	6	5	ел
Чернятка		92018019	1998	305 /	ЛП	6	зерн	ре		5	6	6	5	ел
Чорнобура		89018014	1995	378 /	С	5	зерн	ре		7-9	5	5	5	ел
Юг 30		87018007	1990	411 /	СЛП	5	зк	ре		6	5	5	5	ел
Артеміда		97018003	2001	399 /	С	7	зерн	ер		6	6	6	5	ел
Аркадія одеська		83018001	1986	378 /	С	5	зерн	ер		7-9	5	5	5	ел
Альтаір		89018002	1995	378 /	П	5	зк	ер		5	5	5	5	ел
Берегиня		99018001	2002	378 /	С	7	зерн	ер		7	6	6	5	ел
Васильківська		00018007	2003	378 /	СЛП	7-9	зерн	ер		7	6	6	5	ел
Валюта		97018002	2001	356 /	С	7	зерн	ер		5	6	6	5	ел
Валентія		00018008	2003	355 /	СЛ	7-9	зерн	ер		7	6	6	5	ел
Горизонт		98018002	2002	404 /	С	7-9	зерн	ер		6	7	6	5	ел

Сорт				Код	Зона	Характеристики								
Назва	Вид	Номер	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач		Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бати)				Якість
										посухи	полягання	осипання	хвороб	
Золотиста		00018005	2004	305 /	СЛП	7-9	зерн	ср		7	8	8	8	сл
Гумрудна		90018004	1995	356 /	С	5	зерн	ср		6	5	5	5	сл
Іванка		91018001	1996	345 /	Л	5	зерн	ср		5	6	6	5	сл
Київська 27		86018003	1990	345 /	ЛП	5	зк	ср		5	5	5	5	сл
Оріана		98018001	2002	305 /	С	7	зерн	ср		6	6	6	5	сл
Одеська 124		85018007	1990	378 /	С	5	зерн	ср		7-9	5	5	5	сл
Офелія		00018001	2003	329 /	С	7	зерн	ср		7	6	6	5	сл
Оксана		97018004	2001	411 /	С	7	зерн	ср		6	6	6	5	сл
Подільська 416		96018003	2001	950 /	Л	7	зерн	ср		5	6	6	5	сл
Прикарпатська 96		97018005	2001	330 /	С	6	зерн	ср		5	6	6	5	сл
Східна		00018002	2004	404 /	СЛП	7-9	зерн	ср		7	8	7	8	сл
Сиринг		99018003	2003	329 /	СЛ	7	зерн	ср		6	6	6	5	сл
Стратегія		00018003	2004	950 /	СЛП	7-9	зерн	ср		7	8	8	7	сл
Сонячна		92018005	1997	329 /	СЛ	5	зерн	ср		6	6	5	5	сл
Харківська зерно кормова		90018003	1994	404 /	СЛП	5	зк	ср		6	6	5	5	сл
Херсонська 908		79018017	1985	411 /	СЛ	5	зк	ср		7-9	5	5	5	сл
Чернівецька 9		96018002	2001	432 /	СЛ	7	зерн	ср		5	6	6	5	сл
Юлі 40		83018013	1987	411 /	С	5	зк	ср		6	5	5	5	сл
Агас		94018017	2000	399 /	СЛ	7	зерн	сс		5	6	6	5	сл
Анатолійка		97018007	2001	305 /	С	7	зерн	сс		6	5	6	5	сл
Визнь 50		88018009	1992	411 /	С	5	зерн	сс		5	5	5	5	сл
Деймос		94018002	1998	411 /	С	7	зерн	сс		6	6	5	5	сл
Мар'яна		94018001	1999	345 /	П	7	зерн	сс		6	5	6	5	сл
Одеська 150А		97018011	2001	378 /	ЛС	7	зерн	сс		6	6	6	5	сл
Подольанка		94018004	1999	950 /	П	7	зерн	сс		5	6	6	5	сл
Подільська І		92018017	1997	417 /	СЛ	5	зерн	сс		6	5	5	5	сл
Срібна		99018004	2003	329 /	СЛ	7	зерн	сс		6	6	6	6	сл

Сорт				Код	Зона	Характеристики								Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач		Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бати)				
										посухи	полягання	осипання	хвороб	
Оділа		99016012	2002	946 /	Л	7	олн		7-9	7	>5	>5	7	00
Омікрон		97016029	2001	946 /	ЛП	7	олн		7-9	7	7	7	7	00
Ранок Поділля		97016023	2002	306 /	ЛП	7	олн		7-9	>5	>5	7	7	00
Свєта		88016008	1995	332 /	ЛП	5	олн		5	>5	>5	5	>5	00
Світоч		90016017	1995	306 /	ЛП	5	олн		5	5	7	>5	5	00
Тисменицький		84016001	1989	332 /	СЛП	7	олн		7	>5	>5	>5	>5	00
Федорівський поліпшений		92016015	1998	350 /	СЛ	5	олн		>5	7	>5	>5	5	0
Чорний велетен.		97016022	2002	306 /	ЛП	7	олн		7	>5	7	7	7	00
Рінак ярий		-	27											
Арїон		91016002	1996	332 /	Л	7-9	олн		7	7	7	7	7	00
Болєро		97016004	2001	926 /	П	7-9	олн		7-9	7	9	9	7	00
Байкал		98016002	2001	912 /	ЛП	7-9	олн		7-9	9	9	9	9	00
ВНІС 100		01016004	2004	736 /	ПЛ	7	олн		7	7-9	9	9	9	00
Добробут		01016005	2004	736 /	ПЛ	7	олн		7	9	9	7-9	9	00
Ірис		91016007	1996	912 /	С	5-7	олн		5-7	7	7	7	5-7	00
Калинівський		90016015	1994	350 /	СЛП	5-7	олн		5	5	7	5-7	7	00
Клітинний 8		95016001	2000	350 /	ЛП	5-7	олн		5	5	5-7	7	7	00
Квантум		97016003	2001	926 /	Л	7-9	олн		7	7-9	7	7	7	00
Клітинний 1		91016009	1996	350 /	СЛП	5	олн		5-7	5	7	5	7	00
Ліга		97016014	2001	332 /	П	5-7	олн		5	5	7	7	7	00
Лізіоне		86016002	1998	807 /	Л	7-9	олн		7-9	7	9	7	9	00
Лужок		98016005	2003	332 /	СЛП	5-7	олн		5-7	7	7	9	9	00
Ліколіни		95016002	2000	807 /	П	7-9	олн		7-9	7-9	9	9	9	00
Микитинський		92016017	1997	332 /	СП		олн		5	5	5	5-7	7	00
Марія		99016018	2003	1106 /	СП	7-9	олн		7-9	7-9	7-9	9	9	00
ІНЦ-СІФ-001		00016005	2003	912 /	СЛП	9	олн		7-9	9	9	9	9	00

Сорт				Код	Зона	Характеристики								Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач		Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				
										посухи	полягання	осипання	хвороб	
Оредеж 2		91016006	1996	138 /	Л	5	олн		5-7	5-7	7	7	7	00
Оксамит		99016017	2003	1106 /	СП	5-7	олн		7	7	9	9	9	00
Ольга		97016005	2001	912 /	П	7-9	олн		7-9	9	9	9	9	00
Отаман		94016026	1999	329 /	С	7-9	олн		7	7	7-9	7	7-9	00
Сієста F1		99016009	2002	912 /	СЛП	7-9	олн		7-9	9	9	9	9	00
Терра		99016010	2002	912 /	СЛП	9	олн		7-9	9	9	9	9	00
Титан		94016025	1999	329 /	С	7	олн		7-9	7-9	7	7	7	00
Фаворит		99016022	2003	1115 /	П	7	олн		7	7-9	9	7	9	00
Форте		87016003	2001	938 /	Л	7-9	олн		5-7	7	9	9	7	00
Шпат		84016007	1989	16 /	СЛП	5-7	олн		5	5	5-7	5	7-9	00
Льон кудряш		-	6											
Айсберг		00094001	2001	329 /	СЛ	8	олн			7	8	7	7	
Дебют		99094002	2001	329 /	СЛ	8	олн			7	8	8	7	
Еврика		03094001	2004	345 /	СЛП	7	олн			8	9	8	7-9	
Лірина		00094002	2002	807 /	СЛ	7-9	олн			7	8	8	7	
Орфей		00094004	2002	329 /	СЛ	8	олн			7	8	8	7	
Південна ніч		99094001	2001	329 /	СЛ	8	олн			7	8	8	7	
Рижій ярий		-	4											
Гірський		97097001	2000	332 /	СЛ	7				6	8	8	6	
Клондайк		03097001	2004	345 /	СЛ	7	олн			8	9	9	7	
Міраж		94097001	2000	329 /	СЛП	7				6	8	8	6	
Степовий 1		92097001	1996	329 /	СЛП	5				5	7	7	5	
Гірчиця сарептська		-	6											
Мрія		94144003	2000	329 /	ЛС	7	олн			6	8	8	7	
Росава		94144001	1999	348 /	С	5	олн			6	7	7	5	

Сорт				Код	Зона	Характеристики								
Назва	Вид	Номер	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач		Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
										посухи	полягання	осипання	хвороб	
Роксолана		94144002	1999	332 /	С	5	олн			6	7	7	5	
Тавричанка 5		97144001	2000	329 /	СЛП	7	олн			6	8	8	6	
Тавричанка 15		94144004	1999	329 /	Л	5	олн			6	7	7	6	
Тавричанка		92144001	1996	329 /	СЛ	5	олн			5	7	7	5	
Гірчиця біла - 6														
Еталон		03092001	2004	345 /	ЛСП	7	олн,сд			7	9	8	8	
Кароліна		90092002	1994	305 /	СЛП	5	олн			6	7	8	5	
Надія		02092002	2004	331 /	ЛСП	7-9	олн,сд.			7	7	9	7	
Підпечерецька		94092001	2000	332 /	Л	8	олн			5	7	8	6	
Талісман		94092002	2000	329 /	ЛП	7	олн			6	8	7	5	
Юлія		02092001	2003	1115 /	СЛП	8	олн			6	8	8	6	
Рицина - 6														
Громада		90098001	1996	409 /	С	5	олн			6	7	7	6	
Олеся		00098002	2001	329 /	СЛ	7	олн			6	8	8	6	
Хортицька 3		98098001	2001	329 /	ЛС	7	олн			6	7	8	6	
Хортичанка		00098001	2001	329 /	СЛ	7	олн			6	7	8	6	
Хортицька 1		92098002	1996	329 /	С	5	олн			6	7	8	6	
Хортицька 7		97098001	2001	329 /	СЛ	7	олн			6	7	8	6	
Мак - 12														
Беркут		92095001	1996	332 /	СЛ	5	олн			5	6	7	5	боп
Волинський		01095002	2004	1009 /	ЛСП	8	олн			8	7	8	7-9	
Герлах		99095001	2001	1066 /	СЛП	5	олн			6	7	7	6	боп
Кривотульський		99095007	2001	1115 /	СЛ	7	олн			6	7	8	6	боп
Корал		97095001	2001	329 /	СЛ	6	олн			5	7	8	5	боп
Кристал		99095002	2002	389 /	СЛ	5	олн			6	7	7	5	боп

Сорт				Код	Зона	Характеристики								Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач		Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				
										посухи	полягання	осипання	хвороб	
Марс		99095006	2002	1115 /	СЛ	7	олн			6	7	8	6	боп
Сатурн		99095004	2002	1108 /	ЛП	7-9	лік			8	8	9	7	
Тарновецький		99095005	2001	1115 /	СЛ	7	олн			6	7	8	6	боп
Уран		99095008	2002	1115 /	СЛ	7	олн			6	7	8	6	боп
Франківський		99095003	2001	1115 /	СЛ	7	олн			6	7	8	6	боп
Юнітер		99095009	2001	1115 /	СЛ	7	олн			6	7	8	6	боп
<u>Арахіс</u>		-	1											
Клинецький		97091001	2002	410 /	С	5	олн,конт			7	7	7-9	5	вл
<u>Кунжут</u>		-	1											
Надія		98093001	2001	329 /	ЛС	7	олн			7	8	7	5	
<u>Суріниця озима</u>		-	2											
Вікторія		01145001	2002	331 /	СЛП	7	олн,корм		>5	7	5	5	7	
Оріана		02145001	2003	348 /	СЛП	7	олн		>5	7	7		7	
<u>Суріниця яра</u>		-	1											
Горянка		98145002	2001	332 /	П	7	олн			6	7	8	5	
<u>Льон-довгунець</u>		-	17											
Глухівський ювілейний		92015003	1996	393 /	ЛП	5	пряд	се		5	7	7	5	
Зоря 87		82015001	1988	371 /	Л	5	пряд	не		5	6	6	5	
Ірма		95015001	1999	320 /	П	6	пряд	ер		5	7	7	5	
Київський		79015001	1991	345 /	П	5	пряд	ер		5	6	6	5	
Камешір		99015001	2003	371 /	П	7	пряд	ер		6	7	7	5	
Могильовський 2		88015004	1993	454 /	П	5	пряд	не		5	6	6	5	
М-5		86015001	1991	447 /	П	5	пряд	еп		5	6	6	5	
Персей		94015001	1999	320 /	ЛП	6	пряд	ре		5	7	7	6	

Сорт				Код	Зона	Характеристики								
Назва	Вид	Номер	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач		Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
										посухи	полягання	осипання	хвороб	
Рушничок		97015001	2000	345 /	ЛП	7	пряд	ре		5	7	7	5	
Синільга		91015001	1995	320 /	П	5	пряд	се		5	6	6	5	
Томський 16		85015005	1990	242 /	ЛП	5	пряд	ре		5	6	5	5	
Український ранній		94015002	1999	345 /	ЛП	6	пряд	ре		5	7	7	5	
Український 3		92015001	1997	345 /	ЛП	5	пряд	се		5	6	6	5	
Український 2		76015003	1982	345 /	П	5	пряд	се		6	6	6	5	
Чарівний		92015002	1996	393 /	ЛП	5	пряд	се		6	6	7	5	
Гліну́м		00015002	2004	393 /	ЛП	7-9	пряд.	ер		7	8	8	7-9	
Сві́танок		00015001	2004	320 /	ЛП	7-9	пряд.	ер		7	8	8	7-9	
Коноплі		-	11											
Гле́ра		01014001	2004	393 /	СЛ	7-9	пряд.			8	7	7	7	
Глухівські 46		97014001	2000	393 /	Л	7-9	пряд			7	7	7	5	
Глухівські 33		92014001	1997	393 /	Л	7				6	7	7	5	
Дніпровські однодомні 14		91014001	1995	393 /	Л	5	пряд			7	7	7	5	
Дніпровські однодомні 19		98014001	2002	340 /	СЛ	7-9	пряд			7	7	7	5	
Дніпровські однодомні 6		74014001	1980	340 /	Л	5	пряд			5	7	7	5	
Золотоніські 15		94014002	1998	393 /	Л	5	пряд			7	7	7	5	
Золотоніські однодомні 11		79014001	1984	393 /	Л	5	пряд			5	7	7	5	
Синельниківські однодомні 3		98014002	2001	340 /	Л	7-9	пряд			7	7	7	5	
ЮСО 31		82014002	1987	393 /	Л	5				7	7	7	5	
ЮСО 14		75014001	1981	393 /	Л	5	пряд			5	7	7	5	
Бавовник		-	1											
Дніпровський 5		97366001	2001	411 /	С	5	пряд			7	7-9	7	7	

Сорт				Код	Зона	Характеристики								Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєстрації			Заявник / Підтримувач	Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)			
				посухи	полягання						осипання	хвороб		

Гірчиця сарептська озима 1

Новинка		02144001	2004	329 /	ЛСП	9	олн		7	8	9	9	7	
---------	--	----------	------	-------	-----	---	-----	--	---	---	---	---	---	--

Код	Назва	Адреса заявника, або представника
16	Всеросійський науково-дослідний інститут олійних культур ім. В.С.Пустовойта (НВО)	Вул. Філатова, 17, м. Краснодар-38, Росія, 350038
134	Погорлецький Борис Костянтинович	Вул. Прохоровська 2, кв. 5, м. Одеса, 65091
138	Північно-Західний науково-дослідний інститут сільського господарства	П/в Білогорка, ст. Сіверська, Гатчинський р-н, Ленінградська обл., Росія, 188338
216	ДНУ "Донська дослідна станція ім. А.О. Жданова Всеросійського науково-дослідного інституту олійних культур"	П/в Суходольськ, п. Опорний, Азовський р-н, Ростовська обл., Росія, 346754
221	Єршовська дослідна станція зрошуваного землеробства	М. Єршов, Саратовська обл., Росія, 413500
242	Томська державна обласна сільськогосподарська дослідна станція	Новостройка, с. Богашево, Томський р-н, Томська обл., Росія, 636020
305	Інститут кормів Української академії аграрних наук	Проспект Юності, 16, Вінниця, 21100
306	Вінницька державна сільськогосподарська дослідна станція УААН	Вул. Мічуріна, 1, с. Агрономічне, Вінницький р-н, Вінницька обл., 23227
309	Луганський інститут агропромислового виробництва УААН	П/в Металіст, Слов'янoserбський р-н, Луганська обл., 93733
320	Інститут сільського господарства Полісся Української академії аграрних наук	Вул. Київське шосе, 131, Житомир-7, 10007
329	Інститут олійних культур Української академії аграрних наук	Вул. Весняна, 1, с. Сонячне, Запорізький р-н, Запорізька обл., 70417
330	Коломийська дослідна станція Івано-Франківського інституту агропромислового виробництва Української академії аграрних наук	С. Пядики, Коломийський р-н, Івано-Франківська обл., 78254
331	Прикарпатський університет ім. В. Стефаніка	Вул. Шевченка, 57, м. Івано-Франківськ, 76000
332	Івано-Франківський інститут агропромислового виробництва	Вул. Розумовського, 9а, м. Івано-Франківськ, 76028
340	Синельниківська дослідна станція Інституту зернового господарства Української академії аграрних наук	П/в Раївка, Синельниківський р-н, Дніпропетровська обл., 52523
345	Інститут землеробства Української академії аграрних наук	Вул. Машинобудівників 2-б, смт. Чабани, Києво-Святошинський р-н, Київська обл., 08162
348	Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук України	Вул. Тімірязєвська, 1, Київ, 01014
349	Київська дослідна станція тваринництва	П/в Терезине, м. Біла Церква, Київська обл., 09133
350	Національний аграрний університет	Вул. Героїв оборони, 15, Київ, 03041
355	Інститут фізіології рослин і генетики Національної академії наук	Вул. Васильківська, 31/17, Київ, 03022
356	Кіровоградська державна сільськогосподарська дослідна станція	П/в Сазонівка, м. Кіровоград, 27602
371	Інститут землеробства і тваринництва західного регіону УААН	С. Оброшино, Пустомитівський р-н, Львівська обл., 81115
378	Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннізнавства та сортоживчення УААН	Овідіопольська дорога, 3, Одеса, 65036
389	Устимівська дослідна станція рослинництва Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва УААН	П/в Устимівка, Глобинський р-н, Полтавська обл., Україна, 39074
391	Рівненська державна сільськогосподарська дослідна станція	С. Шубків, Рівненський р-н, Рівненська обл., 35325
393	Інститут луб'яних культур Української академії аграрних наук	Вул. Леніна, 45, м. Глухів, Сумська обл., 41400
399	Красноградська дослідна станція Інституту зернового господарства Української академії аграрних наук	М. Красноград, Харківська обл., 63308
404	Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук	Московський проспект, 142, м. Харків, 61060
409	Херсонський державний аграрний університет	Вул. Розі Люксембург, 23, м. Херсон, 73006
410	Інститут південного овочівництва і баштанництва УААН	Вул. Червоноармійська, 71, м. Гола Пристань, Херсонська обл., 75600
411	Інститут землеробства південного регіону Української академії аграрних наук	С. Наддніпрянське, м. Херсон, 73483
417	Подільська державна аграрно-технічна академія	Вул. Шевченка 13, м. Кам'янець-Подільський, Хмельницька обл., 32316
432	Буковинський інститут агропромислового виробництва УААН	Вул. Кузнєцова, 21а, м. Чернівці, 58026

Код	Назва	Адреса заявника, або представника
447	Білоруський науково-дослідний інститут землеробства і кормів	Вул. Тімірязєва, 1, м. Жодіно, Мінська обл., Білорусь, 222160
454	Могилівська державна обласна сільськогосподарська дослідна станція	П/в Дашовка, Могилівський р-н, Могилівська обл., Білорусь, 213300
713	Адванта Інтернешнл Б.В., (СЕС - Європа Н.В./С.А.)	Industriepark 15, 3300 Tienen, Belgium
736	ТОВ "Всеукраїнський науковий інститут селекції (ВНІС)"	ОФ.36, вул. Ломоносова 30/2, Київ, Україна, 03022
749	Адванта Інтернешнл Б.В. (Ді Джей Ван дер Хаве Б.В.)	П.О.Бокс 1, 4421 АЖ, Капеле, Дейквельзештрат 70, Голандія. Пр.: офіс, 302, вул. Госпітальна, 12, Київ
762	Каргіл Ентерпрайзиз, Інк.	П.О.Бокс 5645, Мінеаполіс, МН 55440. Пр.: бульвар Лепсе, 4, "Сільвер Центр", Київ, 03067
765	ТОВ агрофірма "Нібас"	Вул. Польова 100-А, смт Петропавлівка, Дніпропетрівська обл., Україна, 52700
766	Декалб Дженетікс Корпорейшн	3100 Сікамоє Роуд Декалб, Ілліноїс 60115, USA. Пр.: бульвар Лепсе, 4, "Сільвер Центр", Київ, 03067
767	Піонер Семена Холдінг Гес.М.Б.Х	Індустрігеланде, Піонерштрассе, А - 7111, Парндорф, Австрія.
777	Монсанта Європа С.А.	Авеню де Тервюран 270-272, 1150, Брюссель, Бельгія. Пр.: бульвар Лепсе, 4, "Сільвер Центр", Київ, 03067
793	Лімагрейн Женетік Гранд Кюльтюр С.А.	Домен де Мон 63203 ріом, Седекс-Франція
806	Євраліс Семанс	Авеню Гастон Фоебюс, 64231 Лескар Седекс, Франція. Пр.:Фредерік Шавіні, вул. Шовковична 7а., оф. 23, Київ, 01021
807	Дойче Заатферделунг Ліппштадт-Бремен ГмБХ	Вайсенбургер штр. 5, 59557 Ліппштадт, Німеччина. Пр.: фірма "Голландське насіння Ltd", а/с 249, вул. Луначарського, 1А, кв 12, Київ, 02002
869	Вінницький державний аграрний університет	Вул. Сонячна, 3, м. Вінниця, Україна, 21008
879	Інститут польовництва та овочівництва, м.Нові Сад	М. Горького 30, 21000 Нові Сад, Югославія Пр.: "Продуктива", кор. 1, вул. Весняна 1, Сонячний, м. Запоріжжя, 332110.
886	Науково-дослідний центр "Магроселект"	Вул. Ф. Будде, 34, м. Сорока, Молдова, 3001
901	Комбісід	Вул. Буйше-Шілінський, 50, 21, X - 1054, Будапешт, Угорщина
909	Науково-виробнича асоціація "Кримський міжнародний інститут нетрадиційного рослинництва, екології та здоров'я"	Вул. Київська, буд. 67/2, кв. 3, м. Сімферополь-17, АР Крим, Україна, 95017
912	Норддойче Пфланценцухт Ханс-Георг Лембке КГ	24363 Хохенліті, Хользісес, Німеччина.
919	Сумський національний аграрний університет	Вул. Кірова, 160, м. Суми, Україна, 40021
926	Заатен-Уніон ГмБХ	Айзенштрассе 12, 30916 Ізернхаген ХБ, Німеччина
938	КВС ЗААТ АГ	П.О.Бокс 1463, Д - 37555 Айнбек, Німеччина. Пр.: вул. Закревського, 85 - Б, кв. 123, Київ 02232
946	Осева Ексімпо Прага с.р.о.	Бзєнес 1436, 69681 Бзєнек, ІСО: 639 86175, Чеська Республіка
950	Інститут агроєкології та біотехнології Української академії аграрних наук	Вул. Метрологічна, 12, Київ, Україна, 03143
1009	Приватне підприємство "Канола"	Вул. Сахарова 34, м. Івано-Франківськ, 76014, Україна
1066	Кремлін с.р.о	Вацлавське Наместі, 15 11000 Прага 1, Чеська Республіка
1079	Сінгента Сідз С.А.С.	12, шємен де л"Обі Б.П. 27, 31790 СенСовер, Франція.
1083	Товариство з обмеженою відповідальністю "Технаука"	Вул. Степова 11а, с. Тепличне, м. Луганськ, Україна, 94490
1093	Товариство з обмеженою відповідальністю "Незалежна аграрна індустрія"	Вул. Шушенська, 65, м. Запоріжжя-89, Україна, 69089
1096	Бурлов В.В., Карпенко О.О., Краєвський А.М., Крутько В.И.	Вул. Леніна, 51/27, с. Металіст, Слоб"яносербський р-н, Луганська обл., Україна, 349020
1106	Товариство з обмеженою відповідальністю "Рапсодія"	Немирівське шосе, 26, м. Вінниця, Україна., 23200
1108	Науково-виробниче сільськогосподарське підприємство "Фітон - МВ"	Вул. С. Бандери, 62, м. Івано-Франківськ, Україна, 76014

Код	Назва	Адреса заявника, або представника
1110	Акціонерна компанія "Контакт"	Пров. Слюсарний, 1, м. Харків, Україна, 61003
1114	Агропромислова фірма "Флора" у формі товариства з обмеженою відповідальністю	Вул. Сперідонівська, буд. 26, кв. 3, Одеса, Україна, 65045
1115	Аграрний науково-дослідний інститут "АНДІ"	Вул. С. Бандери, 62, м. Івано-Франківськ, Україна, 76014
1123	Науково-виробнича фірма "Дріада, Ltd"	Вул. Рози Люксембург, 23, Херсон, Україна, 73006
1141	Товариство з обмеженою відповідальністю агрофірма "Сади України"	Вул. Акад. Проскури 1, м. Харків 61070, Україна
1172	Селянське (фермерське господарство) "Тритікум"	смт Авангард, Овідіопольський р-н, Одеська обл., 67806
1192	Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича агрофірма "Землеробець"	с. Полігон, Жовтневий р-н, Миколаївська обл., 57217

ОПИСИ СОРТІВ КУЛЬТУР, ЩО ЗАНЕСЕНІ ДО РЕЄСТРУ СОРТІВ, ПРИДАТНИХ ДЛЯ ПОШИРЕННЯ В УКРАЇНІ

СОНЯШИК

Принтасол. Простий міжлінійний гібрид на стерильній основі. Заявник – фірма “АТ Каргілл”.

Рослини заввишки до 150 см. Стебло нерозгалужене, слабоопушене, добре облиствене. Листки середнього розміру, серцеподібні, зелені. Листкова пластинка без антоціану з блиском; форма поперечного розрізу плеската, крила відсутні, кут розходження бічних жилок прямий. Кошик середнього розміру, опуклий. Листочки обгортки видовжені без антоціану. Язичкові квітки овальні, жовті; трубчасті – довгі без антоціанового забарвлення. Сім’янки видовжено-яйцевидні, сірі з сірими смужками по краях. маса 1000 насінин – 54г.

Вегетаційний період 112 днів. Середня урожайність за роки випробування в зоні Степу становила 23,4 ц/га, потенційна – 43,8 ц/га. Вміст жиру – 50,8%. Ураження хворобами (вовчком до 10%, гнилями – 13%, іржею – 18%).

Рекомендований для зона Степу.

Красень. Скоростиглий гібрид на стерильній основі (материнська форма С х 908 А; батьківська Х 782В). Заявник ІР УААН.

Гібрид відноситься до різновидності чернянка дрібнонасіenneва. Стебло прямостояче, заввишки до 150 см, добре облиствене. Листки середнього розміру, серцеподібні, зелені. Кошик великий, злегка опуклий, діаметром 18-22 см. Насіння чорне, панцирне. Маса 1000 насінин 58-61г. Лушпинність – 21,2%.

Середня урожайність по зоні Степу становила 22 ц/га, потенційна – 41,6 ц/га. Вміст жиру – 49-52%. Гібрид відрізняється рівномірним квітування та достиганням; має високу стійкість до вилягання. Посухостійкість також висока. Генетично стійкий до вовчка та пероноспорозу. Толерантний до загущення.

Урожайність материнської форми складає від 8 до 13 ц/га, вихід кондиційного насіння – 60%. Оптимальна густина стояння 55-60 тис/га; внесення добрив під оранку № 30-35; Р 40-50; К 30-40, при сівбі № 10-15.

Рекомендований для зони Степу.

Український 1. Трилінійний гібрид на стерильній основі (мати – міжлінійний стерильний гібрид Зоря; батько – лінія А-12). Заявник – науково-виробнича фірма “Гран”.

Гіпокотиль з слабким антоціановим забарвленням. Рослини заввишки 130 см., стебло прямостояче, середньоопушене. Листки середнього розміру, світлозелені, трикутної форми, без антоціану. Листкова пластинка слабгорбувата з блиском. Форма поперечного

ОПИСИ СОРТІВ КУЛЬТУР, ЩО ЗАНЕСЕНІ ДО РЕЄСТРУ СОРТІВ, ПРИДАТНИХ ДЛЯ ПОШИРЕННЯ В УКРАЇНІ

СОНЯШИК

Принтасол. Простий міжлінійний гібрид на стерильній основі. Заявник – фірма “АТ Каргілл”.

Рослини заввишки до 150 см. Стебло нерозгалужене, слабоопушене, добре облистнене. Листки середнього розміру, серцеподібні, зелені. Листкова пластинка без антоціану з блиском; форма поперечного розрізу плеската, крила відсутні, кут розходження бічних жилок прямий. Кошик середнього розміру, опуклий. Листочки обгортки видовжені без антоціану. Язичкові квітки овальні, жовті; трубчасті – довгі без антоціанового забарвлення. Сім’янки видовжено-яйцевидні, сірі з сірими смужками по краях. маса 1000 насінин – 54г.

Вегетаційний період 112 днів. Середня урожайність за роки випробування в зоні Степу становила 23,4 ц/га, потенційна – 43,8 ц/га. Вміст жиру – 50,8%. Ураження хворобами (вовчком до 10%, гнилями – 13%, іржею – 18%).

Рекомендований для зона Степу.

Красень. Скоростиглий гібрид на стерильній основі (материнська форма С х 908 А; батьківська Х 782В). Заявник ІР УААН.

Гібрид відноситься до різновидності чернянка дрібнонасіenneва. Стебло прямостояче, заввишки до 150 см, добре облистнене. Листки середнього розміру, серцеподібні, зелені. Кошик великий, злегка опуклий, діаметром 18-22 см. Насіння чорне, панцирне. Маса 1000 насінин 58-61г. Лушпинність – 21,2%.

Середня урожайність по зоні Степу становила 22 ц/га, потенційна – 41,6 ц/га. Вміст жиру – 49-52%. Гібрид відрізняється рівномірним квітування та досяганням; має високу стійкість до вилягання. Посухостійкість також висока. Генетично стійкий до вовчка та пероноспорозу. Толерантний до загущення.

Урожайність материнської форми складає від 8 до 13 ц/га, вихід кондиційного насіння – 60%. Оптимальна густина стояння 55-60 тис/га; внесення добрив під оранку № 30-35; Р 40-50; К 30-40, при сівбі № 10-15.

Рекомендований для зони Степу.

Український 1. Трилінійний гібрид на стерильній основі (мати – міжлінійний стерильний гібрид Зоря; батько – лінія А-12). Заявник – науково-виробнича фірма “Гран”.

Гіпокотиль з слабким антоціановим забарвленням. Рослини заввишки 130 см., стебло прямостояче, середньоопушене. Листки середнього розміру, світлозелені, трикутної форми, без антоціану. Листкова пластинка слабгорбувата з блиском. Форма поперечного

розрізу плеската, крило відсутнє, кут розходження бічних жилок прямий. Кошик малий, опуклий. Листки обгортки округлої форми, без антоціану. Язичкові квітки вижовженої форми яскраво-жовтого кольору; трубчасті квітки червоні з антоціановим забарвленням. Сім'янки видовженої форми, чорні без смужок. Маса 1000 насінин 60-65г.

Вегетаційний період 120 днів. Середня урожайність за роки випробування по зоні Степу становила 26,8 ц/га, по зоні Лісостепу 24,3 ц/га, потенційна – 40,7 ц/га. Вміст жиру – 50,8%, лушпинність – 22%, вміст білку – 18,2%.

Гібрид стійкий до вилягання та осипання. Ураження хворобами назначне (вовчком – 5,3%, пероноспорозом – 2%, іржею – 8,2%, білою гниллю – 10%). Оптимальна густота стояння 45-50 тис/га.

Рекомендований для зон Степу та Лісостепу.

Ной (Харківський 96). Простий міжлінійний гібрид на стерильній основі (мати – АХ-1002; батько-ВХ 720). Заявник – ІР УААН.

Рослини заввишки до 160 см., стебло прямостояче, нерозгалужене, середньоопушене, добре облиствене. Листки темно-зелені, середнього розміру, серцеподібні. Листова пластинка без блиску, слабогорбувата. Кошик середнього розміру, опуклий. Сім'янки темно-сірі з смужками. Маса 1000 насінин – 62г.

Вегетаційний період – 118 днів. Середня урожайність за роки випробування по зоні Степу становила 24,7 ц/га, потенційна – 46,1 ц/га. Вміст жиру – 51,9%, білку – 19%, лушпинність – 22%.

Гібрид стійкий до вилягання, осипання, середньостійкий до посухи. Ураження хворобами (вовчком – 1,5%, гнилями – 13,7%, іржею – 17%).

Рекомендований для зони Степу.

Прометей. Сорт створений на основі міжсорткової гібридизації. Заявник - ІОК УААН.

Гіпокотиль з слабким антоціановим забарвленням. Рослини заввишки до 170 см, стебло прямостояче, нерозгалужене, середньоопушене. Листки середнього розміру, серцеподібні, зелені. Листкова пластинка без блиску, слабогорбувата. Форма поперечного розміру плеската, крило відсутнє, кут розходження бічних жилок прямий. Кошик середнього розміру, опуклий. Язичкові квітки видовженої форми, жовті; трубчасті – жовті з слабким антоціановим забарвленням. сім'янки середнього розміру, яйцеподібно-видовжені, сірі з смужками по краям. Маса 1000 насінин – 65г.

Вегетаційний період 112 днів. Середня урожайність за період випробування становила 21,9 ц/га, потенційна – 38 ц/га. Вміст жиру 52,1%, білку – 18%, лушпинність – 22%.

Сорт відносно стійкий до вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами (вовчком – 1,5%, гнилями – 19,3%, іржею – 14,5%).

Рекомендований для зони Степу.

розрізу плеската, крило відсутнє, кут розходження бічних жилок прямий. Кошик малий, опуклий. Листки обгортки округлої форми, без антоціану. Язичкові квітки вижовженої форми яскраво-жовтого кольору; трубчасті квітки червоні з антоціановим забарвленням. Сім'янки видовженої форми, чорні без смужок. Маса 1000 насінин 60-65г.

Вегетаційний період 120 днів. Середня урожайність за роки випробування по зоні Степу становила 26,8 ц/га, по зоні Лісостепу 24,3 ц/га, потенційна – 40,7 ц/га. Вміст жиру – 50,8%, лушпинність – 22%, вміст білку – 18,2%.

Гібрид стійкий до вилягання та осипання. Ураження хворобами назначне (вовчком – 5,3%, пероноспорозом – 2%, іржею – 8,2%, білою гниллю – 10%). Оптимальна густина стояння 45-50 тис/га.

Рекомендований для зон Степу та Лісостепу.

Ной (Харківський 96). Простий міжлінійний гібрид на стерильній основі (мати – АХ-1002; батько-ВХ 720). Заявник – ІР УААН.

Рослини заввишки до 160 см., стебло прямостояче, нерозгалужене, середньоопушене, добре облиствене. Листки темно-зелені, середнього розміру, серцеподібні. Листова пластинка без блиску, слабогорбувата. Кошик середнього розміру, опуклий. Сім'янки темно-сірі з смужками. Маса 1000 насінин – 62г.

Вегетаційний період – 118 днів. Середня урожайність за роки випробування по зоні Степу становила 24,7 ц/га, потенційна – 46,1 ц/га. Вміст жиру – 51,9%, білку – 19%, лушпинність – 22%.

Гібрид стійкий до вилягання, осипання, середньостійкий до посухи. Ураження хворобами (вовчком – 1,5%, гнилями – 13,7%, іржею – 17%).

Рекомендований для зони Степу.

Прометей. Сорт створений на основі міжсорткової гібридизації. Заявник - ІОК УААН.

Гіпокотиль з слабким антоціановим забарвленням. Рослини заввишки до 170 см, стебло прямостояче, нерозгалужене, середньоопушене. Листки середнього розміру, серцеподібні, зелені. Листкова пластинка без блиску, слабогорбувата. Форма поперечного розміру плеската, крило відсутнє, кут розходження бічних жилок прямий. Кошик середнього розміру, опуклий. Язичкові квітки видовженої форми, жовті; трубчасті – жовті з слабким антоціановим забарвленням. сім'янки середнього розміру, яйцеподібно-видовжені, сірі з смужками по краям. Маса 1000 насінин – 65г.

Вегетаційний період 112 днів. Середня урожайність за період випробування становила 21,9 ц/га, потенційна – 38 ц/га. Вміст жиру 52,1%, білку – 18%, лушпинність – 22%.

Сорт відносно стійкий до вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами (вовчком – 1,5%, гнилями – 19,3%, іржею – 14,5%).

Рекомендований для зони Степу.

Еней. Простий міжлінійний гібрид на стерильній основі. Материнська форма Сх1006А, батьківська – Х-526В.

Заявник – ІР УААН.

Антоціанове забарвлення гіпокотилу середнє. Рослини заввишки до 150 см. Стебло прямостояче, слабоопушене, добре облиствене. Листки середнього розміру, серцеподібні, темно-зелені без антоціанового забарвлення. Листова пластинка без блиску, середньогорбкувата. Форма поперечного розрізу опукла, крила відсутні, кут розходження бічних гілок прямий. Кошик середнього розміру, опуклий. Кількість тильних листочків обгортки мала, листочки округлої форми. Язичкові квітки видовжені, жовті, трубчасті, жовті без антоціану. Сім'янки видовженої форми, чорні з сірими смужками, без опушення. Маса 1000 насінин 61 г.

Вегетаційний період 106 днів. Урожайність – 37 ц/га. Вміст жиру – 55%, олеїнової кислоти – 89,9%, білку – 21%. Лушпинність – 20%. Гібрид стійкий до ураження вовчком та пероноспорозом, відносно стійкий до гнилей.

Рекомендований для зон Степу та Лісостепу.

Сівер. Трьохлінійний гібрид на стерильній основі. Материнська форма – простий міжлінійний гібрид Сх1002А х Х1006В, батьківська Х-720В.

Заявник - ІР УААН.

Гіпокотиль з антоціановим забарвленням. Рослини заввишки до 160 см. Стебло прямостояче з слабким опушенням, середньооблиствене. Листки середнього розміру, серцеподібні, зелені, без антоціану. Листова пластинка без блиску, середньогорбкувата. Форма поперечного розрізу увігнута з крилами; кут розходження бічних жилок тупий. Кошик середнього розміру, плескатий. Листочки обгортки без антоціанового забарвлення, округлої форми. Язичкові квітки овальної форми, жовті, трубчасті – жовті з слабким антоціановим забарвленням. Сім'янки видовжено-яйцевидної форми, чорні з сірими смужками. Маса 1000 сім'янок – 60г.

Гібрид генетично стійкий до вовчка, пероноспорозу. Гнилями уражується середньо.

Вегетаційний період – 105 днів. Урожайність 33,9 ц/га. Вміст жиру – 51,7%, білку – 24,1%. Лушпинність – 24,1%.

Рекомендований для зони Степу.

Ранок (Харківський кондитерський). Сорт кондитерського напрямку. Заявник – Акціонерна компанія “Контакт”.

Рослини заввишки до 140 см. Стебло прямостояче, середньоопушене. Кількість листків на стеблі середня. Листки середнього розміру, ланцетоподібні, зелені. Антоціанове забарвлення – відсутнє. Листова пластинка без блиску, слабогорбкувата. Форма поперечного розрізу плеската, крила відсутні, кут розходження бічних жилок прямий. Кошик середнього розміру, плескатий. Листочки обгортки видовжені. Язичкові квітки овальної форми, жовті; трубчасті – жовті без антоціану. Сім'янки видовженої форми, сірого кольору з сірими смужками. Маса 1000 насінин до 90г.

Вегетаційний період 100 - 107 днів. Середня урожайність за роки випробування в зоні Лісостепу становила 19,7 ц/га. Максимальна – 37 ц/га. Вміст жиру 47,9%, білку –18,6%, лушпинність – 24,6%.

Еней. Простий міжлінійний гібрид на стерильній основі. Материнська форма Сх1006А, батьківська – Х-526В.

Заявник – ІР УААН.

Антоціанове забарвлення гіпокотилу середнє. Рослини заввишки до 150 см. Стебло прямостояче, слабоопушене, добре облиствене. Листки середнього розміру, серцеподібні, темно-зелені без антоціанового забарвлення. Листова пластинка без блиску, середньогорбкувата. Форма поперечного розрізу опукла, крила відсутні, кут розходження бічних гілок прямий. Кошик середнього розміру, опуклий. Кількість тильних листочків обгортки мала, листочки округлої форми. Язичкові квітки видовжені, жовті, трубчасті, жовті без антоціану. Сім'янки видовженої форми, чорні з сірими смужками, без опушення. Маса 1000 насінин 61 г.

Вегетаційний період 106 днів. Урожайність – 37 ц/га. Вміст жиру – 55%, олеїнової кислоти – 89,9%, білку – 21%. Лушпинність – 20%. Гібрид стійкий до ураження вовчком та пероноспорозом, відносно стійкий до гнилей.

Рекомендований для зон Степу та Лісостепу.

Сівер. Трьохлінійний гібрид на стерильній основі. Материнська форма – простий міжлінійний гібрид Сх1002А х Х1006В, батьківська Х-720В.

Заявник - ІР УААН.

Гіпокотиль з антоціановим забарвленням. Рослини заввишки до 160 см. Стебло прямостояче з слабким опушенням, середньооблиствене. Листки середнього розміру, серцеподібні, зелені, без антоціану. Листова пластинка без блиску, середньогорбкувата. Форма поперечного розрізу увігнута з крилами; кут розходження бічних жилок тупий. Кошик середнього розміру, плескатий. Листочки обгортки без антоціанового забарвлення, округлої форми. Язичкові квітки овальної форми, жовті, трубчасті – жовті з слабким антоціановим забарвленням. Сім'янки видовжено-яйцевидної форми, чорні з сірими смужками. Маса 1000 сім'янок – 60г.

Гібрид генетично стійкий до вовчка, пероноспорозу. Гнилями уражується середньо.

Вегетаційний період – 105 днів. Урожайність 33,9 ц/га. Вміст жиру – 51,7%, білку – 24,1%. Лушпинність – 24,1%.

Рекомендований для зони Степу.

Ранок (Харківський кондитерський). Сорт кондитерського напрямку. Заявник – Акціонерна компанія “Контакт”.

Рослини заввишки до 140 см. Стебло прямостояче, середньоопушене. Кількість листків на стеблі середня. Листки середнього розміру, ланцетоподібні, зелені. Антоціанове забарвлення – відсутнє. Листова пластинка без блиску, слабогорбкувата. Форма поперечного розрізу плеската, крила відсутні, кут розходження бічних жилок прямий. Кошик середнього розміру, плескатий. Листочки обгортки видовжені. Язичкові квітки овальної форми, жовті; трубчасті – жовті без антоціану. Сім'янки видовженої форми, сірого кольору з сірими смужками. Маса 1000 насінин до 90г.

Вегетаційний період 100 - 107 днів. Середня урожайність за роки випробування в зоні Лісостепу становила 19,7 ц/га. Максимальна – 37 ц/га. Вміст жиру 47,9%, білку –18,6%, лушпинність – 24,6%.

Сорт відносно стійкий проти вовчку, соняшникової молі, середньостійкий проти фомопсису, гнилей.
Рекомендований для зони Лісостепу як кондитерський.

Сяйво. Потрійний гібрид на стерильній основі. Заявник – СГІ УААН.

Рослини заввишки до 140 см. Стебло прямостояче, слабоопушене. Кількість листочків на стеблі середня. Листки середнього розміру, серцеподібні, зелені без антоціанового забарвлення. Листова пластинка без блиску, гладенька. Форма поперечного розрізу плеската, крила наявні, кут розходження бічних жилок прямий.

Кошик великий, опуклий. Листочки обгортки округлі, без антоціану. Язичкові квітки овальні, жовті; трубчасті – жовті без антоціану. Сім'янки широко-яйцевидні, чорні, без смужок. Маса 1000 насінин 50 – 60г.

Вегетаційний період 100 - 110 днів. Середня урожайність за роки випробування в зоні Степу 22,1 ц/га. Максимальна 38,0 ц/га. Вміст жиру 55,5%, білку 18%, лушпинність 23%.

Гібрид відносно стійкий до вовчку і соняшникової молі; середньо стійкий до гнилей та пероноспорозу.

Рекомендований для зони Степу.

Захист. Простий міжлінійний гібрид на стерильній основі.

Заявник – агропромислова фірма “Флора”.

Рослини заввишки до 180 см. Стебло прямостояче, сильноопушене, добре облиствене. Листок великий, серцеподібний, темно-зелений, без антоціану. Листкова пластинка без блиску, сильногорбувата. Форма поперечного розрізу опукла, крила наявні, кут розходження бічних жилок прямий. Кошик середнього розміру, опуклий. Кількість тильних листочків обгортки середня, форма опукла, антоціанове забарвлення відсутнє. Язичкові квітки оранжевого забарвлення, овальні; трубчасті – червоні без антоціану. Сім'янки широко-яйцевидної форми, чорні без смужок, ледь опушені. Маса 1000 сім'янок – 58г.

Вегетаційний період 118 - 125 днів. Середня урожайність за роки випробування в зоні Степу становила 23,6 ц/га. Максимальна 37,9 ц/га. Вміст жиру 53,2%, білку 18%, лушпинність – 23-24%.

Гібрид стійкий до вовчку, соняшникової молі, толерантний до гнилей, фомопсису.

Рекомендований для зони Степу.

Айтана (PT 002). Простий міжлінійний гібрид на стерильній основі. Заявник – фірма Рустіка Прогрен Женетік (Франція).

Рослини заввишки до 170 см, стебло прямостояче, слабоопушене. Листки великі, округлі, зелені без антоціанового забарвлення. Листова пластинка без блиску, середньогорбувата. Крила відсутні, форма поперечного розрізу плеската, кут розходження бічних жилок прямий. Кошик середнього розміру, опуклий. Листки обгортки видовженої форми, без антоціану. Язичкові квітки овальної форми, жовті; трубчасті – жовті, без антоціану. Сім'янки середнього розміру, широко-яйцевидної форми, сірі з смужками. Маса 1000 насінин 58г.

Сорт відносно стійкий проти вовчку, соняшникової молі, середньостійкий проти фомопсису, гнилей.
Рекомендований для зони Лісостепу як кондитерський.

Сяйво. Потрійний гібрид на стерильній основі. Заявник – СГІ УААН.

Рослини заввишки до 140 см. Стебло прямостояче, слабоопушене. Кількість листочків на стеблі середня. Листки середнього розміру, серцеподібні, зелені без антоціанового забарвлення. Листова пластинка без блиску, гладенька. Форма поперечного розрізу плеската, крила наявні, кут розходження бічних жилок прямий.

Кошик великий, опуклий. Листочки обгортки округлі, без антоціану. Язичкові квітки овальні, жовті; трубчасті – жовті без антоціану. Сім'янки широко-яйцевидні, чорні, без смужок. Маса 1000 насінин 50 – 60г.

Вегетаційний період 100 - 110 днів. Середня урожайність за роки випробування в зоні Степу 22,1 ц/га. Максимальна 38,0 ц/га. Вміст жиру 55,5%, білку 18%, лушпинність 23%.

Гібрид відносно стійкий до вовчку і соняшникової молі; середньо стійкий до гнилей та пероноспорозу.

Рекомендований для зони Степу.

Захист. Простий міжлінійний гібрид на стерильній основі.

Заявник – агропромислова фірма “Флора”.

Рослини заввишки до 180 см. Стебло прямостояче, сильноопушене, добре облиствене. Листок великий, серцеподібний, темно-зелений, без антоціану. Листкова пластинка без блиску, сильногорбувата. Форма поперечного розрізу опукла, крила наявні, кут розходження бічних жилок прямий. Кошик середнього розміру, опуклий. Кількість тильних листочків обгортки середня, форма опукла, антоціанове забарвлення відсутнє. Язичкові квітки оранжевого забарвлення, овальні; трубчасті – червоні без антоціану. Сім'янки широко-яйцевидної форми, чорні без смужок, ледь опушені. Маса 1000 сім'янок – 58г.

Вегетаційний період 118 - 125 днів. Середня урожайність за роки випробування в зоні Степу становила 23,6 ц/га. Максимальна 37,9 ц/га. Вміст жиру 53,2%, білку 18%, лушпинність – 23-24%.

Гібрид стійкий до вовчку, соняшникової молі, толерантний до гнилей, фомопсису.

Рекомендований для зони Степу.

Айтана (PT 002). Простий міжлінійний гібрид на стерильній основі. Заявник – фірма Рустіка Прогрен Женетік (Франція).

Рослини заввишки до 170 см, стебло прямостояче, слабоопушене. Листки великі, округлі, зелені без антоціанового забарвлення. Листова пластинка без блиску, середньогорбувата. Крила відсутні, форма поперечного розрізу плеската, кут розходження бічних жилок прямий. Кошик середнього розміру, опуклий. Листки обгортки видовженої форми, без антоціану. Язичкові квітки овальної форми, жовті; трубчасті – жовті, без антоціану. Сім'янки середнього розміру, широко-яйцевидної форми, сірі з смужками. Маса 1000 насінин 58г.

Сорт відносно стійкий проти вовчку, соняшникової молі, середньостійкий проти фомопсису, гнилей.
Рекомендований для зони Лісостепу як кондитерський.

Сяйво. Потрійний гібрид на стерильній основі. Заявник – СГІ УААН.

Рослини заввишки до 140 см. Стебло прямостояче, слабоопушене. Кількість листочків на стеблі середня. Листки середнього розміру, серцеподібні, зелені без антоціанового забарвлення. Листова пластинка без блиску, гладенька. Форма поперечного розрізу плеската, крила наявні, кут розходження бічних жилок прямий.

Кошик великий, опуклий. Листочки обгортки округлі, без антоціану. Язичкові квітки овальні, жовті; трубчасті – жовті без антоціану. Сім'янки широко-яйцевидні, чорні, без смужок. Маса 1000 насінин 50 – 60г.

Вегетаційний період 100 - 110 днів. Середня урожайність за роки випробування в зоні Степу 22,1 ц/га. Максимальна 38,0 ц/га. Вміст жиру 55,5%, білку 18%, лушпинність 23%.

Гібрид відносно стійкий до вовчку і соняшникової молі; середньо стійкий до гнилей та пероноспорозу.

Рекомендований для зони Степу.

Захист. Простий міжлінійний гібрид на стерильній основі.

Заявник – агропромислова фірма “Флора”.

Рослини заввишки до 180 см. Стебло прямостояче, сильноопушене, добре облиствене. Листок великий, серцеподібний, темно-зелений, без антоціану. Листкова пластинка без блиску, сильногорбувата. Форма поперечного розрізу опукла, крила наявні, кут розходження бічних жилок прямий. Кошик середнього розміру, опуклий. Кількість тильних листочків обгортки середня, форма опукла, антоціанове забарвлення відсутнє. Язичкові квітки оранжевого забарвлення, овальні; трубчасті – червоні без антоціану. Сім'янки широко-яйцевидної форми, чорні без смужок, ледь опушені. Маса 1000 сім'янок – 58г.

Вегетаційний період 118 - 125 днів. Середня урожайність за роки випробування в зоні Степу становила 23,6 ц/га. Максимальна 37,9 ц/га. Вміст жиру 53,2%, білку 18%, лушпинність – 23-24%.

Гібрид стійкий до вовчку, соняшникової молі, толерантний до гнилей, фомопсису.

Рекомендований для зони Степу.

Айтана (PT 002). Простий міжлінійний гібрид на стерильній основі. Заявник – фірма Рустіка Прогрен Женетік (Франція).

Рослини заввишки до 170 см, стебло прямостояче, слабоопушене. Листки великі, округлі, зелені без антоціанового забарвлення. Листова пластинка без блиску, середньогорбувата. Крила відсутні, форма поперечного розрізу плеската, кут розходження бічних жилок прямий. Кошик середнього розміру, опуклий. Листки обгортки видовженої форми, без антоціану. Язичкові квітки овальної форми, жовті; трубчасті – жовті, без антоціану. Сім'янки середнього розміру, широко-яйцевидної форми, сірі з смужками. Маса 1000 насінин 58г.

Вегетаційний період 118 - 125 днів. Середня урожайність за роки випробування в зоні Степу становила 28,3 ц/га, в зоні Лісостепу 26,6 ц/га. Максимальна 42,4 ц/га. Вміст жиру 49,9 - 50,9%, білку 17,9%

Гібрид стійкий до вилягання, осипання, середньо стійкий до ураження хворобами.

Рекомендовано для зон Степу і Лісостепу на богарних та зрошуваних землях.

Магnum (BP 5524). Простий міжлінійний гібрид на стерильній основі. Заявник фірма Лімагрейн (Франція).

Рослини заввишки до 180 см. Стебло прямостояче, нерозгалужене середньоопушене та облиствене. Листки середнього розміру, серцеподібні, зелені. Молоді листочки без антоціанового забарвлення. Листова пластинка без блиску, гладенька; зубчастість слабка регулярна. Форма поперечного розрізу плеската, крила відсутні, кут розходження бічних жилок гострий. Кошик середнього розміру, опуклий, повернений донизу. Листочки обгортки округлої форми, без антоціанового забарвлення. Язичкові квітки овальної форми, жовті; трубчасті жовті з антоціаном. Сім'янки середнього розміру, широко – яйцевидної форми, чорні з сірими смужками. Маса 1000 насінин 55 г.

Вегетаційний період 120 – 125 днів. Середня урожайність за роки випробування в зоні Степу становила 29,7 ц/га, в зоні Лісостепу 26,9 ц/га. Максимальна урожайність 41,2 ц/га. Вміст жиру 53,9 – 55,8 %, білку 16,1 – 17,7%.

Гібрид стійкий до вилягання, осипання; середньо стійкий до ураження хворобами.

Рекомендований для зони Степу.

Арена ПР. Простий міжлінійний гібрид на стерильній основі. Заявник фірма Сінгента.

Гіпокотиль без антоціанового забарвлення. Стебло прямостояче заввишки до 180 см., середньоопушене та облиствене. Антоціанове забарвлення молодих листочків відсутнє. Листок великий, серцеподібний, зелений. Листова пластинка слабогорбкувата без блиску, зубчастість середня, регулярна. Форма поперечного розрізу увігнута, крила відсутні, кут розходження бічних жилок прямий. Кошик опуклий, середнього розміру напівпохилий до низу. Листочки обгортки видовженої форми без антоціану. Язичкові квітки видовженої форми жовті; трубчасті жовті без антоціану. Сім'янки широко – яйцевидної форми, чорні з сірими смужками. Маса 1000 насінин 50 г.

Вегетаційний період в зоні Степу становив 125 днів, в зоні Лісостепу 130 днів. Середня урожайність за роки випробування становила 27,6 – 31,1 ц/га. Максимальна урожайність 45,2 ц/га. Вміст жиру 51%, білку 17,4 – 18,6%.

Гібрид стійкий проти вилягання, посухи; хворобами уражувався в середній мірі.

Рекомендований для зон Степу та Лісостепу.

Запорізький 32. Потрійний міжлінійний гібрид на стерильній основі. Заявник Інститут олійних культур УААН.

Рослини заввишки до 140 см. Стебло прямостояче, нерозгалужене з дуже слабким опушенням. Листки зелені без антоціану, серцеподібні. Листова пластинка слабогорбкувата без блиску, крила відсутні. Кут розходження бічних жилок гострий, форма поперечного розрізу плеската. Кошик середнього розміру, плесканий. Кількість тільних листочків обгортки середня, листочки видовженої форми без

Вегетаційний період 118 - 125 днів. Середня урожайність за роки випробування в зоні Степу становила 28,3 ц/га, в зоні Лісостепу 26,6 ц/га. Максимальна 42,4 ц/га. Вміст жиру 49,9 - 50,9%, білку 17,9%

Гібрид стійкий до вилягання, осипання, середньо стійкий до ураження хворобами.

Рекомендовано для зон Степу і Лісостепу на богарних та зрошуваних землях.

Магnum (BP 5524). Простий міжлінійний гібрид на стерильній основі. Заявник фірма Лімагрейн (Франція).

Рослини заввишки до 180 см. Стебло прямостояче, нерозгалужене середньоопушене та облиствене. Листки середнього розміру, серцеподібні, зелені. Молоді листочки без антоціанового забарвлення. Листова пластинка без блиску, гладенька; зубчастість слабка регулярна. Форма поперечного розрізу плеската, крила відсутні, кут розходження бічних жилок гострий. Кошик середнього розміру, опуклий, повернений донизу. Листочки обгортки округлої форми, без антоціанового забарвлення. Язичкові квітки овальної форми, жовті; трубчасті жовті з антоціаном. Сім'янки середнього розміру, широко – яйцевидної форми, чорні з сірими смужками. Маса 1000 насінин 55 г.

Вегетаційний період 120 – 125 днів. Середня урожайність за роки випробування в зоні Степу становила 29,7 ц/га, в зоні Лісостепу 26,9 ц/га. Максимальна урожайність 41,2 ц/га. Вміст жиру 53,9 – 55,8 %, білку 16,1 – 17,7%.

Гібрид стійкий до вилягання, осипання; середньо стійкий до ураження хворобами.

Рекомендований для зони Степу.

Арена ПР. Простий міжлінійний гібрид на стерильній основі. Заявник фірма Сінгента.

Гіпокотиль без антоціанового забарвлення. Стебло прямостояче заввишки до 180 см., середньоопушене та облиствене. Антоціанове забарвлення молодих листочків відсутнє. Листок великий, серцеподібний, зелений. Листова пластинка слабогорбкувата без блиску, зубчастість середня, регулярна. Форма поперечного розрізу увігнута, крила відсутні, кут розходження бічних жилок прямий. Кошик опуклий, середнього розміру напівпохилий до низу. Листочки обгортки видовженої форми без антоціану. Язичкові квітки видовженої форми жовті; трубчасті жовті без антоціану. Сім'янки широко – яйцевидної форми, чорні з сірими смужками. Маса 1000 насінин 50 г.

Вегетаційний період в зоні Степу становив 125 днів, в зоні Лісостепу 130 днів. Середня урожайність за роки випробування становила 27,6 – 31,1 ц/га. Максимальна урожайність 45,2 ц/га. Вміст жиру 51%, білку 17,4 – 18,6%.

Гібрид стійкий проти вилягання, посухи; хворобами уражувався в середній мірі.

Рекомендований для зон Степу та Лісостепу.

Запорізький 32. Потрійний міжлінійний гібрид на стерильній основі. Заявник Інститут олійних культур УААН.

Рослини заввишки до 140 см. Стебло прямостояче, нерозгалужене з дуже слабким опушенням. Листки зелені без антоціану, серцеподібні. Листова пластинка слабогорбкувата без блиску, крила відсутні. Кут розходження бічних жилок гострий, форма поперечного розрізу плеската. Кошик середнього розміру, плесканий. Кількість тильних листочків обгортки середня, листочки видовженої форми без

Вегетаційний період 118 - 125 днів. Середня урожайність за роки випробування в зоні Степу становила 28,3 ц/га, в зоні Лісостепу 26,6 ц/га. Максимальна 42,4 ц/га. Вміст жиру 49,9 - 50,9%, білку 17,9%

Гібрид стійкий до вилягання, осипання, середньо стійкий до ураження хворобами.

Рекомендовано для зон Степу і Лісостепу на богарних та зрошуваних землях.

Магnum (BP 5524). Простий міжлінійний гібрид на стерильній основі. Заявник фірма Лімагрейн (Франція).

Рослини заввишки до 180 см. Стебло прямостояче, нерозгалужене середньоопушене та облиствене. Листки середнього розміру, серцеподібні, зелені. Молоді листочки без антоціанового забарвлення. Листова пластинка без блиску, гладенька; зубчастість слабка регулярна. Форма поперечного розрізу плеската, крила відсутні, кут розходження бічних жилок гострий. Кошик середнього розміру, опуклий, повернений донизу. Листочки обгортки округлої форми, без антоціанового забарвлення. Язичкові квітки овальної форми, жовті; трубчасті жовті з антоціаном. Сім'янки середнього розміру, широко – яйцевидної форми, чорні з сірими смужками. Маса 1000 насінин 55 г.

Вегетаційний період 120 – 125 днів. Середня урожайність за роки випробування в зоні Степу становила 29,7 ц/га, в зоні Лісостепу 26,9 ц/га. Максимальна урожайність 41,2 ц/га. Вміст жиру 53,9 – 55,8 %, білку 16,1 – 17,7%.

Гібрид стійкий до вилягання, осипання; середньо стійкий до ураження хворобами.

Рекомендований для зони Степу.

Арена ПР. Простий міжлінійний гібрид на стерильній основі. Заявник фірма Сінгента.

Гіпокотиль без антоціанового забарвлення. Стебло прямостояче заввишки до 180 см., середньоопушене та облиствене. Антоціанове забарвлення молодих листочків відсутнє. Листок великий, серцеподібний, зелений. Листова пластинка слабогорбкувата без блиску, зубчастість середня, регулярна. Форма поперечного розрізу увігнута, крила відсутні, кут розходження бічних жилок прямий. Кошик опуклий, середнього розміру напівпохилий до низу. Листочки обгортки видовженої форми без антоціану. Язичкові квітки видовженої форми жовті; трубчасті жовті без антоціану. Сім'янки широко – яйцевидної форми, чорні з сірими смужками. Маса 1000 насінин 50 г.

Вегетаційний період в зоні Степу становив 125 днів, в зоні Лісостепу 130 днів. Середня урожайність за роки випробування становила 27,6 – 31,1 ц/га. Максимальна урожайність 45,2 ц/га. Вміст жиру 51%, білку 17,4 – 18,6%.

Гібрид стійкий проти вилягання, посухи; хворобами уражувався в середній мірі.

Рекомендований для зон Степу та Лісостепу.

Запорізький 32. Потрійний міжлінійний гібрид на стерильній основі. Заявник Інститут олійних культур УААН.

Рослини заввишки до 140 см. Стебло прямостояче, нерозгалужене з дуже слабким опушенням. Листки зелені без антоціану, серцеподібні. Листова пластинка слабогорбкувата без блиску, крила відсутні. Кут розходження бічних жилок гострий, форма поперечного розрізу плеската. Кошик середнього розміру, плесканий. Кількість тильних листочків обгортки середня, листочки видовженої форми без

антоціану. Язичкові квітки овальної форми, жовті; трубчасті квітки жовті без антоціану. Сімянки середнього розміру, видовжено-яйцевидної форми, чорні з сірими смужками. Маса 1000 насінин 50 г.

Вегетаційний період 110 – 120 днів. Середня урожайність за роки випробування становила в зоні Степу 24,9 ц/га, в зоні Лісостепу 22,8 ц/га. Максимальна урожайність 38,0 ц/га. Гібрид стійкий до вовчку і пероноспорозу.

Рекомендований для зон Степу та Лісостепу.

Байда. Простий міжлінійний гібрид на стерильній основі. Заявник Селекційно – насінницька фірма „Незалежна аграрна індустрія” та Інститут олійних культур УААН.

Рослини заввишки до 150 см. Стебло прямостояче, слабо опушене. Листки серцеподібні, зелені без антоціанового забарвлення і блиску. Листова пластинка слабогорбувата. Кошик тонкий, плесканий, середнього розміру. Язичкові квітки овальної форми, жовті; трубчасті жовті без антоціану. Сімянки середнього розміру видовжено – яйцевидні, чорні без смужок. Маса 1000 насінин 55,0 г.

Вегетаційний період 100 – 110 днів. Середня урожайність за роки випробування в зоні Степу 20,5 ц/га, в зоні Лісостепу 17,9 ц/га. Максимальна урожайність 35 ц/га. Вміст жиру 47,8 – 49,0%, вміст білку 17,1 – 18,0%.

Гібрид стійкий проти вилягання, осипання, посухи; відносно стійкий до вовчка та пероноспорозу.

Рекомендований для зон Степу та Лісостепу.

Знахідка. Простий гібрид на стерильній основі. Заявник – агропромислова фірма “Флора”.

Рослина заввишка до 190 см. Стебло прямостояче, добре облиствене. Листки середнього розміру, серцеподібні, зелені, без антоціану. Листова пластинка без блиску, середньогорбувата. Форма поперечного розрізу опукла, крила наявні, кут розходження бічних жилок прямий. Кошик середнього розміру, опуклий. Листочків обгортки багато, форма округла без антоціану. Язичкові квітки овальної форми, оранжеві; трубчасті – жовті без антоціану. Сімянки широко-яйцевидної форми, середнього розміру, чорні без смужок. Маса 1000 насінин – 65 г.

Вегетаційний період – 115 днів. Урожайність 27-29 ц/га. Вміст жиру 50-52%, білку – 14-15%, лущинність 22-24%.

Гібрид стійкий до вовчку, соняшникової молі, толерантний до гнилей.

Рекомендований для зони Степу.

Злива. Потрійний гібрид на стерильній основі. Заявник – СГІ УААН.

Рослини заввишки до 170 см. Стебло прямостояче, середньоопушене. Кількість листків на стеблі середня. Листки великі, серцеподібні, темно-зелені. Листова пластинка без блиску, слабогорбувата. Форма поперечного розрізу опукла, крила наявні, кут розходження бічних жилок прямий. Кошик великий, опуклий. Листочки обгортки округлої форми, без антоціанового забарвлення. Язичкові квітки оранжевого забарвлення, овальної форми, трубчасті жовті з слабким антоціановим забарвленням. Сімянки видовжено-яйцевидної форми, чорні без смужок. Маса 1000 насінин – 60 г.

антоціану. Язичкові квітки овальної форми, жовті; трубчасті квітки жовті без антоціану. Сімянки середнього розміру, видовжено-яйцевидної форми, чорні з сірими смужками. Маса 1000 насінин 50 г.

Вегетаційний період 110 – 120 днів. Середня урожайність за роки випробування становила в зоні Степу 24,9 ц/га, в зоні Лісостепу 22,8 ц/га. Максимальна урожайність 38,0 ц/га. Гібрид стійкий до вовчку і пероноспорозу.

Рекомендований для зон Степу та Лісостепу.

Байда. Простий міжлінійний гібрид на стерильній основі. Заявник Селекційно – насінницька фірма „Незалежна аграрна індустрія” та Інститут олійних культур УААН.

Рослини заввишки до 150 см. Стебло прямостояче, слабо опушене. Листки серцеподібні, зелені без антоціанового забарвлення і блиску. Листова пластинка слабогорбувата. Кошик тонкий, плесканий, середнього розміру. Язичкові квітки овальної форми, жовті; трубчасті жовті без антоціану. Сімянки середнього розміру видовжено – яйцевидні, чорні без смужок. Маса 1000 насінин 55,0 г.

Вегетаційний період 100 – 110 днів. Середня урожайність за роки випробування в зоні Степу 20,5 ц/га, в зоні Лісостепу 17,9 ц/га. Максимальна урожайність 35 ц/га. Вміст жиру 47,8 – 49,0%, вміст білку 17,1 – 18,0%.

Гібрид стійкий проти вилягання, осипання, посухи; відносно стійкий до вовчка та пероноспорозу.

Рекомендований для зон Степу та Лісостепу.

Знахідка. Простий гібрид на стерильній основі. Заявник – агропромислова фірма “Флора”.

Рослина заввишка до 190 см. Стебло прямостояче, добре облиствене. Листки середнього розміру, серцеподібні, зелені, без антоціану. Листова пластинка без блиску, середньогорбувата. Форма поперечного розрізу опукла, крила наявні, кут розходження бічних жилок прямий. Кошик середнього розміру, опуклий. Листочків обгортки багато, форма округла без антоціану. Язичкові квітки овальної форми, оранжеві; трубчасті – жовті без антоціану. Сімянки широко-яйцевидної форми, середнього розміру, чорні без смужок. Маса 1000 насінин – 65 г.

Вегетаційний період – 115 днів. Урожайність 27-29 ц/га. Вміст жиру 50-52%, білку – 14-15%, лущинність 22-24%.

Гібрид стійкий до вовчку, соняшникової молі, толерантний до гнилей.

Рекомендований для зони Степу.

Злива. Потрійний гібрид на стерильній основі. Заявник – СГІ УААН.

Рослини заввишки до 170 см. Стебло прямостояче, середньоопушене. Кількість листків на стеблі середня. Листки великі, серцеподібні, темно-зелені. Листова пластинка без блиску, слабогорбувата. Форма поперечного розрізу опукла, крила наявні, кут розходження бічних жилок прямий. Кошик великий, опуклий. Листочки обгортки округлої форми, без антоціанового забарвлення. Язичкові квітки оранжевого забарвлення, овальної форми, трубчасті жовті з слабким антоціановим забарвленням. Сімянки видовжено-яйцевидної форми, чорні без смужок. Маса 1000 насінин – 60 г.

антоціану. Язичкові квітки овальної форми, жовті; трубчасті квітки жовті без антоціану. Сімянки середнього розміру, видовжено-яйцевидної форми, чорні з сірими смужками. Маса 1000 насінин 50 г.

Вегетаційний період 110 – 120 днів. Середня урожайність за роки випробування становила в зоні Степу 24,9 ц/га, в зоні Лісостепу 22,8 ц/га. Максимальна урожайність 38,0 ц/га. Гібрид стійкий до вовчку і пероноспорозу.

Рекомендований для зон Степу та Лісостепу.

Байда. Простий міжлінійний гібрид на стерильній основі. Заявник Селекційно – насінницька фірма „Незалежна аграрна індустрія” та Інститут олійних культур УААН.

Рослини заввишки до 150 см. Стебло прямостояче, слабо опушене. Листки серцеподібні, зелені без антоціанового забарвлення і блиску. Листова пластинка слабогорбувата. Кошик тонкий, плесканий, середнього розміру. Язичкові квітки овальної форми, жовті; трубчасті жовті без антоціану. Сімянки середнього розміру видовжено – яйцевидні, чорні без смужок. Маса 1000 насінин 55,0 г.

Вегетаційний період 100 – 110 днів. Середня урожайність за роки випробування в зоні Степу 20,5 ц/га, в зоні Лісостепу 17,9 ц/га. Максимальна урожайність 35 ц/га. Вміст жиру 47,8 – 49,0%, вміст білку 17,1 – 18,0%.

Гібрид стійкий проти вилягання, осипання, посухи; відносно стійкий до вовчка та пероноспорозу.

Рекомендований для зон Степу та Лісостепу.

Знахідка. Простий гібрид на стерильній основі. Заявник – агропромислова фірма “Флора”.

Рослина заввишка до 190 см. Стебло прямостояче, добре облистнене. Листки середнього розміру, серцеподібні, зелені, без антоціану. Листова пластинка без блиску, середньогорбувата. Форма поперечного розрізу опукла, крила наявні, кут розходження бічних жилок прямий. Кошик середнього розміру, опуклий. Листочків обгортки багато, форма округла без антоціану. Язичкові квітки овальної форми, оранжеві; трубчасті – жовті без антоціану. Сімянки широко-яйцевидної форми, середнього розміру, чорні без смужок. Маса 1000 насінин – 65 г.

Вегетаційний період – 115 днів. Урожайність 27-29 ц/га. Вміст жиру 50-52%, білку – 14-15%, лущинність 22-24%.

Гібрид стійкий до вовчку, соняшникової молі, толерантний до гнилей.

Рекомендований для зони Степу.

Злива. Потрійний гібрид на стерильній основі. Заявник – СГІ УААН.

Рослини заввишки до 170 см. Стебло прямостояче, середньоопушене. Кількість листків на стеблі середня. Листки великі, серцеподібні, темно-зелені. Листова пластинка без блиску, слабогорбувата. Форма поперечного розрізу опукла, крила наявні, кут розходження бічних жилок прямий. Кошик великий, опуклий. Листочки обгортки округлої форми, без антоціанового забарвлення. Язичкові квітки оранжевого забарвлення, овальної форми, трубчасті жовті з слабким антоціановим забарвленням. Сімянки видовжено-яйцевидної форми, чорні без смужок. Маса 1000 насінин – 60 г.

Вегетаційний період 105 днів. Урожайність 23-34 ц/га. Вміст жиру 48-50%, білку – 14-15%. Лушпинність – 21-23%. Гібрид стійкий до вовчка, соняшникової молі, середньостійкий до фомопсису, гнилей. Рекомендований для зони Степу.

Гетьман F1. Простий міжлінійний гібрид на стерильній основі. Заявник - фірма “Незалежна аграрна індустрія”; Всеросійський НДІ олійних культур.

Рослини заввишки 150 см. Стебло прямостояче, нерозгалужене, середньоопушене. Листки середнього розміру, серцеподібні, зелені, без антоціану. Кошик середнього розміру (17,4 см). Листки обгортки округлі, без антоціану. Язичкові квітки овальної форми, жовті; трубчасті жовті без антоціану. Сім'янки середнього розміру, видовжено-яйцеподібні, чорні; маса 1000 сім'янок – 55,5г.

Гібрид олійного напрямку. Вегетаційний період в зоні Степу 108, в зоні Лісостепу 114 днів. Середня урожайність за роки випробування 26,6 ц/га, що гарантовано перевищує національні стандарти на 13-16%. Потенційна урожайність 38 ц/га. Вміст жиру – 49%, білка – 18,5, лузжистість – 22,9%.

Технологічний, стійкий до вовчка і пероноспорозу.

Рекомендований для зон Степу та Лісостепу.

Чумак. Сорт. Заявник – фірма Незалежна аграрна індустрія; та Донська філія ВНДіОК.

Рослини заввишки 185 см. стебло прямостояче, нерозгалужене, опушення слабке. Листки середнього розміру, серцеподібні, зелені, без антоціану і блиску. Листова поверхня середньогорбкувата. Кошик середнього розміру, тонкий, плескатий. Язичкові квітки видовженої форми, жовті; трубчасті жовті з слабким антоціановим забарвленням. Листки обгортки без антоціанового забарвлення, округлі. Сім'янки середнього розміру, видовжено-яйцеподібної форми, чорні. Маса 1000 сім'янок 64,6г.

Вегетаційний період сорту в зоні Степу-112, в зоні Лісостепу - 118 днів.

Середня урожайність за роки випробування – 24,7-28,2 ц/га, що на 7,4-20,8% перевищує національні стандарти. Потенційна урожайність – 37,3 ц/га. Вміст жиру – 49,5-51,9%, білка – 18,3%, лузжистість 22%. Сорт олійного напрямку.

Рекомендований для зон Степу та Лісостепу.

Український скоростиглий. Трилінійний гібрид на стерильній основі. Заявник - Науково-виробнича фірма „Гран.”

Гіпокотиль з слабким антоціановим забарвленням. Рослини заввишки 130 см. Стебло прямостояче, середньоопушене. Листки середнього розміру, світлозелені, трикутної форми, без антоціану. Листова пластинка слабогорбкувата, з блиском, форма поперечного розрізу плеската, крило відсутнє, кут розходження бічних жилок прямий. Кошик середнього розміру (16,5 см), опуклий. Листки обгортки округлої форми без антоціану. Язичкові квітки видовженої форми яскраво-жовтого кольору; трубчасті квітки червоні з антоціановим забарвленням. Сім'янка видовженої форми, чорна без смужок. Маса 1000 сім'янок - 57г.

Вегетаційний період в зоні Степу 105, в зоні Лісостепу 112 днів. Середня урожайність за роки випробування 24,2-25,3 ц/га. Потенційна

Вегетаційний період 105 днів. Урожайність 23-34 ц/га. Вміст жиру 48-50%, білку – 14-15%. Лушпинність – 21-23%. Гібрид стійкий до вовчка, соняшникової молі, середньостійкий до фомопсису, гнилей. Рекомендований для зони Степу.

Гетьман F1. Простий міжлінійний гібрид на стерильній основі. Заявник - фірма “Незалежна аграрна індустрія”; Всеросійський НДІ олійних культур.

Рослини заввишки 150 см. Стебло прямостояче, нерозгалужене, середньоопушене. Листки середнього розміру, серцеподібні, зелені, без антоціану. Кошик середнього розміру (17,4 см). Листки обгортки округлі, без антоціану. Язичкові квітки овальної форми, жовті; трубчасті жовті без антоціану. Сім'янки середнього розміру, видовжено-яйцеподібні, чорні; маса 1000 сім'янок – 55,5г.

Гібрид олійного напрямку. Вегетаційний період в зоні Степу 108, в зоні Лісостепу 114 днів. Середня урожайність за роки випробування 26,6 ц/га, що гарантовано перевищує національні стандарти на 13-16%. Потенційна урожайність 38 ц/га. Вміст жиру – 49%, білка – 18,5, лузжистість – 22,9%.

Технологічний, стійкий до вовчка і пероноспорозу.

Рекомендований для зон Степу та Лісостепу.

Чумак. Сорт. Заявник – фірма Незалежна аграрна індустрія; та Донська філія ВНДіОК.

Рослини заввишки 185 см. стебло прямостояче, нерозгалужене, опушення слабке. Листки середнього розміру, серцеподібні, зелені, без антоціану і блиску. Листова поверхня середньогорбкувата. Кошик середнього розміру, тонкий, плескатий. Язичкові квітки видовженої форми, жовті; трубчасті жовті з слабким антоціановим забарвленням. Листки обгортки без антоціанового забарвлення, округлі. Сім'янки середнього розміру, видовжено-яйцеподібної форми, чорні. Маса 1000 сім'янок 64,6г.

Вегетаційний період сорту в зоні Степу-112, в зоні Лісостепу - 118 днів.

Середня урожайність за роки випробування – 24,7-28,2 ц/га, що на 7,4-20,8% перевищує національні стандарти. Потенційна урожайність – 37,3 ц/га. Вміст жиру – 49,5-51,9%, білка – 18,3%, лузжистість 22%. Сорт олійного напрямку.

Рекомендований для зон Степу та Лісостепу.

Український скоростиглий. Трилінійний гібрид на стерильній основі. Заявник - Науково-виробнича фірма „Гран.”

Гіпокотиль з слабким антоціановим забарвленням. Рослини заввишки 130 см. Стебло прямостояче, середньоопушене. Листки середнього розміру, світлозелені, трикутної форми, без антоціану. Листова пластинка слабогорбкувата, з блиском, форма поперечного розрізу плеската, крило відсутнє, кут розходження бічних жилок прямий. Кошик середнього розміру (16,5 см), опуклий. Листки обгортки округлої форми без антоціану. Язичкові квітки видовженої форми яскраво-жовтого кольору; трубчасті квітки червоні з антоціановим забарвленням. Сім'янка видовженої форми, чорна без смужок. Маса 1000 сім'янок - 57г.

Вегетаційний період в зоні Степу 105, в зоні Лісостепу 112 днів. Середня урожайність за роки випробування 24,2-25,3 ц/га. Потенційна

Вегетаційний період 105 днів. Урожайність 23-34 ц/га. Вміст жиру 48-50%, білку – 14-15%. Лушпинність – 21-23%. Гібрид стійкий до вовчка, соняшникової молі, середньостійкий до фомопсису, гнилей. Рекомендований для зони Степу.

Гетьман F1. Простий міжлінійний гібрид на стерильній основі. Заявник - фірма “Незалежна аграрна індустрія”; Всеросійський НДІ олійних культур.

Рослини заввишки 150 см. Стебло прямостояче, нерозгалужене, середньоопушене. Листки середнього розміру, серцеподібні, зелені, без антоціану. Кошик середнього розміру (17,4 см). Листки обгортки округлі, без антоціану. Язичкові квітки овальної форми, жовті; трубчасті жовті без антоціану. Сім'янки середнього розміру, видовжено-яйцеподібні, чорні; маса 1000 сім'янок – 55,5г.

Гібрид олійного напрямку. Вегетаційний період в зоні Степу 108, в зоні Лісостепу 114 днів. Середня урожайність за роки випробування 26,6 ц/га, що гарантовано перевищує національні стандарти на 13-16%. Потенційна урожайність 38 ц/га. Вміст жиру – 49%, білка – 18,5, лузжистість – 22,9%.

Технологічний, стійкий до вовчка і пероноспорозу.

Рекомендований для зон Степу та Лісостепу.

Чумак. Сорт. Заявник – фірма Незалежна аграрна індустрія; та Донська філія ВНДіОК.

Рослини заввишки 185 см. стебло прямостояче, нерозгалужене, опушення слабке. Листки середнього розміру, серцеподібні, зелені, без антоціану і блиску. Листова поверхня середньогорбкувата. Кошик середнього розміру, тонкий, плескатий. Язичкові квітки видовженої форми, жовті; трубчасті жовті з слабким антоціановим забарвленням. Листки обгортки без антоціанового забарвлення, округлі. Сім'янки середнього розміру, видовжено-яйцеподібної форми, чорні. Маса 1000 сім'янок 64,6г.

Вегетаційний період сорту в зоні Степу-112, в зоні Лісостепу - 118 днів.

Середня урожайність за роки випробування – 24,7-28,2 ц/га, що на 7,4-20,8% перевищує національні стандарти. Потенційна урожайність – 37,3 ц/га. Вміст жиру – 49,5-51,9%, білка – 18,3%, лузжистість 22%. Сорт олійного напрямку.

Рекомендований для зон Степу та Лісостепу.

Український скоростиглий. Трилінійний гібрид на стерильній основі. Заявник - Науково-виробнича фірма „Гран.”

Гіпокотиль з слабким антоціановим забарвленням. Рослини заввишки 130 см. Стебло прямостояче, середньоопушене. Листки середнього розміру, світлозелені, трикутної форми, без антоціану. Листова пластинка слабогорбкувата, з блиском, форма поперечного розрізу плеската, крило відсутнє, кут розходження бічних жилок прямий. Кошик середнього розміру (16,5 см), опуклий. Листки обгортки округлої форми без антоціану. Язичкові квітки видовженої форми яскраво-жовтого кольору; трубчасті квітки червоні з антоціановим забарвленням. Сім'янка видовженої форми, чорна без смужок. Маса 1000 сім'янок - 57г.

Вегетаційний період в зоні Степу 105, в зоні Лісостепу 112 днів. Середня урожайність за роки випробування 24,2-25,3 ц/га. Потенційна

– 33,5 ц/га. Вміст жиру – 50,5%, лузжистість 23%, вміст білка 18,1%. Гібрид стійкий до вовчка і пероноспорозу. Олійного напрямку.
Рекомендований для зон Степу та Лісостепу.

Лан 26. Міжлінійний гібрид на стерильній основі. Заявник - Селекційно-генетичний інститут УААН та ТОВ “Технаука”.

Антоціанове забарвлення гіпокотилі слабе. Рослини заввишки 117 см. Стебло прямостояче, середньої товщини, опушення на верхівці середнє. Листки середнього розміру, серцеподібні, зелені. Листкова пластинка без блиску, середньогорбувата, форма поперечного розрізу опукла, крила відсутні, кут розходження бічних жилок прямий. Кошик середнього розміру, плескатий, тонкий. Листки обгортки видовженої форми, без антоціану. Язичкові квітки овальної форми, жовті; трубчасті жовті без антоціану. Сім'янки середнього розміру, видовжено-овальної форми, чорного кольору без смужок. Маса 1000 сім'янок 57,8г.

Веgetаційний період в умовах Степу 119 днів. Середня урожайність за роки випробування 30,0 ц/га, що на 5% перевищує національні стандарти. Потенційна урожайність гібриду – 37,9 ц/га. Вміст жиру – 52,0%, лузжистість – 21,8%.

Гібрид олійного напрямку, відносно стійкий до вовчка, пероноспорозу.

Рекомендований для зони Степу.

Аліенор. Простий міжлінійний гібрид. Заявник – фірма Рустіка Прогрен Женетік (Франція).

Гіпокотиль з слабким антоціановим забарвленням. Рослини заввишки 153 см. Стебло прямостояче, середньо опушене в верхній частині. Листки трикутної форми, світло-зелені, без антоціану і блиску. Листова пластинка середньогорбувата, форма поперечного розрізу увігнута, крила відсутні, кут розходження бічних жилок прямий. Кошик середнього розміру, неправильної форми. Листки обгортки округлої форми, без антоціану. Язичкові квітки – видовженої форми, жовті; трубчасті – жовті з слабким антоціановим забарвленням. Сім'янки широко-яйцеподібної форми, чорні з сірими смужками. Маса 1000 сім'янок – 75г.

Веgetаційний період в умовах Лісостепу – 116 днів. Середня урожайність за роки випробування – 26,5 ц/га, що на 15% гарантовано перевищує національні стандарти. Потенційна урожайність – 40,7 ц/га. Вміст жиру – 50,5%, білка – 16,7%.

Гібрид середньостійкий до хвороб (вовчок о, іржа – 9,0%, біла гниль – 0,9%, сіра гниль – 26,4%); стійкий проти вилягання, осипання, посухи.

Напрямок використання – олійний.

Рекомендований для зони Лісостепу.

Альзан. Простий міжлінійний гібрид. Заявник – фірма Рустіка Програ Женетік (Франція).

Гіпокотиль з слабким антоціановим забарвленням. Рослини заввишки 165 см. Стебло прямостояче, середньо опушене. Листки серцеподібні, світло-зелені, без антоціану. Листова пластинка середньогорбувата, з блиском, крила відсутні, форма поперечного розрізу

– 33,5 ц/га. Вміст жиру – 50,5%, лузжистість 23%, вміст білка 18,1%. Гібрид стійкий до вовчка і пероноспорозу. Олійного напрямку.
Рекомендований для зон Степу та Лісостепу.

Лан 26. Міжлінійний гібрид на стерильній основі. Заявник - Селекційно-генетичний інститут УААН та ТОВ “Технаука”.

Антоціанове забарвлення гіпокотилі слабе. Рослини заввишки 117 см. Стебло прямостояче, середньої товщини, опушення на верхівці середнє. Листки середнього розміру, серцеподібні, зелені. Листкова пластинка без блиску, середньогорбувата, форма поперечного розрізу опукла, крила відсутні, кут розходження бічних жилок прямий. Кошик середнього розміру, плескатий, тонкий. Листки обгортки видовженої форми, без антоціану. Язичкові квітки овальної форми, жовті; трубчасті жовті без антоціану. Сім'янки середнього розміру, видовжено-овальної форми, чорного кольору без смужок. Маса 1000 сім'янок 57,8г.

Веgetаційний період в умовах Степу 119 днів. Середня урожайність за роки випробування 30,0 ц/га, що на 5% перевищує національні стандарти. Потенційна урожайність гібриду – 37,9 ц/га. Вміст жиру – 52,0%, лузжистість – 21,8%.

Гібрид олійного напрямку, відносно стійкий до вовчка, пероноспорозу.

Рекомендований для зони Степу.

Аліенор. Простий міжлінійний гібрид. Заявник – фірма Рустіка Прогрен Женетік (Франція).

Гіпокотиль з слабким антоціановим забарвленням. Рослини заввишки 153 см. Стебло прямостояче, середньо опушене в верхній частині. Листки трикутної форми, світло-зелені, без антоціану і блиску. Листова пластинка середньогорбувата, форма поперечного розрізу увігнута, крила відсутні, кут розходження бічних жилок прямий. Кошик середнього розміру, неправильної форми. Листки обгортки округлої форми, без антоціану. Язичкові квітки – видовженої форми, жовті; трубчасті – жовті з слабким антоціановим забарвленням. Сім'янки широко-яйцеподібної форми, чорні з сірими смужками. Маса 1000 сім'янок – 75г.

Веgetаційний період в умовах Лісостепу – 116 днів. Середня урожайність за роки випробування – 26,5 ц/га, що на 15% гарантовано перевищує національні стандарти. Потенційна урожайність – 40,7 ц/га. Вміст жиру – 50,5%, білка – 16,7%.

Гібрид середньостійкий до хвороб (вовчок о, іржа – 9,0%, біла гниль – 0,9%, сіра гниль – 26,4%); стійкий проти вилягання, осипання, посухи.

Напрямок використання – олійний.

Рекомендований для зони Лісостепу.

Альзан. Простий міжлінійний гібрид. Заявник – фірма Рустіка Програ Женетік (Франція).

Гіпокотиль з слабким антоціановим забарвленням. Рослини заввишки 165 см. Стебло прямостояче, середньо опушене. Листки серцеподібні, світло-зелені, без антоціану. Листова пластинка середньогорбувата, з блиском, крила відсутні, форма поперечного розрізу

– 33,5 ц/га. Вміст жиру – 50,5%, лузжистість 23%, вміст білка 18,1%. Гібрид стійкий до вовчка і пероноспорозу. Олійного напрямку.
Рекомендований для зон Степу та Лісостепу.

Лан 26. Міжлінійний гібрид на стерильній основі. Заявник - Селекційно-генетичний інститут УААН та ТОВ “Технаука”.

Антоціанове забарвлення гіпокотилі слабе. Рослини заввишки 117 см. Стебло прямостояче, середньої товщини, опушення на верхівці середнє. Листки середнього розміру, серцеподібні, зелені. Листкова пластинка без блиску, середньогорбувата, форма поперечного розрізу опукла, крила відсутні, кут розходження бічних жилок прямий. Кошик середнього розміру, плескатий, тонкий. Листки обгортки видовженої форми, без антоціану. Язичкові квітки овальної форми, жовті; трубчасті жовті без антоціану. Сім'янки середнього розміру, видовжено-овальної форми, чорного кольору без смужок. Маса 1000 сім'янок 57,8г.

Веgetаційний період в умовах Степу 119 днів. Середня урожайність за роки випробування 30,0 ц/га, що на 5% перевищує національні стандарти. Потенційна урожайність гібриду – 37,9 ц/га. Вміст жиру – 52,0%, лузжистість – 21,8%.

Гібрид олійного напрямку, відносно стійкий до вовчка, пероноспорозу.

Рекомендований для зони Степу.

Аліенор. Простий міжлінійний гібрид. Заявник – фірма Рустіка Прогрен Женетік (Франція).

Гіпокотиль з слабким антоціановим забарвленням. Рослини заввишки 153 см. Стебло прямостояче, середньо опушене в верхній частині. Листки трикутної форми, світло-зелені, без антоціану і блиску. Листова пластинка середньогорбувата, форма поперечного розрізу увігнута, крила відсутні, кут розходження бічних жилок прямий. Кошик середнього розміру, неправильної форми. Листки обгортки округлої форми, без антоціану. Язичкові квітки – видовженої форми, жовті; трубчасті – жовті з слабким антоціановим забарвленням. Сім'янки широко-яйцеподібної форми, чорні з сірими смужками. Маса 1000 сім'янок – 75г.

Веgetаційний період в умовах Лісостепу – 116 днів. Середня урожайність за роки випробування – 26,5 ц/га, що на 15% гарантовано перевищує національні стандарти. Потенційна урожайність – 40,7 ц/га. Вміст жиру – 50,5%, білка – 16,7%.

Гібрид середньостійкий до хвороб (вовчок о, іржа – 9,0%, біла гниль – 0,9%, сіра гниль – 26,4%); стійкий проти вилягання, осипання, посухи.

Напрямок використання – олійний.

Рекомендований для зони Лісостепу.

Альзан. Простий міжлінійний гібрид. Заявник – фірма Рустіка Програ Женетік (Франція).

Гіпокотиль з слабким антоціановим забарвленням. Рослини заввишки 165 см. Стебло прямостояче, середньо опушене. Листки серцеподібні, світло-зелені, без антоціану. Листова пластинка середньогорбувата, з блиском, крила відсутні, форма поперечного розрізу

увігнута, кут розходження бічних жилок прямий. Кошик великий, опуклий. Листок обгортки видовжений, без антоціану. Язичкові квітки овальні, жовті; трубчасті – жовті, без антоціану. Сім'янки видовжено-яйцевидні, чорні з сірими смужками. Маса 1000 сім'янок – 65г.

Веgetаційний період в зоні Лісостепу – 122 дні. Середня урожайність за роки випробування – 29,9 ц/га, потенційна – 43,4 ц/га., що на 29% гарантовано вище, ніж у національний стандартів. Вміст жиру – 50,7%, білка – 16,6%.

Гібрид середньо стійкий до хвороб, стійкий до вилягання, осипання, посухи.

Рекомендований для зони Лісостепу.

ПР63А90. Простий міжлінійний гібрид. Заявник - фірма Піонер Хай-Бред Інтернешнл, ІНК (США).

Рослини заввишки 165 см. Стебло прямостояче, середньоопушене. Листки великі, серцеподібні, зелені. Листова пластинка без антоціану і блиску, слабогорбувата, форма поперечного розрізу увігнута, крила відсутні, кут розходження бічних жилок прямий. Кошик середнього розміру, увігнутий. Листки обгортки округлої форми з антоціановим забарвленням. Язичкові квітки жовті, овальної форми; трубчасті - жовті, без антоціану. Сім'янки видовжено-яйцевидної форми, чорні, без смужок. Маса 1000 сім'янок - 70г.

Веgetаційний період в умовах Лісостепу - 129 днів. Середня урожайність за роки випробування - 28,2 ц/га; потенційна – 42,5 ц/га, що на 22% перевищує національні стандарти. Вміст жиру – 49,2%, білка – 18,3%.

Гібрид стійкий до осипання, вилягання. Відносно стійкий до основних хвороб.

Напрямок використання - олійний.

Рекомендований для зони Лісостепу.

ПР64А44(Mixail) . Простий міжлінійний гібрид на стерильній основі. Заявник – фірма Піонер Хай-Бред Інтернешнл, ІНК (США) та IP УААН.

Гіпокотиль з антоціановим забарвленням. Рослини заввишки 160 см. Стебло прямостояче, нерозгалужене, середньоопушене. Листки середнього розміру, серцеподібні, зелені, без антоціану. Листова пластинка слабогорбувата, без блиску, форма поперечного розрізу плеската, крила відсутні, кут розходження бічних жилок гострий. Кошик середнього розміру, опуклий. Листків обгортки багато, форма видовжена, антоціанове забарвлення відсутнє. Язичкові квітки овальної форми, оранжевого кольору; трубчасті – жовті, без антоціану. Сім'янки видовжено-яйцевидної форми, чорні, без смужок. Маса 1000 сім'янок – 55г.

Веgetаційний період в умовах Степу – 113 днів. Середня урожайність за роки випробування – 30,1 ц/га, потенційна – 40,6 ц/га. Вміст жиру – 52%, білка – 17,8, лузжистість 20%.

Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками незначне. Напрямок використання олійний.

Рекомендований для зони Степу.

увігнута, кут розходження бічних жилок прямий. Кошик великий, опуклий. Листок обгортки видовжений, без антоціану. Язичкові квітки овальні, жовті; трубчасті – жовті, без антоціану. Сім'янки видовжено-яйцевидні, чорні з сірими смужками. Маса 1000 сім'янок – 65г.

Веgetаційний період в зоні Лісостепу – 122 дні. Середня урожайність за роки випробування – 29,9 ц/га, потенційна – 43,4 ц/га., що на 29% гарантовано вище, ніж у національний стандартів. Вміст жиру – 50,7%, білка – 16,6%.

Гібрид середньо стійкий до хвороб, стійкий до вилягання, осипання, посухи.

Рекомендований для зони Лісостепу.

ПР63А90. Простий міжлінійний гібрид. Заявник - фірма Піонер Хай-Бред Інтернешнл, ІНК (США).

Рослини заввишки 165 см. Стебло прямостояче, середньоопушене. Листки великі, серцеподібні, зелені. Листова пластинка без антоціану і блиску, слабогорбувата, форма поперечного розрізу увігнута, крила відсутні, кут розходження бічних жилок прямий. Кошик середнього розміру, увігнутий. Листки обгортки округлої форми з антоціановим забарвленням. Язичкові квітки жовті, овальної форми; трубчасті - жовті, без антоціану. Сім'янки видовжено-яйцевидної форми, чорні, без смужок. Маса 1000 сім'янок - 70г.

Веgetаційний період в умовах Лісостепу - 129 днів. Середня урожайність за роки випробування - 28,2 ц/га; потенційна – 42,5 ц/га, що на 22% перевищує національні стандарти. Вміст жиру – 49,2%, білка – 18,3%.

Гібрид стійкий до осипання, вилягання. Відносно стійкий до основних хвороб.

Напрямок використання - олійний.

Рекомендований для зони Лісостепу.

ПР64А44(Mixail) . Простий міжлінійний гібрид на стерильній основі. Заявник – фірма Піонер Хай-Бред Інтернешнл, ІНК (США) та IP УААН.

Гіпокотиль з антоціановим забарвленням. Рослини заввишки 160 см. Стебло прямостояче, нерозгалужене, середньоопушене. Листки середнього розміру, серцеподібні, зелені, без антоціану. Листова пластинка слабогорбувата, без блиску, форма поперечного розрізу плеската, крила відсутні, кут розходження бічних жилок гострий. Кошик середнього розміру, опуклий. Листків обгортки багато, форма видовжена, антоціанове забарвлення відсутнє. Язичкові квітки овальної форми, оранжевого кольору; трубчасті – жовті, без антоціану. Сім'янки видовжено-яйцевидної форми, чорні, без смужок. Маса 1000 сім'янок – 55г.

Веgetаційний період в умовах Степу – 113 днів. Середня урожайність за роки випробування – 30,1 ц/га, потенційна – 40,6 ц/га. Вміст жиру – 52%, білка – 17,8, лузжистість 20%.

Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками незначне. Напрямок використання олійний.

Рекомендований для зони Степу.

Ругасол. Простий міжлінійний гібрид на стерильній основі. Заявник – Монсанта Європа С.А.

Рослини заввишки 165 см. Стебло прямостояче, середньої товщини, опушене, середньооблиствене. Листки середнього розміру, зелені, з блиском, серцеподібні. Листова пластинка середньогорбувата, зубчастість нерегулярна, середня. Форма поперечного розрізу увігнута, крила відсутні, кут розходження бічних жилок прямий. Кошик середнього розміру (17,2 см). Листочки обгортки видовженої форми, з антоціаном. Язичкові квітки видовженої форми, жовті; трубчасті – жовті з слабким антоціановим забарвленням. Сім'янки видовжено-яйцевидної форми, середньої товщини, чорні, з сірими смужками. Маса 1000 насінин 66г.

Вегетаційний період в умовах Лісостепу – 124 дні. Середня урожайність за роки випробування 27 ц/га, що на 10,3% вище, ніж у національних стандартів. Потенційна урожайність 43,2 ц/га. Вміст жиру – 51,3%, білка – 17,1%.

Гібрид стійкий до вилягання, посухи, осипання. Відносно стійкий до фомопсису, пероноспорозу, іржі.

Технологічний, швидке висихання кошиків гарантує одночасне дозрівання та знижену збиральну вологість. Олійного напрямку.

Рекомендований для зони Лісостепу.

Флай (АК 7307). Простий міжлінійний гібрид на стерильній основі. Заявник – фірма Монсанта Європа С.А.

Рослини заввишки 147 см, стебло середньої товщини, сильно опушене, середньооблиствене. Листки великі, серцеподібні, без антоціану. Листова пластинка з блиском, слабкогорбувата. Зубчастість середня, регулярна. Форма поперечного розрізу увігнута, крила відсутні, кут розходження бічних жилок прямий. Кошик середнього розміру (17,9 см.), опуклий. Листочки обгортки округлі, без антоціану. Язичкові квітки овальної форми, жовті; трубчасті – жовті, без антоціану. Сім'янки середнього розміру широко-яйцевидної форми. Основний колір чорний, з сірими смужками. Маса 1000 насінин – 65г.

Вегетаційний період в умовах Степу – 121 день, в умовах Лісостепу – 131 день. Середня урожайність за роки випробування – 29,3-32,1 ц/га, що перевищує національні стандарти на 3,9%-14,7%. Потенційна урожайність – 45,6 ц/га.

Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи, середньостійкий проти хвороб (вовчок – 4,6%, іржа – 13,9%, біла гниль – 14,8%).

Олійного напрямку.

Рекомендований для зон Степу і Лісостепу.

Мегасан (ІС 33541). Простий міжлінійний гібрид на стерильній основі. Заявник – фірма Адванта.

Рослини заввишки 150 см., стебло прямостояче, нерозгалужене, середньо опушене, добре залистяне. Листки середнього розміру, серцеподібні, світлозелені, без антоціану і блиску. Листова пластинка слабкогорбувата, крило відсутнє. Кошик великий, плоский. Листочки обгортки без антоціанового забарвлення. Язичкові квітки яйцеподібної форми, жовті; трубчасті – жовті з антоціановим забарвленням. Сім'янки середнього розміру, видовженої форми; чорні – з сірими смужками. Маса 1000 насінин – 66-70г.

Вегетаційний період в умовах Степу – 113 днів, в умовах Лісостепу – 120 днів.

Ругасол. Простий міжлінійний гібрид на стерильній основі. Заявник – Монсанто Європа С.А.

Рослини заввишки 165 см. Стебло прямостояче, середньої товщини, опушене, середньооблиствене. Листки середнього розміру, зелені, з блиском, серцеподібні. Листова пластинка середньогорбкувата, зубчастість нерегулярна, середня. Форма поперечного розрізу увігнута, крила відсутні, кут розходження бічних жилок прямий. Кошик середнього розміру (17,2 см). Листочки обгортки видовженої форми, з антоціаном. Язичкові квітки видовженої форми, жовті; трубчасті – жовті з слабким антоціановим забарвленням. Сім'янки видовжено-яйцевидної форми, середньої товщини, чорні, з сірими смужками. Маса 1000 насінин 66г.

Вегетаційний період в умовах Лісостепу – 124 дні. Середня урожайність за роки випробування 27 ц/га, що на 10,3% вище, ніж у національних стандартів. Потенційна урожайність 43,2 ц/га. Вміст жиру – 51,3%, білка – 17,1%.

Гібрид стійкий до вилягання, посухи, осипання. Відносно стійкий до фомопсису, пероноспорозу, іржі.

Технологічний, швидке висихання кошиків гарантує одночасне дозрівання та знижену збиральну вологість. Олійного напрямку.

Рекомендований для зони Лісостепу.

Флай (АК 7307). Простий міжлінійний гібрид на стерильній основі. Заявник – фірма Монсанто Європа С.А.

Рослини заввишки 147 см, стебло середньої товщини, сильно опушене, середньооблиствене. Листки великі, серцеподібні, без антоціану. Листова пластинка з блиском, слабкогорбкувата. Зубчастість середня, регулярна. Форма поперечного розрізу увігнута, крила відсутні, кут розходження бічних жилок прямий. Кошик середнього розміру (17,9 см.), опуклий. Листочки обгортки округлі, без антоціану. Язичкові квітки овальної форми, жовті; трубчасті – жовті, без антоціану. Сім'янки середнього розміру широко-яйцевидної форми. Основний колір чорний, з сірими смужками. Маса 1000 насінин – 65г.

Вегетаційний період в умовах Степу – 121 день, в умовах Лісостепу – 131 день. Середня урожайність за роки випробування – 29,3-32,1 ц/га, що перевищує національні стандарти на 3,9%-14,7%. Потенційна урожайність – 45,6 ц/га.

Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи, середньостійкий проти хвороб (вовчок – 4,6%, іржа – 13,9%, біла гниль – 14,8%).

Олійного напрямку.

Рекомендований для зон Степу і Лісостепу.

Мегасан (ІС 33541). Простий міжлінійний гібрид на стерильній основі. Заявник – фірма Адванта.

Рослини заввишки 150 см., стебло прямостояче, нерозгалужене, середньо опушене, добре залистяне. Листки середнього розміру, серцеподібні, світлозелені, без антоціану і блиску. Листова пластинка слабкогорбкувата, крило відсутнє. Кошик великий, плоский. Листочки обгортки без антоціанового забарвлення. Язичкові квітки яйцеподібної форми, жовті; трубчасті – жовті з антоціановим забарвленням. Сім'янки середнього розміру, видовженої форми; чорні – з сірими смужками. Маса 1000 насінин – 66-70г.

Вегетаційний період в умовах Степу – 113 днів, в умовах Лісостепу – 120 днів.

Середня урожайність за роки випробування – 29,4-31,7 ц/га, що на 21,0-25,9% вище, ніж у національних стандартів. Потенційна урожайність – 44,3 ц/га. Вміст жиру 50,6-51,7%, білка – 16,2-17,0%.

Гібрид стійкий проти вилягання, осипання, посухи; середньо стійкий проти ураження хворобами (вовчок – 7,2%, іржа – 11,7%, біла гниль – 11,5%).

Олійного напрямку.

Рекомендований для зон Степу та Лісостепу.

Погляд. Простий міжлінійний гібрид. Заявник – Інститут рослинництва ім. В.Я.Юр'єва УААН. Батьківська форма гібриду - Х711В, материнська форма - СХ2111А.

Сходи зелені. Стебло прямостояче, нерозгалужене, заввишки 150-160 см. Лист зелений, овально-серцеподібний. Кошик добре виповнений, тонкий, плоский, діаметром 18-20 см. Маса 1000 насінин – 50г.

Ранньостиглий. Вегетаційний період – 110-116 днів. Рекомендована густота стояння до збирання - 60000 рослин на одному гектарі. Відмінною особливістю гібрида є підвищена конкурентоспроможність щодо бур'янів за рахунок інтенсивного росту на перших етапах розвитку, активна реакція на добрива, стійкість до вилягання, висока технологічність.

Гібрид “Погляд” також характеризується як генетично стійкий до вовчка, має підвищену стійкість до білої, сірої гнилей та фомопсису.

Середня врожайність за роки випробування в умовах Степу становила 23,2 ц/га, що на 8% гарантовано перевищує стандартні сорти; у виробничому випробуванні отримали урожай 25,9 ц/га. Потенційний – 37,2 ц/га.

Вміст жиру – 48-50%, білка – 19,5%.

Рекомендований для зони Лісостепу.

Кий. Простий міжлінійний гібрид. Заявник – Інститут рослин ім. В.Я.Юр'єва. Материнська форма - Сх908А (стерильна), батьківська форма - Х762В (відновлювач фертильності пилку).

Стебло однокошикове, заввишки до 150 см. Листки зелені, середнього розміру, серцеподібні. Кошики великі, злегка опуклої форми, діаметр кошика становить 19-23 см. Маса 1000 насінин - 58-61 г.

Скоростиглий, довжина вегетаційного періоду до 100 днів. Відрізняється рівномірним квіткуванням, має високу стійкість до вилягання. Посухостійкість висока, осипаємість слабка. Гібрид генетично стійкий до вовчка та несправжньоборошнистої роси, відносно стійкий до білої та сірої гнилі.

За роки випробування середня урожайність в умовах Степу становила 22 ц/га, потенційна – 48,4 ц/га. Вміст жиру – 50,7%. Урожайність материнської форми складає від 8 до 13,2 ц/га, вихід кондиційного насіння – 65%. Рекомендована густота стояння – 65 тис/га до збирання урожаю. Оптимальна доза мінеральних добрив під основну обробку ґрунту є N45 P60 K45 д.р. на гектар.

Рекомендований для зони Степу.

Середня урожайність за роки випробування – 29,4-31,7 ц/га, що на 21,0-25,9% вище, ніж у національних стандартів. Потенційна урожайність – 44,3 ц/га. Вміст жиру 50,6-51,7%, білка – 16,2-17,0%.

Гібрид стійкий проти вилягання, осипання, посухи; середньо стійкий проти ураження хворобами (вовчок – 7,2%, іржа – 11,7%, біла гниль – 11,5%).

Олійного напрямку.

Рекомендований для зон Степу та Лісостепу.

Погляд. Простий міжлінійний гібрид. Заявник – Інститут рослинництва ім. В.Я.Юр'єва УААН. Батьківська форма гібриду - X711В, материнська форма - CX2111А.

Сходи зелені. Стебло прямостояче, нерозгалужене, заввишки 150-160 см. Лист зелений, овально-серцеподібний. Кошик добре виповнений, тонкий, плоский, діаметром 18-20 см. Маса 1000 насінин – 50г.

Ранньостиглий. Вегетаційний період – 110-116 днів. Рекомендована густота стояння до збирання - 60000 рослин на одному гектарі. Відмінною особливістю гібрида є підвищена конкурентоспроможність щодо бур'янів за рахунок інтенсивного росту на перших етапах розвитку, активна реакція на добрива, стійкість до вилягання, висока технологічність.

Гібрид “Погляд” також характеризується як генетично стійкий до вовчка, має підвищену стійкість до білої, сірої гнилей та фомопсису.

Середня врожайність за роки випробування в умовах Степу становила 23,2 ц/га, що на 8% гарантовано перевищує стандартні сорти; у виробничому випробуванні отримали урожай 25,9 ц/га. Потенційний – 37,2 ц/га.

Вміст жиру – 48-50%, білка – 19,5%.

Рекомендований для зони Лісостепу.

Кий. Простий міжлінійний гібрид. Заявник – Інститут рослин ім. В.Я.Юр'єва. Материнська форма - Сх908А (стерильна), батьківська форма - Х762В (відновлювач фертильності пилку).

Стебло однокошикове, заввишки до 150 см. Листки зелені, середнього розміру, серцеподібні. Кошики великі, злегка опуклої форми, діаметр кошика становить 19-23 см. Маса 1000 насінин - 58-61 г.

Скоростиглий, довжина вегетаційного періоду до 100 днів. Відрізняється рівномірним квіткуванням, має високу стійкість до вилягання. Посухостійкість висока, осипаємість слабка. Гібрид генетично стійкий до вовчка та несправжньоборошнистої роси, відносно стійкий до білої та сірої гнилі.

За роки випробування середня урожайність в умовах Степу становила 22 ц/га, потенційна – 48,4 ц/га. Вміст жиру – 50,7%. Урожайність материнської форми складає від 8 до 13,2 ц/га, вихід кондиційного насіння – 65%. Рекомендована густота стояння – 65 тис/га до збирання урожаю. Оптимальна доза мінеральних добрив під основну обробку ґрунту є N45 P60 K45 д.р. на гектар.

Рекомендований для зони Степу.

Vizum. Міжлінійний гібрид на стерильній основі. Заявник – Інститут рослин ім. В.Я.Юр'єва сумісно з Інститутом польових та овочевих культур м. Нові Сад (Югославія) та НВФ Дріада Херсонського аграрного університету. Батьківські форми Н-33А (стерильна) з КТ-1-17В (відновлювач фертильності пилку).

Сходи зелені. Стебло однокошикове, заввишки 140-160 см. Листки зелені, серцеподібні з слабгорбкуватою поверхнею. Кошики великі, злегка опуклої форми діаметром від 15 до 24 см. Маса 1000 насінин – 63,3 г.

Гібрид відноситься до скоростиглої групи. Довжина вегетаційного періоду – 95-100 днів. Середня урожайність за роки випробування в умовах Степу – 22,2 ц/га, потенційна – 43 ц/га. Вміст жиру – 52,8%, лузжистість – 22%.

Гібрид генетично стійкий до вовчка, іржі та несправжньої борошнистої роси, відносно стійкий до ураження гниллю кошиків. Толерантний до загущення (рекомендована густота стояння 65-70 тис/га). Посухостійкість висока, осипаємість слабка. Урожайність материнської форми – 12,5 ц/га.

Рекомендований для зони Степу.

Постолянський. Сорт. Заявник - Сумський СГІ.

Сходи і сім'ядолі зелені. Стебло прямостояче, діаметром 20-23 мм, середньоопушене, заввишки до 160 см.

Листки темно-зелені, великі, овально-серцеподібної форми, з гладенькою поверхнею. Черенки середньої довжини, розміщення на стеблі позачергове, слабоопушені. Кошик великий, опуклий, з незначним нахилом, середньої товщини. Насіння продовгувате, чорне з світлою смужкою збоку. Маса 1000 насінин - 60-70 г, лузжистість 18-20%, панцерні.

Сорт ранньостиглий, вегетаційний період 121 день. Середня урожайність за роки випробування – 24-25 ц/га, потенційна - 41,2 ц/га. Вміст жиру – 48,3%. Сорт стійкий до вилягання, осипання. Ураження хворобами незначне (вовчком – 7%; гнилями – 10,4%).

Рекомендований для зон Степу та Лісостепу.

Слав'янин. Трьохлінійний гібрид на стерильній основі. Заявник - Інститут олійних культур УААН.

Сходи зелені, без антоціану. Стебло прямостояче, нерозгалужене, заввишки 180 см. Листки зелені, серцеподібні. Кошик середнього розміру, плоский; язичкові квітки жовті, трубчасті – жовті без антоціану. Сім'янки панцерні, темносірі з сірими смужками.

Гібрид ранньостиглий. Вегетаційний період в зоні Степу за роки випробування – 122 дні. Середня урожайність – 25,0 ц/га, потенційна - 42,0 ц/га. Високоолеїновий. Вміст жиру – 50,6 ц/га; олеїнової кислоти – 70,8%. Лузжистість – 24%.

Стійкий до вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами середнє.

Рекомендований для зони Степу.

Запорізький 14. Простий міжлінійний гібрид. Заявник – Інститут олійних культур УААН. Батьківські форми: лінія ЗЛ-95 (стерильний аналог ЗЛ-95А) – мати; лінія ЗЛ-78В (відновлювач фертильності) – батько.

Vizum. Міжлінійний гібрид на стерильній основі. Заявник – Інститут рослин ім. В.Я.Юр'єва сумісно з Інститутом польових та овочевих культур м. Нові Сад (Югославія) та НВФ Дріада Херсонського аграрного університету. Батьківські форми Н-33А (стерильна) з КТ-1-17В (відновлювач фертильності пилку).

Сходи зелені. Стебло однокошикове, заввишки 140-160 см. Листки зелені, серцеподібні з слабгорбкуватою поверхнею. Кошики великі, злегка опуклої форми діаметром від 15 до 24 см. Маса 1000 насінин – 63,3 г.

Гібрид відноситься до скоростиглої групи. Довжина вегетаційного періоду – 95-100 днів. Середня урожайність за роки випробування в умовах Степу – 22,2 ц/га, потенційна – 43 ц/га. Вміст жиру – 52,8%, лузжистість – 22%.

Гібрид генетично стійкий до вовчка, іржі та несправжньої борошнистої роси, відносно стійкий до ураження гниллю кошиків. Толерантний до загущення (рекомендована густота стояння 65-70 тис/га). Посухостійкість висока, осипаємість слабка. Урожайність материнської форми – 12,5 ц/га.

Рекомендований для зони Степу.

Постолянський. Сорт. Заявник - Сумський СГІ.

Сходи і сім'ядолі зелені. Стебло прямостояче, діаметром 20-23 мм, середньоопушене, заввишки до 160 см.

Листки темно-зелені, великі, овально-серцеподібної форми, з гладенькою поверхнею. Черенки середньої довжини, розміщення на стеблі позачергове, слабоопушені. Кошик великий, опуклий, з незначним нахилом, середньої товщини. Насіння продовгувате, чорне з світлою смужкою збоку. Маса 1000 насінин - 60-70 г, лузжистість 18-20%, панцерні.

Сорт ранньостиглий, вегетаційний період 121 день. Середня урожайність за роки випробування – 24-25 ц/га, потенційна - 41,2 ц/га. Вміст жиру – 48,3%. Сорт стійкий до вилягання, осипання. Ураження хворобами незначне (вовчком – 7%; гнилями – 10,4%).

Рекомендований для зон Степу та Лісостепу.

Слав'янин. Трьохлінійний гібрид на стерильній основі. Заявник - Інститут олійних культур УААН.

Сходи зелені, без антоціану. Стебло прямостояче, нерозгалужене, заввишки 180 см. Листки зелені, серцеподібні. Кошик середнього розміру, плоский; язичкові квітки жовті, трубчасті – жовті без антоціану. Сім'янки панцерні, темносірі з сірими смужками.

Гібрид ранньостиглий. Вегетаційний період в зоні Степу за роки випробування – 122 дні. Середня урожайність – 25,0 ц/га, потенційна - 42,0 ц/га. Високоолеїновий. Вміст жиру – 50,6 ц/га; олеїнової кислоти – 70,8%. Лузжистість – 24%.

Стійкий до вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами середнє.

Рекомендований для зони Степу.

Запорізький 14. Простий міжлінійний гібрид. Заявник – Інститут олійних культур УААН. Батьківські форми: лінія ЗЛ-95 (стерильний аналог ЗЛ-95А) – мати; лінія ЗЛ-78В (відновлювач фертильності) – батько.

Сходи зелені. Стебло прямостояче, негіллясте, заввишки до 140-160 см. Лист зелений, серцеподібний, без антоціану. Кошик тонкий, ледь опуклий, діаметром 18-20 см. Сім'янки темні, панцирні, маса 1000 насінин – 50-55 см.

Скоростиглий. Вегетаційний період 90-112 днів. Рекомендована густота стояння до збирання - 50-52 тис. на гектар. Гібрид стійкий до осипання, генетично стійкий до вовчка і пероноспорозу.

Середня врожайність за роки випробування – 24,7 ц/га, що гарантовано на 2,6 ц/га (12,4%) перевищує стандартні сорти. Потенційна – 52,6 ц/га. Вміст жиру - 48-50%, білка – 18%, лузжистість – 22,8%.

Рекомендований для зони Степу.

Запорізький 26. Простий міжлінійний гібрид. Заявник – Інститут олійних культур УААН.

Стебло прямостояче нерозгалужене, заввишки до 170 см. Листки середнього розміру, овально-серцеподібні з ледь горбкуватою поверхнею. Кошик великий (діаметр – 20,2 см), ледь опуклий. Язичкові квітки жовті, трубчасті – жовті без антоціану. Сім'янки чорні, панцирні, маса 1000 насінин – 50 г.

Гібрид ранньостиглий, вегетаційний період у зоні Степу – 118 днів. Середній урожай за роки випробування – 24,6 ц/га, потенційна – 39,1 ц/га. Ураження хворобами нижче середнього (вовчком - 2,7%, іржею – 16,4%, білою гниллю – 12,5%). Рекомендована густота стояння – 60 тис/га.

Рекомендований для зони Степу.

Урсус. Простий міжлінійний гібрид на стерильній основі. Заявник - фірма Рустіка Прогрен Женетік (Франція) спільно з Селекційно-генетичним інститутом УААН.

Сходи зелені, гіпокотиль з слабким антоціановим забарвленням. Стебло прямостояче, нерозгалужене, заввишки до 170 см, опушення середнє. Листки середнього розміру, серцеподібні, слабкогорбкуваті, світлозеленого забарвлення. Кошик середнього розміру, опуклий. Сім'янки панцирні, продовгувато-округлі, середньої товщини, чорного кольору з сірими смужками. Маса 1000 насінин – 50 г.

Середньоранній. Вегетаційний період в умовах Лісостепу – 124 дні. Гібрид стійкий до несприятливих метеофакторів, генетично стійкий до вовчка; пероноспорозом, гнилями уражується незначно. Вміст жиру – 48-50%, білка – 18%, лузжистість – 23,5%.

Середня урожайність за роки випробування – 26,3 ц/га, що на 6,5% гарантовано перевищує національні стандарти. Потенційна - 38,0 ц/га.

Густота посіву: Лісостеп – 60000; Степ – 55000, на зрошенні – 60000 тис. на гектар.

Рекомендований для зони Лісостепу.

Сходи зелені. Стебло прямостояче, негіллясте, заввишки до 140-160 см. Лист зелений, серцеподібний, без антоціану. Кошик тонкий, ледь опуклий, діаметром 18-20 см. Сім'янки темні, панцирні, маса 1000 насінин – 50-55 см.

Скоростиглий. Вегетаційний період 90-112 днів. Рекомендована густота стояння до збирання - 50-52 тис. на гектар. Гібрид стійкий до осипання, генетично стійкий до вовчка і пероноспорозу.

Середня врожайність за роки випробування – 24,7 ц/га, що гарантовано на 2,6 ц/га (12,4%) перевищує стандартні сорти. Потенційна – 52,6 ц/га. Вміст жиру - 48-50%, білка – 18%, лузжистість – 22,8%.

Рекомендований для зони Степу.

Запорізький 26. Простий міжлінійний гібрид. Заявник – Інститут олійних культур УААН.

Стебло прямостояче нерозгалужене, заввишки до 170 см. Листки середнього розміру, овально-серцеподібні з ледь горбкуватою поверхнею. Кошик великий (діаметр – 20,2 см), ледь опуклий. Язичкові квітки жовті, трубчасті – жовті без антоціану. Сім'янки чорні, панцирні, маса 1000 насінин – 50 г.

Гібрид ранньостиглий, вегетаційний період у зоні Степу – 118 днів. Середній урожай за роки випробування – 24,6 ц/га, потенційна – 39,1 ц/га. Ураження хворобами нижче середнього (вовчком - 2,7%, іржею – 16,4%, білою гниллю – 12,5%). Рекомендована густота стояння – 60 тис/га.

Рекомендований для зони Степу.

Урсус. Простий міжлінійний гібрид на стерильній основі. Заявник - фірма Рустіка Прогрен Женетік (Франція) спільно з Селекційно-генетичним інститутом УААН.

Сходи зелені, гіпокотиль з слабким антоціановим забарвленням. Стебло прямостояче, нерозгалужене, заввишки до 170 см, опушення середнє. Листки середнього розміру, серцеподібні, слабкогорбкуваті, світлозеленого забарвлення. Кошик середнього розміру, опуклий. Сім'янки панцирні, продовгувато-округлі, середньої товщини, чорного кольору з сірими смужками. Маса 1000 насінин – 50 г.

Середньоранній. Вегетаційний період в умовах Лісостепу – 124 дні. Гібрид стійкий до несприятливих метеофакторів, генетично стійкий до вовчка; пероноспорозом, гнилями уражується незначно. Вміст жиру – 48-50%, білка – 18%, лузжистість – 23,5%.

Середня урожайність за роки випробування – 26,3 ц/га, що на 6,5% гарантовано перевищує національні стандарти. Потенційна - 38,0 ц/га.

Густота посіву: Лісостеп – 60000; Степ – 55000, на зрошенні – 60000 тис. на гектар.

Рекомендований для зони Лісостепу.

Медальон. Простий міжлінійний гібрид. Заявник - фірма Рустіка Прогрен Женетік (Франція) та Одеський селекційно-генетичний інститут.

Стебло прямостояче, негіллясте, заввишки до 170 см. Листки зелені, середнього розміру, без антоціану. Кошик великий (діаметр 17-24 см), опуклий. Сім'янки панцирні, чорні. Маса 1000 насінин – 80 г.

Середньоранній, вегетаційний період в умовах Лісостепу - 123 дні. Середній урожай за роки випробування – 24,2 ц/га, потенційний – 39,2 ц/га. Вміст жиру – 51,5%. Стійкий до вилягання, осипання. Толерантний до вовчка, гнилей. Рекомендована густота стояння – 60 тис/га.

Рекомендований для зони Лісостепу.

Аламо. Простий міжлінійний гібрид на стерильній основі. Заявник - фірма Рустіка Прогрен Женетік (Франція).

Сходи зелені, гіпокотиль з слабким антоціановим забарвленням. Листки середнього розміру, серцеподібні, зелені, без антоціану, з слабкогорбкуватою поверхнею. Стебло прямостояче, нерозгалужене, заввишки до 170 см. Кошик середнього розміру, тонкий, плоский. Насіння панцирне, продовгувате, чорного кольору з сірими смужками. Маса 1000 насінин – 50-60г. Вміст жиру – 52,8%, білка – 15,1%, лузжистість – 21%.

Гібрид середньоранній. Вегетаційний період за роки випробування – 123 дні. Стійкий до вилягання, осипання. Ураження хворобами: вовчок - 0; гнилі – 9,3%, іржа – 6,0%.

Середній урожай за роки випробування в умовах Лісостепу – 30,5 ц/га, що на 22,5% гарантовано перевищує національні стандарти. Потенційний урожай - 41,1 ц/га.

Густота стояння: Лісостеп – 60, Степ – 55-60, зрошення – 60 тис. на гектар.

Рекомендований для зони Лісостепу та Степу.

Альянс. Простий міжлінійний гібрид на стерильній основі. Заявник - фірма Рустіка Прогрен Женетік (Франція).

Сходи зелені, гіпокотиль з слабким антоціановим забарвленням. Листки світло-зелені, серцеподібні, великі з середньогорбкуватою поверхнею. Стебло прямостояче, нерозгалужене, заввишки до 170 см. Кошик середнього розміру, округлий, іноді ледь деформований. Насіння середнього розміру, продовгувато-округле, чорне з сірими смужками. Маса 1000 насінин – 50-56 г.

Ранньостиглий. Вегетаційний період до 120 днів. Гібрид стійкий до вилягання, осипання. Хворобами уражується в слабкій мірі (вовчок – до 8%; гнилі – до 12%; іржа – 20%). Вміст жиру – 47,8%, білка – 19,4%.

Середня урожайність за роки випробування в умовах Степу – 29,5 ц/га; Лісостепу – 30,7 ц/га, що гарантовано перевищує національні стандарти на 14-28%. Потенційний урожай - 52,2 ц/га.

Густота посіву: Лісостеп – 60-65; Степ – 60; зрошення – 60-65 тис. на гектар на період збирання.

Рекомендований для зон Степу і Лісостепу.

Альціон. Простий міжлінійний гібрид на стерильній основі. Заявник - фірма Рустіка Прогрен Женетік (Франція).

Сходи зелені, гіпокотиль з сильним антоціановим забарвленням. Листки серцеподібні, зелені, середнього розміру, без антоціанового забарвлення. Листова пластинка ледь горбкувата. Стебло прямостояче, негіллясте, заввишки до 160 см. Кошик середнього розміру, опуклий. Сім'янки середні, видовжені, чорного кольору з сірими смужками. Маса 1000 насінин – 50 г. Вміст жиру – 49,8%, білка – 16,9%, лузжистість – 24,2%.

Гібрид ранньостиглий, вегетаційний період за роки випробування – 110-119 днів. Стійкий до несприятливих метеофакторів, осипання, вилягання. Ураження хворобами (вовчок – до 8%, гнилі – 9-11,4%, іржа – 11-18%) нижче середнього.

Середня урожайність за роки випробування в зоні Степу – 28,7 ц/га, Лісостепу – 25,8 ц/га, що гарантовано перевищує національні стандарти на 3-18,7%. Потенційний урожай - 39,3 ц/га.

Густота стояння: Лісостеп – 65-70; Степ – 60; зрошення – 65 тисяч на гектар на період збирання.

Рекомендований для зон Степу та Лісостепу.

Фантасол. Простий міжліній гібрид на стерильній основі. Заявник - фірма Каргілл (США).

Сходи зелені, без антоціану. Стебло прямостояче, нерозгалужене, заввишки до 160 см. Листки світло-зелені, серцеподібні, з гострим кінчиком і гладенькою поверхнею. Кошик середнього розміру, опуклий, язичкові квітки жовті, трубчасті – жовті з незначним антоціановим забарвленням. Сім'янки яйцеподібні, панцирні, чорні з сірими смужками.

Гібрид ранньостиглий. Вегетаційний період в умовах Лісостепу – 122 дні. Середня урожайність - 26,3 ц/га (+5,6 ц/га; +32%) до стандартів. Потенційна урожайність – 35 ц/га. Вміст жиру – 48,2%. Ураження хворобами незначне (вовчком – 0; гнилями – 16%), відносно стійкий до фомопсису.

Рекомендований для зони Лісостепу.

Франкосоль. Простий міжлінійний гібрид на стерильній основі. Заявник - фірма Каргілл (США). Виведений шляхом схрещування материнської лінії 404 та батьківської інбредної лінії 695.

Сходи зелені. Стебло прямостояче, нерозгалужене, середньооблиствене, заввишки 170 см. Листки темно-зелені, серцеподібні, з гострим кінчиком і гладенькою поверхнею. Кошик ледь опуклий, тонкий. Язичкові квітки жовті, трубчасті - жовті без антоціану. Сім'янки обернено-яйцеподібні, чорні, панцирні з вузькими чорно-сірими смужками.

Гібрид ранньостиглий, вегетаційний період за роки випробування 118-122 дні. Стійкий до вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами нижче середнього (вовчок – 1-13,4%, гнилі – 10,8-15,0%, іржа – 9,9%). Вміст жиру – 50,6%, білка – 14,1%.

Середній урожай за роки випробування становить по зоні Степу – 21,1 ц/га, в Лісостепу – 26,0 ц/га, що відповідно на 3-17% гарантовано перевищує національні стандарти. Потенційний урожай – 40,6 ц/га.

Рекомендований для зон Лісостепу та Степу.

СФ-187. Простий міжлінійний гібрид. Заявник фірма Каргілл (США).

Сходи зелені. Стебло однокошикове, прямостояче. Низькорослий (до 130 см). Листки зелені, серцеподібні, з ледь горбкуватою поверхнею. Кошик середнього розміру, тонкий, ледь опуклий. Сім'янки чорні з смужками, панцирні, обернено-яйцеподібні. Маса 1000 насінин – 52,3г.

Гібрид середньоранній, вегетаційний період в умовах Степу – 122 дні. Середній урожай за роки випробування – 28,2 ц/га, потенційний – 44,0 ц/га. Вміст жиру – 48,2%. Ураження хворобами середнє (вовчком – 3,7%; іржею – 12,5%; гниллю: білою – 9,7%, сірою – 20,5%).

Толерантний до фомопсису.

Рекомендований для зони Степу.

Арена. Простий міжлінійний гібрид. Заявник - фірма Новартіс НК (Франція).

Стебло прямостояче, негіллясте, заввишки 167 см. Листки великі, зелені, без антоціану, серцеподібні з ледь горбкуватою поверхнею. Кошик середнього розміру, опуклий. Язичкові квітки жовті, продовгуваті, трубчасті – жовті, без антоціану. Сім'янки чорні, з смужками, панцирні, яйцеподібно-округлі. Маса 1000 насінин – 51г.

Гібрид середньоранній, вегетаційний період в умовах Степу – 122 дні. Середня урожайність за роки випробування – 27,9 ц/га, потенційна 40,1 - ц/га. Вміст жиру – 50,7%. Стійкий до вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами середнє (вовчком – 5,0%, іржею – 16,4%, білою гниллю – 12,0%).

Рекомендований для зони Степу.

Мелоді. Простий міжлінійний гібрид. Заявник - фірма Новартіс НК (Франція).

Стебло прямостояче, однокошикове, середньоопушене, заввишки до 170 см. Листки серцеподібні, світло-зелені, без антоціану з ледь горбкуватою поверхнею. Кошик великий, опуклий. Язичкові квітки жовті, трубчасті – жовті без антоціану. Сім'янки панцирні, чорні з смужками, яйцеподібно-округлі. Маса 1000 насінин – 69г.

Гібрид середньоранній, вегетаційний період в умовах Степу становив 124 дні. Середня урожайність за роки випробування 27,4 ц/га, потенційна – 42,7 ц/га. Вміст жиру – 50,4%. Стійкий до вилягання, осипання. Ураження хворобами середнє (вовчком – 4,4%, іржею – 24,1%, білою гниллю – 10,3%).

Рекомендований для зони Степу.

Фієста (С-255). Простий міжлінійний гібрид. Заявник - фірма Новартіс НК (Франція).

Стебло прямостояче, негіллясте, середньооблиствене. Листки темно-зелені, великі, серцеподібні з ледь горбкуватою поверхнею. Кошик середнього розміру, опуклий. Язичкові квітки яйцеподібні, жовті, трубчасті – жовті, без антоціану. Сім'янки панцирні чорні з сірими смужками, яйцеподібно-округлі. Маса 1000 зерен – 59,5г.

СФ-187. Простий міжлінійний гібрид. Заявник фірма Каргілл (США).

Сходи зелені. Стебло однокошикове, прямостояче. Низькорослий (до 130 см). Листки зелені, серцеподібні, з ледь горбкуватою поверхнею. Кошик середнього розміру, тонкий, ледь опуклий. Сім'янки чорні з смужками, панцирні, обернено-яйцеподібні. Маса 1000 насінин – 52,3г.

Гібрид середньоранній, вегетаційний період в умовах Степу – 122 дні. Середній урожай за роки випробування – 28,2 ц/га, потенційний – 44,0 ц/га. Вміст жиру – 48,2%. Ураження хворобами середнє (вовчком – 3,7%; іржею – 12,5%; гниллю: білою – 9,7%, сірою – 20,5%).

Толерантний до фомопсису.

Рекомендований для зони Степу.

Арена. Простий міжлінійний гібрид. Заявник - фірма Новартіс НК (Франція).

Стебло прямостояче, негіллясте, заввишки 167 см. Листки великі, зелені, без антоціану, серцеподібні з ледь горбкуватою поверхнею. Кошик середнього розміру, опуклий. Язичкові квітки жовті, продовгуваті, трубчасті – жовті, без антоціану. Сім'янки чорні, з смужками, панцирні, яйцеподібно-округлі. Маса 1000 насінин – 51г.

Гібрид середньоранній, вегетаційний період в умовах Степу – 122 дні. Середня урожайність за роки випробування – 27,9 ц/га, потенційна 40,1 - ц/га. Вміст жиру – 50,7%. Стійкий до вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами середнє (вовчком – 5,0%, іржею – 16,4%, білою гниллю – 12,0%).

Рекомендований для зони Степу.

Мелоді. Простий міжлінійний гібрид. Заявник - фірма Новартіс НК (Франція).

Стебло прямостояче, однокошикове, середньоопушене, заввишки до 170 см. Листки серцеподібні, світло-зелені, без антоціану з ледь горбкуватою поверхнею. Кошик великий, опуклий. Язичкові квітки жовті, трубчасті – жовті без антоціану. Сім'янки панцирні, чорні з смужками, яйцеподібно-округлі. Маса 1000 насінин – 69г.

Гібрид середньоранній, вегетаційний період в умовах Степу становив 124 дні. Середня урожайність за роки випробування 27,4 ц/га, потенційна – 42,7 ц/га. Вміст жиру – 50,4%. Стійкий до вилягання, осипання. Ураження хворобами середнє (вовчком – 4,4%, іржею – 24,1%, білою гниллю – 10,3%).

Рекомендований для зони Степу.

Фієста (С-255). Простий міжлінійний гібрид. Заявник - фірма Новартіс НК (Франція).

Стебло прямостояче, негіллясте, середньооблиствене. Листки темно-зелені, великі, серцеподібні з ледь горбкуватою поверхнею. Кошик середнього розміру, опуклий. Язичкові квітки яйцеподібні, жовті, трубчасті – жовті, без антоціану. Сім'янки панцирні чорні з сірими смужками, яйцеподібно-округлі. Маса 1000 зерен – 59,5г.

Гібрид ранньостиглий, вегетаційний період в умовах Степу - до 120 днів. Середня урожайність за роки випробування – 26,8 ц/га, потенційна – 40,9 ц/га. Вміст жиру – 49,1%. Ураження хворобами середнє (вовчком – 3,9%, іржею – 11,3%, білою гниллю – 15,2%). Стійкий до вилягання та осипання.

Рекомендований для зони Степу.

B-206. Простий міжлінійний гібрид. Заявник - фірма Комбісід (Угорщина).

Сходи зелені, без антоціану. Стебло заввишки до 150 см, середньоопушене, добре облиствене. Листки середнього розміру, темно-зелені, з ледь горбкуватою поверхнею. Кошик середнього розміру, тонкий, ледь опуклий. Сім'янки панцирні, чорні. Маса 1000 насінин – 49г.

Гібрид ранньостиглий, вегетаційний період в умовах Степу - до 117 днів. Середня урожайність за роки випробування – 25,5 ц/га, потенційна – 40,2 ц/га. Вміст жиру – 50,3%. Ураження хворобами середнє (вовчком – 6,4%; іржею – 13,4%; гнилями: білою – 9,4%, сірою – 32,3%). Стійкий до вилягання, осипання.

Рекомендований для зони Степу.

B-306. Простий міжлінійний гібрид. Заявник - фірма Комбісід (Угорщина).

Стебло заввишки до 135 см, середньоопушене, прямостояче, однокошикове. Листки середнього розміру, овально-серцеподібні, зелені з ледь горбкуватою поверхнею. Кошик середнього розміру, ледь опуклий. Сім'янки чорні, панцирні. Маса 1000 насінин – 59г.

Гібрид середньоранній, вегетаційний період в умовах Степу - 120 днів. Середня урожайність за роки випробування – 24,9 ц/га, потенційна – 38,4 ц/га. Вміст жиру – 51,5%. Стійкий до посухи, осипання, вилягання. Ураження хворобами середнє (вовчком – 8,7%; іржею – 23,6%; гнилями: білою – 13,3%, сірою – 39,9%).

Рекомендований для зони Степу.

Дністр. Простий міжлінійний гібрид. Заявник - Інститут польових та овочевих культур (м.Нові Сад - Югославія).

Стебло прямостояче, негіллясте, середньоопушене в верхній частині, заввишки до 206 см.

Листки зелені, великі, з горбкуватою поверхнею. Кошик великий (18-20 см), ледь опуклий, середньої товщини. Сім'янки чорні, панцирні, маса 1000 насінин – 57г.

Середньостиглий, вегетаційний період - 128 днів. Середня урожайність в умовах Степу – 26,9 ц/га, Лісостепу – 28 ц/га, потенційна – 41,2 ц/га. Вміст жиру – 50,6%. Стійкий до вилягання, осипання. Ураження хворобами (вовчком – 1,6%; іржею – 10,2%; гнилями: білою – 7-14,8, сірою – 22-26%) Толерантний до фомопсису. Оптимальна густота стояння перед збиранням – 50 тис. на гектар.

Рекомендований для зон Лісостепу та Степу.

Гібрид ранньостиглий, вегетаційний період в умовах Степу - до 120 днів. Середня урожайність за роки випробування – 26,8 ц/га, потенційна – 40,9 ц/га. Вміст жиру – 49,1%. Ураження хворобами середнє (вовчком – 3,9%, іржею – 11,3%, білою гниллю – 15,2%). Стійкий до вилягання та осипання.

Рекомендований для зони Степу.

B-206. Простий міжлінійний гібрид. Заявник - фірма Комбісід (Угорщина).

Сходи зелені, без антоціану. Стебло заввишки до 150 см, середньоопушене, добре облиствене. Листки середнього розміру, темно-зелені, з ледь горбкуватою поверхнею. Кошик середнього розміру, тонкий, ледь опуклий. Сім'янки панцирні, чорні. Маса 1000 насінин – 49г.

Гібрид ранньостиглий, вегетаційний період в умовах Степу - до 117 днів. Середня урожайність за роки випробування – 25,5 ц/га, потенційна – 40,2 ц/га. Вміст жиру – 50,3%. Ураження хворобами середнє (вовчком – 6,4%; іржею – 13,4%; гнилями: білою – 9,4%, сірою – 32,3%). Стійкий до вилягання, осипання.

Рекомендований для зони Степу.

B-306. Простий міжлінійний гібрид. Заявник - фірма Комбісід (Угорщина).

Стебло заввишки до 135 см, середньоопушене, прямостояче, однокошикове. Листки середнього розміру, овально-серцеподібні, зелені з ледь горбкуватою поверхнею. Кошик середнього розміру, ледь опуклий. Сім'янки чорні, панцирні. Маса 1000 насінин – 59г.

Гібрид середньоранній, вегетаційний період в умовах Степу - 120 днів. Середня урожайність за роки випробування – 24,9 ц/га, потенційна – 38,4 ц/га. Вміст жиру – 51,5%. Стійкий до посухи, осипання, вилягання. Ураження хворобами середнє (вовчком – 8,7%; іржею – 23,6%; гнилями: білою – 13,3%, сірою – 39,9%).

Рекомендований для зони Степу.

Дністр. Простий міжлінійний гібрид. Заявник - Інститут польових та овочевих культур (м.Нові Сад - Югославія).

Стебло прямостояче, негіллясте, середньоопушене в верхній частині, заввишки до 206 см.

Листки зелені, великі, з горбкуватою поверхнею. Кошик великий (18-20 см), ледь опуклий, середньої товщини. Сім'янки чорні, панцирні, маса 1000 насінин – 57г.

Середньостиглий, вегетаційний період - 128 днів. Середня урожайність в умовах Степу – 26,9 ц/га, Лісостепу – 28 ц/га, потенційна – 41,2 ц/га. Вміст жиру – 50,6%. Стійкий до вилягання, осипання. Ураження хворобами (вовчком – 1,6%; іржею – 10,2%; гнилями: білою – 7-14,8, сірою – 22-26%) Толерантний до фомопсису. Оптимальна густина стояння перед збиранням – 50 тис. на гектар.

Рекомендований для зон Лісостепу та Степу.

Tica. Простий міжлінійний гібрид. Заявник - Інститут польових та овочевих культур (м.Нові Сад - Югославія).

Стебло нерозгалужене, середньоопушене, заввишки до 160 см. Листки темно-зелені, середнього розміру, з ледь горбкуватою поверхнею. Кошик середнього розміру (діаметром – 17,6 см). Сім'янки чорні, панцерні. Маса 1000 насінин - 50-55 г.

Скоростиглий, вегетаційний період в умовах Степу до 100 днів. Середній урожай за роки випробування - 22,8 ц/га, потенційний – 35,7 ц/га. Вміст жиру – 51,9%. Ураження хворобами середнє (вовчком – 6,4%; гнилями – 22%; іржею – 7,6%). Стійкий до вилягання, осипання, посухи. Оптимальна густина стояння перед збиранням – 45-50 тис на гектар.

Рекомендований для зони Степу.

Флорес. Заявник фірма Асгроу ГМБХ (Німеччина).

Простий міжлінійний гібрид на стерильній основі. Сходи зелені, антоціанове забарвлення гіпокотилу відсутнє. Стебло прямостояче, нерозгалужене, з сильноопушеною верхівкою. Листки середнього розміру, серцеподібні, зелені. Антоціанове забарвлення молодих листочків перед цвітінням відсутнє. Зубчастість листка середня, нерегулярна. Форма поперечного розрізу увігнута, крила листка відсутні, кут розходження бокових жилок – прямий. Горбкуватість листка середня, блиск наявний. Кошик середнього розміру, опуклий. Антоціанове забарвлення обгортки відсутнє. Форма листка обгортки видовжена. Язичкові квітки жовтого забарвлення, видовжені. Трубочасті квітки жовті, рильця трубчастої квітки без антоціанового забарвлення. Сім'янки середнього розміру з дуже рідким опушенням, чорні з сірими смужками.

Гібрид скоростиглий. Середня урожайність за роки випробування в умовах Лісостепу становила 29 ц/га. Потенційна урожайність до 57 ц/га. Вміст жиру - 52,5%. Гібрид середньостійкий до білої гнилі, фомопсису. Ураження вовчком вище середнього.

Рекомендований для зони Лісостепу.

Рекомендований для зони Лісостепу.

Сонріза. Простий міжлінійний гібрид на стерильній основі. Заявник – фірма Декалб (США). Батьківські форми: мати - ДР 642; батько – С2-2.

Сходи зелені, гіпокотиль з слабким антоціановим забарвленням. Стебло прямостояче, нерозгалужене, сильноопушене. Облистненість середня. Листки середнього розміру, серцеподібні, зелені. Антоціанове забарвлення відсутнє. Листова пластинка злегка горбкувата, блискуча, з яскраво вираженими зубчиками. Форма листа у поперечному розрізі увігнута. Кошик середнього розміру, опуклий. Язичкових квіток багато, форма яйцеподібна, колір жовтий. Трубочасті квітки жовтого кольору з дуже слабким антоціановим забарвленням. Сім'янки яйцеподібно-широкі з сірими смужками.

Гібрид ранньостиглий. Вегетаційний період в умовах Лісостепу - до 119 днів. Стійкий до несприятливих метеофакторів. Хворобами уражується в незначній мірі (вовчок – 1%; гнилі – 8%; іржа – 7%).

Середня урожайність за роки випробування – 28,4 ц/га, що гарантовано перевищує національні стандарти на 10%. Потенційний урожай - 49,6 ц/га.

Tica. Простий міжлінійний гібрид. Заявник - Інститут польових та овочевих культур (м.Нові Сад - Югославія).

Стебло нерозгалужене, середньоопушене, заввишки до 160 см. Листки темно-зелені, середнього розміру, з ледь горбкуватою поверхнею. Кошик середнього розміру (діаметром – 17,6 см). Сім'янки чорні, панцерні. Маса 1000 насінин - 50-55 г.

Скоростиглий, вегетаційний період в умовах Степу до 100 днів. Середній урожай за роки випробування - 22,8 ц/га, потенційний – 35,7 ц/га. Вміст жиру – 51,9%. Ураження хворобами середнє (вовчком – 6,4%; гнилями – 22%; іржею – 7,6%). Стійкий до вилягання, осипання, посухи. Оптимальна густина стояння перед збиранням – 45-50 тис на гектар.

Рекомендований для зони Степу.

Флорес. Заявник фірма Асгроу ГМБХ (Німеччина).

Простий міжлінійний гібрид на стерильній основі. Сходи зелені, антоціанове забарвлення гіпокотилу відсутнє. Стебло прямостояче, нерозгалужене, з сильноопушеною верхівкою. Листки середнього розміру, серцеподібні, зелені. Антоціанове забарвлення молодих листочків перед цвітінням відсутнє. Зубчастість листка середня, нерегулярна. Форма поперечного розрізу увігнута, крила листка відсутні, кут розходження бокових жилок – прямий. Горбкуватість листка середня, блиск наявний. Кошик середнього розміру, опуклий. Антоціанове забарвлення обгортки відсутнє. Форма листка обгортки видовжена. Язичкові квітки жовтого забарвлення, видовжені. Трубочасті квітки жовті, рильця трубчастої квітки без антоціанового забарвлення. Сім'янки середнього розміру з дуже рідким опушенням, чорні з сірими смужками.

Гібрид скоростиглий. Середня урожайність за роки випробування в умовах Лісостепу становила 29 ц/га. Потенційна урожайність до 57 ц/га. Вміст жиру - 52,5%. Гібрид середньостійкий до білої гнилі, фомопсису. Ураження вовчком вище середнього.

Рекомендований для зони Лісостепу.

Рекомендований для зони Лісостепу.

Сонріза. Простий міжлінійний гібрид на стерильній основі. Заявник – фірма Декалб (США). Батьківські форми: мати - ДР 642; батько – С2-2.

Сходи зелені, гіпокотиль з слабким антоціановим забарвленням. Стебло прямостояче, нерозгалужене, сильноопушене. Облистненість середня. Листки середнього розміру, серцеподібні, зелені. Антоціанове забарвлення відсутнє. Листова пластинка злегка горбкувата, блискуча, з яскраво вираженими зубчиками. Форма листа у поперечному розрізі увігнута. Кошик середнього розміру, опуклий. Язичкових квіток багато, форма яйцеподібна, колір жовтий. Трубочасті квітки жовтого кольору з дуже слабким антоціановим забарвленням. Сім'янки яйцеподібно-широкі з сірими смужками.

Гібрид ранньостиглий. Вегетаційний період в умовах Лісостепу - до 119 днів. Стійкий до несприятливих метеофакторів. Хворобами уражується в незначній мірі (вовчок – 1%; гнилі – 8%; іржа – 7%).

Середня урожайність за роки випробування – 28,4 ц/га, що гарантовано перевищує національні стандарти на 10%. Потенційний урожай - 49,6 ц/га.

Рекомендована густота стояння перед збиранням – 65 тис/га.
Рекомендований для зони Лісостепу.

Українське сонечко. Заявник – ТОВ “Всеукраїнський науковий інститут селекції (ВНІС)”.

Гіпокотиль з антоціановим забарвленням. Рослини середньої висоти (до 140 см), стебло нерозгалужене, середньоопушене. Облистненість невисока. Листки серцеподібної форми, зелені, невеликі. Форма попереднього розрізу плеската, крила наявні, кут розходження бічних жилок прямий.

Кошик напівповернений донизу, малий, плескатий. Листочків обгортки небагато. Листочки обгортки округлої форми, без антоціанового забарвлення. Язичкові квітки видовженої форми, жовті, трубчасті; квітки жовті, без антоціану. Сім'янки середнього розміру, видовжено-яйцевидної форми. Основний колір чорний, без смужок. Маса 1000 сім'янок – 52,0г, натура 415 г/л.

Веgetаційний період 109 днів. Середня урожайність за роки випробування 25,3 ц/га, потенційна 41,5 ц/га. Вміст жиру – 49,8%, білку – 17,0%, лушпинність – 24%.

Стійкий до вилягання, посухи, осипання. Ураження хворобами незначне.

Рекомендований для зони Лісостепу.

Ковчег. Заявник Інститут рослинництва ім. В.Я.Юр'єва УААН.

Трьохлінійний гібрид на стерильній основі.

Стебло прямостояче, заввишки до 180 см, нерозгалужене, слабоопушене. Кількість листків на стеблі середня. Листки ланцетоподібні, зелені, середнього розміру. Листова пластинка без блиску, середньогорбувата. Зубчастість регулярна, середня; форма поперечного розміру опукла, кут розходження бічних гілочок тупий, крила відсутні. Кошик похилий, середнього розміру, опуклий. Кількість листочків обгортки невелика. Форма листочків обгортки округла, антоціанове забарвлення відсутнє. Язичкові квітки видовженої форми, жовті, трубчасті жовті без антоціанового забарвлення.

Сім'янки середнього розміру, видовжено-яйцевидної форми, чорні з коричневими смужками. Розташування смужок по краях і бічне одночасне. Маса 1000 насінин 55,0 г, натура – 443 г/л.

Веgetаційний період 110 - 115 днів. Середня урожайність за роки випробування в зоні Лісостепу становила 26,1 ц/га, максимальна 39,6 ц/га. Вміст жиру 49,8%, білку – 18,2%, лушпинність 24%.

Гібрид стійкий до ураження хворобами та пошкодження шкідниками. Стійкий до вилягання, посухи, середньо стійкий до осипання.

Рекомендований для зони Лісостепу.

Балкан. Заявник – Інститут польових та овочевих культур, Нові Сад (Сербія).

Простий міжлінійний гібрид на стерильній основі.

Рекомендована густота стояння перед збиранням – 65 тис/га.
Рекомендований для зони Лісостепу.

Українське сонечко. Заявник – ТОВ “Всеукраїнський науковий інститут селекції (ВНІС)”.

Гіпокотиль з антоціановим забарвленням. Рослини середньої висоти (до 140 см), стебло нерозгалужене, середньоопушене. Облистненість невисока. Листки серцеподібної форми, зелені, невеликі. Форма попереднього розрізу плеската, крила наявні, кут розходження бічних жилок прямий.

Кошик напівповернений донизу, малий, плескатий. Листочків обгортки небагато. Листочки обгортки округлої форми, без антоціанового забарвлення. Язичкові квітки видовженої форми, жовті, трубчасті; квітки жовті, без антоціану. Сім'янки середнього розміру, видовжено-яйцевидної форми. Основний колір чорний, без смужок. Маса 1000 сім'янок – 52,0г, натура 415 г/л.

Веgetаційний період 109 днів. Середня урожайність за роки випробування 25,3 ц/га, потенційна 41,5 ц/га. Вміст жиру – 49,8%, білку – 17,0%, лушпинність – 24%.

Стійкий до вилягання, посухи, осипання. Ураження хворобами незначне.

Рекомендований для зони Лісостепу.

Ковчег. Заявник Інститут рослинництва ім. В.Я.Юр'єва УААН.

Трьохлінійний гібрид на стерильній основі.

Стебло прямостояче, заввишки до 180 см, нерозгалужене, слабоопушене. Кількість листків на стеблі середня. Листки ланцетоподібні, зелені, середнього розміру. Листова пластинка без блиску, середньогорбувата. Зубчастість регулярна, середня; форма поперечного розміру опукла, кут розходження бічних гілочок тупий, крила відсутні. Кошик похилий, середнього розміру, опуклий. Кількість листочків обгортки невелика. Форма листочків обгортки округла, антоціанове забарвлення відсутнє. Язичкові квітки видовженої форми, жовті, трубчасті жовті без антоціанового забарвлення.

Сім'янки середнього розміру, видовжено-яйцевидної форми, чорні з коричневими смужками. Розташування смужок по краях і бічне одночасне. Маса 1000 насінин 55,0 г, натура – 443 г/л.

Веgetаційний період 110 - 115 днів. Середня урожайність за роки випробування в зоні Лісостепу становила 26,1 ц/га, максимальна 39,6 ц/га. Вміст жиру 49,8%, білку – 18,2%, лушпинність 24%.

Гібрид стійкий до ураження хворобами та пошкодження шкідниками. Стійкий до вилягання, посухи, середньо стійкий до осипання.

Рекомендований для зони Лісостепу.

Балкан. Заявник – Інститут польових та овочевих культур, Нові Сад (Сербія).

Простий міжлінійний гібрид на стерильній основі.

Рекомендована густота стояння перед збиранням – 65 тис/га.
Рекомендований для зони Лісостепу.

Українське сонечко. Заявник – ТОВ “Всеукраїнський науковий інститут селекції (ВНІС)”.

Гіпокотиль з антоціановим забарвленням. Рослини середньої висоти (до 140 см), стебло нерозгалужене, середньоопушене. Облистненість невисока. Листки серцеподібної форми, зелені, невеликі. Форма попереднього розрізу плеската, крила наявні, кут розходження бічних жилок прямий.

Кошик напівповернений донизу, малий, плескатий. Листочків обгортки небагато. Листочки обгортки округлої форми, без антоціанового забарвлення. Язичкові квітки видовженої форми, жовті, трубчасті; квітки жовті, без антоціану. Сім'янки середнього розміру, видовжено-яйцевидної форми. Основний колір чорний, без смужок. Маса 1000 сім'янок – 52,0г, натура 415 г/л.

Веgetаційний період 109 днів. Середня урожайність за роки випробування 25,3 ц/га, потенційна 41,5 ц/га. Вміст жиру – 49,8%, білку – 17,0%, лушпинність – 24%.

Стійкий до вилягання, посухи, осипання. Ураження хворобами незначне.

Рекомендований для зони Лісостепу.

Ковчег. Заявник Інститут рослинництва ім. В.Я.Юр'єва УААН.

Трьохлінійний гібрид на стерильній основі.

Стебло прямостояче, заввишки до 180 см, нерозгалужене, слабоопушене. Кількість листків на стеблі середня. Листки ланцетоподібні, зелені, середнього розміру. Листова пластинка без блиску, середньогорбувата. Зубчастість регулярна, середня; форма поперечного розміру опукла, кут розходження бічних гілочок тупий, крила відсутні. Кошик похилий, середнього розміру, опуклий. Кількість листочків обгортки невелика. Форма листочків обгортки округла, антоціанове забарвлення відсутнє. Язичкові квітки видовженої форми, жовті, трубчасті жовті без антоціанового забарвлення.

Сім'янки середнього розміру, видовжено-яйцевидної форми, чорні з коричневими смужками. Розташування смужок по краях і бічне одночасне. Маса 1000 насінин 55,0 г, натура – 443 г/л.

Веgetаційний період 110 - 115 днів. Середня урожайність за роки випробування в зоні Лісостепу становила 26,1 ц/га, максимальна 39,6 ц/га. Вміст жиру 49,8%, білку – 18,2%, лушпинність 24%.

Гібрид стійкий до ураження хворобами та пошкодження шкідниками. Стійкий до вилягання, посухи, середньо стійкий до осипання.

Рекомендований для зони Лісостепу.

Балкан. Заявник – Інститут польових та овочевих культур, Нові Сад (Сербія).

Простий міжлінійний гібрид на стерильній основі.

Гіпокотиль з слабким антоціановим забарвленням. Стебло середньоопушене, прямостояче, не розгалужене, заввишки до 168 см, середньооблисне. Листки середнього розміру, серцеподібні, світло-зелені. Антоціанове окантування молодих листочків відсутнє. Листова пластинка без блиску, слабкогорбкувата, зубчастість середня, регулярна. Форма поперечного розрізу опукла, кут розходження бічних жилок прямий, крила відсутні. Кошик середнього розміру, опуклий, напівповернений донизу. Листочки обгортки видовженої форми, без антоціанового забарвлення. Язичкові квітки овальної форми, жовті; трубчасті жовті без антоціану. Сім'янка середнього розміру, широко-яйцевидної форми, чорна з сірими смужками, розташованими по краях сім'янки. Маса 1000 сім'янок 60г, натура – 535 г/л.

Вегетаційний період до 115 днів. Середня урожайність до 40 ц/га. Вміст жиру 52%, білку – 18%, лушпинність – 24%.

Гібрид стійкий до осипання, посухи, вилягання. Хворобами уражується нижче середнього.

Рекомендований для зони Лісостепу, оптимальна густота стояння – 50 тис/га.

Гена. Простий міжлінійний гібрид на стерильній основі. Заявник Інститут польових та овочевих культур, Нові Сад (Югославія).

Гіпокотиль з слабким антоціановим забарвленням. Стебло середньоопушене, заввишки до 190 см, прямостояче, нерозгалужене. Кількість листків на стеблі середня. Листки великі, серцеподібні, світло-зелені. Антоціанове окантування молодих листочків відсутнє. Листкова пластинка без блиску, слабкогорбкувата; зубчастість середня, регулярна. Форма поперечного розрізу опукла, крила відсутні, кут розходження бічних жилок прямий. Кошик середнього розміру, похилий, опуклий. Листочки обгортки округлої форми, без антоціанового забарвлення. Язичкові квітки видовженої форми, жовті; трубчасті – жовті без антоціанового забарвлення. Сім'янки середнього розміру, видовжено-яйцевидної форми, чорні без смужок. Маса 1000 сім'янок 50 – 60 г, натура – 530 г/л.

Вегетаційний період 120 - 130 днів. Середня урожайність за роки випробування в зоні Степу становив 26,6 ц/га, Лісостепу 27,7 ц/га; максимальна урожайність 46,2 ц/га. Вміст жиру – 49,5%, білку – 18,99%, лушпинність – 25%.

Гібрид стійкий до осипання, полягання, посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками середнє.

Рекомендований для зон Степу та Лісостепу, оптимальна густота стояння 55 тис/га.

Еврика МЛ. Заявники АФ „Флора”, ФГ „Тритікум”.

Сорт кондитерського напрямку. Стебло прямостояче, нерозгалужене, слабкогорбкувате, заввишки до 150 см. Листки середнього розміру, серцеподібні, зелені. Листкова пластинка без блиску, гладенька, зубчастість середня, регулярна; форма поперечного розрізу плеската, крила відсутні, кут розходження бічних жилок гострий. Кошик повернений донизу, середнього розміру, опуклий. Листочки обгортки видовженої форми, без антоціанового забарвлення. Язичкові квітки видовженої форми, жовті; трубчасті – червоні, без антоціану. Сім'янки середнього розміру, видовжено-яйцевидної форми, сірі з сірими, розташованими по краях смужками. Маса 1000 сім'янок 70-80г.

Вегетаційний період – 85-90 днів. Середня урожайність 19-32 ц/га. Вміст жиру 46,5 %, лушпинність 23,4%.

Сорт стійкий до вилягання, осипання, посухи, стійкий до хвороб.

Сорт витримує загушення до 71 тис/га.

Рекомендований для зон Степу та Лісостепу.

Гіпокотиль з слабким антоціановим забарвленням. Стебло середньоопушене, прямостояче, не розгалужене, заввишки до 168 см, середньооблисне. Листки середнього розміру, серцеподібні, світло-зелені. Антоціанове окантування молодих листочків відсутнє. Листова пластинка без блиску, слабкогорбкувата, зубчастість середня, регулярна. Форма поперечного розрізу опукла, кут розходження бічних жилок прямий, крила відсутні. Кошик середнього розміру, опуклий, напівповернений донизу. Листочки обгортки видовженої форми, без антоціанового забарвлення. Язичкові квітки овальної форми, жовті; трубчасті жовті без антоціану. Сім'янка середнього розміру, широко-яйцевидної форми, чорна з сірими смужками, розташованими по краях сім'янки. Маса 1000 сім'янок 60г, натура – 535 г/л.

Вегетаційний період до 115 днів. Середня урожайність до 40 ц/га. Вміст жиру 52%, білку – 18%, лушпинність – 24%.

Гібрид стійкий до осипання, посухи, вилягання. Хворобами уражується нижче середнього.

Рекомендований для зони Лісостепу, оптимальна густота стояння – 50 тис/га.

Гена. Простий міжлінійний гібрид на стерильній основі. Заявник Інститут польових та овочевих культур, Нові Сад (Югославія).

Гіпокотиль з слабким антоціановим забарвленням. Стебло середньоопушене, заввишки до 190 см, прямостояче, нерозгалужене. Кількість листків на стеблі середня. Листки великі, серцеподібні, світло-зелені. Антоціанове окантування молодих листочків відсутнє. Листкова пластинка без блиску, слабкогорбкувата; зубчастість середня, регулярна. Форма поперечного розрізу опукла, крила відсутні, кут розходження бічних жилок прямий. Кошик середнього розміру, похилий, опуклий. Листочки обгортки округлої форми, без антоціанового забарвлення. Язичкові квітки видовженої форми, жовті; трубчасті – жовті без антоціанового забарвлення. Сім'янки середнього розміру, видовжено-яйцевидної форми, чорні без смужок. Маса 1000 сім'янок 50 – 60 г, натура – 530 г/л.

Вегетаційний період 120 - 130 днів. Середня урожайність за роки випробування в зоні Степу становив 26,6 ц/га, Лісостепу 27,7 ц/га; максимальна урожайність 46,2 ц/га. Вміст жиру – 49,5%, білку – 18,99%, лушпинність – 25%.

Гібрид стійкий до осипання, полягання, посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками середнє.

Рекомендований для зон Степу та Лісостепу, оптимальна густота стояння 55 тис/га.

Еврика МЛ. Заявники АФ „Флора”, ФГ „Тритікум”.

Сорт кондитерського напрямку. Стебло прямостояче, нерозгалужене, слабкогорбкувате, заввишки до 150 см. Листки середнього розміру, серцеподібні, зелені. Листкова пластинка без блиску, гладенька, зубчастість середня, регулярна; форма поперечного розрізу плеската, крила відсутні, кут розходження бічних жилок гострий. Кошик повернений донизу, середнього розміру, опуклий. Листочки обгортки видовженої форми, без антоціанового забарвлення. Язичкові квітки видовженої форми, жовті; трубчасті – червоні, без антоціану. Сім'янки середнього розміру, видовжено-яйцевидної форми, сірі з сірими, розташованими по краях смужками. Маса 1000 сім'янок 70-80г.

Вегетаційний період – 85-90 днів. Середня урожайність 19-32 ц/га. Вміст жиру 46,5 %, лушпинність 23,4%.

Сорт стійкий до вилягання, осипання, посухи, стійкий до хвороб.

Сорт витримує загушення до 71 тис/га.

Рекомендований для зон Степу та Лісостепу.

PT 012. Заявник – фірма Євраліс Семанс (Франція).

Простий міжлінійний гібрид на стерильній основі.

Гіпокотиль з слабким антоціановим забарвленням. Стебло прямостояче, середньоопушене, заввишки до 168 см, середньооблиствене. Листки великі, серцеподібні, зелені. Антоціанове забарвлення молодих листочків відсутнє. Листкова пластинка з блиском, слабогорбкувата; зубчастість середня, регулярна. Форма поперечного розрізу увігнута, крила відсутні, кут розходження бічних жилок прямий. Кошик напівповернутий донизу, великий, опуклий. Листочки обгортки видовженої форми з антоціановим забарвленням. Язичкові квітки видовженої форми, оранжеві; трубчасті – червоного кольору, з слабким антоціановим забарвленням.

Сім'янки великі, видовженої форми з сірими, розташованими по краях і боках смужками. Маса 1000 сім'янок – 68г.

Вегетаційний період 100 днів. Середня урожайність за роки випробування 25,3 ц/га, потенційна 41,3 ц/га, вміст жиру – 48,3%.

Гібрид стійкий до вилягання, осипання, середньостійкий до посухи. Хворобами та шкідниками уражується в незначній мірі.

Рекомендований для зони Лісостепу.

Енергік РМО. Заявник – фірма Євраліс Семанс.

Простий міжлінійний гібрид на стерильній основі.

Гіпокотиль з слабким антоціановим забарвленням. Стебло прямостояче, нерозгалужене, заввишки до 170 см, середньооблиствене з слабким опушенням. Листки великі, серцеподібні, зелені. Антоціанове окантування молодих листочків відсутнє. Листкова пластинка з блиском, середньогорбкувата, зубчастість сильна, нерегулярна. Форма поперечного розрізу увігнута, крила відсутні, кут розходження бічних жилок тупий. Кошик напівповернений донизу, великий, опуклий. Листочки обгортки округлої форми, без антоціанового забарвлення. Язичкові квітки овальної форми, жовтооранжеві; трубчасті – червоні з слабким антоціановим забарвленням.

Сім'янки середнього розміру, широко-яйцевидної форми, чорні з білими, розташованими по боках смужками. Маса 1000 сім'янок – 63г.

Вегетаційний період 105 днів. Середня урожайність за роки випробування 25,4 ц/га, потенційна 40,1 ц/га, вміст жиру – 52,1%.

Гібрид стійкий до вилягання, осипання, середньостійкий до посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками незначне. Рекомендований для зони Лісостепу.

PR62A91. Заявник – фірма Піонер, Інститут рослинництва ім. В.Я.Юр'єва.

Простий міжлінійний гібрид на стерильній основі.

Гіпокотиль з сильним антоціановим забарвленням. Стебло середньоопушене і облиствене, прямостояче, нерозгалужене, заввишки до 116 см. Листки середнього розміру, серцеподібні, зелені. Молоді листочки без антоціанового забарвлення. Листкова пластинка без блиску, сильногорбкувата, зубчастість сильна, нерегулярна. Форма поперечного розрізу увігнута, крила наявні, кут розходження бічних жилок прямий. Кошик середнього розміру, опуклий, похилий. Листочки обгортки округлої форми, з антоціановим забарвленням. Язичкові квітки овальної форми, оранжеві; трубчасті – жовті, без антоціанового забарвлення. Сім'янки середнього розміру, широко-яйцевидної форми, чорні, без смужок. Маса 1000 сім'янок 50 -55г.

PT 012. Заявник – фірма Євраліс Семанс (Франція).

Простий міжлінійний гібрид на стерильній основі.

Гіпокотиль з слабким антоціановим забарвленням. Стебло прямостояче, середньоопушене, заввишки до 168 см, середньооблиствене. Листки великі, серцеподібні, зелені. Антоціанове забарвлення молодих листочків відсутнє. Листкова пластинка з блиском, слабогорбкувата; зубчастість середня, регулярна. Форма поперечного розрізу увігнута, крила відсутні, кут розходження бічних жилок прямий. Кошик напівповернутий донизу, великий, опуклий. Листочки обгортки видовженої форми з антоціановим забарвленням. Язичкові квітки видовженої форми, оранжеві; трубчасті – червоного кольору, з слабким антоціановим забарвленням.

Сім'янки великі, видовженої форми з сірими, розташованими по краях і боках смужками. Маса 1000 сім'янок – 68г.

Вегетаційний період 100 днів. Середня урожайність за роки випробування 25,3 ц/га, потенційна 41,3 ц/га, вміст жиру – 48,3%.

Гібрид стійкий до вилягання, осипання, середньостійкий до посухи. Хворобами та шкідниками уражується в незначній мірі.

Рекомендований для зони Лісостепу.

Енергік РМО. Заявник – фірма Євраліс Семанс.

Простий міжлінійний гібрид на стерильній основі.

Гіпокотиль з слабким антоціановим забарвленням. Стебло прямостояче, нерозгалужене, заввишки до 170 см, середньооблиствене з слабким опушенням. Листки великі, серцеподібні, зелені. Антоціанове окантування молодих листочків відсутнє. Листкова пластинка з блиском, середньогорбкувата, зубчастість сильна, нерегулярна. Форма поперечного розрізу увігнута, крила відсутні, кут розходження бічних жилок тупий. Кошик напівповернений донизу, великий, опуклий. Листочки обгортки округлої форми, без антоціанового забарвлення. Язичкові квітки овальної форми, жовтооранжеві; трубчасті – червоні з слабким антоціановим забарвленням.

Сім'янки середнього розміру, широко-яйцевидної форми, чорні з білими, розташованими по боках смужками. Маса 1000 сім'янок – 63г.

Вегетаційний період 105 днів. Середня урожайність за роки випробування 25,4 ц/га, потенційна 40,1 ц/га, вміст жиру – 52,1%.

Гібрид стійкий до вилягання, осипання, середньостійкий до посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками незначне. Рекомендований для зони Лісостепу.

PR62A91. Заявник – фірма Піонер, Інститут рослинництва ім. В.Я.Юр'єва.

Простий міжлінійний гібрид на стерильній основі.

Гіпокотиль з сильним антоціановим забарвленням. Стебло середньоопушене і облиствене, прямостояче, нерозгалужене, заввишки до 116 см. Листки середнього розміру, серцеподібні, зелені. Молоді листочки без антоціанового забарвлення. Листкова пластинка без блиску, сильногорбкувата, зубчастість сильна, нерегулярна. Форма поперечного розрізу увігнута, крила наявні, кут розходження бічних жилок прямий. Кошик середнього розміру, опуклий, похилий. Листочки обгортки округлої форми, з антоціановим забарвленням. Язичкові квітки овальної форми, оранжеві; трубчасті – жовті, без антоціанового забарвлення. Сім'янки середнього розміру, широко-яйцевидної форми, чорні, без смужок. Маса 1000 сім'янок 50 -55г.

Вегетаційний період 100 - 115 днів. Середня урожайність за роки випробування в зоні Степу становила 21,9 ц/га, в зоні Лісостепу 21,6 ц/га; максимальна 39,8 ц/га. Вміст жиру 48,5%, білку – 19,5 – 18,7%, лушпинність – 24%.

Гібрид стійкий до вилягання, осипання, середньостійкий до посухи, генетично стійкий до вовчку (раси Е), пероноспорозу (росл 1), ураження іншими хворобами та пошкодження шкідниками незначне.

Рекомендований для зон Степу та Лісостепу.

ПР64Г51. Заявник – фірма Піонер (США).

Простий міжлінійний гібрид на стерильній основі.

Гіпокотиль з антоціановим забарвленням.

Стебло прямостояче, нерозгалужене, середньоопушене і облиствене, заввишки до 157 см. листки середнього розміру, трикутної форми, зелені. Молоді листочки з антоціановим окантуванням. Листкова пластинка з блиском; горбкуватість дуже сильна; зубчастість середня, регулярна. Форма поперечного розрізу плеската, крила відсутні, кут розходження бічних жилок гострий. Кошик займає вертикальне положення, середнього розміру, неправильної форми. Листочки обгортки округлі, без антоціанового забарвлення. Язичкові квітки овальні, фовті; трубчасті – жовті з слабким антоціановим забарвленням.

Сім'янка середнього розміру, видовжено-яйцевидна, чорна з сірими, розташованими по краях і боках одночасно смужками. маса 1000 сім'янок 63г.

Вегетаційний період 125 днів. Середня урожайність за роки випробування 24,2 – 25,2 ц/га, вміст жиру – 49,0 – 52,2%.

Гібрид генетично стійкий до вовчку (раса Е), мільдю (раса 1), стійкий до вилягання, осипання, середньостійкий до посухи.

Рекомендований для зон Степу та Лісостепу.

ПР64А63. Заявник – фірма Піонер (США).

Простий міжлінійний гібрид на стерильній основі.

Стебло заввишки до 157 см, середньоопушене і облиствене, прямостояче, нерозгалужене. Листки середнього розміру, серцеподібні, зелені. Молоді листочки без антоціанового окантування. Листова пластинка без блиску, горбкуватість слабка; зубчастість середня, регулярна. Форма поперечного розрізу плеската, кут розходження бічних жилок прямий. Кошик середнього розміру, опуклий, повернутий донизу. Листочки обгортки округлі, без антоціанового забарвлення. Язичкові квітки овальної форми, жовті; трубчасті – жовті, без антоціанового забарвлення.

Сім'янки середнього розміру, широко-яйцевидної форми; чорні з сірими, розташованими по краях і боках одночасно смужками. Маса 1000 сім'янок 58г.

Вегетаційний період 121 день. Середня урожайність за роки випробування 28,9 – 30,6 ц/га, потенційна 52,9 ц/га, вміст жиру 47,6%, лушпинність 22%.

Гібрид генетично стійкий до вовчку (раса Е), мільдю (раса 4) і середньостійкий до вилягання, осипання, посухи.

Вегетаційний період 100 - 115 днів. Середня урожайність за роки випробування в зоні Степу становила 21,9 ц/га, в зоні Лісостепу 21,6 ц/га; максимальна 39,8 ц/га. Вміст жиру 48,5%, білку – 19,5 – 18,7%, лушпинність – 24%.

Гібрид стійкий до вилягання, осипання, середньостійкий до посухи, генетично стійкий до вовчку (раси Е), пероноспорозу (росл 1), ураження іншими хворобами та пошкодження шкідниками незначне.

Рекомендований для зон Степу та Лісостепу.

ПР64Г51. Заявник – фірма Піонер (США).

Простий міжлінійний гібрид на стерильній основі.

Гіпокотиль з антоціановим забарвленням.

Стебло прямостояче, нерозгалужене, середньоопушене і облиствене, заввишки до 157 см. листки середнього розміру, трикутної форми, зелені. Молоді листочки з антоціановим окантуванням. Листкова пластинка з блиском; горбкуватість дуже сильна; зубчастість середня, регулярна. Форма поперечного розрізу плеската, крила відсутні, кут розходження бічних жилок гострий. Кошик займає вертикальне положення, середнього розміру, неправильної форми. Листочки обгортки округлі, без антоціанового забарвлення. Язичкові квітки овальні, фовті; трубчасті – жовті з слабким антоціановим забарвленням.

Сім'янка середнього розміру, видовжено-яйцевидна, чорна з сірими, розташованими по краях і боках одночасно смужками. маса 1000 сім'янок 63г.

Вегетаційний період 125 днів. Середня урожайність за роки випробування 24,2 – 25,2 ц/га, вміст жиру – 49,0 – 52,2%.

Гібрид генетично стійкий до вовчку (раса Е), мільдю (раса 1), стійкий до вилягання, осипання, середньостійкий до посухи.

Рекомендований для зон Степу та Лісостепу.

ПР64А63. Заявник – фірма Піонер (США).

Простий міжлінійний гібрид на стерильній основі.

Стебло заввишки до 157 см, середньоопушене і облиствене, прямостояче, нерозгалужене. Листки середнього розміру, серцеподібні, зелені. Молоді листочки без антоціанового окантування. Листова пластинка без блиску, горбкуватість слабка; зубчастість середня, регулярна. Форма поперечного розрізу плеската, кут розходження бічних жилок прямий. Кошик середнього розміру, опуклий, повернутий донизу. Листочки обгортки округлі, без антоціанового забарвлення. Язичкові квітки овальної форми, жовті; трубчасті – жовті, без антоціанового забарвлення.

Сім'янки середнього розміру, широко-яйцевидної форми; чорні з сірими, розташованими по краях і боках одночасно смужками. Маса 1000 сім'янок 58г.

Вегетаційний період 121 день. Середня урожайність за роки випробування 28,9 – 30,6 ц/га, потенційна 52,9 ц/га, вміст жиру 47,6%, лушпинність 22%.

Гібрид генетично стійкий до вовчку (раса Е), мільдю (раса 4) і середньостійкий до вилягання, осипання, посухи.

Вегетаційний період 100 - 115 днів. Середня урожайність за роки випробування в зоні Степу становила 21,9 ц/га, в зоні Лісостепу 21,6 ц/га; максимальна 39,8 ц/га. Вміст жиру 48,5%, білку – 19,5 – 18,7%, лушпинність – 24%.

Гібрид стійкий до вилягання, осипання, середньостійкий до посухи, генетично стійкий до вовчку (раси Е), пероноспорозу (росл 1), ураження іншими хворобами та пошкодження шкідниками незначне.

Рекомендований для зон Степу та Лісостепу.

ПР64Г51. Заявник – фірма Піонер (США).

Простий міжлінійний гібрид на стерильній основі.

Гіпокотиль з антоціановим забарвленням.

Стебло прямостояче, нерозгалужене, середньоопушене і облиствене, заввишки до 157 см. листки середнього розміру, трикутної форми, зелені. Молоді листочки з антоціановим окантуванням. Листкова пластинка з блиском; горбкуватість дуже сильна; зубчастість середня, регулярна. Форма поперечного розрізу плеската, крила відсутні, кут розходження бічних жилок гострий. Кошик займає вертикальне положення, середнього розміру, неправильної форми. Листочки обгортки округлі, без антоціанового забарвлення. Язичкові квітки овальні, фовті; трубчасті – жовті з слабким антоціановим забарвленням.

Сім'янка середнього розміру, видовжено-яйцевидна, чорна з сірими, розташованими по краях і боках одночасно смужками. маса 1000 сім'янок 63г.

Вегетаційний період 125 днів. Середня урожайність за роки випробування 24,2 – 25,2 ц/га, вміст жиру – 49,0 – 52,2%.

Гібрид генетично стійкий до вовчку (раса Е), мільдю (раса 1), стійкий до вилягання, осипання, середньостійкий до посухи.

Рекомендований для зон Степу та Лісостепу.

ПР64А63. Заявник – фірма Піонер (США).

Простий міжлінійний гібрид на стерильній основі.

Стебло заввишки до 157 см, середньоопушене і облиствене, прямостояче, нерозгалужене. Листки середнього розміру, серцеподібні, зелені. Молоді листочки без антоціанового окантування. Листова пластинка без блиску, горбкуватість слабка; зубчастість середня, регулярна. Форма поперечного розрізу плеската, кут розходження бічних жилок прямий. Кошик середнього розміру, опуклий, повернутий донизу. Листочки обгортки округлі, без антоціанового забарвлення. Язичкові квітки овальної форми, жовті; трубчасті – жовті, без антоціанового забарвлення.

Сім'янки середнього розміру, широко-яйцевидної форми; чорні з сірими, розташованими по краях і боках одночасно смужками. Маса 1000 сім'янок 58г.

Вегетаційний період 121 день. Середня урожайність за роки випробування 28,9 – 30,6 ц/га, потенційна 52,9 ц/га, вміст жиру 47,6%, лушпинність 22%.

Гібрид генетично стійкий до вовчку (раса Е), мільдю (раса 4) і середньостійкий до вилягання, осипання, посухи.

Рекомендований для зон Степу та Лісостепу.

Діаболо. Простий міжлінійний гібрид на стерильній основі.

Заявник – фірма Лімагрейн Женетік (Франція).

Рослини заввишки до 170 см, нерозгалужені. Стебло прямостояче середньооблиствене та опушене. Листки великі, зелені, зубчастість середня, регулярна. Антоціанове забарвлення молодих листочків відсутнє. Листова пластинка середньогорбкувата, без блиску. Форма поперечного розрізу плеската, крила відсутні; кут розходження бічних жилок гострий. Кошик великий, опуклий, повернений донизу. Листочки обгортки округлі без антоціану. Забарвлення язичкових квіток оранжеве, форма округла; трубчасті квітки жовті з слабким антоціановим забарвленням. Сім'янки середнього розміру, видовжено-яйцевидної форми, чорні з сірими смужками.

Вегетаційний період 123 - 130 днів. Середня урожайність за роки випробування в зоні Степу 28,7 ц/га, Лісостепу 26,1 ц/га, максимальна урожайність становила 42,4 ц/га. Вміст жиру 53 -55%, білку 16 – 17%. Гібрид стійкий до вилягання, осипання. Генетично стійкий до мільдю (Європейські раси).

Рекомендований для зон Степу та Лісостепу.

Оксана. Простий міжлінійний гібрид на стерильній основі. Заявник фірма НДУ “Магроселект”, (Молдова).

Рослин заввишки до 175 см, стебло прямостояче, середньо опушене і облиствене. Листки серцеподібні, світло зелені; листова пластинка з блиском, слабогорбкувата, без антоціану. Зубчастість регулярна, середня, крила відсутні, форма поперечного розрізу опукла, кут розходження бічних жилок прямий. Кошик середнього розміру, опуклий, похилий. Листочки обгортки без антоціану, видовжені. Язичкові квітки овальної форми, жовті; трубчасті – червона без антоціану, видовжені. Сім'янки широко-яйцевидної форми, чорні з сірими розташованими по краях смужками. Маса 1000 насінин – 50г.

Вегетаційний період 128 днів. Середня урожайність за роки випробування в зоні Степу становила 28,7ц/га, в зоні Лісостепу – 27,0 ц/га, максимальна урожайність – 46,0 ц/га. Вміст жиру 48,5– 50,3%, білку 18,8 – 19,4%, лушпинність – 22%.

Гібрид стійкий до ураження пероноспорозом, середньо стійкий до вовчку, гнилей, фомопсису.

Рекомендований для зон Степу та Лісостепу.

Лан 105. Простий міжлінійний гібрид на стерильній основі (батьківські форми: мати Л-10А, батько Х711В), створений ТОВ “Технаука”.

Рослини заввишки до 165 см, стебло прямостояче, середньооблиствене, слабо опушене.

Листки середнього розміру, серцеподібні, без антоціану і блиску, зелені. Листова пластинка середньогорбкувата, з регулярними зубчиками; крила відсутні, кут розходження бічних жилок прямий. Кошик напівпохилений вниз, середнього розміру, плескатий, листочки обгортки овальної форми, без антоціану. Язичкові квітки видовженої форми, жовті; трубчасті – жовті, без антоціану. Сім'янки середнього розміру, широко-яйцевидної форми, чорні з сірими, розташованими по краях смужками. Маса 1000 насінин 84г.

Рекомендований для зон Степу та Лісостепу.

Діаболо. Простий міжлінійний гібрид на стерильній основі.

Заявник – фірма Лімагрейн Женетік (Франція).

Рослини заввишки до 170 см, нерозгалужені. Стебло прямостояче середньооблиствене та опушене. Листки великі, зелені, зубчастість середня, регулярна. Антоціанове забарвлення молодих листочків відсутнє. Листова пластинка середньогорбкувата, без блиску. Форма поперечного розрізу плеската, крила відсутні; кут розходження бічних жилок гострий. Кошик великий, опуклий, повернений донизу. Листочки обгортки округлі без антоціану. Забарвлення язичкових квіток оранжеве, форма округла; трубчасті квітки жовті з слабким антоціановим забарвленням. Сім'янки середнього розміру, видовжено-яйцевидної форми, чорні з сірими смужками.

Вегетаційний період 123 - 130 днів. Середня урожайність за роки випробування в зоні Степу 28,7 ц/га, Лісостепу 26,1 ц/га, максимальна урожайність становила 42,4 ц/га. Вміст жиру 53 -55%, білку 16 – 17%. Гібрид стійкий до вилягання, осипання. Генетично стійкий до мільдю (Європейські раси).

Рекомендований для зон Степу та Лісостепу.

Оксана. Простий міжлінійний гібрид на стерильній основі. Заявник фірма НДУ “Магроселект”, (Молдова).

Рослин заввишки до 175 см, стебло прямостояче, середньо опушене і облиствене. Листки серцеподібні, світло зелені; листова пластинка з блиском, слабогорбкувата, без антоціану. Зубчастість регулярна, середня, крила відсутні, форма поперечного розрізу опукла, кут розходження бічних жилок прямий. Кошик середнього розміру, опуклий, похилий. Листочки обгортки без антоціану, видовжені. Язичкові квітки овальної форми, жовті; трубчасті – червона без антоціану, видовжені. Сім'янки широко-яйцевидної форми, чорні з сірими розташованими по краях смужками. Маса 1000 насінин – 50г.

Вегетаційний період 128 днів. Середня урожайність за роки випробування в зоні Степу становила 28,7ц/га, в зоні Лісостепу – 27,0 ц/га, максимальна урожайність – 46,0 ц/га. Вміст жиру 48,5– 50,3%, білку 18,8 – 19,4%, лушпинність – 22%.

Гібрид стійкий до ураження пероноспорозом, середньо стійкий до вовчку, гнилей, фомопсису.

Рекомендований для зон Степу та Лісостепу.

Лан 105. Простий міжлінійний гібрид на стерильній основі (батьківські форми: мати Л-10А, батько Х711В), створений ТОВ “Технаука”.

Рослини заввишки до 165 см, стебло прямостояче, середньооблиствене, слабо опушене.

Листки середнього розміру, серцеподібні, без антоціану і блиску, зелені. Листова пластинка середньогорбкувата, з регулярними зубчиками; крила відсутні, кут розходження бічних жилок прямий. Кошик напівпохилений вниз, середнього розміру, плескатий, листочки обгортки овальної форми, без антоціану. Язичкові квітки видовженої форми, жовті; трубчасті – жовті, без антоціану. Сім'янки середнього розміру, широко-яйцевидної форми, чорні з сірими, розташованими по краях смужками. Маса 1000 насінин 84г.

Рекомендований для зон Степу та Лісостепу.

Діаболо. Простий міжлінійний гібрид на стерильній основі.

Заявник – фірма Лімагрейн Женетік (Франція).

Рослини заввишки до 170 см, нерозгалужені. Стебло прямостояче середньооблиствене та опушене. Листки великі, зелені, зубчастість середня, регулярна. Антоціанове забарвлення молодих листочків відсутнє. Листова пластинка середньогорбувата, без блиску. Форма поперечного розрізу плеската, крила відсутні; кут розходження бічних жилок гострий. Кошик великий, опуклий, повернений донизу. Листочки обгортки округлі без антоціану. Забарвлення язичкових квіток оранжеве, форма округла; трубчасті квітки жовті з слабким антоціановим забарвленням. Сім'янки середнього розміру, видовжено-яйцевидної форми, чорні з сірими смужками.

Вегетаційний період 123 - 130 днів. Середня урожайність за роки випробування в зоні Степу 28,7 ц/га, Лісостепу 26,1 ц/га, максимальна урожайність становила 42,4 ц/га. Вміст жиру 53 -55%, білку 16 – 17%. Гібрид стійкий до вилягання, осипання. Генетично стійкий до мільдю (Європейські раси).

Рекомендований для зон Степу та Лісостепу.

Оксана. Простий міжлінійний гібрид на стерильній основі. Заявник фірма НДУ “Магроселект”, (Молдова).

Рослин заввишки до 175 см, стебло прямостояче, середньо опушене і облиствене. Листки серцеподібні, світло зелені; листова пластинка з блиском, слабогорбувата, без антоціану. Зубчастість регулярна, середня, крила відсутні, форма поперечного розрізу опукла, кут розходження бічних жилок прямий. Кошик середнього розміру, опуклий, похилий. Листочки обгортки без антоціану, видовжені. Язичкові квітки овальної форми, жовті; трубчасті – червона без антоціану, видовжені. Сім'янки широко-яйцевидної форми, чорні з сірими розташованими по краях смужками. Маса 1000 насінин – 50г.

Вегетаційний період 128 днів. Середня урожайність за роки випробування в зоні Степу становила 28,7ц/га, в зоні Лісостепу – 27,0 ц/га, максимальна урожайність – 46,0 ц/га. Вміст жиру 48,5– 50,3%, білку 18,8 – 19,4%, лушпинність – 22%.

Гібрид стійкий до ураження пероноспорозом, середньо стійкий до вовчку, гнилей, фомопсису.

Рекомендований для зон Степу та Лісостепу.

Лан 105. Простий міжлінійний гібрид на стерильній основі (батьківські форми: мати Л-10А, батько Х711В), створений ТОВ “Технаука”.

Рослини заввишки до 165 см, стебло прямостояче, середньооблиствене, слабо опушене.

Листки середнього розміру, серцеподібні, без антоціану і блиску, зелені. Листова пластинка середньогорбувата, з регулярними зубчиками; крила відсутні, кут розходження бічних жилок прямий. Кошик напівпохилений вниз, середнього розміру, плескатий, листочки обгортки овальної форми, без антоціану. Язичкові квітки видовженої форми, жовті; трубчасті – жовті, без антоціану. Сім'янки середнього розміру, широко-яйцевидної форми, чорні з сірими, розташованими по краях смужками. Маса 1000 насінин 84г.

Вегетаційний період 108 днів. Середня урожайність за роки випробування 23 -24 ц/га, потенційна 44,5 ц/га. Вміст жиру 51%, білку – 21%, лушпинність 23,2%.

Гібрид відносно стійкий до вовчку, пероноспорозу, іржі.

Рекомендований для зон Степу та Лісостепу.

Нібас. Трьохлінійний гібрид на стерильній основі (батьківські форми: мати – простий гібрид АМ-08хВНА-343; батько – РМ-68), створений ТОВ агрофірма “Нібас”.

Рослини заввишки 185 см, стебло прямостояче, слабо опушене, середньооблиствене. Листки середнього розміру, серцеподібні, зелені. Листова пластинка без антоціанового забарвлення і блиску, середньогорбкувата. Зубчастість середня, нерегулярна; форма поперечного розрізу плеската, крила наявні, кут розходження бічних жилок прямий. Кошик невеликий, опуклий, листочки обгортки округлої форми, без антоціану. Язичкові квітки овальної форми, блідо-жовті; трубчасті – жовті без антоціану. Сім'янки видовжено-яйцевидної форми, чорні з сірими смужками. Маса 1000 сім'янок 85г.

Вегетаційний період 110 днів, середня урожайність за роки випробування 25,2 ц/га, потенційна 39,3 ц/га, вміст жиру 50,1%, лушпинність 22%.

Хворобами уражується в незначній мірі.

Рекомендований для зони Лісостепу.

Оксана. Простий міжлінійний гібрид на стерильній основі. Заявник фірма НДУ “Макроселект”, (Молдова).

Рослин заввишки до 175 см, стебло прямостояче, середньо опушене і облиствене. Листки серцеподібні, світло зелені; листова пластинка з блиском, слабогорбкувата, без антоціану. Зубчастість регулярна, середня, крила відсутні, форма поперечного розрізу опукла, кут розходження бічних жилок прямий. Кошик середнього розміру, опуклий, похилий. Листочки обгортки без антоціану, видовжені. Язичкові квітки овальної форми, жовті; трубчасті – червона без антоціану, видовжені. Сім'янки широко-яйцевидної форми, чорні з сірими розташованими по краях смужками. Маса 1000 насінин – 50г.

Вегетаційний період 128 днів. Середня урожайність за роки випробування в зоні Степу становила 28,7ц/га, в зоні Лісостепу – 27,0 ц/га, максимальна урожайність – 46,0 ц/га. Вміст жиру 48,5– 50,3%, білку 18,8 – 19,4%, лушпинність – 22%.

Гібрид стійкий до ураження пероноспорозом, середньо стійкий до вовчку, гнилей, фомопсису.

Рекомендований для зон Степу та Лісостепу.

Перформер. Простий міжлінійний гібрид на стерильній основі створений фірмою НДУ “Магроселект”, (Молдова).

Рослини заввишки до 175 см, стебло прямостояче середньо опушене и обліснене. Листки середнього розміру, серцеподібні, світло-зелені.

Вегетаційний період 108 днів. Середня урожайність за роки випробування 23 -24 ц/га, потенційна 44,5 ц/га. Вміст жиру 51%, білку – 21%, лушпинність 23,2%.

Гібрид відносно стійкий до вовчку, пероноспорозу, іржі.

Рекомендований для зон Степу та Лісостепу.

Нібас. Трьохлінійний гібрид на стерильній основі (батьківські форми: мати – простий гібрид АМ-08хВНА-343; батько – РМ-68), створений ТОВ агрофірма “Нібас”.

Рослини заввишки 185 см, стебло прямостояче, слабо опушене, середньооблиствене. Листки середнього розміру, серцеподібні, зелені. Листова пластинка без антоціанового забарвлення і блиску, середньогорбкувата. Зубчастість середня, нерегулярна; форма поперечного розрізу плеската, крила наявні, кут розходження бічних жилок прямий. Кошик невеликий, опуклий, листочки обгортки округлої форми, без антоціану. Язичкові квітки овальної форми, блідо-жовті; трубчасті – жовті без антоціану. Сім'янки видовжено-яйцевидної форми, чорні з сірими смужками. Маса 1000 сім'янок 85г.

Вегетаційний період 110 днів, середня урожайність за роки випробування 25,2 ц/га, потенційна 39,3 ц/га, вміст жиру 50,1%, лушпинність 22%.

Хворобами уражується в незначній мірі.

Рекомендований для зони Лісостепу.

Оксана. Простий міжлінійний гібрид на стерильній основі. Заявник фірма НДУ “Макроселект”, (Молдова).

Рослин заввишки до 175 см, стебло прямостояче, середньо опушене і облиствене. Листки серцеподібні, світло зелені; листова пластинка з блиском, слабогорбкувата, без антоціану. Зубчастість регулярна, середня, крила відсутні, форма поперечного розрізу опукла, кут розходження бічних жилок прямий. Кошик середнього розміру, опуклий, похилий. Листочки обгортки без антоціану, видовжені. Язичкові квітки овальної форми, жовті; трубчасті – червона без антоціану, видовжені. Сім'янки широко-яйцевидної форми, чорні з сірими розташованими по краях смужками. Маса 1000 насінин – 50г.

Вегетаційний період 128 днів. Середня урожайність за роки випробування в зоні Степу становила 28,7ц/га, в зоні Лісостепу – 27,0 ц/га, максимальна урожайність – 46,0 ц/га. Вміст жиру 48,5– 50,3%, білку 18,8 – 19,4%, лушпинність – 22%.

Гібрид стійкий до ураження пероноспорозом, середньо стійкий до вовчку, гнилей, фомопсису.

Рекомендований для зон Степу та Лісостепу.

Перформер. Простий міжлінійний гібрид на стерильній основі створений фірмою НДУ “Магроселект”, (Молдова).

Рослини заввишки до 175 см, стебло прямостояче середньо опушене и обліснене. Листки середнього розміру, серцеподібні, світло-зелені.

Вегетаційний період 108 днів. Середня урожайність за роки випробування 23 -24 ц/га, потенційна 44,5 ц/га. Вміст жиру 51%, білку – 21%, лушпинність 23,2%.

Гібрид відносно стійкий до вовчку, пероноспорозу, іржі.

Рекомендований для зон Степу та Лісостепу.

Нібас. Трьохлінійний гібрид на стерильній основі (батьківські форми: мати – простий гібрид АМ-08хВНА-343; батько – РМ-68), створений ТОВ агрофірма “Нібас”.

Рослини заввишки 185 см, стебло прямостояче, слабо опушене, середньооблиствене. Листки середнього розміру, серцеподібні, зелені. Листова пластинка без антоціанового забарвлення і блиску, середньогорбкувата. Зубчастість середня, нерегулярна; форма поперечного розрізу плеската, крила наявні, кут розходження бічних жилок прямий. Кошик невеликий, опуклий, листочки обгортки округлої форми, без антоціану. Язичкові квітки овальної форми, блідо-жовті; трубчасті – жовті без антоціану. Сім'янки видовжено-яйцевидної форми, чорні з сірими смужками. Маса 1000 сім'янок 85г.

Вегетаційний період 110 днів, середня урожайність за роки випробування 25,2 ц/га, потенційна 39,3 ц/га, вміст жиру 50,1%, лушпинність 22%.

Хворобами уражується в незначній мірі.

Рекомендований для зони Лісостепу.

Оксана. Простий міжлінійний гібрид на стерильній основі. Заявник фірма НДУ “Макроселект”, (Молдова).

Рослин заввишки до 175 см, стебло прямостояче, середньо опушене і облиствене. Листки серцеподібні, світло зелені; листова пластинка з блиском, слабогорбкувата, без антоціану. Зубчастість регулярна, середня, крила відсутні, форма поперечного розрізу опукла, кут розходження бічних жилок прямий. Кошик середнього розміру, опуклий, похилий. Листочки обгортки без антоціану, видовжені. Язичкові квітки овальної форми, жовті; трубчасті – червона без антоціану, видовжені. Сім'янки широко-яйцевидної форми, чорні з сірими розташованими по краях смужками. Маса 1000 насінин – 50г.

Вегетаційний період 128 днів. Середня урожайність за роки випробування в зоні Степу становила 28,7ц/га, в зоні Лісостепу – 27,0 ц/га, максимальна урожайність – 46,0 ц/га. Вміст жиру 48,5– 50,3%, білку 18,8 – 19,4%, лушпинність – 22%.

Гібрид стійкий до ураження пероноспорозом, середньо стійкий до вовчку, гнилей, фомопсису.

Рекомендований для зон Степу та Лісостепу.

Перформер. Простий міжлінійний гібрид на стерильній основі створений фірмою НДУ “Магроселект”, (Молдова).

Рослини заввишки до 175 см, стебло прямостояче середньо опушене и обліснене. Листки середнього розміру, серцеподібні, світло-зелені.

Листова пластинка без антоціанового забарвлення, з блиском, слабкогорбувата; зубчастість середня, регулярна. Форма поперечного розрізу опукла. Крила відсутні. Кут розходження бічних жилок прямий. Кошик похилий, середнього розміру, опуклий. Листочки обгортки видовженої форми без антоціану. Язичкові квітки овальної форми, жовті; трубчасті – червоні без антоціану. Сім'янки широко-яйцевидної форми, чорні з сірими розташованими по краях смужками. Маса 1000 насінин 65г.

Вегетаційний період 117-125 днів. Середня урожайність за роки випробування в зоні Степу 27,9ц/га, в зоні Лісостепу 28,1 ц/га, максимальна 49,6 ц/га. Вміст жиру – 49,5 – 51,1%, білку 17,0 – 18,6%, лушпинність 23%.

Гібрид стійкий до пероноспорозу, іржі, пошкодження соняшниковою міллю, середньо стійкий до фомопсису, вовчку, гнилей. Рекомендований для зон Степу та Лісостепу.

Vitalia. Простий міжлінійний гібрид на стерильній основі створений НДУ “Магроселект”, (Молдова).

Рослини заввишки до 170 см, стебло прямостояче, нерозгалужене, середньо опушене і обліснене. Листки середнього розрізу, серцеподібні, світло-зелені. Листова пластинка без антоціанового забарвлення, з блиском, слабкогорбувата; зубчастість середня, регулярна, крила відсутні, форма поперечного розрізу опукла. Кут розходження бічних жилок прямий. Кошик похилий, середнього розміру, опуклий. Листочки обгортки без антоціану, видовжені. Язичкові квітки овальної форми, жовті; трубчасті – червоні без антоціану. Сім'янки широко-яйцевидної форми, чорні з сірими розташованими по краях смужками. Маса 1000 сім'янок 60г.

Вегетаційний період 115-120 днів. Середня урожайність за роки випробування в зоні Степу становила 29,3 ц/га, в зоні Лісостепу 25,1 ц/га, максимальна 40,8 ц/га. Вміст жиру – 54-56%, білку – 16,9%, лушпинність 25%.

Гібрид стійкий до вовчку, пероноспорозу, іржі.

Рекомендований для зон Степу та Лісостепу.

СОЯ

Валюта. Заявники-Інститут кормів УААН, Кіровоградська державна сільськогосподарська дослідна станція.

Сорт створений шляхом індивідуально-групового відбору з гібридів від схрещування сортів Петровка + Аврора.

Підвид - манчжурський, апробаційна група – сордіда.

Форма рослин компактна, стебло зелене з густим рудим опушенням і прямим закінченням, висотою 80-140 см. Суцвіття-китиця, 8-10 квіток на квітконіжці. Квітка середня, фіолетова. Біб світло-рудий, слабкозігнутий, середня кількість насінин у бобі 3,2, максимальна – 4. Насінина овальна, середнього розміру, жовта без пігментації. Рубчик коричневий, великий, овальної форми. Маса 1000 насінин 136,7 г.

Вегетаційний період в зоні Степу 115 днів, середня урожайність за роки випробування в зоні Степу 17,5 ц/га. Вміст сирого протеїну 34,9%, вміст жиру - 23,6%.

Рекомендований для зони Степу.

Листова пластинка без антоціанового забарвлення, з блиском, слабкогорбувата; зубчастість середня, регулярна. Форма поперечного розрізу опукла. Крила відсутні. Кут розходження бічних жилок прямий. Кошик похилий, середнього розміру, опуклий. Листочки обгортки видовженої форми без антоціану. Язичкові квітки овальної форми, жовті; трубчасті – червоні без антоціану. Сім'янки широко-яйцевидної форми, чорні з сірими розташованими по краях смужками. Маса 1000 насінин 65г.

Вегетаційний період 117-125 днів. Середня урожайність за роки випробування в зоні Степу 27,9ц/га, в зоні Лісостепу 28,1 ц/га, максимальна 49,6 ц/га. Вміст жиру – 49,5 – 51,1%, білку 17,0 – 18,6%, лушпинність 23%.

Гібрид стійкий до пероноспорозу, іржі, пошкодження соняшниковою міллю, середньо стійкий до фомопсису, вовчку, гнилей. Рекомендований для зон Степу та Лісостепу.

Vitalia. Простий міжлінійний гібрид на стерильній основі створений НДУ “Магроселект”, (Молдова).

Рослини заввишки до 170 см, стебло прямостояче, нерозгалужене, середньо опушене і обліснене. Листки середнього розрізу, серцеподібні, світло-зелені. Листова пластинка без антоціанового забарвлення, з блиском, слабкогорбувата; зубчастість середня, регулярна, крила відсутні, форма поперечного розрізу опукла. Кут розходження бічних жилок прямий. Кошик похилий, середнього розміру, опуклий. Листочки обгортки без антоціану, видовжені. Язичкові квітки овальної форми, жовті; трубчасті – червоні без антоціану. Сім'янки широко-яйцевидної форми, чорні з сірими розташованими по краях смужками. Маса 1000 сім'янок 60г.

Вегетаційний період 115-120 днів. Середня урожайність за роки випробування в зоні Степу становила 29,3 ц/га, в зоні Лісостепу 25,1 ц/га, максимальна 40,8 ц/га. Вміст жиру – 54-56%, білку – 16,9%, лушпинність 25%.

Гібрид стійкий до вовчку, пероноспорозу, іржі.

Рекомендований для зон Степу та Лісостепу.

СОЯ

Валюта. Заявники-Інститут кормів УААН, Кіровоградська державна сільськогосподарська дослідна станція.

Сорт створений шляхом індивідуально-групового відбору з гібридів від схрещування сортів Петровка + Аврора.

Підвид - манчжурський, апробаційна група – сордіда.

Форма рослин компактна, стебло зелене з густим рудим опушенням і прямим закінченням, висотою 80-140 см. Суцвіття-китиця, 8-10 квіток на квітконіжці. Квітка середня, фіолетова. Біб світло-рудий, слабкозігнутий, середня кількість насінин у бобі 3,2, максимальна – 4. Насінина овальна, середнього розміру, жовта без пігментації. Рубчик коричневий, великий, овальної форми. Маса 1000 насінин 136,7 г.

Вегетаційний період в зоні Степу 115 днів, середня урожайність за роки випробування в зоні Степу 17,5 ц/га. Вміст сирого протеїну 34,9%, вміст жиру - 23,6%.

Рекомендований для зони Степу.

Артеміда. Заявники - Інститут кормів УААН, Красноградська дослідна станція.

Сорт створений шляхом індивідуального відбору із сорту Красноградська 86.

Підвид - маньчжурський, апробаційна група - абенарія.

Стебло зелене, з білим і рідким опушенням і верхівкою висотою 78-90 см, що в'ється. Суцвіття - китиця, 12-14 квіток на квітконіжці. Квітка дрібна, фіолетова. Біб світло-пісочний, зігнутий, на кінці з дзьобиком, середня кількість насінин у бобі 2, 6, максимальна -- 4. Насінина овальна, середнього розміру, жовта. Рубчик світло-коричневий, середнього розміру, овальної форми. Маса 1000 насінин 132,5 г.

Веgetаційний період в зоні Степу 111,3 дня, середня урожайність за роки випробування в зоні Степу 24,7 ц/га. Вміст сирого протеїну 39,7%, вміст жиру 22,2%. Стійкий до хвороб.

Рекомендований для зони Степу.

Анатоліївна. Заявники – Інститут кормів УААН, Кіровоградське НВО «Еліта».

Сорт створений шляхом індивідуального відбору із гібридної комбінації Кіровоградська 5 + (Фіскебі+Харсой).

Підвид – маньчжурський, апробаційна група – латіфолія.

Форма рослин розлога, стебло зелене з рідким рудим опушенням, тип росту детермінантний, середня висота 90-110 см. Суцвіття – китиця, 8-12 квіток на квітконіжці. Квітка дрібна, біла. Біб рудий, опуклий. На кінці з дзьобиком, кількість насінин у бобі в середньому 2,9, максимальна – 4. Насіння овальне, середнього розміру, жовте з чорною пігментацією. Рубчик чорний, середнього розміру, овальної форми. Маса 1000 насінин 146 г.

Веgetаційний період у зоні Степу – 121,4 дня, середня урожайність за роки випробування у зоні Степу 19,8 ц/га. Вміст протеїну 33,2%, вміст жиру 25,1%.

Рекомендований для зони Степу.

Оксана. Заявники - Інститут кормів УААН, Інститут зрошуваного землеробства УААН.

Сорт створений шляхом індивідуального відбору із гібридної комбінації Вілкін + Білосніжка.

Підвид - маньчжурський, апробаційна група - цінерада.

Форма рослин компактна, стебло зелене з рудим і рідким опушенням, висотою 150-165 см. Суцвіття-китиця, 12-14 квіток на квітконіжці. Квітка дрібна, біла. Біб рудий, опуклий, на кінці з дзьобиком, середня кількість насінин у бобі 3,5, максимальна – 4. Насінина середнього розміру округлої форми, жовте з чорно-коричневою пігментацією. Рубчик чорний з вічком, середній, овальної форми. Маса 1000 насінин 138,9 г.

Веgetаційний період в зоні Степу --120,6 дня, середня урожайність за роки випробування в зоні Степу (на зрошенні) –18,8 ц/га. Вміст сирого протеїну 37,6%, вміст жиру 21,4%.

Рекомендований для зони Степу.

Прикарпатська 96. Заявники - Івано-Франківська державна сільськогосподарська дослідна станція, Інститут кормів УААН.

Сорт створений шляхом індивідуально відбору із сорту Мейпл Ероу.

Підвид - маньчжурський, апробаційна група - віріда.

Форма рослин напіврозлога, стебло зелене з жовто-бурим опушенням, висотою 70-85 см. Тип росту детермінантний. Суцвіття - китиця, 2-5 квіток на квітконіжці. Квітка дрібна, фіолетова. Біб рудий, плоский на кінці з дзьобиком, середня кількість насінин у бобі 2,3, максимальна - 3. Насінина дрібна, овальної форми, жовта. Рубчик жовто-зелений, лінійний, середнього розміру. Маса 1000 насінин 138,9 г.

Вегетаційний період в зоні Степу -109,7 дня, середня урожайність за роки випробування в зоні Лісостепу - 17,8 ц/га, у зоні Степу - 16,9 ц/га. Вміст сирого протеїну 34,4%, вміст жиру 23,0%.

Рекомендований для зони Степу.

Київська 98. Заявник - Інститут землеробства УААН. Підвид маньчжурський, апробаційна група - сордіда.

Форма рослини проміжна, стебло зелене з рудим опушенням, прямим закінченням, висотою 85-95 см. Суцвіття - китиця, 12-13 квіток на квітконіжці. Квітка велика, фіолетова. Біб темно-коричневий, слабо зігнутий, з загостреною верхівкою, кількість насінин у бобі в середньому 2-2,5, максимальна - 4. Насінина овальна, жовта, без пігментації, середнього розміру. Рубчик овально-подовжений, коричневий. Маса 1000 насінин - 160г.

Тип росту напівдетермінантний, малогіллястий.

Вегетаційний період (від входів до господарської стиглості) в зоні Полісся 121,9 днів, Лісостепу 113,0 днів, середня урожайність за роки випробування у зоні Полісся 17,6 ц/га, у зоні Лісостепу - 17,8 ц/га. Вміст сирого протеїну 34,6-36,8%, вміст жиру 21,8-22,0%.

Рекомендований для зон Лісостепу та Полісся.

Подільська 416. Заявники Інститут агроєкології та біотехнології УААН, Подільська державна аграрно-технічна академія, Інститут кормів УААН.

Апробаційна група сордіда.

Форма рослини компактна, стебло зелене з рудим опушенням, проміжним типом верхівки, висотою 80-100 см. Суцвіття китиця, 8-12 квіток на квітконіжці. Квітка середнього розміру, фіолетова. Біб темно-коричневий, слабозігнутий, кількість насінин у бобі в середньому 2,25, максимальна - 4. Насінина овальна або округла, жовта, без пігментації, рідко з коричневою пігментацією. Рубчик коричневий, середньої величини, овальної форми. Маса 1000 насінин 148г.

Вегетаційний період (від сходів до господарської стиглості) 107,2-116,2 днів, середня урожайність за роки випробування 20,3-26,4 ц/га. Вміст сирого протеїну 36,4-37,4%, жиру 22,2-23,2%.

Рекомендований для зони Лісостепу.

Хаджибей. Заявник - Селекційно-генетичний інститут УААН. Підвид -манчжурський, апробаційна група латіфолія.

Форма рослини компактна, кущ стиснутого типу, стебло зелене з рудим опушенням, з прямим закінченням, висотою 80-90 см. Суцвіття - китиця, 7-9 квіток на квітконіжці. Квітка велика, біла. Біб рудий, прямий, кількість насінин у бобі в середньому 2,4, максимальна 3. Насінина нирковидна, жовта, середнього розміру. Рубчик крупний, видовженої форми, чорний. Маса 1000 насінин 142 г.

Веgetаційний період (від сходів до господарської стиглості) 114-126,8 днів, середня урожайність за роки випробування 25,7 ц/га. Вміст сирого протеїну 36,9%, жиру - 21,8 %.

Рекомендований для зони Лісостепу.

Чернівецька 9. Заявники - Чернівецька державна дослідна сільськогосподарська станція УААН, Інститут землеробства УААН.

Апробаційна група сордіда.

Форма рослини компактна, стебло зелене з рижим опушенням і прямим закінченням, висотою 62-69 см. Суцвіття - китиця, 7-8 квіток на квітконіжці. Квітка велика, фіолетова. Біб коричневий, слабо зігнутий, кількість насінин у бобі 3-4. Насінина округла, жовта. Рубчик коричневий з вічком.

Детермінантний тип росту, гілки розміщені на стеблі під гострим кутом.

Веgetаційний період (від сходів до господарської стиглості) 111,6-117,5 днів, середня урожайність за роки випробування 18,9-23,8 ц/га. Вміст сирого протеїну 36,3%, жиру - 21,4-21,6%.

Рекомендований для зон Степу та Лісостепу.

Аполлон. Заявник - Інститут зрошуваного землеробства УААН.

Сорт створений шляхом гібридизації двох сортів США: Вілкін х Ходсон з послідуочим чотирьохразовим індивідуальним доббором.

Гіпокотиль з антоціановим забарвленням. Тип росту індетермінантний, габітус рослини прямостійний,- висота рослини до 105 см., рослини з сірим опушенням. Листочок середнього розміру, бокові листочки овальної форми, темно-зелені.

Квітка фіолетова. Біб світло-коричневий. Насінина середнього розміру, видовженої форми, жовтого забарвлення. Рубчик сірого забарвлення.

Веgetаційний період 116 - 149 днів; середня урожайність за роки випробування в зоні Степу 19,7 ц/га, в зоні Лісостепу 21,8 ц/га, в зоні Полісся 18,4 ц/га. Вміст сирого протеїну 31,7 -36,4 %, вміст жиру 22,5 - 23,8%.

Маса 1000 насінин 195г. Сорт стійкий до вилягання, осипання, середньо стійкий до ураження хворобами та пошкодження шкідниками.

Рекомендований для зон Степу, Лісостепу та Полісся.

Донька. Заявник - Селекційно-генетичний інститут УААН.

Сорт створений шляхом масового добору рослин із підвищеною кількістю бульбочок із сорту Пальміра при інокуляції насіння перед сівною препаратами бульбочкових бактерій.

Хаджибей. Заявник - Селекційно-генетичний інститут УААН. Підвид -манчжурський, апробаційна група латіфолія.

Форма рослини компактна, кущ стиснутого типу, стебло зелене з рудим опушенням, з прямим закінченням, висотою 80-90 см. Суцвіття - китиця, 7-9 квіток на квітконіжці. Квітка велика, біла. Біб рудий, прямий, кількість насінин у бобі в середньому 2,4, максимальна 3. Насінина нирковидна, жовта, середнього розміру. Рубчик крупний, видовженої форми, чорний. Маса 1000 насінин 142 г.

Вегетаційний період (від сходів до господарської стиглості) 114-126,8 днів, середня урожайність за роки випробування 25,7 ц/га. Вміст сирого протеїну 36,9%, жиру - 21,8 %.

Рекомендований для зони Лісостепу.

Чернівецька 9. Заявники - Чернівецька державна дослідна сільськогосподарська станція УААН, Інститут землеробства УААН.

Апробаційна група сордіда.

Форма рослини компактна, стебло зелене з рижим опушенням і прямим закінченням, висотою 62-69 см. Суцвіття - китиця, 7-8 квіток на квітконіжці. Квітка велика, фіолетова. Біб коричневий, слабо зігнутий, кількість насінин у бобі 3-4. Насінина округла, жовта. Рубчик коричневий з вічком.

Детермінантний тип росту, гілки розміщені на стеблі під гострим кутом.

Вегетаційний період (від сходів до господарської стиглості) 111,6-117,5 днів, середня урожайність за роки випробування 18,9-23,8 ц/га. Вміст сирого протеїну 36,3%, жиру - 21,4-21,6%.

Рекомендований для зон Степу та Лісостепу.

Аполлон. Заявник - Інститут зрошуваного землеробства УААН.

Сорт створений шляхом гібридизації двох сортів США: Вілкін х Ходсон з послідуочим чотирьохразовим індивідуальним добором.

Гіпокотиль з антоціановим забарвленням. Тип росту індетермінантний, габітус рослини прямостійний,- висота рослини до 105 см., рослини з сірим опушенням. Листочок середнього розміру, бокові листочки овальної форми, темно-зелені.

Квітка фіолетова. Біб світло-коричневий. Насінина середнього розміру, видовженої форми, жовтого забарвлення. Рубчик сірого забарвлення.

Вегетаційний період 116 - 149 днів; середня урожайність за роки випробування в зоні Степу 19,7 ц/га, в зоні Лісостепу 21,8 ц/га, в зоні Полісся 18,4 ц/га. Вміст сирого протеїну 31,7 -36,4 %, вміст жиру 22,5 - 23,8%.

Маса 1000 насінин 195г. Сорт стійкий до вилягання, осипання, середньо стійкий до ураження хворобами та пошкодження шкідниками.

Рекомендований для зон Степу, Лісостепу та Полісся.

Донька. Заявник - Селекційно-генетичний інститут УААН.

Сорт створений шляхом масового добору рослин із підвищеною кількістю бульбочок із сорту Пальміра при інокуляції насіння перед сівною препаратами бульбочкових бактерій.

Гіпокотиль з антоціановим забарвленням. Тип росту індетермінантний, габітус рослини прямостійний, висота до 107см. Рослина з рудувато-коричневим опушенням. Листочок малого розміру з боковими листочками овальної форми, зелений.

Квітка фіолетова. Біб темно-коричневий. Насінина середнього розміру, кулясто-приплюснutoї форми, зелено-жовтого забарвлення. Рубчик жовтого забарвлення.

Вегетаційний період 128 - 136 днів. Середня урожайність за роки випробування в зоні Степу 17,7 ц/га, в зоні Лісостепу 19,1 ц/га. Вміст сирого протеїну 34,3 - 36,0%, вміст жиру 22,2 - 23,3%. Маса 1000 насінин 160г.

Сорт стійкий до вилягання, осипання, середньо стійкий до ураження хворобами.

Рекомендований для зон Степу та Лісостепу.

Спринт. Заявник - Інститут олійних культур УААН.

Сорт створени індивідуальним добором з гібридної популяції другого покоління Кубань х Волна.

Гіпокотиль без антоціанового забарвлення. Тип росту індетермінантний, габітус рослини прямостійний, висота рослини до 80 см, рослина з рудувато-коричневим опушенням. Листочок середнього розміру з боковими листочками овальної форми, темно-зелений.

Квітка біла. Біб коричневий. Насінина малого розміру, кулясто-приплюснutoї форми, жовтого забарвлення. Рубчик коричневого забарвлення.

Вегетаційний період 112 - 121 днів. Середня урожайність за роки випробування в зоні Степу 15,6 ц/га, в зоні Лісостепу 18,5 ц/га. Вміст сирого протеїну 35,6 - 36,7%, вміст жиру 22,7 - 23,5%. Маса 1000 насінин 140г.

Сорт стійкий до вилягання, осипання, середньо стійкий до ураження хворобами.

Рекомендований для зон Степу та Лісостепу.

Срібна. Заявник - Інститут олійних культур УААН.

Сорт створено індивідуальним добором з гібридної популяції Високоросла 3 х Ходсон.

Форма рослини широка, стебло зелене з світло-коричневим опушенням і прямим закінченням, середньооблиствене. Висота рослин до 90 см. Листочки трійчасті овально - загострені, цільнокраї. Кінчик листка загострений. Суцвіття - китиця середньої довжини, забарвлення квітконоса зелене. Квітка біла, дрібна. Біб широкий, середньої виповненості, слабо зігнутий із загостреним кінчиком. У бобі в середньому 2-3 насінини, максимально 4. Насінина велика, овальної форми, жовтого забарвлення, без пігментації. Рубчик коричневого забарвлення.

Вегетаційний період 131 - 140 днів. Середня урожайність за роки випробування в зоні Степу 18,4 ц/га, в зоні Лісостепу 18,2 ц/га. Вміст сирого протеїну 30,7 - 39,1%, вміст жиру 21,2 - 23,0%. Вміст в насінні інгібітора трипсину 19,1 мг/г. Маса 1000 насінин 190г.

Сорт відрізняється стійкістю до розтріскування бобів, до вилягання, осипання. Ураження хворобами незначне.

Рекомендований для зон Степу та Лісостепу.

Гіпокотиль з антоціановим забарвленням. Тип росту індетермінантний, габітус рослини прямостійний, висота до 107см. Рослина з рудувато-коричневим опушенням. Листочок малого розміру з боковими листочками овальної форми, зелений.

Квітка фіолетова. Біб темно-коричневий. Насінина середнього розміру, кулясто-приплюснutoї форми, зелено-жовтого забарвлення. Рубчик жовтого забарвлення.

Веgetаційний період 128 - 136 днів. Середня урожайність за роки випробування в зоні Степу 17,7 ц/га, в зоні Лісостепу 19,1 ц/га. Вміст сирого протеїну 34,3 - 36,0%, вміст жиру 22,2 - 23,3%. Маса 1000 насінин 160г.

Сорт стійкий до вилягання, осипання, середньо стійкий до ураження хворобами.

Рекомендований для зон Степу та Лісостепу.

Спринт. Заявник - Інститут олійних культур УААН.

Сорт створени індивідуальним добором з гібридної популяції другого покоління Кубань х Волна.

Гіпокотиль без антоціанового забарвлення. Тип росту індетермінантний, габітус рослини прямостійний, висота рослини до 80 см, рослина з рудувато-коричневим опушенням. Листочок середнього розміру з боковими листочками овальної форми, темно-зелений.

Квітка біла. Біб коричневий. Насінина малого розміру, кулясто-приплюснutoї форми, жовтого забарвлення. Рубчик коричневого забарвлення.

Веgetаційний період 112 - 121 днів. Середня урожайність за роки випробування в зоні Степу 15,6 ц/га, в зоні Лісостепу 18,5 ц/га. Вміст сирого протеїну 35,6 - 36,7%, вміст жиру 22,7 - 23,5%. Маса 1000 насінин 140г.

Сорт стійкий до вилягання, осипання, середньо стійкий до ураження хворобами.

Рекомендований для зон Степу та Лісостепу.

Срібна. Заявник - Інститут олійних культур УААН.

Сорт створено індивідуальним добором з гібридної популяції Високоросла 3 х Ходсон.

Форма рослини широка, стебло зелене з світло-коричневим опушенням і прямим закінченням, середньооблиствене. Висота рослин до 90 см. Листочки трійчасті овально - загострені, цільнокраї. Кінчик листка загострений. Суцвіття - китиця середньої довжини, забарвлення квітконоса зелене. Квітка біла, дрібна. Біб широкий, середньої виповненості, слабо зігнутий із загостреним кінчиком. У бобі в середньому 2-3 насінини, максимально 4. Насінина велика, овальної форми, жовтого забарвлення, без пігментації. Рубчик коричневого забарвлення.

Веgetаційний період 131 - 140 днів. Середня урожайність за роки випробування в зоні Степу 18,4 ц/га, в зоні Лісостепу 18,2 ц/га. Вміст сирого протеїну 30,7 - 39,1%, вміст жиру 21,2 - 23,0%. Вміст в насінні інгібітора трипсину 19,1 мг/г. Маса 1000 насінин 190г.

Сорт відрізняється стійкістю до розтріскування бобів, до вилягання, осипання. Ураження хворобами незначне.

Рекомендований для зон Степу та Лісостепу.

Валентія. Заявники: Інститут фізіології рослин і генетики УААН, Інститут землеробства УААН, Селекційне - генетичний інститут УААН.

Сорт створено методом багаторазового індивідуального відбору з гібриду Київська 27 х Київська скоростигла.

Гіпокотиль з антоціановим забарвленням. Тип росту детермінантний, габітус рослини прямостійний. Рослини заввишки до 80 см. з рудувате -коричневим забарвленням волосків. Листочок середнього розміру, зелений, бокові листочки овальної форми. Квітка фіолетова. Біб коричневий. Висота прикріплення нижнього бобу 13,8 см.

Вегетаційний період 122-130 днів. Середня урожайність за роки випробування становила в зоні Степу 17,7 ц/га, в зоні Лісостепу 20,2 ц/га. Вміст сирого протеїну 35,5 - 35,8%, вміст жиру 23,5 - 25,0%. Маса 1000 насінин 180г.

Сорт стійкий до вилягання, середньо стійкий до осипання і посухи. Ураження хворобами незначне. Сорт відрізняється високою симбіотичною активністю комплексу з бульбочковими бактеріями.

Рекомендований для зон Степу та Лісостепу.

Васильківська. Заявники: Інститут фізіології рослин і генетики УААН, Інститут землеробства УААН, Селекційно - генетичний інститут УААН.

Сорт створений методом багаторазового індивідуального відбору з гібриду Київська 27 х Київська скоростигла.

Гіпокотиль з антоціановим забарвленням. Тип росту детермінантний, габітус рослини прямостійний, висота до 90 см. Листочки середнього розміру, зелені, бокові листочки овальної форми. Квітка фіолетова. Біб коричневий, серповидний. Висота прикріплення нижнього бобу 14,6 - 17,7 см. Насінина середнього розміру, видовженої форми, жовте. Рубчик темно - коричневий.

Вегетаційний період 120 -136 днів. Середня урожайність за роки випробування становила в зоні Степу 18,2 ц/га, в зоні Лісостепу 22,0 ц/га, в зоні Полісся 20,3 ц/га. Вміст сирого протеїну 35,6 - 36,6%, вміст жиру 22,9 - 23,9%. Маса 1000 насінин 170 г.

Сорт стійкий до вилягання, осипання; середньостійкий до ураження хворобами.

Рекомендований для зон Степу, Лісостепу та Полісся.

Офелія. Заявник - Інститут олійних культур УААН.

Сорт виведений індивідуальним відбором у гібридній популяції другого покоління Аванс х л. 88 - 407.

Гіпокотиль без антоціанового забарвлення. Тип росту детермінантний, габітус рослини прямостійний, рослини заввишки 85 см. з сірим забарвленням волосків. Листочок середнього розміру, зелений. Бокові листочки овальної форми. Квітка біла. Біб коричневий. Висота прикріплення нижнього бобу 16,3 см. Насінина середнього розміру, кулястої форми, жовта. Рубчик жовтого забарвлення.

Вегетаційний період 125 днів. Середня урожайність за роки випробування в зоні Степу становила 20,1 ц/га. Вміст сирого протеїну 35,6%, вміст жиру 21,6%. Маса 1000 насінин 145 г.

Сорт стійкий до вилягання, осипання; середньостійкий до посухи. Ураження хворобами незначне.

Рекомендований для зони Степу.

Ранок Поділля - Заявник Вінницька державна сільськогосподарська дослідна станція.

Коренева система добре розвинена, стрижнева з добре вираженим головним коренем.

Стебло прямостояче, заввишки 112-115 см, без антоціану і опушення.

Стебловий листок ліроподібний, прикореневий – ліроподібно-пірчастий. Облиственність 45-50%. Суцвіття – рихла китиця, квітки лимонно-жовті, великі. Кількість стручків на рослині досягає 210-220 шт, кількість насінин у стручку 22-25 шт. Маса 1000 насінин 3-4г. Вегетаційний період 290-295 днів.

Вміст олії в насінні складає 47,1%, білку – 19,7%, глюкозинолатів 0,7%, ерукової кислоти 0,8%.

Сорт за якісними показниками належить до типу - 00, тобто придатний для одержання високоякісної харчової олії і білкових кормів.

Сорт середньостійкий до вилягання, придатний до механізованого збирання. Хворобами уражувався менше стандарту.

Середня врожайність за роки випробування (2001-2002рр) на сортодослідних станціях України становила в зоні Полісся 33,4 ц/га, що на рівні стандартів, по зоні Лісостепу – 34,2 ц/га, що на рівні стандартів, по зоні Степу – 31,9, що вище стандартів на 12 ц/га– сортів Микитинецький, Калинівський, Аріон.

Сорт занесено до Реєстру сортів рослин на 2002 рік по зонах Лісостепу та Полісся України придатного для поширення

Чорний велетень – Вінницька державна сільськогосподарська дослідна станція.

При появі сходів нерозгорнуті сім'ядолі мають синьо-зелений колір. Перші листки розетки сіро-зелені, круглі, злегка ворсисті. Розетка прикорневих листків злегка піднята або компактна. Прикореневі листки черешкові. Всі листки охоплюють стебло на 1/3–2/3. Загальна їх кількість – 16-23.

Стебло циліндричне, розгалужене, заввишки 140-150 см, голе, середній діаметр при основі 15-18мм. Листки зелено-сизі, з нижнього боку опушені.

Корінь стержневий, потужний, веретеноподібний, проникає глибоко в підґрунття.

Суцвіття – нещільна китиця. Бутони різного ступня розвитку розміщені вище квіток. Середня кількість квіток у китиці 20-40, на головному стеблі їх буває 75-80 шт.

Рослина починає цвісти з головної китиці. Кожна квітка цвіте впродовж 2-2,5 днів, а вся рослина 25-30 днів. Тривалість цвітіння залежить від кліматичних умов, сортових особливостей, строків сівби, забезпеченість добривами.

Плід – стручок завдовжки 6-12 см. Кількість стручків на рослині 300-400 шт. Стручки розміщені під прямим або тупим кутом до стебла.

Насіння кругле, чорно-синє. Діаметр 1,7-2,5 мм. Маса 1000 насінин 3-5г. Середня кількість насінин у стручку 20—30 шт.

В державному випробуванні з 2000 року. В середньому одержано врожай насіння 23 ц/га, що перевищує урожай стандарту на 3,7 ц/га. Стійкість до вилягання 8,0 бала, до обсіпання – 8,0, до засухи – 7,8 бала.

Ранок Поділля - Заявник Вінницька державна сільськогосподарська дослідна станція.

Коренева система добре розвинена, стрижнева з добре вираженим головним коренем.

Стебло прямостояче, заввишки 112-115 см, без антоціану і опушення.

Стебловий листок ліроподібний, прикореневий – ліроподібно-пірчастий. Облиственність 45-50%. Суцвіття – рихла китиця, квітки лимонно-жовті, великі. Кількість стручків на рослині досягає 210-220 шт, кількість насінин у стручку 22-25 шт. Маса 1000 насінин 3-4г. Вегетаційний період 290-295 днів.

Вміст олії в насінні складає 47,1%, білку – 19,7%, глюкозинолатів 0,7%, ерукової кислоти 0,8%.

Сорт за якісними показниками належить до типу - 00, тобто придатний для одержання високоякісної харчової олії і білкових кормів.

Сорт середньостійкий до вилягання, придатний до механізованого збирання. Хворобами уражувався менше стандарту.

Середня врожайність за роки випробування (2001-2002рр) на сортодослідних станціях України становила в зоні Полісся 33,4 ц/га, що на рівні стандартів, по зоні Лісостепу – 34,2 ц/га, що на рівні стандартів, по зоні Степу – 31,9, що вище стандартів на 12 ц/га– сортів Микитинецький, Калинівський, Аріон.

Сорт занесено до Реєстру сортів рослин на 2002 рік по зонах Лісостепу та Полісся України придатного для поширення

Чорний велетень – Вінницька державна сільськогосподарська дослідна станція.

При появі сходів нерозгорнуті сім'ядолі мають синьо-зелений колір. Перші листки розетки сіро-зелені, круглі, злегка ворсисті. Розетка прикорневих листків злегка піднята або компактна. Прикореневі листки черешкові. Всі листки охоплюють стебло на 1/3–2/3. Загальна їх кількість – 16-23.

Стебло циліндричне, розгалужене, заввишки 140-150 см, голе, середній діаметр при основі 15-18мм. Листки зелено-сизі, з нижнього боку опушені.

Корінь стержневий, потужний, веретеноподібний, проникає глибоко в підґрунття.

Суцвіття – нещільна китиця. Бутони різного ступня розвитку розміщені вище квіток. Середня кількість квіток у китиці 20-40, на головному стеблі їх буває 75-80 шт.

Рослина починає цвісти з головної китиці. Кожна квітка цвіте впродовж 2-2,5 днів, а вся рослина 25-30 днів. Тривалість цвітіння залежить від кліматичних умов, сортових особливостей, строків сівби, забезпеченість добривами.

Плід – стручок завдовжки 6-12 см. Кількість стручків на рослині 300-400 шт. Стручки розміщені під прямим або тупим кутом до стебла.

Насіння кругле, чорно-синє. Діаметр 1,7-2,5 мм. Маса 1000 насінин 3-5г. Середня кількість насінин у стручку 20—30 шт.

В державному випробуванні з 2000 року. В середньому одержано врожай насіння 23 ц/га, що перевищує урожай стандарту на 3,7 ц/га. Стійкість до вилягання 8,0 бала, до обсіпання – 8,0, до засухи – 7,8 бала.

Вміст жиру в насінні становить 45,5%, білку – 18,6%, глюкозинолатів – 0,9%, ерукової кислоти – 0,3%. По якості належить до типу 00 - нулевих сортів.

Внесений до Реєстру сортів рослин по зонах Лісостеп та Полісся на 2002 рік придатного для поширення.

Елвіс - заявник фірма Рустика /Франція/.

Рослини заввишки 160 см. Форма куща напівзімкнута. Стебло без антоціану і опушення. Стебловий листок ліроподібний без опушення. Облиственність 50%. Суцвіття – нещільна китиця. Квітки лимонно-жовті. Стручок сплюснений, завдовжки – 6-13 см. Насінина кругла, чорна. Маса 1000 насінин 4-5г.

Вміст олії 46,5%, білку – 20,4%, ерукової кислоти – 0,3%, глюкозинолатів – 0,8%.

За роки випробування хворобами уражувався менше стандарту, шкідниками пошкоджувався на рівні стандарту (15-19%).

Вегетаційний період 285-290 днів.

Середня врожайність насіння за роки випробування (1999-2000рр) на сортодослідних станціях становила по зоні Лісостепу 27,8 ц/га, по зоні Полісся – 29,6 ц/га, по зоні Степу – 31,5 ц/га.

Найвищий врожай одержано 31,2 ц/га в 2000 році.

Занесений до Реєстру сортів рослин на 2001 рік по зонах Лісостепу, Полісся придатного до поширення.

РІПАК ЯРИЙ

Оксамит – заявник Вінницька державна дослідна сільськогосподарська станція. Висота рослин 120-130см. Вегетаційний період від сходів до повної стиглості 100-105 днів. Маса 1000 насінин 3,9-4,0 г. Стійкість до осипання засухи висока. За роки випробування одержано середній урожай насіння від 16,5 до 19,7 ц/га, що вище стандарту відповідно на 3,0-4,0 ц/га. Сорт по типу якості належить до 00-нулевих.

Рекомендовано внести до Реєстру сортів рослин на 2003 рік по зонах Лісостепу та Полісся для поширення в Україні.

Марія – заявник Вінницька державна дослідна сільськогосподарська станція. Висота рослин 120-130см. Вегетаційний період від сходів до повної стиглості 112-115 днів. Маса 1000 насінин 4,0-4,2 г. Стійкість до засухи, осипання на рівні 7-9 балів. Вміст олії в насінні 44,0%, білку 23,2 %. Середній урожай за роки випробування на сортодослідних станціях України одержано від 17 до 19 ц/га, що вище стандарту на 3-4 ц/га. Сорт низькоеруковий та низькоглюкозинолатний /00/.

Рекомендовано внести до Реєстру сортів рослин на 2003 рік по зонах Лісостепу

Вміст жиру в насінні становить 45,5%, білку – 18,6%, глюкозинолатів – 0,9%, ерукової кислоти – 0,3%. По якості належить до типу 00 - нулевих сортів.

Внесений до Реєстру сортів рослин по зонах Лісостеп та Полісся на 2002 рік придатного для поширення.

Елвіс - заявник фірма Рустика /Франція/.

Рослини заввишки 160 см. Форма куща напівзімкнута. Стебло без антоціану і опушення. Стебловий листок ліроподібний без опушення. Облиственність 50%. Суцвіття – нещільна китиця. Квітки лимонно-жовті. Стручок сплюснений, завдовжки – 6-13 см. Насінина кругла, чорна. Маса 1000 насінин 4-5г.

Вміст олії 46,5%, білку – 20,4%, ерукової кислоти – 0,3%, глюкозинолатів – 0,8%.

За роки випробування хворобами уражувався менше стандарту, шкідниками пошкоджувався на рівні стандарту (15-19%).

Вегетаційний період 285-290 днів.

Середня врожайність насіння за роки випробування (1999-2000рр) на сортодослідних станціях становила по зоні Лісостепу 27,8 ц/га, по зоні Полісся – 29,6 ц/га, по зоні Степу – 31,5 ц/га.

Найвищий врожай одержано 31,2 ц/га в 2000 році.

Занесений до Реєстру сортів рослин на 2001 рік по зонах Лісостепу, Полісся придатного до поширення.

РІПАК ЯРИЙ

Оксамит – заявник Вінницька державна дослідна сільськогосподарська станція. Висота рослин 120-130см. Вегетаційний період від сходів до повної стиглості 100-105 днів. Маса 1000 насінин 3,9-4,0 г. Стійкість до осипання засухи висока. За роки випробування одержано середній урожай насіння від 16,5 до 19,7 ц/га, що вище стандарту відповідно на 3,0-4,0 ц/га. Сорт по типу якості належить до 00-нулевих.

Рекомендовано внести до Реєстру сортів рослин на 2003 рік по зонах Лісостепу та Полісся для поширення в Україні.

Марія – заявник Вінницька державна дослідна сільськогосподарська станція. Висота рослин 120-130см. Вегетаційний період від сходів до повної стиглості 112-115 днів. Маса 1000 насінин 4,0-4,2 г. Стійкість до засухи, осипання на рівні 7-9 балів. Вміст олії в насінні 44,0%, білку 23,2 %. Середній урожай за роки випробування на сортодослідних станціях України одержано від 17 до 19 ц/га, що вище стандарту на 3-4 ц/га. Сорт низькоеруковий та низькоглюкозинолатний /00/.

Рекомендовано внести до Реєстру сортів рослин на 2003 рік по зонах Лісостепу

МОЛОЧАЙ

Запорізький. Заявник: Інститут олійних культур УААН.

Однорічна рослина родини молочайних. Сім'ядолі з рожевим відтінком.

Стебло прямостояче, розгалужене, голе, темно-зелене з блакитним нальотом, заввишки до 100 см. Листки чергові, цілюнокраї; верхні – широко яйцеподібні, подовжені, середні та нижні – ланцетоподібні з широкою або слабкосерцевидною основою. Квітки зібрані у суцвіття (променевиий зонтик), біля основи якого знаходяться сидячі широко трикутні, загострені, з серцеподібною основою при квітниках. Суцвіття складається з декількох квіток, оточене обгорткою.

Плід – трьох гніздова коробочка з зморшкуватою, шерехатою поверхнею від 8 до 12 мм завдовжки і до 1 см завширшки. Насіння овальне, з внутрішньої сторони жолобчасте, з конічним заглибленням і світлим придатком, з карункулою. Поверхня насінневої оболонки сітчасто-зморшкувата, світло-коричнева. Довжина насінини 5-6 мм, ширина 3,5-4,6 мм. Маса 1000 насінин 53г.

Вегетаційний період в умовах Степу 142 дні. Одночасність дозрівання 97%. Урожайність 20,7 ц/га. Вміст олії 51%.

Рекомендована температура проростання +15 градусів, сорт чутливий до весняних заморозків.

Напрямок використання – для виробництва молочайної олії з його використанням в миловарній промисловості, а також для потреб медицини.

Рекомендована зона вирощування – Степ.

САФЛОР

Сонячний. Заявник: Інститут олійних культур УААН.

Однорічна трав'яниста рослина сімейства айстрових. Сім'ядолі світло-зелені. Стебло прямостояче, гіллясте, заввишки до 85 см., середньооблиствене. Листки зелені, без антоціанового забарвлення. Число гілок першого порядку до 10-20. Листки зелені, без антоціанового забарвлення, ланцетно-овальні з невеликими зубчиками по краю листової пластинки, без колючок. Суцвіття – кошики конічної форми, діаметром 25-35 мм., до 40 штук на рослині. Листочки – обгортки овально-ланцетні, щільно зімкнуті. Квітки трубчасті з п'ятироздільним вінчиком жовтого кольору. Забарвлення зів'ялої квітки оранжеве. Плід – сім'янка, яка подібна до сім'янки соняшнику. Оболонка її тверда, складає 50% маси сім'янки, біла. Середня вага сім'янок з одного кошика 1,6г. Маса 1000 насінин 44,4г.

Вегетаційний період в умовах Степу 127 днів. Урожайність 9,4 ц/га. Вміст жиру 33,2%, лузжистість 47%, натура 466.

Сорт світлолюбивий, стійкий до атмосферної посухи, не вибагливий до родючості ґрунту.

Рекомендується для вирощування в зоні Степу для виробництва рослинної олії та потреб харчової промисловості.

РЕДЬКА ОЛІЙНА

Журавка. Заявник – Інститут хрестоцвітних культур УААН.

Сходи зелені. Кущ нещільний. Листки світло-зелені, перисто-надрізані, опушені, з зморшкуватою поверхнею. Антоціанове забарвлення відсутнє.

Суцвіття - китиця з білими, рожевими та фіолетовими квітками. Стручок циліндричної форми з гострим кінчиком, не розтріскується. На одній рослині до 150 стручків.

Середня урожайність за роки випробування 14,8-16,4 ц/га, вміст жиру – 37,4%, білка – 27,2%.

Сорт стійкий до посухи та осипання, середньостійкий до вилягання.

Ураження хворобами середнє (бактеріоз 11,5%, пероноспорооз – 3,5%).

Рекомендований для зон Степу та Лісостепу як олійний і кормовий.

ГІРЧИЦЯ САРЕПТСЬКА

Тавричанка 5. Заявник – Інститут олійних культур УААН.

Сходи зелені. Кущ напівзімкнутий, заввишки до 122 см. Листки: нижні черешкові, ліровидно-перистонадрізані; верхні – сидячі, видовжено-лінійні. Суцвіття – китиця з жовтими квітками. Стручок тонкий, продовгуватий з шилоподібним носиком. Насіння жовте, кулеподібне.

За роки випробування середня урожайність сорту становила від 10 до 16,3 ц/га, вміст жиру – 40,9%, білка – 24,0%. Сорт стійкий до вилягання і посухи, середньостійкий до осипання. Ураження хворобами середнє (бактеріозом – 22%, пероноспороозом – 5,5%).

Рекомендований для зон Степу, Лісостепу та Полісся як харчовий і олійний.

Мрія. Заявник – Інститут олійних культур УААН.

Рослини заввишки до 116 см, кущ напівзімкнутий. Стебло неопушене, діаметром 7-8мм. Листки світло-зелені, непарноперистонадрізані. Суцвіття китицеподібне з яскраво-жовтими квітками. Стручок світло-зелений, неопушений, з округлим носиком і бугорчастою поверхнею. Насіння жовте, овально-округле.

Середня урожайність за роки випробування від 8,9 до 16 ц/га. Вміст жиру 39,6%, білка – 26,1%. Сорт стійкий до вилягання, середньостійкий до осипання і посухи.

Ураження хворобами нижче середнього (бактеріозом – 9,5%, пероноспороозом – 6,3%).

Рекомендований для зон Степу і Лісостепу як олійний.

Тавричанка 15. Заявник – Інститут олійних культур УААН.

Сходи світло-зелені. Кущ напівзімкнутий, діаметром 20 см; стебло завтовшки 8-10мм, не опушене. Антоціанове забарвлення стебла відсутнє, висота прикріплення нижніх гілок - 45 см. Листки світло-зелені, непарно перисто-сильно надрізані, рідко опушені з гладенькою поверхнею. Суцвіття китицеподібне, квітка жовта. Стручок округлий, прямий, сильнобугорчастий.

Насіння жовте, овально-округле, до 26 шт в стручку. Маса 1000 насінин 5,6г.

Вегетаційний період 87 днів. Середній урожай за роки випробування 10,4 ц/га, що на 5,6% перевищує стандарти. Вміст ерукувої кислоти 8%, алілової олії – 0,9%, жиру – 43,1%, білка – 29,9%.

Сорт стійкий до вилягання, посухи, середньостійкий до осипання. Ураження хворобами незначне.

Рекомендований для зон Степу і Лісостепу як олійний.

Росава. Заявник – Центральний ботанічний сад ім. М.М.Гришка Національної академії наук.

Сходи зелені, сім'ядолі світлозелені. Кущ зімкнутий, заввишки до 127 см. Листки ліровиднопірчаторозсічені з незначним опушенням з нижнього боку; верхні листки видовжено-овальнопірчасті; поверхня листка зморшкувата. Суцвіття веретеноподібне, квітка жовта. Стручок довгий, прямий, опушений.

Насіння жовте, кулеподібне. Маса 1000 насінин – 5,6г.

Вегетаційний період 74 дні. Середній урожай за роки випробування 16,7 ц/га, що на 1,7 ц/га перевищує стандарти. Вміст жиру 39,5%, білка – 25,7%.

Сорт стійкий до вилягання, середньостійкий до осипання і посухи. Ураження хворобами незначне.

Рекомендований для зон Степу і Лісостепу як олійний.

Роксолана. Заявник – Інститут хрестоцвітних культур УААН.

Сходи зелені, сім'ядолі зелені з сизим восковим нальотом. Кущ напівзімкнутий, діаметр стебла – 0,5-1,5мм. Висота прикріплення нижніх пагонів 25-40см. Листки: нижні – черенкові, ліровидно-перисторозсічені, верхні – продовгувато-лінійні, не опушені. Суцвіття – рихла китиця з лимонно-жовтими квітками. Стручок прямий, прикріплений під гострим кутом до стебла, до 280-340 шт. на рослині. Насіння жовте, кулеподібне, в стручку – 18-24шт.

Вегетаційний період 76 днів. Середній урожай за роки випробування 21,8 ц/га, вміст жиру 39%, білка – 27,4%.

Сорт стійкий до вилягання, середньостійкий до осипання і посухи.

Ураження хворобами незначне.

Рекомендований для зон Степу і Лісостепу як олійний.

ГІРЧИЦЯ БІЛА

Підпечерицька. Заявник – Інститут хрестоцвітних культур УААН.

Рослини заввишки до 110 см. Кущ напівзімкнутий. Листки: нижні ліровиднорозсічені, верхні продовгувато-лінійні, покриті жорсткими волосками. Стебло опушене, діаметром 0,5-1,0мм. Суцвіття китицеподібне з жовтими квітками. Стручок горбкуватий, опушений, без антоціанового забарвлення.

Вегетаційний період до 100 днів. Середня урожайність за роки випробування 21,1 ц/га. Вміст жиру 25,4%, білка – 32,0%.

Сорт стійкий до вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками середнє (бактеріозом – 8,8%, ріпаковим квіткоїдом – 19%).

Рекомендовано для зони Лісостепу як олійний та кормовий.

Талісман. Заявник – Інститут олійних культур УААН.

Рослини заввишки до 130 см. кущ нещільний. Листки зелені, опушені, черенкові, верхні листки злегка гофровані. Стебло опушене з антоціановим забарвленням. Стручок горбкуватий, мечевидний, опушений.

Вегетаційний період до 82 днів. Середній урожай за роки випробування 23 ц/га; вміст жиру 28,3%, білка – 30,1%.

Сорт стійкий до осипання, вилягання, посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками нижче середнього (бактеріоз – 8,4%, ріпаковий квіткоїд – 10,9%).

Рекомендовано для зон Лісостепу і Полісся як олійний та кормовий.

РИЖІЙ ЯРИЙ

Гірський. Заявник – Інститут хрестоцвітних культур УААН.

Рослини заввишки до 90 см. Кущ напівзімкнутий. Листки ланцетні, гладенькі, без опушення і антоціану. Стручок з гладенькою поверхнею, носик гострий. Насіння жовте, еліпсоїдне. Маса 1000 насінин – 1,2г.

Вегетаційний період 88 днів. Середня урожайність за роки випробування від 10 до 18 ц/га. Вміст жиру – 34%, білка – 27%.

Сорт стійкий до вилягання, середньостійкий до осипання і посухи. Ураження хворобами нижче середнього.

Рекомендований для зон Степу і Лісостепу.

Міраж. Заявник – Інститут олійних культур УААН.

Рослини заввишки до 85 см. Кущ напівзімкнутий. Листки сидячі, лінійні, зеленого кольору; прикореневі – округло-овальні. Стебло злегка опушене, без антоціанового забарвлення.

ГІРЧИЦЯ БІЛА

Підпечерицька. Заявник – Інститут хрестоцвітних культур УААН.

Рослини заввишки до 110 см. Кущ напівзімкнутий. Листки: нижні ліровиднорозсічені, верхні продовгувато-лінійні, покриті жорсткими волосками. Стебло опушене, діаметром 0,5-1,0мм. Суцвіття китицеподібне з жовтими квітками. Стручок горбкуватий, опушений, без антоціанового забарвлення.

Вегетаційний період до 100 днів. Середня урожайність за роки випробування 21,1 ц/га. Вміст жиру 25,4%, білка – 32,0%.

Сорт стійкий до вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками середнє (бактеріозом – 8,8%, ріпаковим квіткоїдом – 19%).

Рекомендовано для зони Лісостепу як олійний та кормовий.

Талісман. Заявник – Інститут олійних культур УААН.

Рослини заввишки до 130 см. кущ нещільний. Листки зелені, опушені, черенкові, верхні листки злегка гофровані. Стебло опушене з антоціановим забарвленням. Стручок горбкуватий, мечевидний, опушений.

Вегетаційний період до 82 днів. Середній урожай за роки випробування 23 ц/га; вміст жиру 28,3%, білка – 30,1%.

Сорт стійкий до осипання, вилягання, посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками нижче середнього (бактеріоз – 8,4%, ріпаковий квіткоїд – 10,9%).

Рекомендовано для зон Лісостепу і Полісся як олійний та кормовий.

РИЖІЙ ЯРИЙ

Гірський. Заявник – Інститут хрестоцвітних культур УААН.

Рослини заввишки до 90 см. Кущ напівзімкнутий. Листки ланцетні, гладенькі, без опушення і антоціану. Стручок з гладенькою поверхнею, носик гострий. Насіння жовте, еліпсоїдне. Маса 1000 насінин – 1,2г.

Вегетаційний період 88 днів. Середня урожайність за роки випробування від 10 до 18 ц/га. Вміст жиру – 34%, білка – 27%.

Сорт стійкий до вилягання, середньостійкий до осипання і посухи. Ураження хворобами нижче середнього.

Рекомендований для зон Степу і Лісостепу.

Міраж. Заявник – Інститут олійних культур УААН.

Рослини заввишки до 85 см. Кущ напівзімкнутий. Листки сидячі, лінійні, зеленого кольору; прикореневі – округло-овальні. Стебло злегка опушене, без антоціанового забарвлення.

Суцвіття – щиток з блідо-жовтими квітками. Стручок світло-зелений, без антоціану, створки яйцеподібні, звужені до низу. Насіння руде, продовгувате.

Вегетаційний період 66 днів. середня урожайність за роки випробування 10-16 ц/га. Вміст жиру 43,2%, білка – 27,1%.

Сорт стійкий до вилягання, середньо-стійкий до осипання і посухи (4,2-4,1 бали). Ураження хворобами незначне.

Рекомендований для зон Лісостепу, Степу і Полісся.

ЛЬОН КУДРЯШ

Дебют. Заявник – Інститут олійних культур УААН.

Рослини заввишки 57 см, довжина технічної частини стебла – 48 см. Кущ компактний, стебло округле, слабо гіллясте, не опушене, без антоціанового забарвлення. Листки ланцетні, маленькі, трижильні з гладенькими краями, без черешкові, зелені. Розміщуються на стеблі по гвинтовій спіралі з загущенням у нижній частині стебла.

Квітка п'ятигніздового типу, віночок світло-фіолетовий, пиляки сині. Плід – округла коробочка. Насіння яйцеподібної форми, темно-коричневе. Маса 1000 насінин 7,7г.

Вегетаційний період 87 днів. Середня урожайність 15,4 ц/га. Вміст жиру 45,4%, вихід олії з гектара 564 кг/га.

Сорт стійкий до посухи, вилягання, осипання. Придатний до механізованого збирання.

Рекомендований для зони Степу.

Айсберг. Заявник – Інститут олійних культур УААН.

Рослини заввишки 43 см. Стебло прямостояче, розгалужене. Листки ланцетні, трижильні з гладенькими краями, без черешкові, зелені. Квітки п'ятірного типу, віночок білий, пелюстки віночка вузькі. Забарвлення пиляків кремове. Суцвіття – нещільна звивина. Насіння темно-коричневого кольору. Маса 1000 насінин 4,4 г.

Вегетаційний період 88 днів. Середня урожайність 16,5 ц/га. Вміст жиру 45,8%, йодне число 17,6.

Сорт відзначається стійкістю до посухи, вилягання, фузаріозного в'янення.

Рекомендований для зони Степу.

Південна ніч. Заявник – Інститут олійних культур УААН.

Рослини заввишки 52 см., довжина технічної частини стебла 40,3 см. Стебло округле. Листки ланцетні, тоненькі, трижильні з гладенькими краями. Без черешкові, темно-зелені, розміщуються по гвинтовій спіралі з загущенням у нижній частині стебла. Квітка велика, п'ятірного типу. Забарвлення пелюсток і пильників сине, рилець – фіолетове.

Суцвіття – щиток з блідо-жовтими квітками. Стручок світло-зелений, без антоціану, створки яйцеподібні, звужені до низу. Насіння руде, продовгувате.

Вегетаційний період 66 днів. середня урожайність за роки випробування 10-16 ц/га. Вміст жиру 43,2%, білка – 27,1%.

Сорт стійкий до вилягання, середньо-стійкий до осипання і посухи (4,2-4,1 бали). Ураження хворобами незначне.

Рекомендований для зон Лісостепу, Степу і Полісся.

ЛЬОН КУДРЯШ

Дебют. Заявник – Інститут олійних культур УААН.

Рослини заввишки 57 см, довжина технічної частини стебла – 48 см. Кущ компактний, стебло округле, слабо гіллясте, не опушене, без антоціанового забарвлення. Листки ланцетні, маленькі, трижильні з гладенькими краями, без черешкові, зелені. Розміщуються на стеблі по гвинтовій спіралі з загущенням у нижній частині стебла.

Квітка п'ятигніздового типу, віночок світло-фіолетовий, пиляки сині. Плід – округла коробочка. Насіння яйцеподібної форми, темно-коричневе. Маса 1000 насінин 7,7г.

Вегетаційний період 87 днів. Середня урожайність 15,4 ц/га. Вміст жиру 45,4%, вихід олії з гектара 564 кг/га.

Сорт стійкий до посухи, вилягання, осипання. Придатний до механізованого збирання.

Рекомендований для зони Степу.

Айсберг. Заявник – Інститут олійних культур УААН.

Рослини заввишки 43 см. Стебло прямостояче, розгалужене. Листки ланцетні, трижильні з гладенькими краями, без черешкові, зелені. Квітки п'ятірного типу, віночок білий, пелюстки віночка вузькі. Забарвлення пиляків кремове. Суцвіття – нещільна звивина. Насіння темно-коричневого кольору. Маса 1000 насінин 4,4 г.

Вегетаційний період 88 днів. Середня урожайність 16,5 ц/га. Вміст жиру 45,8%, йодне число 17,6.

Сорт відзначається стійкістю до посухи, вилягання, фузаріозного в'янення.

Рекомендований для зони Степу.

Південна ніч. Заявник – Інститут олійних культур УААН.

Рослини заввишки 52 см., довжина технічної частини стебла 40,3 см. Стебло округле. Листки ланцетні, тоненькі, трижильні з гладенькими краями. Без черешкові, темно-зелені, розміщуються по гвинтовій спіралі з загущенням у нижній частині стебла. Квітка велика, п'ятірного типу. Забарвлення пелюсток і пильників сине, рилець – фіолетове.

Суцвіття – щиток з блідо-жовтими квітками. Стручок світло-зелений, без антоціану, створки яйцеподібні, звужені до низу. Насіння руде, продовгувате.

Вегетаційний період 66 днів. середня урожайність за роки випробування 10-16 ц/га. Вміст жиру 43,2%, білка – 27,1%.

Сорт стійкий до вилягання, середньо-стійкий до осипання і посухи (4,2-4,1 бали). Ураження хворобами незначне.

Рекомендований для зон Лісостепу, Степу і Полісся.

ЛЬОН КУДРЯШ

Дебют. Заявник – Інститут олійних культур УААН.

Рослини заввишки 57 см, довжина технічної частини стебла – 48 см. Кущ компактний, стебло округле, слабо гіллясте, не опушене, без антоціанового забарвлення. Листки ланцетні, маленькі, трижильні з гладенькими краями, без черешкові, зелені. Розміщуються на стеблі по гвинтовій спіралі з загущенням у нижній частині стебла.

Квітка п'ятигніздового типу, віночок світло-фіолетовий, пиляки сині. Плід – округла коробочка. Насіння яйцеподібної форми, темно коричневе. Маса 1000 насінин 7,7г.

Вегетаційний період 87 днів. Середня урожайність 15,4 ц/га. Вміст жиру 45,4%, вихід олії з гектара 564 кг/га.

Сорт стійкий до посухи, вилягання, осипання. Придатний до механізованого збирання.

Рекомендований для зони Степу.

Айсберг. Заявник – Інститут олійних культур УААН.

Рослини заввишки 43 см. Стебло прямостояче, розгалужене. Листки ланцетні, трижильні з гладенькими краями, без черешкові, зелені. Квітки п'ятірного типу, віночок білий, пелюстки віночка вузькі. Забарвлення пиляків кремове. Суцвіття – нещільна звивина. Насіння темно-коричневого кольору. Маса 1000 насінин 4,4 г.

Вегетаційний період 88 днів. Середня урожайність 16,5 ц/га. Вміст жиру 45,8%, йодне число 17,6.

Сорт відзначається стійкістю до посухи, вилягання, фузаріозного в'янення.

Рекомендований для зони Степу.

Південна ніч. Заявник – Інститут олійних культур УААН.

Рослини заввишки 52 см., довжина технічної частини стебла 40,3 см. Стебло округле. Листки ланцетні, тоненькі, трижильні з гладенькими краями. Без черешкові, темно-зелені, розміщуються по гвинтовій спіралі з загущенням у нижній частині стебла. Квітка велика, п'ятірного типу. Забарвлення пелюсток і пильників сине, рилець – фіолетове.

Плід – округла п'ятигнізда коробочка. Насіння яйцеподібної форми з дещо звуженим і злегка зігнутим носиком, плоске, гладеньке, блискуче, слизьке, коричневе. Маса 1000 насінин 7,9г.

Вегетаційний період 84 дні. Середня урожайність 16,7 ц/га. Вміст жиру 44,8%, вихід олії з гектара 748 кг.

Сорт стійкий до осипання, посухи, вилягання.

Рекомендований для зони Степу.

КУНЖУТ

Надія. Заявник – Інститут олійних культур УААН.

Сім'ядолі зелені. Стебло прямостояче, заввишки до 100 см, зелене, галузиться. Розміщення листків на стеблі почергове. Листки зелені, черешкові. Пластинки нижніх і верхніх листків суцільні; середніх – розсічені у вигляді трійчастого листа, злегка опушені. Стебло сильно облистнене.

Квітка світло-фіолетова. Плід – коробочка з добре розвиненими несправжніми перегородками. Насіння світло-кремове. Середня вага насіння з однієї коробочки 0,25 г. Маса 1000 насінин 3,2 г., натура 609.

Вегетаційний період до 96 днів. Урожайність 10,7 ц/га. Вміст жиру 54,9%.

Сорт світлолюбивий, стійкий до перепадів температур повітря і весняних приморозків. Вибагливий до родючості ґрунту, не виносить важких ґрунтів. Стійкий до вилягання, середньо стійкий до осипання. Хворобами уражується в незначній мірі.

Рекомендується для зон Степу та Лісостепу для отримання рослинної високоолеїнової олії.

СУРІПИЦЯ ЯРА

Горянка. Заявник – Інститут хрестоцвітих культур УААН.

Сім'ядолі зелені. Стебло прямостояче, гіллясте, діаметром 0,5-0,7 см, без антоціанового забарвлення.

Кущ напівзімкнутий, середнє число гілок першого порядку 5, висота прикріплення нижніх гілок 15-20 см. Листки ліровидноперистонадрізані, не опушені, з слабким восковим нальотом, без антоціанового забарвлення.

Суцвіття – китиця з жовтими квітками. Насіння світло-коричнево-жовте, округле. В стручку до 20-30 насінин. Маса 1000 насінин 2,3 г.

Вегетаційний період 86 днів. Середня урожайність 12,3 ц/га. Вміст жиру 40%, ерукової кислоти 0,6%, глюкозинолатів 0,5%.

Сорт стійкий до вилягання, середньо стійкий до посухи та осипання.

Рекомендована норма висіву 5-6 кг/га; норма внесення добрив $N_{90}P_{60}K_{120}$.

Посів у першій декаді квітня.

Рекомендований для зони Полісся для виробництва рослинної олії.

Плід – округла п'ятигнізда коробочка. Насіння яйцеподібної форми з дещо звуженим і злегка зігнутим носиком, плоске, гладеньке, блискуче, слизьке, коричневе. Маса 1000 насінин 7,9г.

Вегетаційний період 84 дні. Середня урожайність 16,7 ц/га. Вміст жиру 44,8%, вихід олії з гектара 748 кг.

Сорт стійкий до осипання, посухи, вилягання.

Рекомендований для зони Степу.

КУНЖУТ

Надія. Заявник – Інститут олійних культур УААН.

Сім'ядолі зелені. Стебло прямостояче, заввишки до 100 см, зелене, галузиться. Розміщення листків на стеблі почергове. Листки зелені, черешкові. Пластинки нижніх і верхніх листків суцільні; середніх – розсічені у вигляді трійчастого листа, злегка опушені. Стебло сильно облистнене.

Квітка світло-фіолетова. Плід – коробочка з добре розвиненими несправжніми перегородками. Насіння світло-кремове. Середня вага насіння з однієї коробочки 0,25 г. Маса 1000 насінин 3,2 г., натура 609.

Вегетаційний період до 96 днів. Урожайність 10,7 ц/га. Вміст жиру 54,9%.

Сорт світлолюбивий, стійкий до перепадів температур повітря і весняних приморозків. Вибагливий до родючості ґрунту, не виносить важких ґрунтів. Стійкий до вилягання, середньо стійкий до осипання. Хворобами уражується в незначній мірі.

Рекомендується для зон Степу та Лісостепу для отримання рослинної високоолеїнової олії.

СУРІПИЦЯ ЯРА

Горянка. Заявник – Інститут хрестоцвітих культур УААН.

Сім'ядолі зелені. Стебло прямостояче, гіллясте, діаметром 0,5-0,7 см, без антоціанового забарвлення.

Кущ напівзімкнутий, середнє число гілок першого порядку 5, висота прикріплення нижніх гілок 15-20 см. Листки ліровидноперистонадрізані, не опушені, з слабким восковим нальотом, без антоціанового забарвлення.

Суцвіття – китиця з жовтими квітками. Насіння світло-коричнево-жовте, округле. В стручку до 20-30 насінин. Маса 1000 насінин 2,3 г.

Вегетаційний період 86 днів. Середня урожайність 12,3 ц/га. Вміст жиру 40%, ерукової кислоти 0,6%, глюкозинолатів 0,5%.

Сорт стійкий до вилягання, середньо стійкий до посухи та осипання.

Рекомендована норма висіву 5-6 кг/га; норма внесення добрив $N_{90}P_{60}K_{120}$.

Посів у першій декаді квітня.

Рекомендований для зони Полісся для виробництва рослинної олії.

РИЦИНА

Хортицька 3. Заявник – Інститут олійних культур УААН.

Рослини заввишки до 100 см, висота штамба 40-60 см. Суцвіття китиця, середньої щільності, овальної форми. Стебло сизе, з восковим нальотом, має центральну та до 4 бокових китиць. Центральна китиця закладається на 6-7 вузлі. Листки великі, зелені без антоціану, пальчаторозсічені, без блиску, слабкогорбкуваті.

Рослини однодомні, роздільностатеві, чоловічі квітки розміщені в нижній частині суцвіття, жіночі – у верхній. Квітки дрібні, з простою оцвітиною з п'ятьма пелюстками, майже сидячі. Бутон чоловічої квітки широко конічний з великою кількістю тичинок, жіноча квітка вузько конічна. Зав'язь тригніздова, з трьома дволопатевиими приймочками.

Плід – коробочка, що має три гнізда. У кожному з них міститься по одній насініні. Коробочки вкриті колючками.

Насіння овальної форми, середнього розміру, довжина 1,1-1,3 см, ширина 0,8-0,9 см, темно-коричневого кольору з світло-коричневою мозаїкою, з карункулою. Маса 1000 насінин 281 г, натура 360 г/л.

Веgetаційний період до 100 днів. Урожайність 12,3 ц/га. Вміст жиру 49,2%, рицинової кислоти 87%, лузжистість 22,1%.

Сорт стійкий до вилягання, осипання, середньо стійкий до посухи. Стійкий до фузаріозного в'янення.

Рекомендований для зони Степу.

Олеся. Заявник – Інститут олійних культур УААН.

Висота рослин до 120 см., штамба – 60-80 см, стебло сизе з восковим нальотом.

Сорт практично однокитицевий, з щільною центральною китицею, яка закладається на 8-9 вузлі.

Рослини однодомні, роздільностатеві, чоловічі квітки розміщені в нижній частині суцвіття, жіночі – у верхній. Квітки дрібні, з простою оцвітиною з п'ятьма пелюстками, майже сидячі. Бутон чоловічої квітки широко конічний з великою кількістю тичинок. Жіноча квітка вузько-конічна. Зав'язь тригніздова, з трьома дволопатевиими приймочками, забарвленими в червоний колір.

Рослини слабооблиственні, у період дозрівання центральної китиці починається своєрідна фаза біологічного спокою. На цей час ріст і утворення бічних пагонів, китиць і листків припиняється, а значна кількість раніше утворених листків опадає.

Плід – коробочка, що має три гнізда. Коробочки вкриті колючками, кулеподібні, мілкі.

Насіння овальної форми, мілке, довжиною 1,1-1,2 см, ширина 0,8 см, коричневого кольору з світло-коричневою мозаїкою, з невеликою карункулою.

Веgetаційний період 107 днів. Середня урожайність 16,3 ц/га. Вміст жиру 56,1%, рицинової кислоти 86,9%, лузжистість 23,5%.

Сорт стійкий до фузаріозного в'янення, має дружне дозрівання, пристосований до механізованого збирання.

Рекомендований для зони Степу.

Хортичанка. Заявник – Інститут олійних культур УААН.

Висота рослин 100-120 см, висота штамба 60-80 см. Стебло фіолетове з восковим нальотом, гіллясте, має 1-3 продуктивні китиці. Китиці щільні, центральна китиця закладається на 8-9 вузлі головного стебла.

Рослини однодомні, роздільностатеві, чоловічі квітки розміщені в нижній частині суцвіття, жіночі – у верхній. Квітки дрібні, з простою оцвітиною, з п'ятьма пелюстками, майже сидячі. Бутон чоловічої квітки широко конічний з великою кількістю тичинок. Жіноча квітка вузько конічна. Зав'язь тригніздова, з трьома дволопатевиими приймочками.

Плід – тригніздова коробочка, вкрита колючками. Насіння овальної форми, середнього розміру, довжина 1,1-1,4 см, ширина 0,8-0,9 см, коричневого кольору з сірою мозаїкою, на звуженому кінці невелика карункула. Маса 1000 насінин 310г.

Вегетаційний період 117 днів. Середня урожайність 19,2 ц/га, вміст жиру 56,8%, рицинолової кислоти 87,8%, лузжистість 23%.

Сорт стійкий до фузаріозного в'янення, придатний до механізованого збирання. Рекомендується для зони Степу.

Хортицька 7. Заявник – Інститут олійних культур УААН.

Рослини заввишки до 130 см, штамба – 70-90 см, стебло гіллясте, зелене з незначним восковим нальотом. Центральна китиця щільна, закладається на 9-10 вузлі. На стеблі до 3 бокових китиць.

Рослини однодомні, роздільностатеві; чоловічі квітки розміщені у нижній частині суцвіття, жіночі – у верхній. Квітки дрібні з простою оцвітиною з п'ятьма пелюстками, майже сидячі. Бутон чоловічої квітки широко конічний з великою кількістю тичинок. Жіноча квітка вузько конічна. Зав'язь тригніздова, з трьома дволопатевиими приймочками, забарвленими в червоний колір.

Плід – трьохгніздова коробочка, вкрита колючками, кулеподібна, при дозріванні розтріскуються.

Насіння овальної форми, мілке, довжина 1,0-1,2 см, шириною 0,7-0,8 см, світло-коричневого кольору з сірою мозаїкою, з невеликою карункулою.

Вегетаційний період 119 днів. Середня урожайність 15,4 ц/га, вміст жиру 56,2%, рицинолової кислоти 87,4%, лузжистість 23,89%.

Сорт стійкий до фузаріозного в'янення, призначений для вирощування у фермерських та інших господарствах без застосування збиральної техніки.

Рекомендований для зони Степу.

МАК

Кривотульський. Заявник – Аграрний науково-дослідний інститут “АНДІ”.

Сходи зеленого кольору, сім'ядолі світло-зелені. Стебло прямостояче, заввишки до 150 см, сильно розгалужене. Число бічних гілок до 6 на рослині.

Листки зеленого кольору, стеблові широко ланцетоподібної форми з восковим нальотом, з ледь помітним антоціановим забарвленням, прикореневі листки видовжені, розміщені спіралью, не опушені. Рослини слабоопушені.

Хортичанка. Заявник – Інститут олійних культур УААН.

Висота рослин 100-120 см, висота штамба 60-80 см. Стебло фіолетове з восковим нальотом, гіллясте, має 1-3 продуктивні китиці. Китиці щільні, центральна китиця закладається на 8-9 вузлі головного стебла.

Рослини однодомні, роздільностатеві, чоловічі квітки розміщені в нижній частині суцвіття, жіночі – у верхній. Квітки дрібні, з простою оцвітиною, з п'ятьма пелюстками, майже сидячі. Бутон чоловічої квітки широко конічний з великою кількістю тичинок. Жіноча квітка вузько конічна. Зав'язь тригніздова, з трьома дволопатевиими приймочками.

Плід – тригніздова коробочка, вкрита колючками. Насіння овальної форми, середнього розміру, довжина 1,1-1,4 см, ширина 0,8-0,9 см, коричневого кольору з сірою мозаїкою, на звуженому кінці невелика карункула. Маса 1000 насінин 310г.

Вегетаційний період 117 днів. Середня урожайність 19,2 ц/га, вміст жиру 56,8%, рицинолової кислоти 87,8%, лузжистість 23%.

Сорт стійкий до фузаріозного в'янення, придатний до механізованого збирання. Рекомендується для зони Степу.

Хортицька 7. Заявник – Інститут олійних культур УААН.

Рослини заввишки до 130 см, штамба – 70-90 см, стебло гіллясте, зелене з незначним восковим нальотом. Центральна китиця щільна, закладається на 9-10 вузлі. На стеблі до 3 бокових китиць.

Рослини однодомні, роздільностатеві; чоловічі квітки розміщені у нижній частині суцвіття, жіночі – у верхній. Квітки дрібні з простою оцвітиною з п'ятьма пелюстками, майже сидячі. Бутон чоловічої квітки широко конічний з великою кількістю тичинок. Жіноча квітка вузько конічна. Зав'язь тригніздова, з трьома дволопатевиими приймочками, забарвленими в червоний колір.

Плід – трьохгніздова коробочка, вкрита колючками, кулеподібна, при дозріванні розтріскуються.

Насіння овальної форми, мілке, довжина 1,0-1,2 см, шириною 0,7-0,8 см, світло-коричневого кольору з сірою мозаїкою, з невеликою карункулою.

Вегетаційний період 119 днів. Середня урожайність 15,4 ц/га, вміст жиру 56,2%, рицинолової кислоти 87,4%, лузжистість 23,89%.

Сорт стійкий до фузаріозного в'янення, призначений для вирощування у фермерських та інших господарствах без застосування збиральної техніки.

Рекомендований для зони Степу.

МАК

Кривотульський. Заявник – Аграрний науково-дослідний інститут “АНДІ”.

Сходи зеленого кольору, сім'ядолі світло-зелені. Стебло прямостояче, заввишки до 150 см, сильно розгалужене. Число бічних гілок до 6 на рослині.

Листки зеленого кольору, стеблові широко ланцетоподібної форми з восковим нальотом, з ледь помітним антоціановим забарвленням, прикореневі листки видовжені, розміщені спіралью, не опушені. Рослини слабоопушені.

Квітки великі, округлої форми, червоного кольору з фіолетовим відтінком. Коробочка велика з багатопроменевою приймочкою, округла, у верхній частині трохи витягнута. Закритого типу. Висота коробочки 60-64 мм, діаметр 34-40 мм. На рослині 2-6 коробочок. Середня маса 1 коробочки без насіння 1,4 г. Насіння блакитного кольору. Маса 1000 насінин 0,37 г.

Веgetаційний період 112 днів. Середня урожайність насіння 19,2 ц/га, коробочок - 10,2 ц/га. Вміст жиру 54,0%, білка 29,5%, морфіну 0,054%.

Сорт стійкий до осипання, вилягання, середньо стійкий до посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками незначне. Рекомендований для виробництва рослинної олії та потреб харчової промисловості зон Степу, Лісостепу, Полісся.

Тарновецький. Заявник – Науково-виробниче сільськогосподарське підприємство “Фітон МВ”.

Сходи зелені з різко вираженим антоціановим забарвленням. Стебло прямостояче, сильно розгалужене, заввишки до 110 см. Листки витягнуті, широко ланцетної форми, зубчасті, слабко опушені, блідо-зелені. Прикореневі листки витягнуті, слабко опушені. Облистненість середня.

Квітки великі, пелюстки білого кольору, округлої форми, вічко фіолетове. Коробочка округла, з багатопроменевою приймочкою, закрита. Висота 45-55 мм, діаметр 32-35 мм. Число коробочок на рослині від 2 до 6. Насіння блакитного кольору. Маса 1000 насінин 0,47г.

Веgetаційний період 110 днів. Середня урожайність насіння 21,3 ц/га, коробочок 11 ц/га, вміст жиру 52,2%, морфіну 0,035%.

Сорт стійкий до вилягання, осипання, середньо стійкий до посухи. Хворобами уражується в незначній мірі, стійкий до пошкодження шкідниками.

Рекомендується для виробництва рослинної олії та потреб харчової промисловості зон Степу, Лісостепу, Полісся.

Юпітер. Заявник – Аграрний науково-дослідний інститут “АНДІ”.

Сходи блідо-зеленого кольору. Стебло прямостояче, заввишки до 130 см. Листки зеленого кольору з слабким антоціановим забарвленням. Листова пластинка з надрізнаними краями, опушення незначне. Прикореневі листки розміщені спірально, видовжені. Ступінь облистненості рослин висока.

Квітка округлої форми, червона з фіолетовим відтінком.

Коробочка яйцеподібної форми, зморшкувата, у верхній та нижніх частинах витягнута. Висота коробочки 62-66 мм, діаметр 30-34 мм. Закритого типу. Середня маса коробочки без насіння 2,0 г. Насіння блакитного кольору. Маса 1000 насінин 0,41 г.

Веgetаційний період 115 днів. Урожайність насіння 20,6 ц/га, коробочок 11,1 ц/га. Вміст жиру 52,1%, білка 30%, морфіну 0,052%.

Сорт стійкий до вилягання, осипання, середньо стійкий до посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками незначне.

Рекомендований для виробництва рослинної олії та потреб харчової промисловості в зонах Степу, Лісостепу та Полісся.

Квітки великі, округлої форми, червоного кольору з фіолетовим відтінком. Коробочка велика з багатопроменевою приймочкою, округла, у верхній частині трохи витягнута. Закритого типу. Висота коробочки 60-64 мм, діаметр 34-40 мм. На рослині 2-6 коробочок. Середня маса 1 коробочки без насіння 1,4 г. Насіння блакитного кольору. Маса 1000 насінин 0,37 г.

Веgetаційний період 112 днів. Середня урожайність насіння 19,2 ц/га, коробочок - 10,2 ц/га. Вміст жиру 54,0%, білка 29,5%, морфіну 0,054%.

Сорт стійкий до осипання, вилягання, середньо стійкий до посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками незначне. Рекомендований для виробництва рослинної олії та потреб харчової промисловості зон Степу, Лісостепу, Полісся.

Тарновецький. Заявник – Науково-виробниче сільськогосподарське підприємство “Фітон МВ”.

Сходи зелені з різко вираженим антоціановим забарвленням. Стебло прямостояче, сильно розгалужене, заввишки до 110 см. Листки витягнуті, широко ланцетної форми, зубчасті, слабко опушені, блідо-зелені. Прикореневі листки витягнуті, слабко опушені. Облиственість середня.

Квітки великі, пелюстки білого кольору, округлої форми, вічко фіолетове. Коробочка округла, з багатопроменевою приймочкою, закрита. Висота 45-55 мм, діаметр 32-35 мм. Число коробочок на рослині від 2 до 6. Насіння блакитного кольору. Маса 1000 насінин 0,47г.

Веgetаційний період 110 днів. Середня урожайність насіння 21,3 ц/га, коробочок 11 ц/га, вміст жиру 52,2%, морфіну 0,035%.

Сорт стійкий до вилягання, осипання, середньо стійкий до посухи. Хворобами уражується в незначній мірі, стійкий до пошкодження шкідниками.

Рекомендується для виробництва рослинної олії та потреб харчової промисловості зон Степу, Лісостепу, Полісся.

Юпітер. Заявник – Аграрний науково-дослідний інститут “АНДІ”.

Сходи блідо-зеленого кольору. Стебло прямостояче, заввишки до 130 см. Листки зеленого кольору з слабким антоціановим забарвленням. Листова пластинка з надрізними краями, опушення незначне. Прикореневі листки розміщені спірально, видовжені. Ступінь облиственості рослин висока.

Квітка округлої форми, червона з фіолетовим відтінком.

Коробочка яйцеподібної форми, зморшкувата, у верхній та нижніх частинах витягнута. Висота коробочки 62-66 мм, діаметр 30-34 мм. Закритого типу. Середня маса коробочки без насіння 2,0 г. Насіння блакитного кольору. Маса 1000 насінин 0,41 г.

Веgetаційний період 115 днів. Урожайність насіння 20,6 ц/га, коробочок 11,1 ц/га. Вміст жиру 52,1%, білка 30%, морфіну 0,052%.

Сорт стійкий до вилягання, осипання, середньо стійкий до посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками незначне.

Рекомендований для виробництва рослинної олії та потреб харчової промисловості в зонах Степу, Лісостепу та Полісся.

Франківський. Заявник – Науково-виробниче сільськогосподарське підприємство “Фітон МВ”.

Сходи зеленого кольору, широко ланцетоподібної форми з надрізаними краями; прикореневі листки подовжені, слабо опушені, облиственість рослин невелика.

Квітка велика, округлої форми, білого кольору з фіолетовим вічком. Коробочка кулеподібна з багато променевою приймочкою, закритого типу, заввишки 55-65 мм, діаметром 30-35 мм. Середня маса коробочки без насіння 3,6 г. Насіння білого кольору. Маса 1000 насінин 0,48 г.

Вегетаційний період 98 днів. Середній урожай насіння 11,8 ц/га, коробочок 6,5 ц/га. Вміст жиру 46,1%, морфіну 0,082%.

Сорт стійкий до вилягання, осипання, середньо стійкий до посухи. Хворобами уражується в незначній мірі, стійкий до пошкодження шкідниками. Вимогливий до ґрунтів і вологи у період вегетації. Добре реагує на внесення мінеральних добрив.

Рекомендований для виробництва рослинної олії та потреб харчової і кондитерської промисловості зон Степу, Лісостепу, Полісся.

Корал. Заявник – Інститут олійних культур УААН.

Рослини заввишки до 177 см. Стебло прямостояче, сильно опушене з восковим нальотом.

Листки великі, не опушені, продовгуваті, гладенькі. Листова пластинка слабо надрізана по краю, сіро-зелена, з восковим нальотом. Прикореневі листки видовжені, черешкові.

Квітка велика, блідо-бузкова з бузковим вічком. Плід – коробочка жовтуватого кольору, висотою 31 мм, діаметр 33 мм. На рослині 3-4 коробочки. Насіння нирковидної форми, блакитного кольору. Маса коробочки без насіння 1,7 г, маса насіння з 1 коробочки 2,3г, маса 1000 насінин 0,41г.

Вегетаційний період 95 нів. Середня урожайність насіння 8,2 ц/га, коробочок 5,5 ц/га. Вміст жиру 48,4%, морфіну 0,04%.

Сорт стійкий до осипання, але при тривалому перестой після дозрівання можуть спостерігатися поодинокі напіввідкриті коробочки; стійкий до вилягання.

Має підвищену стійкість до ураження хворобами і заселення шкідниками. Технологічний, придатний до механізованого вирощування.

Рекомендований для виробництва рослинної олії, вимог харчової промисловості зон Степу, Лісостепу, Полісся.

Герлах. Заявник – фірма Кремлін с.р.о. (Чехія).

Сходи зелені з восковим нальотом. Стебло пряме, заввишки до 130 см, слабо гіллясте. На рослині 2-3 гілки. Листки великі, зелені з антоціановим забарвленням, середньо опушені. Квітки великі, білого кольору з коричневим вічком. Плід – коробочка циліндричної форми, закритого типу. Насіння блакитного кольору. Аса 1000 насінин – 0,6 г.

Вегетаційний період від 90 до 1-5 днів. Середня урожайність насіння 10-12 ц/га. Вміст жиру 46%, морфіну 0,10-0,14%.

Сорт стійкий до осипання, середньо стійкий до вилягання та посухи. Хворобами та шкідниками пошкоджується в незначній мірі.

Рекомендується для виробництва рослинної олії та потреб харчової промисловості в зонах Степу, Лісостепу, Полісся.