

МІНАГРОПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА З ОХОРОНИ ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН

КАТАЛОГ СОРТІВ РОСЛИН
ПРИДАТНИХ ДЛЯ ПОШИРЕННЯ В УКРАЇНІ у 2004 році
(плодово-ягідні культури, виноград)

Київ 2004

УДК 347.77:633(055) ББК 67.404.1 0-92

Каталог сортів рослин, придатних для поширення в Україні у 2004 році, з плодово-ягідних культур та винограду підготували:
Волкодав В. В., Гончар О. М., Загинайло М. І., Рукавець Л. М., Ілюченко О. С.

Адреса Державної служби з охорони прав на сорти рослин:

Вул. Генерала Родимцева, 15, м. Київ-41, 03041, Україна,

тел.: 257-99-33, факс: 257-99-34

e-mail: sops@sops.gov.ua www.sops.gov.ua

Каталог сортів рослин, придатних для поширення в Україні у 2004 році, з плодово-ягідних культур та винограду. — К.: Алефа, 2004. — 68 с.

© Державна служба з охорони прав на сорти рослин, 2004

Підписано до друку 14.05.2004 року. Наклад 500 пр. Формат 60x84 1/8

Папір офсетний. Гарнітура Times. Ум. др.арк. 4,3

Віддруковано у видавництві “Алефа” з оригінал-макету замовника.

Адреса видавництва: 01042, Україна, м. Київ, вул. Перспективна, 3, тел./факс: 268-80-30

Свідцтво серія ДК № 306 від 28.12.2000 р.

ЗМІСТ

Скорочення термінів	5
Плодові та ягідні:	7
Яблуна	7
Груша	9
Айва	11
Хеномелес	11
Абрикос	11
Алича	12
Вишня	13
Черешня	13
Слива	15
Персик	16
Нектарін	18
Кизил	18
Агрус	18
Актинідія	19
Глід	19
Жимолость	19
Калина	20
Лимонник	20
Малина	20
Обліпіха	20
Порічки (червоні і білі)	21
Смородина чорна	21
Суниця	22
Шипшина	23
Горіх грецький	23
Гранат	24
Інжир	24
Ківі	24
Лимон	24
Маслина	24

Мигдаль	24
Унабі	24
Фундук	25
Хурма	25
Виноград	25
Виноград	25
Описи сортів плодових та ягідних культур, що занесені до Реєстру сортів, придатних для поширення в Україні	
Яблуня	30
Груша	34
Айва	36
Хеномелес	36
Абрикос	39
Алича	40
Вишня	40
Черешня	41
Слива	44
Персик	44
Нектарін	47
Кизил	47
Актинідія	49
Глід	50
Жимолость	51
Калина	53
Порічки (червоні і білі)	55
Смородина чорна	57
Суниця	62
Ківі	63
Лимон	63
Мигдаль	64
Описи сортів та підщепних сортів винограду, що занесені до Реєстру сортів, придатних для поширення в Україні	
Виноград	64
Підщепи винограду	67

СКОРОЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Зона - Рекомендована зона вирощування

П	Полісся
Л	Лісостеп
С	Степ
Кр	Крим
ЗГр	захищений ґрунт
1....15	тимчасові виноградарські зони
гідроп	гідропоніка
К	Карпати
ЗГр(СТ)	захищений ґрунт (скляна теплиця)
ЗГр(ПТ)	захищений ґрунт (плівкова теплиця)

Характеристика 1 - Продуктивність

7-9	висока
5	середня
<5	нижчесередньої

Характеристика 2 - Напрямок використання

влв	весняного промислового використання
оз	озимий
ЗПВ	для зон промислової вигодівлі
уц	урожайно-цукристий
цукр	цукристий
++	технічного напрямку
спц	спеція
парф	парфумерна промисловість
пер	переробка
фарм	фармацевтична промисловість
зпл	запилювач
слн	сильний
дф	добрий філер
цін	цінний
ф	філер
зерн	зерновий
зк	зерно-кормовий
пв	пивоварний

зф	задовільний філер
х	харчовий
фж	фуражний
олн	олійний
конд	кондитерський
вол	високоолеїновий
тхн	технічний
лік	лікарський
стл	столовий
тхст	технічно-столовий
сал	салатний
конс	консервний
зс	для соління
ун	універсального призначення
свж	споживання у свіжому вигляді
сил	силосний
лп	луко-пасовищний
мед	медонос
ск	сінокісний
піщ	піщаний
закав	закавказький
зак	залуження схилів та еродованих земель
овоч	овочевий
зх	захисний
прм	промисловий
зріз	зріз
озл	озеленення
аром	ароматичний
склт	скелетний
нц	напівцукровий
корм	кормовий
він	віничний
дкр	декоративного оформлення
лпв	для літнього промислового використання
сд	сидерат
зрош	на зрошуваних землях

хп	для харчової промисловості
всш	придатний для високоштамбової культури
г	гостра
нг	напівгостра
со	солодка
цу	цукристо-урожайний

Характеристика 3 - Група стиглості

ср	середньоранній
сп	середньопізній
сс	середньостиглий
рс	ранньостиглий
пс	пізньостиглий
рсдн	ранньосередній
скс	скоростиглий
зим	зимовий
літ	літній
осін	осінній
нр	надранньостиглий

Характеристика 4 - Зимостійкість/Холодостійкість

7-9	висока
>5	вищесередньої
5	середня
<5	низька

Характеристика 5 - Стійкість до посухи

7-9	висока
5	середня
<5	низька

Характеристика 6 - Стійкість до полягання

7-9	висока
5	середня
<5	низька

Характеристика 7 - Стійкість до осипання

7-9	висока
5	середня

<5	низька
----	--------

Характеристика 8 - Стійкість до хвороб

7-9	висока
5	середня
<5	низька

Характеристика 9 - Якість

вбіл	високобілковий
сбіл	середньобілковий
вкліт	висококлітковинний
скліт	середньоклітковинний
мал	малоалкалоїдний
сал	середньоалкалоїдний
вдек	високодекоративний
дек	декоративний
вщі	з високою щільністю покриття
сщі	з середньою щільністю покриття
влеж	високолежкий
слеж	середньолежкий
вц	високоцукристий
сц	середньоцукристий
вкр	висококрохмальний
скр	середньокрохмальний
вл	високоолійний
сл	середньоолійний
боп	безопійний
лік	лікарський
о	низькоеруковий
++	високоеруковий
о+	середньоеруковий
нгл	низькоглюкозинолатний
сгл	середньоглюкозинолатний
цін	цінний
ф	філер
зрош	на зрошуваних землях
слн	сильний
слн	сильний

Сорт				Код	Зона	Характеристики							
Назва	Вид	Номер	Рік рес- тації			Заявник / Підтримувач	Продук- тивність	Напря- м викорис- тання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)		
				посухи	поля- гання						осипання	хвороб	

Плодові та ягідні

Яблуня

- 56

54-118		73086025	1984	237 /	ЛП	підщ.			9	9			9	
Аврора кримська		73086019	1977	359 /	С	свж	зим		9	9		9	9	влеж
Айдоред		73086026	1986	1010 /	СЛ	свж	зим		9	9		9	9	влеж
Алкмене		84086009	1996	1010 /	ЛП	ун	осін		9	7		7	7	
Антонівка звичайна		90086015	1928	1010 /	ЛП	ун	осін		9	9		7	7	
Алі паруси		82086007	1994	359 /	С	свж	літ		9	7			7	
Аскольда		88086001	1999	344 /	ЛП	свж	зим		9	7		7	9	влеж
Бистриця		78086014	1995	344 /	СЛ	свж	осін		7	7		7	7	
Балаклавське		85086004	2001	359 /	С	свж	зим		9	7		7	7	влеж
Гала		78086013	1993	1010 /	С	свж	осін		7	7		7	7	
Голден Делішес		66086002	1969	1010 /	СЛ	свж	зим		9	9		9	9	влеж
Голдспур		74086004	1984	1010 /	СЛ	свж	зим		9	7		7	7	влеж
Д- 471		88086002	2000	314 /	С	підщ.			9	9			9	
Д-1071		94086002	2000	314 /	С	підщ.			9	9			9	
Джонатан		47086010	1954	1010 /	Л	свж	зим		9	9		7	7	влеж
Едера		97086007	2001	344 /	ЛП	свж	зим		9	9		7	9	влеж
ЕМ-ІХ		75086010	1976	1010 /	С	підщ.			9	9			9	
Зоря Поділля		54086001	1980	344 /	СЛП	свж	зим		9	9		7	7	слеж
Зимове лимонне		55086001	1969	403 /	ЛП	свж	зим		9	7		7	7	слеж
Катерина		94086013	2001	344 /	ЛП	свж	зим		9	7		7	7	слеж
Кимерія		92086003	1997	359 /	С	свж	зим		7	7		7	7	слеж
Кальвіль донецький		71086001	1987	314 /	С	свж	зим		9	7		7	7	слеж
Кальвіль сніговий		47086005	1928	1010 /	ЛПС	свж	зим		9	7		5	7	влеж
Кримське		75086004	1999	359 /	Кр	свж	зим		7	7		7	7	слеж
Краснокутське солодке		86086003	2003	403 /	Л	свж	осін		7	9		7	7	
Кримське зимове		69086006	1984	359 /	С	свж	зим		9	7		7	7	влеж

Сорт				Код	Зона	Характеристики								
Назва	Вид	Номер	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач		Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
										посухи	полягання	осипання	хвороб	
Каразинське		97086002	1999	403 /	Л	свж	зим	7	7		7	7	слеж	
Куликівське		83086007	2002	202 /	П	свж	зим	7	7		7	7	слеж	
Мекінтош		38086010	1954	1010 /	Л	ун	осін	9	7		7	7		
Мелба		40086003	1962	1010 /	СЛП	свж	літ	9	9		7	7		
Мінкар		90086006	2002	325 /	СЛ	свж	зим	7	7		7	7	влеж	
ММ-106		75086014	1984	1010 /	СЛП	підш.		9	9			9		
Млївське літнє		61086002	1962	424 /	Л	свж	літ	9	7		7	7		
Мантуанер		38086009	1989	1010 /	С	свж	зим	9	9		9	9	влеж	
Папіровка		38086003	1928	1010 /	СЛП	свж	літ	9	9		7	7		
Пепінка золотиста		55086002	1971	424 /	СЛП	свж	осін	9	9		7	7		
Предгорнє		75086026	1999	359 /	Кр	свж	зим	7	7		7	7	слеж	
Прима		76086023	1991	1010 /	С	свж	осін	9	7		7	7		
Перлина Кисва		94086021	2001	344 /	ЛП	свж	зим	9	7		7	7	слеж	
Рум'яний альпініст		87086002	1997	365 /	С	свж	зим	7	7		7	7	слеж	
Росавка		80086003	1992	424 /	СЛ	свж	зим	9	9		7	7	влеж	
Радогость		92086018	2000	344 /	ЛП	свж	зим	7	7		7	7	слеж	
Ровесник		78086006	2000	424 /	СЛ	свж	зим	7	7		7	7	слеж	
Ренет Смиренка		47086006	1928	424 /	СЛП	свж	зим	9	9		9	7	влеж	
Рубінове Дуки		74086003	1983	344 /	Л	свж	зим	7	7		7	7	слеж	
Старкримсон		67086007	1984	1010 /	СЛ	свж	зим	9	7		7	7	влеж	
Спартан		70086013	1986	1010 /	СЛП	свж	зим	9	9		7	7	влеж	
Слава переможцям		47086008	1954	424 /	СЛП	ун	осін	9	9		7	7		
Сентябрьське красне		69086010	1989	359 /	С	свж	осін	9	7		7	7		
Сапфір		82086011	2001	424 /	ЛП	свж	зим	7	7		7	7	слеж	
Салгірське		73086021	1981	359 /	С	свж	осін	7	7		7	7		
Смиренківець		80086004	1997	424 /	Л	свж	зим	9	7		7	7	влеж	
Таврія		75086008	1984	359 /	С	свж	зим	7	7		7	7	слеж	
Теремок		90086002	1999	344 /	ЛП	ун	осін	9	7		7	7		
Уманське зимове		68086012	1988	344 /	СЛ	свж	зим	9	7		7	7	слеж	

Сорт				Код	Зона	Характеристики								Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач		Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				
										посухи	полягання	осипання	хвороб	
Флоріна		94086011	2003	1010 /	СЛ		свж	зим	9	7		9	9	слеж
Груша		-	57											
Бере Жіффар		40076007	1928	1010 /	СЛП		свж	літ	7	9		7	7	
Буковинка		87076007	1997	433 /	Л		ун	осін	7	7		7	7	
Бере київська		72076001	1991	344 /	Л		свж	зим	9	9		7	7	влеж
Бере Боск		40076005	1928	1010 /	СЛ		свж	осін	9	9		9	7	
Бере прекос Мореттіні		68076002	1982	1010 /	С		свж	літ	9	9		7	7	
Вижниця		87076012	1999	344 /	ЛП		свж	осін	9	7		7	7	
Вікторія		73076001	1988	325 /	СЛ		ун	осін	7	7		7	7	
Вільямс		40076009	1928	1010 /	СЛ		ун	літ	9	7		7	7	
Васса		66076001	1979	359 /	С		свж	зим	9	7		7	7	слеж
Вітчизняна		57076002	1969	359 /	СЛ		свж	зим	9	7		7	7	слеж
Вільямс Руж Дельбара		68076003	1988	1010 /	С		свж	літ	9	9		7	7	
Гранд Чемпіон		73076005	1988	1010 /	С		свж	осін	9	9		7	7	
Деканка краснокутська		71076001	1987	403 /	Л		свж	зим	9	9		7	7	слеж
Десертна		57076001	1969	359 /	С		свж	осін	7	7		7	7	
Деканка зимова		47076001	1928	1010 /	СЛ		свж	зим	9	9		9	7	слеж
Епод		87076013	1999	372 /	ЛП		свж	зим	9	7		7	7	влеж
Зимова мліївська		68076001	1989	424 /	Л		свж	зим	9	7		7	7	влеж
Золотиста		58076001	1975	359 /	С		свж	зим	9	7		7	7	влеж
Звєнїєнська		92076024	1997	433 /	Л		ун	осін	7	7		7	7	
Золотоворітська		81076004	1995	372 /	Л		свж	зим	9	9		9	9	влеж
ІС 2-10		98076001	2000	344 /	ЛП		підш.		9	9			9	
ІС 4-6		98076002	2000	344 /	ЛП		підш.		9	9			9	
Ізумрудна		82076009	1994	359 /	С		свж	зим	9	7		7	7	слеж
Ізюминка Криму		83076003	1995	359 /	С		свж	зим	9	7		7	7	слеж
Кучерянка		88076003	1997	433 /	Л		ун	зим	9	9		9	9	влеж
Конференція		54076001	1975	1010 /	ЛП		свж	осін	9	9		7	9	

Сорт				Код	Зона	Характеристики								Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач		Продуктивність	Напрямовикористання	Групастиглості	Зимост.Холодост.	Стійкість до (бали)				
										посухи	полягання	осипання	хвороб	
Крупноплідна		87076011	1997	433 /	Л		ун	осін	9	7		7	7	
Кюре		40076013	1928	1010 /	СЛП		свж	зим	9	9		9	9	в'єж
Корсунська		49076001	1972	424 /	Л		свж	літ	9	7		7	7	
Лимонка		40076003	1928	1010 /	СЛ		ун	літ	9	9		7	7	
Лимонка осіння		77076002	1994	403 /	Л		ун	осін	9	9		7	7	
Малевчанка		88076002	1997	433 /	Л		ун	осін	7	7		7	7	
Мліївська рання		55076001	1962	424 /	Л		ун	літ	7	7		7	7	
Марія		92076011	2001	359 /	Кр		свж	зим	7	7		7	7	сл'єж
Наdejда степу		87076003	2000	365 /	С		свж	осін	7	7		7	7	
Ноябрська Молдавії		95076002	2000	365 /	Кр		свж	зим	9	7		7	7	в'єж
Осінь Буковини		88076001	1997	433 /	Л		ун	осін	9	7		7	7	
Основ'янська		69076001	1987	403 /	СЛ		свж	осін	9	9		7	7	
Придністр'янка		87076005	1997	433 /	П		ун	осін	7	7		7	7	
Парижанка		47076003	1954	1010 /	Л		свж	зим	9	9		9	9	в'єж
Роксолана		81076005	1995	372 /	СЛ		свж	зим	9	9		9	9	сл'єж
Сторожинецька		92076005	1997	433 /	Л		ун	зим	9	9		9	9	сл'єж
Стрійська		86076002	1999	344 /	ЛП		свж	зим	9	9		9	9	в'єж
Старкримсон		73076007	1985	1010 /	С		свж	літ	9	9		9	7	
Солодка з Млієва		52076001	1981	424 /	Л		свж	літ	77	7		7	7	
Смерічка		83076002	1995	372 /	Л		свж	осін	7	7		9	7	
Трембіта		80076008	1995	372 /	Л		свж	осін	7	7		7	9	
Таврійська		74076003	1976	359 /	СЛ		свж	осін	9	7		9	7	
Улюблена Клаппа		40076015	1928	1010 /	СЛП		свж	літ	9	7		7	7	
Улюблена осіння		82076006	1987	403 /	Л		свж	осін	7	7		7	7	
Чернівчанка		87076006	1997	433 /	Л		ун	осін	7	7		7	7	
Черемшина		82076002	2000	344 /	ЛП		свж	зим	9	9		7	7	в'єж
Шунтукська		79076005	1995	22 /	С		свж	осін	7	7		7	7	
Щедра		51076002	1978	424 /	Л		свж	осін	7	7		7	7	
Яблунівська		87076009	1997	433 /	Л		ун	зим						в'єж

Сорт				Код	Зона	Характеристики								Якість
Назва	Вид	Номер	Рік рес- тації	Заявник / Підтримувач		Продук- тивність	Напря- м викорис- тання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				
										посухи	поля- гання	осипання	хвороб	
Янтарна		74076004	1989	325 /	СЛП		свж	осін	7	7		7	7	
Якимівська		86076003	2000	359 /	С		свж	осін	9	7		9	7	
Айва		- 11												
Академічна		97207004	1999	348 /	СЛП		ун	сс	7	7		5	5	
Дарунок онуку		97207002	1999	348 /	СЛП		ун	ср	7	7		5	7	
Кашенка №18		97207001	1999	348 /	ЛП		ун	рс	9	7		7	5	
Кримська ароматна		72207001	1981	365 /	СЛ		ун	сс	9	7		7	7	
Кримська рання		68207004	1982	365 /	С		ун	рс	7	7		7	5	
Мир		72207003	1981	365 /	СЛ		ун	сп	7	7		5	7	
Марія		97207003	1999	348 /	СЛП		ун	сс	7	7		5	5	
Отлічниця		68207005	1976	365 /	С		ун	сс	7	7		5	5	
Студентка		87207001	1999	348 /	СЛП		ун	сс	7	7		7	7	
С'єдобна		98207001	2001	365 /	С		ун	сс	9	7		7	5	
Сказочна		98207002	2001	365 /	С		ун	сс	9	7		5	5	
Хеномелес		- 8												
Вітамінний		99362001	2001	348 /	ЛП		ун	рс	9	7		7	5	
Караваєвський		99362003	2001	348 /	ЛП		ун	пе	9	7		7	5	
Каліф		98362004	2001	314 /	СЛ		тхн	рс	9	7		7	5	
Ніна		98362002	2001	314 /	СЛП		тхн	рс	9	7		7	7	
Ніка		98362003	2001	314 /	СЛП		тхн	рс	9	7		7	7	
Ніколай		98362001	2001	314 /	СЛП		тхн	рс	9	7		7	7	
Помаранчевий		99362002	2001	348 /	ЛП		ун	сс	9	7		7	5	
Цитриновий		99362004	2001	348 /	ЛП		ун	сс	9	7		7	5	
Абрикос		- 18												
Авіатор		83070001	1995	365 /	С		ун	пе	7	7		5	5	
Ананасний щорупінський		40070001	1962	365 /	С		ун	сс	9	7		7	7	

Сорт				Код	Зона	Характеристики								
Назва	Вид	Номер	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач		Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
										посухи	полягання	осипання	хвороб	
Буревісник		78070001	1991	365 /	С		стл	рс	7	7		5	5	
Ботсадівський		83070006	2001	348 /	СЛ		ун	ср	7	5		7	5	
Зоряний		84070001	2000	325 /	С		ун	ср	7	5		7	7	
Кримський амур		83070002	1994	365 /	С		ун	сп	7	7		5	7	
Колгоспний		77070002	1993	344 /	СЛ		ун	сс	7	7		7	5	
Консервний пізній		47070001	1969	365 /	С		ун	пс	9	7		7	7	
Краснощокій		48070001	1928	1010 /	СЛ		ун	сс	9	9		7	7	
Мелітопольський лучистий		80070004	1990	325 /	С		стл	сс	7	5		5	7	
Мелітопольський ранній		56070001	1980	325 /	С		стл	рс	7	7		7	5	
Мелітопольський пізній		70070002	1988	325 /	СЛ		ун	пс	9	9		7	7	
Олімп		69070001	1983	365 /	СЛ		ун	сс	7	7		7	7	
Пам'ять Кашенка		78070003	2001	348 /	СЛ		ун	рс	9	7		7	7	
Поліський крупноплідний		74070001	1985	344 /	С		ун	сс	7	7		5	5	
Парнас		69070002	1982	365 /	С		ун	сс	9	9		7	7	
Сульмона		84070009	1995	1010 /	С		ун	пс	7	5		5	5	
Форум		72070001	1992	365 /	С		ун	рс	7	7		5	5	

Алича

- 12

Десертна	48072001	1969	365 /	С		ун	сс	9	9		5	7	
Дончанка рання	92072004	1997	314 /	Л		свж	рс	9	9		7	7	
Жемчужина	77072001	1993	20 /	СЛ		ун	рс	9	9		7	7	
Кремень	84072001	1995	20 /	ЛП		ун	ср	9	9		7	7	
Кубанська комета	76072001	1991	20 /	СЛП		ун	рс	9	9		9	9	
Київська гібридна	84072002	2001	348 /	СЛ		ун	рс	9	7		7	7	
Найдьоніш	86072005	1998	314 /	Л		ун	пс	9	7		7	5	
Обільна	57072001	1969	365 /	С		ун	рс	9	9		7	7	
Оленька	86072001	1995	365 /	СЛ		ун	сс	9	9		7	7	
Путешественіца	76072003	1992	20 /	Л		ун	рс	9	7		5	7	

Сорт				Код	Зона	Характеристики								Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач		Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				
										посухи	полягання	осипання	хвороб	
Пламенна		86072004	1998	314 /	Л		ун	пс	9	7		5	5	
Сигма		90072002	1992	20 /	Л		ун	сс	9	7		7	7	
Вишня		-	17											
Альфа		79074001	2000	424 /	Л		ун	сп	9	9		5	5	
Встреча		82074001	1995	325 /	С		ун	сп	9	9		5	5	
Гріот Подбельський		38074008	1948	1010 /	СЛП		ун	сс	9	9		7	7	
Гріот мелітопольський		80074001	2002	325 /	С		ун	сс	9	9		7	7	
Гуртівка		76074003	1986	202 /	Л		ун	рс	9	9		7	7	
Жуковська		47074002	1978	238 /	С		ун	сс	9	9		7	7	
Ігрушка		80074004	1992	325 /	С		ун	сс	9	9		5	5	
Любська		39074001	1928	1010 /	С		ун	пс	9	9		7	5	
Мелітопольська десертна		47074005	1954	325 /	СЛ		ун	сс	9	7		5	7	
Метеор		84074003	2003	761 /	Л		ун	сс	9	7		7	7	
Норд Стар		84074005	1995	1010 /	П		ун	пс	9	9		9	9	
Орколія		71074001	1987	202 /	С		ун	сп	9	7		5	5	
Ожиданіє		83074002	1993	325 /	С		ун	сс	9	7		7	7	
Примітна		81074004	1991	325 /	С		ун	сс	9	7		5	7	
Пам'яті Вавілова		70074001	1986	238 /	Л		ун	сс	9	9		5	5	
Тургенєвка		71074003	1985	202 /	СЛП		ун	сс	9	9		5	5	
Шалунья		80074002	1990	325 /	С		ун	сс	9	7		5	7	
Черешня		-	58											
Амазонка		90085002	2001	314 /	Л		ун	пс	7	7		5	5	
Аеліта		77085004	1989	314 /	СЛ		ун	сп	9	7		5	5	
Анонс		76085005	1990	325 /	С		ун	сп	9	7		7	7	
Бігарро Хатіф Бурлат		75085007	1994	1010 /	С		свж	рс	9	7		7	7	
Бігарро Старкінг Харді Джайнт		79085007	1991	1010 /	С		ун	сс	9	7		7	7	
Бігарро Марморг		75085006	1997	1010 /	Л		ун	сс	9	9		7	7	

Сорт				Код	Зона	Характеристики								
Назва	Вид	Номер	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач		Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
										посухи	полягання	осипання	хвороб	
Валерій Чкалов		52085001	1954	238 /	СЛП	ун	рс	9	9		7	7		
Валерія		88085004	2001	314 /	Л	ун	сс	9	7		5	7		
Винка		48085001	1981	325 /	С	ун	сс	9	9		7	7		
Виставочна		47085001	1972	365 /	СЛ	ун	пс	9	9		7	7		
Генеральська		48085002	1989	365 /	С	ун	пс	9	9		7	7		
Дончанка		71085001	1985	314 /	СЛ	ун	сп	7	7		5	7		
Дачниця		83085001	2001	325 /	С	ун	сс	9	7		7	7		
Дніпровка		47085002	1954	325 /	С	ун	сс	7	7		5	7		
Донецька красавиця		82085006	1987	314 /	С	ун	сс	9	7		7	5		
Ділема		74085004	1987	325 /	С	ун	сс	9	7		7	7		
Донецький уголюк		77085007	1990	314 /	СЛ	ун	пс	7	7		7	7		
Дрогана жовта		40085002	1928	1010 /	СЛП	ун	пс	9	9		7	7		
Дружба		76085001	2001	325 /	С	ун	сс	9	7		7	5		
Електра		82085009	2001	325 /	С	ун	сп	9	9		7	7		
Запорізька		47085003	1962	325 /	Л	свж	рс	7	9		7	7		
Заря Востока		72085002	1996	365 /	Л	ун	сс	9	7		5	5		
Забуга		86085008	2002	325 /	П	ун	пс	7	9		7	5		
Зоряна (Возвращеніє)		99085006	2002	424 /	Л	ун	пс	9	7		7	7		
Ізюмна		71085002	1991	325 /	Л	ун	пс	7	7		5	7		
Іскра		79085001	1998	325 /	С	ун	сп	7	7		7	7		
Китаївська чорна		50085003	1962	344 /	ЛП	ун	сс	7	5		5	5		
Красавиця Києва		50085004	1962	344 /	ЛП	ун	сс	7	7		5	5		
Кримська ніч		75085002	1998	365 /	СЛ	ун	сс	7	7		5	5		
Крупноплідна		72085003	1983	325 /	С	ун	сс	9	7		9	5		
Космічна		70085002	1984	325 /	СЛ	ун	сс	9	7		7	7		
Міраж		88085002	2003	325 /	Л	ун	рс	9	7		7	7		
Мелітопольська чорна		57085002	1969	325 /	СЛ	ун	сс	9	7		5	5		
Мелітопольська рання		47085004	1976	325 /	С	свж	рс	7	7		7	5		
Меотіда		02085001	2003	325 /	Л	ун	сс	9	7		7	7		

Сорт				Код	Зона	Характеристики								Якість
Назва	Вид	Номер	Рік ресет- рації	Заявник / Підтримувач		Продук- тивність	Напря- м викорис- тання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				
										посухи	поля- гання	осипання	хвороб	
Мелітопольська красна		71085004	1996	325 /	СЛ		ун	сс	9	9		7	7	
Нектарна		49085003	1954	424 /	СЛ		ун	пс	9	7		7	7	
Оріон		81085001	1998	325 /	Л		ун	сс	7	7		5	5	
Престижна		74085003	1990	325 /	С		ун	сп	9	7		7	7	
Полянка		68085002	1980	325 /	Л		ун	пс	9	9		7	7	
Патріотка Криму		82085003	2003	365 /	С		ун	рс	9	9		7	7	
Присадибна		47085006	1954	325 /	СЛ		свж	рс	9	9		7	7	
Романтика		79085002	1998	325 /	ЛП		ун	пс	9	7		7	7	
Рання Дуки		49085002	1972	344 /	Л		свж	рс	7	7		5	5	
Рожева мліївська		49085001	1962	424 /	ЛП		ун	пс	7	7		5	7	
Рубінова рання		71085006	1983	325 /	СЛ		свж	рс	9	9		7	7	
Скороспілка		50085005	1954	325 /	С		свж	рс	9	9		7	7	
Сюрприз		70085004	1982	325 /	С		ун	сп	9	7		5	5	
Сказка		86085007	2002	325 /	С		ун	рс	7	7		5	7	
Тавричанка		47085012	1969	325 /	С		ун	сп	9	9		5	5	
Талісман		93085001	1995	325 /	С		ун	сс	9	9		7	7	
Улюблена Дуки		50085007	1962	344 /	ЛП		ун	сс	7	7		7	7	
Удівительна		77085002	1991	325 /	СЛ		ун	сс	7	7		5	5	
Францис		40085005	1928	1010 /	СЛП		ун	сп	7	7		7	5	
Чорнокримка		86085006	2003	365 /	С		ун	рс	9	7		7	5	
Червнева рання		50085001	1969	325 /	СП		свж	рс	9	7		7	7	
Янтарна		47085009	1980	365 /	Л		ун	пс	7	7		5	5	
Ярославна		77085003	1989	314 /	СЛ		ун	сп	9	7		7	5	
Слива		- 19												
Анна Шпет		39080001	1928	1010 /	СЛП		ун	пс	9	9		7	5	
Блюфрі		90080006	1994	761 /	С		ун	пс	9	9		7	5	
Волошка		76080001	1980	424 /	СЛП		ун	пс	9	9		5	5	
Валор		89080001	1997	1010 /	Л		ун	сп	9	9		5	5	

Сорт				Код	Зона	Характеристики								
Назва	Вид	Номер	Рік реєстрації			Заявник / Підтримувач	Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)			
				посухи	полягання						осипання	хвороб		
Ода		79080003	1986	424/	Л		свж	рс	9	9		5	5	
Президент		61080002	2003	761/	Л		ун	сп	9	9		7	7	
Ренклюд ранній		90080002	1988	314/	С		свж	рс	9	7		5	5	
Ренклюд Карбишева		75080001	1984	314/	Л		ун	рс	9	9		7	7	
Ренклюд Алтана		39080009	1954	1010/	СЛП		ун	сп	9	9		7	7	
Сентябрьська		48080002	2003	424/	Л		ун	сп	9	9		7	7	
Стенлей		76080006	1988	1010/	СЛ		ун	пс	9	9		7	7	
Угорка ажанська		38080001	1928	1010/	СЛ		ун	сс	9	9		7	7	
Угорка донецька		71080004	1985	314/	С		ун	пс	9	7		7	5	
Угорка італійська		39080003	1928	1010/	СЛП		ун	пс	9	9		7	7	
Угорка донецька рання		71080001	1984	314/	С		ун	пс	9	7		5	5	
Угорка ювілейна		80080001	1995	607/	С		ун	сс	9	7		5	7	
Угорка крупна		90080001	1992	365/	С		ун	сс	9	9		7	7	
Угорка Альбаха		73080002	1991	1010/	С		свж	рс	9	7		7	7	
Чачакська найкраща		90080005	1999	363/	С		ун	пс	9	7		5	5	

Персик

- 42

Волшебний		68079008	1995	365/	С		ун	сс	9	7		7	7	
Восток 3		81079002	1995	365/	С		ун	сс	7	7		7	7	
Віреня		94079001	2003	325/	С		ун	сс	7	7		7	7	
Дніпровський		67079001	1979	348/	СЛ		ун	рс	7	5		5	5	
Дружба		70079001	1972	348/	Л		стл	сс	7	5		5	5	
Золота Москва		72079004	1982	365/	С		стл	сп	7	7		7	7	
Золотистий		76079001	1988	325/	С		ун	пс	7	7		7	7	
Знамя		74079002	1986	365/	С		ун	пс	7	7		7	7	
Золотий ювілей		48079005	1954	1010/	СЛ		стл	сп	7	7		7	5	
Златогор		51079001	1976	365/	С		ун	рс	7	7		7	7	
Крімсон Голд		86079003	1992	1010/	С		стл	рс	7	7		5	7	
Київський ранній		50079001	1954	344/	СЛ		стл	рс	5	7		7	5	

Сорт				Код	Зона	Характеристики								
Назва	Вид	Номер	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач		Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
					посухи					полягання	осипання	хвороб		
Красна дівиця		63079002	1977	365 /	С		стл	сп	7	7		7	7	
Кремлівський		47079002	1954	365 /	С		стл	рс	7	7		7	7	
Кримська осінь		83079003	1999	365 /	С		ун	пс	7	7		7	7	
Кримський фейсверк		84079009	1995	365 /	С		ун	рс	7	7		5	7	
Лебедєв		48079001	1969	365 /	С		ун	сс	7	7		7	7	
Лісостеповий		78079001	1993	348 /	С		стл	рс	7	7		7	7	
Любимець II		97079005	2001	348 /	СЛ		ун	сс	7	7		7	5	
Мелітопольський ясний		80079002	1991	325 /	С		стл	рс	7	7		7	7	
Муза		68079003	1982	365 /	С		стл	пс	7	7		7	7	
Молодіжний		63079004	1982	365 /	СЛ		стл	сс	5	5		5	5	
Оksamитовий		92079014	2001	348 /	Л		ун	сп	7	5		5	5	
Пам'ять Гришко		92079005	2001	348 /	СЛ		ун	пс	5	5		5	5	
Подарок Кисва		78079003	1993	348 /	С		стл	сс	7	7		7	7	
Пам'ять Шевченка		71079002	1978	348 /	С		ун	сс	7	7		7	7	
Посол миру		92079001	2002	365 /	С		ун	рс	7	7		7	7	
Потомок		77079002	1992	365 /	С		ун	сс	7	7		7	7	
Пушистий ранній		47079004	1954	365 /	СЛ		стл	рс	5	5		5	5	
Підщепний I		75079004	1990	348 /	С				9	9		-	9	
Редхавен		68079012	1985	1010 /	С		стл	сс	7	7		7	7	
Рум'яний		68079006	1972	348 /	СЛ		стл	рс	5	5		5	5	
Сказка		79079002	1993	365 /	С		стл	сс	7	7		7	7	
Советський		48079002	1954	365 /	С		стл	сп	7	7		7	7	
Стартовий		94079005	2000	365 /	С		ун	рс	7	7		7	7	
Славутич		71079004	1984	348 /	СЛ		стл	сс	7	5		7	7	
Сочиний		47079005	1954	365 /	СЛ		стл	рс	7	7		7	7	
Старк Сангло		70079005	1993	1010 /	С		ун	сс	7	7		7	7	
Франт		68079007	1974	365 /	С		стл	рс	7	7		7	7	
Чемпіон ранній		81079003	1983	365 /	С		стл	рс	7	7		7	7	
Щедрий		92079004	2001	348 /	Л		ун	пс	7	5		5	5	

Сорт				Код	Зона	Характеристики								
Назва	Вид	Номер	Рік рес- тації	Заявник / Підтримувач		Продук- тивність	Напря- м викорис- тання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
										посухи	поля- гання	осипання	хвороб	
Ювілейний Сидоренка		90079002	2003	325 /	С		ун	сп	7	7		7	7	
Нектарін		-	1											
Рубіновий 8		84396001	2001	365 /	С		ун	пс	7	7		5	7	
Кизил		-	15											
Билда		98212001	2001	314 /	СЛП		ун	пс	7	7		5	7	
Вавіловець		92212007	2000	348 /	СЛ		ун	рс	7	5		5	7	
Володимирський		97212002	1999	348 /	СЛП		ун	сс	9	5		5	7	
Видубецький		87212004	2000	348 /	СЛ		ун	сс	7	7		5	7	
Гренадер		92212001	2000	348 /	СЛ		ун	нр	7	5		5	7	
Екзотичний		00212001	2001	348 /	СЛП		ун	пс	9	5		5	7	
Елегантний		92212006	1999	348 /	СЛП		ун	рс	9	5		5	7	
Євгенія		97212003	1999	348 /	СЛП		ун	сс	9	5		5	7	
Кораловий Марка		00212002	2001	348 /	СЛП		ун	рс	9	5		5	7	
Лук'янівський		87212003	1999	348 /	СЛП		ун	сс	7	7		5	7	
Миколка		92212002	2000	348 /	СЛ		ун	рс	7	5		5	7	
Олена		92212004	1999	348 /	СЛП		ун	рс	9	5		5	7	
Радість		92212005	2000	348 /	СЛ		ун	рс	7	5		5	7	
Світлячок		92212003	1999	348 /	СЛП		ун	пс	9	5		5	5	
Семен		97212001	1999	348 /	СЛП		ун	пс	9	5		5	7	
Агрус		-	11											
Артемівський		68071001	1998	314 /	С		ун	рс	9	7		5	5	
Бахмутський		68071002	1978	314 /	С		ун	сс	9	7		5	5	
Високий замок		85071001	1995	372 /	П		ун	сс	9	7		5	5	
Донецький крупноплідний		68071003	1976	314 /	С		ун	сс	9	7		5	5	
Донецький первенець		68071004	1979	314 /	СЛ		ун	рс	9	7		7	5	
Карпати		84071001	1995	372 /	Л		ун	сс	9	7		5	5	

Сорт				Код	Зона	Характеристики								Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач		Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				
										посухи	полягання	осипання	хвороб	
Красень		75071001	1986	424 /	ЛП		ун	сс	9	7		5	5	
Каменярь		85071002	1994	372 /	ЛП		ун	сс	9	7		5	5	
Консервний		66071001	1981	424 /	Л		ун	сс	9	7		5	5	
Млійський жовтий		51071001	1969	424 /	ЛП		ун	рс	9	7		5	7	
Неслухівський		84071002	1990	372 /	ЛП		ун	сс	9	7		5	5	
Актинідія		-	12											
Загадкова		00208004	2001	348 /	СЛ		ун	сс	>5	5		5	7	
Київська гібридна		84208003	1992	348 /	СЛП		ун	сс	>5	5		5	5	
Київська крупноплідна		84208004	1992	348 /	СЛП		ун	сс	>5	5		5	5	
Караваївська урожайна		92208002	2001	348 /	СЛ		ун	пс	>5	5		5	7	
Надія		00208003	2001	348 /	СЛ		ун	сп	>5	5		5	7	
Оригінальна		92208003	2001	348 /	СЛ		ун	сс	>5	5		5	7	
Перлина саду		00208002	2001	348 /	СЛ		ун	рс	>5	5		5	7	
Пурпурна садова		84208006	1992	348 /	слп		ун	сс	>5	5		5	7	
Ріма		00208001	2001	348 /	СЛ		ун	сс	>5	5		5	7	
Рубінова		92208001	2001	348 /	СЛ		ун	рс	>5	5		5	7	
Сентябрьська		84208002	1992	348 /	СЛП		ун	сс	>5	5		5	5	
Фігурна		84208005	1992	348 /	СЛП		ун	сс	>5	5		5	5	
Глід		-	3											
Збігнєв		98320002	2001	1089 /	СЛП		ун	рс	9	7		7	7	
Людмил		98320001	2001	1089 /	СЛП		ун	пс	9	7		7	7	
Шаміль		98320003	2001	1089 /	СЛП		ун	пс	9	7		7	7	
Жимолость		-	6											
Богдана		98341001	2000	403 /	Л		ун	сс	7	7		7	5	
Дончанка		97341004	2001	317 /	СЛ		ун	рс	9	7		7	5	
Степова		97341002	2001	317 /	СЛ		ун	рс	9	7		7	5	
Скіфська		97341001	2001	317 /	СЛ		ун	рс	9	7		7	5	

Сорт				Код	Зона	Характеристики							
Назва	Вид	Номер	Рік реєстрації			Заявник / Підтримувач	Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)		
				посухи	полягання						осипання	хвороб	
Українка		97341003	2001	317 /	СЛ	ун	рс	9	7		7	5	
Фіалка		98341002	2000	403 /	Л	ун	сс	7	7		7	5	
Калина		-	2										
Великоплідна		97211002	2001	424 /	ЛП	ун	сс	9	9		7	7	
Коралова		97211001	2001	424 /	ЛП	ун	рс	9	9		7	7	
Лимонник		-	1										
Садовий 1		96213001	1998	348 /	ЛП	ун	сс	7	7		7	9	
Малина		-	15										
Бальзам		81077006	1993	163 /	СЛ	ун	ср	9	7		7	7	
Бригантина		81077004	1995	163 /	СЛ	ун	сс	9	7		7	7	
Бабине літо		88077002	1995	163 /	СЛП	ун	рм	9	7		7	7	
Журавлик		88077001	1995	163 /	СЛ	ун	рс	9	7		7	7	
Зєва		90077004	1995	1010 /	СЛ	ун	рм	9	7		7	7	
Каскад Брянський		78077002	1990	163 /	П	ун	рс	9	7		7	7	
Мар'янушка		81077001	1993	403 /	СЛ	ун	сс	9	7		7	7	
Метеор		78077001	1987	163 /	СЛ	ун	нр	9	7		7	7	
Награда		67077001	1976	100 /	СЛП	ун	сс	9	7		7	7	
Новокітківська		51077001	1969	344 /	СЛП	ун	рс	9	7		7	7	
Новість Миколайчука		73077001	1987	424 /	ЛП	ун	сс	9	7		7	7	
Одарка		80077002	1988	403 /	СЛП	ун	рс	9	7		7	7	
Рось		86077001	1999	424 /	СЛ	ун	рс	9	7		7	7	
Спутниця		81077003	1990	163 /	СЛП	ун	рс	9	7		7	7	
Скромниця		81077005	1990	163 /	СЛП	ун	сс	9	7		7	7	
Обліпіха		-	10										
Володимирка		73078002	1991	1010 /	П	ун	рс	9	5		7	7	
Київський янтар		98078001	2000	1085 /	Л	ун	рс	9	5		7	7	

Сорт				Код	Зона	Характеристики								
Назва	Вид	Номер	Рік ресес- тації	Заявник / Підтримувач		Продук- тивність	Напря- м викорис- тання	Група стиглогості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
										посухи	поля- гання	осипання	хвороб	
Либідь		98078002	2000	1085 /	Л		ун	сс	9	5		7	7	
Новость Алтаю		73078006	1988	3 /	С		ун	сс	9	5		7	7	
Обільна		78078003	1989	3 /	Л		ун	пс	9	5		7	7	
Превосходна		78078001	1988	3 /	П		ун	рс	9	5		7	7	
Солодка жінка		98078003	2000	314 /	С		ун	сс	9	7		7	7	
Трохимівська		80078001	1992	100 /	П		ун	сс	9	5		7	7	
Чуйська		78078006	1988	3 /	ЛП		ун	сс	9	5		7	7	
Янтарна		78078007	1998	3 /	П		ун	сс	9	5		7	7	

Порічки (червоні і білі) - 11

Голландська червона	47082002	1954	1010 /	СЛП		ун	пс	9	7		7	7	
Йонкер ван Тетс	81082001	1987	1010 /	СЛП		ун	рс	9	7		7	7	
Львівська солодка	94082002	2000	372 /	ЛП		ун	сс	9	7		5	7	
Любава	94082003	2000	372 /	ЛП		ун	сс	9	7		5	7	
Рондом	84082002	1990	1010 /	СЛП		ун	пс	9	7		7	7	
Святкова	94082004	2000	372 /	ЛП		ун	рс	9	7		7	7	
Святомихайлівська	98082001	2001	344 /	СЛП		ун	сп	9	7		7	7	
Троїцька	94082008	2001	344 /	СЛП		ун	сп	9	7		7	7	
Фертоді 56 пірош	83082001	1994	1010 /	СЛП		ун	сп	9	7		5	7	
Чародійка	94082006	2000	372 /	ЛП		ун	пс	9	7		5	7	
Ярославна	97082002	2001	372 /	ЛП		ун	сп	9	7		5	7	

Смородина чорна - 29

Аметист	92083005	2002	344 /	П		ун	сс	9	7		7	7	
Білоруська солодка	68083001	1980	446 /	СЛП		ун	рс	9	7		7	7	
Багіра	85083001	1994	240 /	ЛП		ун	сп	9	7		7	7	
Вербна	97083007	2004	372 /	ЛП		ун	рс	9	7		7	7	
Вернісаж	94083007	2003	344 /	СЛП		ун	сс	9	9		7	7	
Верность	87083001	1995	163 /	ЛП		ун	пс	9	7		7	7	
Говтва	87083008	1999	350 /	ЛП		ун	сс	9	7		7	7	

Сорт				Код	Зона	Характеристики								Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач		Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				
										посухи	полягання	осипання	хвороб	
Дочка Ворскли		90083007	1999	350 /	СЛ	ун	рс	9	9		7	7		
Зоря Галицька		94083003	2000	372 /	ЛП	ун	рс	9	7		7	7		
Зелена димка		85083002	1994	240 /	ЛП	ун	сс	9	7		7	7		
Загадка		77083002	1990	163 /	ЛП	ун	сс	9	7		7	7		
Краса Львова		94083004	2000	372 /	ЛП	ун	сп	9	9		7	7		
Козацька		92083003	2001	344 /	ЛП	ун	сп	9	7		7	7		
Либідь		94083005	2001	372 /	ЛП	ун	сп	9	5		5	7		
Минай Шмирьов		68083003	1978	446 /	СЛП	ун	сс	9	7		7	7		
Надбужанська		97083006	2004	372 /	ЛП	ун	сп	9	7		7	7		
Пам'ять Правнику		90083002	1994	424 /	Л	ун	сс	9	7		7	7		
Полтава 800		74083002	1981	944 /	ЛП	ун	сс	9	7		7	7		
Софіївська		97083010	2001	344 /	СЛП	ун	сп	9	7		7	7		
Софія		97083005	2001	372 /	ЛП	ун	сс	9	7		7	7		
Сюїта кийвська		87083006	1995	344 /	СЛ	ун	сп	9	7		7	7		
Славути		75083002	1989	424 /	Л	ун	рс	9	7		7	7		
Санюта		87083007	1995	344 /	СЛ	ун	сп	9	9		7	7		
Тітанія		90083003	1997	1010 /	Л	ун	сс	9	7		7	7		
Українка		94083006	2000	372 /	ЛП	ун	сс	9	7		5	5		
Чорний жемчуг		84083004	1995	240 /	П	ун	сп	9	7		7	7		
Чернеча		88083003	2000	344 /	ЛП	ун	сс	9	9		7	7		
Черешнева		91083007	1999	344 /	ЛП	ун	сп	9	7		7	7		
Ювілейна Копаня		97083001	2001	344 /	СЛП	ун	сп	9	7		7	7		

Суніця

- 21

Багряна	90084005	1999	344 /	СЛП	ун	рс	7	7				7	
Деснянка кокінська	91084002	1995	163 /	Л	ун	рс	7	7				5	
Десна	78084001	1987	344 /	СЛП	свж	рс	9	7				7	
Дарунок вчителю	85084001	1993	344 /	СЛП	свж	рс	7	7				7	
Ельсанта	97084004	1999	1012 /	С	ун	рс	7	7				5	

Сорт				Код	Зона	Характеристики								
Назва	Вид	Номер	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач		Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
										посухи	полягання	осипання	хвороб	
Зенга Зенгана		68084001	1975	1010/	СЛП	ун	сп	7	7				7	
Істочник		80084005	1989	344/	СЛП	ун	сс	7	7				5	
Кримська ремонтантна		81084001	1985	359/	С	свж	рс	7	7				5	
Кримська рання		77084002	1985	359/	С	свж	рс	7	7				5	
Килимова		03084001	2004	117/	ЛП	мульча		9	9				7	
Кримчанка 87		80084008	1987	359/	С	ун	сс	7	7				5	
Львівська рання		71084001	1979	372/	СЛП	ун	рс	7	7				5	
Мачужинка		82084001	1990	372/	П	свж	рс	7	7				5	
Ольвія		97084002	2001	344/	СЛП	ун	рс	7	7				7	
Покахонгас		72084003	1980	1010/	П	ун	сп	9	7				7	
Присвята		86084001	1992	344/	СЛП	ун	сп	7	7				7	
Ред Гонтлет		76084002	1982	1010/	СЛП	ун	сп	7	7				7	
Русанівка		78084003	1986	344/	СП	ун	рс	7	7				7	
Теніра		84084004	1992	1010/	П	ун	сп	7	7				7	
Фестивальна ромашка		85084002	1992	344/	СЛП	ун	сс	7	7				7	
Ясна		56084001	1960	344/	СЛ	ун	сс	7	7				7	
Шипшина		-	2											
Вітамінна		65218001	1998	148/	Кр	ун	рс							
Пізнюстигла		71218001	1998	148/	Кр	ун	пс							
Горіх грецький		-	13											
Буковинська бомба		87075007	1995	433/	Л	ун	сс	5	7				7	
Буковинський 2		87075003	1995	433/	Л	ун	сс	5	7				7	
Буковинський 1		79075004	1997	433/	Л	ун	сс	5	7				5	
Колгоспний		79075001	1991	398/	С	ун	сс	5	7				5	
Курзім		68075003	1997	398/	С	ун	сс	5	7				7	
Клішківський		91075009	1995	433/	Л	ун	рс	5	7				7	
Красавець		75075004	1991	398/	С	ун	пс	5	5				7	
Прикарпатський		91075010	1995	433/	Л	ун	рс	5	5				7	

Сорт				Код	Зона	Характеристики								Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач		Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				
										посухи	полягання	осипання	хвороб	
Придністровський		84075001	1997	433 /	Л		ун	сс	5	7			5	
Топорівський		91075014	1995	433 /	Л		ун	сп	7	5			7	
Чернівецький 1		95075001	1997	433 /	Л		ун	сс	5	7			5	
Щепотівський		91075013	1998	398 /	С		ун	сп	5	7			7	
Ярівський		91075012	1995	433 /	Л		ун	сс	5	5			7	
Гранат		-	1											
Сочний 110		65209001	1994	365 /	С		ун	сс	5	7			7	
Інжир		-	1											
Сабруція рожева		81210001	1994	365 /	С		ун	сс	>5	7			7	
Ківі		-	2											
Монті		98342002	2000	365 /	С		ун	сп	>5	7		5	7	
Томурі		98342001	2000	365 /	С		зпл	сп	<5	7		5	7	
Лимон		-	2											
Лісбон		01310002	2004	365 /	Згр		свж	пс	7	5			5	
Мейер		01310001	2003	365 /	Згр		свж	рем	7	5		5	5	
Маслина		-	1											
Кримська превосходна		81214002	1994	365 /	С		ун	рс	>5	7			7	
Мигдаль		-	5											
Десертний		49215001	1976	365 /	С		ун	сс	7	7		7	7	
Мілас		97215004	2000	365 /	С		ун	рс	7	7		7	7	
Нікітський 2240		65215002	1986	365 /	С		ун	сс	7	7		7	7	
Нікітський 62		49215002	1954	365 /	С		ун	сс	7	7		7	7	
Прибережний		72215002	1986	365 /	С		ун	пс	7	7		7	7	
Унабі		-	2											
Китайський 60		81124002	1994	1010 /	С		ун	рс	7	7			7	

Сорт				Код	Зона	Характеристики								Якість
Назва	Вид	Номер	Рік рес- тації	Заявник / Підтримувач		Продук- тивність	Напря- м викорис- тання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				
										посухи	поля- гання	осипання	хвороб	
Южанін		77124001	1994	661 /	С	ун	рс	7	7				7	
Фундук		-	12											
Болградська новинка		79216001	1981	398 /	С	ун	сс	9	7				7	
Боровський		75216003	1991	398 /	ЛП	ун	сс	9	7				7	
Дар Павлинка		82216004	1991	398 /	С	ун	сс	9	7				7	
Корончатий		80216001	1991	398 /	П	ун	сс	9	9				7	
Клиновидний		76216001	1988	398 /	Л	ун	сс	9	9				7	
Лозівський шаровидний		75216002	1989	398 /	СЛ	ун	сс	9	9				7	
Пірожок		80216002	1996	398 /	С	ун	сс	9	9				7	
Ракетний		76216003	1990	398 /	С	ун	пс	9	9				7	
Серебристий		76216004	1991	398 /	СЛ	ун	сс	9	9				7	
Степовий 83		58216001	1985	398 /	С	ун	пс	9	9				7	
Шедєвр		78216003	1985	398 /	СЛ	ун	сс	9	9				7	
Шоколадний		68216001	1988	398 /	Л	ун	сс	9	9				7	
Хурма		-	1											
Спутник		64217001	1994	365 /	С	ун	рс	7	7				7	
Виноград														
Виноград		-	118											
Тельті курук		50073002	1969	1010 /	9,10	тхн	сп	7	7				7	
Аркадія		90073004	1995	379 /	7,8-10	стл	нр	7	7				5	
Альбільо кримський		57073008	1958	1010 /	2,4-6	тхн	сс	9	9				7	
Алеатіко		54073004	1958	1010 /	5,6	тхн	сп	9	7				7	
Антей магараський		80073001	1988	364 /	1-4, 7	тхст	сп	9	7				7	
Асма		80073010	1986	1010 /	5-6	стл	пс	7	7				5	
Аврора Магарача		82073012	1995	364 /	8-10	тхн	сс	9	7				7	
Аліготе		48073001	1936	1010 /	1-6, 8-15	тхн	сп	7	7				7	

Сорт				Код	Зона	Характеристики								
Назва	Вид	Номер	Рік рес- тації	Заявник / Підтримувач		Продук- тивність	Напря- м викорис- тання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
										посухи	поля- гання	осипання	хвороб	
Берландієрі х Рипарія СО4		76073011	1978	1010 /	1-15		підщ.		9	9			9	
Бастардо магарацький		69073001	1969	364 /	2-10,14		тхн	сп	9	9			9	
Берландієрі х Рипарія Телекі 5Ц		76073003	1978	1010 /	1-15		підщ.		9	9			9	
Берландієрі х Рипарія Кобера 5 ББ		76073010	1978	1010 /	1-15		підщ.		9	9			9	
Восток		68073001	1978	379 /	11-14		стл	сс	7	7			7	
Восторг		90073019	1992	211 /	1-6,13,14		стл	нр	7	7			7	
Вердельо		52073003	1958	1010 /	2,4-6		тхн	сс	7	7			7	
Гарс Левелю		49073005	1958	1010 /	4-7		тхн	пс	9	7			7	
Голубок		70073001	1981	379 /	7-12,15		тхн, всш	рс	7	7			7	
Грочанка		82073006	1990	1010 /	1-6		стл	нр	7	7			7	
Дністровський рожевий		65073001	1972	379 /	8-10		тхст	пс	9	9			7	
Дієтичний		83073003	1992	380 /	8-10		стл	рс	7	7			7	
Данко		81073004	2003	364 /	1-6		тхн	сс	7	7			7	
Джеват кара		01073002	2002	917 /	5		тхн	сп	9	7			7	
Екім кара		59073010	1958	364 /	5,6		тхн	пс	9	7			7	
Жемчуг Саба		49073006	1944	1010 /	7-15		стл, всш	нр	7	7			7	
Золотистий устійчивий		70073002	1990	379 /	10		тхст, всш	сп	7	7			7	
Італія		51073002	1969	1010 /	2-6,8-10,13,14		стл	пс	9	7			7	
Іршаї Олівер		57073009	1958	1010 /	7-10		стл	нр	9	7			7	
Кодрянка		85073006	1995	614 /	13,14		стл	рс	7	7			7	
Кефесія		79073006	1995	917 /	5,6		тхн	пс	7	7			7	
Кокур білий		57073001	1958	364 /	2,4-6		тхн	пс	7	7			7	
Київський золотистий		67073004	1983	348 /	10		стл	нр	7	7			7	
Королева винограду		49073001	1944	1010 /	2,4-6,		стл	рс	7	7			7	
Крона		92073013	1995	917 /	5,6		тхн	сп	7	7			7	
Киргизький ранній		61073002	1981	656 /	12,15		стл	нр	7	7			7	
Капсельський білий		92073012	1995	917 /	5,6		тхн	сп	9	9			7	

Сорт				Код	Зона	Характеристики								Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач		Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				
									посухи	полягання	осипання	хвороб		
Кардинал		65073005	1969	1010/	1-6,8,14	стл	нр	7	7				7	
Каберне Совінйон		52073004	1936	1010/	1-12,13-15	тхн, веш	пс	9	9				7	
Красуня Цегледа		51073001	1969	1010/	8-10,13-14	стл	сс	9	7				7	
Кишмиш ОСГІ		83073002	1990	380/	8-10	стл	редн	7	7				7	
Карабурну		52073005	1936	1010/	2-15	стл	пс	9	7				7	
Ланка		79073002	1990	379/	8-10,15	стл	сс	9	7				7	
Леся		74073008	1985	379/	8-10,13-15	стл	нр	7	7				7	
Марсельський чорний ранній		50073003	1969	1010/	8,9	тхст	рс	7	7				7	
Марінка		85073009	1997	35/	8-10	стл	рс	7	7				7	
Мюскадель		49073011	1958	1010/	5,6	тхн	редн	7	7				7	
Мускат чорний		52073007	1958	1010/	2,5,6	тхн	редн	7	7				7	
Мускат рожевий		52073006	1958	1010/	2,4,6	тхн	рс	7	7				7	
Матраса		49073002	1958	1010/	2,4,7	тхн	сп	7	7				7	
Мерло		59073011	1983	1010/	1,2,4,7-14	тхн	сс	7	7				7	
Матяш Янош		49073008	1958	1010/	7	стл	рс	7	7				7	
Мускат олександрійський		55073001	1958	1010/	5,6	стл	пс	7	7				7	
Мускат таїровський		68073004	1976	379/	7-14	стл	нр	7	7				7	
Мечта		76073012	1983	380/	1-6,8-10,15	стл	рс	7	7				7	
Мюллер Тургау		49073010	1958	1010/	7	тхн	сс	7	7				7	
Мускат чорноморський		83073004	1995	380/	13,14	стл	рс	7	7				7	
Мускат пейцький		75073012	1969	1010/	4,7	тхн	пс	7	7				7	
Мускат Оттонель		50073004	1952	1010/	1-4,7-9,11-14	тхст	редн	7	7				7	
Мускат одеський		82073003	1993	379/	8-14	тхн	рс	7	7				7	
Мускат жемчужний		79073003	1988	379/	8-10,15	стл	нр	7	7				7	
Мускат ереванський		75073004	1989	677/	2,4-6	стл	редн	7	7				7	
Мускат гамбургський		49073009	1936	1010/	1-15	стл	сп	9	9				7	
Мускат білий		49073003	1936	1010/	2,4-6,13,14	тхн	редн	7	7				7	

Сорт				Код	Зона	Характеристики								Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач		Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				
										посухи	полягання	осипання	хвороб	
Морастель		57073010	1958	1010/	2,4-6	тхн	пс	7	7				7	
Молдова		74073004	1987	614/	1-14	стл, всш	пс	9	9				9	
Мускат янтарний		69073002	1986	614/	1-6,13-15	стл	нр	7	7				7	
Мурведр		00073011	2001	364/	2,5,6	тхн	пс	7	7				7	
Овідіопольський		72073001	1986	379/	8-15	тхн, всш	сс	7	7				7	
Оригінал		87073003	2002	379/	8	стл	сп	9	9				9	
Одеський ранній		61073004	1978	379/	10	стл	нр	7	7				7	
Особий		70073004	1991	211/	11,12,15	стл	нр	7	7				7	
Олімпійський		77073023	1989	413/	12	тхн	пс	7	7				7	
Одеський сувенір		74073001	1985	379/	7-12	стл	сп	9	9				7	
Одеський чорний		57073002	1972	379/	1-6,8-14	тхн, всш	пс	7	7				7	
Піно білий		60073001	2002	1010/	8-14	тхн	рс	7	7				7	
Первенець Магарача		76073014	1994	364/	1-14	тхн	сп	7	9				7	
Подарок Магарача		77073014	1987	364/	1-3,12-14	тхст	редн	7	7				7	
Піно чорний		57073011	1959	1010/	2,4,8-14	тхн	рс	7	7				7	
Піно сірий		49073012	1959	1010/	6,8-14	тхн	рс	7	7				7	
Рубіновий Магарача		59073007	1969	364/	4-6,11,12,15	тхн, всш	сп	9	9				7	
Рислінг рейнський		39073001	1936	1010/	1-5,7-15	тхн, всш	сс	9	7				7	
Ркацителі		49073004	1958	1010/	1-5,7-15	тхн	пс	9	9				9	
Ранній Магарача		52073002	1969	364/	1-6,8-15	стл	нр	7	7				7	
Рипарія х Рупестрис 101-14		76073007	1978	1010/	1-15	підш.		9	9				9	
Рипарія х Рупестрис 3309		76073008	1978	1010/	1-15	підш.		9	9				9	
Рислінг італійський		49073013	1959	1010/	7	тхн	сп	9	7				7	
Рубін таїровський		79073005	1990	379/	8-10,14	тхн	пс	9	9				9	
Степняк		70073005	1982	211/	11,12,15	тхн, всш	пс	9	9				7	
Сухолиманський білий		58073001	1969	379/	2,8-14	тхн	сс	7	7				7	
Сари пандас		79073007	1995	917/	5,6	тхн	пс	9	9				7	
Совіньйон зелений		49073017	1969	1010/	1,2,4-6,8-14	тхн	сс	9	7				7	

Сорт				Код	Зона	Характеристики								Якість
Назва	Вид	Номер	Рік рес- тації	Заявник / Підтримувач		Продук- тивність	Напрям викорис- тання	Група стигlostі	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				
										посухи	поля- гання	осипання	хвороб	
Семільон		00073010	2001	364 /	2,5,6,9		тхн	сп	7	7			7	
Сурученський білий		75073007	1992	607 /	2,4-6,11,12		стл	сп	9	9			7	
Сорок лет Победы		90073021	1998	413 /	12		тхн	пс	7	7			7	
Сапераві северний		57073004	1978	211 /	11-15		тхн, всш	сп	7	7			7	
Сапераві		50073001	1958	1010 /	1-15		тхн	пс	9	9			7	
Серсіаль		49073015	1958	1010 /	2,4-6		тхн	сс	9	9			7	
Солдайя		01073003	2002	917 /	5,6		тхн	сп	7	7			7	
Сорок лет Октября		57073012	1969	379 /	7,8,9		тхн	пс	9	9			7	
Сільванер		49073016	1958	1010 /	1-5,8-10,12		тхн	рс	7	7			7	
Сонячнодолинський		92073007	1995	364 /	5,6		тхн	сп	7	7			7	
Серексія чорна		60073002	2002	1010 /	9		тхн	пс	9	9			7	
Трамінер рожевий		49073018	1958	1010 /	1-5,7-11,13-15		тхн	редн	7	7			7	
Український 85		68073002	1985	379 /	10		стл	нр	7	7			7	
Фетяска біла		52073008	1958	1010 /	1-4,7-15		тхн, всш	рс	7	7			7	
Фіолетовий ранній		57073006	1980	211 /	7,13-15		тхст, всш	рс	7	7			7	
Фурмінг		49073019	1958	1010 /	6,7		тхн	пс	9	7			7	
Хіндогни		50073005	1958	1010 /	2,4		тхн	пс	9	7			7	
Цимлянський чорний		60073003	2002	1010 /	2,4-6		тхн	сс	7	7			7	
Цитронний Магарача		94073006	2002	364 /	1-6		тхн	сс	7	7			7	
Цвєточний		70073006	1985	211 /	11,12,15		тхн, всш	сс	9	7			7	
Червоний		78073016	1995	380 /	13,14		стл	рс	7	7			7	
Шардоне		49073020	1958	1010 /	1-5,8-14		тхн	сс	7	7			7	
Шабаш		57073007	1958	1010 /	2-6		стл	пс	9	9			7	
Шасла біла		48073002	1936	1010 /	1-15		стл	рс	7	7			7	
Шасла северна		63073006	1984	211 /	10-12		стл	рс	7	7			7	
Южанка ОСГІ		78073004	1986	380 /	8-10		стл	рс	7	7			7	
Янтар ОСГІ		76073016	1985	380 /	8-10		стл	нр	7	7			7	
Кок пандас		01073001	2002	917 /	5,6		тхн	рс	7	7			7	

**ОПИСИ СОРТІВ ПЛОДОВИХ ТА ЯГІДНИХ КУЛЬТУР,
що занесені до Реєстру сортів, придатних для поширення в Україні**

ЯБЛУНЯ

Балаклавське. Заявник Кримський науково-дослідний центр плодівництва Інституту садівництва УААН.

Отриманий від запилення у 1970 році сорту Кальвіль красний зимовий сумішшю пилку сортів Розмарин білий і Пепин лондонський.

Раньозимового строку достигання. Дерево середньоросле, з негустою оберненопірамідальною кроною, в плодоношення вступає на 4-5-й рік. При достиганні плоди схильні до осипання, великі, масою 160-170 г. Основне забарвлення – світло-жовте, покривне – рожеве, розмитий рум'янець з сонячного боку плода. М'якуш білий, ніжний, дуже солодкий, приємного кисло-солодкого десертного смаку. Дегустаційна оцінка – 8 балів. Вміст цукрів 11,7%, кислот – 0,48-0,56%, пектинів – 0,72-0,74%, вітаміну С – 5,6-6,3 мг %.

Напрямок використання – свіжі плоди.

Рекомендована зона вирощування – Степ.

Зареєстрований у 2001 році.

Д-471. Підщепа. Заявник Донецький філіал Інституту садівництва УААН.

Зимостійкість та холодостійкість підщепи відповідає 9 балам, стійкість до посухи та хвороб – висока.

Рекомендована зона вирощування – Степ.

Зареєстрований у 2000 році.

Д-1071. Карликова підщепа. Заявник Донецький філіал Інституту садівництва УААН. Отримана від схрещування у 1970 році карликової вегетативно розмножувальної форми М-9 з сортом Аніс бархатний.

Маточний кущ невеликий, утворює багато середньо розвинених пагонів. Укорінення підгорнених пагонів дуже добре навіть в сухому ґрунті без поливу. Ріст окулянтів на цій підщепі стриманий, вихід стандартних саджанців високий. Щеплені на ній дерева рясно плодоносять з 2-3-річного віку.

Ріст молодих дерев у саду помірний, плодоношення на 3-й рік після посадки. Морозостійкість задовільна, засухостійкість добра. Коренева система добре розвинута, але поверхнева, тому якірність дерев недостатня, вони потребують опори. Продуктивність дерев дуже висока. Сумісність з багатьма сортами, які досліджуються, добра.

Рекомендується як карликова підщепа для яблуні в інтенсивних насадженнях в усіх зонах плодівництва України.

Зареєстрований у 2000 році.

Едера. Заявник Інститут садівництва УААН.

Сорт зимового строку досягання.

Дерево росте дуже швидко, середньозагущене, утворює оберненоширокопірамідальну, міцну крону. Плодоносить на 2-3-й рік. Плоди великі, масою 170-220 г, ширококонічні, широкоребристі. Основне забарвлення – зеленувате, покривне – на більшій частині яскравий, розмитий пурпуровий рум'янець. М'якуш кремовий, середньої щільності, мілкозернистий, соковитий, кисло-солодкого гармонійного смаку, з легким ароматом. Вміст цукрів 9,02-9,96%, кислот 0,52-0,68%, пектинів 0,38-0,59%, вітаміну С 4,79-7,92 мг %. Дегустаційна оцінка – 7 балів. Відрізняється імунністю до парші і високою толерантністю до борошнистої роси в умовах Київщини, досить зимостійкий.

Рекомендована зона вирощування – Лісостеп, Полісся.

Напрямок використання – свіжі плоди.

Зареєстрований у 2001 році.

Краснокутське солодке. Заявник Краснокутська дослідна станція Інституту садівництва УААН. Отриманий від схрещування Зимове золоте х Макінтош з наступним відбором елітного сіянця з гібридного потомства.

Дерево середньоросле, швидко росте, крона густа, округла. Плоди крупні, округлі, правильної форми, поверхня плоду гладенька. Забарвлення в момент знімальної стиглості – зеленувато-жовте, покривне – на більшій частині плоду у вигляді легкого загару. М'якуш білий, середньої щільності, солодкий зі слабким ароматом.

Напрямок використання – свіжі плоди.

Дегустаційна оцінка – 7 балів.

Зареєстрований у 2003 році.

Куликівське. Заявник Всеросійський науково-дослідний інститут селекції плодових культур.

Пізнюстиглого строку дозрівання, морозостійкий. Плоди яскраво забарвлені, мають гарний товарний вигляд та високі смакові якості. Високоврожайний, посухостійкий. Середня маса плоду за роки державного сортовипробування – 153 г. Сорт стійкий до грибкових хвороб, добре переносить перезволожений період року. Сорт придатний для використання у свіжому вигляді, на соки, варення, повидло, консервування, сушки.

Зареєстрований у 2002 році.

Катерина. Заявник Інститут садівництва УААН. Виведений шляхом запилення у 1978 році сорту Голден Делішес пилком Макінтош Важек (ген Со).

Сорт пізнюзимового строку досягання. Відрізняється зимостійкістю в умовах Полісся, толерантністю до парші і борошнистої роси, високою врожайністю, відмінним смаком плодів.

Дерево росте дуже швидко, формує широкопірамідальну, помірного росту, міцну крону на потовщеному штабмі. Починає плодоносити на 3-4-й рік. Плоди великі, масою 160-190 г, при зніманні з дерева інтенсивно-зелені з червонувато-оранжевим смугастим рум'янцем, при досяганні – зеленувато-жовті з більш інтенсивним розмитим смугастим рум'янцем. М'якуш інтенсивно-кремовий, щільний, дуже соковитий, відмінного кислувато-солодкого смаку.

Вміст цукрів – 11,92-13,46%, кислот – 0,48-0,72%, пектинів – 0,64-0,92%, вітаміну С – 16,69-19,46 мг %. Дегустаційна оцінка – 7 балів.

Рекомендована зона вирощування – Лісостеп, Полісся.

Напрямок використання – свіжі плоди, придатний для довготривалого приготування відмінних соків.

Зареєстрований у 2001 році.

Мінкар. Заявник Інститут зрошуваного садівництва УААН.

Отриманий шляхом запилення сорту Голден Делішес сумішшю пилку (Кальвіль білий зимовий + Бельфлор жовтий + Енні Елізабет + Ренет Баумана + Ренет Симиренка).

Сорт зимового строку досягання.

Дерево слаборосле, утворює пірамідальну, компактну, але витягнуту у висоту крону. Починає плодоносити на 4-5-й рік. Плоди середньої величини, масою 140-160 г, зсичено-яйцеподібної форми. Забарвлення в період знімальної та споживчої стиглості жовтувато-зелене. М'якуш білий, ніжний, дрібнозернистий, соковитий, приємного кисло-солодкого смаку. Вміст цукрів – 9,3%, кислот – 0,4%, вітаміну С – 5,3 мг %. Дегустаційна оцінка – 7 балів. Відрізняється стабільною врожайністю, досить високою зимостійкістю і засухостійкістю в умовах півдня України, толерантність до борошнистої роси.

Рекомендована зона вирощування – Степ.

Напрямок використання – свіжі плоди, придатний для довготривалого приготування високоякісних світлих соків.

Зареєстрований у 2002 році.

Перлина Києва. Заявник Інститут садівництва УААН. Отриманий шляхом схрещування у 1984 році сортів Рубін х Прісцила.

Сорт зимового строку досягання. Один з перших сортів української селекції з олігогенною стійкістю до парші (ген Vf) та стабільною толерантністю до борошнистої роси.

Дерево росте швидко, утворює струнку, широкопірамідальну крону, починає плодоносити на 3-4-й рік. Плоди крупні, середньою масою 160-180 г, зсичено-конічні, широкоребристі біля верхівки. Основне забарвлення – зеленувато-жовте, покривне – розмитий, яскравий червоно-малиновий рум'янець на весь плід у густій сизуватій димці. М'якуш дрібнозернистий, досить щільний, соковитий, ароматний, кисло-солодкого десертного смаку. Вміст цукрів – 8,98-9,86%, кислот – 0,46-0,62%, пектинів – 0,62-0,84%, вітаміну С – 4,68-7,46 мг %. Дегустаційна оцінка – 7 балів.

Рекомендована зона вирощування – Лісостеп, Полісся.

Напрямок використання – свіжі плоди. Зареєстрований у 2001 році.

Ровесник. Заявник Мліївський інститут садівництва ім. Л. П. Симиренка УААН. Отриманий шляхом схрещування у 1934 році сортів Бойкен і Антонівка каменичка.

Сорт зимового строку достигання.

Дерево росте швидко, формує плескато-округлу, злегка пониклу крону середніх розмірів. Починає плодоносити на 4-5-й рік. Плоди крупні, однорідні, середньою масою 210-230 г, на молодих деревах до 280 г, плоско округлі, слаборебристі. Основне забарвлення – зеленувато-жовте, м'якуш зеленувато-кремовий, ніжний, соковитий, приємного кисло-солодкого смаку. Вміст цукрів – 10,59-11,08%, кислот – 0,46-0,66%, вітаміну С – 1,91 мг %. Дегустаційна оцінка – 7 балів. Відрізняється високою стабільною врожайністю плодів з добрим товарним виглядом, досить високою зимостійкістю в умовах Лісостепу та Полісся України, незначним ураженням паршою та борошнистою росою в епіфітотійні роки.

Рекомендована зона вирощування – Лісостеп, Степ.

Напрямок використання – свіжі плоди.

Зареєстрований у 2000 році.

Радогость. Заявник Інститут садівництва УААН. Отриманий від запилення у 1971 році сорту Джонатан пилом сорту Грінслівз, отриманим з Болгарії.

Сорт пізньозимового строку достигання.

Дерево середньої сили росту, формує оберненопірамідальну, компактну, дещо загущену крону. Починає плодоносити на 3-4-й рік. Плоди великі або вище середнього розміру, середньою масою 160-180 г, плоско округлі або зсічено-конічні, інколи широкоребристі біля основи. Основне забарвлення при достиганні золотисто-жовте, покривне – розмитий оранжево-червоний рум'янець майже на весь плід. М'якуш кремовий, щільний, дрібнозернистий, соковитий, відмінного кисло-солодкого смаку, ароматний. Вміст цукрів – 11,24-12,48%, кислот – 0,59-0,66%, пектинів – 0,49-0,1,07%, вітаміну С – 10,64-14,92 мг %. Дегустаційна оцінка – 9 балів. Відрізняється стабільною високою урожайністю, зимостійкістю в умовах Полісся. Один з найбільш стабільно толерантних сортів до парші та борошнистої роси.

Рекомендована зона вирощування – Лісостеп, Полісся.

Напрямок використання – свіжі плоди.

Зареєстрований у 2000 році.

Сапфір. Заявник Мліївський інститут садівництва ім. Л. П. Симиренка УААН. Отриманий шляхом схрещування у 1985 році гібридної форми 654 (Бойкен х Кальвіль сніговий) і сорту Ренет Симиренка.

Сорт пізньозимового строку достигання.

Дерево середньоросле, формує плескатоокруглу, середньозагущену крону. Починає плодоносити на 4-5-й рік. Плоди вище середньої величини, однорідні, середньою масою 145-150 г, округло-конічні, широкоребристі. Основне забарвлення світло-зелене, покривне – у

вигляді світло-оранжевого рум'янцю на сонячному боці. М'якуш зеленувато-білий, дрібнозернистий, щільний, ніжний, дуже соковитий, ароматний, приємного освіжаючого, кисло-солодкого смаку.

Вміст цукрів – 7,9-10,48%, кислот – 0,74-0,91%, вітаміну С – 10,3 мг %. Дегустаційна оцінка – 7 балів. Відрізняється високою урожайністю з невираженою періодичністю плодоношення, досить високою зимостійкістю в умовах Лісостепу, незначним ураженням паршою та борошнистою росою.

Рекомендована зона вирощування – Лісостеп, Полісся.

Напрямок використання – свіжі плоди, придатний для довготривалого приготування високоякісних світлих соків.

Зареєстрований у 2001 році.

Флоріна. Заявник Інститут садівництва УААН.

Сорт виведений у Франції. Зимового строку досягання.

Дерево середньоросле, крона середньої густоти. Починає плодоносити на 4-5-й рік. Плоди однорідні, масою 140-160 г, округлої чи плескатоокруглої форми. Шкірка ніжна, з крупними добре помітними цяточками. Основне забарвлення – жовтувато-зелене, покривне – сизувато-червоне, суцільне з помітними штрихами. М'якуш зеленувато-білий, щільний, кислувато-солодкий. Термін вживання – до травня.

Рекомендована зона вирощування – Лісостеп, Степ.

Зареєстрований у 2003 році.

ГРУША

Марія. Заявник Кримська дослідна станція Інституту садівництва УААН. Отриманий шляхом схрещування у 1962 році сортів Доктор Тіль x Деканка зимова.

Сорт зимового строку досягання.

Дерево слаборосле, утворює широкопірамідальну, компактну крону. Починає плодоносити на 3-4-й рік. Плоди крупні, середньою масою 220 г, подовжено-грушоподібні. Основне забарвлення – жовтувато-зелене, покривне – яскравий червоно-кармінний рум'янець з сонячного боку плоду. М'якуш кремовий, соковитий, маслянистий, відмінного кислувато-солодкого смаку. Вміст цукрів – 12,68%, кислот – 0,27%, вітаміну С – 8,36 мг %. Дегустаційна оцінка – 9 балів. Відрізняється скороплідністю, високою, стабільною урожайністю; зимостійкістю і стійкістю до грибкових хвороб та “термічних опіків” листків в умовах Криму.

Рекомендована зона вирощування – Крим.

Напрямок використання – свіжі плоди.

Зареєстрований у 2001 році.

Ноябрська Молдавії. Заявник Державний Нікітський ботанічний сад УААН. Отриманий від схрещування у 1962 році сортів Триум Вієни х Криер.

Сорт зимового строку достигання, зимостійкість, посухостійкість, стійкість до осипання та хвороб висока.

Придатний для загальноприйнятої технології вирощування.

Дерево середньоросле, крона середньої густоти у молодих дерев – високопірамідальна, пізніше – широкопірамідальна. Плоди великі, правильної форми, злегка ребристі, середня маса плоду – 180-250 г, максимальна – 350 г. Основне забарвлення в період знімальної зрілості – зелене, покривне – рожеве, у вигляді легкого загару. М'якуш кремового забарвлення, соковитий, маслянистий, ніжний. Краща підщепа для сорту – айва "А". Сорт потребує запилювання, кращі запилювачі Васса, Ізмурудна, Виставочна, Джанкойська пізня. Вміст цукрів – 12,6%, кислот – 0,20%, вітаміну С – 7,8 мг %, плоди мають відмінний десертний смак. Дегустаційна оцінка – 7 балів. Транспортабельність добра.

Рекомендована зона вирощування – Крим.

Напрямок використання – свіжі плоди.

Зареєстрований у 2000 році.

Черемшина. Заявник Інститут садівництва УААН. Отриманий шляхом схрещування у 1960 році сортів Бере Гарді х Жозефіна Мехельнська.

Сорт зимового строку достигання.

Дерево швидкоросле, утворює високопірамідальну, середньозагущену крону, дещо розлогу. Починає плодоносити на 5-6-й рік. Плоди дещо неодномірні, вище середньої величини або крупні (160-170 г, крупні 240-250 г). Забарвлення в період знімальної стиглості – сірувато-зелене, під час достигання – інтенсивно жовте або жовтувато-оранжеве. М'якуш інтенсивно кремовий, майже жовтий, дуже соковитий, ніжний, маслянистий, дуже приємного кислувато-солодкого смаку з легким ароматом троянди. Вміст цукрів – 9,3%, кислот – 0,40%, пектинів – 2,2%, вітаміну С – 1,5 мг %. Дегустаційна оцінка – 9 балів.

Відрізняється скороплідністю, високою урожайністю з перших років плодоношення, відмінним смаком плодів, зимостійкістю і стійкістю до грибкових хвороб.

Рекомендована зона вирощування – Лісостеп, Полісся.

Напрямок використання – свіжі плоди.

Зареєстрований у 2000 році.

Надсжда степу. Заявник Державний Нікітський ботанічний сад УААН.

Сорт осіннього строку достигання. Зимостійкість та холодостійкість сорту оцінюється у 9 балів, стійкість до осипання та хвороб – висока.

Рекомендована зона вирощування – Степ.

Напрямок використання – свіжі плоди. Зареєстрований у 2000 році.

Якимівська. Заявник Кримська дослідна станція Інституту садівництва УААН. Отриманий з насіння від вільного запилення у 1961 році сорту Бере Арданпон.

Сорт осіннього строку досягання.

Дерево середньоросле, утворює широкопірамідальну, дещо загущену крону. Починає плодоносити на 3-4-й рік. Плоди великі, середньою масою 180 г, максимальною – 310 г, грушоподібні або короткогрушоподібні. Основне забарвлення – зеленувато-жовте, покривне – яскраво-червоний рум'янець на сонячному боці. М'якуш білий, соковитий, маслянистий, кислувато-солодкого смаку. Вміст цукрів – 13,5%, кислот – 0,32%, вітаміну С – 9,11 мг %. Дегустаційна оцінка – 9 балів. Відрізняється скороплідністю, щорічною, стабільною урожайністю, високою зимостійкістю і стійкістю до грибкових хвороб в умовах Криму, не вимогливий до умов вирощування.

Рекомендована зона вирощування – Степ.

Напрямок використання – свіжі плоди.

Зареєстрований у 2000 році.

АЙВА

С'єдобна. Заявник державний Нікітський ботанічний сад Української академії аграрних наук.

Сорт середньостиглий.

Зимостійкість та холодостійкість – висока, стійкість до посухи та хвороб – середня, до осипання – висока.

Рекомендований для зони Степу.

Напрямок використання – універсальний.

Зареєстрований у 2001 році.

Сказочна. Заявник Державний Нікітський ботанічний сад Української академії аграрних наук.

Сорт середньостиглий.

Зимостійкість та холодостійкість – висока, стійкість до посухи, хвороб та до осипання – середня.

Рекомендований для зони Степу.

Напрямок використання – універсальний.

Зареєстрований у 2001 році.

ХЕНОМЕЛЕС

Вітамінний. Заявник Центральний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук.

Відрізняється стабільною урожайністю, великими плодами, технологічністю (кущ компактний, пагони злегка вкриті колючками, легкий відрив плодів), підвищеним вмістом вітаміну С. Кущ компактний, невеликий. Гілки прямостоячі, слабо вкриті колючками. Плоди

великі, середня маса – 98 г, округлі або плескатоокруглі, привабливого яскраво-жовтого кольору, дуже ароматні, Шкірка гладенька, масляниста. Вміст сухих речовин у плодах – 16,5%, пектинів – 2,7%, вітаміну С – 361 мг %.

Використовується для виготовлення високовітамінних продуктів технічної переробки.

Сорт ранньостиглий.

Рекомендований для зон Лісостепу, Полісся.

Напрямок використання – універсальний.

Зареєстрований у 2001 році.

Каліф. Заявник Артемівський науково-дослідний центр Інституту садівництва УААН.

Відрізняється високою стабільною урожайністю, великими плодами, зимостійкістю, стійкістю до хвороб та шкідників. Куш високорослий, прямостоячий. Пагони незначною мірою вкриті колючками, квітки біло-рожеві. Плоди округлі масою 80-100 г, жовті, ароматні, з твердою кислою м'якоттю. Вміст сухих речовин у плодах – 16,5%, цукру - 2,4%, кислот – 4,6%, вітаміну С – 73,9 мг %.

Достигають плоди у вересні.

Використовується для виготовлення високоякісних продуктів переробки.

Сорт ранньостиглий.

Рекомендований для зон Степу та Лісостепу.

Напрямок використання – технічний.

Зареєстрований у 2001 році.

Караваєвський. Заявник Центральний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук.

Відрізняється високою урожайністю, швидким ростом куща, підвищеною життєздатністю. Куш великий, пагони прямостоячі, вкриті колючками.

Плоди круглі, середньою масою 74 г, жовтувато-зелені, дуже ароматні. Шкірка гладенька, злегка масляниста. Вміст сухих речовин у плодах – 16%, цукру – 4,1%, органічних кислот – 3,5%, пектинів – 2,7%, вітаміну С – 329 мг %.

Сорт пізньостиглий.

Рекомендований для зон Лісостепу, Полісся.

Напрямок використання – універсальний.

Зареєстрований у 2001 році.

Ніколай. Заявник Артемівський науково-дослідний центр Інституту садівництва УААН.

Сорт ранньостиглий.

Зимостійкість, та стійкість до хвороб висока, посухостійкість та стійкість до осипання середня.

Рекомендований для зон Степу, Лісостепу, Полісся.
 Напрямок використання – технічний.
 Зареєстрований у 2001 році.

Ніна. Заявник Артемівський науково-дослідний центр Інституту садівництва УААН.

Сорт ранньостиглий. Має високу зимостійкість, стійкість до посухи, осипання та хвороб – середня.
 Рекомендований для зон Степу, Лісостепу, Полісся.
 Напрямок використання – технічний.
 Зареєстрований у 2001 році.

Ніка. Заявник Артемівський науково-дослідний центр Інституту садівництва УААН.

Відрізняється високою урожайністю, зимостійкістю, стійкий до хвороб та шкідників. Куш низькорослий, розкидистий. Пагони не вкриті колючками. Квітки оранжево-червоні, в суцвіттях по 2-6 штук. Плоди округлі, масою 70-100 г, зеленувато-жовті, з твердою кислою м'якоттю. Вміст сухих речовин у плодах – 14,7%, цукру – 2,4%, вітаміну С – 85,5 мг %.

Сорт ранньостиглий.

Використовується для виготовлення високоякісних продуктів переробки.

Представляє інтерес для аматорського садівництва в умовах Донбасу.

Рекомендований для зон Степу, Лісостепу, Полісся.

Зареєстрований у 2001 році.

Помаранчевий. Заявник Центральний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук.

Відрізняється помірною, стабільною, технологічною, підвищеною життєздатністю.

Куш компактний, середній, пагони прямі, практично без колючок. Плоди середньою масою 60 г, плоскоокруглі або видовжено-конічні. Красивого яскраво-жовтого кольору, дуже ароматні. Шкірка гладенька, масляниста. Вміст сухих речовин у плодах – 17,6%, пектинів – 2,4%, вітаміну С – 202 мг %.

Використовується для виготовлення високо вітамінних продуктів техпереробки відмінної якості.

Представляє особливий інтерес для любительського садівництва, а також для озеленення ерозійних схилів.

Сорт середньостиглий.

Рекомендований для зон Лісостепу, Полісся.

Зареєстрований у 2001 році.

Цитриновий. Заявник Центральний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук.

Відрізняється високою урожайністю, великими плодами, технологічністю.

Кушч піднесений, середньої величини, пагони без колючок. Плоди великі, середньою масою до 72 г., яблукоподібні, округло- конічні, дещо витягнуті до вершини, зеленувато-жовті, дуже ароматні та з легким відривом. Дуже ароматні. Вміст сухих речовин у плодах – 15,5%, цукру – 3,5%, пектинів – 2,5%, каротинів – 20 мг, вітаміну С – 346 мг%.

Використовується для виготовлення високовітамінних продуктів техпереробки відмінної якості.

Представляє особливий інтерес для любительського садівництва.

Сорт середньостиглий.

Рекомендований для зони Лісостепу, Полісся.

Напрямок використання – універсальний.

Зареєстрований у 2001 році.

АБРИКОС

Ботсадівський. Заявник Центральний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук.

Сорт середньостиглий.

Рекомендований для зони Лісостепу, Степу.

Напрямок використання – універсальний.

Зареєстрований у 2001 році.

Зоряний. Заявник Інститут зрошуваного садівництва УААН.

Отриманий шляхом висіву насіння колективних сортів від вільного запилення в 1955 році. Селекціонери М. Т. Ораторський, Г. А. Федченкова.

Має високу та регулярну врожайність, зимостійкість, стійкість генеративних бруньок до різких коливань температур. Стійкий до бактеріального раку кісточкових.

Дерево сильноросле, формує округлошароподібну дещо асиметричну крону, середньої густоти. У плодоношення вступає на 4-5-й рік. Плоди великі (45-50 г), округло-видовжені. Шкірка ніжна, золотисто-оранжевого кольору. М'якуш оранжевий, ніжний, соковитий, солодкий з ніжним абрикосовим ароматом. Дегустаційна оцінка – 7 балів. Вміст сухої речовини в плодах становить – 12,33%, цукрів – 8,48%, кислотність – 1,02%. Кісточка середніх розмірів, овальна із загостреною верхівкою, від м'якуша відділяється легко.

Плоди універсального призначення.

Зареєстровано сорт у 2000 році.

Пам'ять Кащенка. Заявник Центральний ботанічний сад ім. М. М. Гришка. Національної академії наук.

Сорт ранньостиглого строку досягання.

Рекомендований для зони Лісостепу, Степу.
Напрямок використання – універсальний.
Зареєстрований у 2001 році.

АЛИЧА

Київська гібридна. Заявник Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук України. Отриманий від схрещування у 1981 році сортів Василевська і Десертна.

Сорт ранньостиглого строку досягання. Дерево середньоросле, утворює плескатоокруглу, середньозагущену крону. Плоди одномірні, середня маса – 20-25 г, округлі. Шкірка середньої товщини, фіолетово-бура. М'якуш темно-кремовий, ніжний, соковитий, приємного, дещо нестабільного кисло-солодкого смаку. Дегустаційна оцінка – 7 балів. Вміст цукрів – 5,7%, кислот – 0,96%, пектинів – 0,10%, каротину – 0,17%, вітаміну С – 14,6 мг %.

Кісточка середня, слабо відділяється від м'якушу. Відрізняється високою, стабільною урожайністю, підвищеною зимостійкістю, невимогливістю дерев до умов вирощування.

Напрямок використання – свіжі плоди, приготування високоякісних компотів, джемів, соків.

Рекомендована зона вирощування – Степ, Лісостеп. Зареєстрований у 2001 році.

ВИШНЯ

Альфа. Заявник Мліївський інститут садівництва ім. Л. П. Симиренка УААН.

Ранньостиглий сорт вишні селекції Мліївського інституту садівництва ім. Л. П. Симиренка. Вільна форма відібрана серед сіянців вільного запилення невідомого сорту. Селекціонер В. П. Ласкавий.

Сорт відрізняється високою врожайністю, зимостійкістю дерев та квіткових бруньок, високою стійкістю до кокомікозу, доброю загальною життєздатністю.

Дерево сильноросле, крона в молодому віці вузько пірамідальна, густа, з часом овально-округла, середньої загущеності. Плодоношення настає на 4-5-й рік, плодоносить на букетних гілочках та однорічних приростах. Цвітіння пізнє.

Плоди округло-серцеподібні, досить одномірні, середня вага 4,4 г. Шкірка середньої щільності, міцна, еластична, темно-червона, блискуча. М'якуш темно-червоний, середньої щільності, соковитий, винно-солодкий, приємного освіжаючого смаку. Дегустаційна оцінка – 7 балів. Вміст сухої речовини в плодах становить 14,7%, цукрів – 12,3%, кислоти – 0,79%. Сік червоного кольору. Кісточка досить велика, округла, гладенька, добре відділяється від м'якуша. Плодоніжка середньої довжини та товщини, легко відділяється від гілочки та плоду. В умовах Черкащини плоди досягають у середині червня, практично одночасно, добре утримуються на дереві, універсального призначення.

Рік реєстрації – 2000.

Гріот Мелітопольський. Заявник Інститут зрошуваного садівництва УААН.

Середньостиглий сорт вишні селекції Інституту зрошуваного садівництва УААН. Отриманий шляхом схрещування у 1966 році сорту вишні Самсонова з черешнею Дрогана жовта. Селекціонери В. О. Туровцева, М. І. Туровцев.

Сорт відрізняється великоплідністю, стабільною врожайністю, самобезплідністю, високою якістю плодів та стійкістю до кокомікозу.

Дерево сильноросле, швидко росте, формує кулеподібну, дещо пониклу, густу крону. У плодоношення вступає на 4-й рік, плодоносить на букетних гілочках та однорічних приростах. Найкращі запилювачі: Ожиданіє, Встреча. Плоди великі (6,9 г), одномірні, плоско-округлі. Шкірка тоненька, щільна, темно-червона, блискуча, легко знімається з плоду. М'якуш червоний, ніжний, соковитий. Сік темно-червоний. Кисло-солодкого смаку 5 балів. Вміст сухої речовини в плодах становить 22,16%, цукрів – 13,68%, кислотність – 1,12%. Кісточка дрібна, округла, вільна. Достигають плоди в умовах Мелітополя 20-25 червня, універсального призначення. В селекції – джерело крупноплідності, урожайності та якості плодів.

Зареєстровано сорт у 2002 році.

Метеор. Заявник Фред Гутвейн, США. Прийнятий у випробування ДК СРСР у 1985 році.

Сорт середньостиглий. Зимостійкість та холодостійкість – висока, стійкість до посухи, осипання та хвороб - 7 балів.

Рекомендована зона вирощування – Лісостеп.

Напрямок використання – універсальний.

Зареєстровано сорт у 2003 році.

ЧЕРЕШНЯ

Амазонка. Селекції Артемівського науково-дослідного центру Інституту садівництва УААН.

Плоди універсального напрямку призначення. Ягоди досить добре утримуються на гілочках, середньостійкі до осипання. Зимостійкість, холодостійкість та посухостійкість у дерев цього сорту досить висока. Стійкість до хвороб середня. Рекомендована зона вирощування – Лісостеп.

Зареєстровано сорт у 2001 році.

Валерія. Заявник Донецький філіал Інституту садівництва УААН.

Новий ранньосередній сорт Артемівської дослідної станції розсадництва. Отриманий шляхом схрещування сортів Дончанка х Валерій Чкалов. Селекціонер Л. І. Тараненко.

Сорт відрізняється високою, стабільною врожайністю, зимостійкістю, стійкістю до кокомікозу, невибагливий до умов вирощування.

Дерево сильноросле, утворює кулеподібну крону середньої густини. Плодоношення настає на 5-й рік на букетних гілочках та минулорічних приростах. Плоди крупні, середньою масою 8-9 г, серцеподібної форми, темно-червоного кольору. М'якуш темно-червоний,

середньої щільності, відмінного кисло-солодкого десертного смаку (9 балів). Ягоди досить добре утримуються на гілочках, середньо стійкі до обсипання. Відрив напівсухий. Дозрівають плоди в умовах Донбасу в першій декаді червня, універсального призначення.

Зареєстровано сорт у 2001 році.

Дачниця. Заявник Інститут зрошуваного садівництва УААН.

Середньостиглий сорт черешні селекції Інституту зрошуваного садівництва УААН. Плоди універсального призначення. Зимостійкість, холодостійкість та посухостійкість у дерев даного сорту досить висока. Стійкість до хвороб середня. Ягоди досить добре утримуються на гілочках, середньо стійкі до обсипання.

Рекомендована зона вирощування – Степ.

Зареєстровано сорт у 2001 році.

Дружба. Заявник Інститут зрошуваного садівництва УААН.

Середньостиглий сорт селекції Інституту зрошуваного садівництва УААН. Рекомендується для вирощування у зоні Степу. Зимостійкість та холодостійкість дерев дуже висока, але до посухи стійкість середня. Стійкість до хвороб середня. Плоди добре утримуються на гілочках, стійкі до обсипання, універсального призначення. Сорт відрізняється високою стійкістю до хвороб.

Зареєстровано у 2001 році.

Електра. Заявник Інститут зрошуваного садівництва УААН.

Середньоранній сорт черешні селекції Інституту зрошуваного садівництва УААН. Рекомендується до вирощування у зоні Степу. Плоди універсального призначення. Зимостійкість, холодостійкість та посухостійкість у дерев цього сорту виступає на високому рівні. Стійкість до захворювань середня. Дерев цього сорту досить стійкі до хвороб. Плоди добре утримуються на гілочках, стійкі до обсипання, універсального призначення.

Зареєстровано у 2001 році.

Зоряна (Возвращеніє). Сорт селекції Мліївського інституту садівництва ім. Л. П. Симиренка Української академії аграрних наук.

Відноситься до пізньостиглої групи сортів. Рекомендується для вирощування в зоні Лісостепу. Зимостійкість та холодостійкість дерев дуже висока, але посухостійкість та стійкість до хвороб дещо вища середнього. Плоди добре утримуються на гілочках, стійкі до осипання, серцеподібної форми, красиві, великі – 5,8 г, жовто-червоні, високих смакових якостей.

Напрямок використання – універсальний.

Зареєстровано у 2002 році.

Забута. Сорт селекції Мелітопольського інституту зрошувального садівництва.

Зимостійкість, посухостійкість, стійкість до осипання – висока, стійкість до хвороб – середня.

Сорт пізньостиглого строку досягання. Морозостійкий та посухостійкий. Стійкий до грибкових хвороб.

Напряв використання – універсальний.

Зареєстровано у 2002 році.

Рекомендована зона вирощування – Полісся.

Міраж. Сорт селекції Мелітопольського інституту зрошувального садівництва.

Зимостійкість, посухостійкість – висока, стійкість до хвороб та осипання – середня.

Напряв використання – універсальний.

Зареєстровано у 2003 році.

Рекомендована зона вирощування – Лісостеп.

Меотіда. Сорт селекції Мелітопольського інституту зрошувального садівництва.

Зимостійкість, посухостійкість, стійкість до осипання та хвороб – висока.

Напряв використання – універсальний.

Зареєстровано у 2003 році.

Рекомендована зона вирощування – Лісостеп.

Патріотка Криму. Заявник Державний Нікітський ботанічний сад УААН.

Зимостійкість, посухостійкість, стійкість до осипання та хвороб – висока.

Напряв використання – універсальний.

Зареєстровано у 2003 році.

Рекомендована зона вирощування – Степ.

Сказка. Сорт селекції Мелітопольського інституту зрошувального садівництва.

Зимостійкість, посухостійкість та стійкість до хвороб – висока, стійкість до осипання – середня.

Напряв використання – універсальний.

Зареєстровано у 2002 році.

Рекомендована зона вирощування – Степ.

Чорнокримка. Заявник Державний Нікітський ботанічний сад УААН.

Зимостійкість, посухостійкість, стійкість до осипання – висока, стійкість до хвороб – середня.

Напрямок використання – універсальний.

Зареєстровано у 2003 році.

Рекомендована зона вирощування – Степ.

СЛИВА**Президент.** Заявник Фред Гутвейн, США.

Сорт середньопізнього строку достигання.

Зимостійкість, холодостійкість та стійкість до посухи – висока, стійкість до осипання та хвороб – 7 балів.

Напрямок використання – універсальний.

Зареєстровано у 2003 році.

Рекомендована зона вирощування – Лісостеп.

Сентябрьська. Сорт селекції Мліївського інституту садівництва ім. Л. П. Симиренка Української академії аграрних наук. Зимостійкість, холодостійкість та стійкість до посухи – висока, стійкість до осипання та хвороб – 7 балів.

Сорт середньопізнього строку достигання.

Напрямок використання – універсальний.

Зареєстровано у 2003 році.

Рекомендована зона вирощування – Лісостеп.

ПЕРСИК**Віриня.** Заявник Інститут зрошувального садівництва української академії аграрних наук.

Зимостійкість, посухостійкість, стійкість до осипання та хвороб – висока.

Сорт середньостиглий.

Рекомендований для зони Степу.

Напрямок використання – універсальний.

Зареєстрований у 2003 році.

Любимець II. Заявник Центральний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук.

Отриманий шляхом схрещування у 1980 році географічно віддалених за походженням сортів Нікітський і Славутич. Відрізняється високою, досить стабільною урожайністю, самоплідністю, підвищеною зимостійкістю дерева та квіткових бруньок, відносною стійкістю до грибкових хвороб.

Дерево середньої сили росту, утворює розлогу, дещо асиметричну, досить загущену крону. Плоди великі (150-170 г), одномірні, овальні. Шкірка середньої товщини, міцна, опушена, легко відділяється від м'якоті. Основне забарвлення – кремове, покривне – з густим темно-бордовим рум'янцем на більшій частині плода. М'якоть зеленувато-жовта, соковита, гармонійно кисло-солодкого смаку. Дегустаційна оцінка – 9 балів. Кісточка середньої величини, овальна, злегка сплюснена. Дозрівання в умовах Києва – друга половина серпня.

Сорт середньостиглий.

Рекомендований для зони Степу та Лісостепу.

Напрямок використання – універсальний.

Зареєстрований у 2001 році.

Оксамитовий. Заявник Центральний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук.

Сорт середньоранній.

Зимостійкість, посухостійкість, стійкість до осипання та хвороб – середня.

Рекомендований для зони Лісостепу.

Напрямок використання – універсальний.

Зареєстрований у 2001 році.

Пам'ять Гришка. Заявник Центральний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук.

Сорт пізньостиглий.

Зимостійкість, посухостійкість, стійкість до осипання та хвороб – середня.

Рекомендований для зон Степу, Лісостепу.

Напрямок використання – універсальний.

Зареєстрований у 2001 році.

Посол миру. Заявник Нікітський ботанічний сад Національний науковий центр Української академії аграрних наук.

Сорт ранньостиглий.

Дерево швидкоросле, крона розкидиста, середньої густоти.

Сорт морозостійкий. Плоди красиві, високих смакових якостей. Основне забарвлення жовте, покривне – темно-червоне. Максимальна маса плоду – 180-200 г. М'якуш соковитий, жовтуватого кольору. Дегустаційна оцінка – 5 балів.

Рекомендований для зони Степу.

Напрямок використання – універсальний.

Зареєстрований у 2002 році.

Стартовий. Заявник Нікітський ботанічний сад-Національний науковий центр Української академії аграрних наук.

Відібраний з сіянців від вільного запилення 1981 року сорту Старт.

Відрізняється ранньостиглістю, стабільною врожайністю, зимостійкістю і стійкістю квіткових бруньок до весняних заморозків, в умовах Криму – стійкістю до борошнистої роси.

Дерево середньоросле, формує розлогу, середньозагущену крону. Починає плодоносити на 2-3-й рік. Плоди великі (140-150 г), одномірні, округлі. Шкірка середньої щільності, жовта з темно-червоним, розмитим рум'янцем, з ніжним опушенням. М'якуш щільний, жовтий, приємного десертного кисло-солодкого смаку. Дегустаційна оцінка – 9 балів. У плодах міститься цукрів – 8,9%, кислот – 0,5%, вітаміну С – 15,3 мг %. Кісточка невелика, вільно відділяється від м'якушу. Плоди досить транспортабельні.

Сорт ранньостиглий.

Рекомендований для зони Степу.

Напрямок використання – універсальний.

Зареєстрований у 2000 році.

Щедрий. Заявник Центральний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук.

Сорт пізньостиглий.

Напрямок використання – універсальний.

Рекомендований для зони Лісостепу.

Зареєстрований у 2001 році.

Ювілейний Сидоренка. Заявник Інститут зрошуваного садівництва Української академії аграрних наук.

Сорт середньопізній.

Рекомендований для зони Степу.

Напрямок використання – універсальний.

Зареєстрований у 2003 році.

НЕКТАРІН

Рубіновий 8. Заявник Державний Никітський ботанічний сад УААН.

Сорт пізньостиглого строку достигання

Рекомендований для зони Степу.

Напрямок використання – універсальний.

Зареєстрований у 2001 році.

КИЗИЛ

Билда. Заявник Донецький філіал Інституту садівництва УААН. Відібраний з сіянців посіву 1967 року суміші насіння відбірних форм від вільного запилення кримського походження.

Сорт пізньостиглого строку достигання.

Відрізняється великоплідністю, високою, стабільною врожайністю, невимогливістю до умов вирощування.

Кущ деревоподібний, має багато стовбурів. Крона кулеподібна, досить загущена, розлога. Пагони ребристі, опушені, однорічні – зелені, багаторічні – світло-коричневі, квітки двостатеві, жовті, мілкі. Плоди грушоподібної форми, темно-червоні, середньою масою – 4,2 г, великі до 8 г. Кісточка маленька, масою – 0,5 г. У плодах міститься: сухих речовин – 21,2%, цукрів – 7,4%, кислот – 2,4%, вітаміну С – 28,9 мг %.

Рекомендований для зони Степу, Лісостепу, Полісся.

Напрямок використання – універсальний.

Зареєстрований у 2001 році.

Видубецький. Заявник Центральний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук.

Отриманий шляхом схрещування у 1967 році гібридних форм 6-3-9 і 9-15-2.

Сорт середньостиглий.

Відрізняється дуже високою, стабільною врожайністю, зимостійкістю, засухостійкістю.

Дерево досить великого розміру, формує плескатоокруглу крону середньої густоти. Плоди великі, середньою масою 6,5-6,7 г, великі – 7,0-7,6 г, овально-грушоподібні, зсічені коло плодоніжки, темно-червоні. Шкірка тоненька, міцна. М'якоть темно-червона, дуже соковита, ніжна, ароматна, гармонійного кисло-солодкого смаку. У плодах міститься: сухих речовин – 20,1%, цукрів – 7, %, кислот – 1,6%, пектинів – 1,0%, антоціанів у м'якоті – 98 мг, у шкірці – 850 мг, вітаміну С – 157,3 мг %. Кісточка веретеноподібна, невелика, добре відділяється від м'якоті. Достигають плоди в умовах Києва з 15-20 серпня до 5-10 вересня. Достиглі плоди добре утримуються на дереві.

Рекомендований для зони Степу, Лісостепу.

Напрямок використання – універсальний.
Зареєстрований у 2000 році.

Вавіловець. Заявник Центральний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук.

Сорт ранньостиглого строку достигання.

Зимостійкість та стійкість до хвороб – висока, стійкість до посухи та осипання – середня.

Рекомендований для зони Степу, Лісостепу.

Напрямок використання – універсальний.

Зареєстрований у 2000 році.

Гренадер. Заявник Центральний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук.

Зимостійкість та стійкість до хвороб – висока, стійкість до посухи та осипання – середня.

Рекомендований для зони Степу, Лісостепу.

Напрямок використання – універсальний.

Зареєстрований у 2000 році.

Екзотичний. Заявник Центральний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук.

Зимостійкість та стійкість до хвороб – висока, стійкість до посухи та осипання – середня.

Рекомендований для зони Степу, Лісостепу, Полісся.

Напрямок використання – універсальний.

Зареєстрований у 2001 році.

Кораловий Марка. Заявник Центральний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук.

Зимостійкість та стійкість до хвороб – висока, стійкість до посухи та осипання – середня.

Рекомендований для зони Степу, Лісостепу, Полісся.

Напрямок використання – універсальний.

Зареєстрований у 2001 році.

Миколка. Заявник Центральний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук.

Зимостійкість та стійкість до хвороб – висока, стійкість до посухи та осипання – середня.

Рекомендований для зони Степу, Лісостепу.

Напрямок використання – універсальний. Зареєстрований у 2000 році.

Радість. Заявник Центральний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук.
Зимостійкість та стійкість до хвороб – висока, стійкість до посухи та осипання – середня.
Рекомендований для зони Степу, Лісостепу.
Напрямок використання – універсальний.
Зареєстрований у 2000 році.

АКТИНІДІЯ

Загадкова. Заявник Центральний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук.
Сорт середньостиглий, зимостійкість вищесередньої, посухостійкість середня, осипання середнє, стійкість до хвороб висока.
Напрямок використання – універсальний.
Рекомендована зона вирощування – Лісостеп, Полісся.
Зареєстрований у 2001 році.

Каравайівська урожайна. Заявник Центральний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук.
Сорт середньопізній, зимостійкість вищесередньої, посухостійкість середня, осипання середнє, стійкість до хвороб висока.
Напрямок використання – універсальний.
Рекомендована зона вирощування – Лісостеп, Полісся.
Зареєстрований у 2001 році.

Надія. Заявник Центральний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук.
Сорт середньопізній, зимостійкість вищесередньої, посухостійкість середня, осипання середнє, стійкість до хвороб висока.
Напрямок використання – універсальний.
Рекомендована зона вирощування – Степ, Лісостеп.
Зареєстрований у 2001 році.

Оригінальна - Заявник Центральний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук.
Сорт середньостиглий, зимостійкість вища середньої, посухостійкість середня, осипання середнє, стійкість до хвороб висока.
Напрямок використання – універсальний.
Рекомендована зона вирощування – Степ, Лісостеп.
Зареєстрований у 2001 році.

Перлина саду. Заявник Центральний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук.

Сорт ранньостиглий, зимостійкість вищесередньої, посухостійкість середня, осипання середнє, стійкість до хвороб висока.

Напрямок використання – універсальний.

Рекомендована зона вирощування – Степ, Лісостеп.

Зареєстрований у 2001 році.

Рубінова. Заявник Центральний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук.

Сорт ранньостиглий, зимостійкість вищесередньої, посухостійкість середня, осипання середнє, стійкість до хвороб висока.

Напрямок використання – універсальний.

Рекомендована зона вирощування – Степ, Лісостеп.

Зареєстрований у 2001 році.

Ріма. Заявник Центральний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук.

Сорт середньостиглий, зимостійкість вища середньої, посухостійкість середня, осипання середнє, стійкість до хвороб висока.

Напрямок використання – універсальний.

Рекомендована зона вирощування – Степ, Лісостеп.

Зареєстрований у 2001 році.

ГЛІД

Збігнев. Заявник Меженський В. М., Меженська Л. О. Походження – сіянець глоду Арнольда.

Відрізняється відмінним смаком, раннім строком досягання.

Дерево середньоросле, крона кулеподібна, розлога, густа. Пагони середні, колінчасті. Ягоди середнього розміру, середньою масою 3,5 г, форма – округла. Краща підщепа для сорту – сіянець північно-американських видів.

Сорт ранньостиглого строку досягання.

Рекомендований для зони Степу, Лісостепу, Полісся.

Напрямок використання – універсальний.

Зареєстрований у 2001 році.

Людмил. Заявник Меженський В. М., Меженська Л. О.

Сорт пізньостиглого строку досягання.

Рекомендований для зони Степу, Лісостепу, Полісся.

Напрямок використання – універсальний. Зареєстрований у 2001 році.

Шаміль. Заявник Меженський В. М, Меженська Л. О.

Сорт пізньостиглого строку досягання.

Рекомендований для зони Степу, Лісостепу, Полісся.

Напрямок використання – універсальний.

Зареєстрований у 2001 році.

ЖИМОЛОСТЬ

Богдана. Заявник Краснокутська дослідна станція Інституту садівництва УААН. Отриманий шляхом міжвидової гібридизації сіянців жимолості Турчанінова з відбірним сіянцем жимолості камчатської.

Сорт середньостиглого строку досягання.

Відрізняється дуже раннім дозріванням ягід, скороплідністю, дуже високою врожайністю. Рослина середньої сили росту, формує негустий, середньорозлогий, округлої форми кущ. Плоди середньою масою – 1,1 г, великі – 1,5 г, сині, з густим голубуватим восковим нальотом, подовженокувшиноподібні. Шкірка тоненька але, міцна, з сухим відривом. М'якуш ніжний, десертного кисло-солодкого смаку. Вміст цукрів – 8,85%, кислот – 2,03%, вітаміну С – 69 мг %. Дегустаційна оцінка – 7 балів.

Напрямок використання – універсальний.

Рекомендована зона вирощування – Лісостеп.

Зареєстрований у 2000 році.

Дончанка. Заявник Донецький ботанічний сад НАН України. Відібрана у 1991 році серед сіянців від вільного запилення.

Маточна рослина – компактний, середньозагущений кущ, висотою – 140 см, діаметром – 120 см. Плоди, внаслідок сильно вкорочених міжвузлів, по 10-12 штук скупчено розміщені поблизу основи цьогогорічних пагонів. Прикріплення плодів середнє, що призводить до їх незначного осипання (10-15%) і легкого відділення від плодоніжки при збиранні. Плоди темно-сині з восковим нальотом, еліптично видовжені, часто з загостреною основою та верхівкою, з досить щільним м'якушем, тонкою шкірочкою і темно-вишневим кольором соку. Смак кисло-солодкуватий, без гіркоти, з приємним ароматом. Плоди завдовжки 17-20 мм, завширшки 8-10 мм, плодоніжка довжиною 1-2 мм. Плоди містять 18-20 дуже дрібних насінин, що майже не відчувається при споживанні свіжих плодів та продуктів їх переробки. Маса 100 шт. плодів – 70 г. Урожай із одного куща у 8-річному віці – 1,1 кг. У плодах міститься: сухих речовин – 17,3%, золи – 1,3%, цукрів – 6,1%, кислот – 3,0%, каротину – 5,8 мг %, вітаміну С – 40,0 мг %.

Сорт ранньостиглого строку досягання.

Напрямок використання – універсальний.

Рекомендована зона вирощування – Степ, Лісостеп.

Зареєстрований у 2001 році.

Скіфська. Заявник Донецький ботанічний сад НАН України. Відібрана у 1992 році серед сіянців шляхом вільного запилення.

Маточна рослина – прямостоячий, середньогалузистий кущ висотою – 110 см та діаметром 100 см. Прикріплення плодів середнє, осипання не перевищує 15%. Плоди темно-сині з восковим нальотом, округло-яйцеподібні з тупою верхівкою і округлою основою, м'якуш середньої щільності, шкірочка тонка, сік темно-вишневого кольору. Смак плодів десертний, солодкий, без характерної для виду гіркоти, з приємним ароматом. Плоди завдовжки 15-17 мм, завширшки 9-11 мм, довжина плодоніжки 3-5 мм. Плоди містять до 20 дуже дрібних насінин, що майже не відчувається при споживанні свіжих плодів та продуктів їх переробки. Маса 100 шт. плодів – 85 г. Урожай із одного куща у 8-річному віці – 0,8 кг. У плодах міститься: сухих речовин – 17,3% , золи – 4,3% , цукрів – 6,1%, кислоти – 3,0%, каротину – 5,8 мг %, вітаміну С – 40,0 мг %.

Сорт ранньостиглого строку досягання.

Напрямок використання – універсальний.

Рекомендована зона вирощування – Степ, Лісостеп.

Зареєстрований у 2001 році.

Степова. Заявник Донецький ботанічний сад НАН України. Відібрана у 1992 році серед сіянців від вільного запилення.

Маточна рослина – злегка розлогий, розгалужений, середньорослий кущ округлої форми, висотою – 110 см, діаметром – 130 см. Прикріплення плодів середнє, осипання становить близько 10-15%. Плоди темно-сині з восковим нальотом, видовжені, з увігнутою верхівкою, обмеженою валиком; м'якуш середньої щільності, шкірочка тонка, сік темно-вишневого кольору. Плоди з приємним ароматом та десертним смаком – солодко-кислуваті, злегка гіркуваті. Плоди завдовжки 20-23 мм, завширшки 8-10 мм, довжина плодоніжки 5-8 мм. Плоди містять близько 20 дуже дрібних насінин. Маса 100 штук плодів 90 г. Врожай з одного куща у 8-річному віці – 2,0 кг. У плодах міститься: сухих речовин – 13%, золи – 3,3%, цукрів – 5,6% , кислот – 3,5%, каротину – 2,5 мг %, вітаміну С – 96,6 мг %.

Сорт ранньостиглого строку досягання.

Напрямок використання – універсальний.

Рекомендована зона вирощування – Степ, Лісостеп.

Зареєстрований у 2001 році.

Українка. Заявник Донецький ботанічний сад НАН України. Відібрана у 1991 році серед сіянців від вільного запилення.

Маточна рослина – міцний густогалузистий кущ заввишки 150 см, діаметром 110 см. Плоди по 10-15 штук розміщені скупчено поблизу основи цьогорічних пагонів, що значно полегшує та прискорює їх збір. Прикріплення плодів міцне, чим забезпечується збереження врожаю при мінімальних (до 5 %) втратах. Плоди темно-сині з восковим нальотом, з слабоборбкуватою поверхнею, бочкоподібні, з притупленою верхівкою та округлою основою, з щільною консистенцією м'якуша, тонкою шкірочкою. Сік – темно-вишневого кольору. Смак кисло-солодкий, без гіркоти, з незначним ароматом. Плоди завдовжки 13-15 мм, завширшки 10-11 мм. Містять 18-20 штук дуже

Коралова. Заявник Мліївський інститут садівництва ім. Л. П. Симиренка УААН. Отриманий відбором сіянця із сім'ї форми № II-II-324 від вільного запилення. Відрізняється високими смаковими якостями, вмістом вітаміну С, урожайністю.

Кущ середньорослий, стислий, пагони середні, прямі, сіро-бурого забарвлення, не опушені. Ягоди середнього розміру, округлої форми, однорідні, червоні. М'якуш соковитий, середньої щільності, смак солодкий з гірчинкою. Вміст у плодах цукрів – 10,11%, кислот – 1,16%, вітаміну С – 80,96 мг/%, вітаміну Д – 860,20 мг/г на 100 г сирої речовини. Дегустаційна оцінка – 9 балів.

Сорт ранньостиглого строку достигання.

Напрямок використання – універсальний.

Рекомендована зона вирощування – Лісостеп, Полісся.

Зареєстрований у 2001 році.

Київський янтар. Заявник Дмитрієв В. І. Відібраний із сіянців алтайських сортів, вихідна форма Чуйська.

Відрізняється довговічністю насаджень, тривалим терміном збору ягід. Дегустаційна оцінка – 5 балів. Кращі запилювачі – дикорослі форми обліпихи. Відрив ягід – сухий.

Сорт ранньостиглого строку достигання.

Напрямок використання – універсальний.

Рекомендована зона вирощування – Лісостеп.

Зареєстрований у 2000 році.

Либідь. Дмитрієв В. І. Отриманий шляхом відбору сіянців алтайських сортів, вихідна форма – Чуйська.

Відрізняється крупноплідністю, легким відривом ягід, десертним смаком. Придатний до механізованого збору. Відрив ягід – сухий. Кращі запилювачі – дикорослі форми обліпихи.

Сорт середньостиглого строку достигання.

Напрямок використання – універсальний.

Рекомендована зона вирощування – Лісостеп.

Зареєстрований у 2000 році.

Солодка жінка. Заявник Донецький філіал Інституту садівництва УААН. Відібраний з сіянців вільного запилення 1987 року сорту Чуйська.

Сорт середньостиглого строку достигання.

Відрізняється високою, стабільною врожайністю, десертним смаком ягід.

Кущ середньо рослий, розлогий. Має лише функціонально жіночі квітки, тому необхідна посадка у невеликій кількості чоловічих екземплярів. Плоди подовжено-овально-циліндричні, лимонно-жовті, приємного кисло-солодкого смаку. Маса 100 ягід – 60-70 г. У плодах

міститься: сухих речовин – 17,6%, цукрів – 6,7%, кислот – 1,6%, вітаміну С – 24,6-35,2 мг %, каротину – 12,8 мг %. Дегустаційна оцінка – 7 балів. Дозрівають плоди в кінці липня.

Напрямок використання – у свіжому вигляді, для приготування високоякісних продуктів переробки.

Рекомендована зона вирощування – Степ.

Зареєстрований у 2000 році.

ПОРІЧКИ (ЧЕРВОНІ І БІЛІ)

Львівська солодка. Заявник Львівський філіал Інституту садівництва УААН.

Сорт середньостиглого строку достигання.

Напрямок використання – універсальний.

Рекомендована зона вирощування – Лісостеп, Полісся.

Зареєстрований у 2000 році.

Любава. Заявник Львівський філіал Інституту садівництва УААН. Отриманий від вільного запилення сорту Фертоді пірос.

Середньостиглий сорт. Відрізняється високою, стабільною врожайністю, комплексною стійкістю до борошнистої роси, антракнозу, септоріозу.

Кущ середньорослий, прямостоячий. Пагони середньої товщини, прямі, гнучкі. Ягоди середньої величини, середньою масою 0,6-0,9 г, округлі, ніжно-рожеві. Шкірка тоненька, еластична, міцна. М'якоть ніжного кисло-солодкого смаку, містить: цукрів – 5,1%, кислоти – 2,6%, вітаміну С – 102,4 мг %. Достигають одночасно, довго утримуються на кущах, не осипаючись. Грона густі, добре заповнюють гілки різного віку.

Напрямок використання – свіжі плоди, заморожування, різні види технічної переробки.

Рекомендована зона вирощування – Лісостеп, Полісся.

Зареєстрований у 2000 році.

Святкова. Заявник Львівський філіал Інституту садівництва УААН. Відібраний із сіянців вільного запилення врожаєм 1983 року сорту красна Віксне.

Сорт ранньостиглого строку достигання.

Відрізняється високою врожайністю, стійкістю до хвороб. Кущ сильнорослий, слабо розлогий, з товстими, прямими пагонами. Грона довгі, рихлі. Ягоди середньою масою – 0,7 г, великі – 1,0 г, округлі, темно-вишневого забарвлення. Шкірка тоненька, міцна. М'якуш інтенсивно-червоний, соковитий, освіжаючого кисло-солодкого смаку; містить сухих речовин – 11,7%, цукрів – 5,9%, кислот – 2,7%, вітаміну С – 105,6-118,2 мг %. Достигання дружнє.

Напрям використання – свіжі ягоди, заморожування, різні види технічної переробки.

Рекомендована зона вирощування – Лісостеп, Полісся.

Зареєстрований у 2000 році.

Троїцька. Заявник Інститут садівництва УААН. Отриманий від схрещування у 1985 році сортів Джонкер ван Тетс х Алтайська рання.

Сорт середньопізній.

Відрізняється дуже високою, стабільною врожайністю, зимостійкістю, засухостійкістю, стійкістю до грибкових хвороб, невимогливістю до умов вирощування, відмінною товарністю ягід, високою транспортабельністю.

Кущ середньорослий, слаборозлогий, компактний. Пагони середньої довжини, товсті, міцні, гнучкі. Ягоди великі, одномірні, середньою масою – 0,9 г, великі – 1,3 г, інтенсивно-червоні, блискучі, щільні, з легким, сухим відривом. Шкірка тоненька, але міцна, еластична. М'якуш інтенсивно-червоний, приємного кисло-солодкого освіжаючого смаку. Грона довгі, густі, добре виповнені, заповнюють весь простір куща. Містить: сухих речовин – 11,5%, цукрів – 8,2%, кислот – 2,6%, вітаміну С – 60,8 мг %.

Дозрівання одночасне.

Напрям використання – свіжі ягоди, заморожування, різні види технічної переробки.

Рекомендована зона вирощування – Лісостеп, Полісся, Степ.

Зареєстрований у 2001 році.

Чародійка. Заявник Львівський філіал Інституту садівництва УААН. Отриманий шляхом схрещування у 1983 році сортів Джонкер ван Тетс і Роте шпетлезе.

Сорт пізньостиглого строку досягання.

Відрізняється високою врожайністю, технологічністю куща, комплексною стійкістю до грибкових хвороб.

Кущ сильнорослий, середньорозлогий, з прямими пагонами. Грона середньої довжини, густі. Ягоди середньою масою 0,6-0,8 г, великі – 0,9-1 г, округлі, інтенсивно-червоні, блискучі. Шкірка міцна, еластична. М'якуш червоний, кисло-солодкий; містить: сухих речовин – 11,2%, цукрів – 6,2%, кислот – 2,1%, вітаміну С – 105,4-109,6 мг %.

Дозрівають дружно, в пізні строки. Використовуються для використання у свіжому вигляді, заморожування, техпереробки.

Рекомендована зона вирощування – Лісостеп, Полісся.

Зареєстрований у 2000 році.

Ярославна. Заявник Львівський філіал Інституту садівництва УААН. Отриманий шляхом схрещування у 1984 році сортів Роте шпетлезе і Джонкер ван Тетс.

Сорт середньопізнього строку досягання.

Відрізняється дуже високою врожайністю, комплексною стійкістю до борошнистої роси, антракнозу, септоріозу.

Кущ сильнорослий, слаборозлогий. Пагони середні, прямі, гнучкі. Грона довгі, рихлі. Ягоди нижче середньої величини, середньою масою – 0,6-0,8 г, великі – 0,9-1,0 г, округлі червоні, з сухим відривом. Шкірка середньої товщини, міцна, еластична. М'якуш приємного освіжаючого кисло-солодкого смаку; містить: сухих речовин – 10,0%, цукрів – 6,3%, кислот – 2,4%, вітаміну С – 115,2-122,0 мг%. Дозрівають одночасно, утримуються на кущах більше місяця, не осипаючись і не в'януть. Придатні для використання у свіжому вигляді, заморожування, різних видів технічної переробки.

Рекомендована зона вирощування – Лісостеп, Полісся.

Зареєстрований у 2001 році.

Святомихайлівська. Заявник Інститут садівництва УААН. Отриманий шляхом схрещування у 1985 році сортів Джонкер ван Тетс і Алтайська рання.

Сорт середньопізнього строку достигання.

Відрізняється високою врожайністю, зимо-, засухо-, і хворобостійкістю. Кущ середньо рослий, компактний. Пагони середньої товщини, темно-сірі. Ягоди одномірні, середньою масою – 1,1 г, великі – 1,4 г, округлі, інтенсивно-червоні, соковиті, щільні. Шкірка еластична. М'якуш світло-червона, відмінного кислувато-солодкого смаку; містить: сухих речовин – 11,6%, цукрів – 8,9%, кислот – 1,8%, вітаміну С – 54,6 мг%. Дегустаційна оцінка – 7 балів. Достигання одночасне. Використовується, насамперед, як десертний, придатний для усіх видів техпереробки.

Рекомендована зона вирощування – Лісостеп, Полісся, Степ.

Зареєстрований у 2001 році.

СМОРОДИНА ЧОРНА

Аметист. Заявник Інститут садівництва УААН. Отриманий від схрещування у 1983 році сорту Новость Прикарпаття з гібридною формою серії С-106, що є комплексним донором стійкості до борошнистої роси, антракнозу, септоріозу, стовпчастої іржі, брунькового кліща. В її походженні брали участь європейський і сибірський підвиди чорної смородини, види дикуша і клейкої смородини, а також агрус.

Сорт середньостиглого строку достигання.

Відрізняється високою, стабільною врожайністю, самоплідністю, комплексною стійкістю до хвороб, підвищеною засухостійкістю.

Кущ високий, напіврозлогий, технологічний для машинного збору врожаю. Пагони середньої товщини, еластичні. Грона середньої довжини, густі. Ягоди середньої величини, дещо неодномірні, середньою масою 1,3 г, великі – 2,5 г, округло-овальні, чорні, блискучі. Шкірка міцна з сухим відривом. М'якуш зеленувато-коричневий, помірно-ароматний, приємного кисло-солодкого смаку; сухих речовин – 15%, цукрів – 9,5%, кислот – 2,48-2,64%, пектинів – 0,92-1,46%, фенольних сполук – 352,98-448,23 мг, вітаміну С – 198,24-218,42 мг%. Достигання дружнє. Придатні для використання у свіжому вигляді, заморожування, різних видів технічної переробки.

Рекомендована зона вирощування – Полісся. Зареєстрований у 2002 році.

Вернісаж. Заявник Інститут садівництва УААН. Сіянець 85в-19-42 отриманий шляхом схрещування у 1985 році сортів Клусоновська х Тритон, від яких в його геномі присутня геноплазма європейського і сибірського підвидів чорної смородини, далекосхідних видів дикуша і смородини уссурійської. Це забезпечує олігогенну стійкість до борошнистої роси, антракнозу, стовпчастої іржі, брунькового кліща.

Сорт середньостиглого строку досягання.

Відрізняється високою, стабільною врожайністю, самоплідністю, підвищеною засухостійкістю.

Кущ високий, напіврозлогий. Пагони довгі, середньої товщини. Грона середні, густі. Ягоди одномірні, середньою масою – 1,6 г, великі – 2 г, округло-овальні, чорні, блискучі. Шкірка міцна, з сухим відривом. М'якуш зеленувато-коричневий, помірно-ароматний, кисло-солодка містить сухих речовин – 15,02-16,42%, цукрів – 8,64-9,24%, кислот – 2,72-3,44%, пектинів – 1,42- 1,98%, фенольних сполук – 346,12-458,36 мг, вітаміну С – 169,24-186,46 мг%. Досягання майже одночасне. Придатні для використання у свіжому вигляді, заморожування, а особливо для різних видів технічної переробки.

Рекомендована зона вирощування – Лісостеп, Полісся, Степ.

Зареєстрований у 2003 році.

Вербна. Заявник Львівський філіал Інституту садівництва УААН.

Зимостійкість, стійкість для посухи, осипання та хвороб – висока.

Середня маса плоду – 1,5 г. Вміст у плодах: цукрів – 5,52%, вітаміну С – 325,0 мг%. Стійкість до борошнистої роси та септоріозу висока.

Зимостійкість, стійкість до посухи, осипання та хвороб – висока.

Рекомендована зона вирощування – Лісостеп, Полісся.

Сорт середньопізнього строку досягання.

Напрямок використання – універсальний.

Зареєстрований у 2004 році.

Надбужанська. Заявник Львівський філіал Інституту садівництва УААН. Отриманий від схрещування у 1986 році сортів Лесковіца х Делікатес.

Сорт пізнього строку досягання.

Відрізняється високою, стабільною врожайністю, крупноплідністю, високим вмістом біоактивних речовин, комплексною стійкістю до борошнистої роси, антракнозу, септоріозу, добре адаптований до умов підвищеної вологості.

Кущ середньорослий, слаборозлогий. Пагони середні, прямі. Грона короткі або середні, рихлі, густо розміщені на пагоні. Ягоди досить одномірні, середньою масою 1,1 г, великі – 2,4 г, округлі, чорні, блискучі. Шкірка середня, еластична, міцна, з сухим відривом. М'якуш густий, коричневий, з слабким ароматом смородини, приємного освіжаючого кисло-солодкого смаку; містить сухих речовин –

14,8%, цукрів – 8,2%, кислот – 2,3%, вітаміну С – 322,9-325,1 мг. %. Дегустаційна оцінка – 7 балів. Достигання дружнє, достиглі ягоди довго тримаються на кущах не осипаючись. Придатні для використання у свіжому вигляді, заморожування, різних видів технічної переробки.

Рекомендована зона вирощування – Лісостеп, Полісся.

Зареєстрований у 2004 році.

Зоря Галицька. Заявник Львівський філіал Інституту садівництва УААН. Отриманий шляхом гібридизації у 1986 році, вихідні форми – Пам'ять Вавілова та Оджебін. Відрізняється ранньостиглістю, величиною грони, великоплідністю. Зимостійкість, стійкість до посухи, осипання та хвороб – висока. Кущ середньорослий, середньорозлогий. Пагони середні, прямі. Ягоди за величиною середні, одномірні, середньою масою 1,0 г, максимальною 1,7 г, округлої форми, шкірка середня. Характер відриву ягід – сухий. М'якуш соковитий, вміст в ягодах: цукрів – 8,17%, кислот – 1,9%, вітаміну С – 162,0 мг. %. Смак – солодко-кислий, дегустаційна оцінка – 5 балів. Придатний до механізованого вирощування. Сорт високосамоплідний, кращі запилювачі – Чорнобильська, Минай Шмирьов, Фертоді – І.

Сорт ранньостиглого строку достигання.

Напрямок використання – універсальний.

Рекомендована зона вирощування – Лісостеп, Полісся.

Зареєстрований у 2000 році.

Краса Львова. Заявник Львівський філіал Інституту садівництва УААН. Отриманий шляхом схрещування у 1985 році сортів Загадка х Лентай.

Сорт середньопізнього строку достигання.

Відрізняється високою, стабільною врожайністю, великоплідністю, комплексною стійкістю до борошнистої роси, антракнозу, септоріозу, добре адаптований до умов вирощування в Лісостепу і Поліссі, придатний до механізованого збору врожаю. Кущ середньорослий, слаборозлогий. Пагони середні, прямі. Грона короткі або середні, густо розміщені. Ягоди крупні, досить одномірні, середньою масою – 1,5 г, великі – 4,5 г, округлі, чорні, блискучі. Шкірка середньої товщини, еластична, міцна, з сухим відривом. М'якуш густа, бурого забарвлення, приємного кисло-солодкого смаку; містить: сухих речовин – 12,9-13,2%, цукрів – 5,8-6,7%, кислот – 1,8-3,1%, вітаміну С – 228,0-270,0 мг. %. Дегустаційна оцінка – 5 балів. Достигання дружнє. Придатні для використання у свіжому вигляді, заморожування, різних видів технічної переробки.

Рекомендована зона вирощування – Лісостеп, Полісся.

Зареєстрований у 2000 році.

Козацька. Заявник Інститут садівництва УААН. Отриманий шляхом схрещування у 1974 році гібридної форми А-1-14 (Юність х Зоя) і сорту Минай Шмирьов.

Сорт середньораннього строку достигання.

Відрізняється високою, стабільною врожайністю, самоплідністю, стійкістю до грибкових хвороб, невимогливістю до умов вирощування, придатністю для механізованого збору врожаю.

Куш середньорослий, слаборозлогий. Пагони досить товсті, з укороченими міжвузлями, еластичні. Грона середньої довжини, густі. Ягоди досить крупні, одномірні, середньою масою – 1,6-2,0 г, великі – 2,6-3,0 г, округло-овальні, чорні, блискучі. Шкірка середньої товщини, міцна, еластична, з сухим відривом. М'якуш зеленувато-коричневий, приємного кисло-солодкого смаку, з слабким ароматом містить цукрів – 11,425, кислот -3,21%, вітаміну С – 182,5 мг %. Дегустаційна оцінка – 7 балів. Достигання дружнє. Придатні для використання у свіжому вигляді, заморожування, різних видів технічної переробки.

Рекомендована зона вирощування – Лісостеп, Полісся.

Зареєстрований у 2001 році.

Либідь. Заявник Львівський філіал Інституту садівництва УААН.

Сорт середньопізнього строку достигання.

Зимостійкість, стійкість для посухи, осипання та хвороб – висока.

Напрямок використання – універсальний.

Рекомендована зона вирощування – Лісостеп, Полісся.

Зареєстрований у 2001 році.

Софія. Заявник Львівський філіал Інституту садівництва УААН. Отриманий від схрещування у 1985 році сортів Пам'ять Вавилова і міжвидової гібридної форми 106-37-11, як комплексного донора хворобостійкості.

Сорт середньостиглого строку достигання.

Відрізняється високою, стабільною врожайністю, підвищеним вмістом вітаміну С, комплексною стійкістю до грибкових хвороб.

Куш сильнорослий, слаборозлогий. Пагони середні за довжиною і товщиною, прямі, гнучкі. Грона середньої довжини і короткі, рихлі, досить густо розміщені на пагоні. Ягоди середньою масою – 1,1 г, великі – 1,7-2,4 г, округлі, чорні, блискучі. Шкірка середньої товщини, еластична, міцна, з сухим відривом. М'якуш коричневий, густий, ніжний, приємного кисло-солодкого смаку, з легким ароматом смородини; містить: цукрів – 6,1-7,2%, кислот – 1,6%, вітаміну С – 308,0-334,8 мг %. Достигання дружнє. Придатні для використання у свіжому вигляді, заморожування, різних видів технічної переробки.

Рекомендована зона вирощування – Лісостеп, Полісся.

Зареєстрований у 2001 році.

Софіївська. Заявник Інститут садівництва УААН. Отриманий шляхом схрещування у 1986 році сорту Білоруська солодка з гібридною формою С-106, що є комплексним донором хворобостійкості.

Відрізняється надзвичайно високою, стабільною врожайністю, самоплідністю, комплексною стійкістю до грибкових хвороб, брунькового кліща, засухостійкістю, невимогливістю до умов вирощування.

Кущ вище середньої величини, напіврозлогий. Пагони товсті, з укороченими міжвузлями, еластичні. Грона середні, густі, густо розміщені на пагонах. Ягоди досить крупні, однорічні, середньою масою – 1,7-2,1 г, великі – 3,2-3,6 г, округло-овальні, чорні, блискучі, при досягненні не осипаються. Шкірка еластична, міцна, з сухим відривом. М'якуш зеленувато-коричневий, густий, помірно ароматний, приємного кисло-солодкого смаку; містить цукрів – 9,82-10,24%, кислот – 2,14-2,48%, пектинів – 1,48-1,72%, фенольних сполук – 342,24-451,14 мг, вітаміну С – 218,42-242,16 мг %. Дегустаційна оцінка – 5 балів. Досягання дружнє. Придатні для використання у свіжому вигляді, заморожування, різних видів технічної переробки.

Рекомендована зона вирощування – Лісостеп, Полісся, Степ.

Зареєстрований у 2001 році.

Українка. Заявник Львівський філіал Інституту садівництва УААН. Отриманий шляхом схрещування у 1982 році сортів Загадка х Оджебін.

Сорт середньостиглого строку досягання.

Відрізняється високою, стабільною врожайністю, комплексною стійкістю до борошнистої роси, антракнозу, септоріозу, придатністю для механічного збору врожаю, доброю адаптивністю до умов вирощування у Лісостепу та Поліссі.

Кущ середньорослий, прямостоячий, компактний. Пагони середньої довжини і товщини, прямі, еластичні. Грона середньої довжини, досить рихлі, густо розміщені на пагонах. Ягоди досить великі, середньою масою – 1,3 г, великі – 2,7 г, округло-овальні, чорні, блискучі. Шкірка товста, міцна, еластична, з сухим відривом. М'якуш зеленувато-коричневий, приємного освіжаючого кисло-солодкого смаку. Містить цукрів 5,5-6,1%, кислот 1,4 – 2,2%, вітаміну С 180,0-216,0 мг %. Досягання дружнє. Придатні для використання у свіжому вигляді, заморожування, різних видів технічної переробки.

Рекомендована зона вирощування – Лісостеп, Полісся.

Зареєстрований у 2000 році.

Чернеча. Заявник Інститут садівництва УААН. Отриманий шляхом схрещування у 1975 році сортів Новість Прикарпаття х Минай Шмирьов.

Сорт середньостиглого строку досягання.

Відрізняється високою, стабільною врожайністю, що базується на само плідності, комплексною стійкістю до грибних хвороб, технологічністю куща.

Кущ середньорослий, досить компактний. Пагони товсті, прямі з короткими міжвузлями. Грона середні, щільні, густо розміщені на пагонах. Ягоди великі, однорічні, середньою масою – 1,5 г, великі – 2,5 г, округло-овальні, чорні, блискучі. Шкірка середньої товщини, еластична, міцна, з сухим відривом. М'якуш коричнево-зелений, приємного кисло-солодкого смаку; містить цукрів – 10,4%, кислот – 2,1%, пектинів – 1,03%, фенольних сполук – 672,72 мг, вітаміну С – 183,12-187,0 мг %. Дегустаційна оцінка – 7 балів. Досягання дружнє, але сорт

потребує своєчасного збору врожаю, так як при перезріванні придатні до осипання. Придатні для використання у свіжому вигляді, заморожування, різних видів технічної переробки.

Рекомендована зона вирощування – Лісостеп, Полісся.

Зареєстрований у 2000 році.

Ювілейна Копаня. Заявник Інститут садівництва УААН. Отриманий шляхом схрещування у 1983 році сортів Новість Прикарпаття з гібридною формою С-106, що є комплексним донором хворобостійкості.

Сорт середньопізнього строку досягання.

Відрізняється високою, стабільною врожайністю, самоплідністю, комплексною олігогенною стійкістю до хвороб та шкідників, підвищеною засухостійкістю.

Кущ високий, напіврозлогий. Пагони довгі, вище середньої товщини, еластичні. Грона середні, густі. Ягоди крупні, одномірні, середньою масою – 1,7-1,9 г, великі – 3,0-3,5 г, овально-округлі, чорні, блискучі. Шкірка міцна, еластична, з сухим відривом. М'якуш зеленувато-коричневий, помірно ароматний, приємного кисло-солодкого смаку; містить цукрів – 10,52-11,09%, кислот – 2,56-2,94%, пектинів – 1,42-1,68%, фенольних сполук – 328,64-456,8 мг, вітаміну С – 206,28-232,64 мг % на 100 г сирової маси. Дегустаційна оцінка – 4,25-4,5 бала. Досягання дружнє. Придатні для використання у свіжому вигляді, заморожування, різних видів технічної переробки.

Рекомендована зона вирощування – Лісостеп, Полісся, Степ.

Зареєстрований у 2001 році.

СУНИЦЯ

Ольвія. Заявник Інститут садівництва УААН. Отриманий шляхом схрещування у 1987 році сорту Присвята з донорською міжвидовою формою підвищеної зимостійкості і засухостійкості – 277-3-16 (Фестивальна + F1 суниці віргінської).

Сорт раннього строку досягання.

Відрізняється високою врожайністю, відмінним виглядом та підвищеною транспортабельністю ягід, стійкістю до грибкових хвороб та суничного кліща, більш високим рівнем зимостійкості та засухостійкості. Рослини середньорослі, напіврозлогі, мають велику кількість темно-зелених, шкіряних, блискучих листків. Вуса середньої товщини, червоні, багато чисельні. Розсада середньоросла, з розвиненою кореневою системою. Квітконоси середньої довжини, товсті, міцні. Суцвіття – багатоквітковий компактний дихазій. Ягоди великі, одномірні у збиранні (великі – 32-40 г, середні – 11,0-11,8 г), правильної тупоконічної форми, з шийкою, інтенсивно-червоні, блискучі, мають ефектний вигляд у тарі. М'якуш яскраво-червоний, щільний, соковитий, ніжний, ароматний, гармонійного кисло-солодкого смаку; містить: цукрів – 7,74-9,06%, кислот – 0,79-0,88%, вітаміну С – 64,55-86,92 мг/%. Достигає одночасно з сортом Десна.

Використовуються у свіжому вигляді, придатні для виготовлення високоякісних продуктів переробки.

Рекомендована зона вирощування – Лісостеп, Полісся, Степ. Зареєстрований у 2001 році.

Килимова. Сунично-полуничний гібрид. Заявник приватна сільськогосподарська науково-виробнича фірма “Новий сад”. Використовується в садах як біологічна мульча. Ягоди дрібні, неїстівні.

Зимостійкість, стійкість до посухи та хвороб – висока.

Рекомендована зона вирощування – Лісостеп, Полісся.

Зареєстрований у 2004 році.

КІВІ

Монті. Заявник Державний Нікітський ботанічний сад УААН.

Зимостійкість вище середньої, стійкість до посухи та хвороб висока.

Рекомендована зона вирощування – Степ.

Зареєстрований у 2000 році.

Напрямок використання – запилювач.

Томурі. Заявник Державний Нікітський ботанічний сад УААН.

Зимостійкість вище середньої, стійкість до посухи та хвороб висока.

Рекомендована зона вирощування – Степ.

Зареєстрований у 2000 році.

Напрямок використання – запилювач.

ЛИМОН

Мейер. Заявник Державний Нікітський ботанічний сад УААН.

Зимостійкість висока, стійкість до посухи та хвороб середня.

Сорт ремонтантний.

Рекомендована зона вирощування – Степ, Лісостеп, Полісся.

Зареєстрований у 2003 році.

Напрямок використання – свіжі плоди.

Лісбон. Заявник Державний Нікітський ботанічний сад УААН.

Зимостійкість висока, стійкість до посухи та хвороб середня.

Сорт пізньостиглого строку досягання.

Рекомендована зона вирощування – Степ, Лісостеп, Полісся.
Зареєстрований у 2004 році.
Напрямок використання – свіжі плоди.

МИГДАЛЬ

Мілас. Заявник Державний Нікітський ботанічний сад УААН.
Зимостійкість, стійкість до посухи, та хвороб висока.
Сорт ранньостиглого строку досягання.
Рекомендована зона вирощування – Степ.
Зареєстрований у 2000 році.
Напрямок використання – універсальний.

ОПИСИ СОРТІВ ВИНОГРАДУ ТА ПІДЩЕПНИХ СОРТІВ ВИНОГРАДУ, що занесені до Реєстру сортів, придатних для поширення в Україні

ВИНОГРАД

Данко. Заявник Всесоюзний НДІ виноробства і виноградарства „Магарач” (Лімбергер х Ркацелі). Прийнятий у випробування ДК СРСР у 1982 р.

Винний, з чорною ягодою. Стійкий до філоксери і грибкових хвороб. В умовах Криму має високо стабільні врожаї - більше 100 ц/га, відрізняється високим стабільним рівнем цукронакопичення – 22,0-23,0 г/100 см³ і стабільною оптимальною кислотністю – 7-8 г/дм³. Сорт має високу технологічність. Із його врожаю можна виробляти як сухі, так і міцні червоні вина Кагор. Високий запас красильних речовин і їх стабільність дозволяють використовувати врожай сорту у виробництві витриманих марочних вин.

Сорт зареєстрований у 2003 році у 1-6 зонах Криму.

Цимлянський чорний. Місцевий донський, винний, з чорною ягодою сорт. Прийнятий у випробування ДК УРСР у 1958 році. Цінний старовинний технічний сорт винограду, що використовується в Криму для виготовлення унікальних марочних столових, міцних та ігристих вин, які користуються підвищеним попитом у споживача. Сила росту кущів – помірна. Визрівання пагонів добре. Сорт – зимостійкий.

Кущі середньорослі. Середня врожайність – 60 ц/га.

Сорт зареєстрований у 2, 4-6 зонах Криму у 2002 році.

Семільйон. Французький сорт, винний з білою ягодою. Випробовувався у Криму, середньопізній, врожайний. Кущі середньої сили росту, лоза визріває добре. Сорт стійкий проти мільдю і оїдіуму.

З ягід цього сорту виготовляються марочні портвейни, а також сортові столові вина. У господарствах об'єднання „Масандра” цей сорт вирощується масово.

У перше плодоношення вступає на третій рік. Врожай нарастає поступово. Осипання зав'язі і горошкватість ягід слабкі. Сорт не вибагливий, добре почуває себе на глиняно-вапняних ґрунтах. На теплих південних схилах сорт повною мірою виявляє свої високі якості. Зареєстрований у 2, 5, 6, 9 виноградних зонах у 2001 році.

Солдайя. Аборигенний сорт Криму. Маточний кущ був виділений у 1970 році у радгоспі „Сонячна долина”. Вивчався там же і в ампелографічній колекції. Передгірського дослідного господарства „Магарач”.

Порівняльні аналізи ознак листків і ягід дозволяють зробити висновки, що сорт є гібридом сортів Пухляківський і Шабаш. За морфологічними ознаками близький до сорто типу Пухляківський. Квітки двостатеві. Грона середні, конічні, щільні і середньощільні.

Ягоди середні і великі – до 23 мм, злегка овальні або круглі, білі з коричневим загаром. М'якуш соковитий, приємного смаку, гармонійний із слабким сортовим ароматом. Відноситься до столово-винних сортів пізнього строку дозрівання.

Характеризується відносною стійкістю до морозів і грибкових захворювань.

Високоврожайний, середня маса грона 200 – 220 г.

Зареєстрований у 2002 році у 5, 6 виноградарських зонах України.

Мурведр. Іспанський сорт. Одержав назву від містечка Мурвієдро /північніше Валенсії/. В VI ст. сорт під назвою Еспар був завезений у Францію, де значно поширився. Давність культури і широке розповсюдження сорту привело до того, що багато хто рахує сорт Мурведр французьким сортом.

Цей сорт свого часу був уже поширений і на південному березі Криму. Тепер його насадження, займають також не малі площі.

Сорт винний з чорною ягодою. У випробування був прийнятий у 1960 р. по СРСР.

Сік слабкозафарбований або прозорий, солодкий з помірною кислотністю.

Сорт стійкий до осипання квіток, пізнього строку дозрівання, кущі сильнорослі, морозостійкий, посухостійкий.

Пошкоджується в окремі роки мілдью, оїдіумом, пліснявою, гроною, листокруткою та ін.

Зареєстрований у 2, 5, 6 зонах України у 2001 році.

Піно білий. Аборигенний сорт інтродукований із Франції, технічний, з білою ягодою. У випробування прийнятий у 1960 році по СРСР. Дуже якісний технічний сорт, який в умовах України дає добрі білі столові вина і задовільні шампанські виноматеріали. Дозріває досить рано – перша половина вересня. Визрівання лози добре – на 90-95% довжини лози. Кущі середньої сили росту. Сорт найбільше врожайний серед різновидностей Піно. Горошіння ягід, зазвичай, незначне.

Не стійкий проти мільдю і філоксери.

Зареєстрований у 8-14 виноградарських зонах України у 2002 році.

Джеват кара. Аборигенний сорт південно-східної зони Криму. Походження і час появи його в культурі невідомо. Із Криму сорт був завезений на Дон на початку XIX ст. після заснування Нікітського училища садівництва, виноградарства і виноробства.

Там він одержав місцеву назву - Буланний.

У даний час сорт у багатьох ампелографічних колекціях країни.

Кущі сорту відрізняються сильним розвитком. Однорічні пагони сягають більше 2 м. Визрівання пагонів дуже добре – 92%. Квітка двостатева.

Ягоди великі, рідше середні, округлі, темно-сині з густим пруїном. Грона великі, рідше середні, ширококонічні, частіше щільні, рідше середньої щільності.

Дуже пізнього строку дозрівання, стійкий до засухи, не вибагливий до ґрунтів.

Стійкий до хвороб, шкідників. Заслужовує на увагу його врожайність.

Сорт Джеват Кара – місцевого значення. Використовується як сорт-опилювач і як купажний матеріал для виробництва десертних вин „Чорний доктор” і „Чорний полковник”.

Зареєстрований у 5 виноградарській зоні Криму у 2002 році.

Цитринний магарача. Одержаний в результаті схрещування сортів Мадлен Анжевін х „Магарач” 124-66-26 + Новоукраїнський ранній.

Технічний, ранньосереднього строку дозрівання. Масова концентрація цукрів 20-23 г/см³, кислот – 6-7 г/дм³. Сорт врожайний – до 150 ц/га.

Рекомендується для виготовлення десертних вин. Сила росту куща висока, визрівання лози добре. За морфологічними даними близький до сорту Мускат білий, схожість виражається у високій якості десертних вин з мускатним ароматом. Також перевищує цей сорт за комплексною польовою стійкістю до філоксери, мільдю і оїдіуму. Запилювачів не потребує.

Зареєстрований в 1-6 виноградарських зонах Криму у 2002 році.

Кок пандас. Кок (у перекладі з тюрського – зелений, Пандос у перекладі з грецького – завжди дає). Аборигенний технічний сорт дуже пізнього строку дозрівання. Вважають, що свого часу був завезений із Греції, який колись мав синонім - Ткем Ізюм. Розширився із старих кореневласних виноградників Козької долини, де ріс невеликими групами і окремими рослинами. Був описаний П.П. Кеппеном в числі старих судакських сортів як Пандас жовто-зелений.

Відрізняється сильним розвитком куща, добрим визріванням лози. Має функціонально-жіночий тип квітки, але добре зав'язує ягоди і дає стабільний врожай.

Ягода жовтуватозелена, середньої величини, округла або злегка сплюснена.

Смак добрий. Грона циліндричні, середні за величиною та щільністю. Технічна стиглість ягід настає в кінці вересня – початку жовтня. Врожайність сорту середня. Цукристість соку залежить від погодних умов і коливається від 19 до 23 г/см³ і вище, при кислотності 5,5 – 7 г/дм³. Сорт високо посухо- і солестійкий. Середностійкий до грибкових хвороб.

Використовується виноград для одержання високоякісного десертного вина „Сонячна долина”.

Зареєстрований у 5 і 6 виноградарських зонах у 2002 році.

Серексія чорна. Місцевий молдавський сорт, який культивується у Придністров’ї з давніх часів. В Україні вирощується широко.

Відноситься до технічних сортів пізнього строку дозрівання.

Веgetаційний період від розпускання бруньок до дозрівання ягід приблизно 150 днів при необхідній сумі температур. Сорт високоврожайний, особливо у кореневласних насадженнях на піщаних ґрунтах. Також добре росте і плодоносить на підщепах Р x Р 101-14 і 3309. Із суслу цього сорту виготовляють ординарні червоні столові вина. В останні роки в Україні із сорту виготовляють за особливою технологією дуже смачні десертні вина і одержують коньячні спирти. Дуже добре накопичує цукор. Квітки двостатеві, грона – від середніх до дуже великих розмірів, ягоди середньої величини, темносині. Шкурка в ягоди середньої товщини. М’якуш ягоди дуже приємний, але простого смаку. Сорт зимостійкий і стійкий проти грибкових хвороб. Більше всього використовується для купажування з другими червоними винами.

Сорт зимостійкий і стійкий проти грибкових хвороб.

Зареєстрований у 9- й виноградарській зоні у 2002 р.

Оригінал. Виведений Інститутом виноградарства і виноробства ім. В. Є.Таїрова шляхом генеративної гібридизації, вихідні форми (Дамаська роза x СВ 20365), сорт столового направлення, продуктивний, стійкий до найбільш небезпечних щирокорозповсюджених грибкових хвороб – мілдью, оїдіуму.

Має декоративний вигляд грон і ягід, високі смакові і товарні якості, транспортабельний. Зимостійкий, посухостійкий.

Коренева система толерантна до філоксери, добре адаптується до умов вирощування. Недоліки сорту – не рівномірне дозрівання грон, багато пасинків. Дозрівання лози добре, кущі – сильнорослі.

Рекомендований для вирощування у АР Крим, більшій частині степової зони України, Молдові, Російській Федерації.

Зареєстрований у 8- й виноградарській зоні України у 2002 році.

ПІДЩЕПНІ СОРТИ ВІНОГРАДУ

БЕРЛАНДІЕРІ x РІПАРІА КОБЕР 5ББ – підщепа інтродукована із Австрії.

Відрізняється більш високим розвитком лози (в середньому 20 тис. чубуків з гектара), але гіршим укоріненням чубуків і більш низьким виходом прищеплених саджанців у порівнянні з контрольною підщепою 101-14.

Кущі сильнорослі, досягання лози хороше. Відрізняється високою стійкістю до підвищеного вмісту вапна в ґрунті, тому позитивно оцінюється в районах, де багато карбонатних ґрунтів.

Квітка функціонально – жіноча. Гроно дрібне, рихле. Ягода дуже дрібна, не їстівна, синювато-чорна.

Зареєстрована у всіх виноградарських зонах України у 2004 році.

БЕРЛАНДІЄРІ x РШАРІА ТЕЛЕКІ 5 Ц – інтродукована із УНР. Зимостійка, відрізняється хорошим лозоношенням (вихід стандартних чубуків 56 тис. з га. проти 30 тис. з га. у контрольної підщепи 101 – 14), добрим укоріненням чубуків і виходом прищеплених саджанців. Кущі сильнорослі, лоза визріває задовільно. Невибаглива до ґрунтових умов, але слабо стійка до підвищеного вмісту активного вапна в ґрунті. Квітка – чоловіча.

Зареєстрована у всіх виноградарських зонах України в 2004 році.

БЕРЛАНДІЄРІ x РШАРІА СО4 – інтродукована з ФРН, зимостійка.

Підщепа СО4 відрізняється більш високим лозоношенням (вихід стандартних чубуків 52 тис. з га, проти 30 тис. га у контрольної підщепи 101-14). Чубуки СО4 гірше укоріняються ніж 101 – 14. За виходом прищеплених саджанців істотних переваг перед контрольним сортом немає. Квітки чоловічі, лоза визріває добре. Широко поширена по всіх виноградарських зонах.

Зареєстрована в Україні у 2004 році.

РШАРІА x РУПЕСТРІС 101-14 – інтродукована із Франції, зимостійка. Кущ сильнорослий. За даними державного сортовипробування підщепа 101-14 відрізняється дуже хорошим укоріненням чубуків (виходом кореневласних саджанців – 52,8%), високим виходом прищеплених саджанців в комбінації з сортом Аліготе (45,2%), добрим визріванням лози, високою стійкістю до кореневої форми філоксери. Підщепа 101-14 являється найбільш поширеною підщепою в Одеській області, що займає у виробництві маточників більше 70% площ.

Квітки функціонально-жіночі, гроно маленьке, ягоди дрібненькі, чорні, неїстівні.

Зареєстрована у всіх виноградарських зонах України у 2004 році.

РШАРІА x РУПЕСТРІС 3309 – інтродукована із Франції. Поступається контрольному сорту 101-14 за виходом стандартних чубуків, однак, краще вкорінюється. За виходом підщепних саджанців переваг особливих також немає. Відрізняється середньою силою росту куща, підвищеною можливістю до утворення пасинків.

Відносно стійка до вмісту в ґрунті активного вапна. Визрівання лози добре. Квітки – чоловічі. Зимостійка.

Зареєстрована у всіх виноградарських зонах України у 2004 році.