

МІНАГРОПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА З ОХОРОНИ ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН

КАТАЛОГ

СОРТІВ РОСЛИН, ПРИДАТНИХ ДЛЯ ПОШИРЕННЯ В УКРАЇНІ на 2004 рік
(ЯРІ ЗЕРНОВІ, ЗЕРНОБОБОВІ ТА КРУП'ЯНІ КУЛЬТУРИ)

Київ - 2003 р.

ЗМІСТ

Скорочення термінів	4
Сільськогосподарські: злаки	6
Пшениця м'яка яра	6
Пшениця тверда яра	7
Тритикале яре	7
Овес ярий	7
Ячмінь ярий	8
Кукурудза	11
Сільськогосподарські: бобові	22
Горох	22
Сочевиця	24
Нут	24
Чина	25
Квасоля звичайна	25
Сільськогосподарські: круп'яні	26
Гречка	26
Просо	26
Сорго зернове	27
Сориз	28
Рис	28
Мишій італійський	29
Заявник, представник та їх адреси	30
Описи сортів культур, що занесені до Реєстру сортів, придатних для поширення в Україні	34
Пшениця м'яка яра	34
Пшениця тверда яра	36
Тритикале яре	37
Овес ярий	38
Ячмінь ярий	39
Кукурудза	67
Горох	74
Гречка	86
Просо	86
Сорго зернове	88
Сориз	90
Рис	92

СКОРОЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Зона - Рекомендована зона вирощування

П	Полісся
Л	Лісостеп
С	Степ
Кр	Крим
ЗГр	захищений ґрунт
1....15	тимчасові виноградарські зони
гідроп	гідропоніка
К	Карпати
ЗГр(СТ)	захищений ґрунт (скляна теплиця)
ЗГр(ПТ)	захищений ґрунт (плівкова теплиця)

Характеристика 1 - Продуктивність

7-9	висока
5	середня
<5	нижчесередньої

Характеристика 2 - Напрямок використання

впв	весняного промислового використання
оз	озимий
ЗПВ	для зон промислової вигодівлі
уц	урожайно-цукристий
цукр	цукристий
++	технічного напрямку
спц	спеція
парф	парфумерна промисловість
пер	переробка
фарм	фармацевтична промисловість
зпл	запилювач
слн	сильний
дф	добрий філер
цін	цінний
ф	філер
зерн	зерновий
зк	зерно-кормовий
пв	пивоварний

зф	задовільний філер
х	харчовий
фж	фуражний
олн	олійний
конд	кондитерський
вол	високоолеїновий
тхн	технічний
лік	лікарський
стл	столовий
тхст	технічно-столовий
сал	салатний
конс	консервний
зс	для соління
ун	універсального призначення
свж	споживання у свіжому вигляді
сил	силосний
лп	луко-пасовищний
мед	медонос
ск	сінокісний
піщ	піщаний
закав	закавказький
зак	залуження схилів та еродованих земель
овоч	овочевий
зх	захисний
прм	промисловий
зріз	зріз
озл	озеленення
аром	ароматичний
склт	скелетний
нц	напівцукровий
корм	кормовий
він	віничний
дкр	декоративного оформлення
лпв	для літнього промислового використання
сд	сидерат
зрош	на зрошуваних землях

хп	для харчової промисловості
всш	придатний для високоштамбової культури
г	гостра
нг	напівгостра
со	солодка
цу	цукристо-урожайний

Характеристика 3 - Група стиглості

ср	середньоранній
сп	середньопізній
сс	середньостиглий
рс	ранньостиглий
пс	пізньостиглий
рсдн	ранньосередній
скс	скоростиглий
зим	зимовий
літ	літній
осін	осінній
нр	надранньостиглий

Характеристика 4 - Зимостійкість/Холодостійкість

7-9	висока
>5	вищесередньої
5	середня
<5	низька

Характеристика 5 - Стійкість до посухи

7-9	висока
5	середня
<5	низька

Характеристика 6 - Стійкість до полягання

7-9	висока
5	середня
<5	низька

Характеристика 7 - Стійкість до осипання

7-9	висока
5	середня

<5	низька
----	--------

Характеристика 8 - Стійкість до хвороб

7-9	висока
5	середня
<5	низька

Характеристика 9 - Якість

вбіл	високобілковий
сбіл	середньобілковий
вкліт	висококлітковинний
скліт	середньоклітковинний
мал	малоалкалоїдний
сал	середньоалкалоїдний
вдек	високодекоративний
дек	декоративний
вщі	з високою щільністю покриття
сщі	з середньою щільністю покриття
влеж	високолежкий
слеж	середньолежкий
вц	високоцукристий
сц	середньоцукристий
вкр	висококрохмальний
скр	середньокрохмальний
вл	високоолійний
сл	середньоолійний
боп	безопійний
лік	лікарський
о	низькоеруковий
++	високоеруковий
о+	середньоеруковий
нгл	низькоглюкозинолатний
сгл	середньоглюкозинолатний
цін	цінний
ф	філер
зрош	на зрошуваних землях
слн	сильний
слн	сильний

Сорт				Код	Зона	Характеристики								Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач		Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				
										посухи	полягання	осипання	хвороб	

Сільськогосподарські: злаки

Пшениця м'яка яра - 23

Білоруська 12		75007034	1980	447 /	ЛП	7	зерн	се		5	5	7-9	5	зф
Вороньська 6		84007071	1990	89 /	П	7	зерн	се		5	5	7-9	5	елн
+ Вітка		99007015	2003	1120 /	П	7	зерн	ре		5	7	7-9	7	цпн
Дніпрянка		79007052	1982	345 /	Л	7	зерн	ре		5	5	7-9	5	елн
Елегія миронівська		00007023	2004	341 /	ЛП	7-9	зерн	се		7	7	7-9	7	елн
Іволга		88007048	1993	164 /	П	9	зерн	ер		5	5	7-9	5	корм
Катюша		90007050	1996	305 /	Л	7	зерн	ре		5	5	7-9	7	ф
Колективна 3	ж	96007002	2000	341 /	Л	7	зерн	се		5	7-9	7-9	7	цпн
+ Краса Полісся		00007022	2003	430 /	П	7	зерн	се		5	7-9	7-9	7	цпн
Легуан		95007032	2000	946 /	Л	9	зерн	се		5	7-9	7-9	7-9	цпн
Луганська 4		75007039	1978	309 /	С	5	зерн	се		5	5	7-9	5	елн
Миронівчанка		95007021	1999	341 /	Л	7	зерн	се		5	7-9	7-9	7	цпн
Миронівська яра		75007040	1978	341 /	ЛП	7	зерн	се		5	5	7-9	5	цпн
Печерянка		00007025	2004	305 /	Л	5	зерн	се		7	7	7-9	7	цпн
Рання 93		93007063	1996	345 /	ЛП	7	зерн	ер		5	7	7-9	7	цпн
Скороспілка 95		95007022	2000	345 /	П	7	зерн	ре		5	7	7-9	7	цпн
Скороспілка 98		97007018	2001	345 /	Л	7	зерн	ер		5	7-9	7-9	7	ф
Скороспілка 99		99007010	2003	345 /	ЛП	7	зерн	ре		5	7	7-9	7	цпн
Трізо		01007036	2004	807 /	ЛП	7-9	зерн	се		7	7-9	7-9	7-9	цпн
Харківська 18		93007052	1996	404 /	Л	7	зерн	се		7	5	7-9	5	цпн
+ Харківська 30		99007009	2003	404 /	ЛП	7	зерн	се		7-9	5	7-9	7	цпн
+ Харківська 28		98007021	2002	404 /	Л	7	зерн	се		7-9	7-9	7-9	7	цпн
Харківська 26		96007019	2000	404 /	СЛ	7	зерн	се		5	7-9	7-9	7	цпн

Сорт				Код	Зона	Характеристики								
Пазва	Вид	Номер	Рік ресетрації	Заявник / Підтримувач		Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
										посухи	полягання	осипання	хвороб	

Пшениця тверда яра - 13

Букурія		00008004	2004	420 /	П	5	зерн	се	5	7-9	7-9	7	х
Дарина		01008006	2004	309 /	Л	7	зерн	ср	7-9	7	7-9	7	х
Ізольда		00008003	2004	341 /	ЛП	7	зерн	се	7	7	7-9	7	х
Кісвлянка		92008002	1997	796 /	Л	9	зерн	се	5	7-9	7-9	7-9	х
Луганська 7		80008002	1985	309 /	Л	7	зерн	се	7	5	7-9	5	х
Неодор		92008003	1996	943 /	СЛ	9	зерн	сн	5	7-9	7-9	7-9	х
Харківська 23		91008005	1995	404 /	С	7	зерн	се	7-9	7-9	7-9	5	х
Харківська 27		94008005	2000	404 /	СЛ	7	зерн	се	7-9	7-9	7-9	7	х
+ Харківська 39		98008002	2002	404 /	С	7	зерн	ср	7-9	7-9	7-9	7	х
+ Харківська 41		99008002	2003	404 /	Л	7	зерн	се	7-9	7	7-9	7	х
Харківська 46		52008001	1957	404 /	СЛ	7	зерн	се	5	5	5	5	х
Харківська 37		83008001	1988	404 /	Л	7	зерн	се	7	5	7-9	5	х
Чадо		00008002	2004	404 /	Л	7	зерн	се	7	7	7-9	7	х

Тритикале яре - 6

+ Арсенал		99011005	2002	920 /	П	7	зерн	се	7	7-9	7	7-9	зерн
Аіст харківський		91011001	1995	404 /	ЛП	7	зерн	се	7	7	7	9	зерн
+ Вікторія		00011004	2003	430 /	П	7	зерн	се	7	7	7	7-9	зерн
Жайворонок харківський		98011005	2002	404 /	Л	7	зерн	ре	7	7	7	7-9	зерн
Крупільський		97011007	2001	1027 /	П	7	зерн	се	7	7	7	7-9	зерн
+ Хлібодар харківський		00011005	2003	404 /	ЛП	7	зерн	се	7	7	7	7-9	зерн

Овес ярий - 14

+ Ранньостиглий		96005001	2000	950 /	П	інтн	зерн	ре	5-7	5-7	5-7	5-7	цін
Абель		96005003	2000	946 /	П	інг	зерн	ср	5-7	7-9	5-7	5-7	цін
Полонез		92005007	1996	447 /	ЛП	інтг	зерн	ср	5-7	5-7	5-7	5	цін

Сорт				Код	Зона	Характеристики								Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач		Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				
										посухи	полягання	осипання	хвороб	
Синельниківський 68		93005001	1996	340 /	Л	нінт	зерн	ер		5-7	5-7	5-7	5-7	цін
Славутич		95005002	2000	950 /	П	нінт	зерн	ер		5	5-7	5-7	5-7	фж
Буг		83005005	1986	447 /	ЛП	нінт	зерн	се		5-7	5-7	5-7	5	фж
Деснянський		95005001	1998	430 /	ЛП	нінт	зерн	се		5-7	5-7	5-7	5-7	фж
Райдужний		98005002	2001	430 /	П	нінт	зерн	се		5-7	7-9	7-9	5-7	фж
Синельниківський 1321		91005009	1994	311 /	ПЛ	нінт	зерн	се		5-7	5-7	5-7	5	цін
Скакун		84005009	1988	167 /	СЛП	інтн	зерн	се		7-9	7-9	7-9	5-7	цін
Факір		92005005	1996	116 /	Л	нінт	зерн	се		5-7	5-7	5-7	5-7	фж
Чернігівський 27		86005014	1990	429 /	СП	інтн	зерн	се		7-9	7-9	7-9	5-7	фж
Грамена		93005006	1996	926 /	Л	нінт	зерн	еп		5-7	7-9	5-7	5-7	цін
Львівський 1		80005007	1983	371 /	Л	нінт	цін	еп		5-7	5-7	5-7	5	цін
Ячмінь ярий		- 84												
Аскольд		97012020	2001	341 /	П	інт	зерн	се		5	5-7	5-7	5-7	пв
Адажіо		00012002	2003	1048 /	ЛП	інт	зерн	се		5-7	7-9	7-9	5-7	пв
Адап		94012008	1998	378 /	С	нінт	зерн	се		7-9	7-9	7-9	5	фж
Асторія		98012025	2002	1048 /	ЛП	інт	зерн	се		5-7	7-9	7-9	5-7	фж
Амулет		96012011	1999	946 /	СЛП	інт	зерн	се		5-7	7-9	7-9	5-7	пв
Аннабель		01012018	2004	926 /	П	інт	зерн	се		5-7	7-9	7-9	5-7	пв
Барке		98012011	2003	1149 /	ЛП	інт	зерн	ер		5-7	7-9	7-9	5-7	пв
Бадьорний		96012004	1999	404 /	ЛП	нінт	зерн	се		5-7	5-7	5-7	5	пв
Вінницький 28		00012016	2004	306 /	П	нінт	зерн	ер		5-7	5-7	7-9	5-7	фж
Варіант		00012013	2004	430 /	П	нінт	зерн	се		5-7	5-7	7-9	5-7	фж
Вакула		00012005	2003	378 /	СЛП	плас	зерн	се		7-9	7-9	7-9	5-7	пв
Галатея	®	94012002	1998	378 /	СЛП	плас	зерн	ер		7-9	7-9	5-7	5	фж
Гамбринус		92012023	1996	378 /	Л	інт	зерн	се		5-7	5-7	5-7	5-7	пв
Гама		97012006	2000	404 /	Л	нінт	зерн	се		5-7	5-7	5-7	5	фж

Сорт				Код	Зона	Характеристики								Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєстрації			Заявник / Підтримувач	Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)			
				посухи							полягання	осипання	хвороб	
Галактик		® 94012015	1999	378 /	СЛП	плас	зерн	се		7-9	7-9	5-7	5-7	пв
Гостинець		91012017	1995	447 /	П	нінт	зерн	еп		5	5-7	5-7	5	фжк
Гонар		91012020	1995	447 /	ЛП	нінт	зерн	се		5	5-7	5	5	пв
Гетьман		® 98012020	2001	378 /	ЛП	нінт	зерн	се		5-7	5-7	7-9	5-7	пв
Данута		00012017	2003	926 /	СЛП	інт	зерн	се		7-9	7-9	7-9	5-7	пв
Дерибас		92012021	1995	378 /	СЛП	плас	зерн	се		7-9	5-7	5-7	5	цін
Джерзей		96012013	2000	946 /	СЛП	інт	зерн	еп		5-7	7-9	7-9	5-7	пв
Дніпровський 257		94012013	1996	311 /	Л	нінт	зерн	се		5	5-7	5-7	5	фжк
Донецький 14		97012003	2000	315 /	С	нінт	зерн	се		7-9	5-7	5-7	5	цін
Донецький 15		98012017	2002	315 /	С	нінт	зерн	ер		7-9	7-9	5-7	5	цін
Донецький 12		96012001	1999	315 /	СЛ	нінт	зерн	се		7-9	7-9	7-9	5-7	цін
Джерело		96012003	1999	404 /	ЛП	нінт	зерн	се		7-9	5-7	7-9	5-7	цін
Докучаєвський 15		98012023	2003	405 /	ЛП	нінт	зерн	се		5-7	5-7	5-7	5	пв
Едем		94012020	1997	378 /	ЛП	інт	зерн	се		5-7	7-9	5-7	5	пв
Ефект		98012006	2002	404 /	П	нінт	зерн	еп		5	5-7	5-7	5	пв
Екзотік		94012012	1997	404 /	С	нінт	зерн	ер		7-9	7-9	7-9	7-9	фжк
Європрестиж		02012006	2004	777 /	П	нінт	зерн	се		5-7	7-9	7-9	7-9	пв
Зерноградський 385		86012017	1990	217 /	С	нінт	зерн	се		7-9	5-7	5-7	5-7	пв
Зоряний		® 97012004	2000	378 /	ЛП	нінт	зерн	се		5-7	5-7	5-7	5	пв
Звернення		94012010	1997	404 /	ЛП	нінт	зерн	се		5-7	5-7	5-7	5-7	пв
Іпарі		98012027	2001	1094 /	П	нінт	зерн	се		5	5-7	5-7	5	пв
Кадікс		01012001	2004	1048 /	П	інт	зерн	се		5-7	7-9	7-9	5-7	пв
Корона		98012002	2000	1047 /	Л	інт	зерн	ер		5-7	7-9	5-7	5-7	пв
Караг		94012024	1998	307 /	П	нінт	зерн	се		5	5-7	5-7	5	фжк
Козак		00012009	2004	405 /	П	нінт	зерн	се		7-9	5-7	7-9	7-9	пв
Княжий		00012008	2003	371 /	П	нінт	зерн	се		5-7	5-7	7-9	5-7	пв
Каштан		® 89012009	1994	306 /	П	нінт	зерн	се		5	5-7	5-7	5-7	пв

Сорт				Код	Зона	Характеристики								
Назва	Вид	Номер	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач		Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
										посухи	полягання	осипання	хвороб	
Лінус		00012010	2004	710 /	П	нінт	зерн	се		7-9	7-9	7-9	5-7	пв
Логос		97012002	2000	306 /	ЛП	нінт	зерн	се		5-7	5-7	5-7	5	фж
Миронівський 86		91012015	1995	341 /	Л	нінт	зерн	ср		5-7	5-7	7-9	5	пв
Миронівський 92		93012014	1996	341 /	СЛ	нінт	зерн	се		5-7	5-7	7-9	5-7	пв
Носівський 21	®	97012014	2002	430 /	Л	інт	зерн	ср		5-7	7-9	7-9	5	пв
Невада		98012001	2001	1048 /	ЛП	інт	зерн	ср		5-7	7-9	7-9	5-7	пв
Неофіт	®	94012017	1999	306 /	ЛП	нінт	зерн	се		5-7	5-7	5-7	5	фж
Надія	®	94012003	1998	371 /	П	інт	зерн	се		5	5-7	5-7	5	фж
Одеський 131		89012013	1993	378 /	Л	нінт	зерн	се		5-7	7-9	7-9	5-7	цін
Одеський 151		90012027	1994	378 /	С	нінт	зерн	се		7-9	5-7	7-9	5-7	цін
Оболонь	®	98012021	2001	378 /	ПЛ	інт	зерн	сп		5-7	5-7	7-9	5-7	пв
Пасадена	®	98012009	2003	824 /	ЛП	інт	зерн	се		5-7	7-9	5-7	5-7	пв
Прима Білорусії		88012030	1991	447 /	ЛП	нінт	зерн	се		5	5	5-7	5	пв
Прерія		89012017	1992	378 /	С	нінт	зерн	се		5-7	5-7	5-7	5	цін
Подільян		91012007	1995	306 /	П	нінт	зерн	сп		7-9	5-7	5-7	5	пв
Подільський 14		87012038	1990	306 /	Л	нінт	зерн	сп		5-7	5-7	5-7	5	пв
Персей		00012012	2004	341 /	П	нінт	зерн			5-7	5-7	7-9/5-7		фж
Престиж		92012022	1995	378 /	С	нінт	зерн	се		7-9	5-7	5-7	5-7	цін
Перелом		87012037	1991	25 /	Л	нінт	зерн	се		5-7	5-7	5	5	цін
Пеляс		97012012	2001	946 /	СЛП	інт	зерн	се		5-7	7-9	7-9	5-7	пв
Паллідум 107		90012028	1993	378 /	СЛП	плас	зерн	се		7-9	7-9	7-9	5	цін
Південний	®	98012004	2001	378 /	СЛ	плас	зерн	ср		7-9	7-9	7-9	5-7	пв
Роланд		81012022	1987	876 /	ЛП	інт	зерн	се		5-7	5-7	5-7	5	пв
Рось		90012030	1993	378 /	СЛП	плас	зерн	ср		7-9	5-7	5-7	5	пв
Стяг		94012007	1997	350 /	Л	нінт	зерн	се		5-7	5-7	7-9	5	пв
† Соборний		00012011	2004	341 /	П	нінт	зерн			5-7	5-7	7-9	5-7	фж
Скіф		99012004	2003	306 /	П	нінт	зерн	се		5	5-7	5-7	5	пв

Сорт				Код	Зона	Характеристики								Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєстрації			Заявник / Підтримувач	Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)			
				посухи							полягання	осипання	хвороб	
Сталкер		93012009	1997	378 /	С	нінт	зерн	ср		7-9	7-9	7-9	5-7	фж
Сулган		98012024	2002	1048 /	СЛП	інт	зерн	сє		7-9	7-9	7-9	5-7	пв
Скарлет		98012010	2001	1149 /	СЛП	інт	зерн	сє		7-9	7-9	7-9	5-7	пв
СП-28		96012007	2000	356 /	С	нінт	зерн	сє		7-9	5-7	5-7	5	фж
Тодар		98012003	2001	946 /	ЛП	інт	зерн	сє		5-7	7-9	7-9	5-7	пв
Тюрінгія	ю	96012015	2000	926 /	П	інт	зерн	сє		5	5-7	5-7	5-7	пв
Терен		95012002	1998	306 /	ЛП	нінт	зерн	сє		5-7	5-7	5-7	5	фж
Табора		98012013	2001	1048 /	СЛП	інт	зерн	сє		7-9	7-9	7-9	5-7	пв
Форум		95012006	2000	946 /	СЛП	плас	зерн	сє		5-7	7-9	7-9	5-7	пв
Фенікс		97012005	2000	404 /	С	нінт	зерн	сє		7-9	5-7	7-9	5	фж
Харківський 112		92012025	1996	404 /	Л	нінт	зерн	сє		5-7	5-7	5-7	5	пв
Целінка		97012013	2001	796 /	СЛП	інт	зерн	сє		5-7	7-9	7-9	5-7	пв
Цезар		95012003	1998	341 /	ЛП	інт	зерн	ср		5-7	7-9	7-9	5-7	пв
Чарівний		01012007	2004	378 /	ЛП	нінт	зерн	сє		7-9	7-9	7-9	7-9	пв
Чудовий		99012003	2002	378 /	Л	нінт	зерн	сє		5-7	7-9	7-9	5-7	пв

Кукурудза

- 289

Браво	95004082	1999	806 /	Л	7	зерн	ре (190)	7	5	7		5	
Бастіон МВ	98004122	2001	1040 /	ЛП	7	зерн	ре (180)	5	5	7		7	
Борисфен 191 МВ	96004001	1999	411 /	Л	7	зерн	ре (190)	7	5	7		7	
Гран 220	00004017	2003	736 /	Л	7	зерн	ре (190)	5	5	5		7	
Гомера	01004002	2003	806 /	ЛП	9	зерн	ре (190)	7	7	7		7	
Дніпровський 177 СВ	94004005	1998	311 /	С	5	зерн	ре (170)	5	5	7		7	
Дніпровський 181 СВ	99004018	2002	311 /	П	7	зерн	ре (180)	7	7	7		7	
Дніпровський 145 МВ	92004005	1996	311 /	СП	5	сил	ре (140)	5	5	5		5	
Дніпровський 196 СВ	00004023	2003	311 /	ЛП	7	зерн	ре (190)	7	7	7		7	
Дніпровський 172 МВ	92004007	1996	311 /	С	5	зерн, сил	ре (170)	5	5	5		5	

Сорт				Код	Зона	Характеристики							
Назва	Вид	Номер	Рік реєстрації			Заявник / Підтримувач	Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)		
				посухи	полягання						осипання	хвороб	
Дніпровський 187 МВ		95004011	1998	311 /	СЛ	5	зерн	рс (180)	>5	5	5		7
ЕКСП 178 (ТК 178)		92004043	1995	901 /	Л	5	зерн	рс (170)	5	5	5		7
Ерлі Стар		01004001	2003	806 /	ЛП	9	зерн	рс (150)	7	7	7		7
Ензо		95004080	1999	806 /	ЛП	7	зерн	рс (170)	7	5	7		7
Жеріко		95004081	1999	806 /	ЛП	5	зерн	рс (180)	>5	5	7		5
ЗІТК 196		80004032	1999	936 /	Л	7	зерн	рс (190)	7	5	7		7
Колективний 111 СВ		85004028	1989	334 /	ЛП	7	зерн,сил	рс (110)	7	5	7		7
Катеринин 176 СВ	®	99004022	2002	1028 /	СЛП	7	зерн	рс (180)	>5	7	7		7
Колективний 210 АСВ		81004012	1984	333 /	ЛП	5	зерн,сил	рс (200)	5	5	5		5
Кап Горн		98004077	2001	806 /	СП	9	зерн	рс (150)	>5	7	7		7
Кишкун 4194 СК		97004005	2001	998 /	ЛП	7	зерн	рс (160)	>5	5	7		5
Кадр 195 СВ		98004111	2001	982 /	Л	9	зерн	рс (190)	>5	7	7		7
Колективний 100 СВ		85004027	1988	333 /	СЛП	7	зерн,сил	рс (100)	7	7	7		7
ЛГ 22.44		95004022	1999	793 /	ЛП	7	зерн	рс (180)	7	5	7		7
ЛЗМ 144/08		99004013	2002	793 /	СЛП	9	зерн	рс (150)	7	7	7		7
Луч 170 МВ		90004033	1994	311 /	Л	5	зерно	рс/170/	5-7	5-7	5		5
Молдавський 257 АСВ		81004024	1986	618 /	П	5	зерн	рс (200)	5	5	5		5
Маслівський 208 СВ		97004027	2000	336 /	ЛП	7	зерн	сп (200)	>5	5	5		5
НС 101		98004087	2001	879 /	СЛ	7	зерн	рс (110)	5	5	7		5
Оксана (SZE TC 191)		95004029	1998	937 /	П	7	зерн	рс (160)	7	7	7		7
Петрівський 169 СВ		98004041	2001	1028 /	СЛП	7	зерн,сил	рс (170)	>5	5	5		7
ПРЗ9Г32		02004028	2004	767 /	слп	9	зерно	рс/180/	7-9	8	9		9
Планета 180		95004084	1998	355 /	СЛ	7	зерн,сил	рс (180)	7	7	7		7
Прем'єр МВ		98004097	2002	378 /	Л	7	зерн	рс (180)	>5	5	7		7
ПРЗ9Джі12		00004042	2003	767 /	ЛП	9	зерн	рс (180)	7	7	7		7
Радіус		95004079	1998	806 /	П	7	зерн	рс (150)	>5	5	7		5
Рональдс		02004001	2004	806 /	лп	7-9	зерно	рс/180/	5-7	9	8,9		9

Сорт				Код	Зона	Характеристики								Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач		Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				
										посухи	полягання	осипання	хвороб	
Расава 200 СВ		97004028	2000	1028 /	ЛП	7	зерн	рс (200)	>5	5	5		5	
Сурський 197 МВ		01004027	2004	311 /	сл	7-9	зерно	рс/190/	5-7	8,5	8,8		9	
Славутич 162 СВ		92004025	1995	311 /	С	5	зерн,сил	рс (160)	5	5	5		5	
ТОСС 218 МВ		90004053	1994	345 /	П	5	зерн,сил	рс (200)	5	5	5		5	
Татьяна (N 188)		94004058	1997	901 /	ЛП	7	зерн	рс (180)	7	5	7		7	
ТОСС 156 МВ		92004115	1997	420 /	С	5	зерн	рс (150)	5	5	5		7	
ТОСС 235 М		91004087	1994	420 /	Л	5	зерн,сил	рс (200)	5	5	5		5	
ТК 181		95004066	1999	901 /	Л	5	зерн	рс (180)	5	5	5		5	
Темп		99004049	2002	938 /	ЛП	7	зерн	рс (180)	>5	7	7		7	
Фривол		97004029	2000	806 /	ЛП	5	зерн	рс (190)	5	5	5		5	
Харківський 195 МВ		98004095	2002	404 /	Л	5	зерн	рс (190)	5	5	5		5	
Харківський 199 МВ		94004020	1997	404 /	Л	5	сил	рс (190)	5	5	5		5	
Анатолієвський 246 МВ		98004130	2001	336 /	Л	7	зерн	сп (240)	5	5	5		7	
Ангіллес		97004030	2002	806 /	СЛП	9	зерн	сп (260)	7	7	7		7	
Агро 200 СВ		99004021	2003	1112 /	ЛП	7	зерн	сп (200)	5	5	7		5	
Аталіс (РМ 21)		02004002	2004	806 /	лп	7-9	зерно	сп/230/	5-7	9	9		9	
Асор		98004137	2002	806 /	ЛП	9	зерн	сп (220)	7	7	7		7	
Авангард		00004001	2003	938 /	ЛП	7	зерн	сп (260)	>5	5	5		5	
Авантаж		93004088	1997	901 /	П	7	зерн,сил	сп (260)	5	7	7		5	
Акцент МВ		91004159	1994	378 /	СЛ	5	зерн,сил	сп (300)	5	5	5		5	
Абонданс		00004002	2003	1079 /	ЛП	9	зерн	сп (200)	7	7	7		7	
Ангарес		97004031	2000	1079 /	П	7	зерн	сп(230)	>5	5	7		7	
БМ 281 АСВ		96004016	1999	432 /	Л	7	зерн	сп (280)	>5	5	5		7	
Бемо 210 СВ		93004001	1996	618 /	ЛП	5	зерн,сил	сп (210)	5	5	7		7	
Борисфен 275 АМВ		93004027	1996	311 /	С	5	зерн,сил	сп (270)	5	5	7		5	
БМ 281 СВ		93004011	1996	432 /	СЛ	5	зерн,сил	сп (280)	5	5	5		5	
Бершадь		99004016	2003	841 /	Л	7	зерн	сп (260)	>5	7	7		7	

Сорт				Код	Зона	Характеристики								Якість
Пазва	Вид	Номер	Рік ресет- рації	Заявник / Підтримувач		Проду- ктивність	Напря- м викорис- тання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				
										посухи	поля- гання	осипання	хвороб	
Борнефен 250 МВ		99004031	2003	1070 /	Л	9	зерн	ср (270)	7	7	7		7	
Вектор МВ		92004003	1995	378 /	СЛП	5	зерн.сил	ср (270)	5	5	5		5	
Гран 5		98004110	2001	736 /	Л	5	зерн	ср (260)	5	5	5		7	
Гран 310		00004019	2003	736 /	Л	7	зерн	ср (280)	5	5	5		5	
Геперал		94004077	1999	938 /	П	7	зерн	ср (220)	5	5	7		7	
Гран 1		98004035	2001	736 /	Л	7	зерн.сил	ср (230)	5	5	5		7	
Гран 6		99004026	2002	736 /	Л	7	зерн	ср (260)	>5	5	7		5	
Галіна		95004077	1998	901 /	П	7	сил	ср (250)	>5	5	7		5	
Гайгі		98004135	2002	806 /	ЛП	9	зерн	ср (210)	>5	7	7		7	
Дніпровський 228 МВ		93004014	1996	340 /	С	5	зерн	ср (220)	5	5	5		5	
Діамант		91004136	1995	938 /	П	5	сил	ср (210)	5	5	5		5	
Дніпровський 298		85004013	1993	311 /	С	5	зерн	ср (290)	5	5	5		5	
Дніпровський 223 СБ		99004019	2002	311 /	Л	7	зерн	ср (220)	>5	5	7		7	
Дніпровський 293 МВ		99004020	2002	311 /	Л	7	зерн	ср (290)	>5	5	7		5	
Десна СБ		98004018	2002	841 /	Л	7	зерн	ср (280)	>5	5	7		7	
Домінго		91004137	1996	938 /	Л	5	зерн	ср (280)	5	5	7		5	
Дніпровський 193 МВ		93004013	1996	311 /	С	5	зерн	ср (200)	5	5	5		5	
Джерба		98004078	2002	806 /	П	7	зерн	ср (200)	>5	5	7		7	
Дніпровський 284 МВ		89004026	1992	311 /	СЛ	5	зерн.сил	ср (280)	5	5	5		7	
Дніпровський 273 АМВ		85004014	1988	311 /	СЛ	5	зерн.сил	ср (270)	7	5	7		5	
Еліга		98004007	2000	767 /	ЛП	9	зерн	ср (270)	7	7	7		7	
Елегія МВ		00004038	2003	378 /	ЛП	7	зерн	ср (240)	>5	7	7		7	
Еден Стар		00004044	2003	806 /	ЛП	9	зерн	ср (220)	7	7	7		7	
Свростар		98004138	2001	806 /	СП	7	зерн	ср (210)	7	7	7		7	
Закарпатський 101 М		84004035	1988	323 /	П	5	зерн.сил	ср (200)	5	5	5		5	
ЗІГК 256		88004044	1996	936 /	С	5	зерн	ср (250)	5	5	7		7	
ЗІГК 209		86004025	1999	936 /	П	7	сил	ср (200)	7	7	5		7	

Сорт				Код	Зона	Характеристики								Якість
Назва	Вид	Номер	Рік ресет- рації			Заявник / Підтримувач	Проду- ктивність	Напрям викорис- тання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)			
				посухи	поля- гання						осинапня	хвороб		
Імпауга		98004076	2001	806 /	С	7	зерн	ср (210)	>5	5	7		7	
Імпакт (КХ 2105)		93004133	1996	938 /	Л	7	сил	ср (210)	>5	5	7		7	
Капітол (КХ 3345)		94004105	1999	938 /	П	7	зерн	ср (240)	5	5	7		7	
Кулон МВ		88004069	1991	378 /	СЛП	5	зерн,сил	ср (200)	5	5	5		5	
Кадр 257 С'В		98004114	2002	982 /	ЛП	7	зерн	ср (250)	>5	5	7		5	
Кий 250 С'В		98004042	2001	1028 /	П	7	зерн,сил	ср (250)	>5	5	7		7	
Консул		91004135	1994	938 /	П	7	зерн	ср (240)	7	5	7		5	
Колективний 225 МВ		86004037	1990	420 /	ЛП	5	зерн,сил	ср (220)	5	5	5		5	
КХ 1362		00004035	2004	938 /	ли	7-9	зерно	ср/220/	7-9	8,8	8,8		9	
Кадр 217 МВ		98004113	2002	982 /	Л	9	зерн	ср (220)	7	7	7		7	
Київський 271 М		90004025	1993	355 /	ЛП	5	зерн,сил	ср (270)	5	5	5		7	
Король		99004050	2003	938 /	ЛП	7	зерн	ср (280)	>5	5	5		7	
Кишкун 190		91004057	1994	998 /	С	7	зерн	ср (200)	5	5	7		7	
Кишкун 240 А		91004056	1994	998 /	С	7	зерн	ср (240)	5	5	7		5	
Корсар МВ		91004160	1995	378 /	С	5	зерн	рс /190/	5	5	5		5	
Креміль 200 С'В		00004026	2003	311 /	ЛП	7	зерн	ср (210)	>5	7	7		7	
Кадр 267 МВ		98004024	2001	982 /	Л	7	зерн,сил	ср (260)	>5	5	7		7	
Кросс 293 МВ		96004009	1999	340 /	С	5	зерн	ср (290)	5	5	7		5	
Кишкун 297		91004058	1994	998 /	С	5	зерн	ср (290)	5	5	7		7	
Ліберо		91004064	1994	901 /	С	5	зерн	ср (240)	5	5	5		5	
ЛП' 23.10		93004033	1996	793 /	С	7	зерн	ср (270)	7	7	7		7	
ЛП' 22.66		93004031	1997	793 /	П	7	зерн	ср (260)	7	5	7		7	
Луганський 222 МВ		95004010	1998	309 /	С	7	зерн	ср (220)	>5	5	5		7	
Луганський 287 МВ		94004009	1997	309 /	СЛ	5	сил	ср (280)	5	5	5		5	
ЛЗМ 343/09		99004012	2002	793 /	СЛ	7	зерн	ср (280)	>5	5	7		7	
ЛП 2306		01004044	2004	793 /	сил	7-9	зерно	ср	5-7	8,5	9		9	
ЛП 22.08		93004030	1997	793 /	П	7	зерн	ср (240)	7	5	7		7	

Сорт				Код	Зона	Характеристики								Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач		Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				
										посухи	полягання	осинання	хвороб	
Maie 226 MB		01004006	2004	962 /	СЛП	7-9	зерно	ср	5-7	8,3	9	-	9	
Marigster		93004140	2004	1079 /	лп	7-9	зерно	ср/220/	7-9	9	9		9	
Меркуріус		93004089	1997	901 /	П	7	зерн.сил	ср (270)	>5	5	7		7	
МС 300 MB		92004017	1996	355 /	С	5	сил	ср (300)	5	5	7		7	
Марк		94004062	1997	901 /	П	5	зерн	ср (240)	5	5	7		7	
Монументал		99004004	2001	777 /	СП	7	зерн	ср (280)	7	7	7		7	
Марінья		96004029	2000	1079 /	Л	7	зерн	ср (240)	5	5	5		5	
Міф 227 MB		01004033	2004	311 /	сл	7	зерно	ср/220/	5-7	8,8	9		9	
Наутилус		00004016	2003	350 /	ЛП	7	зерн	ср (290)	>5	7	7		7	
Нептун СВ		96004002	1999	355 /	СЛП	5	зерн.сил	ср (280)	5	5	7		5	
НХ 1480		02004003	2004	1079 /	лп	7-9	зерно	ср/250/	7-9	9	8,7		9	
Оленин 240 СВ	®	99004015	2003	336 /	ЛП	7	зерн	ср (240)	>5	7	7		7	
ОДЛ-І		99004045	2003	1083 /	Л	7	зерн	ср (240)	>5	7	7		7	
Одеський 297 MB		88004080	1996	378 /	С	5	зерн	ср (290)	5	5	5		5	
Олдхем		02004004	2004	1079 /	лп	7-9	зерно	ср/270/	7-9	9	9		9	
Порумбень 295 АСВ		93004002	1996	612 /	СЛП	5	зерн.сил	ср (290)	5	7	7		7	
ПР39Ф55 (Синонім: Баккара)		98004064	2001	767 /	Л	9	зерн	ср (230)	7	7	7		7	
Порумбень 274 MB		95004007	1999	612 /	П	7	сил	ср (270)	>5	5	5		7	
ПР39Д81		98004102	2001	767 /	П	9	зерн	ср (260)	7	7	7		7	
Порумбень 212 СВ		98004045	2001	612 /	С	7	зерн	ср (210)	5	5	5		5	
Піонер-Гран 3978		98004107	2001	736 /	Л	5	зерн	ср (260)	5	5	7		7	
Росс 209 СВ		88004092	1992	25 /	С	5	зерн.сил	ср (200)	5	5	7		7	
Росс 207 СВ		86004073	1991	25 /	С	5	зерн.сил	ср (200)	5	5	5		7	
Славутич 224 СВ		92004027	1996	311 /	СП	5	зерн.сил	ср (220)	5	5	5		5	
Славутич 214 СВ		93004022	1996	311 /	С	5	зерн	ср (210)	5	5	7		5	
Сатурн		94004014	1997	355 /	СЛП	5	зерн.сил	ср (240)	5	5	5		5	

Сорт				Код	Зона	Характеристики								Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач		Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				
										посухи	полягання	осипання	хвороб	
Славутич 271 МВ		95004016	1999	340 /	С	5	зерн	ср (270)	>5	5	7		7	
Санторен		98004136	2002	806 /	ЛП	9	зерн	ср (200)	7	7	7		7	
Сидорів 251 МВ		00004040	2003	336 /	Л	7	зерн	ср (250)	5	5	7		7	
Сандріна		00004043	2003	767 /	Л	9	зерн	ср (220)	9	7	7		7	
Славутич 230 СВ		92004028	1996	340 /	С	5	зерн	ср (230)	5	5	5		5	
ТОСС 231 МВ		92004116	1996	345 /	С	7	сил	ср (230)	7	5	7		5	
Тріумф		98004055	2001	938 /	П	7	зерн,сил	ср (220)	>5	5	5		5	
Теофанів 295 СВ		01004047	2004	1028 /	сш	5-7	зерно	ср/290/	7	8	8,5		9	
Тясьмин МВ		97004018	2001	355 /	Л	7	зерн,сил	ср (250)	7	5	7		7	
Титан 220 СВ		97004019	2000	355 /	СЛП	7	зерн	ср (220)	7	7	7		7	
Трістан		97004035	2000	938 /	П	7	зерн	ср (210)	>5	5	7		7	
Тітус		94004054	1997	806 /	Л	7	зерн	ср (250)	7	7	7		7	
ТОСС 230 МВ		93004005	1995	121 /	СЛ	7	сил	ср (230)	5	5	7		7	
Ферро		91004152	1993	938 /	Л	5	зерн	ср (220)	5	5	5		5	
Флавіус		95004083	1998	806 /	Л	7	зерн	ср (210)	>5	5	5		7	
Харківський 291 МВ		99004036	2003	404 /	Л	7	зерн	ср (290)	>5	5	5		7	
Харківський 294 МВ		96004017	1999	404 /	П	5	сил	ср (290)	5	5	5		5	
Харківський 250 МВ		94004021	1999	404 /	П	5	сил	ср (250)	5	5	5		5	
Харківський 290 МВ		91004090	1997	404 /	ЛП	5	сил	ср (290)	5	5	5		5	
Харківський 295 МВ		98004051	2001	404 /	Л	5	зерн,сил	ср (290)	5	5	5		7	
Хельга		91004035	1996	767 /	Л	7	зерн	ср (300)	7	7	7		7	
Цеміла 250 (ЦЕ 2789)		92004128	1997	946 /	П	5	зерн	ср (250)	5	5	5		5	
Челленджер		93004066	1997	777 /	П	7	зерн	ср (250)	7	7	7		7	
Ювілейний 70 М		90004060	1993	355 /	СЛП	7	зерн,сил	ср (260)	7	5	7		7	
Ювілейний 60 МВ		84004105	1985	420 /	ЛП	5	зерн,сил	ср (250)	5	5	5		5	
Альфа		95004027	1999	1079 /	С	7	зерн	сс (380)	7	7	7		7	
Борисфен 380 МВ		98004040	2001	411 /	Л	7	зерн,сил	сс (380)	>5	5	7		5	

Сорт				Код	Зона	Характеристики								Якість
Назва	Вид	Номер	Рік ресет- рації	Заявник / Підтримувач		Проду- ктивність	Напря- м викорис- тання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				
										посухи	поля- гання	осипання	хвороб	
Борнефен 301 МВ		94004003	1997	411 /	С	7	зерн	сс (300)	5	5	7		7	
Веселка МВ		00004039	2003	378 /	Л	7	зерн	сс (340)	>5	5	7		7	
ДК 391		02004007	2004	777 /	Л	9	зерно	сс/350/	7-9	8,6	9		9	
Дніпровський 345 МВ		93004016	1996	312 /	С	5	зерн.сил	сс (340)	5	5	5		7	
Дніпровський 387 ВЛ		90004014	1994	311 /	С	5	зерн	сс (380)	5	5	5		7	
Дніпровський 325 МВ		93004015	1996	311 /	С	7	зерн	сс (320)	7	5	7		5	
Діброва МВ		01004035	2004	1040 /	Л.сзрощ	5-7	зерно	сс/340/	7-9	9	9		9	
Дніпровський 358 МВ		94004007	1997	311 /	СЛ	5	зерн	сс (350)	5	5	5		5	
Дніпровський 310 МВ		82004026	1987	311 /	СЛ	5	зерн.сил	сс (310)	5	5	7		5	
ДК 443		97004037	2000	766 /	СЛ	9	зерн	сс (380)	7	7	7		7	
Дар 347 МВ		00004025	2003	311 /	ЛСзр	9	зерн	сс (340)	7	7	7		7	
Дніпровський 337 МВ		96004008	1999	1040 /	СЛ	5	зерн.сил	сс (330)	>5	5	5		5	
Дніпровський 303 МВ		99004055	2002	311 /	Л	7	зерн	сс (300)	>5	5	5		5	
Дніпровський 309 МВ		98004098	2002	340 /	С	7	зерн	сс (300)	>5	7	7		5	
ДК 440		99004007	2003	777 /	Сзр,Л	9	зерн	сс (350)	7	7	7		7	
Долар		92004139	1995	1079 /	СЛ	7	зерн	сс (390)	7	7	7		7	
СВРО 301 МВ	ж	99004028	2003	962 /	Л	9	зерн	сс (300)	>5	7	7		7	
ЗІСК 330		88004020	2001	936 /	С	5	зерн	сс (330)	5	5	7		7	
ЗІСК 434		99004017	2002	936 /	С	7	зерн	сс (400)	7	5	7		7	
ЗІ 341		02004006	2004	936 /	сзрощ,Л	7-9	зерно	сс/340/	7-9	8,5	8,5		9	
Закарпатський 381 МВ		91004050	1995	323 /	ЛП	5	сил	сс (380)	5	5	7		5	
Кросс 292 МВ		93004028	1996	311 /	С	5	зерн	сс (300)	5	5	7		7	
Краснодарський 321 СВ		90004029	1994	25 /	С	5	зерн	сс (320)	5	5	5		7	
Краснодарський 335 МВ		83004026	1988	25 /	П	5	зерн.сил	сс/330/	5	5	5		5	
Кадр 327 МВ		97004009	2001	982 /	Л	7	зерн.сил	сс (330)	>5	5	7		5	
Кросс 390 МВ		90004032	1994	311 /	Л	5	зерн.сил	сс (340)	5	5	5		5	
Кадр 328 МВ		98004028	2001	982 /	Л	7	зерн	сс (330)	>5	5	5		5	

Сорт				Код	Зона	Характеристики								
Назва	Вид	Номер	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач		Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
										посухи	полягання	осипання	хвороб	
Кадр 318 МВ		98004027	2001	982 /	С	7	зерн	сс (310)	>5	5	5		7	
Каліс		96004045	2000	806 /	С	5	зерн	сс (340)	>5	5	5		5	
Кларіка		98004003	2000	767 /	СЛ	7	зерн	сс (340)	>5	5	7		7	
Комета МВ		99004023	2002	355 /	СЛ	9	зерн	сс (300)	9	7	7		7	
Лебідь МВ		96004019	2000	378 /	С	5	зерн	сс (340)	5	5	7		5	
Моналіза		98004009	2000	767 /	СЛ	9	зерн	сс (340)	7	7	7		7	
Майс 350 МВ		01004007	2004	962 /	сл	7	зерно	сс/350/	5-7	8,5	9		9	
МВ 355		91004023	1994	720 /	Л	7	зерн	сс (350)	7	7	7		7	
Молдавський 291 АМВ		84004074	1988	612 /	Л	5	зерн,сил	сс (300)	5	5	5		5	
НС 300		97004038	2000	879 /	С	7	зерн	сс (300)	7	7	7		7	
НС 400		98004086	2001	879 /	С	9	зерн	сс (400)	>5	5	5		7	
Одеський 360 МВ		98004103	2002	378 /	С	7	зерн	сс (350)	>5	5	7		7	
Одеський 375 МВ		99004053	2002	378 /	СЛ	7	зерн	сс (380)	>5	5	5		7	
ОдМа 310 М		84004085	1987	720 /	СЛ	7	зерн,сил	сс (350)	7	7	7		7	
Одеський 385 МВ		98004037	2001	378 /	С	7	зерн	сс (380)	>5	5	5		7	
ОдМа 338 МВ		90004045	1994	378 /	Л	7	зерн,сил	сс (330)	5	5	7		7	
Одеський 346 МВ		92004019	1995	378 /	С	5	зерн	сс (360)	5	5	5		5	
Океїган		02004027	2003	1079 /	сл	9	зерно	сс/340/	7-9	8	9		9	
Олісей 324 МВ		01004039	2004	378 /	с	7	зерно	сс/320/	7-9	8,1	9		9	
Порумбень 359 МВ		96004020	2000	612 /	С	5	зерн	сс (350)	5	5	7		5	
Платан МВ		94004013	1997	378 /	С	7	зерн	сс (340)	7	5	7		5	
Порумбень 351 МВ		95004006	1999	612 /	СЛ	7	зерн	сс (340)	7	5	7		7	
Пріз		98004133	2002	938 /	Л	7	зерн	сс (400)	>5	5	7		7	
Пелікан		95004008	1999	1079 /	Л	7	зерн	сс (310)	>5	7	7		7	
Порумбень 458 СВ		98004131	2002	612 /	С	7	зерн	сс (400)	5	7	7		7	
ПР38Д89 (Синонім: Анаста)		98004072	2001	767 /	Л	9	зерн	сс (330)	7	7	7		7	

Сорт				Код	Зона	Характеристики								Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач		Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				
										посухи	полягання	осипання	хвороб	
ПР39К38 (Синонім: Валота)		98004069	2001	767 /	Л	9	зерн	сс (300)	7	7	7	7		
Песо		98004061	2001	1079 /	СЛ	7	зерн, сил	сс (320)	>5	5	7	7		
Порумбень 372 МВ		98004132	2002	612 /	С	7	зерн	сс (370)	5	5	5	7		
Росс 331 МВ		85004058	1989	25 /	С	5	зерн, сил	сс (330)	5	5	5	7		
Селест		02004005	2004	1079 /	сл	9	зерно	сс /330/	7-9	8,5	9	9		
СВС 9555		91004091	1994	901 /	Л	7	зерн	сс (380)	7	5	7	7		
Січеславський 335 МВ		01004032	2004	311 /	сл		зерно	сс/330/	7	8,5	9,0	9,0		
СД 395 МВ		99004034	2002	1111 /	С	7	зерн	сс (390)	>5	5	5	7		
Січеславський 335 МВ		01004032	2004	311 /	сл		зерно	сс/330/	7	8,5	9,0	9,0		
Сервіа		95004042	1999	713 /	С	5	зерн	сс (370)	>5	5	7	7		
Стіра		94004102	1999	767 /	СЛ	5	зерн	сп (420)	5	5	7	5		
Харківський 311 МВ		93004029	1996	404 /	С	5	зерн	сс (310)	5	5	7	5		
Харківський 325 МВ		98004093	2002	404 /	Л	5	зерн	сс (330)	5	5	7	5		
Харківський 329 МВ		99004038	2003	404 /	Л	7	зерн	сс (320)	>5	5	5	7		
Харківський 315 МВ		97004021	2000	404 /	С	5	зерн	сс (320)	5	5	5	5		
Харківський 340 МВ		99004039	2002	404 /	Л	7	зерн	сс (340)	5	5	7	7		
Борисфен 430 АМВ		89004005	1993	411 /	С	5	зерн	сп (430)	5	5	5	5		
Борисфен 433 МВ		92004001	1995	311 /	С	5	зерн	сп (430)	7	5	5	5		
Борисфен 490 АМВ		92004002	1995	311 /	С		зерн	сп (490)	5	5	5	5		
Дніпровський 425 МВ		92004008	1996	311 /	С	5	зерн	сп (420)	5	5	5	5		
Дніпровський 453 СВ		00004024	2003	311 /	Сзр	7	зерн	сп (450)	7	7	7	7		
Дніпровський 476 МВ		92004009	1995	311 /	С	5	зерн	сп (470)	5	5	5	5		
Дніпровський 473 СВ		96004011	2000	1040 /	С	7	зерн	сп (470)	>5	5	7	5		
ДнОд 417 МВ		90004015	1994	378 /	СП	5	зерн, сил	сп (420)	7	5	5	5		
ДК 471		94004090	1997	766 /	С	7	зерн	сп (430)	7	7	7	7		
ЄВРО 401 СВ		99004029	2003	962 /	С	9	зерн	сп (400)	7	7	7	7		

Сорт				Код	Зона	Характеристики								Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач		Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				
										посухи	полягання	осипання	хвороб	
ЗПТК 404		93004124	2001	936 /	С	7	зерн	сп (400)	7	7	7		7	
Закарпатська жовта зубовидна		49004001	1951	996 /	П	5	зерн, сил	сп (400)	5	5	7		5	
Кадр 447 МВ		96004014	1999	982 /	С	5	зерн	сп (440)	>5	5	7		7	
Кадр 443 СВ		98004116	2001	982 /	С	7	зерн	сп (420)	5	5	5		5	
Кавказ 484 МВ		90004022	1994	25 /	СП	5	зерн	сп (480)	5	5	5		7	
Кадр 397		96004015	2000	982 /	С	7	зерн	сп (400)	5	5	5		5	
Кадр 427		98004029	2001	982 /	С	7	зерн	сп (420)	5	5	5		5	
Луч 471 МВ		88004072	1996	414 /	С	5	зерн	сп (470)	5	5	5		5	
Маїс 400 МВ		01004008	2004	962 /	с/зрош/	7-9	зерно	сп/400/	5-7		9		9	
НС 444		93004120	1997	879 /	С	7	сил	сп (440)	7	>5	7		7	
Одеський 480 МВ		97004023	2001	378 /	С	5	зерн	сп (480)	5	5	5		5	
Південь 480 СВ		92004020	1996	411 /	ЛП	5	сил	сп (480)	5	5	5		5	
ПР38А24		00004041	2003	767 /	Сзр	9	зерн	сп (400)	7	7	7		7	
СЕ 6580		98004079	2001	713 /	С	7	зерн	сп (470)	>5	5	7		5	
Соколов 407 МВ		01004031	2004	311 /	сзрош	7	зерно	сп/400/	9	9.0	9		9	
Фуріо		91004126	1993	1079 /	С	7	зерн	сп (450)	7	5	7		7	
Борисфен 600 СВ		99004032	2003	311 /	Сзр	9	зерн	пс (550)	7	7	7		7	
ЗПСК 704		95004048	1999	936 /	С	7	зерн	пс (600)	>5	5	7		7	
Леоніс		02004009	2004	806 /	с	7-9	зерно	пс/520/	7-9	8,5	9		9	
Луч 630 МВ		89004049	1993	358 /	С	5	зерн, сил	пс (560)	5	5	5		5	
Машук АМВ		92004016	1995	57 /	С	5	зерн	пс (550)	5	5	5		5	
Надніпрянська 50		78004038	1982	411 /	С	5	зерн, сил	пс (570)	5	5	5		5	
НС 420		93004043	1997	879 /	С	7	зерн	пс (600)	7	5	7		7	
НС 640		93004045	1997	879 /	С	7	зерн	пс (600)	7	7	7		7	
Одеська 10		53004001	1955	378 /	С	7	зерн, сил	пс (500)	7	7	7		7	
Перекоп СВ		85004057	1990	411 /	С	7	зерн	пс (600)	7	7	7		7	

Сорт				Код	Зона	Характеристики							
Назва	Вид	Номер	Рік реєстрації			Заявник / Підтримувач	Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)		
				посухи	полягання						осипання	хвороб	

Сільськогосподарські: бобові

Горох

- 59

Ароніс	98001001	2003	1082 /	СЛП	нінт	зерн	се			7-9	5-7	5-7	5-7	фж
Аграрій	87001002	1995	304 /	ЛП	нінт	зерн	се			5-7	5	5-7	5	цін
Акціонер	90001013	1994	304 /	СЛП	нінт	зерн	се			5-7	5	5	5	фж
Богатир чеський	81001011	1987	880 /	СЛП	інт	зерн	се			7-9	7-9	5-7	5	цін
Батан	99001001	2003	404 /	Л	інтн	зерн	се			5-7	5-7	5-7	5-7	цін
Беркут	94001001	1999	520 /	С	нінт	зерн	се			7-9	7-9	5-7	5-7	фж
Вішнічанін	92001013	1998	304 /	Л	інт	зерн	се			5-7	5-7	5-7	5-7	фж
Вінець	00001002	2004	309 /	СЛП	нінт	зерн	сп			5	5	5-7	5-7	фж
Грап	94001004	1998	304 /	СЛ	нінт	зерн	сп			5-7	5-7	5-7	5	фж
Дамир 3	97001004	2000	1182 /	Л	нінт	зерн	сп			5-7	7-9	5-7	5	фж
Дамир 2	97001003	2000	1184 /	СЛ	інтн	зерн	сп			7-9	7-9	7-9	5-7	фж
Дамир 1	97001002	2000	1047 /	С	інтн	зерн	се			7-9	7-9	5-7	5-7	фж
Дамир 4	97001005	2000	1047 /	Л	нінт	зерн	сп			5-7	5-7	5-7	5	фж
Елегант	98001002	2002	305 /	Л	нінт	зерн	ре			5-7	5	5-7	5-7	фж
Зекон	79001006	2000	880 /	СЛП	7-9	зерн	се			7-9	7-9	5-7	5-7	цін
Інтенсивний 92	92001006	1996	404 /	СЛП	інт	зерн	се			7-9	5	5	5	цін
Інтенсивний 97	97001006	2001	404 /	ЛП	інт	зерн	се			5-7	5-7	5-7	5	фж
Красноградський 8	92001003	1996	399 /	П	нінт	зерн	се			5	5	5-7	5	фж
Комет	95001002	1999	946 /	СЛП	нінт	зерн	сп			7-9	7-9	5-7	5-7	фж
Комбайновий 1	99001003	2003	1121 /	Л	нінт	цін	се			5-7	5-7	5-7	5-7	цін
Луганський	99001002	2003	309 /	СЛ	нінт	зерн	сп			7-9	5-7	5-7	5-7	фж
Любінський короткостеблевий	90001003	1994	304 /	СЛП	інт	зерн	се			7-9	7-9	5-7	5-7	цін
Лото	81001008	1997	796 /	Л	інт	зерн	се			5-7	7-9	5-7	5-7	фж

Сорт				Код	Зона	Характеристики								
Назва	Вид	Номер	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач		Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
										посухи	полягання	осипання	хвороб	
Лазер		98001006	2001	912 /	Л	нінт	зерн	се		5-7	5-7	5-7	5	фж
Менгір		95001003	2000	946 /	СПП	інт	зерн	ре		7-9	7-9	5-7	5-7	фж
Мадонна		00001004	2003	912 /	СПП	інт	зерн	ер		7-9	7-9	7-9	5-7	ціп
Модус		01001003	2004	404 /	Л	нінт	зерн	се		5-7	7-9	5-7	5-7	фж
Надійний		90001005	1995	309 /	СПП	нінт	зерн	се		7-9	5	5-7	5	ціп
Норд		88001009	1993	201 /	СПП	нінт	зерн	се		7-9	7-9	5-7	5	ціп
Напарник		88001001	1993	309 /	С	нінт	зерн	се		5-7	5	5-7	5	фж
Неосипаючий 1		74001010	1978	309 /	СПП	нінт	зерн	се		5-7	5	5-7	5	ціп
Орловчанин		87001004	1991	201 /	СПП	нінт	зерн	се		5-7	5	5	5	фж
Орендатор		89001001	1993	304 /	СПП	нінт	зерн	се		5-7	5	5-7	5	ціп
Плутоп		96001003	2004	1153 /	СП	інт	зерн	ер		5-7	7-9	7-9	5-7	фж
Полтавець 2		94001003	1999	952 /	Л	нінт	зерн	се		5-7	5-7	5-7	5	фж
Рапорт		81001010	1984	304 /	СП	нінт	зерн	се		5-7	5	5	5	фж
Схід		98001005	2001	520 /	ДС	нінт	зерн	се		7-9	5-7	5-7	5-7	фж
Собел		92001009	1996	724 /	С	інтн	ціп	ер		5-7	7-9	5-7	5	ціп
Світазь		94001005	1998	304 /	Л	нінт	зерн	ер		5-7	5	5-7	5	фж
Таловець 60		88001005	1993	89 /	СПП	нінт	зерн	се		5-7	5	5	5	ціп
Топаз		77001007	1981	378 /	СП	ціп	зерн	се		5-7	5	5	5	ціп
Топаз 2		90001016	1995	378 /	С	нінт	зерн	се		7-9	5-7	5-7	5	ціп
Таловець 50		87001001	1992	89 /	П	нінт	зерн	се		5	5	5	5	ціп
Труженник		80001003	1984	309 /	СПП	нінт	зерн	се		5-7	5	5	5	ціп
Уладівський пачівкарлик		92001014	1997	304 /	Л	інт	ціп	ер		5-7	7-9	7-9	5-7	ціп
Уладівський ювілейний		67001004	1972	304 /	СПП	нінт	зерн	се		5-7	5	5	5	фж
Уладівський 10		74001015	1979	304 /	СП	нінт	зерн	се		5-7	5	5	5	фж
Універ		96001004	2004	1153 /	СП	плас	зерн	ер		7-9	7-9	7-9	7-9	фж
Харківський 302		94001006	1998	404 /	СП	нінт	зерн	ер		7-9	5	7-9	5	фж
Харківський янтарний		94001007	1998	404 /	С	нінт	зерн	ре		7-9	5-7	5-7	5	фж

Сорт				Код	Зона	Характеристики								
Назва	Вид	Номер	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач		Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
										посухи	полягання	осипання	хвороб	
Харлі		00001003	2004	912 /	СЛП	плас	зерн	еп		5-7	5-7	5-7	5-7	фж
Харківський еталонний		97001008	2002	404 /	С	інт	зерн	ер		7-9	7-9	5-7	5-7	фж
Харківський 317		96001001	2000	404 /	СЛ	нінт	зерн	еп		7-9	5	5-7	5	фж
Харківський 376		97001007	2001	404 /	П	нінт	зерн	ее		5	5	5-7	5	фж
Харківський 29		88001014	1993	404 /	Л	нінт	зерн	ее		5-7	5	5	5	цін
Харків'янин		00001001	2003	404 /	СЛ	нінт	зерн	ее		7-9	5	5-7	5-7	цін
Харківський 320		95001001	2001	404 /	СЛ	нінт	зерн	ее		7-9	5	5-7	5-7	фж
Харківський 85		84001001	1989	404 /	Л	нінт	зерн	ее		5-7	5	5	5	фж
Сочевія - 6														
Дніпровська 3		57089001	1969	311 /	СЛП	нінт	зерн	ее		7-9	7-9	7-9	5-7	цін
Красноградська 100		00089001	2002	399 /	Л	нінт	зерн	ее		5-7	5-7	7-9	5-7	фж
Красноградська 49		91089001	1996	399 /	Л	нінт	зерн	ее		5-7	5-7	5-7	5-7	цін
Красноградська 250		84089002	1988	399 /	СЛ	нінт	зерн	ее		7-9	5-7	5-7	5-7	цін
Луганчанка		89089001	1997	520 /	СЛ	нінт	зерн	ее		7-9	5-7	5-7	5-7	цін
Світланок		01089001	2002	520 /	С		зерн	ее						
Нут - 15														
Александрит		97088001	2001	378 /	С	нінт	зерн	ее		7-9	7-9	7-9	5-7	цін
Аптей		01088001	2004	378 /	С	нінт	зерн	ее		7-9	7-9	7-9	7-9	цін
Волгоградський 10		85088002	1991	76 /	С	усуп	зерн	ее		7-9	5-7	5-7	5-7	цін
Дніпровський високорослий		60088001	1966	311 /	С	нін	зерн	ее		7-9	5-7	5-7	5-7	цін
Добробут		01088002	2003	309 /	СЛ	нінт	зерн	ер		7-9	7-9	7-9	5-7	цін
Краснокутський 123		77088001	1988	222 /	С	нінт	зерн	ее		7-9	7-9	5-7	5-7	фж
Красноградський 213		55088001	1962	399 /	С	нінт	зерн	ее		7-9	5-7	5-7	5-7	цін
Колорит		97088003	2000	309 /	СЛ	нінт	зерн	ее		7-9	7-9	7-9	5-7	фж
Луганець		90088001	1994	309 /	С		зерн	ее		7-9	7-9	7-9	5-7	цін

Сорт				Код	Зона	Характеристики								
Назва	Вид	Номер	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач		Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
										посухи	полягання	осипання	хвороб	
Орнамент		94088001	2002	309 /	С	нінт	зерн	се		7-9	5-7	5-7	5-7	фж
Пам'ять		99088001	2002	378 /	С	нінт	зерн	се		7-9	7-9	7-9	5-7	фж
Слобожанський		02088001	2004	399 /	С	нінт	зерн	се		7-9	7-9	7-9	7-9	фж
Смачний		94088002	1999	309 /	С	інтн	зерн	се		7-9	5-7	7-9	5-7	цін
Ціна		-	5											
Красноградська 6		90090001	1995	399 /	СЛ	нінт	зерн	се		7-9	5-7	5-7	5-7	
Красноградська 7		94090001	1999	399 /	СЛ	нінт	зерн	се		7-9	5-7	7-9	5-7	
Красноградська 4		79090001	1986	399 /	ЛП	нінт	зк	се		5-7	5-7	5-7	5-7	
Красноградська 5		85090001	1990	399 /	С	нінт	зерн	се		7-9	5-7	5-7	5-7	
Красноградська 8		99090001	2001	399 /	Л	нінт	зерн	се		5-7	5-7	5-7	5-7	
Квасоля звичайна		-	14											
Алуна		84087001	1988	618 /	П	нінт	зерн	се						цін
Бельська 16		85087006	1990	618 /	П		зерн	се		5	5	5-7	5	цін
Докучаська		94087004	2000	405 /	СЛ	інт	зерн	се		7-9	5-7	5-7	5-7	цін
Красноградська 5		75087002	1981	399 /	СЛ	нінт	зерн	се		5-7	5	5	5	цін
Красноградська кушова		00087001	2002	399 /	Л	нінт	зерн	се		5-7	5-7	5-7	5	фж
Мотольська біла		66087001	1972	453 /	ЛП	нінт	зерн	се		5	5	5	5	фж
Мавка		98087004	2001	345 /	ЛП	інтн	зерн	се		5-7	5-7	5-7	5-7	цін
Надія		99087001	2001	432 /	Л	нінт	зерн	се		5-7	5-7	5-7	5	цін
Подільська кушова		83087003	1990	418 /	Л	нінт	зерн	пе		5-7	5	5	5	цін
Первомайська		89087001	1994	406 /	ЛП	інтн	зерн	се		5-7	5-7	5-7	5-7	цін
Синельниківська 8		80087002	1982	311 /	СЛ	нінт	зерн	се		5-7	5	5	5	цін
Синельниківська 6		81087005	1985	311 /	СЛ	нінт	зерн	се		5-7	5	5	5	цін
Харківська штамбова		86087002	1989	406 /	СЛ	інтн	зерн	се		7-9	5-7	5-7	5	цін
Ювілейна 250		85087004	1989	399 /	СП	нінт	зерн	се		7-9	5	5	5	цін

Сорт				Код	Зона	Характеристики							
Пазва	Вид	Номер	Рік реєстрації			Заявник / Підтримувач	Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)		
				посухи	полягання						осипання	хвороб	

Сільськогосподарські: круп'яні

Гречка

- 20

Астра	78002001	1983	345 /	Л	7	зерн	се	5	5	7	5	5	цін
Аеліта	72002001	1978	417 /	П	5	зерн	се	5	5	5	5	5	цін
Антарія	99002001	2002	1117 /	СЛП	7	зерн	ер	7	7	7	7	5	х
Вікторія	64002001	1969	371 /	ЛП	5	зерн	еп	5	5	5	5	5	х
Глорія	67002001	1973	371 /	С	5	зерн	еп	5	5	5	5	5	х
Зеленоквіткова 90	90002002	1995	417 /	П	5	зерн	се	5	5	5	5	5	х
Іванна	92002001	1997	392 /	С	7	зерн	се	7	7	7	7	5	цін
Кара-Дай	91002001	1996	417 /	С	5	цін	се	5	5	5	5	5	цін
Київська	75002002	1980	345 /	СЛ	5	зерн	се	5	7	7	5	5	цін
Лілея	83002003	1987	345 /	ЛП	5	зерн	ер	5	5	7	7	5	цін
Любава	89002003	1993	417 /	СЛП	7	зерн	се	7	5	7	7	5	цін
Лада	73002004	1979	371 /	ЛП	5	зерн	се	5	5	5	5	5	х
Майська	67002002	1978	291 /	Л	5	зерн	ер	5	5	7	7	5	цін
Роксолана	94002004	2000	417 /	П	7	зерн	ер	7	7	7	7	5	х
Сумчанка	80002003	1985	392 /	СЛ		зерн	ре	5	5	7	7	5	цін
Скороспела 86	85002001	1990	201 /	С	5	зерн	ре	5	7	7	7	5	цін
Слобожанка	00002002	2004	392 /	СЛП	8	зерно	се	7	8,2	7,9	7,8	8	цін
Степова	92002005	1999	417 /	С	5	зерн	се	5	5	7	7	5	х
Українка	92002007	1997	345 /	СЛП	7	зерн	се	7	7	7	7	5	цін
Крушнік	86002002	1990	392 /	СЛ	7	зерн	се	7	7	7	7	5	цін

Просо

- 16

Веселодолянське 176	91006002	1995	388 /	СЛП	7	зерн	се	7	7	7	7	5	цін
Веселодільське 16	97006001	2000	388 /	СЛП	7х	зерн	еп	5	5	7	7	5	х

Сорт				Код	Зона	Характеристики								Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач		Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				
										посухи	полягання	осипання	хвороб	
Золотисте		00006001	2003	388 /	Л	7	зерн	ср	7	7	7	7	7	цін
Київське 96		96006002	1999	345 /	Л	7	зерн	рс	7	5	7	7	5	цін
Київське 87		87006002	1991	345 /	СЛП	7	зерн	ср	7	7	5	7	5	цін
Лілове		86006001	1990	345 /	ЛП	7	зерн	рс	7	7	7	7	5	х
Миронівське 94		72006001	1976	341 /	ЛП	5	зерн	сс	5	7	7	7	5	цін
Миронівське 51		69006002	1978	341 /	СЛП	7	зерн	сп	7	7	7	7	5	цін
Новокиївське 01		00006003	2004	345 /	ЛП	8	зерно	сс	7	8	8,2	7	8	зерно
Слобожанське		98006004	2001	404 /	ЛП	7	зерн	сс	7	7	7	7	5	цін
Старт		77006003	1982	225 /	С	5	зерн	ср	5	5	5	5	5	цін
Сяйво		91006001	1994	345 /	СЛП	7	зерн, корм	ср	7	7	7	7	5	цін
Сонячне		80006002	1983	345 /	Л	5	зерн	сс	5	5	7	7	5	цін
Харківське 57		84006003	1987	404 /	СЛП	7	зерн	сп	7	7	7	7	5	цін
Харківське 31		93006002	1996	404 /	СЛ	7	зерн	сс	7	7	7	7	5	цін
Сорго зернове		-	20											
Генічеський 5/11		89064001	1994	414 /	С	7	зерн	сс	7	7	7	7	5	х,фр
Генічеське 209		99064003	2003	414 /	С	7,5	зерно	ср	7	7	7,5	7	7,6	х,фж
Горизонт		78064002	1982	378 /	С	5	зерн	сс	5	5	7	7	5	х,фр
Дністр		83064001	1984	378 /	С	5	зерн	сс	5	7	7	7	5	х,фр
Донецьке 8		99064004	2003	909 /	С	7	зерно	ср	7	7,4	7,8	8	8	х,фж
Дніпровський 39		94064006	2000	340 /	С	7	х	сс	7	7	7	7	7	х,фж
Зерноград 8		79064005	1989	212 /	С	5	зерн	сс	5	7	7	7	5	х,фр
Кримбел		87064004	1992	361 /	С	5	зерн	сс	5	7	5	7	5	х,фр
Кейрас F1		00064001	2003	806 /	С	7,5	зерно	ср	7,8	8	8	7,6	8	х,фж
Кубанське червоне 1677		36064001	1981	23 /	С	5	х,фж	сс	5	5	5	7	5	х,фр
Кримдар 10		87064005	1992	361 /	С	5	зерн	сс	5	5	5	5	5	х,фр
Одеський 205		91064001	1995	378 /	С	7	зерн	сс	5	7	7	7	5	х,фр

Сорт				Код	Зона	Характеристики								Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач		Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				
										посухи	полягання	осипання	хвороб	
Россорго 4		78064007	1983	212 /	С	5	зерн	сс	5	5	5	7	5	х,фр
Степовий 13		90064013	1995	311 /	С	7	зерн	сс	5	7	7	5	5	х,фр
Степовий 8 F1		99064002	2003	340 /	С	7	х,фж	ср	7,5	7,8	7	7	7	х,фж
Степовий 5		66064002	1971	311 /	С	7	зерн	сс	5	7	7	7	5	х,фр
Сатурн		80064001	1985	378 /	С	7	зерн	сс	7	7	7	7	5	х,фр
Вінець		00064003	2004	414 /	С	7	зерно	ср	8	7,3	7,5	7,2	7,8	х,фж
Красвид		01064001	2004	311 /	С	7	зерно	ср	7	8	7,5	7,4	7,4	х,фж
Сориз		-	11											
Анадол		97330002	2001	378 /	С	7	х	ср	7	7	7	7	7	х
Дарунок		00330002	2003	378 /	С	7	х	ср	5	5	7	7	7	х
Ізумруд		00330001	2003	378 /	С	7	х	ср	5	7	7	7	7	х
Коричневе 11		00330005	2003	361 /	С	7	х	ср	7	5	7	7	7	х
Крупинка 10		00330003	2003	361 /	С	7	х	ср	5	7	7	7	7	х
Оксамит		98330002	2001	612 /	С	7	х	ср	5	5	7	7	7	х
Одеський 333		98330001	2001	378 /	С	7	х	ср	5	7	7	7	7	х
Одеський 302		95330002	1999	378 /	С	7	х	ср	7	5	7	7	7	х
Прогрес F1		00330004	2002	361 /	С	7	х	ср	5	5	7	7	7	х
Порумбень 6		97330001	2000	612 /	С	7	х	ср	7	7	7	7	7	х
Сюрприз		96330002	2001	378 /	С	7	х	ср	5	5	7	5	7	х
Рис		-	6											
Дніпровський		99009001	2002	412 /	С	7	зерн	рс	7		7	5	5	зерн
Зубець		00009002	2003	412 /	С		цін	рс						
Мутант 428		86009004	1989	412 /	С	7	зерн	рс	7		7	5	5	цін
Славутич		00009001	2003	412 /	С		цін	рс						
Спальчик		76009009	1990	15 /	С	7	зерн	сс	7		5	5	5	цін
Україна 96		96009003	2001	412 /	С	7	зерн	ср	7		7	7	5	х

Сорт				Код	Зона	Характеристики							
Назва	Вид	Номер	Рік реєстрації			Заявник / Підтримувач	Продуктивність	Напрямок використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)		
				посухи	полягання						осипання	хвороб	

Мишій італійський

- 1

Дніпровський	00122001	2001	1125 / 180	СЛ	8	х,корм, сил	сс			7	7	5	7	вкліт
--------------	----------	------	------------	----	---	-------------	----	--	--	---	---	---	---	-------

Код	Назва	Адреса заявника, або представника
15	Всеросійський науково-дослідний інститут рису	П/в Білозерне, м. Краснодар, Росія, 350921
23	Кубанська дослідна станція Всеросійського науково-дослідного інституту рослинництва	П/в Ботаніка, Гулькевичський р-н, Краснодарський Край, Росія, 352183
25	Краснодарський науково-дослідний інститут сільського господарства ім. П.П. Лук'яненка	П/в 12, м. Краснодар, Росія, 350012
57	Ставропольська селекційно-дослідна станція	Вул. Селекційна, м. Ставрополь, Росія, 355000
76	Волгоградська державна сільськогосподарська академія	Вул. Інститутська, 8, м. Волгоград, 41, Росія, 400041
89	НДІ сільського господарства Центрально-Чорноземної полоси ім. В.В. Докучаєва	П/в Інститут ім. В.В. Докучаєва, Таловський р-н, Воронежська обл., Росія, 397463
116	Фаленська селекційна станція	С. Фаленкі, Фаленський р-н, Кіровська обл., Росія, 612500
121	Самарський науково-дослідний інститут сільського господарства ім. Н.М. Тулайкова	Вул. К.Маркса, 41, п/в Безенчук, Куйбишевська обл., Росія, 446080
164	Московська сільськогосподарська академія ім. К.О. Тімірязєва	Вул. Тімірязєвська, 47, Москва, Росія, 127550
167	НДІ сільського господарства Центральних районів Нечорноземної зони	П/в Немчиновка, Одинцовський р-н, Московська обл., Росія, 143013
201	ВНДІ зернобобових і круп'яних культур	П. Стрелецький, м. Орел, Росія, 303112
212	ВНДІ сорго та інших зернових культур	Науковий городок, 3, м. Зерноград, Ростовська обл., Росія, 347740
217	Донський зональний науково-дослідний інститут сільського господарства	Сел. Рассвет, Аксайський р-н, Ростовська обл., Росія, 346714
222	Краснокутська селекційно-дослідна станція	С. Семенной, Краснокутський р-н, Саратовська обл., Росія, 413241
225	Науково-дослідний інститут сільського господарства Південного Сходу	Вул. Тулайкова, 7, м. Саратов-20, Росія, 410020
291	Урус-Мартановська державно-селекційна дільниця Чечено-Інгушської республіки	П/в Урус Мартан, Чечено-Інгушська республіка, Росія, 366500
304	Уладово-Люлінецька дослідно-селекційна станція Інституту цукрових буряків Української академії аграрних наук	П/в Жовтневе, Калинівський р-н, Вінницька обл., 22412
305	Інститут кормів Української академії аграрних наук	Проспект Юності, 16, Вінниця, 21100
306	Вінницька державна сільськогосподарська дослідна станція УААН	Вул. Мічуріна, 1, с. Агрономічне, Вінницький р-н, Вінницька обл., 23227
307	Волинський інститут агропромислового виробництва	С. Рокині, Луцький р-н, Волинська обл., 45626
309	Луганський інститут агропромислового виробництва УААН	П/в Металіст, Сло'яносербський р-н, Луганська обл., 93733
311	Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук	Вул. Дзержинського, 14, м. Дніпропетровськ, 49027
312	Дніпропетровський орден Трудового Червоного Прапора державний аграрний університет	Вул. Ворошилова, 25, м. Дніпропетровськ, 49600
315	Донецький інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук	С. Піски, Ясинуватський р-н, Донецька обл., 86053
323	Закарпатський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук	С. Велика Бакта, Берегівський р-н, Закарпатська обл., 295520
333	Інститут молекулярної біології і генетики Національної академії наук	Вул. Заболотного, 150, Київ, 03143
334	Інститут цукрових буряків Української академії аграрних наук	Вул. Клінічна, 25, Київ, 03110
336	Маслівський державний аграрний технікум	П/в Маслівка, Миронівський р-н, Київська обл., 08850
340	Синельниківська дослідна станція Інституту зернового господарства Української академії аграрних наук	П/в Раївка, Синельниківський р-н, Дніпропетровська обл., 52523
341	Миронівський інститут пшениці ім. В.М. Ремесла Української академії аграрних наук	П/в Центральне, Миронівський р-н, Київська обл., 08853
345	Інститут землеробства Української академії аграрних наук	Вул. Машинобудівників 2-б, смт. Чабани, Києво-Святошинський р-н, Київська обл., 08162
350	Національний аграрний університет	Вул. Героїв оборони, 15, Київ, 03041
355	Інститут фізіології рослин і генетики Національної академії наук	Вул. Васильківська, 31/17, Київ, 03022
356	Кіровоградська державна сільськогосподарська дослідна станція	П/в Сазонівка, м. Кіровоград, 27602
358	Кримська державна сільськогосподарська дослідна станція УААН	П/в Клепініно, Красногвардійський р-н, Автономна Республіка Крим, 97010
361	Кримський державний аграрний університет	С. Аграрне, м. Сімферополь, Автономна Республіка Крим, 95492
371	Інститут землеробства і тваринництва західного регіону УААН	С. Оброшино, Пустомитівський р-н, Львівська обл., 81115
377	Жеребківська дослідна станція Інституту зернового господарства Української академії аграрних наук	П/в Жеребкове, Ананіївський р-н, Одеська обл., 66410

Код	Назва	Адреса заявника, або представника
378	Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення УААН	Овідіопольська дорога, 3, Одеса, 65036
386	Полтавська державна аграрна академія	Вул. Сковороди, 1/3, Полтава, 36003
388	Веселоподільська дослідно-селекційна станція інституту цукрових буряків УААН	П/в Вереміївка, Семенівський р-н, Полтавська обл., 38251
392	Сумський інститут агропромислового виробництва УААН	Вул. Паркова, 3, с. Сад, Сумський р-н., Сумська обл., 42343
399	Красноградська дослідна станція Інституту зернового господарства Української академії аграрних наук	М. Красноград, Харківська обл., 63308
404	Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук	Московський проспект, 142, м. Харків, 61060
405	Харківський ордена Трудового Червоного Прапора державний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва	П/в Комуніст, 1, Харків, 62483
406	Інститут механізації та електрифікації сільського господарства	Вул. Артема, 44, м. Харків, 61000
411	Інститут землеробства південного регіону Української академії аграрних наук	С. Наддніпрянське, м. Херсон, 73483
412	Дослідна станція рису УААН	С. Антонівка, Скадовський р-н, Херсонська обл., 75705
414	Генічеська дослідна станція Інституту зернового господарства Української академії аграрних наук	С. Новоолексівка, 3, Генічеський р-н, Херсонська обл., 75560
417	Подільська державна аграрно-технічна академія	Вул. Шевченка 13, м. Кам'янець-Подільський, Хмельницька обл., 32316
418	Хмельницька державна сільськогосподарська дослідна станція	С. Самчики, Старокостянтинівський р-н, Хмельницька обл., 31182
420	Черкаська державна сільськогосподарська дослідна станція	Вул. Докучаєва, 13, м. Сміла-6, Черкаська обл., 20700
429	Чернігівський інститут агропромислового виробництва УААН	С. Прогрес, Козелецький р-н, Чернігівська обл., 17035
430	Носівська селекційна дослідна станція Чернігівського інституту агропромислового виробництва УААН	С. Дослідне, Носівський р-н, Чернігівська обл., 17131
432	Буковинський інститут агропромислового виробництва УААН	Вул. Кузнєцова, 21а, м. Чернівці, 58026
447	Білоруський науково-дослідний інститут землеробства і кормів	Вул. Тімірязєва, 1, м. Жодіно, Мінська обл., Білорусь, 222160
453	Білоруська сільськогосподарська академія	Вул. Мічуріна, 10, м. Горки, Могилівська обл., Білорусь, 213410
520	Луганський державний аграрний університет	М. Луганськ-8, 91008
612	Науково-дослідний інститут кукурудзи і сорго Республіки Молдова	С. Пашкани, Криулянський р-н, Молдова, 278336
618	Науково-дослідний інститут польових культур Республіки Молдова	Вул. Зелена, 1, м. Бельци, Молдова, 279200
710	Данія-Хандел А.С., Пр.: ДП "Проскурів Агротекс"	Вул. Санкт-Анне Гаде, 3, Копенгаген, ДК-1416, Пр.: Вул. Київська, 4, м. Хмельницький, 29008
713	Адванта Інтернешнл Б.В., (СЕС - Європа Н.В./С.А.)	Industriepark 15, 3300 Tienen, Belgium
720	Сільськогосподарський дослідний інститут Угорської академії наук, Мартонвашар	Н - 2462, Мартонвашар, Р.О.В., Угорщина
724	ДЛФ - Трифоліум А/С	9, Ny Østergade DK 4000, Roskilde Denmark, Postbox 59
736	ТОВ "Всеукраїнський науковий інститут селекції (ВНІС)"	ОФ.36, вул. Ломоносова 30/2, Київ, Україна, 03022
749	Адванта Інтернешнл Б.В. (Ді Джей Ван дер Хаге Б.В.)	П.О.Бокс 1, 4421 АЖ, Капеле, Дейквельзештрат 70, Голандія. Пр.: офіс, 302, вул. Госпітальна, 12, Київ
758	Жемойда Віталій Леонідович	Пров. Сільськогосподарський, 1, кв.29, Київ, Україна, 03041
759	Хмарський Микола Іванович	Вул. Академіка Заболотного, 112, кв. 10, Київ, Україна, 03187
760	Калінчук Олег Іванович	Вул. Калініна, 57, кв. 174, м. Черкаси, Україна, 18000
765	ТОВ агрофірма "Нібас"	Вул. Польова 100-А, смт Петропавлівка, Дніпропетровська обл., Україна, 52700
766	Декалб Дженетікс Корпорейшн	3100 Сікамор Роуд Декалб, Іллінойс 60115, USA. Пр.: бульвар Лепсе, 4, "Сільвер Центр", Київ, 03067
767	Піонер Семена Холдінг Гес.М.Б.Х	Індустрігеланде, Піонерштрассе, А - 7111, Парндорф, Австрія.
777	Монсанта Європа С.А.	Авеню де Тервюран 270-272, 1150, Брюссель, Бельгія. Пр.: бульвар Лепсе, 4, "Сільвер Центр", Київ, 03067

Код	Назва	Адреса заявника, або представника
793	Лімагрейн Женетік Гранд Кюльтюр С.А.	Домен де Мон 63203 ріом, Седекс-Франція
796	С.А. Флоримонд Депре	Б.П. 41. Капель, Темплев, Франція, 59242
806	Євраліс Семанс	Авеню Гастон Фоебюс, 64231 Лескар Седекс, Франція. Пр.:Фредерік Шавіні,вул. Шовковичнна 7а., оф. 23, Київ,01021
807	Дойче Заатферделунг Ліппштадт-Бремен ГмбХ	Вайсенбургер штр. 5, 59557 Ліпштадт, Німеччина. Пр.: фірма " Голландське насіння Ltd", а/с 249, вул. Луначарського, 1А, кв 12, Київ, 02002
824	Лохов-Петкус ГмбХ	Постфак 1197, 29296 Берген, Болерзенер Вег 5, Д-29303 Берген, Німеччина
826	Пархоменко Анатолій Костянтинович	Вул. Родімба 11, кв. 156, Київ, Україна, 03041
841	ТОВ "Земун Поле плюс"	с/мт Чабани, Кісво- Святошинський р-н, Київська обл., 08162
875	ТОВ Науково-виробнича фірма "Еліта"	Пл. Героїв ВВВ-9, каб. 411, м. Луганськ, Україна, 91000
876	Свальов Вейбул АБ	SE-26881 Svalof Sweden
879	Інститут польовництва та овочівництва, м.Нові Сад	М. Горкого 30, 21000 Нові Сад, Югославія Пр.: "Продуктива", кор. 1, вул. Весняна 1, Сонячний, м. Запоріжжя, 332110.
880	Селген, а.с.	Янковцова 18, 170 37 Прага 7, Чеська Республіка
901	Комбісід	Вул. Буйше-Шілінський, 50,21, X - 1054, Будапешт, Угорщина
909	Науково-виробнича асоціація "Кримський міжнародний інститут нетрадиційного рослинництва, екології та здоров'я"	Вул. Київська, буд. 67/2, кв. 3, м. Сімферополь-17, АР Крим, Україна, 95017
912	Норддойче Пфланценцухт Ханс-Георг Лембке КГ	24363 Хохенліті, Хольцес, Німеччина
920	Приватне підприємство " Сорт"	П/в Центральне, Миронівкий р-н, Київська обл., Україна, 08853
926	Заатен-Уніон ГмбХ	Айзенштрассе 12, 30916 Ізернахен ХБ, Німеччина
936	Інститут кукурудзи "Земун Поле"	с. Баїка 1, 11080 Белград, Югославія
937	Зернова дослідна неприбуткова компанія	шегед, ПФ. 391, 6701, Угорщина
938	КВС ЗААТ АГ	П.О.Бокс 1463, Д - 37555 Айнбек, Німеччина. Пр.: вул. Закревського, 85 - Б, кв. 123, Київ 02232
943	Г.А.Е. - Групеман Агріколь Ессонуа	91720 Мес сюр Ессон, Франція
946	Осева Ексімпіо Прага с.р.о.	Бзенес 1436, 69681 Бзенек, ІСО: 639 86175, Чеська Республіка
950	Інститут агроєкології та біотехнології Української академії аграрних наук	Вул. Метрологічна, 12, Київ, Україна, 03143
952	Мале підприємство "Нива 1"	Пр. Ломаний 14, кв. 53, м. Полтава, Україна, 36022
954	Приватна виробнича фірма " Агроцентр"	Вул. Мільмана,110,м. Дніпропетровськ, Україна, 49049
957	Костюченко Віктор Іванович	Будинок 42, кв 10,с.Дослідне, Дніпропетровський р-н, Дніпропетровська обл., Україна, 52071
961	Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю " Смілянське"	вул. Щорса 3, с. Мале Старосілля, Смілянський р-н, Черкаська обл., Україна
962	Науково- виробниче фермерське господарство "Компанія "Maic"	Вул. Тельмана,5, с. Веселе, Синельниківський р-н, Дніпропетровська обл., Україна, 52502
982	АТ "Каргілл Дніпро-селекція та насінництво"	Вул. Держинського, 14, м. Дніпропетровськ
996	Місцевої селекції	Не визначено
998	Кішкун Дослідний Центр	Кішкунхалас Х - 6400, Фузеспустца, 42, Угорщина
1027	Вітвіцький Михайло Антонович	Вул. Машинобудівників, 7/19, с/мт. Чабани, Києво-Святошинський р-н, Київська обл., Україна, 08162
1028	Закрите акціонерне товариство "Расава"	Вул. Північна, 54г, к-та 226, Київ. 04213
1040	Науково-виробниче підприємство "АгроДніпро"	С. Дослідне, б.42, кв. 69, м. Дніпропетровськ, Україна, 52071
1041	ЗАТ "Агрофірма Насіння"	Вул. Гоголя, 1, с. Абазівка, Полтавський р-н, Полтавська область, Україна, 38715
1047	Науково-дослідна комерційно-виробнича фірма "Мир-Сем"	Вул. Леніна, 113, м. Миронівка, Київська обл., Україна, 08800
1048	Секобра Решерш	Центр де Буа Енді - 78580 МОЛЬ, Франція
1051	Акціонерне товариство "Українська соя"	Вул. Жуковського, 20, м. Одеса, Україна, 65036

Код	Назва	Адреса заявника, або представника
1070	Мале науково-виробниче підприємство "Корн"	С. Ольгино, Горностаєвський р-н, Херсонська область, Україна, 74621
1079	Сінгента Сідз С.А.С.	12, шемен де л'Обі Б.П. 27, 31790 СенСовер, Франція.
1082	Закрите акціонерне товариство "Ворскла"	Вул. Б.Хмельницького, 37, м. Тростянець, Сумська обл., Україна, 42600
1083	Товариство з обмеженою відповідальністю "Технаука"	Вул. Степова 11а, с. Тепличне, м. Луганськ, Україна, 94490
1094	Бореал Планта Брідін Лтд	Мілтті 10, Фін - 31600 Йокіоїнен, Фінляндія
1109	Черкаський Інститут агропромислового виробництва УААН	Вул. Онопрієнка, 10, м. Черкаси, Україна, 18034
1111	Науково-виробниче закрите акціонерне товариство "Насіння Донбасу"	С. Піски, Ясинуватський р-н, Донецька обл., Україна, 86053
1112	Науково-виробниче товариство з обмеженою відповідальністю "Агро-інтер"	Вул. Героїв Оборони 10, Київ, Україна, 03680
1117	Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче мале підприємство "Антарія"	Вул. Машинобудівників, 2а/43, стм. Чабани Києво-Святошинський р-н, Київська обл., Україна, 08162
1120	Приватне підприємство "Віткос"	Вул. Машинобудівників, 2/19, смт Чабани, Києво-Святошинський р-н, Київська обл., Україна, 08162
1121	ООО "Насіння Луганщини"	С. Металіст, Славяносербський р-н, Луганська обл., Україна, 93733
1125	Кравченко Петро Григорович	С. Чистопіль, П'ятихатський р-н, Дніпропетровська область, Україна, 52140
1129	Клиша Андрій Іванович	М. Красноград, Харківська обл., Україна, 63308
1149	Заатцухт Йозеф Бройн Гдбр	Амсельвеч 1-Д 91074 Герцогенаурах
1153	"ГАЕ Решерш"	41 рю де ріве'єр 91720 Месс
1176	Закрите акціонерне товариство "Селена"	С. Дачне, Біляївський р-н, Одеська обл., 67624, Україна
1182	Товариство з обмеженою відповідальністю "Верес"	вул. Петропавловська 15, м Київ 04086
1184	Закрите акціонерне товариство "Агроком"	Вул. Ленінградська 6, с. Сурсько-Литовське, Дніпропетровський р-н, Дніпропетровська обл., 52064

ОПИСИ СОРТІВ ЯРИХ ЗЕРНОВИХ, ЗЕРНОБОБОВИХ ТА КРУП'ЯНИХ КУЛЬТУР, ЩО ЗАНЕСЕНІ ДО РЕЄСТРУ СОРТІВ РОСЛИН, ПРИДАТНИХ ДЛЯ ПОШИРЕННЯ В УКРАЇНІ

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ЯРА

ХАРКІВСЬКА 28. Заявник- Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва.

Різновидність лютесценс.

Тип розвитку ярий. Куш прямий. Соломина тонка, пружна. Колос білий, циліндричний, середньої довжини та щільності. На верхівці колосу наявні остеподібні загострення, середньої довжини. Плече середньої ширини, скошене. Зубець короткий, прямий. Зернівка червона, середньої величини. Маса 1000 зерен - 39,0 г.

Рослини заввишки 90-96 см.

Сорт середньостиглий, досягає за 93 дні. Стійкість до вилягання 4,3 бала. Не осипається. Стійкість проти засухи 4,7 бала.

Борошнистою россою уражувався середньо. Слабо – бурю іржею та фузаріозом колосу.

Середня урожайність сорту у випробуванні склала 34,6 ц/га, гарантована прибавка – 3.55 ц/га. Цінна пшениця. Вміст білку в зерні становив 13,0%, клейковини 26,0%, ІДК- 55 о. п., W- 286 о. а., об'єм хліба з 100 г борошна 970 мл, загальна оцінка 3,9 бала.

Внесений до Реєстру сортів рослин, рекомендований для зони Лісостепу.

ВІТКА. Заявник – приватне підприємство „Віткос”.

Тип розвитку ярий. Має слабе антоціанове забарвлення сходів. Куш прямостоячої форми. Стебло середньої товщини, міцне, має середній восковий наліт. Висота рослин 97-100 см. Лист зелений, середній за довжиною та розміром. Колос білий, веретеноподібний, середньої довжини та щільності. На верхівці колоса наявні остюки середньої довжини. Плече середньої ширини, злегка скошене. Зубець середньої довжини, злегка зігнутий. Зернівка червона, крупна. Маса 1000 зерен 41,7 г.

Ранньостиглий, вегетаційний період 89-91 день. Стійкість до вилягання 8 5 балів. Стійкість до засухи 8,2 бала.

Борошнистою россою, бурю іржею, фузаріозом уражувався слабо.

Середня урожайність за роки випробування (2000-2002рр.) становила по зоні Полісся 33,9 ц/га. В умовах Полісся сорт формує зерно з високим вмістом білка та добрими хлібопекарними якостями. Вміст білку становив 14,2%, клейковини 28,4%, загальна хлібопекарська оцінка 7,0 балів. Цінна пшениця.

Внесений до Реєстру сортів рослин придатних до поширення по зоні Полісся.

КРАСА ПОЛІССЯ. Заявник - Носівська селекційно – дослідна станція, Науково- виробниче товариство „Агро-Інтер”.

Різновидність лютесценс.

Тип розвитку ярий. Форма куща злегка похилена. Стебло середньої товщини, міцне, середньої виповненості. Листя зелене, з середнім опушенням та слабким восковим нальотом. Колос білий, напівбулавоподібний, середньої довжини та щільності. Колоскова луска середня за розміром з слабкою нервацією. Зубець середнього розміру, плече пряме кіль слабо виражений. Колос білий, має остеподібні відростки. Зернівка червона, видовжена, середньої величини, маса 1000 зерен 37,7 г.

Рослини заввишки 88 см.

Середньостиглий, досягає 94 дні.

Слабо уражувався борошнистою россою, бурою іржею, фузаріозом.

Урожайність сорту за роки випробування в середньому становила 32,4 ц/га. Хлібопекарські якості добрі. Вміст білку – 13,0%, клейковини - 27,4 %, сила борошна – 303 о.а., об'єм хліба з 100 грамів борошна -1090 мл, загальна хлібопекарська оцінка 8,0 балів. Цінна пшениця.

Внесений до Реєстру сортів рослин придатних до поширення по зоні Полісся.

СКОРОСПІЛКА 99. Заявник – Інститут землеробства УААН.

Різновидність еритроспермум.

Тип розвитку ярий. Форма куща пряма. Антоціанове забарвлення сходів слабке. Стебло середньої товщини, міцне. Восковий наліт на верхньому міжвузлі середній. Лист зелений, проміжний за величиною.

Колос білий, веретеноподібний, середній за довжиною та щільністю. Остюки середньої довжини, білі. Зернівка червона, середньої крупності. Маса 1000 зерен 39,1г.

Рослини висотою 84 см.

Ранньостиглий, досягає за 90 днів.

Стійкість до вилягання 8,9 бала, до осипання 8,5 бала, до засухи 8.5 бала.

Слабо уражується основними хворобами та шкідниками.

Середня урожайність сорту становила 33,8 ц/га. Хлібопекарські якості добрі. Вміст білку 14,0 – 15,3%, клейковини 29,3 – 31,8%, загальна

Оцінка 7,0 балів. Цінна пшениця.

Внесений до Реєстру сортів рослин придатних до поширення по зонах Лісостеп та Полісся.

ХАРКІВСЬКА 30. Сортотвласник – Інститут рослинництва.

Тип розвитку ярий. Колос білий, циліндричний, середньої довжини та щільності. Має короткі кільові зубці. Плече середньої ширини, скошене. Зубець короткий, прямий. Зернівка червона, середньої крупності. Маса 1000 зерен 40,8 г.

Середньорослий, висота рослин 92 – 94 см.

Середньостиглий, вегетаційний період становить 93 – 94 дні. Стійкість до вилягання 8,5 бала, неосипається, стійкість до засухи 7,8 бала.

Слабо уражується борошнистою росою, бурю іржею, фузаріозом.

Середня урожайність сорту за роки випробування становила 36,4 – 39,4 ц/га, гарантована прибавка склала 5,0 ц/га. Цінна пшениця. Вміст білку становить 13,8%, клейковини 28,0% , сила борошна 336 о. а., об'єм хліба – 1010 мл. Загальна хлібопекарська оцінка сорту 8,0 балів.

Сорт внесений до Реєстру сортів рослин придатних до поширення по зонах Лісостеп, Полісся.

ПШЕНИЦЯ ТВЕРДА ЯРА

ХАРКІВСЬКА 41. Заявник – Інститут рослинництва УААН.

Різновидність леукурум.

Тип розвитку ярий. Куш прямий. Антоціанове забарвлення сходів відсутнє або слабке. Стебло середньої довжини та міцності, виповнене. Опушення верхнього вузла та восковий наліт на ньому відсутні або дуже незначні. Колос білий, циліндричний, середньої довжини та щільності. Остюки розміщені по всій довжині колосу, білі, довші за колос. Колоскова луска видовженої форми, плече скошене, вузьке. Зубець короткий, злегка скошений. Зернівка біла, напіввидовжена, середньої величини. Маса 1000 зерен 41,1 г.

Висота рослин 101 см, середньоросла.

Середньостиглий, вегетаційний період 93 дні. Стійкість до вилягання 8,3 бала. Стійкість до засухи 8,1 бала.

Основними хворобами зернових культур уражувався слабо.

Середня урожайність за роки випробування склала 31,6 ц/га.

Гарантована прибавка становила 3,1 ц/га. Вміст білку 15,5%. Загальна оцінка макаронних виробів 7,5 бала.

Внесений до Реєстру сортів рослин придатних до поширення по зоні Лісостепу.

ХАРКІВСЬКА 39. Заявник- Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр'єва.

Різновидність гордеїформе.

Тип розвитку ярий. Куш прямий. Рослини середньорослі, висотою 95-100 см. Колос червоний, циліндричний, середньої довжини та щільності. Остюки розташовані по всій довжині колосу, світлокоричневі, на верхівці- довші за колос. Колоскова луска видовженої форми. Плече округле, вузьке. Зубець короткий, прямий. Зернівка біла, напіввидовжена, середньої крупності. Маса 1000 зерен 39 г.

Середньорослий, вегетаційний період 86 днів. Стійкість до вилягання 4,6 бала. Не осипається. До засухи стійкість оцінена в 4,2 бала.

Хворобами уражувався середньо, на рівні стандартів.

За роки випробування середня врожайність сорту становила 25,9 ц/га, гарантована прибавка склала 1,0 ц/га, зерно скло видне, містить 15,5% білку.

Загальна оцінка макаронних виробів 4,1 бала.

Внесений до Реєстру сортів рослин, рекомендований для вирощування в зоні Степу.

ТРИТИКАЛЕ ЯРЕ

АРСЕНАЛ. Заявник – Приватне підприємство „Сорт”.

Кущ проміжної форми. Стебло середньої товщини, міцне. Листя світлозелене, велике за розміром без опушення та воскового нальоту. Колос білий, веретеноподібний, довгий, щільний. Колоскова луска ланцетна. Зубець гострий, короткий. Плече вузьке, скошене. Кіль гострий, середньо виражений. Остюки білі, короткі, середньорозлогі, зазубрені. Зернівка червона, овальновидовжена, крупна. Маса 1000 зерен 39,8 г.

Вегетаційний період 98 днів.

Рослини висотою 95-100 см.

Стійкість до вилягання 4,9 бала, до осипання 5,0 балів, до засухи 4,4 бала.

Основними хворобами уражувався слабо.

Середня урожайність сорту за роки випробування становила 42,6 ц/га.

Гарантована прибавка становила 2,33 ц/га. Вміст білку в зерні 12,5 %.

Внесений до Реєстру сортів рослин України, рекомендований для зони Полісся.

ВІКТОРІЯ. Заявник - Носівська селекційна дослідна станція, НВТ „Агро – Інтер”

Гексаплоїдний. Тип розвитку ярий. Сходи мають середнє антоціанове забарвлення. Кущ прямий. Стебло середньоросле, середньо виповнене, опушення середнє. Колос пониклий, білий, веретеноподібний, довгий, частково не вимолочуються верхівки. Остюки середньої довжини, коротші за колос, розташовані по всій його довжині, слабо розведені, світло – сірі. Зернівка червона, виповнена, пшеничного типу.

Рослини заввишки 97 см. Достигає за 97 днів, відноситься до середньостиглих сортів. Стійкість сорту до вилягання 8,7 бала, стійкість до засухи 8,1 бала.

Сорт слабо уражується борошнистою росою та бурю іржею.

Середня урожайність сорту за роки випробування склала 38,2 ц/га.

Вміст білку в зерні 13,1 %. Маса 1000 зерен 37,6 г.

Внесений до Реєстру сортів рослин придатних до поширення по зоні Полісся.

ХЛІБОДАР ХАРКІВСЬКИЙ. Заявник – Інститут рослинництва УААН.

Гексаплоїдний. Тип розвитку ярий. Антоціанове забарвлення сходів середнє. Кущ напівпрямий. Стебло середньоросле з дуже сильним опушенням шийки. Колос білий, довгий, середньої щільності. Остюки довгі, розташовані по всій довжині колоса. Зернівка червона, велика. Маса 1000 зерен 40,0 г.

Рослини висотою 114 – 117 см.

Середньостиглий, досягає за 96 -97 днів. Стійкість сорту до вилягання 7,6 бала. Стійкість до засухи 8,0 балів.

Сорт слабко уражувався борошнистою росою, стійкий до ураження бурю іржею та корневими гнилями.

Урожайність сорту в середньому за роки випробування склала 36,6 ц/га. Вміст білку в зерні становить 12,9%.

ОВЕС

Ранньостиглий - Сорт виведений на Носівській селекційно-дослідній станції методом гібридизації.

Різновидність мутіка.

Стебло середньої висоти 95-110 см, середньої товщини, міцне. Волоть напівстиснута, гілки відходять під гострим кутом до стрижня, жовтувата, завдовжки 18-19 см. Колоскові луски довгі з яскраво вираженою нервацією. Колоски здебільшого двозерні. Остюки практично відсутні.

Зернівка московського (пробштейського) типу, біла, добре виповнена. Маса 1000 насінин - 31-37г. Плівчастість нижче-середня - 23-24%. Основа нижньої зернівки опушена ріденькими волосками.

Сорт ранньостиглий - 86-90 днів, дозріває на 7-10 днів раніше стандартів.

Стійкість до осипання та вилягання висока. За роки випробування на державних сортовипробувальних станціях отримали урожай 37,7-41,4 ц/га, максимальний - 64 ц/га. Слабко уражується корончатою іржею. Стійкий до летючої сажки. Шведською мухою пошкоджується на рівні стандартів.

Рекомендований для вирощування в зонах Полісся та Лісостепу.

Райдужний - Сорт виведений на Носівській селекційно-дослідній станції Інституту агроєкології та біотехнології УААН.

Виведений методом гібридизації. Різновидність мутіка.

Стебло заввишки 85-98 см, середньої товщини, міцне. Стеблові вузли голі або з рідким опушенням, листки широкі, темно-зелені. Волоть напівстиснута, гілки відходять вгору до головної осі під гострим кутом. Остюки тонкі, ніжні. Зернівка московського (пробштейського) типу, біла, добре виповнена, досить велика. Маса 1000 насінин 30-35г. Плівчастість 23%. Білка має 11,9%.

Середньостиглий. Вегетаційний період 90-100 днів. Стійкий до осипання. За роки випробування на державних сортовипробувальних станціях отримали середній урожай 42,2 ц/га, максимальний – 61 ц/га.

Слабо уражується корончатою іржею. Стійкий до летючої сажки.

Рекомендований для вирощування в зоні Полісся.

ЯЧМІНЬ ЯРИЙ

Аскольд - Виведений у Миронівському інституті пшениці ім. В.М. Ремесла методом індивідуального відбору.

Різновидність нутанс.

Колос дворядний, солом'яно-жовтий, остистий, конусоподібної форми, середньої щільності, (на 4 см колоскового стрижня припадає 12 – 14 члеників) неламкий. Колоскові луски середньої довжини, вузькі.

Остюки довгі, у півтора–два рази перевищують довжину колоса, зазубрені, при досяганні не опадають, ніжні еластичні. Добре помітна перша пара квіткової луски. Перехід квіткової луски в остюк поступовий

Зернівка жовта, плівчаста, еліптична. Маса 1000 зерен - 45,8 – 47,5 г.

Середньостиглий, вегетаційний період коливається в межах 85 днів. Солома середньої довжини, 75 см, міцна, стійка проти вилягання.

Посухостійкість середня. Стійкість проти вилягання висока.

Сорт інтенсивного типу, пластичний. За даними заявника рекомендується висівати за 100-відсоткової господарської придатності 4 – 4,5 млн/га насінин.

Запізнення із сівбою на 5 – 10 днів призводить до значного недобору врожаю (від 3,9 – 7,4 ц/га).

За роки випробування на державних сортовипробувальних станціях отримано середній врожай 38,3 – 42 ц/га, що на 3,7 – 5,6 відсотків більше стандартів. Максимальний врожай сорту отримали на Крижопільській державній сортовипробувальній станції в 1998 році - 90 ц/га.

Відноситься до сортів пивоварного призначення. Білка має 11,4 – 11,7 %, плівчастість 8–9, екстрактивних речовин - 78-79, крохмалю – 58-61%.

Стійкість до хвороб і шкідників. Слабко уражується гельмінтоспоріозом, більш стійкий проти борошнистої роси, середньо пошкоджується шведською мухою.

В той же час обов'язкове протруювання насіння проти летючої сажки.

Рекомендований для вирощування у зонах Лісостепу та Полісся.

Скарлет - Заявник фірма Осева Прага с. р. о., Чехія. Виведений методом схрещування.

Різновидність нутанс.

Колос дворядний, середньої щільності, солом'яно-жовтий, остистий, неламкий, слабо звужується до вершини.

Остюки довгі, зазубрені, паралельні, тонкі, еластичні, жовті.

Колоскова луска мала, вузька, тонка, без опушення.

Квіткова луска слабозморшувата, нервація добре виявлена, перехід в остюк поступовий. Основна щетинка зерна довговолосяна.

Кущ прямостоячий, листки зелені, опушення середнє.

Стебло міцне, висота рослин 75 – 80 см.

Зернівка жовта, еліптична. Маса 1000 зерен – 45-55 г.

Середньостиглий, вегетаційний період коливається в межах 81-84 дні. Стійкий проти вилягання. За даними заявника, рекомендується висівати за 100-відсоткової господарської придатності 3,5-4 млн/га насінин.

Сорт інтенсивного типу. Добре реагує на внесення мінерального живлення.

Пивоварні якості добрі. Білка має 10,0-11,5 %, плівчастість 8-9 %, екстрактивних речовин 79-80 % . Високоврожайний. За роки випробування на державних сортовипробувальних станціях отримали середній врожай 48,9 ц/га, що на 11,3 відсотки більше стандартів.

Максимальний врожай сорту отримали на Бородянській державній сортовипробувальній станції 85 ц/га.

Борошнистою росю уражується середньо. Рекомендований для вирощування у зонах Лісостепу та Полісся.

Оболонь - Виведений у Селекційно-генетичному інституті методом схрещування.

Різновидність нутанс.

Колос дворядний, середньої довжини (7 – 8 см), середньої щільності (10 – 11 члеників на 4 см колоскового стрижня), неламкий, солом'яно-жовтий, слабо звужується до вершини. Колосовий стрижень опушений рідкими довгими волосками. Добра озерненість колоса (19 – 20 зерен в колосі).

Остюки довгі, зазубрені, паралельні, тонкі, еластичні, солом'яно-жовті.

Колоскова луска мала, тонка, вузька, без опушення.

Квіткова луска зморшувата, нервація добре виявлена, перехід в остюк поступовий.

Основна щетина зерна довговолосяна.

Кущ напіврозлогий. Листки середньоопушені, вузькі, світло-зелені. Стійкий до вилягання, що забезпечується коротким (70 – 80 см) міцним стеблом. Сорт відзначається високою кущистістю.

Зернівка світло-жовта, тонкоплівчаста, подовжено-овальної форми. Маса 1000 зерен – 42-51 г.

Середньостиглий, дозріває за 81 – 85 днів. Сорт інтенсивного типу. За даними заявника рекомендується висівати за 100 – відсоткової господарської придатності 4 – 4,5 млн/га насінин.

Запізнення із сівбою на 5 – 10 днів призводить до значного недобору врожаю (від 4 до 6 ц/га) та погіршення якості зерна.

Агротехніка – звичайна для зони вирощування. За роки випробування на державних сортовипробувальних станціях отримали середній врожай 40,5 ц/га, що на 3,2 % більше стандартів.

Максимальний врожай сорту отримали на Перемишлянській державній сортовипробувальній станції в 1999 році - 75 ц/га.

Має високі пивоварні властивості. Білка має 9,5 – 11,0 %, плівчастість 8 – 9, екстрактивність речовин - 78-80, крохмалю – 58-62 %.

Стійкість проти хвороб і шкідників. Стійкість до всіх листостеблових хвороб, летючої сажки.

Рекомендований для вирощування у зонах Лісостепу і Полісся.

Гетьман - Виведений у Селекційно-генетичному інституті для умов високоінтенсивного землеробства методом схрещування.

Різновидність нутанс.

Колос дворядний, середньої довжини (6-8см), середньої щільності (12 члеників на 4 см колоскового стрижня), неламкий, солом'яно-жовтий, слабо звужується до верхівки. Добра озерненість колоса (19 – 20 зерен в колосі), висока кущистість, вирівняність стеблостою.

Остюки довгі, зазубрені, паралельні, тонкі, еластичні, солом'яно-жовті. В період колосіння мають антоціанове забарвлення. Колоскова луска тонка, вузька, без опушення. Квіткова луска слабозморшкувата, нервація добре виявлена. Перехід квіткової луски в остюк поступовий.

Основна щетина зерна довговолосяна.

Кущ прямостоячий. Лист неопушений, проміжний, зелений.

Зернівка жовта, велика, подовжено-овальної форми. Маса 1000 зерен – 42-48г.

Сорт інтенсивного типу. За даними заявника рекомендується висівати за 100 – відсоткової господарської придатності 4 – 4,5 млн/га насінин.

Середньостиглий, дозріває за 81 – 83 дні. Запізнення із сівбою на 5 – 10 днів призводить до значного недобору врожаю (від 3,8 – 6,4 ц/га) та погіршення якості зерна. Агротехніка – звичайна для зони вирощування.

За роки випробування на державних сортовипробувальних станціях отримали середній врожай 40,9 0 44,7 ц/га, що на 3,7 відсотків більше стандартів.

Максимальний врожай сорту отримали на Миргородській державній сортовипробувальній станції в 1999 році - 80 ц/га.

Відноситься до сортів пивоварного призначення. Білка має 10,8 %, плівчастість 8 – 9, екстрактивність речовин 78 – 80, крохмалю 58-62 %.

Стійкий до листостеблових хвороб, летючої сажки.

Рекомендований для вирощування у зонах Лісостепу і Полісся.

Інарі - Заявник-фірма Бореаль, Фінляндія. Виведений методом схрещування.

Різновидність нутанс.

Колос дворядний, середньої довжини (7-9см), підвищеної щільності (11 – 12 члеників на 4 см колосового стрижня), неламкий, звужується до вершини, солом'яно-жовтий. Добра озерненість колоса (16-26 зерен в колосі).

Остюки довгі, зазубрені, паралельні, тонкі, еластичні, солом'яно-жовті.

Колоскова луска, тонка, вузька, без опушення.

Квіткова луска слабозморшкувата, нервація добре виявлена. Перехід квіткової луски в остюк поступовий.

Зернівка жовта, еліптична.

Куш напіврозлогий. Листки без опушення, вузькі, темно-зелені.

Сорт інтенсивний. Добре реагує на внесення мінерального живлення. середньостиглий. Вегетаційний період коливається в межах 75 – 83 дні. Стійкий до вилягання. За даними заявника рекомендується висівати за 100 – процентної господарської придатності 3,5-4,5 млн/га насінин. Агротехніка звичайна для зони вирощування.

За роки випробування на державних сортовипробувальних станціях отримали середній врожай 40,3 ц/га, що на 3,4 % більше стандартів.

Максимальний врожай сорту отримали на Волинській державній сортовипробувальній станції в 2000 році - 75 ц/га.

Відноситься до сортів пивоварного призначення. Білка має 10,2 %, плівчастість - 8-9, екстрактивність речовин - 78 – 80, крохмалю – 58-62 %.

Стійкість до хвороб і шкідників: сорт стійкий до смужкового гельмінтоспориозу і твердої сажки.

Рекомендований для вирощування у зоні Полісся.

Табора - Заявник - фірма Секобра Ремерш, Франція.

Виведений методом схрещування.

Різновидність нутанс.

Колос дворядний, середньої довжини (8 – 10 см), середньої щільності (10 – 11 члеників на 4 см колосового стрижня), неламкий, слабо звужується до верхівки, солом'яно-жовтий.

Остюки довгі, зазубрені, паралельні, тонкі, еластичні, жовті.

Колоскова луска мала, без опушення.

Квіткова луска слабозморшкувата, нервація добре виявлена, перехід в остюк поступовий. Основна щетинка зерна довговолосяна.

Куш розлогий, листки неопушені, проміжні, зелені.

Висота рослин - 70-85 см.

Зернівка жовта, велика, подовженої форми. Маса 1000 зерен – 45-50 г.

Середньостиглий, дозріває за 81 – 83 дні.

Сорт інтенсивного типу. За даними заявника рекомендується висівати за 100 – відсоткової господарської придатності 4 – 4,5 млн/га насінин.

Дуже реагує на запізнення із сівбою.

Агротехніка звичайна для зони вирощування. За роки випробування на державних сортовипробувальних станціях отримали середній врожай 38,2-44,9 ц/га, що на 4,6-9,6 % більше стандартів.

Максимальний врожай сорту отримали на Андрушівській державній сортовипробувальній станції в 2000 році - 85 ц/га.

Має високі пивоварні властивості. Білка має 10,5 – 11,3 %, плівчастість – 8-9, екстрактивність речовин – 78-80, крохмалю 58 – 62 %.

Стійкість до хвороб та шкідників. Має комплексну стійкість до більшості поширених в Україні хвороб: летючої, твердої і чорної сажки, борошнистої роси, гельмінтоспоріозу.

Рекомендований для вирощування у зонах Лісостепу, Полісся та Степу.

Зоряний - Виведений у Селекційно-генетичному інституті методом схрещування.

Різновидність – нутанс. Форма куща прямостояча. Колос дворядний, злегка звужується до верхівки, середньої щільності (на 4 см колосового стрижня припадає 12-14 члеників), неламкий. Колосові луски середньої довжини, вузькі. Остюки довгі, гладенькі, зазубрені. Квіткові луски лінійно-ланцетні, тоненькі, зморшкуваті. Добре помітна перша пара квіткової луски. Перехід квіткової луски в остюк поступовий.

Зернівка еліптична, жовтого кольору, маса 1000 зерен – 42,1-45,5г. Середньостиглий, вегетаційний період коливається в межах 75-84 дні, на 2-3 дні раніше національних стандартів. Солома середньої довжини (67-81 см), міцна, стійка до вилягання.

Сорт інтенсивного типу, пластичний, стійкий до осипання.

За даними заявника рекомендується висівати за 100-відсоткової господарської придатності 4,0-4,5 млн/га насінин. Запізнення з сівбою на 5-10 днів призводить до значного недобору врожаю (4,1-9,6 ц/га).

На державних сортовипробувальних станціях та дільницях за роки випробування отримали урожай 35,3-39,6 ц/га, що на 5,0-6,9% більше національних стандартів.

Потенційна можливість сорту – 95 ц/га. Відноситься до сортів пивоварного призначення. Білка має 11,3-12,0%, плівчастість – 8-9, екстрактивних речовин 78-80, крохмалю – 58-62%.

Борошнистою росю, бурою іржею, гельмінтоспоріозом уражується нижче стандартів. Обов'язкове протруювання насіння проти летючої сажки.

Рекомендований для вирощування у зонах Лісостепу і Полісся.

Донецький 14 - Виведений у Донецькому інституті агропромислового виробництва методом схрещування.

Різновидність – медикум. Форма куща прямостояча. Колос дворядний, солом'яно-жовтий, середньої щільності (на 4 см колосового стрижня 12-14 члеників), довжина 11-14 см, слабо поникає, солом'яно-жовтий, циліндричної форми. Колоскові луски вузькі. Остюки довгі (довші від колоса в 1,5-2 рази), зазубрені, еластичні. Квіткові луски лінійно-ланцетні, вузькі, середньої довжини, добре помітна зазубреність першої пари нервів. Зернівка напіввидовжена, жовтого кольору, маса 1000 зерен – 45,1-48,2г.

Середньостиглий, вегетаційний період – 73-85 днів. Солома середньої довжини, - 58-62 см. Має підвищену стійкість до посухи.

За даними науково-дослідних установ рекомендується висівати за 100-відсоткової господарської придатності 4,5-5 млн/га насінин.

Сорт добре кушиться, щільність стеблестою сягає 650-750 продуктивних стебел на 1м². Сорт раннього строку сіву. Запізнення з сівбою на 5-10 днів призводить до недобору врожаю до 10 ц/га.

Добрі результати дає при внесенні повного мінерального живлення.

На державних сортовипробувальних станціях та дільницях за роки випробування отримали урожай 33,3-40,5 ц/га. Потенційна можливість сорту – 79 ц/га.

Цінний, білка має 13,5-14,4%, вихід крупи складає 44,7%, вирівняність зерна – 94,5%.

Сорт стійкий до ураження бурю іржею. Обов'язкове протруювання насіння проти летючої сажки.

Рекомендований для вирощування у зоні Степу.

Олбрам - Заявник – фірма Осева Прага с.р.о., Чехія. Виведений методом схрещування.

Різновидність нутанс. Форма куща прямостояча. Колос дворядний, злегка звужується до верхівки, середньої щільності (на 4 см колосового стрижня 12-14 члеників), довжина 8-9 см, слабо поникає. Остюки довгі, ніжні, перевищують довжину колоса у півтора-два рази. Квіткові луски не мають забарвлення, з маленькими зубчиками. Перехід квіткової луски в остюк поступовий. Щетинка біля основи зерна волосиста.

Зерно еліптично-ромбічне, жовте, крупне. Маса 1000 зерен 41-42г. Рослини середньої висоти, за стійкістю проти вилягання дещо перевищують стандарти.

Середньопізній, дозріває за 79-90 днів. Солома середньої довжини (63-65 см), міцна.

За даними заявника рекомендується висівати за 100-відсоткової господарської придатності 4-4,5 млн/га насінин. Запізнення із сівбою на 5-10 днів призводить до недобору до 10 ц/га.

Сорт інтенсивного типу. Добрі результати дає при внесенні повного мінерального живлення.

Особливістю сорту є те, що він відрізняється підвищеною кушистістю та раннім строком сіву.

На державних сортовипробувальних станціях та дільницях за роки випробування отримали урожай 35,6-48,4 ц/га. Потенційна можливість сорту – 85 ц/га.

Відноситься до сортів пивоварного призначення. Білка має 10,1-11,3%, плівчастість 7-8, екстрактивних речовин – 80-82, крохмалю – 58-62%.

Борошнистою росю, бурю іржею, гельмінтоспоріозом та летючою сажкою уражується на рівні стандартів.

Рекомендований для вирощування у зоні Полісся.

Лотос - Виведений на Вінницькій державній обласній сільськогосподарській дослідній станції методом гібридизації.

Різновидність нутанс. Форма куща прямостояча. Колос дворядний, солом'яно-жовтий, середньої довжини (6-7 см), нещільний, колоскові луски вузькі. Остюки довгі (довші колоса в 2 рази), тонкі, еластичні, зазубрені. Квіткові луски лінійно-ланцетні, тоненькі,

моршкуваті. Добре помітна перша пара квіткової луски. Перехід квіткової луски в сотюк поступовий. Зернівка жовта, еліптичної форми, маса 1000 зерен – 42,1-43,5г.

Середньостиглий, досягає за 79-89 днів, або на 1-3 дні раніше стандартів.

Солома середньої довжини (65-68 см), міцна. Стійкий до вилягання.

За даними заявника рекомендується висівати за 100-% господарської придатності 4-4,5 млн/га насінин. Запізнення з сівбою на 5-10 днів призводить до значного недобору врожаю (5-11 ц/га).

На державних сортовипробувальних станціях та ділянках за роки випробування отримали врожай 38,3-44,5 ц/га, максимальний – на Іллінецькій державній сортовипробувальній станції – 71,8 ц/га.

Круп'яні якості від середніх до добрих. Білка має 12,8%, вихід крупи складає – 44,6%, вирівняність зерна – 92,3%.

Гельмінтоспориозом і карликовою іржею уражується слабо, шведською мухою пошкоджується середньо. Обов'язкове протруювання насіння проти сажки.

Рекомендований для вирощування у зоні Лісостепу.

Фенікс - Виведений у Інституті рослинництва ім. В.Я.Юр'єва методом схрещування.

Різновидність нутанс. Форма куща прямостояча. Колос дворядний, злегка звужується до верхівки, середньої довжини і щільності. Квіткові луски не мають забарвлення, з маленькими зубчиками. Остюки довгі, розміщені паралельно до колоса, середньогрубі, жовті.

Зерно еліптично-ромбічне, жовте, крупне. Маса 1000 насінин – 45,8-46,7г. Щетинка біля основи зерна волосиста. Рослини середньої висоти, за стійкістю до вилягання дещо перевищують стандарти. Середньостиглий, в умовах Степу досягає за 79-86 днів, одночасно із стандартами.

Сорт відрізняється підвищеною посухостійкістю у всіх фазах розвитку.

За даними науково-дослідних установ рекомендується висівати за 100-відсоткової господарської придатності 4,5-5 млн/га насінин.

Сорт інтенсивного типу. Добрі результати дає при внесенні повного мінерального живлення.

Високоврожайний. Максимальний урожай 67,5 ц/га одержали на Кіровоградській державній сортовипробувальній станції. Білка має 12,5%, вихід крупи – 44,5%, вирівняність зерна – 96,6%.

Досить стійкий проти ураження гельмінтоспориозом.

Рекомендований для вирощування у зоні Степу.

Гама - Виведений у Інституті рослинництва ім. В.Я.Юр'єва методом індивідуального добору.

Різновидність нутанс. Форма куща прямостояча. Колос дворядний, призматичний, солом'яно-жовтий, середньої довжини, нещільний, трохи пониклий. Колоскові луски вузькі. Остюки довгі, не розходяться, в 1,5-2 рази довші колоса, гладенькі, еластичні. Зернівка еліптична, плівчаста, солом'яно-жовта, велика. Маса 1000 насінин – 42-45,4г. Щетинка біля основи волосиста.

Середньостиглий, вегетаційний період – 75-83 дні. Середньостійкий до вилягання (3,5-5 балів) і досить стійкий до осипання (4-5 балів).

За даними науково-дослідних установ рекомендується висівати за 100-відсоткової господарської придатності 4-4,5 млн/га насінин.

Сорт інтенсивного типу. Добрі результати дає при внесенні повного мінерального живлення.

Урожайний. На державних сортовипробувальних станціях та дільницях отримали середній врожай 38,5 ц/га, максимальний – 69,8 ц/га - на Тернопільській державній сортовипробувальній станції.

Білка має 12,2%, вихід крупи – 44,4%, вирівняність зерна – 95,2%.

Слабо уражується борошнистою россою та карликовою іржею. Стійкий до ураження летючою сажкою.

Рекомендований для вирощування у зоні Лісостепу.

Корона - Заявник – науково-дослідна комерційно-виробнича фірма “Мир-Сем”. Виведений методом індивідуального добору.

Різновидність нутанс. Форма куща прямостояча. Колос дворядний, середньої довжини (8-9 см), слабо звужується до верхівки, середньої щільності. Остюки довгі, ніжні, перевищують довжину колоса у півтора-два рази. Зерно середнього розміру, еліптичної форми. Маса 1000 насінин – 42,7-45,4г. Рослини середньої висоти, досить стійкі до вилягання. Кущистість висока. Перехід квіткової луски в остюк поступовий, основна щетинка довговолосиста. Середньоранній, досягає за 74-80 днів, на 4-5 днів раніше стандартів.

За даними заявника, рекомендується висівати за 100-відсоткової господарської придатності 4-4,5 млн/га насінин.

Належить до сортів інтенсивного типу, за сприятливих умов здатний давати більше 75-80 ц/га.

Відрізняється стійкістю до весняних заморозків, добре використовує осадки другої половини вегетації.

Відноситься до сортів пивоварного призначення. Білка має 10,5-11,2 відсотка, плівчастість – 8-9 відсотків, екстрактивних речовин – 79-81 відсоток.

Стійкий до борошнистої роси, гельмінтоспоріозу, летючої сажки.

Рекомендований для вирощування у зоні Лісостепу.

СН-28 - Виведений на Кіровоградській державній обласній станції методом схрещування.

Різновидність нутанс. Форма куща прямостояча. Колос дворядний, солом'яно-жовтий, середньої щільності, довжиною 6-9 см, слабо поникає, ромбічної форми. Остюки довгі (довші колоса в 1,5 раза), зверху слабо зазубрені, зубчики розміщені по обох краях від основи до верху. Квіткові луски зморшкуваті, лінійно-ланцетні, тоненькі. Перехід квіткової луски в остюк поступовий. Основна щетинка довговолосиста.

Середньостиглий, досягає за 76-84 дні. Солома середньої довжини (63-68 см), міцна. Стійкий до вилягання та осипання. Має підвищену стійкість до посухи. Краще стандартів використовує осадки другої половини вегетації.

За даними заявника рекомендується висівати за 100-відсоткової господарської придатності 4,5-5 млн/га насінин. Запізнення із сівбою на 5-10 днів призводить до недобору врожаю до 12 ц/га.

Сорт напівінтенсивного типу, пластичний.

Добрі результати дає при внесенні повного мінерального живлення.

Стійкий до весняних заморозків. Здатний в умовах Степу забезпечувати врожай 56-71 ц/га. Цінний. Має відмінні круп'яні якості. Білка має 13,4%, вихід крупи – 44,4%, вирівняність зерна – 96,5%.

Борошнистою росю, бурю іржею, гельмінтоспоріозом уражується нижче стандартів.

Рекомендований для вирощування у зоні Степу.

Маресі - Заявник фірма Ф. фон Лохов-Петкус Гмбх. Виведений методом схрещування.

Форма куша прямостояча. Колос дворядний, остистий, солом'яно-жовтий, завдовжки 7-8 см, середньої щільності. Остюки довгі (довші колоса в 1,5 рази), слабо зазубрені. Квіткові луски лінійно-ланцетні, тоненькі, зморшкуваті. Перехід квіткової луски в остюк поступовий, основна щетинка зернівки довговолосиста. Зернівка видовжено-овальної форми, жовтого кольору, маса 1000 зерен – 42-45,6г.

Середньостиглий, вегетаційний період коливається в межах 72-88 днів, на 1-2 дні раніше стандартів. Солома середньої довжини (59-62 см), міцна, стійка до вилягання.

За даними заявника, рекомендується висівати за 100-відсоткової господарської придатності 3,5-4,0 млн/га насінин. Запізнення із сівбою на 5-10 днів призводить до недобору врожаю (5-11 ц/га).

Сорт інтенсивного типу. Добрі результати дає при внесенні повного мінерального живлення.

Високоврожайний. На Бородянській державній сортовипробувальній станції отримали врожай 86,9 ц/га.

Відноситься до сортів пивоварного призначення. Білка має 10,3-11,8%, плівчастість 8-10, екстрактивних речовин – 79-81%.

Стійкий до ураження борошнистою росю, гельмінтоспоріозом.

Рекомендований для вирощування у зоні Полісся.

Форум - Заявник – фірма Осева Прага с.р.о., Чехія. Виведений методом схрещування.

Різновидність нутанс. Форма куша прямостояча. Колос дворядний, середньої щільності, солом'яно-жовтий (на 4 см колосового стрижня 11-13 члеників), довжина 7-9 см, слабо поникає, не ламається. Колоскова луска тоненька. Остюки солом'яно-жовті, довгі, слабо розходяться, сильно зазубрені. Квіткова луска ніжна, зморшкувата, нервація добре виражена, перехід квіткової луски в остюк поступовий. Щетинка біля основи зернівки волосиста. Зернівка еліптична, жовта, велика. Маса 1000 зерен – 41,3-45,6г.

Середньостиглий, дозріває за 77-86 днів. Солома середньої довжини (63-61 см), міцна, стійка до полягання.

За даними заявника, рекомендується висівати за 100-відсоткової господарської придатності 4-4,5 млн/га насінин.

Запізнення із сівбою на 5-10 днів призводить до недобору врожаю до 10 ц/га.

Сорт інтенсивного типу. Добре реагує на внесення повного мінерального живлення.

Пивоварні якості добрі. Білка має 11,3-11,9%; плівчастість 8-9%; екстрактивних речовин – 78-81%.

Високоврожайний. На державних сортовипробувальних станціях та дільницях за роки випробування отримали урожай 35,7-42,2 ц/га, максимальний на Крижопільській державній сортовипробувальній станції – 76,4 ц/га.

Летючою сажкою та борошнистою росою уражується середньо.
Рекомендований для вирощування у зонах Лісостепу та Полісся.

Тюрінгія - Заявник фірма Заатен-Уніон Гмбх. Виведений методом схрещування.

Різновидність нутанс. Форма куща прямостояча. Колос веретеноподібної форми, дворядний, нещільний, солом'яно-жовтий (на 4 см колосового стрижня – 10-11 члеників), довжина 7-9 см, слабо поникає, ромбічної форми, не ламається. Колоскова луска тоненька, ніжна, має густе довговолосисте опушення. Остюки солом'яно-жовті, довгі, слабо розходяться, тоненькі, ніжні, сильно зазубрені. Квіткова луска ніжна, зморшкувата, нервація добре виражена, перехід квіткової луски в остюк поступовий. Щетинка біля основи зернівки довговолосиста. Зернівка еліптична, жовта, велика. Маса 1000 зерен – 44,1-46,8г.

Середньостиглий, дозріває за 76-83 дні.

Солома середньої довжини (65-68 см), міцна, стійка до полягання.

За даними заявника, рекомендується висівати за 100-відсоткової господарської придатності 3,5-4,0 млн/га насінин.

Запізнення з сівбою на 5-10 днів призводить до недобору врожаю до 9 ц/га.

Сорт інтенсивного типу.

Пивоварні якості добрі. Білка має 10,3-11,7%, плівчастість – 8-10%, екстрактивних речовин – 79-81%.

Летючою сажкою та борошнистою росою уражується середньо.

Рекомендований для вирощування у зоні Полісся.

Галактик - Виведений у Селекційно-генетичному інституті методом індивідуального добору.

Різновидність – нутанс.

Форма куща прямостояча. Колос дворядний, злегка звужується до верхівки, середньої щільності (на 4 см колосового стрижня припадає 12-14 члеників), довжина 11-12 см, слабо поникає, неламкий. Колосові луски вузькі. Остюки довгі, паралельні, зазубрені, еластичні. Квіткові луски лінійно-ланцетні, тоненькі, зморшкуваті. Добре помітна перша пара квіткової луски. Перехід квіткової луски в остюк поступовий, основна щетинка зернівки довговолосиста. Зернівка видовжено-овальної форми, жовтого кольору, маса 1000 зерен - 46,9-50,9г. Середньостиглий, вегетаційний період коливається в межах 72-87 днів, на 1-2 дні раніше національних стандартів. Солома середньої довжини (72-87 см), міцна, стійка до вилягання.

Особливістю сорту є те, що він відрізняється стійкістю до весняних заморозків, високим температурам і засусі в літній період. Краще стандартів використовує осадки другої половини вегетації.

За даними науково-дослідних установ, рекомендується висівати за 100-відсоткової господарської придатності 4,5-5 млн/га насінин. Запізнення з сівбою на 5-10 днів призводить до незначного недобору врожаю (від 3,6- до 8,6 ц/га).

Сорт інтенсивного типу, пластичний, стійкий до осипання.

На державних сортовипробувальних станціях та дільницях за роки випробування отримали урожай 35,3-40,1 ц/га, що на 3,6-11,9

відсотків більше національних стандартів. Потенційна можливість сорту - 85 ц/га.

Відноситься до сортів пивоварного призначення. Білка має 11,2-12,4%, плівчастість 8-9, екстрактивних речовин - 77-79, крохмалю - 58-62%.

Борошнистою россою, бурю іржею, гельмінтоспоріозом та летючою сажкою уражується нижче або на рівні стандартів.

Рекомендований для вирощування у всіх природно-кліматичних зонах.

Джерело - Виведений в інституті рослинництва ім. В.Я. Юр'єва.

Різновидність – медікум.

Форма куща прямостояча. Колос дворядний, солом'яно-жовтий, нещільний (на 4 см колосового стрижня 10-11 члеників), довжина 6-9 см, слабо поникає, солом'яно-жовтого кольору, ромбічної форми. Остюки довгі (довші колоса в 1,5 раза), вгорі слабо зазубрені, зубчики розміщені по обох краях від основи до верху. Квіткові луски зморшкуваті, лінійно-ланцетні, тоненькі, добре помітна зазубреність першої пари нервів. Перехід квіткової луски в остюк поступовий, основна щетина довговолосиста. Зернівка еліптична, нижня частина трохи вкорочена і розширена, жовтого кольору, маса 1000 зерен - 43-49г. Середньостиглий, вегетаційний період 70-85 днів. Солома середньої довжини (73-75 см), міцна, стійка до вилягання.

За даними науково-дослідних установ, рекомендується висівати за 100-відсоткової господарської придатності 4,5-5 млн/га насінин.

Запізнення з сівбою на 5-10 днів, призводить до недобору врожаю 2,3-7,1 ц/га. Сорт напівінтенсивного типу, пластичний, стійкий до осипання.

На державних сортовипробувальних станціях та дільницях за роки випробування отримали урожай 39,5-39,9 ц/га, що на 5,2-8,1 відсотка більше національних стандартів. Потенційна можливість сорту 90 ц/га.

Відноситься до сортів пивоварного призначення. Білка має 10,7-12 відсотків, плівчастість 8-10, екстрактивних речовин 79, крохмалю 58-60 відсотків.

Стійкий до ураження борошнистою россою, бурю іржею; гельмінтоспоріозом уражується слабо.

Рекомендований для вирощування в зонах Лісостепу і Полісся.

Бадьорий - Виведений в інституті рослинництва ім.Юр'єва.

Різновидність – нутанс. Форма куща прямостояча. Колос дворядний, нещільний, солом'яно-жовтий (на 4 см колосового стрижня 10-11 члеників), довжина 7-10 см, слабо поникає, ромбічної форми. Остюки солом'яно-жовті, довгі, вгорі слабо зазубрені, зубчики розміщені по обох краях від основи до верху. Квіткові луски дрібно-зморшкуваті, лінійно-ланцетні, тоненькі, добре помітна зазубреність першої пари нервів. Перехід квіткової луски в остюк поступовий, основна щетинка довговолосиста. Зернівка еліптична, нижня частина трохи вкорочена і розширена, жовтого кольору, маса 1000 зерен - 45,1-45,9 г.

Сорт середньостиглий, дозріває за 71-86 днів. Солома середньої довжини (72-74 см), міцна, стійка до полягання.

За даними науково-дослідних установ, рекомендується висівати за 100-відсоткової господарської придатності 4,5-5 млн/га насінин.

Запізнення з сівбою на 5-10 днів призводить до недобору 3,7-9 ц/га.

Сорт інтенсивного типу. Добрі результати дає при внесенні повного мінерального добрива.

На державних сортовипробувальних станціях та дільницях за роки випробування отримали урожай 36,6-39,8 ц/га, гарантована надбавка складає 8,4-8,6 відсотків до національних стандартів.

Потенційна можливість сорту 95 ц/га. Відноситься до сортів пивоварного призначення. Білка має 10,3-11,8 відсотка, екстрактивних речовин - 78, крохмалю - 57-61 відсоток.

Стійкий до ураження борошнистою росою, гельмінтоспориозом.

Рекомендований для вирощування у зонах Лісостепу і Полісся.

Амулет - Заявник фірма Осева Прага с.р.о., Чехія.

Різновидність – нутанс.

Форма куща прямостояча. Колос дворядний, злегка звужується до верхівки, середньої щільності (на 4 см колосового стрижня 12-14 члеників), довжина 11-13 см, слабо поникає. Остюки довгі, паралельні, зазубрені, зубчики розміщені по обох краях від основи до верху. Квіткові луски лінійно-ланцетні, зморшкуваті, тоненькі, добре видна зазубреність першої пари нервів. Перехід квіткової луски в остюк поступовий, основна щетинка довговолосиста. Зернівка видовжено-овальної форми, жовтого кольору, маса 1000 зерен 45-51 г.

Середньостиглий, вегетаційний період 74-87 днів. Солома низькоросла (48-63 см), міцна, стійка до вилягання.

За даними заявника, рекомендується висівати за 100-відсоткової господарської придатності 4,5-5 млн/га насінин.

Запізнення з сівбою на 5-10 днів призводить до недобору врожаю 2,8-7,7 ц/га. Сорт інтенсивного типу, стійкий до осипання.

На державних сортовипробувальних станціях та дільницях за роки випробування отримали врожай 38,7-39,1 ц/га, гарантована надбавка складає 3,1 відсотка до національних стандартів.

Потенційна можливість сорту 85 ц/га.

Відноситься до сортів пивоварного призначення. Білка має 10,1-11,3 відсотка, плівчастість 8-10, екстрактивних речовин 80, крохмалю – 55-61 відсоток. Стійкий до ураження борошнистою росою, гельмінтоспориозом.

Рекомендований для вирощування у зоні Полісся.

Донецький 12 - Виведений в Донецькому інституті агропромислового виробництва методом схрещування.

Різновидність медикум.

Форма куща прямостояча. Колос дворядний, солом'яно-жовтий, середньої щільності (на 4 см колосового стрижня 12-14 члеників), довжина 11-12 см, слабо поникає, солом'яно-жовтий, циліндричної форми. Колоскові луски вузькі. Остюки довгі (довші за колоса в 1,5-2 рази), зазубрені, еластичні. Квіткові луски лінійно-ланцетні, вузькі, середньої довжини, добре помітна зазубреність першої пари нервів. Перехід квіткової луски в остюк по ступовий, основна щетина довговолосиста. Зернівка напіввидовжена, жовтого кольору, маса 1000

зерен 45-54 г.

Середньостиглий, вегетаційний період 71-86 днів. Солома середньої довжини 60-70 см, міцна, стійка до вилягання.

За даними науково-дослідних установ, рекомендується висівати за 100-відсоткової господарської придатності 4,5-5 млн/га насінин.

Запізнення з сівбою на 5-10 днів призводить до недобору врожаю до 10 ц/га. Сорт інтенсивного типу, стійкий до осипання. Добрі результати дає при внесенні повного мінерального добрива.

На державних сортовипробувальних станціях та дільницях за роки випробування отримали урожай 31,1-37,8 ц/га. Потенційна можливість сорту 85 ц/га.

Білка має 12,6-13,7 відсотків, вихід крупи складає 44,4%, вирівняність 92,8-95,1%.

Стійкий до ураження борошнистою росю, бурою іржею.

Рекомендований для вирощування у зонах Степу і Лісостепу.

Неофіт - Виведений Вінницькою державною обласною сільськогосподарською станцією методом гібридизації.

Різновидність – нутанс. Форма куща прямостояча. Колос дворядний, злегка звужується до верхівки, нещільний (на 4 см колосового стрижня припадає 9-11 члеників), довжина 8-9 см, слабо поникає, солом'яно-жовтого кольору. Остюки довгі (довші колоса в 1,5-2 рази), слабо зазубрені, зубчики розміщені по обох краях від основи до верху. Квіткові луски лінійно-ланцетні, тоненькі, гладенькі, добре видна зазубреність першої пари нервів, перехід квіткової луски в остюк поступовий. Зернівка напівкругла, солом'яно-жовтого кольору, маса 1000 зерен 48-51 г.

Середньостиглий, вегетаційний період 73-87 днів. Солома середньої довжини (59-61 см), міцна, стійка до вилягання.

За даними науково-дослідних установ, рекомендується висівати за 100-відсоткової господарської придатності 4,5-5 млн/га насінин.

Запізнення з сівбою на 5-10 днів призводить до недобору врожаю до 7,5 ц/га. На державних сортовипробувальних станціях та дільницях за роки випробування отримали урожай 36,2-39,7 ц/га, що на 6,7-7,9 відсотків більше національних стандартів. Потенційна можливість сорту 85 ц/га. Білка має 12,6-13,7 відсотка, вихід крупи 44,3-44,5%, вирівняність 84,8-86,3%. Стійкий до ураження борошнистою росю, гельмінтоспоріозом та летючою сажкою уражується нижче або на рівні стандартів.

Рекомендований для вирощування у зонах Лісостепу і Полісся.

Південний - Виведений у Селекційно-генетичному інституті УААН методом схрещування.

Різновидність нутанс.

Форма куща прямостояча. Колос дворядний, злегка звужується до верхівки, середньої щільності (на 4 см колосового стрижня припадає 12-14 члеників), неламкий. Колосові луски середньої довжини, вузькі. Квіткові луски зморшкуваті, лінійно-ланцетні, тоненькі. Перехід квіткової луски в остюк поступовий. Основна щетинка довговолосиста.

Середньостиглий, досягає за 76-84 дні. Солома середньої довжини (63-73 см), міцна. Стійкий до вилягання та осипання. Має підвищену стійкість до посухи.

Краще стандартів використовує осадки другої половини вегетації.

За даними заявника, рекомендується висівати за 100-відсоткової господарської придатності 4,5-5 млн/га насіння. Запізнення із сівбою на 5-10 днів призводить до недобору врожаю до 8 ц/га.

Сорт напівінтенсивного типу, пластичний. Стійкий до весняних заморозків. Здатний в умовах Степу забезпечувати врожай 53-64 ц/га.

Цінний. Має відмінні круп'яні якості. Білка має в зоні Степу – 13,6%, вихід крупи – 44,4%, високу вирівняність зерна – 97,3%. Борошнистою росю, бурою іржею, гельмінтоспоріозом уражується нижче стандартів.

Рекомендований для вирощування у зонах Степу та Лісостепу.

Невада - Заявник – фірма Секобра, Франція.

Виведений методом схрещування. Різновидність нутанс.

Форма куща прямостояча. Колос дворядний, середньої щільності, солом'яно-жовтий (на 4 см колосового стрижня 11-13 члеників), довжина 7-9 см, слабо поникає, не ламається.

Колоскова луска тоненька. Остюки солом'яно-жовті, довгі, слабо розходяться, сильно зазубрені. Квіткова луска ніжна, зморшкувата, нервація добре виражена, перехід квіткової луски в остюк поступовий. Щетинка біля основи зернівки довговолосиста. Зернівка еліптична, жовта, велика. Маса 1000 зерен – 45,1г.

Середньоранній, дозріває на 3-4 дні раніше стандартів, - за 72-79 днів. Солома (58-59см) міцна, стійка до вилягання та осипання.

За даними заявника, рекомендується висівати за 100-відсоткової господарської придатності 4- 4,5 млн/га насіння.

Запізнення із сівбою на 5-10 днів призводить до недобору врожаю до 11 ц/га.

Сорт інтенсивного типу. Добре реагує на повне внесення мінерального живлення.

Пивоварні якості добрі. Білка має 10,7-11,4%, плівчастість – 8-9%, екстрактивних речовин 79-81%.

Високоврожайний. На державних сортовипробувальних станціях та дільницях за роки випробування отримали середній врожай 39,9-42,1 ц/га, максимальний на Бородянській державній сортовипробувальній станції - 88,7 ц/га.

Летючою сажкою та борошнистою росю уражується середньо.

Рекомендований для вирощування у зонах Лісостепу та Полісся.

Пеяс - Заявник – фірма Осева Прага с.р.о, Чехія.

Виведений методом схрещування. Різновидність нутанс.

Форма куща прямостояча. Колос веретеноподібної форми, дворядний, нещільний, солом'яно-жовтий (на 4 см колосового стрижня 11-12 члеників), довжина 7-9 см, слабо поникає, не ламається. Остюки солом'яно-жовті, довгі, слабо розходяться, тоненькі, ніжні.

Квіткова луска зморшкувата, нервація добре виражена, перехід квіткової луски в остюк поступовий. Щетинка біля основи зернівки довговолосиста. Зернівка еліптична, жовта. Маса 1000 зерен – 43,4г.

Середньостиглий, дозріває за 76-81 день. Солома середньої довжини 59-63 см, міцна, стійка до полягання та осипання.

За даними заявника, рекомендується висівати за 100-відсоткової господарської придатності 4-4,5 млн/га насінин. Запізнення із сівбою на 5-10 днів призводить до недобору врожаю до 9 ц/га.

Сорт інтенсивного типу. Добре реагує на внесення повного мінерального живлення. Пивоварні якості добрі. білка має 11,4-11,9%, плівчастість 8-10%, екстрактивних речовин до 82%.

Високоврожайний. На Верхівській державній сортовипробувальній станції отримали врожай 81,7 ц/га.

Летючою сажкою та борошнистою росою пошкоджується слабо.

Рекомендований для вирощування у зонах Лісостепу та Полісся.

Толар - Заявник – фірма Осева Прага с.р.о., Чехія.

Виведений методом індивідуального добору. Різновидність нутанс.

Форма куща прямостояча. Колос дворядний, злегка звужується до верхівки, середньої щільності (на 4 см колосового стрижня 12-14 члеників), довжина 7-8 см, слабо поникає. Остюки довгі, ніжні, перевищують довжину колоса у 1,5 рази. Квіткові луски не мають забарвлення. Перехід квіткової луски в остюк поступовий. Щетина біля основи зерна волосиста.

Зерно еліптично-ромбічне, жовте, крупне. Маса 1000 зерен – 45,3г.

Рослини середньої висоти, стійкі до осипання.

Середньостиглий, дозріває за 76-83 дні. Солома середньої довжини – 66см, міцна.

За даними заявника рекомендується висівати за 100-відсоткової господарської придатності 4-4,5 млн/га насінин. Запізнення з сівбою на 5-10 днів призводить до недобору врожаю до 12 ц/га.

Сорт інтенсивного типу. Добрі результати дає при внесенні повного мінерального живлення.

Особливістю сорту є те, що він відрізняється підвищеною кущистістю та більш раннім строком сіву.

На державних сортовипробувальних станціях та дільницях за роки випробування отримали урожай 46,5 ц/га. Відноситься до сортів пивоварного напрямку. білка має 11,2%, плівчастість 8-10%, екстрактивних речовин 80-81%.

Борошнистою росою, бурю іржею, гельмінтоспориозом уражується нижче стандартів.

Рекомендований для вирощування у зоні Лісостепу.

Целінка - Заявник – фірма Флорімонд Депре, Франція.

Виведений методом схрещування. Форма куща прямостояча.

Колос дворядний, солом'яно-жовтий, завдовжки 6-8см, середньої щільності. Остюки довгі (довші від колоса в 1,5 рази), слабо зазубрені. Квіткові луски лінійно-ланцетні, тоненькі, зморшкуваті. Перехід квіткової луски в остюк поступовий, основна щетинка зернівки довговолосиста. Зернівка видовжено-овальної форми, жовтого кольору, маса 1000 зерен 43,9г.

Середньостиглий, вегетаційний період коливається в межах 72-88 днів, на 1-3 дні раніше стандартів. Солома середньої довжини - 62,1-69,7 см, міцна, стійка до вилягання.

За даними заявника рекомендується висівати за 100-відсоткової господарської придатності 4,5-5 млн/га насінин. Запізнення із сівбою на 5-10 днів призводить до недобору врожаю 5-14 ц/га. Сорт інтенсивного типу. Добрі результати дає при внесенні повного мінерального живлення.

Високоврожайний. На Крижопільській державній сортовипробувальній станції отримали врожай 85,3 ц/га.

Відноситься до сортів пивоварного призначення. Білка має 10,8-11,5%, плівчастість 8-10, екстрактивних речовин 80-82%.

Стійкий до ураження борошнистою росою, гельмінтоспориозом.

Рекомендований для вирощування у зонах Степу, Лісостепу та Полісся.

Чудовий – Виведений у Селекційно-генетичному інституті УААН методом схрещування. Різновидність нутанс.

Форма куша прямостояча. Стебло висотою 65-72 см. Колос дворядний, середньої довжини, солом'яно-жовтий, нещільний (на 4 см припадає 10 члеників), слабо пониклий (ближче до прямостоячого), членики колосового стрижня майже не опушені. Добре озернений колос (19-23 зерен в колосі).

Листки стоячі, зеленого кольору, проміжної форми, опушення відсутнє.

Остюки довгі, зазублені, трохи розходяться, солом'яно-жовті.

Колоскова луска – мала, вузька, нервація відсутня. Квіткова луска зморшкувата, нервація добре виявлена, перехід квіткової луски в остюк поступовий, основна щетинка довго волосиста.

Зернівка видовжено-овальна, розмір 12х14мм, жовтого кольору. Маса 1000 насінин 45-50г.

Середньостиглий, дозріває за 79-84 дні. Стійкий до вилягання, посухи та осипання.

Має високу кушистість, вирівняний стеблостой.

Сорт напівінтенсивного типу, пластичний. Стійкий до весняних заморозків.

Агротехніка – звичайна для зони вирощування. На державних сортовипробувальних станціях за роки випробування отримали середній врожай – 44,6 ц/га, що на 14 відсотків більше стандартів.

Потенційна можливість сорту – 95 ц/га. Сорт має високі пивоварні властивості. Індекс пивоварної щільності – 97. Білка має 10,5-11,5, екстрактивність – 80 відсотків.

Твердою сажкою і карликовою іржею уражується слабо.

Рекомендований для вирощування у зонах Лісостепу та Полісся.

Носівський 21 – Виведений Носівською селекційно-дослідною станцією шляхом гібридизації.

Різновидність нутанс.

Форма куша прямостояча. Колос дворядний, злегка звужується до верхівки, циліндричний, середньої щільності, довгий – 7-10 см.

Листки зелені, ланцетної форми, опушення слабо виражене.

Остюки довгі (довші колоса в 1,5-2 рази), зазублені, солом'яно-жовті.

Колоскові луски вузькі, нервація слабо виражена. Квіткові луски вузькі, нервація слабо виражена. Квіткові луски лінійно-ланцетні, тоненькі, гладенькі. Перехід квіткової луски в остюк поступовий.

Зернівка ромбічна, велика, соломя'но-жовта. Маса 1000 насінин 48-50г.

Середньостиглий, вегетаційний період 79-87 днів. Солома середньої довжини, міцна.

Строки сівби ранні – перші дні початку польових робіт, норма висіву 4,50-5,0 млн.га схожих насінин.

На державних сортовипробувальних станціях отримали середній врожай за роки випробування – 45 ц/га, що на 5 відсотків більше стандартів. Потенційна можливість сорту 90 ц/га.

Сорт напівінтенсивного типу. Має хороші пивоварні властивості. Білка – 11, екстрактивність 78-80 відсотків. Стійкий до ураження борошнистою росою, бурюю іржею.

Рекомендований для вирощування у зонах Лісостепу та Полісся.

Асторія – Заявник – фірма “Се кобра”, Франція. Виведений методом схрещування.

Різновидність нутанс.

Колос двохрядний, соломя'но-жовтий, остистий, конусоподібної форми, середньої щільності (на 4 см колосового стрижня припадає 12-14 члеників), неламкий. Колоскові луски середньої довжини, вузькі.

Остюки довгі, у півтора рази перевищують довжину колоса, зазублені, при досяганні не опадають, ніжні, еластичні. Добре помітна перша пара квіткової луски. Перехід квіткової луски в остюк поступовий.

Зернівка жовта, плівчата, еліптична. Маса 1000 зерен 45-47г.

Середньостиглий, вегетаційний період коливається в межах 78 днів. Солома середньої довжини – 85 см, міцна, стійка проти вилягання.

Посухостійкість середня. Стійкість проти вилягання висока.

Сорт інтенсивного типу, пластичний.

За даними заявника рекомендується висівати за 100-відсоткової господарської придатності 4 млн/га насінин.

Запізнення із сівбою на 5-10 днів призводить до значного недобору врожаю.

За роки випробування на державних сортовипробувальних станціях отримали середній врожай 43,4-45,9 ц/га.

Потенційна можливість сорту 95 ц/га.

Відновиться до сортів пивоварного призначення. Білка має 10,4-11,5%, плівчастість 8-9, екстрактивних речовин 80 відсотків.

Слабко уражується гельмінтоспоріозом, більш стійкий проти борошнистої роси, середньо пошкоджується шведською мухою.

Перед посівом обов'язкове протруювання насіння проти летючої сажки.

Рекомендований для вирощування у зонах Лісостепу та Полісся.

Ефект – Виведений Інститутом рослинництва ім. Юр'єва методом Різновидність нутанс.

Форма куща прямостояча. Колос двохрядний, довгий, веретеноподібний, солом'яно-жовтий, нещільний (на 4 см колосового стрижня припадає 12 члеників).

Остюки довгі, майже паралельні, у півтора-два рази перевищують довжину колоса, зазублені, при досяганні не опадають, ніжні, еластичні.

Перехід квіткової луски в остюк поступовий. Колоскова луска мала, вузька, нервація відсутня. Зернівка жовта, плівчаста, видовжено-овальна. Маса 1000 зерен 48г.

Середньостиглий, вегетаційний період коливається в межах 83 дні. Солома середньої довжини – 79 см, міцна, стійка проти вилягання.

Сорт напівінтенсивного типу. За даними заявника рекомендується висівати за 100-відсоткової господарської придатності 4,5-5 млн/га насінин.

За роки випробування на державних сортовипробувальних станціях отримали середній врожай 42,6 ц/га. Потенційна можливість сорту 75-80 ц/га. Має відмінні круп'яні якості. Білка – 13,5%, вирівняність зерна 98%, вихід крупи – 44,5%. Середньо пошкоджується шведською мухою.

Перед посівом обов'язкове протруювання насіння проти летючої сажки.

Рекомендований для вирощування у зоні Полісся.

Султан – Заявник – фірма Се кобра (Франція).

Виведений методом схрещування.

Різновидність нутанс.

Форма куща прямостояча. Колос дворядний, середньої щільності, солом'яно-жовтий (на 4 см колосового стрижня 10-12 члеників), довжина 8-9 см, слабо поникає не ламається.

Листки темно-зелені, середньої ширини.

Колоскова луска тоненька. Остюки солом'яно-жовті, довгі, слабо розходяться, сильно зазублені.

Квіткова луска ніжна, зморшкувата, нервація добре виражена. Перехід квіткової луски в остюк поступовий.

Щетинка біля основи зернівки довго волосиста.

Зернівка еліптична, жовта, велика. Маса 1000 насінин – 45г.

Середньостиглий, дозріває на 4 дні раніше стандартів. Солома міцна, стійка до вилягання та осипання.

За даними заявника, рекомендується висівати за 100-відсоткової господарської придатності 4,0-4,5 млн/га схожих насінин. Запізнення із сівбою призводить до значних втрат врожаю.

Сорт інтенсивного типу, пластичний. Добре реагує на повне внесення мінерального живлення.

Пивоварні якості відмінні. Білка має 10,7-11,4%, екстрактивність – 80 відсотків.

Високоврожайний. На державних сортовипробувальних станціях отримали середній врожай 41,2-46,4 ц/га. Потенційна можливість сорту – 100 ц/га.

Стійкий до ураження борошнистою росою, гельмінтоспоріозом.

Рекомендований для вирощування у зонах Степу, Лісостепу та Полісся.

Скіф – заявник Вінницька о.д.с.г.д. станція.

Різновидність нутанс.

Форма куша прямостояча. Стебло середньої висоти – 86 см. Листок зелений з фіолетовим відтінком, опушення відсутнє, ланцетовидної форми.

Колос дворядний, солом'яно-жовтий, підвищеної щільності, довжиною – 8-9 см.

Остюки довгі – 12-13 см, зазублені, притиснуті до колосу, під час досягання часто опадають.

Колоскові луски гладенькі. Квіткові луски не мають забарвлення, з маленькими зубчиками. Перехід квіткової луски в остюк поступовий. Основна щетинка повстяна.

Сорт середньостиглий. Вегетаційний період 95 днів. За даними заявника, рекомендується висівати за 100-відсоткової господарської придатності 4,5-5 млн/га насінин.

Пивоварного напрямку. Білка має 10,5, екстрактивність – 80, крохмалю – 62 відсотки.

Посухостійкість середня. Сорт середньостійкий проти летючої і твердої сажки.

На державних сортодослідних станціях отримали середній врожай за роки випробування 42,3 ц/га, що на 4,8 ц/га більше стандартів. Потенційна можливість сорту 85 ц/га.

Адажіо – заявник „Секобра”, Франція.

Різновидність нутанс.

Колос дворядний, середньої довжини – 8-10 см, середньої щільності (на 4 см колосового стрижня припадає 12-14 члеників), слабо звужується до верхівки, солом'яно-жовтий.

Остюки довгі, зазублені, паралельні, тонкі, еластичні, жовті. Колоскова луска слабо зморшкувата, нервація добре виявлена, перехід в остюк поступовий. Основна щетинка зерна довговолосиста.

Кущ прямостоячий, листки не опушені, проміжні, зелені. Висота рослин – 85 см.

Зернівка жовта, велика, продовженої форми. Маса 1000 насінин – 50г.

Середньостиглий, досягає за 83 дні. Сорт інтенсивного типу.

За даними заявника рекомендується висівати за 100-відсоткової господарської придатності 4,0-4,5 млн/га насінин. Запізнення із сівбою приводить до значних втрат врожаю.

Агротехніка звичайна для зони вирощування.

Має високі пивоварні властивості. Білка має 10,5%, плівчастість – 8-9, екстрактивних речовин 80-82, крохмалю – 58-62 відсотки.

Має комплексну стійкість до більшості поширених хвороб: летючої сажки, твердої і чорної сажки, борошнистої роси, гельмінтоспориозу.

На державних сортодослідних станція отримали середній врожай 47,0 ц/га, що на 7,6 відсотків більше стандартів. Потенційна можливість сорту 90 ц/га.

Рекомендований для вирощування по зонах Лісостепу та Полісся.

Докучаєвський 15 – заявник ХДАУ ім. В.В.Докучаєва.

Різновидність – нутанс. Форма куща прямостояча. Стебло середньої висоти – 72 см. Листки темно-зелені, середньої ширини.

Колос двохрядний, солом'яно-жовтий, нещільний (на 4 см колосового стрижня припадає 10-11 члеників), під час достигання поникає середньо, неламкий. Часто із піхви листка повністю не виходить.

Остюки довгі, зазубрені, ніжні, еластичні, світло-жовті.

Зернівка еліптична, світло-жовта, велика. Маса 1000 насінин – 46г.

Квіткова луска тонка, дрібно зморшкувата. Перехід її в остюк поступовий.

Вегетаційний період 80 днів. Середньо стійкий проти вилягання, а в дуже вологі роки дещо полягає. Посухостійкість середня.

За даними заявника рекомендується висівати за 100-відсоткової господарської придатності 4,5-5 млн/га насінин.

Пивоварний. Вміст білка 11%, екстрактивність – 78, крохмалю – 62 %.

Летючою сажкою, борошнистою росою і гельмінтоспориозом уражується середньо.

На державних сортодослідних станціях отримали середній врожай 42,7 ц/га, що на 5,7 відсотки більше стандартів. Потенційна можливість сорту 87 ц/га.

Рекомендований для вирощування по зонах Лісостепу та Полісся.

Данута – заявник “Заатен Уніон”, Німеччина.

Різновидність нутанс.

Форма куща прямостояча. Колос дврядний, злегка звужується до верхівки, середньої щільності (на 4 см колосового стрижня 12-14 члеників), довжина 11-13 см, слабо поникає. Остюки довгі, паралельні, зазублені, зубчики розміщені по обох краях від основи до верху.

Квіткові луски лінійно-ланцетні, тоненькі.

Перехід квіткової луски в остюк поступовий, основна щетинка довговолосиста.

Зернівка видовжено-овальної форми, жовтого кольору, маса 1000 насінин – 50г.

Середньостиглий, вегетаційний період 78 днів. Солома міцна, стійка проти вилягання.

За даними заявника, рекомендується висівати за 100-відсоткової господарської придатності 3,5-4,0 млн/га насінин.

Сорт інтенсивного типу, стійкий до осипання. Добрі результати дає при внесенні повного мінерального живлення.

Особливістю сорту є те, що він відрізняється підвищеною кустистістю та раннім строком сіву.

Відноситься до сортів пивоварного призначення. Білка має 10,5, плівчастість 7-8, екстрактивних речовин – 80-82 відсотки.

Борошнистою росю, бурю іржею уражується нижче стандартів.

На державних сортодослідних станціях отримали середній врожай за роки випробування 47,1 ц/га, що на 7,4 відсотків більше стандартів. Потенційна можливість сорту 100 ц/га.

Рекомендований для вирощування по зонах Степу, Лісостепу та Полісся.

Вакула – заявник СГІ.

Різновидність – паллідум.

Кущ прямостоячий, листки не опушені, проміжні, зелені. Колос шестирядний, середньої довжини (7-9 см), середньої щільності (на 4 см колосового стрижня 10-11 члеників), неламкий, слабо пониклий, прямокутної форми з переходом у ромбічну, солом'яно-жовтий.

Остюки довгі – 14-18 см, злегка розлогі, тонкі, еластичні, слабо зазубрені, у верхній частині жовті, при обмолоті легко відділяються.

Колоскова луска тоненька, ніжна, з рідкими волосками. Квіткова луска середньо зморшувата, нервація добре виявлена, без зубчиків, перехід в остюк поступовий. Основна щетинка зерна коротка, довго волосяна.

Висота рослин 65-75 см.

Зернівка видовжено-овальна, розмір 13х14 мм, жовта, вирівняна.

Маса 1000 насінин 44г.

Середньостиглий, дозріває за 80 днів.

Високий врожай завжди гарантований, якщо з весни склалися умови для нормального розвитку вузлової кореневої системи і в ґрунті є достатньо поживних речовин.

Сорт придатний для вирощування в умовах посухи і підвищеної кислотності ґрунтів.

За даними заявника рекомендується висівати за 100-відсоткової господарської придатності 4,5-5 млн/га насінин.

Сорт має групову стійкість до сажкових хвороб, борошнистої роси, гельмінтоспориозу.

На державних сортодослідних станціях отримали середній врожай 48,4 ц/га, що на 8,8 відсотки більше стандартів. Потенційна можливість сорту 105 ц/га.

Рекомендований для вирощування по зонах Степу, Лісостепу та Полісся.

Пасадена – заявник фірма “Земундо”, Нідерланди.

Різновидність нутанс. Форма куща прямостояча. Колос двохрядний, злегка звужується до верхівки, середньої щільності (на 4 см колосового стрижня 12-14 члеників), довжина 8-9 см, слабо поникає. Листки світло-зелені, без опушення, ланцетовидної форми.

Остюки довгі, ніжні, перевищують довжину колоса у півтора-два рази. Квіткові луски не мають забарвлення. Перехід квіткової луски в остюк поступовий. Щетинка біля основи зерна довговолосиста.

Зерно еліптично-ромбічне, жовте, велике. Маса 1000 зерен – 50г. Рослини середньої висоти, за стійкістю проти вилягання дещо перевищують стандарти.

Середньо стійкий, дозріває за 92 дні. Солома середньої довжини – 85 см, міцна.

Сорт інтенсивного типу. Добрі результати дає при внесенні повного мінерального живлення.

Особливістю сорту є те, що він відрізняється підвищеною кущистістю та раннім строком сіву. Відноситься до сортів пивоварного призначення. Білка має 10-11%, плівчастість – 7-8, екстрактивних речовин – 80-82, крохмалю – 62 відсотки.

Досить стійкий проти ураження гельмінтоспориозом. Обов'язкове протруювання насіння проти сажки.

На державних сортодослідних станціях отримали середній врожай 45,3 ц/га, що на 9,4 відсотки більше стандартів. Потенційна можливість сорту 95 ц/га.

Рекомендований для вирощування по зонах Лісостепу та Полісся.

Табора - Заявник - фірма Секобра Ремерш, Франція.

Виведений методом схрещування.

Різновидність нутанс.

Колос дворядний, середньої довжини (8 – 10 см), середньої щільності (10 – 11 члеників на 4 см колосового стрижня), неламкий, слабо звужується до верхівки, солом'яно-жовтий.

Остюки довгі, зазубрені, паралельні, тонкі, еластичні, жовті.

Колоскова луска мала, без опушення.

Квіткова луска слабозморшкувата, нервація добре виявлена, перехід в остюк поступовий. Основна щетинка зерна довговолосяна.

Кущ розлогий, листки неопушені, проміжні, зелені.

Висота рослин - 70-85 см.

Зернівка жовта, велика, подовженої форми. Маса 1000 зерен – 45-50 г.

Середньостиглий, дозріває за 81 – 83 дні.

Сорт інтенсивного типу. За даними заявника рекомендується висівати за 100 – відсоткової господарської придатності 4 – 4,5 млн/га насінин.

Дуже реагує на запізнення із сівбою.

Агротехніка звичайна для зони вирощування. За роки випробування на державних сортовипробувальних станціях отримали середній врожай 38,2-44,9 ц/га, що на 4,6-9,6 % більше стандартів.

Максимальний врожай сорту отримали на Андрушівській державній сортовипробувальній станції в 2000 році - 85 ц/га.

Має високі пивоварні властивості. Білка має 10,5 – 11,3 %, плівчастість – 8-9, екстрактивність речовин – 78-80, крохмалю 58 – 62 %.

Стійкість до хвороб та шкідників. Має комплексну стійкість до більшості поширених в Україні хвороб: летючої, твердої і чорної сажки, борошнистої роси, гельмінтоспориозу.

Рекомендований для вирощування в зонах Лісостепу, Полісся та Степу.

Пеяс - Заявник – фірма Осева Прага с.р.о, Чехія.

Виведений методом схрещування. Різновидність нутанс.

Форма куща прямостояча. Колос веретеноподібної форми, дворядний, нещільний, солом'яно-жовтий (на 4 см колосового стрижня 11-12 члеників), довжина 7-9 см, слабо поникає, не ламається. Остюки солом'яно-жовті, довгі, слабо розходяться, тоненькі, ніжні.

Квіткова луска зморшкувата, нервація добре виражена, перехід квіткової луски в остюк поступовий. Щетинка біля основи зернівки довговолосиста. Зернівка еліптична, жовта. Маса 1000 зерен – 43,4г.

Середньостиглий, дозріває за 76-81 день. Солома середньої довжини 59-63 см, міцна, стійка до полягання та осипання.

За даними заявника, рекомендується висівати за 100-відсоткової господарської придатності 4-4,5 млн/га насінин.

Запізнення із сівбою на 5-10 днів призводить до недобору врожаю до 9 ц/га.

Сорт інтенсивного типу. Добре реагує на внесення повного мінерального живлення. Пивоварні якості добрі. білка має 11,4-11,9%, плівчастість 8-10%, екстрактивних речовин до 82%.

Високоврожайний. На Верхівській державній сортовипробувальній станції отримали врожай 81,7 ц/га.

Летючою сажкою та борошнистою росою пошкоджується слабо.

Рекомендований для вирощування в зонах Лісостепу та Полісся.

Аннабель – заявник фірма “Заатен Уніон”, Німеччина.

Різновидність нутанс. Форма куща прямостояча. Колос двохрядний, злегка звужується до верхівки, середньої щільності (на 4 см колосового стрижня 12-14 члеників), довжина 8-9 см, слабо поникає. Листки світло-зелені, без опушення, ланцетовидної форми.

Остюки довгі, ніжні, перевищують довжину колоса у півтора-два рази. Квіткові луски не мають забарвлення. Перехід квіткової луски в остюк поступовий. Щетинка біля основи зерна довговолосиста.

Зерно еліптично-ромбічне, жовте, велике. Маса 1000 зерен – 50г. Рослини середньої висоти, за стійкістю проти вилягання дещо перевищують стандарти.

Середньо стійкий, дозріває за 92 дні. Солома середньої довжини – 85 см, міцна.

Сорт інтенсивного типу. Добрі результати дає при внесенні повного мінерального живлення.

На державних сортовипробувальних станціях отримали середній врожай 50,1 ц/га, що на 30,1 відсотків більше стандартів.

Особливістю сорту є те, що він відрізняється підвищеною кущистістю та раннім строком сіву. Відноситься до сортів пивоварного призначення. Білка має 10-11%, плівчастість – 7-8, екстрактивних речовин – 80-82, крохмалю – 62 відсотки.

Досить стійкий проти ураження гельмінтоспориозом. Обов'язкове протруювання насіння проти сажки. Рекомендований для вирощування в зонах Лісостепу та Полісся.

Чарівний – заявник ЗАТ “Селена”, Селекційно-генетичний інститут.

Різновидність нутанс. Форма куща прямостояча. Колос дворядний, злегка звужується до верхівки, середньої щільності (на 4 см колосового стрижня припадає 12-14 члеників), неламкий. Колосові луски середньої довжини, вузькі, членики колосового стрижня майже не опушені. Остюки довгі, зазубрені, трохи розходяться, солом'яно-жовті. Квіткові луски лінійно-ланцетні, тоненькі, зморшкуваті. Добре помітна перша пара квіткової луски. Перехід квіткової луски в сотюк поступовий.

Зернівка еліптична, жовтого кольору, маса 1000 зерен – 50г. Середньостиглий, вегетаційний період – 83 дні. Солома середньої довжини 70-75 см, міцна, стійка проти вилягання.

Сорт інтенсивного типу, пластичний, стійкий проти осипання.

За даними заявника рекомендується висівати за 100-відсоткової господарської придатності 4,0-4,5 млн/га насінин.

На державних сортовипробувальних станціях отримали середній врожай – 48,1 ц/га, що на 24,9 відсотки більше стандартів.

Потенційна можливість сорту – 95 ц/га. Відноситься до сортів пивоварного призначення. Білка – 11, плівчастість – 8-9, екстрактивних речовин – 80 відсотків.

Борошнистою росю, бурою іржею, гельмінтоспориозом уражується нижче стандартів. Обов'язкове протруювання насіння проти летючої сажки.

Рекомендований для вирощування з зонах Лісостепу та Полісся.

Вінницький-28 – заявник Вінницька обласна державна сільськогосподарська станція.

Різновидність нутанс.

Форма куща прямостояча. Стебло середньої висоти – 86 см. Листок зелений з фіолетовим відтінком, опушення відсутнє, ланцетовидної форми.

Колос дворядний, солом'яно-жовтий, підвищеної щільності, довжиною – 8-9 см.

Остюки довгі – 12-13 см, зазублені, притиснуті до колосу, під час досягання часто опадають.

Колоскові луски гладенькі. Квіткові луски не мають забарвлення, з маленькими зубчиками. Перехід квіткової луски в остюк поступовий. Основна щетинка повстяна.

Сорт середньостиглий. Вегетаційний період 95 днів. За даними заявника, рекомендується висівати за 100-відсоткової господарської придатності 4,5-5 млн/га насінин.

На державних сортовипробувальних станціях отримали середній врожай 39,6 ц/га.

Пивоварного напрямку. Білка має 10,5, екстрактивність – 80, крохмалю – 62 відсотки.

Посухостійкість середня. Сорт середньостійкий проти летючої і твердої сажки.
Рекомендований для вирощування в зоні Лісостепу.

Соборний – заявник Миронівський інститут пшениці ім. В.М.Ремесла.

Різновидність нутанс.

Форма куща прямостояча. Колос дворядний, слабо звужується до верхівки, довжиною 6-9 см, солом'яно-жовтий, середньої щільності (на 4 см колосового стрижня 11-13 члеників), слабо поникає.

Остистий, остюки зазублені, пружні, перевищують довжину колоса у 1,5 рази.

Стебло середньої висоти – 88 см, світло-жовте. Листки зелені, широкі. Колоскова луска – мала, вузька, нервація відсутня.

Квіткова луска ніжна, зморшкувата. Перехід квіткової луски в остюк поступовий. Щетинка біля основи зернівки довговолосиста.

Зернівка велика, еліптичної форми. Маса 1000 насінин 48г.

Середньостиглий, вегетаційний період 87-93 дні. Стійкий до вилягання. Посухостійкість висока.

Сорт інтенсивного типу. За даними заявника рекомендується висівати за 100-відсоткової господарської придатності 4,5-5,0 млн/га насінин. Строк сівби ранній – перші дні початку польових робіт.

На державних сортовипробувальних станціях отримали середній врожай 44,9 ц/га, що на 6,6 відсотка більше стандартів.

Сорт пивоварного призначення. Вміст білка 10,2%, екстрактивних речовин – 82, плівчастість 8-9 та крохмалю 62 відсотки.

Стійкий до ураження борошнистою росою, жовтою іржею, смугастим гельмінтоспоріозом.

Рекомендований для вирощування в зонах Степу та Полісся.

Персей – заявник Миронівський інститут пшениці ім. В.М.Ремесла.

Різновидність нутанс.

Форма куща прямостояча.

Стебло середньої висоти – 81 см, листки темно-зелені, середньої ширини.

Колос дворядний, остистий, ледь звужений до верхівки, довжиною 7-11 см.

Остюки довгі, зазубрені. У період молочно-воскової стиглості остюки мають слабкий фіолетовий відтінок.

Квіткова луска ніжна, зморшкувата, нервація добре виражена. Щетинка зернівки довго волосиста. Зернівка велика, еліптичної форми. Маса 1000 зерен – 45г. Середньостиглий, вегетаційний період 87 днів.

Як сорт інтенсивного типу вимагає високої сортової агротехніки. За даними заявника, рекомендується висівати за 100-відсоткової господарської придатності 4,5-5,0 млн/га насінин.

На державних сортовипробувальних станціях отримали середній врожай 44,5 ц/га, що на 5,9 відсотка більше стандартів.

Сорт кормового і пивоварного призначення.

Білка має 11-12,5%, вихід крупи 44,5, вирівняність зерна – 96 відсотків.

Потенційна можливість сорту 95 відсотків.

Стійкий до ураження сітчастим гельмінтоспоріозом, борошнистою росою.

Рекомендований для вирощування в зоні Полісся.

Варіант – заявник Чернігівська державна с.г. дослідна станція, Носівська с.д. станція.

Різновидність - нутанс.

Форма куша прямостояча. Стебло середньої висоти – 85 см. Листки темно-зелені, середньої ширини. Колос дворядний, солом'яно-жовтий, нещільний (на 4 см колосового стрижня 10-11 члеників), довжиною 7-8 см, слабо поникає.

Остюки довгі (довші колоса в 1,5 рази), вверху слабо зазублені, зубчики розміщені по обох краях від основи до низу. Квіткові луски зморшкуваті, лінійно-ланцетні, тоненькі.

Перехід квіткової луски в остюк поступовий, основна щетинка довго волосиста.

Зернівка еліптична, нижня частина трохи вкорочена і розширена, жовтого кольору. Маса 1000 зерен 45г.

Середньостиглий, вегетаційний період – 85 днів.

За даними заявника, рекомендується висівати при 100-відсоткової господарської придатності 4,5-5 млн/га насінин.

На державних сортовипробувальних станціях отримали середній врожай 41,6 ц/га, що на 7,8 відсотка більше стандартів.

Сорт напівінтенсивного типу, стійкий до осипання.

Відноситься до сортів пивоварного призначення. Білка має 10,7-11,8 відсотків, плівчастість 8-10, екстрактивних речовин 79, крохмалю 58-60 відсотків.

Стійкий до ураження борошнистою росою, гельмінтоспоріозом уражується середньо.

Рекомендований для вирощування в зоні Полісся.

Докучаєвський 18 – заявник Харківський державний аграрний університет ім. В.В.Докучаєва.

Різновидність нутанс.

Форма куша прямостояча. Стебло середньої висоти – 72 см. Листки темно-зелені, середньої ширини.

Колос дворядний, солом'яно-жовтий, нещільний (на 4 см колосового стрижня припадає 10-11 члеників), під час достигання поникає середньо, неламкий. Часто із піхви листка повністю не виходить.

Остюки довгі, зазубрені, ніжні, еластичні, світло-жовті.

Зернівка еліптична, світло-жовта, велика. Маса 1000 насінин 46г.

Квіткова луска тонка, дрібно зморшкувата. Перехід її в остюк поступовий.

Веgetаційний період 80 днів. Середньо стійкий проти вилягання, а в дуже вологі роки децю полягає. Посухостійкість середня.

За даними заявника, рекомендується висівати за 100-відсоткової господарської придатності 4,5-5 млн/га насінин.

На державних сортовипробувальних станціях отримали середній врожай 41,2 ц/га, що на 6,8 відсотка більше стандартів.

Пивоварний. Вміст білка – 11, екстрактивність – 78, крохмалю – 62 відсотки.
Летючою сажкою, борошнистою росою і гельмінтоспоріозом уражується середньо.
Рекомендований для вирощування в зоні Полісся.

Княжий – заявник Інститут землеробства і тваринництва західного регіону України.

Різновидність нутанс.

Форма куша прямостояча. Колос дворядний, середньої довжини – 8-9 см, слабо звужується до верхівки, середньої щільності. Остюки довгі, ніжні, перевищують довжину колоса у півтора рази.

Зерно середнього розміру, еліптичної форми, маса 1000 насінин – 43г.

Рослини середньої висоти, досить стійкі до вилягання. Перехід квіткової луски в остюк поступовий, основна щетинка довговолосиста.

Середньостиглий, досягає за 80 днів.

За даними заявника, рекомендується висівати за 100-відсоткової господарської придатності 4,0-4,5 млн/га насінин.

На державних сортовипробувальних станціях отримали середній врожай 44,6 ц/га, що на 15,7 відсотка більше стандартів.

Належить до сортів інтенсивного типу. Пивоварні якості добрі. Вміст білка – 11, екстрактивність – 80, крохмалю – 61 відсоток.

Стійкий до ураження борошнистою росою, гельмінтоспоріозом.

Рекомендований для вирощування в зоні Полісся.

Кадікс – заявник “Секобра” Франція.

Різновидність нутанс.

Колос дворядний, середньої довжини – 8-10 см, середньої щільності (4 см колоскового стрижня – 12-14 члеників), слабо звужується до верхівки, солом'яно-жовтий.

Остюки довгі, зазубрені, паралельні, тонкі, еластичні, жовті. Колоскова луска слабо зморшкувата, нервація добре виявлена, перехід в остюк поступовий. Основна щетинка зерна довговолосиста.

Кущ прямостоячий, листки не опушені, проміжні, зелені. Висота рослин – 85 см.

Зернівка жовта, велика, подовженої форми. Маса 1000 насінин – 50г. Середньостиглий, дозріває за 83 дні. Сорт інтенсивного типу. За даними заявника рекомендується висівати за 100-відсоткової господарської придатності 4,0-4,5 млн/га насінин.

На державних сортовипробувальних станціях отримали середній врожай 42,3 ц/га, що на 9,6 відсотка більше стандартів.

Дуже реагує на запізнення із сівбою.

Агротехніка звичайна для зони вирощування.

Має високі пивоварні властивості. Білка має 10,5, плівчастість – 8-9, екстрактивність – 80-82, крохмалю 58-62 відсотки.

Має комплексну стійкість до більшості поширених хвороб: летючої сажки, твердої і чорної сажки, борошнистої роси, гельмінтоспоріозу.

Рекомендований для вирощування в зоні Полісся.

Європрестиж – заявник „Монсанто Україна”.

Різновидність нутанс. Форма куща прямостояча. Колос дворядний, циліндричний, злегка звужується до верхівки, солом'яно-жовтий, середньої щільності (на 4 см колосового стрижня припадає 12-14 члеників), неламкий.

Стебло середньої висоти – , світло-жовте, міцне. Листки зелені, опушення слабо виражене, ланцетної форми.

Остюки довгі, зазублені, солом'яно-жовті, трохи розходяться.

Квіткові луски лінійно-ланцетні, тоненькі, зморшкуваті. Добре помітна перша пара квіткової луски. Перехід квіткової луски в остюк поступовий.

Колоскові луски вузькі, рівні відносно зернівки, нервація слабо виражена.

Зернівка ромбічна, велика, маса 1000 насінин – г, солом'яно-жовтого кольору.

Середньостиглий, вегетаційний період коливається в межах – днів. Сорт інтенсивного типу, пластичний, стійкий проти осипання та полягання.

Строки сівби ранні, норма висіву 4,0-4,5 млн.га схожих насінин.

На державних сортодослідних станціях отримали середній врожай 42,2 ц/га, що на 9,4 відсотка більше стандартів. Потенційна можливість сорту 110 ц/га.

Має добрі пивоварні властивості. білка – 11,5, екстрактивність – 82 відсотки. Стійки до ураження борошнистою росою, бурною іржею.

Рекомендований для вирощування у зонах Лісостепу та Полісся.

Лінус – заявник фірма „Данія Хандел”, Данія.

Різновидність нутанс. Форма куща прямостояча. Колос дворядний, злегка звужується до верхівки, середньої щільності (на 4 см колосового стрижня припадає 12-14 члеників), довжина 11-13 см, слабо поникає. Остюки довгі, паралельні, зазублені, зубчики розміщені по обох краях від основи до верху.

Квіткові луски лінійно-ланцетні, тоненькі. Перехід квіткової луски в остюк поступовий, основна щетинка довговолосиста.

Зернівка видовжено-овальної форми, солом'яно-жовтого кольору. Маса 1000 насінин 45-50 г.

Середньостиглий, вегетаційний період – днів.

Солома міцна, стійка до вилягання.

Строки сівби ранні – перші дні початку польових робіт, норма висіву 4-4,5 млн/га схожих насінин.

На державних сортодослідних станціях отримали середній врожай 43,2 ц/га, що на 4,6 відсотка більше стандартів.

Сорт інтенсивного типу.

Має високі пивоварні властивості. Індекс пивоварної щільності – 97, білка має 10,5-11,5, екстрактивність – 82 відсотки.
Твердою сажкою уражується на рівні стандартів.
Рекомендований для вирощування в зоні Полісся.

КУКУРУДЗА

Харківський 291МВ – заявник Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр'єва УААН.

Біологічні ознаки: трилінійний, середньоранній гібрид (ФАО 290) з вегетаційним періодом 110-115 днів. Висота рослин 250-260 см, кількість надземних вузлів 11-12, листків на стеблі 15-16, качан довжиною 25-26 см, кількість рядів зерен 16-18, верхівка озернена, качан покритий обгорткою, прикріплюється на висоті 85 см, стрижень рожевий. Зерно напівзубовидне, жовто-оранжевого кольору, маса 1000 зерен 240-250 гр.

Стійкість до полягання, засухи, хвороб – середня.

Господарські ознаки: гібрид врожайний, потребує інтенсивних технологій вирощування з внесенням оптимальної дози мінеральних добрив.

За 3 роки випробування на сортодослідних станціях України в Лісостеповій зоні отримано середній врожай 69,5 ц/га, що на рівні стандартів.

Рекомендовано внести до Реєстру сортів рослин на 2003 рік до придатності для поширення в Україні по зоні Лісостепу.

Агро 200 СВ – заявник науково-виробниче товариство з обмеженою відповідальністю „Агро-Інтер”.

Біологічні ознаки: трилінійний, середньоранній гібрид (ФАО 200) з вегетаційним періодом 110-115 днів. Висота рослин 200-220 см, кількість надземних вузлів 10-11, листків на стеблі 14-16. Качан довжиною 22-24 см, середнього діаметру, висота прикріплення його на стеблі 66см, кількість рядів зерен 16-18, стрижень рожевий. Зерно кремнистого типу, маса 1000 зерен 260-270 гр. Вихід зерна 76 %.

Посухостійкість 8 балів, стійкість проти вилягання – висока (9 балів), холодостійкість (9 балів). Пухирчастою сажкою уражується на рівні 2 %.

Господарські ознаки: гібрид врожайний. За даними державного випробування (2 роки) на сортодослідних станціях України отримано середній врожай в Лісостепу 65,0 ц/га, в Поліссі 68,7 ц/га, що перевищує стандарт на 2-3 ц/га. Для одержання високих врожаїв гібрид необхідно вирощувати за інтенсивною технологією з внесенням оптимальної дози мінеральних добрив.

Рекомендовано внести до Реєстру сортів рослин на 2003 рік по Лісостепу придатного для поширення в Україні.

Абонданс – заявник фірма „Новартіс Сідз SA”

Біологічні ознаки: простий, середньоранній гібрид (ФАО 200) з вегетаційним періодом 90-110 днів. Висота рослин 200-220 см, кількість надземних вузлів 10-11, листків на стеблі 14-16, качан довжиною 15 см, ледь конічної форми, середнього діаметру. Формується на висоті 115 см. Кількість рядів зерен 24. Зерно проміжного типу, жовто-оранжевого кольору, маса 1000 зерен 300-320 гр, стрижень жовто-оранжевий, качан добре покритий обгорткою. Вихід зерна - 75 %. Вміст білку в зерні -

Стійкий до вилягання, посухи, хвороб.

Господарські ознаки: гібрид врожайний. Пластичний. За даними державного випробування (2 роки) на сортодослідних станціях України отримано середній врожай в зоні Лісостепу 74,6 ц/га, в зоні Полісся 76,1 ц/га, що перевищує стандарт на 5-13 ц/га.

Гібрид швидко віддає вологу при дозріванні. Потребує внесення оптимальних доз мінеральних добрив.

Рекомендовано внести до Реєстру сортів рослин на 2003 рік по зонах Лісостепу та Полісся придатного для поширення в Україні.

Наутилус – заявник Національний аграрний університет

Біологічні ознаки: простий, міжлінійний гібрид, створений шляхом гібридизації з участю інбредних ліній української селекції, середньоранній (ФАО 290) з вегетаційним періодом від сходів до повної стиглості 117-120 днів. Висота рослин 250-260 см, кількість надземних вузлів 10-11, листків на стеблі 14-15, качан довжиною 22-24 см, кількість рядів зерен в качані 14-16, висота прикріплення нижнього качана 75 см. Верхівка добре озернена, качан повністю покритий обгорткою. Зерно напівзубовидне, маса 1000 зерен 350-360 гр. Стрижень рожевий. Вихід зерна 79 %.

Посухостійкий, холодостійкий. Стійкість проти вилягання та хвороб висока.

Господарські ознаки: гібрид високопродуктивний, толерантний до підвищеної густоти стояння. Рекомендована густота – Полісся- 65-75 тис/га, Лісостеп – 60-70 тис/га. Степ – 35-50 тис/га.

Для отримання високого врожаю гібрид необхідно вирощувати за інтенсивною технологією з внесенням оптимальної дози мінеральних добрив. За даними державного випробування (2 роки) на сортодослідних станціях України отримано середній врожай на рівні 70 ц/га. Насінництво ведеться на стерильній та фертильній основі.

Рекомендовано внести до Реєстру сортів рослин на 2003 рік по Лісостепу та Поліссі придатного для поширення в Україні.

Гран 310 – заявник ТОВ „Всеукраїнський науковий інститут селекції” (ВНІС)

Біологічні ознаки: простий, середньоранній гібрид (ФАО 280) з вегетаційним періодом 115-120 днів. Висота рослин 200-210 см, кількість надземних вузлів 10-11, листків на стеблі 14-15, качан довжиною 20-22 см, середнього діаметру. Формується на висоті 75 см. Кількість рядів зерен в качані 18-20. Зерно проміжного типу, оранжевого кольору, маса 1000 зерен 260-270 гр. Вихід зерна - 83 %.

Стійкість до вилягання, посухи та хвороб – середня.

Господарські ознаки: гібрид врожайний. За даними державного випробування (3 роки) на сортодослідних станціях України отримано середній врожай в межах 75 ц/га, що на 6 ц/га перевищує стандарт. Для одержання високих врожаїв потрібно вирощувати за інтенсивною технологією з внесенням оптимальної дози мінеральних добрив. Добре реагує на внесення органічних добрив.

Рекомендовано внести до Реєстру сортів на 2003 рік по Лісостеповій зоні для поширення в Україні.

Кремінь 200СВ – заявник Інститут зернового господарства УААН

Біологічні ознаки: трьохлінійний, середньоранній гібрид (ФАО 200) з вегетаційним періодом 110-115 днів. Висота рослин 200-210 см, кількість надземних вузлів 10-11, листків на стеблі 14-16. Качан довжиною 17-18 см ледь конічної форми з середнім діаметром, кількість рядів зерен 16-18, висота прикріплення нижнього качана 65-70 см. Верхівка добре озернена, качан покритий обгорткою. Стрижень рожевий. Зерно кремнистого типу, оранжевого кольору. Вихід зерна - 82 %, маса 1000 зерен 280-290 гр.

Посухостійкість, холодостійкість - висока. Пухирчастою сажкою уражується до 1 %.

Господарські ознаки: гібрид врожайний. Пластичний. За роки державного випробування на сортодослідних станціях України (3 роки) одержано високий врожай в зоні Лісостепу 78 ц/га, в Поліссі – 75,2 ц/га, що значно вище стандарту.

Потребує інтенсивних технологій з внесення оптимальних доз мінеральних добрив.

Рекомендовано внести до Реєстру сортів рослин на 2003 рік по зонах Лісостепу та Полісся для поширення в Україні.

Сидорів 251 МВ – заявник закрите акціонерне товариство „Расава” Маслівський державний аграрний технікум

Біологічні ознаки: трьохлінійний гібрид виведений шляхом гібридизації трьох самозапильних ліній, середньоранній, (ФАО 260) з вегетаційним періодом від сходів до повної стиглості 115-120 днів. Висота рослин 220-230 см, листків на стеблі 14-16. Качан довжиною 20-21 см, висота прикріплення 70 см, ледь конічної форми, діаметр товстий. Кількість рядів зерен в качані 18-20. Зерно напівзубовидного типу, жовтого кольору, маса 1000 зерен 290-300 гр, стрижень рожевий. Вихід зерна - 78%.

Стійкий до видягання та хвороб. Холодостійкість 9 балів, посухостійкість 8 балів.

Господарські ознаки: гібрид високопродуктивний. За даними державного випробування (3 роки) на сортодослідних станціях України отримано середній врожай 78,3 ц/га, що перевищує стандарт на 8,8 ц/га. Гібрид потребує інтенсивних технологій з внесенням оптимальних доз мінеральних добрив.

Рекомендовано внести до Реєстру сортів рослин на 2003 рік по зоні Лісостепу придатного придатного для поширення в Україні.

Елегія МВ – заявник Селекційно-генетичний інститут УААН

Біологічні ознаки: простий модифікований виведений шляхом гібридизації, середньоранній, (ФАО 280-290) з вегетаційним періодом 110-113 днів. Висота рослин 200-210 см, листків на стеблі 14-15, качан довжиною 18-20 см, циліндричної форми, формується на висоті 60-70 см. Кількість рядів зерен в качані 18-20 см. Верхівка качана добре озернена, качан покритий обгорткою. й. Зерно зубовидного типу, жовтого кольору, маса 1000 зерен 290-300 гр, стрижень рожевий. Вихід зерна – 82 %.

Холодостійкість вище середньої, посухостійкість висока, стійкість до вилягання висока. До ураження хворобами стійкий.

Господарські ознаки: гібрид високоврожайний особливо в Лісостеповій зоні. За 3 роки випробування одержано середній урожай на сортодослідних станціях на рівні 74 ц/га в Лісостепу, в зоні Полісся 68 ц/га, що вище стандарту відповідно на 4-5 ц/га. Гібрид швидко віддає вологу при дозріванні. Потребує інтенсивних технологій.

Рекомендовано внести до Реєстру сортів рослин на 2003 рік по зонах Лісостепу та Поліссі придатного для поширення в Україні.

Еуро 301 МВ – заявник- Спеціалізоване насінницьке господарство „Маїс”

Біологічні ознаки: простий міжлінійний гібрид створений шляхом схрещування стерильного аналога ліній з лінією відновлювачем фертильності, середньостиглий, (ФАО 300) з вегетаційним періодом 115- 120 днів. Висота рослин 250-260 см, листків на стеблі 14-16 штук, качан довжиною 20-25 см, циліндричної форми, по діаметру товстий. Кількість рядів зерен в качані 18-20. Зерно зубовидного типу, жовтого кольору, маса 1000 зерен 260-280 гр, стрижень рожевий. Вихід зерна – 77 %.

Стійкий до вилягання та хвороб. Посухостійкість висока.

Господарські ознаки: гібрид високопродуктивний, високо пластичний. За даними державного випробування на сортодослідних станціях України одержано високий врожай 81,3 ц/га, що на 13 ц/га вище за врожай стандарту.

Для отримання високого врожаю гібрид необхідно вирощувати за інтенсивною технологією з внесенням оптимальних доз мінеральних добрив.

Рекомендовано внести до Реєстру сортів рослин на 2003 рік по зоні Лісостепу придатного для поширення в Україні.

Дар 347 МВ – заявник Інститут зернового господарства УААН, НПВ „Еліта”

Біологічні ознаки: трьохлінійний модифікований гібрид, середньостиглий, (ФАО 340) з вегетаційним періодом від сходів до повної стиглості 120-125 днів. Висота рослин 220-230 см, надземних вузлів на стеблі 13-14, листків на стеблі 17-18, висота прикріплення нижнього качана 75-85 см, качан довжиною 21 см, ледь конічної форми. Зерно зубоподібне, маса 1000 зерен 290-300 гр, стрижень рожевий. Верхівка качана добре озернена. Вихід зерна – 85 %.

Стійкий до вилягання, посухостійкий. До ураження пухирчастою сажкою стійкість середня.

Господарські ознаки: гібрид високопродуктивний. Пластичний. За три роки випробування на держсортослідних станціях України одержано врожай зерна 79,6 ц/га, на зрошенні 92,7 ц/га, що значно перевищує стандарт

Гібрид характеризується швидкою віддачею вологи при дозріванні.

Рекомендовано внести до Реєстру сортів рослин на 2003 рік по зонах Лісостеп та Степ на зрошенні придатного для поширення в Україні.

Борисфен 250 МВ - заявник - Інститут зрошуваного землеробства УААН, Інститут зернового господарства УААН, Мале науково-виробниче підприємство Корн.

Біологічні ознаки: трилінійний, середньоранній гібрид / ФАО 270/ з вегетаційним періодом від сходів до повної стиглості 110-115 днів. Висота рослин 220-230 см, наземних вузлів на стеблі 11-12, листків 15-16. Качан середньої довжини – 20-22 см, циліндричної форми, формується на висоті 80-85 см. Маса 1000 зерен 230-240 г, рядів зерен 14-16. Верхівка качана добре озернена, качан повністю покритий обгорткою.

Стрижень рожевий, зерно зубовидне жовтого кольору. Вихід зерна 78-80 %.

Посухостійкий – 8.8 бала, стійкість до вилягання 8.9 бала. Стійкість до ураження пухирчастою сажкою середня.

Господарські ознаки: Гібрид продуктивний, пластичний. За роки випробування / 3 роки/ врожай на сортодослідних станціях одержано 70.7 ц/га, що перевищує стандарт на 5 ц/га. Для отримання високого врожаю гібрид необхідно вирощувати за інтенсивною технологією з внесенням оптимальних доз мінеральних добрив.

Рекомендовано внести до Реєстру сортів рослин на 2003 рік по зоні Лісостепу придатного для поширення в Україні.

РМ 011 - заявник – фірма Рустика Домен де Сандро /Франція/.

Біологічні ознаки. Простий ранньостиглий гібрид / ФАО 160/ з вегетаційним періодом від сходів до повної стиглості 110-115 днів. Висота рослин 230-240 см, наземних вузлів на стеблі 10-11, листків 15-16. Качан середньої довжини 20-22 см, ледь конічної форми, формується на висоті 85-90 см. Рядів зерен в качані 16-18, верхівка качана добре озернена, качан покритий обгорткою. Стрижень жовто-оранжевого кольору. Зерно напівзубовидного типу жовтого кольору, маса 1000 зерен 280-290 грам. Вихід зерна при обмолоті 80%. Стійкість до засухи, вилягання висока /9 балів/, до ураження пухирчастою сажкою середня.

Господарські ознаки. Гібрид досить високопродуктивний та пластичний. За роки випробування на сортодослідних станціях України одержано середній врожай 80,0 -82,0 ц/га, що перевищує національні стандарти відповідно на 10 -13,0ц/га.

Важливим елементом агротехніки є підживлення азотними добривами в перший період вегетації.

Рекомендовано внести до Реєстру сортів рослин на 2003 рік по зонах Лісостепу та Поліссі придатного для поширення в Україні.

РМ 001 /Еденстар/ - заявник –фірма Рустика Домен де Сандро /Франція/.

Біологічні ознаки. Простий середньоранній гібрид /ФАО 230/ з вегетаційним періодом від сходів до повної стиглості 120-125 днів. Висота рослин 210-220см, наземних вузлів на стеблі 11-12, листків 16-18. Качан середньої довжини ледь конічної форми формується на висоті 75-85 см, верхівка добре озернена повністю покритий обгорткою. Стрижень жовто-оранжевого кольору. Зерно зубоподібне жовтого кольору. Вихід зерна при обмолоті 80%, маса 1000зерен 290-300г. Вміст крохмалю в зерні 73,4 %, білку 10,5 %. Посухостійкість, стійкість до вилягання та ураження пухирчастою сажкою висока.

Господарські ознаки. Гібрид високоврожайний та висопластичний. За роки випробування /3 роки/ на сортодослідних станціях України одержано середній урожай зерна 82,5-83,7 ц/га, що вище стандарту відповідно на 13-21 ц/га. Гібрид характеризується швидкою віддачею вологи зерна при досяганні.

Рекомендовано внести до Реєстру сортів рослин на 2003 рік по зонах Лісостеп та Полісся придатного для поширення в Україні.

Дніпровський 196 СВ - заявник – Інститут зернового господарства УААН.

Біологічні ознаки. Трьохлінійний ранньостиглий гібрид /ФАО 190/ з вегетаційним періодом від сходів до повної стиглості 105-110 днів. Висота рослин 200-210 см, наземних вузлів на стеблі 11-12, листків 16-17. Качан середньої довжини -18-20 см, ледь конічної форми, середнього діаметру, кількість рядів зерен в качані 16-18, висота прикріплення качана 60-65 см. Качан жовто-оранжевого кольору добре покритий обгорткою, верхівка повністю озернена. Зерно жовтого кольору проміжного типу. Маса 1000 зерен 260-270 г. Вихід зерна при обмолоті 80%. Вміст крохмалю в зерні 72-74 %, білку 9-10%. Стійкість до засухи, вилягання, ураження пухирчастою сажкою висока / 8-9 балів/.

Господарські ознаки. Гібрид врожайний, толерантний до підвищеної густоти стояння рослин. За роки випробування на сортодослідних станціях України одержано середній урожай 72-73 ц/га, що вище стандарту відповідно на 5-6 ц/га.

Характеризується швидкою віддачею вологи зерна при дозріванні. Для отримання високих врожаїв потребує інтенсивних технологій вирощування з внесенням оптимальної дози мінеральних добрив.

Рекомендовано внести до Реєстру сортів рослин на 2003 рік по зонах Лісостеп та Полісся для поширення в Україні.

Гран 220 - заявник – ТОВ “Всеукраїнський науковий інститут селекції /ВНІС/.

Біологічні ознаки. Трилінійний ранньостиглий гібрид /ФАО 190/ з вегетаційним періодом від сходів до повної стиглості 113-115 днів. Висота рослин 180-190 см, наземних вузлів на стеблі 10-11, листків 16-17. Качан середньої довжини 19-20 см, ледь конічної форми, кількість рядів зерен в качані 16-18. Стрижень і зерно жовто-оранжевого кольору. Зерно проміжного типу. Маса 1000 зерен 250-260 г.

Посухостійкість середня, стійкість до вилягання та ураження хворобами на рівні 8 балів.

Господарські ознаки. Гібрид врожайний, за роки випробування на сортодослідних станціях України одержано середній урожай зерна 73-75 ц/га, що вище стандарту на 5-7 ц/га. Гібрид потребує інтенсивних технологій вирощування з внесенням оптимальних доз мінеральних добрив.

Рекомендовано внести до Реєстру сортів рослин на 2003 рік по зоні Лісостеп для поширення в Україні.

Пр 39 Джі 12/ Х0778/Т - заявник- фірма Піонер /США/.

Біологічні ознаки. Простий ранньостиглий гібрид /ФАО 180/ з вегетаційним періодом 100-105 днів. Висота рослин 210-220 см, наземних вузлів на стеблі 12-13, листків 15-16. Качан великий довжиною 20-22 см, ледь конічної форми, середнього діаметру. Верхівка качана добре озернена і повністю покрита обгорткою. Кількість рядів зерен на качані 16. Стрижень оранжевий, зерно кремнистоподібного

типу жовто-оранжевого кольору. Вихід зерна при обмолоті 80%. Посухостійкість, стійкість до вилягання та ураження хворобами висока. /8-9балів/. Вміст крохмалю в зерні 75%, білку 10%.

Господарські ознаки. Гібрид високоврожайний, пластичний. Характеризується швидкою віддачею вологи при дозріванні, збиральна вологість 22%. За роки випробування на сортодослідних станціях України одержано середній урожай від 77 до 80 ц/га, що перевищує стандарт на 10-11 ц/га.

Рекомендовано внести до Реєстру сортів рослин на 2003 рік по зонах Лісостепу та Полісся для поширення в Україні.

КХ 8369 - заявник – фірма КВС / Німеччина/.

Біологічні ознаки. Простий середньоранній гібрид /ФАО 280/ з вегетаційним періодом від сходів до повної стиглості 1115-120 днів. Висота рослин 210-220 см, наземних вузлів на стеблі 10-11, листків 15-16. Качан великий, ледь конічної форми, кількість рядів зерен в качані 16-18. Верхівка качана добре озернена повністю покрита обгорткою. Стрижень оранжевий. Зерно проміжного типу, жовтого кольору, маса 1000зерен 280-300г. Посухостійкість, стійкість до вилягання висока, ураження пухирчастою сажкою на рівні стандарту.

Господарські ознаки. Гібрид високоврожайний за роки випробування на сортодослідних станціях України одержано середній урожай 80-82 ц/га, що вище стандарту відповідно на 12-15ц/га. Для отримання високих урожаїв гібрид потребує внесення оптимальних доз мінеральних добрив.

Рекомендовано внести до Реєстру сортів рослин на 2003 рік по зонах Лісостепу та Полісся для поширення в Україні.

Бершадь - заявник – Інститут землеробства УААН, Інститут кукурудзи м.Земун Поле, СП Земун Поле- Україна.

Біологічні ознаки. Трилінійний середньоранній гібрид /ФАО 260/ з вегетаційним періодом від сходів до повної стиглості 125-130 днів. Висота рослин 220-240см, наземних вузлів на стеблі 12-13, листків 17-18. Качан довжиною 20-22см ледь конічної форми добре вкритий обгорткою., висота прикріплення розвинутого качана 75-80см. Кількість рядів зерен в качані 16-18, зерно зубовидного типу жовто-оранжевого кольору. Стрижень жовто-оранжевий. Маса 1000 зерен 225-245г. Вихід зерна при обмолоті 80%. Вміст крохмалю в зерні 74%, білку 10.3 %.

Посухостійкість, стійкість до ураження хворобами та полягання середньо-висока.

Господарські ознаки. Гібрид високопродуктивний за роки випробування на сортодослідних станціях України одержано середній урожай 83ц/га, що вище стандарту на 8ц/га. На перших етапах розвитку потребує підживлення азотними добривами.

Рекомендовано внести до Реєстру сортів рослин на 2003 рік по зоні лісостеп для поширення в Україні.

ГОРОХ

Харківський еталонний – Виведений в інституті рослинництва ім. В.Я.Юр'єва методом складної гібридизації.

Різновидність екадукум.

Сходи зелені. Стебло просте, висотою 64-69 см, сизо-зелене.

Загальна кількість міжвузлів – 13-17, до першого суцвіття – 8-9. Листки з трьома парами яйцеподібних цільнокраїх листочків. Квітки білі, по дві на квітконіжці. Боби прямі із загостреним кінцем, завдовжки 5-5,5 см. Кількість насінин у бобі 5-6, максимальна – 8. Насінина жовта, округла, гладенька, на місці рубчика сім'яніжка. Маса 1000 насінин – 268-281 г. Середньоранній. Вегетаційний період 74-83 дні. Посухостійкий. Придатний до механізованого збирання. За даними заявника норма висіву 1,1 млн/га схожих насінин. Білка має – 24,3%. Урожайний. На державних сортовипробувальних станціях за роки випробування отримали урожай – 21,9-24,7 ц/га. Потенційна можливість сорту 60 ц/га.

Рекомендований для вирощування у зонах Степу, Лісостепу і Полісся.

Елегант – Виведений в інституті кормів та Уладово-Люлінецькій дослідно-селекційній станції методом гібридизації.

Різновидність екадукум.

Стебло просте, зелене, висотою 80-90 см. Загальне число міжвузлів – 16-19, до першого суцвіття – 13-14.

Листки складаються із 2-3 пар овально-яйцеподібних листочків.

Квітки білі. Великі, по дві на квітконіжці. Боби світло-жовті, прямі з тупою верхівкою. Кількість бобів на рослині – 10-12. Насінин у бобі 5-6, максимальна – 9.

Насіння жовто-рожеве, округле, гладеньке, іноді злегка зморшкувате. Маса 1000 насінин – 270 г.

Середньостиглий, вегетаційний період 83-89 днів. Посухостійкий, стійкий до осипання.

За даними заявника норма висіву 1,1 млн/га схожих насінин. Білка має 23,1-24,7%. Аскохітозом уражується середньо, гороховою плодожеркою і попелицею пошкоджується на рівні стандартів.

Урожайний, на державних сортовипробувальних станціях за роки випробування отримали урожай 30 ц/га. Потенційна можливість сорту – 65 ц/га.

Рекомендований для вирощування у зоні Лісостепу.

Ароніс - Виведений на Уладово-Люлінецькій селекційно-дослідній станції.

Різновидність екадукум.

Сходи зелені. Стебло звичайне, сизо-зелене, заввишки 60-75 см. Кількість міжвузлів 13-17, до першого суцвіття – 8-9.

Листки з двома або трьома парами яйцеподібних суцільнокраїх листочків. Прилистники середні, напівсерцеподібні, біля основи зазублені.

Суцвіття двоквітка китиця. Квітки великі, білі.

Боби прямі, інколи трохи зігнуті з тупим кінцем. Середня довжина бобу 5,5-6,5 см. Кількість насінин 6-7. Насінина жовта, округла, здавлена по боках. Маса 1000 насінин 267-279 г.

Середньостиглий, вегетаційний періодж 80-87 дні. Вміст білка 21,5-24,8%.

Посухостійкість середня. Аскохітозом, корневими гнилями, пероноспорозом зашкоджується на рівні стандартів.

За даними заявника норма висіву 1,2 млн/га схожих насінин.

Урожайний. За роки випробування на державних сортодослідних станціях отримали середній врожай 25,5-31,3 ц/га. Потенційна можливість сорту 50 ц/га.

Рекомендований для вирощування в зонах Степу, лісостепу і Полісся.

Банан - Виведений в інституті рослинництва ім. В.Я.Юр'єва УААН методом складної гібридизації.

Різновидність екадукум.

Сходи зелені. Стебло просте, висотою 95 см, сизо-зелене. Загальна кількість міжвузлів на рослині 15-17, до першого суцвіття 10-13.

Листки з двома парами яйцеподібних звужених доверху середніх листочків, що закінчуються добре розвинутими вусиками. Прилистки середні. Суцвіття – двоквітка китиця. Квітки білі, великі.

Боби прямі, інколи злегка зігнуті, зеленкувато-жовті, з тупим кінцем, по два на одній плодоніжці. Кількість насінин 6-7, максимальна – 9.

Насіння сизо-зелене, округле з вдав линами на боках. Маса 1000 насінин 285-360г.

Вміст білка – 26,2%.

Веgetаційний період 71 день. Посухостійкість середня.

Стійкий проти пошкодження гороховою плодожеркою та попелицею, середня проти зараження аскохітозом.

Смакові якості та розварюваність добрі.

За даними заявника норма висіву – 1-1,4 млн. га схожих насінин.

На державних сортодослідних станціях за роки випробування отримали середній врожай – 29,1 ц/га. Потенційна можливість сорту – 50 ц/га.

Рекомендований для вирощування в зоні Лісостепу.

Комбайновий 1 - Виведений в Луганському інституті агропромислового виробництва УААН, ООО „Насіння Луганщини” методом індивідуального добору.

Сходи зелені. Стебло сизо-зелене, звичайне, заввишки 60-80 см, а в умовах достатнього зволоження 100-110 см. Загальна кількість міжвузлів 14-19 і більше, до першого суцвіття 10-13.

Листки з двома-трьома парами яйцеподібних, середнього розміру, з восковим нальотом, зелених цілюноккрайх листочків. Прилистки напівсерцеподібні, біля основи зубчасті, великі. Пазушна пляма без антоціану.

Квітки білі, великі, по дві, рідше по одній на квітконіжці.

Боби прямі, рідко злегка зігнуті, з тупим кінцем.

Насінина жовто-оранжева, рубчик покритий залишками сім'яніжки, яка міцно зростається з рубчиком насінини. Маса 1000 насінин 240г. Вміст білка в насінні – 24-26%.

Вегетаційний період 73-94 дні. За смаковими якостями та рівномірністю розварювання не поступається стандартам.

Аскохітозом та антракнозом уражується середньо.

За даними заявника норма висіву – 1-1,2 млн. га схожих насінин.

Урожайний. За роки випробування на державних сортодослідних станціях отримали середній врожай – 29,8 ц/га. Потенційна можливість сорту – 50-57 ц/га.

Рекомендований для вирощування в зоні Лісостепу.

Луганський - Виведений в Луганському інституті агропромислового виробництва УААН, ООО „Насіння Луганщини” методом індивідуального добору.

Сходи зелені. Стебло середньої висоти - 60-80 см, рідше 80-100 см. Загальна кількість міжвузлів 12-18, до першого суцвіття 11-13 міжвузлів.

Листки з двома-трьома парами широких, яйцеподібних, світло-зелених листочків, що закінчуються вусиками.

Квітки білі, великі, по одній-дві на квітконіжці.

Боби прямі, рідко злегка зігнуті, з тупим кінцем.

Насінина округла, майже куляста, світло-рожева, гладенька, середня за розміром.

Вегетаційний період 73-88 днів. Сорт середньостиглий. Посухостійкість вище середньої.

Гороховою плоджеркою і попелицею пошкоджується вище середньо, антракнозом і аскохітозом на рівні стандартів.

За даними заявника норма висіву – 1-1,2 млн. га схожих насінин.

Білка має 23,7-23,9%.

За роки випробування на державних сортодослідних станціях отримали середній врожай – 30,7-31,3 ц/га. Потенційна можливість сорту – 50-55 ц/га.

Рекомендований для вирощування в зонах Степу та Лісостепу.

Мадонна - Заявник фірма „Лембке”, Німеччина.

Різновидність екадукум.

Сходи зелені. Стебло звичайне, заввишки 57-81 см. Загальна кількість міжвузлів 13-14, до першого суцвіття 8-11.

Листки з трьома парами яйцеподібних цілюноккраїх листочків з восковим нальотом.

Прилистники напівсерцеподібні, біля основи зубчаті.

Квітки білі, великі, по дві, рідше по одній на квітконіжці.

Насінина жовто-рожева, округла, гладенька з матовим відтінком, зростається із рубчиком насінини. Маса 1000 насінин – 229-254 г.

Середньоранній, дозріває за 77-80 днів. Посухостійкий, досить стійкий до полягання та осипання.

Придатний для прямого комбайнування.

За даними заявника норма висіву – 0,8-1 млн. га схожих насінин.

Білка має 21,3-24,0%.

Стійкий до кореневих гнилей, аскохітозом уражується слабо.

На державних сортодослідних станціях за роки випробування отримали середній врожай – 32,1-36,1 ц/га. Потенційна можливість сорту – 55-65 ц/га.

Рекомендований для вирощування в зонах Степу, Лісостепу та Полісся.

Харків'янин - Виведений в інституті рослинництва ім. В.Я.Юр'єва.

Різновидність екадукум.

Сходи зелені. Стебло звичайне, просте, висотою 64-75 см. Кількість міжвузлів на рослині 14-17, до першого суцвіття 9-12.

Листки з двома парами яйцеподібних листочків. Квітки білі, великі. Боби світло-жовті, прямі, з тупою верхівкою, кількість бобів на рослині 10-14. Насінин у бобі 4-5, максимальна кількість - 8. Зернівка рожева, овальна, гладенька, на місці рубчика сім'яніжка. Маса 1000 насінин – 235-241 г.

Середньостиглий, вегетаційний період 80-85 днів. Посухостійкий, стійкий до осипання.

За даними заявника норма висіву – 1,2 млн. га схожих насінин.

Білка має 24,2-24,7%.

Аскохітозом уражується слабо.

На державних сортовипробувальних станціях за роки випробування отримали середній врожай – 31,8-39,2 ц/га. Потенційна можливість сорту – 55 ц/га.

Рекомендований для вирощування в зонах Степу та Лісостепу.

Харківський 317 - Виведений в Інституті рослинництва ім. В.Я.Юр'єва УААН методом складної гібридизації та багаторазового добору.

Різновидність - екадукум.

Стебло просте, висотою 75-120 см. Загальне число міжвузлів 17-20, до першого суцвіття - 13-14. Листки складаються із двох-трьох пар яйцеподібних, зелених із восковим нальотом листочків. Квітки білі, великі. Боби світло-жовті, прямі з тупою верхівкою, кількість бобів на рослині 10-14. Насінин у бобі 4-5, максимальна кількість - 8. Зернівка рожева, овальна, гладенька, на місці рубчика сім'яніжка. Маса 1000 насінин - 260 г.

Середньопізній. Веgetаційний період 85-90 днів. Посухостійкий, досить стійкий до осипання.

За даними заявника норма висіву 1,2 млн/га схожих насінин.

Білка має 22,9-24,8%. Аскохітозом уражується слабо. Урожайний. На державних сортовипробувальних станціях та дільницях за роки випробування отримали урожай 24,3-27,0 ц/га. Потенційна можливість сорту - 55 ц/га.

Рекомендований для вирощування у зонах Степу та Лісостепу.

Дамир 2 - Заявник - науково-дослідна комерційно-виробнича фірма Мир-Сем.

Різновидність екадукум.

Сходи зелені. Стебло звичайне, заввишки 55-65 см. Загальна кількість міжвузлів 13-14, до першого суцвіття 8-11. Листки з трьома парами яйцеподібних цільнокраїх листочків.

Квітки білі, великі. Боби світло-жовті, прямі з тупою верхівкою. Кількість бобів на рослині 10-14. Насінин у бобі 4-5, максимальна кількість - 8. Насінина жовта, округла, гладенька, на місці рубчика сім'яніжка. Маса 1000 насінин 220-260г.

Середньостиглий. Веgetаційний період 79-86 днів. Посухостійкий, досить стійкий до осипання та полягання. Придатний до механізованого збирання.

За даними заявника норма висіву 1,2 млн/га схожих насінин.

Білка має 26,6-26,8%.

Високоврожайний. За роки випробування на державних сортовипробувальних станціях та дільницях отримали врожай 28,7-39,5 ц/га. Потенційна можливість сорту 65 ц/га.

Аскохітозом уражується слабо.

Рекомендований для вирощування у зонах Степу та Лісостепу.

Кількість бобів на рослині – 10-12. Насінин у бобі 5-6, максимальна кількість – 9. Насінина жовта, округла, гладенька. Маса 1000 насінин - 230-245г.

Середньостиглий. Вегетаційний період 79-84 дні. Стійкий до посухи та осипання.

За даними заявника норма висіву 1,2 млн/га схожих насінин. Білка має 24,1%. Аскохітозом уражується середньо, гороховою плодожеркою і попелицею пошкоджується нижче середнього. Потенційна можливість сорту до 55 ц/га.

Рекомендований для вирощування у зонах Лісостепу та Полісся.

Дамир 1 - Заявник – Науково-дослідна комерційно-виробнича фірма Мир-Сем.

Різновидність екадукум. Сходи зелені. Стебло звичайне, заввишки 50-70см. Загальна кількість міжвузлів 13-14, до першого суцвіття 8-10. Листки з трьома парами яйцеподібних цільнокраїх листочків.

Квітки білі, по дві на квітконіжці. Боби прямі, з загостреним кінцем, завдовжки 5-5,5 см. Кількість насінин у бобі 5-6, максимальна – 9. Насінина жовта, округла, гладенька, на місці рубчика – сім'яніжка. Маса 1000 насінин - 210-240г.

Середньостиглий. Вегетаційний період 73-90 днів. Посухостійкий, досить стійкий до осипання та полягання. Придатний до механізованого збирання.

За даними заявника норма висіву - 1,1 млн/га схожих насінин.

Вміст білка в насініні залежно від умов вирощування становив 24,7-25,6%. Високоврожайний. На Ново одеській державній сортовипробувальній станції отримали врожай 40-50 ц/га.

Середньо уражується аскохітозом.

Рекомендований для вирощування у зоні Степу.

Харківський 320 - Виведений у Інституті рослинництва ім. В.Я.Юр'єва УААН методом гібридизації.

Різновидність - екадукум.

Стебло просте, зелене, висотою 80-89 см. Загальне число міжвузлів - 16-19, до першого суцвіття 13-14. Листки складаються із двох-трьох пар овально-яйцеподібних листочків. Квітки білі, великі, по дві на квітконіжці. Боби світло-жовті, прямі з тупою верхівкою, завдовжки 5-5,5см. Кількість бобів на рослині - 10-12. Насінин у бобі 5-6, максимальна кількість - 9. Насіння жовто-рожеве, округле, гладеньке, іноді злегка зморшкувате. Маса 1000 насінин - 262г.

Середньостиглий. Вегетаційний період 83-87 днів. Посухостійкий, стійкий до осипання.

За даними заявника норма висіву 1,2 млн/га схожих насінин. Білка має 23,8-25,2%. Аскохітозом уражується середньо, гороховою плодожеркою і попелицею пошкоджується нижче середнього. Смакові якості добрі, коефіцієнт розварювання 4,4-4,5.

Урожайний. На державних сортовипробувальних станціях та дільницях за роки випробування отримали урожай 25-25,5 ц/га. Потенційна можливість сорту 60 ц/га.

Рекомендований для вирощування у зонах Степу і Лісостепу.

Менгир - Заявник фірма Осева Прага с.р.о., Чехія. Виведений методом схрещування.

Різновидність екадукум.

Сходи зелені. Стебло сизо-зелене, звичайне, заввишки 63-69 см. Загальна кількість міжвузлів 17-19 і більше, до першого суцвіття 12-16. Листки з двома-трьома парами яйцеподібних, середнього розміру, з восковим нальотом, зелених цілокраїх листочків. Прилистки напівсерцеподібні, біля основи зубчасті, великі. Пазушна пляма без антоціану. Квітки білі, великі, по дві, рідше по одній на квітконіжці.

Боби прямі, рідко злегка зігнуті, з тупим кінцем. Довжина бобу 5-6 см.

Насінина жовто-рожева, округла, гладенька з матовим відтінком; сім'ядолі жовто-оранжеві, рубчик покритий залишками сім'яніжки, яка міцно зростається з рубчиком насінини. Маса 1000 насінин - 235-245г.

Ранньостиглий. Вегетаційний період 73-81 день. Посухостійкий, досить стійкий до осипання.

За даними заявника норма висіву 1,2 млн/га схожих насінин. Білка має 24,7-25,6%. Стійкий до корневих гнилей, аскохітозом уражується слабо.

На державних сортовипробувальних станціях та дільницях за роки випробування отримали урожай 27,1-34,9 ц/га.

Потенційна можливість сорту - 45-54 ц/га.

Рекомендований для вирощування у зоні Полісся.

Дамир 4 - Заявник - науково-дослідна комерційно-виробнича фірма Мир-Сем. Виведений методом гібридизації.

Різновидність екадукум.

Стебло просте, висотою 54-73 см. Загальне число міжвузлів 16-19, до першого суцвіття - 13-14. Листки складаються із двох-трьох пар овально-яйцеподібних листочків. Квітки білі, великі, по дві на квітконіжці. Боби світло-жовті, прямі, з тупою верхівкою, завдовжки 5-5,5 см. Кількість бобів на рослині 10-12. Насінин у бобі 5-6, максимальна кількість - 9.

Насіння жовте, округле, гладеньке, іноді злегка зморшкувате. Маса 1000 насінин - 224 г.

Середньопізній. Вегетаційний період 79-96 днів. Посухостійкий, стійкий до осипання.

За даними заявника норма висіву - 1 млн/га схожих насінин. Білка має 24,9-25,7%. Аскохітозом уражується слабо.

На державних сортовипробувальних станціях та дільницях за роки випробування отримали урожай 24,8-36,4 ц/га. Потенційна можливість сорту - 50-55 ц/га.

Рекомендований для вирощування у зоні Лісостепу.

Інтенсивний 97 - Виведений в Інституті рослинництва ім. В.Я.Юр'єва УААН.

Різновидність екадукум. Виведений методом схрещування.

Стебло просте, висотою 62-65см. Загальне число міжвузлів 16-19, до першого суцвіття 13-14. Листки складаються із двох-трьох пар овально-яйцеподібних листочків. Квітки білі, великі, по дві на квітконіжці. Боби світло-жовті, прямі з тупою верхівкою, завдовжки 5-6 см.

Загальна кількість міжвузлів 14-19, до першого суцвіття 14-16. Суцвіття двоквіткова китиця, квітки великі, білі. Листки з двома-трьома парами широких, ромбічної форми світло-зелених листочків, що закінчуються вусиками.

Боби прямі, з тупим кінчиком, середні. Кількість насінин у бобі 6-8, максимальна – 9.

Середньоранній. Вегетаційний період 73-88 днів.

За даними заявника норма висіву 1,4 млн/га схожих насінин. Посухостійкий, досить стійкий до осипання. Білка має 23,7-26,6%. Аскохітозом уражується слабо.

Урожайний. На державних сортовипробувальних станціях та дільницях за роки випробування отримали урожай 37,1-43,4 ц/га. Потенційна можливість сорту 55 ц/га.

Рекомендований для вирощування у зоні Лісостепу.

Комет - Заявник - фірма Осева Ексімпо Прага с.р.о., Чехія. Виведений методом гібридизації.

Різновидність екадукум.

Стебло звичайне, світло-сизо-зелене, заввишки 75-98 см. Загальна кількість міжвузлів на рослині 15-19, до першого суцвіття 10-13. Суцвіття – двоквіткова китиця, квітки великі, білі. Боби прямі, інколи трохи зігнуті, з тупим кінцем. Середня довжина 5,6-7,2 см. Кількість насінин у бобі 5-6, максимальна - 8.

Насінина жовта, округла, гладенька.

Маса 1000 насінин – 244-250г.

Сорт середньопізній. Вегетаційний період 94-103 дні.

Стійкий до посухи та осипання.

За даними заявника норма висіву 1,2 млн/га схожих насінин.

Білка має 21,1-25,9%.

Особливо стійкий до пошкодження кореневими гнилями. Гороховою плодожеркою та попелицею уражується середньо.

Високоврожайний. На Калинівській державній сортовипробувальній станції отримали врожай 39,8-48,7 ц/га.

Рекомендований для вирощування у зоні Лісостепу.

Полтавець 2 - Заявник – Мале підприємство “Нива 1”, Полтавське АТ “Агрофірма Насіння”. Виведений методом індивідуального добору.

Різновидність екадукум.

Сходи зелені, без опушення. Стебло просте, висотою 80-95 см. Загальна кількість міжвузлів 15-19, до першого суцвіття – 10-12. Листки з двома парами яйцеподібних звужених до верхівки середніх листочків, що закінчуються добре розвиненими вусиками.

Суцвіття – двоквіткова китиця. Боби прямі, інколи злегка зігнуті, великі. Насінина жовта, округла з вдавлинами на боках. Маса 1000 насінин 235-260г.

Середньостиглий. Вегетаційний період 75-100 днів. Посухостійкість середня.
За даними заявника норма висіву 1,3 млн/га схожих насінин. Придатний до механізованого збирання. Білка має 22,9-24,7%.
Високоврожайний. За роки випробування на державних сортовипробувальних станціях та дільницях отримали врожай 29,9-48,7 ц/га.
Потенційна можливість сорту 70 ц/га.
Смакові якості та розварюваність добрі.
Гороховою плодожеркою та попелицею уражується середньо.
Рекомендований для вирощування у зоні Лісостепу.

Степовик – заявник Луганський інститут агропромислового виробництва, ООО “Насіння Луганщини”.

Виведений індивідуальним добором із гібридної комбінації від схрещування.

Різновидність контекстум.

Рослини низькорослі, 48-65 см, сходи зелені. Загальна кількість міжвузлів 12-16.

Потовщене стебло. Добре розвинуті вусаті листки, що зумовлює підвищену стійкість рослин до вилягання.

Суцвіття – двоквіткова китиця, квітки великі, білі. Листки з двома-трьома парами широких, ромбічної форми світло-зелених листочків, що закінчуються вусиками.

Боби злегка зігнуті, великі. Кількість насінин у бобі 6-8, маса 1000 насінин – 250г.

Стійкий до посухи та осипання. Придатний до механізованого збирання.

За даними заявника норма висіву 1,2 млн/га схожих насінин Білка має 25%.

Особливо стійкий до пошкодження кореневими гнилями. Гороховою плодожеркою та попелицею уражується середньо.

Урожайний, на державних сортовипробувальних станціях отримали середній врожай 26,9-31,7 ц/га, що на 4,4 відсотка більше стандартів.

Рекомендований для вирощування в зонах Лісостепу та Степу.

Модус – заявник Інститут рослинництва ім. В.Я.Юр'єва УААН.

Різновидність контекстум.

Сходи зелені. Стебло звичайне, висотою 54-78, зелене. Загальна кількість міжвузлів 14-16, до першого суцвіття 8-10.

Тип листа – безлисточковий (вусатий), замість листочків добре розвинені вусики.

Прилистники напівсерцевидні, середньокрупні, зелені.

Квітки білі, середні, по дві-три на квітконіжці.

Боби прямі, з тупою верхівкою, середніх розмірів. Кількість насінин в бобі 4-5, максимальна – 7, маса 1000 насінин 230-236 г.

Насіння рожеве, насінних рубчик – чорний, округло-здавлена з гладкою верхівкою.

Сім'ніжка при висиханні насіння легко відділяється від оболонки насіння. Придатних до механізованого збирання.

Середньостиглий, вегетаційний період - днів. Високобілковий, вміст білка в насінні – 26,5-27,5 %.

За смаковими якостями та рівномірністю розварювання не поступається стандартам.

Стійкий до ураження аскохітозом та антракнозом. Норма висіву 1-1,2 млн.га схожих насінин.

За роки випробування на сортодослідних станціях отримали середній врожай 32,3 ц/га, що на 17,2 відсотка більше стандартів.

Рекомендований для вирощування в зоні Лісостепу.

Харді – заявник фірма „Лембке”, Німеччина.

Різновидність екадукум.

Сходи зелені. Стебло просте, висотою 48-73 см. Загальна кількість міжвузлів на рослині 15-19, до першого суцвіття 10-13. Суцвіття – двоквіткова китиця. Квітки білі, великі.

Боби прямі, інколи трохи зігнуті, з тупим кінцем. Середні довжина бобу 5,6-7,2 см. Кількість насінин в бобі 5-6, максимальна – 8. насінина жовта, округла, гладенька. Маса 1000 насінин 253 г.

Сорт середньопізній, дозріває за 78 днів. Стійкий до посухи та осипання.

Агротехніка – звичайна для зони вирощування.

Сорт інтенсивного типу, придатний для прямого комбайнування.

Високоврожайний. На державних сортовипробувальних станціях отримали середній врожай за роки випробування – 29,2-35,0 ц/га, що на 15,3 відсотка більше стандартів. Потенційна можливість сорту – до 70 ц/га.

Білка має 22,7-24,1%. Смакові якості та розварюваність добрі.

Стійкий до пошкодження попелицею.

Рекомендований для вирощування в зонах Степу, Лісостепу та Полісся.

Вінець – заявник Луганський інститут агропромислового виробництва УААН, ООО „Насіння Луганщини”.

Різновидність екадукум.

Сходи зелені. Стебло середньої висоти - 85-89 см. Загальна кількість міжвузлів 14-15, до першого суцвіття 10-13.

Листки з двома-трьома парами широких, яйцеподібних, світло-зелених листочків, що закінчуються вусиками.

Квітки білі, великі, по одній-дві на квітконіжці.

Боби прямі, рідко злегка зігнуті, з тупим кінцем.

Насінина округла, майже куляста, гладенька, середня за розміром. Маса 1000 насінин 260-271 г.

Середньостиглий, вегетаційний період 78-87 днів. Посухостійкість вище середньої.

Гороховою плоджеркою пошкоджується вище середнього, антракнозом і аскохітозом на рівні стандартів.

Агротехніка – звичайна для зони вирощування. На державних сортовипробувальних станціях за роки випробування отримали середній врожай – 26,4-33,2 ц/га, що на 10,1-18,2 відсотки більше стандартів.

Білка має 22,4-24,2%. Смакові якості та розварюваність добрі.
Рекомендований для вирощування в зонах Степу, Лісостепу та Полісся.

Універ – заявник „ГАЕ Решерш”, Франція.

Різновидність контекмум.

Сходи зелені. Стебло сизо-зелене, звичайне, заввишки 74-76 см, а в умовах достатнього зволоження 80-85 см.

Загальна кількість міжвузлів 14-19 і більше, до першого суцвіття 10-13.

Листки з двома-трьома парами яйцеподібних, середнього розміру, з восковим нальотом, зелених цілюноккраїх листочків, що закінчуються добре розвиненими вусиками.

Суцвіття двоквіткова китиця. Боби прямі, інколи злегка зігнуті, великі.

Насінина жовта, округла. Маса 1000 насінин 263-271г.

Норма висіву 1,1-1,2 млн/га схожих насінин.

Інтенсивного типу. Придатний до механізованого збирання.

Білка має 22,0-22,4 %.

Високоврожайний. На державних сортовипробувальних станціях за роки випробування отримали врожай 25,8-37,2 ц/га, що на 35 відсотків більше стандартів.

Потенційна можливість сорту 65-75 ц/га.

Рекомендований для вирощування в зонах Степу та Лісостепу.

Плутон – заявник „ГАЕ Решерш”, Франція.

Різновидність контекмум.

Стебло звичайне, світло сизо-зелене, заввишки 51-56 см.

Загальна кількість міжвузлів 14-19, до першого суцвіття 14-16.

Суцвіття двоквіткова китиця. Квітки великі, білі. Листки з двома-трьома парами широких, ромбічної форми світло-зелених листочків, що закінчуються вусиками.

Боби прямі, з тупим кінчиком, середні.

Кількість насінин у бобі 6-8, максимальна – 9. Маса 1000 насінин - 235г.

Середньоранній, дозріває за 75 днів.

Агротехніка – звичайна для зони вирощування. Придатний для механізованого збирання. Посухостійкий, досить стійкий до осипання та полягання.

Білка має 23,0-23,4 %.

Аскохітозом уражується слабо.

Високоврожайний. на державних сортовипробувальних станціях за роки випробування отримали середній врожай 25,3-34,4 ц/га, що на 25 відсотків більше стандартів.

Потенційна можливість сорту 75 ц/га.

Рекомендований для вирощування в зонах Степу та Лісостепу.

ГРЕЧКА

Слобожанка. Сорт виведений Сумською державною сільськогосподарською дослідною станцією методом індивідуально-сімейного добору на продуктивність із гібридної популяції одержаної шляхом схрещування.

Різновидність алята. Рослина диплоїдна. Тип росту пагонів звичайний. Тип квіток гетероморфний, блідо-рожевого забарвлення. Фонове забарвлення плодової шкірки коричневе.

Урожайність сорту 18-21 ц/га. Вегетаційний період 80-85 днів, маса 1000 зерен 28,6 г. Висота рослин 95-100 см. Дружність цвітіння та дозрівання 8,4 балів, стійкість до осипання 7,5 балів. Ураженість хворобами та пошкодженість шкідниками невисока. Крупніють зерна 3,5-5,0 мм. Плівчатість 19,8%, вирівняність 80-85%. Вихід крупи 75%, коефіцієнт розваримості 3,5. Смакові якості високі.

Сорт середньостиглий. Квітки зібрані у пазухові суцвіття, - щіточки, верхові суцвіття за формою близькі до щитка. Сорт стійкий проти вилягання та осипання. Посухостійкість середня.

Рекомендований до Реєстру сортів рослин України в зонах Степу, Лісостепу та Полісся.

ПРОСО

Золотисте. Сорт виведений Веселоподільською дослідно-селекційною станцією методом індивідуального добору з гібридної популяції одержаної від схрещування сортів Миронівське 51 і Весело подільське 176.

Ознаки сорту. Кущ прямостоячий, стебло товсте, міцне, 6-7 мм. Листки зелені, по розмірах листків під час колосіння сорт проміжний. Волоть стиснута, поникла, жовта, довжиною 28-36 см. Подушечки відсутні. Зерно крупне, овально-округле, жовте. Морфологічна особливість сорту – сильно звисаюча крупна волоть. Норма висіву насіння 26-30 кг/га.

Урожай зерна 28,9 – 41,4 ц/га, плівчатість 16,7%, вміст білку 11,3%, вихід крупи 79,9%. Маса 1000 зерен 7,6-8,3 г. Колір крупи жовтий. Сорт має високі смакові якості, коефіцієнт розварюваності 4,9.

Вегетаційний період 88 днів, висота рослин 105 см. Сорт має інтенсивний ріст в початкових фазах розвитку, підвищена стійкість до весняного похолодання.

Строк сівби оптимально ранній, норма висіву при суцільному способі посіву 4.0 млн. схожих насінин на гектарі, глибина заробки зерна 5 см. Сорт проса Золотисте цінний, відповідає вимогам інтенсивних технологій вирощування та якісного проведення механізованого збирання і переробки продукції.

Рекомендований до Реєстру сортів рослин по зоні Лісостепу.

Новокиївське 01. Сорт виведений в інституті землеробства УААН методом багаторазового індивідуального добору на фонах штучного зараження різними расами сажки.

Сорт зернового напрямку для виробництва пшона та використання зерна і соломи для годівлі тварин.

Ознаки сорту. Форма куща майже прямостояча. Стебло середньої товщини і міцності. Листок видовжено-ланцетний, опушення в період кушіння середнє. Сорт по величині листків – широколистий.

Волоть стиснута, звисаюча в один бік, темно-солом'яно-жовтий колір, без антоціанового забарвлення, довжина вище середньої, щільність волоті середня.

Подушечки відсутні по всій довжині волоті. Колоскові луски розміром 3.0-4.0 мм, нервація поздовжня. Зерно середньої величини, округле, з високими показниками кулястості. Колір кремовий, внутрішня квіткова плівка знизу злегка сірувата. Чітко відрізняється за сукупністю ознак стебла, листя волотей і, особливо за кремовим забарвленням та кулястою формою низько-плівчатих зернівок.

Рівень однорідності та стабільності прояву ознак – високий. Ґрунти прийняті в зоні випробування. Випробовувати сорт за оптимально ранніх строків сівби, за однакових умов технології, кращий посів рядковий з нормою висіву 4.0-4.5 млн/га та внесення під передпосівну культивуацію гербіциду.

Урожайність 30-35 ц/га. Плівчатість 12,9%. Маса 1000 зерен 7,4 г. Вміст білку 13,6%. Вихід крупи 83,2%. Колір крупи яскраво-жовтий. Колір каші 4,3 балів, розварюваність крупи становить 5,7.

Вегетаційний період 84 днів, висота рослин 118 см. Смакові якості каші 4,4 балів.

Відзначається поєднанням високої продуктивності рослин, стійкості до ураження одночасно до 11-ти з 12 відомих основних рас сажки та до меланому ядер, виключно високим виходом крупи доброї якості.

Сорт придатний для вирощування за сучасними технологіями, до механізованого збирання та переробки зерна на крупу.

Рекомендований до Реєстру сортів рослин по зонах Лісостепу та Полісся.

СОРГО ЗЕРНОВЕ

Генічеське 209. Сорт селекції Генічеської дослідної станції Інституту зернового господарства УААН. Вид – зернове сорго, підвид – кафрське сорго.

Сорт середньостиглий, досягає за 99 днів, що на 7 днів раніше сорту Генічеське 11, перевищує останній по врожаю зерна на 4.6 ц/га. В екстремальні по умовах роки вигідно відрізняється від пізньостиглих сортів посухостійкістю та жаростійкістю. В роки з прохолодними веснами проявляє підвищену холодостійкість.

Сорт технологічний, може бути зібраний на зерно прямим комбайнуванням в першій половині вересня, в окремі роки в кінці серпня-початку вересня в умовах Присивашся.

Насінництво сорту Генічеське 209 надійне, здійснюється по загальноприйнятій схемі насінництва сортів:

1. розсадник відбору;
2. насінний розсадник;
3. розмноження.

Сходи рослин сорту Генічеське 209 мають зелений колір. Головне стебло з 11-13 надземними вузлами, число листків на головному стеблі 9-11. Колір стебла при викиданні волотей і дозріванні зерна зелений. Волоть червоно-коричнева, по формі подовжено-овальна без опушення, довжиною 20-30 см, прямостояча. Листки зелені, ланцетовидні, довжиною 50-70 см, шириною 6-8 см, колір пластинки і жилок зелений, без опушення.

Зерно округле, з боків приплюснуте, червоно-коричнєве, плівка закриває на 1/3 зернину, оболонка червоно-коричнєва, алеїроновий шар кремового забарвлення. Колір ендосперма білий. Зерно добре вимолочується. Колоски округло-яйцевидні, є легка остистість. Розмір колоскової луски 3x4 мм, темно-коричнєвого кольору.

Урожайність 36,6-54,2 ц/га. Маса 1000 зерен 21,4-25,4 г. Сорт має високу засухостійкість, придатний до механізованого збирання. Вегетаційний період 97-100 днів. Висота рослин 100-112 см. Сорт Генічеське 209 слід висівати при оптимальних умовах для проростання насіння, коли температура ґрунту на глибині загортання насіння (5-7 см) досягне +14 градусів. Спосіб посіву широкорядний, з міжряддям 70 см. Норма висіву при вирощуванні на незрошуваних землях 4-6 кг/га, що забезпечує оптимальну густоту стояння рослин сорту. Після посіву доцільне досходове та післясходове боронування, а в фазі 4-6 листків в залежності від забур'яненості посівів – обробка гербіцидами. Ґрунтові гербіциди також забезпечують позитивний результат.

Сорт Генічеське 209 пропонується для вирощування в південних та східних областях України. Рекомендований до Реєстру сортів рослин України по зоні Степу.

Степовий 8. Виведено інститутом зернового господарства УААН і Синельниківською селекційно-дослідною станцією інституту зернового господарства УААН шляхом гібридизації.

За даними сортовипробування урожай зерна складає 31,7-33,1 ц/га. Маса 1000 зерен 20-24 г. Сорт придатний до механізованого збирання. Вегетаційний період 99-112 днів. Висота рослин 128-140 см. Вміст білка в зерні 12,6-14,6%, крохмалю – 75,3-77,9%, жиру – 4,0-4,1%.

Сходи зелені з антоціановим забарвленням. На головному стеблі 7-8 листків, 8-9 надземних вузлів. Колір стебла при викиданні волотей і дозріванні зерна зелений. Волоть прямостояча, яйцевидна, коричнева, слабо остиста, довжина 21-27 см. Листкова піхва зелена, слабо опушена. Листки ланцетовидні, розмір 55x6,7, колір пластинок і жилок темнозелені, без опушення.

Зерно округле, коричневе, плівчатість – 50% зернівки, колір оболонки та алеїронового шару темна, колір ендосперму – білий.

Вимолочуваність зерна добра. Колоски яйцеподібні, остистість легка, розмір колоскової луски 4-5x3-4 мм, колір бурий, характер колоскової луски сидячий. Гібрид відноситься до групи скоростиглих форм, рекомендується для вирощування в степовій зоні України.

Рекомендований до Реєстру сортів рослин України по зоні Степу.

Донецьке 8. Сорт виведений Кримським міжнародним інститутом нетрадиційного рослинництва, екології і здоров'я, селекцентр „Фитодар” – „Гетерозис” методом об'єднання кращих індивідуальних відборів із гібридних комбінацій і синтетичних сортів.

За даними сортовипробування урожай зерна складає 29,4-35,5 ц/га. Маса зерен 22,8 г. Плівчатість 4,9%. Стійкий до осипання, холодостійкості. Довжина вегетаційного періоду 109-113 днів. Висота рослин 115-121 см. Вміст білка в зерні 14,2%. Листки ланцетовидні, розміром 65-75 см, колір пластинок і жилок світлозелений. Зерно округло-приплюснуте, жовто-червоного кольору з темнокоричневою прожилкою по ребру. Колір оболонки і алеїронового шару – чорна плівка. Колір ендосперму світло-жовтий. Колоски видовжено-овальні, безості, колір колоскової луски світло-соломисті. Характерний габітус рослин з добре висунутою волоттю апробаційна та господарська ознака сорту.

Сорт рекомендований для вирощування в східних та південних районах України. Підготовку до посіву вести по системі полупара. Оптимальний термін посіву на півдні України – перша декада травня. Максимальний врожай сорт формує при широкорядному посіві з

Нормою висіву 350-450 тис. насінин (9-11 кг/га). Стабільну високу врожайність забезпечує суцільний рядковий посів з нормою 650-800 тис. шт./га (20-25 кг/га).

Рекомендований до Реєстру сортів рослин України по зоні Степу.

Кейрас. Оригінатор – фірма Рустіка Прогрен Женетік. Гібрид виведений методом гібридизації шляхом схрещування двох ліній, із яких жіноча стерильна (цитоплазматично) і чоловіча – запилювач.

За даними сортовипробування урожай насіння складає 31,5-37,8 ц/га. Маса 1000 зерен 30,6-31,3 г. Гібрид має добру холодостійкість та високу засухостійкість, придатний до механізованого збирання. Вегетаційний період 120 днів, висота рослин 87,3-94,7 см. Вміст білка 11%, крохмалю в зерні 65%, жиру – 3%. Гібрид відноситься до групи скоростиглих форм.

Насінництво гібриду Кейрас надійне. Батьківські форми цвітуть одночасно. Урожайні, ранньостиглі. Зерно материнської форми швидко втрачає вологу. Насінницькі посіви широкорядні.

Колір сходів зелений. Волоть симетрична, коричнево-червона, довжиною 21-27 см, довжина ніжки 18-25 см, прямостояча. Листкова піхва прямостояча, зелена. Листя вузькі, середні, зелені. Зерно округле, червоно-оранжеве, плівчатість середня.

Колір ендосперма оранжевий. Колоски симетричні, розмір колоскових лусок середній, колір темно-коричневий. Гібрид призначений для вирощування на зерно, на харчові та кормові цілі.

Рекомендований до Реєстру сортів рослин України, рекомендується вирощувати в степовій зоні України.

Вінець. Підвид негритянського сорго. Сорт виведений Генічеською дослідною станцією Інституту зернового господарства УААН шляхом схрещування сортів зернового сорго з подальшим направленим індивідуальним відбором ранньостиглих та продуктивних форм.

Ознаки сорту. Сходи зелені. Волоть подовжено-овальна, прямостояча, світло-кремова, без опушення, довжиною 20-30 см, довжина ніжки 30-35 см.

Листова піхва зелена, має легке опушення між піхвою та листовою пластинкою, ланцетовидна. Листки довжиною 40-65 см, ширина 6-9 см. Колір пластинок та жилок зелений, без опушення. Зерно округле, з боків приплюснуте, світло-кремове. Плівка закриває 1/3 зернини. Оболонка світло-кремова, алеїроновий шар – кремовий. Колір ендосперму на 1/2 кремовий, 1/2 білий. Консистенція – 1/2 роговидна, 1/2 мучниста. Колоски округло-яйцевидні, безості. Розмір колоскової луски 3x4 мм, темно-коричневого кольору, сидячі, на 1/3 закриває зернину.

Урожай сорту 31-35,8 ц/га. Маса 1000 зерен 28,5 г. Вегетаційний період 100-110 днів. Висота рослин 96-105 см.

Сорт Вінець слід висівати при оптимальних умовах для проростання насіння, коли температура ґрунту на глибині загортання насіння (5-7 см) досягає +14⁰. Спосіб посіву широкорядний з міжряддям 70 см. Норма висіву насіння при вирощуванні на незрошуваних землях в залежності від регіону 4-8 кг/га. Після посіву доцільне коткування, досходове та після сходове боронування посівів з метою боротьби з бур'янами. А в фазі 4-6 листків, при потребі посівів – обробка гербіцидами. В цій же фазі при наявності злакових попелиць посіви обробляють відповідними препаратами. Ґрунтові гербіциди також забезпечують позитивні результати. За період вегетації проводять 2-3 міжрядні обробки.

Рекомендований до Реєстру сортів рослин України по зоні Степу.

СОРИЗ

Дарунок. Сорт виведений в Селекційно-генетичному інституті методом інтеркросних схрещувань.

Ознаки сорту. Сходи світлозелені. Волоть овально-конусовидна, кольору. Без опушення, довжиною 22-25см, прямостояча. Листки розміром 33x3,5см, світлозелені, без опушення.

Зерно яйцевидне, світложовтого кольору. Плівчатість-на 1/3 закрите. Колір оболонки і алеїронового шару яскраво-жовтий, колір ендосперму матово-жовтий. Колоски ромбовидні, безості, розмір колоскової луски 2,3-2,5мм.

За роки випробування урожай сорту становить 26,4-30 ц/га. Маса 1000 зерен 33-37 г. Засухостійкість і холодостійкість висока. Сорт придатний до механізованого збирання. Вегетаційний період 108-110 днів. Висота рослин 115-120 см. Вміст білку 14,4%, вміст лізину 0,26%, крохмалю 72%, танін відсутній. Скловидність ендосперму 90%. Сорт має добру вирівняність стеблестою та відсутність гілкування після визрівання.

Харчова цінність сорту Дарунок: зерно багате на білково-вітамінний комплекс, цінні мінеральні речовини, дає високий вихід крупи (80%) придатної для виробництва різних видів продуктів.

Сорт придатний для вирощування при будь-якому способі посіву, який забезпечує норму висіву насіння 5-7 кг/га і густоту стояння рослин 70-80 тис/га для півдня України і 90-100 тис/га для середньої смуги.

Рекомендований до Реєстру сортів рослин України по зоні Степу.

Крупинка 10. Сорт відноситься до виду кафрського, виведений в Кримському державному аграрному університеті методом гібридизації. Ознаки сорту. Колір сходів зелений. Волоть подовжено-циліндрична, колір сірувато-білий, опушена в лутовках. Довжина волотей 30-38 см. Листки ланцетоподібні, розміром 61х7,5 см, темно-зелені. Зерно округле, біле, восковидне, колоски гроновидні.

За даними сортовипробування урожай сорту Крупинка 10 становить 23,4-43,0 ц/га. Маса 1000 зерен 24,8-30 г. Сорт засухостійкий, слабо холодостійкий. Вегетаційний період 100-109 днів. Висота рослин 89-117 см. Вміст білку в зерні 12,5-13,3%, лізину 2,2-2,7%, крохмалю 68,7%, жиру-2,4-2,6%.

Вихід крупи 80-85%, технологічні якості крупи високі.

Сорт Крупинка 10 слід висівати при температурі ґрунту 14-16 градусів з міжряддям 70 см. Густота рослин в крайніх південних областях 100-120 тис/га, в областях з більшими опадами 150-200 тис/га, при зрошенні - 300-350 тис/га.

Внесений до Реєстру сортів рослин України по зоні Степу.

Коричневе 11. Сорт виведений в Кримському державному аграрному університеті методом багаторазового відбору.

Ознаки сорту. Сходи зелені. Рослини невисокі, кушисті. На головному стеблі 8-9 листків, колір стебла (при викиданні волоті і дозріванні зерна) грязно антоціанове. Волоть пряма, циліндрична, буро-коричнева, має опушення довжиною 22-25 см, довжина ніжки 26-30 см.

Листкова піхва грязно-зелена, опушення відсутнє. Листки темно-зелені, розміром 6,0х6,5 см. Зерно дрібне, округле, коричнево-буре, без плівки. Маса 1000 зерен 18-20 г. Колір оболонки та алеїронового шару матово-восковий. Колір ендосперму білий, восково-скловидна.

Колоски гроновидні, сидячі. Волоть перед збиранням коричневого кольору.

За даними сортовипробування урожай сорту 28,5-40,8 ц/га, вегетаційний період 100-105 днів, висота рослин 102-126. Вміст білку в зерні 13,4-13,8%, крохмалю 66%, жиру-2,5%, танін відсутній. Сорт соризу Коричневе 11 рекомендується сіяти при температурі ґрунту 14-16 градусів широкорядним методом з міжряддями 70 см. Густота рослин 100-120 тис/га, в областях з більшими опадами - 150-200

тис. шт/га, при зрошенні 300-350 тис/га. Догляд за посівами і післяпосівне коткування, досходове боронування, в фазі 3-5 листків внесення гербіциду. Міжрядний обробіток культиватором, потім підгортання. Збирають тільки волоті, тоді проводять просушування вологого зерна.

Зерно є доброю сировиною для виробництва різних видів продукції.

Рекомендований до Реєстру сортів рослин України по зоні Степу.

Ізумруд. Сорт виведений Селекційно-генетичним інститутом методом інтеркросних схрещувань.

Ознаки сорту. Рослини світлозелені. Волоть овально-конусовидна, прямостояча, колір жовтий, без опушення, довжина 23-25 см, довжина ніжки 20-25 см. Листкова піхва світлозелена, листки розміром 35х4 см. Зерно округло-яйцевидне, глянцево-жовте, плівчатість на 1/3 закрите.

Колір оболонки і алейронового шару жовтий. Колір ендосперму матово-жовтий, скловидний. Колоски ромбовидні, безості. Розмір колоскової луски 2,3-2,5 мм, солом'яного кольору.

За роки випробування в системі сортомережі урожай зерна був в межах 25,6-44,0 ц/га. Маса 1000 зерен 32,8-38,4 г. Засухостійкість та морозостійкість висока. Сорт придатний до механізованого збирання. Вегетаційний період 110-112 днів, висота рослин 112-130 см. Вміст білку 13,7%, лізину 0,25 %, крохмалю 72%, жиру-3,6 %. Скловидність ендосперму 95%. Сорт має високу жаростійкість, відсутність гілкування після визрівання, добру вирівняність стеблестою по висоті та одночасності визрівання.

Харчова цінність :зерно багате на білково-вітамінний комплекс, дає високий вихід крупи (80%) придатної для різних видів харчування.

Сорт Ізумруд придатний для вирощування при будь-якому способі посіву, який забезпечує норму висіву 5-7 кг/га і густоту стояння рослин 70-80 тисяч для засушливих умов півдня України і 90-100 тис/га - для середньої смуги.

Рекомендований до Реєстру сортів рослин України по зоні Степу.

РИС

Зубець. Сорт виведений дослідною станцією рису УААН методом індивідуального добору. Сорт призначений для виробництва крупи. Підвид японіка, різновидність неровіалоніка.

Ознаки сорту. Висота рослин 90-95 см. Кущ компактний, прямостоячий, стійкий до вилягання. Сорт має інтенсивний фіолетовий колір стеблевих вузлів, язичка, вушок, країв листової поверхні та судинних пучків. Листки середньої довжини, зеленого кольору по краях фіолетова окраска, відходять від стебла під гострим кутом. Антоціанове забарвлення розміщене по краях листків. Опушення пластинки передостаннього листка відсутнє або дуже слабе, антоціанове забарвлення вушок передостаннього листка відсутнє. Зігнутість пластинки прапорцевого листка слабка.

Волоть компактна, щільна, поникла, довжиною 15-16 см, має 105-120 колосків розміром 7,1x3,4x2,1 мм. Викривлення основної осі волоті слабе. Час викидання волоті (50% рослин з волоттю) середнє. Антоціанове забарвлення кіля нижньої квіткової луски середнє. Антоціанове забарвлення зони під верхівкою нижньої квіткової луски та верхівки середнє.

Забарвлення приймочки колоска світло пурпурове. Товщина стебла середня. Антоціанове забарвлення вузлів стебла сильне. Опушення нижньої квіткової луски колоска відсутнє або дуже слабе. Волоски на нижній квітковій лусці колоска короткі. Забарвлення верхівки нижньої квіткової луски колоска пурпурове. Остюки волоті відсутні або дуже короткі. Час визрівання сорту 118-125 днів. Зерно коротке. Зернівка – кругла. Ширина зерна середня. Обрушене зерно напівкругле (вид збоку). Біле. Розмір серцевини полірованого зерна відсутня або дуже мала.

Сорт високопродуктивний, за роки випробування урожай сорту Зубець складав 72,0-90,7 ц/га, що дає можливість одержувати по 54,3 ц/га крупи, 5 ц/га – січки, 8,5 ц/га мучки та 10-12,5 ц/га лушпиння. Плівчастість 18%. Маса 1000 зерен 31 г. Скловидність 90%, вихід цілого ядра 92%, вихід крупи при обрушенні зерна 68%, тріщинуватість 8-10%. Колір крупи білий, колір каші білий.

Вегетаційний період сорту 120 днів. Висота рослин 90-95 см.

Продуктивна кустистість 2,4. Число зерен волоті 155 шт. Пустозерність 14 %. Сорт стійкий до осипання та вилягання, добре реагує на рівень азотних добрив. Оптимальний строк посіву перша декада травня. Норма висіву 5,5-6,0 млн. всхожих насінин на 1 гектар. Сорт не реагує на обробіток посівів гербіцидами. Сорт придатний до механізованого збирання та переробки урожаю, рекомендується для вирощування в степовій зоні України.

Рекомендований до Реєстру сортів рослин України по зоні Степу.

Славутич. Сорт рису з подовженою зернівкою виведений дослідною станцією рису УААН методом індивідуального добору, підвид японіка, різновидність італіка. Сорт призначений для виробництва крупи.

Ознаки сорту. Кущ компактний, прямостоячий, стійкий до вилягання, висота рослин 85-90 см. Листки середньої довжини, широкі, зелені. Антоціанове забарвлення листка відсутнє. Опушення пластинки передостаннього листка відсутнє. Зігнутість пластинки прапорцевого листка відсутня або дуже слаба.

Волоть компактна, щільна, довжиною 14-16 см, має 115-136 колосків, розміром 8,6x3,0x2,1 мм. Час викидання волоті середнє. Антоціанове забарвлення кіля нижньої квіткової луски відсутнє або дуже слабе. Антоціанове забарвлення зони під верхівкою нижньої квіткової луски відсутнє або дуже слабе. Антоціанове забарвлення верхівки нижньої квіткової луски відсутнє або дуже слабе. Забарвлення приймочки колоска біле. Товщина та довжина стебла середні. Антоціанове забарвлення вузлів стебла відсутнє або дуже слабе. Довжина

волоті середня. Викривлення основної осі волоті відсутнє або дуже слабке. Опушення нижньої квіткової луски відсутнє або дуже слабке. Волоски на нижній квітковій лусці колоска довгі, забарвлення верхівки нижньої квіткової луски колоска біле.

Остюки волоті відсутні або дуже короткі. Маса 1000 повністю сформованих зерен велика і складає 33 г. Зерно довге, середньої ширини, форма (вид збоку) обрубленого зерна напівверетеноподібна, білого кольору. Розмір білої серцевини полірованого зерна малий. Ендосперм неглютинозний.

Сорт Славутич дозріває на 5-7 діб раніше, висота рослин менша в порівнянні з сортом Україна-5 і складає 91 см. За роки випробування урожай складав 50,8-75,3 ц/га. Плівчатість 19%. Скловидність 93%. Вихід цілого ядра 87%. Вихід крупи при обрубленні зерна 67%. Колір крупи і колір каші білий. Вегетаційний період 118 днів. Пустозерність 16%. Оптимальні строки посіву – 11 декада травня, норма висіву 5,5-6,0 млн. всхожих насінин на 1 га.

Сорт не реагує на обробіток гербіцидами, придатний для механізованого збирання та переробки врожаю, рекомендується для вирощування в степовій зоні України.

Рекомендований до Реєстру сортів рослин України по зоні Степу.

УДК 347.77:633(055) ББК 67.404.1 0-92

Адреса Державної служби з охорони прав на сорти рослин:

Вул. Генерала Родімцева, 15, м. Київ-41, 03041, Україна.

тел.:257-99-33, факс:257-99-34

e-mail: sops@сops.gov.ua

www.sops.gov.ua

Підписано до друку 04.12.2003 року. Наклад 500 пр. Формат 60x84 1/8

Папір офсетний. Гарнітура Times. Ум. др.арк. 5,88

Віддруковано у видавництві "Алефа" з оригінал-макету замовника.

Адреса видавництва: 01042, Україна, м. Київ, вул. Перспективна, 3, тел./факс: 268-80-30

Свідоцтво серія ДК № 306 від 28.12.2000 р.

Агат - Заявник Годовля рослин Собутка, Польща.

Виведений методом гібридизації.

Різновидність екадукум.

Сходи зелені. Стебло сизо-зелене, звичайне, заввишки 68-79 см. Загальна кількість міжвузлів 17-18, до першого суцвіття 12-14. Листки складаються із двох-трьох пар яйцеподібних листочків.

Квітки білі, великі, по дві на квітконіжці. Боби світло-жовті, прямі з тупою верхівкою. Кількість бобів на рослині 10-14. Насінин у бобі 5-6, максимальна 8. Насінина жовто-рожева, округла, гладенька.

Маса 1000 насінин - 257г.

Середньостиглий. Вегетаційний період 83-87 днів.

Стійкий до осипання.

За даними заявника норма висіву 1,2 млн/га схожих насінин. Білка має 23,7-24,9%. Аскохітозом уражується середньо.

Смакові якості добрі, коефіцієнт розварювання 4,4-4,6.

Урожайний. На державних сортовипробувальних станціях та дільницях отримали урожай 29,4-37,4 ц/га. Потенційна можливість сорту 60 ц/га.

Рекомендований для вирощування у зоні Полісся.

Дамир 3 - Заявник науково-дослідна комерційно-виробнича фірма Мир-Сем.

Різновидність екадукум.

Стебло звичайне, заввишки 45-61 см. Загальна кількість міжвузлів 13-17, до першого суцвіття 8-9. Листки з трьома парами яйцеподібних цільнокраїх листочків.

Квітки білі, по дві на квітконіжці. Боби прямі із загостреним кінцем, завдовжки 5-5,5 см. Кількість насінин у бобі 5-6, максимальна - 9. Насінина жовта, округла, гладенька, на місці рубчика сім'яніжка. Маса 1000 насінин 205-215г.

Середньопізній. Вегетаційний період 78-94 дні. Посухостійкий. Придатний до механізованого збирання. За даними заявника норма висіву 1,1 млн/га схожих насінин. Білка має 22,9-23,8%.

Аскохітозом уражується середньо.

Урожайний. На державних сортовипробувальних станціях та дільницях за роки випробування отримали урожай 26,9-35,7 ц/га. Потенційна можливість сорту 60 ц/га.

Рекомендований для вирощування у зоні Лісостепу.

Беркут - Виведений в Луганському сільськогосподарському інституті методом гібридизації.

Різновидність контекмум.

Стебло середньої висоти – 62-74 см.