Охорона прав на сорти рослин
PLANT VARIETY RIGHTS PROTECTION

Офіційний бюлетень
OFFICIAL BULLETIN

Заснований у 2003 р. Видається щоквартально
Випуск 1,частина 4, 2008

КАТАЛОГ СОРТІВ РОСЛИН, ПРИДАТНИХ ДЛЯ ПОШИРЕННЯ В УКРАЇНІ у 2008 р.

КИЇВ 2008

УДК 347.77:633(055) ББК 67.404.1 0-92

Каталог сортів рослин придатних для поширення в Україні видається на виконання Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" з метою організації інформаційної діяльності у сфері охорони прав на сорти рослин.

Поширюється для селекціонерів, власників сортів, виробників насіння і садивного матеріалу, селекційно-насіннєвих фірм, науково-дослідних інститутів, вузів, технікумів, а також представляє інтерес для господарств різних форм власності та городників і садівників.

Каталог підготували: Гончарук В.Я., Ткачик С. О., Загинайло М. І., Бельдій Н. М., Жаркова Г. Г., Лисікова В. М., Гопчак В. О., Павлюк Н. В., Таганцова М. М., Васьківська С. В., Безручко О. І., Майстер Н. В., Києнко З.Б., Лівандовський А.А., Носуля А.М., Довгий Ю.М., Колесніченко О.В., Яковлєв Є.В., Поливаний В.П., Мілієнко М.В., Мізерний В. О., Ілюченко О. С., Гоцуєнко Л. М.

Адреса засновника та редакційної колегії:
Вул. Генерала Родимцева, 15, м. Київ-41, 03041, Україна,
Державна служба з охорони прав на сорти рослин,
Український інститут експертизи сортів рослин
тел.:257-99-33, 258-34-56, факс:257-99-63
e-mail: sops@sops.gov.ua, www.sops.gov.ua

Зареєстровано 23 січня 2003 року
Державним комітетом інформаційної
політики, телебачення та радіомовлення України
Свідоцтво про державну реєстрацію серія **КВ № 6889**

Каталог сортів рослин, придатних для поширення в Україні у 2008 р. – К.: Алефа, 2008. – 420 с.

© Український інститут експертизи сортів рослин, 2008

Підписано до друку 26.05.2008 року. Наклад 1200 пр. Формат 60x84 1/8
Папір офсетний. Гарнітура Times. Ум. др. арк. 52,5
Віддруковано у видавництві "Алефа" з оригінал-макету замовника.
Адреса видавництва: 01042, Україна, м. Київ, вул. Празька, 18, офіс 3,тел./факс: 528-80-30, 573-32-69
Свідоцтво серія ДК № 306 від 28.12.2000 р.

ЗМІСТ

Перелік сортів рослин, придатних для поширення в Україні у 2008 р.	19
Сільськогосподарські: злаки	20
Пшениця м'яка озима	20
Пшениця м'яка яра	25
Пшениця м'яка двуручка	26
Пшениця тверда озима	26
Пшениця тверда яра	27
Жито озиме	27
Жито яре	28
Тритикале озиме	29
Тритикале яре	30
Овес ярий	30
Ячмінь озимий	31
Ячмінь ярий	32
Кукурудза	35
Пшениця шарозерна	51
Сільськогосподарські: бобові	51
Горох	51
Сочевиця	53
Нут	53
Чина	53
Квасоля звичайна	53
Сільськогосподарські: круп'яні	54
Гречка	54
Просо	55
Сорго зернове	55

Сориз	56
Рис	57
Сільськогосподарські: олійні та прядивні	57
Соняшник	57
Соя	66
Ріпак озимий	69
Ріпак ярий	71
Льон кудряш	72
Рижій ярий	73
Гірчиця сарептська	73
Гірчиця біла	73
Рицина	73
Мак	74
Арахіс	74
Кунжут індійський	75
Суріпиця озима	75
Суріпиця яра	75
Льон-довгунець	75
Коноплі	76
Бавовник	76
Гірчиця сарептська озима	76
Гірчиця чорна	77
Смикавець їстівний (Чуфа)	77
Сільськогосподарські: буряк	77
Буряк цукровий	77
Буряк кормовий	81
Сільськогосподарські: картопля	82
Картопля	82

Сільськогосподарські: кормові	86
Пайза	86
Сорго віникове	86
Сорго цукрове	87
Суданська трава	87
Сорго-суданковий гібрид	87
Елевсина (Дагуса)	88
Пажитниця однорічна (Вестервольдська)	88
Грястиця збірна	88
Костриця східна	88
Костриця лучна	88
Костриця очеретяна	89
Мітлиця велетенська	89
Очеретянка звичайна	89
Пирій видовжений	90
Райграс високий	90
Пажитниця багаторічна	90
Гребінник звичайний декоративний	91
Костриця червона мінлива	91
Костриця жорстка	91
Костриця овеча	91
Костриця різнолиста	91
91Костриця червона	92
Костриця тонколиста	93
Костриця шорстколиста	93
Мітлиця повзуча	93
Мітлиця тонка	93
Тонконіг лісовий	93
Тонконіг лучний	93
Тонконіг фіолетовий	94
Стоколос безостий	94

Тимофіївка лучна	94
Трава Колумба	94
Пажитниця багатоквіткова	95
Боби кормові	95
Горошок (Вика озима)	95
Горошок (Вика яра)	95
Пелюшка	96
Конюшина відкритозіва	96
Конюшина олександрійська	96
Люпин білий	96
Люпин жовтий	97
Люпин вузьколистий	97
Серадела	97
Горох кормовий	97
Буркун білий	98
Еспарцет	98
Люцерна мінлива	98
Козлятник лікарський (кормовий)	99
Козлятник східний	99
Конюшина лучна	99
Конюшина гібридна	100
Конюшина повзуча (біла)	100
Люцерна посівна	100
Люцерна хмелевидна	101
Лядвенець рогатий	101
Чина лісова гібридна	101
Щириця	101
Віничня справжнє	102
Мальва кучерява	102
Мальвапухлена	102
Мальва мелюка	102

Топінамбур	102
Топісоняшник	103
Лаватера тюрінгська	103
Щавель тяншанський	103
Сильфій пронизолистий	103
Свербига східна	103
Тіфон	103
Фацелія	103
Мальва гібридна	103
Сіда багаторічна	103
Турнепс	103
Гарбуз кормовий	103
Пирій середній	104
Щавнат	104
Люцерна жовта (серповидна)	104
Еспарцет закавказький	104
Сільськогосподарські: овочеві	104
Баклажан	104
Боби кінські	105
Буряк столовий	105
Вівсяний корінь	106
Гірчиця салатна	106
Гарбуз	106
Горох овочевий	107
Диня	108
Кабачок	109
Кавун	110
Капуста білоголова	112
Капуста броколі	116
Капуста брюсельська	116

Капуста качанна (червоноголова)	116
Капуста кольрабі	117
Капуста пекінська	117
Капуста савойська	117
Капуста цвітна	117
Квасоля овочева	119
Крес-салат	120
Кукурудза розлусна	120
Кукурудза цукрова	120
Мангольд	121
Морква	121
Огірок	124
Пастернак	129
Патисон	129
Перець гіркий	130
Перець солодкий	130
Петрушка	132
Помідор	133
Ріпа	140
Редиска	141
Редька посівна	142
Редька олійна	143
Салат головчастий	143
Салат латук	143
Селера листкова	144
Тиква звичайна	145
Фізаліс	145
Хрін	145
Цибуля батун	145
Цибуля городня	145
Цибуля порей	148

Цибуля скорода	148
Цибуля слизун	148
Цибуля шалот	148
Часник	148
Чорнушка посівна ь(Нігела)	149
Шпинат	149
Щавель	149
Цибуля запашна	149
Гібіск їстівний (Бамія)	149
Гарбуз мускусний	149
Квасоля багатоквіткова	149
Сільськогосподарські: інші	149
Аніс	149
Васильки справжні	150
Гісоп лікарський	150
Ельшольція Стаунтона	150
Змієголовник	150
Змієголовник молдавський	150
Катран Стевена	150
Кмин	150
Коріандр	151
Котяча м'ята	151
Кріп	151
Лаванда	152
Лавандин	152
Лаконос американський	152
Лофант	152
Майоран	152
Меліса лікарська	152
Меліса лимонна	152

Молочай чиновий	153
М'ята	153
Полин лимонний	153
Рожа рожева	153
Розмарін лікарський	153
Сафлор красильний	153
Троянда ефіроолійна дамаська	154
Тютюн	154
Фенхель	154
Хміль	154
Хризантема ефіроолійна	155
Хризантема увінчана	156
Цмин італійський	156
Чабер гірський	156
Чабер садовий	156
Чебрець	156
Чебрець камфорний	156
Чорнобривці прямостоячі, повняки	156
Шавлія мускатна	156
М`ята довголиста	157
Монарда трубчаста	157
Плодові та ягідні	157
Яблуня домашня	157
Груша	159
Айва	161
Хеномелес	162
Абрикос	162
Алича	163
Вишня	163
Черешня	164

Слива	165
Персик	166
Нектарін	168
Кизил	168
Агрус	168
Актинідія	169
Жимолость	169
Калина	170
Лимонник	170
Малина	170
Обліпиха	170
Порічки (червоні і білі)	170
Смородина чорна	171
Суниця	172
Горіх грецький	173
Гранат	173
Інжир	174
Ківі	174
Лимон	174
Маслина	174
Мигдаль	174
Унабі	174
Хурма	174
Хурма східна	174
Актинідія пурпурна х актинідія гостра	175
Яблуня (підщепа)	175
Виноград	175
Виноград	175
Декоративні та лікарські	179

Азалія	179
Алтея	179
Белладонна	179
Бузок	179
Валеріана лікарська	179
Вовчуг польовий	179
Гладіолус	179
Головатень круглоголовий	181
Сахалінська гречка	181
Еремур	181
Ехінацея пурпурова	181
Женьшень	181
Жовтушник лакфіолевидний	181
Жоржина	181
Звіробій	182
Калістефус китайський	182
Канна індійська	183
Ломиніс	184
Льон великоквітковий (декоративний)	185
Мачок жовтий	185
Наперстянка пурпурова	185
Наперстянка шерстиста	185
Оман високий	185
Півники	185
Півонія	185
Персик декоративний	186
Подорожник блошиний	186
Подорожник великий	186
Ехінацея бліда	186
Розторопша плямиста	186
Ромашка аптечна	186

Ротики садові	186
Солодка гола	187
Соняшник декоративний однорічний	187
Стевія	187
Троянда	187
Тюльпан	189
Флокс волотистий	189
Тютюн крилатий	189
Хризантема	189
Целозія гребінчаста	192
Цмин пісковий	192
Чебрець повзучий	192
Шавлія лікарська	192
Щириця Мантегацца	192
Щириця хвостата	192
Рицина декоративна	192
Полин кримський	192
Полин лікарський	192
Череда трироздільна	192
Лісові	193
Дуб	193
Кедр атласний	193
Модрина	193
Сосна звичайна	193
Сосна кедрова	193
Ялиця біла	193
Ялиця бальзамічна	193
Ясен вузьколистий	193
Інші	193

Глива звичайна	193
Печериця	194
Шії-таке	194
Шовковиця	194
Характеристики сортів рослин, занесених до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні у 2008 році	195
Сільськогосподарські: злаки	196
Пшениця м'яка озима	196
Пшениця м'яка яра	209
Пшениця м'яка двуручка	212
Пшениця тверда озима	212
Пшениця тверда яра	213
Жито озиме	214
Тритикале озиме	215
Тритикале яре	217
Овес ярий	218
Ячмінь озимий	218
Ячмінь ярий	219
Кукурудза	226
Сільськогосподарські: бобові	263
Горох	263
Сочевиця	266
Нут	266
Сільськогосподарські: круп'яні	267
Гречка	267
Просо	268
Сорго зернове	269
Сориз	270

Рис	272
Сільськогосподарські: олійні та прядивні	274
Соняшник	274
Соя	293
Ріпак озимий	297
Ріпак ярий	299
Гірчиця сарептська	299
Гірчиця біла	300
Мак	300
Льон-довгунець	300
Сільськогосподарські: буряк	301
Буряк цукровий	301
Буряк кормовий	308
Сільськогосподарські: картопля	308
Картопля	308
Сільськогосподарські: кормові	312
Сорго цукрове	312
Суданська трава	312
Горошок (вика яра)	313
Люпин білий	314
Люпин вузьколистий	314
Серадела	315
Конюшина повзуча (біла)	315
Турнепс	316
Кострица червона	316
Еспарцет закавказький	316

Сільськогосподарські: овочеві	317
Баклажан	317
Боби кінські	317
Буряк столовий	317
Горох овочевий	319
Диня	323
Кабачок	324
Кавун	324
Капуста білоголова	325
Капуста броколі	330
Капуста брюсельська	330
Капуста качанна (червоноголова)	331
Капуста пекінська	332
Капуста цвітна	332
Квасоля овочева	335
Кукурудза розлусна	336
Кукурудза цукрова	337
Морква	341
Огірок	347
Перець солодкий	349
Петрушка	350
Помідор	351
Ріпа	366
Редиска	366
Салат головчастий	369
Салат латук	371
Селера листкова	373
Тиква звичайна	373
Холодок лікарський	373
Цибуля батун	374
Цибуля городня	374

Шпинат	378
Гарбуз мускатний	378
Артишок посівний	379
Селера коренеплідна	379
Сільськогосподарські: інші	380
Кмин	380
Лавандин	380
М'ята перцева	381
Полин лимонний	381
Тютюн	382
Хміль	382
М'ята довголиста	383
Плодові та ягідні	384
Яблуня домашня	384
Груша	386
Черешня	387
Слива	387
Кизил	389
Актинідія	389
Калина	390
Малина	390
Смородина чорна	391
Суниця	392
Унабі	393
Актинідія пурпурна х актинідія гостра	393
Чорниця щиткова	394
Виноград	396
Виноград	396

Декоративні та лікарські	398
Азалія	398
Головатень круглоголовий	401
Мачок жовтий	402
Полин кримський	402
Азіміна трилопатева	403
Любисток лікарський	404
Каріоптеріс сивий	404
Адреси заявників, власників, підтримувачів сорту та інші	405
Скорочення термінів	419

Перелік сортів рослин, придатних для поширення в Україні у 2008 р.

Сорт				Код	Зона	Характеристики								
						Продук-тивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєст-рації	Заявник / Підтримувач						посухи	поля-гання	осипання	хвороб	
Сільськогосподарські: злаки														
Пшениця м'яка озима														
Астет		01007037	2006	404 /	СЛ	7	зерн	ср	7-9	7-9	7-9	8-9	7-9	слн
Антара		04007030	2008	376 /	С	8	зерн	ср	7-8	8	8-9	9	7-8	слн
Артеміда		02007022	2008	736 /	ЛП	7-8	зерн	сс	8	7-8	8,5	8	7-8	цін
Актер		05007030	2008	807 /	П	7-8	зерн	сс	6-7	7-8	8-9	8-9	8-9	слн
Апогей Луганський	®	02007020	2006	309 /	СЛ	7-8	зерн	ср	7-8	8	6-8	8-9	7-8	слн
Антонівка		05007007	2008	378 /	СЛ	7-8	зерн	ср	8-9	7-8	8-9	8-9	7-8	слн
Альбатрос одеський		86007002	1990	378 / 378	СЛ	7	зерн	ср	7-8	5	5	7-9	5	слн,зрош
Ассоль		04007038	2008	376 /	С	7-8	зерн	ср	8-9	8	9	9	7-8	слн
Безмежна		04007008	2008	922 /	СЛ	7-8	зерн	ср	8-9	7-8	8-9	8-9	7-8	слн
Білоцерківська напівкарликова	®	94007028	1999	1097 / 1097, 335	ЛП	7	зерн	рс	7	5	7-9	5	5	цін
Білосніжка		01007017	2006	315 /	СЛ	7-9	зерн	ср	7-9	8-9	8-9	8-9	7-9	слн
Безоста 1		59007001	1959	25 / 1112	С	5	зерн	ср	<5	5	7-9	7-9	5	слн
Богдана	®	03007018	2006	355 /	СЛП	8-9	зерн	сс	7-9	8-9	8-9	8-9	7-9	слн
Батько		02007029	2006	25 / 1112	С	5-7	зерн	рс	5-7	8	8-9	8-9	7-9	слн
Богиня		04007021	2008	315 /	СЛ	8	зерн	ср	8	7-8	9	8-9	7-8	слн
Василина	®	01007038	2005	404 / 404	ЛП	7-8	зерн	сс	8-9	7-8	8	8	8-9	слн
Вікторія одеська	®	93007001	1998	378 / 378	Л	9	зерн	ср	6-7	7	5	7-9	5	цін
Віта		03007026	2007	25 / 1112	СЛ	7	зерн	ср	7-9	8	8-9	8-9	7	цін
Витязь	®	93007003	1998	520 / 520	С	5	зерн	рс	7-8	7-9	5	7-9	5	цін
Веснянка		02007007	2005	355 /	СЛП	6-7	зерн	рс	7	8	8	8-9	7-8	слн
Вдала	®	03007009	2006	378 /	СЛ	7-9	зерн	ср	7-8	8	8-9	8-9	7-8	слн
Веста		00007004	2003	341 / 341	ЛП	9	зерн	сс	7	5	7-9	7-9	5	цін
Володарка		02007006	2005	355 /	ЛП	7-9	зерн	сс	8	8	8-9	8-9	8-9	цін
Волошкова		04007026	2008	341 /	ЛП	8-9	зерн	сс	8	8	8	8	7-8	цін
Вінничанка		04007023	2008	888 /	ЛП	8-9	зерн	сс	8	8	8	8-9	7-8	цін

Сорт				Код	Зона	Характеристики								
						Продук-тивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєст-рації	Заявник / Підтримувач						посухи	поля-гання	осипання	хвороб	
Господиня		04007006	2007	378 /	СЛ	7-8	зерн	ср	7	8	8-9	8-9	5-7	слн
Глібовчанка		98007008	2002	388 /	Л	7	зерн	сс	7-8	5	5	7-9	5	слн
Дар Луганщини		01007005	2005	309 /	С	7	зерн	ср	8-9	8	8	8	7	слн
Донецька 48		93007045	1997	315 /	СЛ	9	зерн	ср	7-8	7-9	5	7-9	5	цін
Дончанка 3		92007046	1995	315 /	С	5	зерн	ср	7	7-9	5	7-9	5	слн
Донський сюрприз		01007023	2006	212 / 1112	СЛ	7	зерн	рс	7-9	7-9	8-9	8-9	7-9	слн
Дальницька		00007015	2005	378 /	СЛ	7-9	зерн	ср	7	8	8	8-9	8	слн
Донецька 46		86007014	1990	315 /	СЛ	7	зерн	ср	7-8	7-9	5	7-9	5	слн
Доля		97007003	2001	312 /	С	7	зерн	рс	<5	7-9	7-9	7-9	5	цін
Деметра	®	00007005	2005	341 / 1025, 341	ЛП	7-8	зерн	сс	7	7	8-9	9	7-8	цін
Дріада 1	®	00007001	2004	1123 / 1123	С	9	зерн	рс	7-9	7-9	7-9	7-9	7	слн
Диканька	®	02007013	2005	386 /	Л	7	зерн	сс	8-9	7	8	9	8	слн
Добірна		02007008	2005	355 /	СЛП	7	зерн	сс	7	8	8	9	8-9	слн
Елегія	®	99007003	2003	335 /	ЛП	7	зерн	сс	7	7	7-9	7-9	7	цін
Єрмак		01007025	2005	212 / 1112	СЛ	7-9	зерн	ср	8	8	8-9	8	8-9	слн
Єдність		05007008	2008	378 /	СЛП	8-9	зерн	ср	8,5-9	8	8-9	8-9	7-8	слн
Зіра		01007001	2005	340 /	СЛ	7	зерн	ср	7-8	8	7-8	8-9	8	цін
Зерноградка 11		01007028	2005	212 / 1112	С	8	зерн	ср	7-8	8-9	8-9	9	8-9	слн, зрош
Зразкова	®	03007005	2007	378 /	СЛ	7-9	зерн	ср	7-8	8	8-9	8-9	7	слн
Застава одеська	®	98007011	2002	378 /	ЛП	7	зерн	ср	5-6	7-9	5	7-9	5	слн
Зимоярка	®	04007010	2007	355 /	Л	7-9	зерн	сс	<5	7-8	9	8-9	7	слн
Збруч		90007012	1994	355 /	Л	5-7	зерн	сс	5-7	7	7	7-9	7	цін
Запорука		04007018	2008	378 /	СЛ	7-8	зерн	ср	8	8	9	8-9	7-8	слн
Землячка одеська	®	03007007	2006	922 /	СЛ	7-9	зерн	ср	7-8	8-9	8-9	8-9	7-8	цін
Зміна	®	03007006	2007	922 /	С	7-9	зерн	ср	5-7	8-9	8-9	8-9	7	слн
Зустріч	®	98007010	2002	378 / 378	СЛ	9	зерн	ср	5	7-9	7-9	7-9	5	слн
Знахідка одеська	®	96007005	2001	378 / 378, 378	С	7	зерн	рс	>5	7-9	6-7	7-9	5	слн
Золотоколоса	®	03007020	2006	355 /	СЛП	9	зерн	сс	7	7	8-9	9	7-9	цін
Іванівська остиста		93007010	1997	394 /	Л	7	зерн	сс	7	5	5	7-9	5	ф

Сорт				Код	Зона	Характеристики								
						Продук-тивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєст-рації	Заявник / Підтримувач						посухи	поля-гання	осипання	хвороб	
Київська 7		94007006	1998	355 /	П	7	зерн	ср	7	5	5	7-9	5	дф
Комплімент	®	03007022	2007	807 /	П	7-9	зерн	сп	5	7-8	8-9	9	7-9	цін
Коломак 3		93007038	1997	386 / 386	СЛП	7	зерн	сс	7-8	5	7-9	7-9	5	слн
Красуня одеська		93007011	1997	378 / 378	СЛ	7	зерн	ср	7-8	7-9	5	7-9	5	слн
Київська остиста		92007018	1995	355 /	ЛП	5	зерн	сс	5	5	7-9	7-9	5	слн
Коломак 5		93007039	1997	386 / 386	Л	7	зерн	сс	7-8	5	5	7-9	5	слн
Кнопа		04007009	2008	381 /	СЛ	8-9	зерн	ср	8	8	8,5-9	8-9	7-8	цін
Косовиця		04007005	2008	378 /	СЛ	8-9	зерн	ср	8-9	8	8-9	8-9	7-8	слн
Копилівчанка		98007007	2003	345 / 345	ЛП	5	зерн	сс	7-8	5	5	7-9	5	цін
Крижинка	®	98007004	2002	341 / 341	ЛП	9	зерн	сс	8-9	5	5	7-9	5	цін
Київська 8		97007014	2001	355 /	СЛП	9	зерн	сс	7-8	7-9	7-9	7-9	5	слн
Краплина		04007022	2008	315 /	С	8-9	зерн	ср	8	8	9	9	7-8	слн
Краснодарська 99		03007027	2006	25 / 1112	С	7-8	зерн	рс	7	8	8-9	8-9	7-8	слн
Косоч		05007045	2008	627 /	Л	7-8	зерн	рс	7-8	8	9	8	7-8	цін
Кірія		00007017	2004	378 /	С	8-9	зерн	ср	7	8	8-9	9	7	слн
Кобіра		04007002	2008	279 /	ЛП	8-9	зерн	сс	8	8	8-9	8-9	8	цін
Калинова		05007027	2008	341 /	ЛП	8	зерн	сс	7-8	7-8	8	8-9	7	цін
Куяльник	®	99007007	2003	378 /	СЛ	9	зерн	ср	5	7-9	7	7-9	7	слн
Колумбія	®	00007010	2003	355 / 341	СЛП	9	зерн	рс	5-6	5	7-9	7-9	7-9	слн,зрош
Кольчуга	®	03007011	2007	1192 /	С	5-7	зерн	рс	7-8	8	8-9	9	7	цін
Красота		02007030	2007	25 / 1112	Л	7-9	зерн	ср	7-8	7-8	8-9	8-9	7	слн
Колос Миронівщини		05007025	2008	341 /	ЛП	8	зерн	сс	8	8	8-9	8,5	7-8	цін
Луганчанка		01007004	2005	309 /	С	7-8	зерн	ср	8-9	8	7-8	8-9	8	слн
Либідь	®	03007021	2006	335 /	СЛП	7-9	зерн	сс	7-9	7-8	7-9	7-9	7	слн
Левада	®	01007007	2005	386 /	Л	7-8	зерн	сс	8-9	7	8	9	8	слн
Леля	®	94007022	2000	378 / 378	С	7	зерн	ср	6	7-9	5	7-9	5	слн
Ліона		01007019	2005	378 /	СЛ	8-9	зерн	ср	6-7	8	8	8	8	слн
Лугастар		05007017	2008	1121 /	С	8-9	зерн	ср	8-9	7-8	9	8-9	7-8	слн
Лист 25	®	03007023	2007	1059 /	СЛ	7-9	зерн	ср	7-8	8	8-9	8-9	7	цін

Сорт				Код	Зона	Характеристики								
						Продук-тивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєст-рації	Заявник / Підтримувач						посухи	поля-гання	осипання	хвороб	
Лузанівка одеська	®	97007007	2001	378 / 378	С	7	зерн	ср	7-8	7-9	5	7-9	5	слн
Ласуня		02007009	2007	355 /	СЛ	5-7	зерн	сс	7-9	7-8	9	8-9	7	слн
Ларс	®	00007020	2005	926 / 926	П	7-8	зерн	сс	6	7	8-9	9	8-9	цін
Миронівська 66	®	95007006	2000	341 / 341	П	7	зерн	сс	6	5	5	7-9	5	цін
Миронівська 30		92007042	1995	341 / 341	ЛП	7	зерн	сс	6	5	5	7-9	5	ф
Мирич		94007013	1999	341 / 341	П	7	зерн	сс	5	5	5	7-9	5	дф
Миронівська 65	®	95007005	2000	341 / 341	ЛП	7	зерн	сс	6-7	5	5	7-9	5	цін
Миронівська 33		94007014	1998	341 / 341	П	7	зерн	сс	6	5	5	7-9	7-9	дф
Мирхад	®	95007004	2000	341 / 341	П	7	зерн	сс	5	5	7	7-9	7-9	ф
Миронівська остиста		87007027	1992	341 / 341	ЛП	5	зерн	сс	6-7	5	5	7-9	5	цін
Миронівська ранньостигла	®	98007012	2002	341 / 341	ЛП	5	зерн	рс	6	5	5	7-9	5	цін
Миронівська 808		61007001	1963	341 /	ЛП	5	зерн	сс	7-9	5	5	7-9	7	слн
Миронівська 61		86007024	1989	341 / 341	ЛП	7	зерн	сс	7-8	5	5	7-9	5	цін
Миронівська 67		98007003	2002	341 / 341	П	9	зерн	сс	6	5	5	7-9	5	цін
Національна		01007016	2005	350 /	ЛП	7	зерн	сс	8-9	8	8-9	8	8	цін
Находка 4		93007014	1996	411 /	С	7	зерн	ср	5	7-9	5	7-9	5	цін,зрош
Ніконія	®	95007003	2000	378 / 378	С	9	зерн	ср	6-7	7-9	7-9	7-9	5	слн
Нела		94007001	1998	946 /	П	9	зерн	сп	5	5	7-9	7-9	5	цін
Оксана		01007013	2007	378 /	С	5-7	зерн	ср	5-7	8	8-9	9	7	цін
Одеська 267		93007033	1997	378 / 378	СЛ	9	зерн	ср	7-8	7-9	5	7-9	5	слн
Олеся	®	97007009	2001	1097 / 335, 1097	ЛП	9	зерн	ср	6-7	7-9	7-9	5	5	цін
Олексіївка		04007020	2008	315 /	СЛ	8-9	зерн	ср	8	8	8-9	8-9	7-8	слн
Паляниця		04007035	2008	1059 /	СЛ	8-9	зерн	ср	8	8	9	8-9	7-8	цін
Побєда 50		97007024	2005	25 / 1112	СЛ	7	зерн	ср	6-7	8	7-8	9	7	слн
Пам'ять		04007046	2008	25 /	Л	8	зерн	ср	8	7-8	8-9	8-9	7-8	слн
Переяславка		01007014	2004	355 / 341	СЛП	7-9	зерн	ср	7-8	7	7-9	9	7-9	слн
Писанка	®	01007011	2006	378 /	СЛ	7-9	зерн	ср	7-8	8-9	7-8	8-9	7-9	слн
ПАЛПИЧ		04007044	2008	25 /	СЛ	8-9	зерн	ср	8	8	9	8-9	7-8	слн

Сорт				Код	Зона	Характеристики								
						Продук-тивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєст-рації	Заявник / Підтримувач						посухи	поля-гання	осипання	хвороб	
Панна	®	99007006	2003	378 /	С	5	зерн	ср	5-6	7-9	6-7	7-9	7	слн
Пошана	®	00007018	2004	378 / 378	С	7-9	зерн	ср	5	7-9	7	7-9	7	слн
Подяка		04007017	2008	378 /	СЛ	8-9	зерн	ср	8	8-8,5	8-9	8	7-8	слн
Попелюшка	®	03007004	2007	315 /	СЛ	7-9	зерн	ср	8	8	8-9	8-9	7	слн
Палма		96007015	2002	720 / 1112	ЛП	9	зерн	сп	5	5	7-9	7-9	7-9	цін
Почесна (Престиж)		03007038	2007	209 / 1112	СЛ	7	зерн	ср	7-9	8-9	8-9	8-9	7	слн
Перлина лісостепу	®	98007013	2001	335 / 1097, 335	ЛП	9	зерн	сс	7	5	5	7-9	5	цін
Поліська 90		90007028	1994	345 / 345	ЛП	5	зерн	сс	7	5	5	7-9	5	цін
Повага	®	99007008	2003	378 /	СЛП	9	зерн	ср	6-7	8	8	9	7-8	слн
Пивна	®	03007019	2006	355 /	ЛП	8-9	зерн	сс	7-8	7-8	8-9	8-9	7-9	ф
Подолянка	®	00007009	2003	355 / 341	СЛП	9	зерн	ср	7-8	7-8	7-8	7-9	7	слн,зрош
Ренан		92007049	2006	1155 /	Л	7	зерн	сс	5-7	7	9	8-9	8-9	слн
Ремеслівна	®	00007007	2004	341 / 341	СЛП	7-9	зерн	ср	7-8	8	8-9	9	7-8	слн
Росинка тарасівська		03007036	2007	209 / 1112	С	7-8	зерн	ср	7-8	8	7-8	8-9	7	слн
Росинка	®	02007040	2007	412 /	С	7-8	зерн	ср	8	8	8-9	8-9	7	слн
Смуглянка		01007015	2004	355 / 341	СЛП	9	зерн	ср	6	7-9	9	7-9	7-9	слн
Станична		01007033	2005	212 / 1112	С	7	зерн	рс	7	8	8	8	8	слн
Саскія		98007017	2002	946 /	ЛП	9	зерн	сп	5	5	7-9	7-9	7-9	цін
Світанок 1	®	02007001	2006	1124 /	СЛ	7-8	зерн	ср	7-8	7-9	8-9	8-9	7-9	слн
Сніжана		00007003	2004	341 / 341	ЛП	5	зерн	сс	7-9	5	7-9	7-9	7	філер
Сирена одеська	®	97007006	2002	378 / 378	С	7	зерн	ср	6-7	7-9	5	7-9	5	слн
Столична		01007003	2005	345 / 345	ЛП	7-9	зерн	сс	7-8	7	7-8	8	8-9	цін
Селянка	®	97007008	2001	378 / 378	С	9	зерн	ср	5-6	7-9	5	7-9	5	слн
Супутниця	®	02007019	2006	378 /	СЛ	7-8	зерн	ср	7-8	8-9	8-9	8-9	7-9	слн
Скарбниця		04007003	2007	378 /	СЛ	7-9	зерн	ср	8	7-8	8-9	8-9	7	слн
Снігурка	®	04007012	2007	355 /	СЛ	8-9	зерн	сс	8	8	8-9	8-9	7	слн
Скіф'янка		89007039	1993	25 / 1112	С	7	зерн	ср	5	7-9	7-9	7-9	5	слн,зрош
Станіслава		04007019	2008	1121 /	СЛ	8-9	зерн	ср	8	8	8-9	8-8,5	7-8	слн
Співанка		00007019	2005	312 /	С	7-9	зерн	ср	5-6	8	8	8	7-8	слн

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	полягання	осипання	хвороб	
Тронка ®	00007032	2005	1124 / 1159, 659	СЛ	7-8	зерн	ср	7-8	8	8-9	8	8	слн
Трипільська	04007015	2008	1203 /	СЛП	8-9	зерн	сс	8	8	8-9	8-9	7-8	слн
Українка одеська	92007002	1995	378 / 378	СЛП	7	зерн	ср	7	7-9	5	7-9	5	цін
Українка Полтавська ®	94007026	2000	294 / 308, 294, 295, 386, 513, 511	Л	7	зерн	сс	8	5	5	7-9	5	слн
Фантазія одеська	92007056	1996	378 / 376, 378	С	9	зерн	ср	6-7	7-9	7-9	7-9	5	слн
Фарандоль	02007027	2006	1155 /	ЛП	7-9	зерн	сс	>5	7	9	8-9	8-9	цін
Фаворитка	02007010	2005	355 /	ЛП	8	зерн	сс	7	7	8-9	8-9	8-9	цін
Фішт	02007028	2007	25 / 1112	СЛ	8-9	зерн	ср	8	8	8-9	8-9	7	слп
Херсонська остиста	92007032	1995	411 /	С	7	зерн	рс	5-6	7-9	7-9	7-9	5	цін,зрош
Хуртовина ®	04007011	2007	355 /	СЛ	8-9	зерн	сс	8	8	8-9	8-9	7	слн
Херсонська 99	99007011	2005	411 /	С	7	зерн	ср	7	8	8	8-9	7-8	цін, зрош
Херсонська безоста	97007005	2002	411 /	СЛП	9	зерн	ср	7	5	7-9	7-9	5	цін,зрош
Харус ®	99007004	2002	404 / 404	СЛ	9	зерн	сс	7-8	7	7-9	7-9	7-8	цін
Циганка	94007005	1998	355 /	ЛП	7	зерн	пс	<5	5	5	7-9	7-9	цін
Царівна	05007036	2008	335 /	ЛП	8	зерн	ср	8,5-9	8	8-9	8	7-8	слн
Шестопалівка ®	03007001	2007	1124 / 1159	СЛ	8-9	зерн	рс	8	8	8-9	8-9	7	слн
Юна	89007044	1993	25 / 1112	СЛ	7	зерн	ср	5	7-9	7-9	7-9	5	слн
Ювілейна 100	04007045	2008	25 /	СЛ	8-9	зерн	рс	8	8	9	8	7-8	слн
Ятрань 60	97007010	2001	355 /	СЛП	9	зерн	сс	6-7	7-9	7-9	7-9	5	слн
Ясочка	01007039	2006	335 /	Л	8	зерн	сс	7-8	7-8	8-9	8-9	7-9	цін
Тітона	05007006	2008	1124 /	СЛП	8-9	зерн	ср	8	8	8	8-9	7-8	слн
Пшениця м'яка яра													
Ажурная ®	03007028	2006	920 /	ЛП	6	зерн	сс	-	7	8	8-9	7-9	слн
Аранка ®	04007027	2007	888 /	СЛП	7-9	зерн	сс	-	7-8	8-9	8	7	слн
Вітка ®	99007015	2003	345 / 345	П	7	зерн	рс		5	7	7-9	7	цін
Венера	03007013	2005	879 / 879	Л	7	зерн	ср	-	7	9	8	8	цін
Героїня ®	02007036	2005	404 / 404	С	5-7	зерн	сс	-	7	9	8	7-8	слн

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продук-тивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач					посухи	поля-гання	осипання	хвороб	
Дніпрянка		79007052	1982	345 / 345	Л	7	зерн	рс		5	5	7-9	5	слн
Етюд	®	03007029	2006	341 /	ЛП	7-8	зерн	сс	-	8	8-9	8-9	7-9	цін
Елегія миронівська	®	00007023	2004	341 / 341	ЛП	7-9	зерн	сс		7	7	7-9	7	слн
Краса Полісся	®	00007022	2003	430 / 1112, 430	П	7	зерн	сс		5	7-9	7-9	7	цін
Колективна 3	®	96007002	2000	341 / 341	Л	7	зерн	сс		5	7-9	7-9	7	цін
Катюша		90007050	1996	305 /	Л	7	зерн	рс		5	5	7-9	7	ф
Легуан		95007032	2000	946 /	Л	9	зерн	сс		5	7-9	7-9	7-9	цін
Миронівчанка		95007021	1999	341 / 341	Л	7	зерн	сс		5	7-9	7-9	7	цін
Миронівська яра		75007040	1978	341 / 341	ЛП	7	зерн	сс		5	5	7-9	5	цін
Недра	®	03007034	2007	345 /	ЛП	7-8	зерн	сс	-	7-8	8	8-9	7	цін
Печерянка		00007025	2004	305 /	Л	5	зерн	сс	-	7	7	7-9	7	цін
Рання 93		93007063	1996	345 / 345	ЛП	7	зерн	ср		5	7	7-9	7	цін
Стависька	®	04007042	2007	350 /	ЛП	7-8	зерн	сс	-	8	7-8	8-9	7	цін
Скороспілка 98		97007018	2001	345 / 345	Л	7	зерн	ср		5	7-9	7-9	7	ф
Скороспілка 95		95007022	2000	345 / 345	П	7	зерн	рс		5	7	7-9	7	цін
Сюїта	®	04007047	2007	341 /	ЛП	7-8	зерн	сс	-	8-9	6-8	8-9	7	слн
Скороспілка 99	®	99007010	2003	345 / 345	ЛП	7	зерн	рс		5	7	7-9	7	цін
Срібнянка	®	03007031	2006	1112 / 1112	Л	7-8	зерн	сс	-	7-8	8-9	8-9	7-9	ф
Трізо	®	01007036	2004	807 /	ЛП	7-9	зерн	сс	-	7	7-9	7-9	7-9	цін
Торчинська		04007053	2008	500 /	ЛП	8-9	зерн	ср	-	8-9	8-8,5	8,5-9	7-8	цін
Харківська 26		96007019	2000	404 / 404	СЛ	7	зерн	сс		5	7-9	7-9	7	цін
Харківська 30	®	99007009	2003	404 / 404	ЛП	7	зерн	сс		7-9	5	7-9	7	цін
Ясна	®	04007001	2005	279 /	ЛП	7-9	зерн	сс		7	9	8	8-9	ф
Пшениця м'яка двуручка														
Хуторянка		04007013	2008	1203 /	Л	8-9	зерн	сс	<5	7	8	8	7-8	цін,дв
Пшениця тверда озима														
Бурштин	®	03008001	2007	378 /	СЛ	7-8	зерн	ср	5	8	8-9	8-9	7	х
Гардемарин	®	02008001	2006	378 /	СЛ	7	зерн	ср	5	8	8-9	9	7-9	х

Сорт				Код	Зона	Характеристики								
						Продук-тивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поля-гання	осипання	хвороб	
Континент		05008001	2008	378 /	СЛ	8	зерн	ср	5	8	8-9	8-9	7-8	х
Лагуна		01008001	2005	378 /	СЛ	7-8	зерн	ср	4-5	7	7-8	8	8	х
Алий парус		89008001	1994	378 / 378	С	9	зерн	ср	5	5	5	7-9	5	х
Айсберг одеський		85008001	1990	378 / 378	С	7	зерн	ср	5	7	5	7-9	5	х
Аргонавт	®	98008001	2002	378 /	С	7	зерн	ср	<5	5	5	7-9	5	х
Дельфін	®	94008006	2000	378 / 378	С	7	зерн	ср	<5	5	5	7-9	5	х
Дніпряна		94008002	2000	411 /	СЛ	9	зерн	ср	5	5	5	7-9	5	х
Золоте руно	®	00008001	2004	378 /	СЛ	7-8	зерн	ср	5	7	8-9	8-9	7	х
Леукурум 21		97008003	2001	25 / 1112	С	9	зерн	ср	5	5	5	7-9	5	х
Перлина одеська	®	99008001	2002	378 /	С	9	зерн	ср	5	7-9	7-9	7-9	5	х
Харківська 32		92008005	1997	404 / 404		7	зерн	сс	>5	5	5	7-9	5	х
Пшениця тверда яра														
Букурія	®	00008004	2004	430 / 1112, 430	П	5	зерн	ср		5	7-9	7-9	7	х
Дарина		01008006	2004	309 /	Л	7	зерн	ср		7-9	7	7-9	7	х
Ізольда	®	00008003	2004	341 / 341	ЛП	7	зерн	сс		7	7	7-9	7	х
Кучумовка	®	04008001	2007	404 /	СЛ	7-8	зерн	ср	-	8-9	8	8-9	7	х
Неодюр		92008003	1996	943 /	СЛ	9	зерн	сп		5	7-9	7-9	7-9	х
Спадщина	®	03008003	2006	404 /	С Л	5-7	зерн	сс		8	7-8	8-9	7-9	х
Харківська 27		94008005	1999	404 / 404	СЛ	7	зерн	сс		7-9	7-9	7-9	7	х
Харківська 39	®	98008002	2002	404 / 404	С	7	зерн	ср		7-9	7-9	7-9	7	х
Харківська 41	®	99008002	2003	404 / 404	Л	7	зерн	сс		7-9	7	7-9	7	х
Чадо	®	00008002	2004	404 / 404	Л	7	зерн	сс		7	7	7-9	7	х
Жито озиме														
Богуславка		91003010	1995	430 /	СЛП	5	зерн	сс	5	5	5	5	5	зерн
Боротьба		87003001	1993	429 /	СЛП	7	зерн	сс	7	7	5	5	5	зерн
Воля		91003008	1996	430 /	П	5	зерн	сс	5	5	5	5	5	зерн
Велитень		01003002	2005	422 /	ЛП	7	зерн	сс	8	7	7	7,5	7	зерн
Верхняцьке 94		96003003	2000	422 /	Л	7	зерн	сс	7	7	5	5	5	зерн

Сорт				Код	Зона	Характеристики								
						Продук-тивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєст-рації	Заявник / Підтримувач						посухи	поля-гання	осипання	хвороб	
Верхняцьке 32		68003002	1976	422 /	СЛП	7	зерн,сил	сс	5	5	5	5	5	зерн
Древлянське		93003005	1997	808 /	ЛП	5	зерн	сс	5	5	5	5	5	зерн
Дозор	®	00003001	2005	430 / 430	ЛП	7	зерн	сс	7	7	8	7	8	зерн
Інтенсивне 99		99003002	2002	345 / 345	ЛП	7	зерн	сс	7	5	7	5	5	зерн
Ірина		01003001	2004	307 /	ЛП	8	зерно	сс	8	8	7	8	8	зерно
Інтенсивне 95		95003005	1999	345 / 345	П	7	зерн	сс	7	7	5	7	5	зерн
Купалинка		04003004	2008	447 /	СЛ	7	зерн	сс	8	6	7	7	8	зерн
Київське кормове		93003002	1998	350 /	Л	8	корм	рс	7	7	7	7	6	скліт
Київське 90		89003002	1995	345 / 345	ЛП	7	зерн	сс	7	5	5	5	5	зерн
Київське 93		92003001	1997	345 / 345	Л	7	зерн	сс	7	7	5	7	5	зерн
Клич		00003002	2003	320 /	П	7	зерн	сс	7	7	5	7	5	зерн
Матадор	®	01003004	2004	926 / 926	ЛП	8	зерно	сс	7	8	7	8	7	зерн
Ніка		86003001	1992	320 /	П	7	зерн	сс	7	5	5	5	5	зерн
Нива		76003002	1981	422 /	СЛ	7	зерн,сил	сс	7	7	5	5	5	зерн
Полі 2		01003003	2005	422 /	ЛП	7	зерно	ср	7,5	7,5	7	7	7,5	зерн
Паллада	®	91003009	1996	307 / 307	ЛП	5	зерн	сс	5	5	5	5	5	зерн
Полікросне		99003003	2003	422 /	П	9	зерн	сс	7	7	7	7	7	зерн
Пуховчанка		80003005	1987	447 /	ЛП	7	зерн	сс	7	5	5	5	5	зерн
Первісток F1	®	00003003	2003	404 /	ЛП	9	зерн	сс	7	7	7	7	5	зерн
Синтетик 38	®	03003003	2006	430 /	СЛП	8	зерн	сс	8	7	7	7	7	зерн
Слобожанець F1		05003002	2008	404 /	СЛ	7-6	зерн	сс	8	8	7	8	8	зерн
Сіверське	®	03003001	2007	345 /	СЛП	5	зерн	сс	8	7	5	5	7	зерн
Хамарка		04003001	2007	404 / 1112	С	7	зерн	ср	7	7	7	7	7	зерн
Харківське 98		94003004	1999	404 / 404	СЛП	7	зерн	сс	7	7	5	7	5	зерн
Хасто	®	99003001	2002	404 / 404	Л	9	зерн	сс	7	7	7	7	5	зерн
Хлібне	®	03003002	2007	430 /	СЛП	7	зерн	сс	7	7	7	7	7	зерн
Юр'ївець		04003002	2007	404 / 404	СП	7	зерн	сс	7	7	6	7	5	зерн
Жито яре														
Веснянка		93003001	1997	305 /	ЛП	7	корм	рс		7	7	7	7	скліт

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продук-тивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер	Рік реєст-рації	Заявник / Підтримувач						посухи	поля-гання	осипання	хвороб	
Тетянка	94003005	1997	305 /	ЛП	7	корм	сс		7	7	7	7	скліт
Тритикале озиме													
АДМ-9	93011007	2002	341 / 341	СЛП	8	корм	сс	7	8	7	7	7	вкліт
АДМ 8	93011006	1998	341 / 341	П	7	зерн	сс	5	5	5	7-9	7-9	зерн
АДМ 11	95011014	2000	341 / 341	Л	9	зерн	сс	>5	5	7-9	7-9	7-9	зерн
Амфідиплоїд 52	95011010	2000	404 / 404	ЛП	7	зерн	сс	7	5	5	7-9	7-9	зерн
Амфідиплоїд 44	89011009	1993	404 / 404	СЛП	8	корм	сп	7	7	7	7	6	вкліт
Амфідиплоїд 256	98011004	2001	404 / 404	СЛП	9	зерн	сс	7	7-9	7-9	7-9	7-9	зерн
АДМ 5	89011002	1993	341 / 341	С	7	зерн	сс	5	5	5	7-9	7-9	зерн
АДМ 4	89011001	1994	341 / 341	СЛП	7	зерн	сс	5	5	5	7-9	7-9	зерн
Алкід	02011002	2006	736 /	СЛП	7-8	зерн	сс	8-9	8-9	7-8	8-9	8-9	зерн
Благодатний	01011005	2005	309 /	С	7	зерн	ср	7-8	8	8-9	8	8	зерн
Валентин 90	04011008	2008	25 /	ЛП	8	зерн	ср	8,5-9	8	8-8,5	8-9	8-9	зерн
Гарне ®	01011008	2004	404 / 404	ЛП	7-9	зерн	сс	9	7	9	9	7-9	зерн
Зеніт одеський	92011001	1995	378 / 378	СЛП	7	зерн	ср	5	7-9	5	7-9	7-9	зерн
Інтерес	04011001	2008	1121 /	СЛП	8	зерн	ср	8,5-9	8-8,5	8,8,5	8-9	8-9	зерн
Київське раннє	95011007	1998	355 /	ЛП	7	зерн	рс	5	5	7-9	7-9	7-9	зерн
Ладне	99011004	2002	404 / 404	ЛП	9	зерн	сс	>5	7-9	7-9	7-9	7-9	зерн
Мудрець	02011006	2007	25 / 1112	Л	7-8	зерн	ср	8-9	8-9	8-9	8-9	8	зерн
Поліський кормовий	01011007	2002	345 / 345	ЛП	7	корм	ср	7	5	5	6	6	скліт
Поліський 7	98011003	2002	345 / 345	Л	9	зерн	сс	>5	5	5	7-9	7-9	зерн
Папсуєвська ®	03011003	2005	376 /	СЛП	7-9	корм,зерн	сс	7-9	7-9	7-9	9	7-9	біл, вкліт,зерн
Прорив	02011005	2006	25 / 1112	СЛ	7-8	зерн	ср	8-9	8-9	8-9	8-9	7-9	зерн
Пурпурний	04011010	2008	500 /	ЛП	7-8	зерн	сс	8	8,5	7,5-8	9	8-9	зерн
Раритет	04011004	2008	404 /	ЛП	8	зерн	ср	8	8-8,5	7,5-8	8-9	8-9	зерн
Ратне ®	03011002	2007	404 /	СЛП	8-9	зерн	сс	9	8	7-8	8-9	8	зерн
Славетне	01011002	2004	430 /	ЛП	7	зерн	сс	7-9	7	7	7-9	7-9	зерн
Сувенір ®	98011002	2002	378 /	Л	7	зерн	сс	5	7-9	5	7-9	7-9	зерн
Союз	02011004	2006	25 / 1112	СЛ	7-8	зерн	ср	7-8	8-9	8-9	8-9	7-9	зерн

Сорт				Код	Зона	Характеристики								
						Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляг-ання	осипання	хвороб	
Тритикале яре														
Аіст харківський		91011001	1995	404 / 404	ЛП	7	зерн	сс		7	7	7	9	зерн
Арсенал		99011005	2002	920 /	П	7	зерн	сс		7	7-9	7	7-9	зерн
Вересоч		05011006	2008	350 /	П	7	зерн	сс	-	8,5	7-8	8-9	8-9	зерн
Вікторія		00011004	2003	430 /	П	7	зерн	сс		7	7	7	7-9	зерн
Жайворонок харківський	®	98011005	2002	404 / 404	Л	7	зерн	рс		7	7	7	7-9	зерн
Згурівський	®	03011009	2007	1027 /	П	7-8	зерн	сс	-	8	8-9	8-9	7	зерн
Кобзар	®	03011005	2007	1159 /	ЛП	7	зерн	сс	-	8	8-9	8-9	7	зерн
Коровай харківський	®	04011006	2007	404 /	СЛП	7-8	зерн	сс	-	8-9	8-9	8-9	7	зерн
Легінь харківський		04011007	2008	404 /	П	7-8	зерн	сс	-	8,5	7-8	8-9	8-9	зерн
Лосинівське	®	04011005	2007	350 /	ЛП	7-8	зерн	сс	-	8	8-9	8-9	7	зерн
Микола	®	02011007	2006	1112 /	С	6	зерн	сс	-	7	9	9	7-9	зерн
Соловей Харківський	®	03011006	2006	404 /	СЛП	7-8	зерн	сс	-	8-9	8-9	8-9	7-9	зерн
Хлібодар харківський	®	00011005	2003	404 / 404	ЛП	7	зерн	сс		7	7	7	7-9	зерн
Овес ярий														
Аркан		03005001	2007	371 /	Л	7-8	зерн	ср		7-9	7-9	7-9	7-9	фж
Ант		02005001	2006	371 /	П	7	зерн	сс		7-9	7-9	9	5-7	цін
Декамерон		03005002	2007	422 /	ЛП	7-8	зерн	сс		7-9	7-9	7-9	7-9	фж
Житомирський		04005004	2008	963 /	П	7-8	зерн	сс		7-8	7-9	8-9	7-9	фж
Львівський 1		80005007	1983	371 /	Л	5	зерн	сп		5-7	5-7	5-7	5	цін
Нептун		01005003	2005	430 /	П	7-9	зерно	сс		5-7	5-7	7-9	5-7	фж
Ранньостиглий		96005001	2000	950 /	П	7	зерн	рс		5-7	5-7	5-7	5-7	цін
Саргон	®	04005003	2007	376 /	Л	7-8	зерн	ср		7-9	7-9	7-9	7-9	фж
Самуель	®	04005001	2007	1174 /	Л	7-8	зерн	сс		7-9	7-9	7-9	7-9	цін
Саломон	®	04005002	2007	1174 /	Л	7-8	зерн	сс		7-9	7-9	7-9	7-9	цін
Чернігівський 28		92005014	1996	429 /	СЛП	7-9	корм	сс		7	7	7	>5	скліт
Чернігівський 27		86005014	1990	429 /	СП	7	зерн	сс		7-9	7-9	7-9	5-7	фж
Абель		96005003	2000	946 /	П	5-7	зерн	ср		5-7	7-9	5-7	5-7	цін

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляг-ання	осипання	хвороб	
Славутич	95005002	2000	950 /	П	7	зерн	ср		5	5-7	5-7	5-7	фж
Синельниківський 68	93005001	1996	340 /	Л	7	зерн	ср		5-7	5-7	5-7	5-7	цін
Деснянський	95005001	1998	430 /	ЛП	5-7	зерн	сс		5-7	5-7	5-7	5-7	фж
Райдужний	98005002	2001	430 /	П	5-7	зерн	сс		5-7	7-9	7-9	5-7	фж
Синельниківський 1321	91005009	1994	311 /	ПЛ	5	зерн	сс		5-7	5-7	5-7	5	цін
Скакун	84005009	1988	167 /	СЛП	7	зерн	сс		7-9	7-9	7-9	5-7	цін
Ячмінь озимий													
Абориген ®	02012011	2007	378 /	С	7	зерн	ср	7	7	8	8	8	зерн
Буран	88012003	1993	358 /	СЛП	7	зерн	сс	5	5	5	5	5	зерн
Бемір 2	81012002	1987	341 / 341	ЛП	5	зерн	ср	5	5	5	7	5	зерн
Борисфен ®	02012015	2006	341 /	ЛП	8	зерн	рс	7	7	7	7	8	зерн
Восход	98012016	2002	358 /	СЛП	7	зерн	сс	5	7	7	7	5	зерн
Достойний ®	02012002	2006	378 /	СЛ	7	зерн	рс	7	8	7	8	8	зерн
Дністер	01012002	2002	371 /	СЛП	9	корм	рс	7	8	7	8	8	вкліт
Добриня 3	01012005	2005	25 / 1112	СЛП	7	зерн	сс	7	8	7	8	8	зерн
Зимовий ®	00012006	2005	378 /	СЛП	7	зерн	сс	7	8	7-8	8	8	зерн
Кормовий	93012019	1997	371 /	СП	8	корм	сс	7	7	7	7	7	скліт
Клепінінський	78012002	1981	358 /	С	7	зерн	сс	5	7	5	7	5	зерн
Ковчег ®	03012001	2007	341 /	С	7	зерн	ср	5	7	7	7	7	зерн
Луран	97012009	2000	946 /	СЛП	7	зерн	сс	5	7	7	7	5	знрн
Метелиця ®	00012004	2003	378 /	СЛ	7	зерн	ср	5	7	7	7	5	зерн
Михайло	97012019	2001	25 / 1112	СЛП	7	зерн	ср	5	7	7	7	5	зерн
Миронівський 87	92012018	1995	341 / 341	СЛП	7	зерн	сс	5	7	5	7	5	зерн
Морозко	04012023	2007	25 / 1112	С	7	зерн	ср	5	8	8	7	7	зерн
Онега	93012027	1999	358 /	Л	7	зерн	сс	5	7	5	5	5	зерн
Основа	90012008	1994	378 / 378	С	7	зерн	сс	5	5	5	5	5	зерн
Огоньковський	00012003	2003	358 /	СЛ	7	зерн	ср	5	7	5	5	5	зерн
Паллідум 77 ®	94012018	1999	341 / 341	П	7	зерн	сс	5	7	7	7	5	зерн
Радон	90012009	1994	341 / 341	ЛП	5	зерн	сс	5	5	5	5	5	зерн

Сорт				Код	Зона	Характеристики								
						Продук-тивність	Напрям викорис-тання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєст-рації	Заявник / Підтримувач						посухи	поля-гання	осипання	хвороб	
Росава		83012006	1988	378 / 378	СЛП	7	зерн	сс	5	7	5	5	5	зерн
Сіндерелла		05012005	2008	807 /	СЛП	7	зерн	ср	7	7	7	8	6	зерн
Селена стар	®	02012013	2006	922 /	СЛП	8	зерн	рс	7	7	7	5	7	зерн
Сейм		04012019	2008	341 /	СП	8	зерн	ср	7	7	8	8	8	зерн
Трудівник	®	02012001	2006	378 /	СЛП	8	зерн	сс	7	8	7	7	8	зерн
Тамань		91012006	1995	378 / 378	СЛ	5	зерн	сс	5	5	5	5	5	зерн
Фантаст		04012024	2007	25 / 1112	С	5	зерн	ср	5	5	7	7	5	зерн
Широколистий		82012028	1987	371 /	СП	7	корм	сс	7	6	6	7	6	скліт
Ячмінь ярий														
Адапт		94012008	1998	378 / 378	С	5-7	зерн	сс		7-9	7-9	7-9	5	фж
Аннабель	®	01012018	2004	926 / 926	П	7-9	зерн	сс		5-7	7-9	7-9	5-7	пв
Аспект	®	03012011	2007	404 /	ЛП	5-7	зерн	сп		5-7	5-7	5-8	5-8	пв
Авгій		04012020	2008	341 /	ЛП	5-7	зерн	сс		5-7	7	7	5-7	пв
Аскольд		97012020	2001	341 / 341	П	5-7	зерн	сс		5	5-7	5-7	5-7	пв
Асторія		98012025	2002	1048 / 1174	ЛП	7-9	зерн	сс		5-7	7-9	7-9	5-7	фж
Брюсефілд		06012006	2008	749 /	П	7-9	зерн	сс		5-7	7-9	7-9	5-7	зерн
Бадьорий		96012004	1999	404 / 404	ЛП	5-7	зерн	сс		5-7	5-7	5-7	5	пв
Баланс		06012005	2008	749 /	ЛП	7-8	зерн	сс		5-7	5-7	7-9	5-7	пв
Барке	®	98012011	2003	1149 /	ЛП	7-9	зерн	ср		5-7	7-9	7-9	5--7	пв
Варіант	®	00012013	2004	430 / 430	П	5-7	зерн	сс		5-7	5-7	7-9	5-7	фж
Вакула	®	00012005	2003	378 /	СЛП	7-9	зерн	сс		7-9	7-9	7-9	5-7	пв
Вінницький 28		00012016	2004	306 / 791	П	7	зерн	ср		5-7	5-7	7-9	5-7	фж
Виклик		04012018	2008	404 /	ЛП	5-7	зерн	ср		5-7	7	7	5-7	пв
Віват	®	04012006	2007	1112 / 1112	П	7-8	зерн	пв		7-9	7-9	7-9	7-9	пв
Водограй	®	02012012	2005	378 / 378	ЛП	9	зерн	сс		5-7	5-7	7-9	5-7	фж
Віскор		03012003	2005	1141 /	Л	7	зерн	п		5-7	5-7	7-9	5-7	пв
Геліос	®	03012008	2006	922 /	СЛП	7-9	зерн	сс		7-9	7-9	9	5-7	пв
Галактик	®	94012015	1999	378 / 378	СЛП	5-7	зерн	сс		7-9	7-9	5-7	5-7	пв
Гетьман	®	98012020	2001	378 / 378	ЛП	7	зерн	сс		5-7	5-7	7-9	5-7	пв

Сорт				Код	Зона	Характеристики								
						Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляглання	осипання	хвороб	
Данута	®	00012017	2003	926 / 926	СЛП	7-9	зерн	сс		7-9	7-9	7-9	5-7	пв
Джерело		96012003	1999	404 / 404	ЛП	7	зерн	сс		7-9	5-7	7-9	5-7	пв
Донецький 12		96012001	1999	315 /	СЛ	5	зерн	сс		7-9	7-9	7-9	5-7	цін
Дніпровський 257		94012013	1998	311 /	Л	5	зерн	сс		5	5-7	5-7	5	фж
Докучаєвський 15		98012023	2003	405 /	ЛП	7	зерн	сс		5-7	5-7	5-7	5	пв
Джерзей	®	96012013	2000	934 / 740	СЛП	7-9	зерн	сп		5-7	7-9	7-9	5-7	пв
Донецький 14		97012003	2000	315 /	С	7	зерн	сс		7-9	5-7	5-7	5	цін
Донецький 15		98012017	2002	315 /	С	7	зерн	ср		7-9	7-9	5-7	5	цін
Ебсон		04012008	2008	946 /	ЛП	7-9	зерн	сс		5-7	7-9	7-9	5-7	пв
Ефект	®	98012006	2002	404 / 404	П	5-7	зерн	сп		5	5-7	5-7	5	пв
Еней		05012011	2008	378 /	СЛП	5-7	зерн	ср		7-9	7-9	9	5-7	пв
Етикет	®	02012008	2006	404 / 404	ЛП	5-7	зерн	сс		5-7	5-7	5-7	7	пв
Жозефін		03012006	2006	1048 /	ЛП	7-9	зерн	сс		7-9	7-9	7-9	5-7	пв
Здобуток	®	03012015	2007	404 /	ЛП	5-7	зерн	сп		5-7	5-7	7-9	5-7	фж
Звершення		94012010	1997	404 / 404	ЛП	7	зерн	сс		5-7	5-7	5-7	5-7	пв
Зоряний	®	97012004	2000	378 / 378	ЛП	7	зерн	сс		5-7	5-7	5-7	5	пв
Кадікс		01012001	2004	1048 / 1174	П	7	зерн	сс		5-7	7-9	7-9	5-7	пв
Командор	®	04012012	2007	378 /	ЛП	7-8	зерн	сс		7-9	7-9	7-9	7-9	пв
Казковий	®	01012010	2005	378 /	ЛП	9	зерн	сс		5-7	7-9	7-9	7-9	пв
Княжий		00012008	2003	371 / 371	П	7	зерн	сс		5-7	5-7	7-9	5-7	пв
Карат		94012024	1998	307 /	П	7	зерн	сс		5	5-7	5-7	5	фж
Козак		00012009	2004	405 /	ЛП	7	зерн	сс		7-9	5-7	7-9	7-9	пв
Корона		98012002	2000	1174 /	Л	7-9	зерн	ср		5-7	7-9	5-7	5-7	пв
Каштан	®	89012009	1994	306 / 306	П	5-7	зерн	сс		5	5-7	5-7	5-7	пв
Ксанаду	®	02012016	2005	926 / 926	ЛП	9	зерн	ср		5-7	7-9	7-9	5-7	пв
Лотос		97012002	2000	306 /	ЛП	7	зерн	сс		5-7	5-7	5-7	5	фж
Лофант	®	02012007	2006	306 /	ЛП	5-7	зерн	сс		5-7	5-7	7	5-7	пв
Миронівський 86		91012015	1995	341 / 341	Л	7	зерн	ср		5-7	5-7	7-9	5	пв
Максим		04012002	2008	1112 /	СЛП	7-8	зерн	сс		7-9	7-8	7-9	5-7	пв

Сорт				Код	Зона	Характеристики								
						Продук-тивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєст-рації	Заявник / Підтримувач						посухи	поля-гання	осипання	хвороб	
Миронівський 92		93012014	1996	341 / 341	СЛ	7	зерн	сс		5-7	5-7	7-9	5-7	пв
Маурітія		04012010	2008	824 /	П	7	зерн	сс		7	7-9	7-9	7-9	пв
Мальз	®	04012007	2007	946 /	ЛП	7-9	зерн	сс		7-9	7-9	7-9	7-9	пв
Мономах	®	03012016	2007	405 /	Л	7	зерн	сс		7-9	7-9	7-9	7	пв
Носівський 21	®	97012014	2002	430 /	Л	7	зерн	ср		5-7	7-9	7-9	5	пв
Надія		94012003	1998	371 /	П	5	зерн	сс		5	5-7	5-7	5	пв
Набат		04012026	2008	306 /	СП	5-7	зерн	сп		7-9	7	7-8	5-7	пв
Неофіт	®	94012017	1999	306 / 306	ЛП	5	зерн	сс		5-7	5-7	5-7	5	фж
Незабудка	®	03012010	2007	306 /	П	5-7	зерн	п		5-7	5	5-7	5-7	пв
Оболонь	®	98012021	2001	378 / 378	ПЛ	7-9	зерн	сп		5-7	5-7	7-9	5-7	пв
Подолян		91012007	1995	306 /	П	7	зерн	сп		7-9	5-7	5-7	5	пв
Персей	®	00012012	2004	341 / 341	П	7	зерн	сп		5-7	5-7	7-9	5	фж
Партнер		03012009	2008	315 /	С	5-7	зерн	сс		7-9	5-7	7-9	5-7	фж
Південний	®	98012004	2001	378 / 378	СЛ	7	зерн	ср		7-9	7-9	7-9	5-7	пв
Приазовський 9	®	04012005	2006	212 / 1112	Л	5-7	зерн	сс		5-7	5-7	7	5-7	фж
Парнас		04012022	2008	404 /	СЛ	5-7	зерн	сс		7-9	5-7	7-9	5-7	пв
Прерія		89012017	1992	378 / 376, 378	С	7	зерн	сс		5-7	5-7	5-7	5	цін
Пеяс		97012012	2001	946 /	СЛП	7	зерн	сс		5-7	7-9	7-9	5-7	пв
Подільський 14		87012038	1990	306 /	Л	5	зерн	сп		5-7	5-7	5-7	5	пв
Престиж	®	02012006	2004	465 /	П	7-9	зерн	сс		5-7	7-9	7-9	7-9	пв
Пасадена	®	98012009	2003	824 / 824	ЛП	7-9	зерн	сс		5-7	7-9	5-7	5-7	пв
Ростенций		04012013	2008	376 /	СЛП	7-8	зерн	сс		7-9	7-9	7-9	5-7	пв
Соборний	®	00012011	2004	341 / 341	П	7	зерн	сс		5-7	5-7	7-9	5-7	пв
Селеніт	®	01012008	2004	378 / 922, 378	ЛП	7	зерн	сс		7-9	7-9	7-9	5-7	пв
Стяг		94012007	1997	350 /	Л	7	зерн	сс		5-7	5-7	7-9	5	пв
Созонівський		04012009	2008	356 /	ЛП	5	зерн	сс		5-7	7	9	5-7	фж
Сталкер		93012009	1997	378 / 378	С	7	зерн	ср		7-9	7-9	7-9	5-7	фж
СН 28		96012007	2000	356 /	С	7	зерн	сс		7-9	5-7	5-7	5	фж
Санктрум	®	04012001	2006	376 /	ЛП	7	зерн	сс		7	7-9	7-9	5-7	пв

Сорт				Код	Зона	Характеристики								
						Продук-тивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєст-рації	Заявник / Підтримувач						посухи	поля-гання	осипання	хвороб	
Сонцедар		® 03012007	2007	341 /	ЛП	7-9	зерн	сп		7-9	5-7	7-9	5-7	пв
Скарлет		98012010	2001	1149 / 1159, 1174	СЛП	7	зерн	сс		7-9	7-9	7-9	5-7	пв
Скіф		® 99012004	2003	306 / 306	П	5	зерн	сс		5	5-7	5-7	5	пв
Серпанок		04012025	2008	500 /	П	5	зерн	сп		5	7	7	5-7	пв
Султан		98012024	2002	1048 /	СЛП	7	зерн	сс		7-9	7-9	7-9	5-7	пв
Сєбастьян		® 05012024	2008	947 /	ЛП	7-8	зерн	сс		5-7	5-7	9	5-7	пв
Тюрінгія		® 96012015	2000	926 / 926	П	7	зерн	сс		5	5-7	5-7	5-7	пв
Терен		95012002	1998	306 /	ЛП	5	зерн	сс		5-7	5-7	5-7	5	фж
Тройчан		® 04012011	2007	376 /	Л	7-8	зерн	сс		7-9	7-9	7-9	7-9	пв
Толар		98012003	2001	946 /	ЛП	7	зерн	сс		5-7	7-9	7-9	5-7	пв
Табора		98012013	2001	1048 /	СЛП	7	зерн	сс		7-9	7-9	7-9	5-7	пв
Токада		03012017	2007	824 /	ЛП	7-9	зерн	п		7-8	7-9	7-9	5-7	пв
Філадельфія		03012018	2006	824 /	ЛП	7-9	зерн	сп		5-7	7-9	7-9	7-9	пв
Фенікс		97012005	2000	404 / 404	С	7	зерн	сс		7-9	5-7	7-9	5	фж
Цезар		95012003	1998	341 / 341	ЛП	7	зерн	ср		5-7	7-9	7-9	5-7	пв
Чарівний		® 01012007	2004	378 /	ЛП	7	зерн	сс		7-9	7-9	7-9	7-9	пв
Чудовий		® 99012003	2002	378 / 378	Л	7	зерн	сс		5-7	7-9	7-9	5-7	пв
Юкатан		® 04012021	2007	341 /	Л	7-9	зерн	сс		7-9	7-9	7-9	7-9	пв
Кукурудза														
Анжу 249		95004084	1998	355 /	СЛ	7	зерн,сил	рс (180)	7	7	7		7	
Агро Стар		98004077	2001	806 /	СП	9	зерн	рс (150)		7	7		7	
Аматус		05004068	2008	938 /	ЛП	8-9	зерновий	рс (180)		8-9	7-9		9	
Бастіон МВ		98004122	2001	1040 /	ЛП	7	зерн	рс (180)	5	5	7		7	
Бц 178		05004024	2007	993 /	ЛП	8,5	зерн	р/с/170/		9,0	9,0		7-8	
Баксос		05004095	2008	1194 /	С (зрош) Л	10-8	зерновий	рс (195)		8-9	6-9		9	
Буг СВ		04004043	2007	345 /	Л	7-8	зерн	р/с/180/		8,6	8,9		7-8	
Балтімор		99004013	2002	793 /	СЛП	9	зерн	рс (150)	7	7	7		7	
Бліц 160 МВ		® 02004050	2006	962 /	Л	7-8	зерн	р/с/160/		5-7	8,8		9,0	
Берег МВ		02004024	2006	1040 /	СЛП	7-9	зерно	рс	8,0	8,5	9,0		9,0	

Сорт			Код	Зона	Характеристики							
					Продук-тивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)			Якість
Назва Вид	Номер	Рік реєст-рації	Заявник / Підтримувач						посухи	поля-гання	осипання	хвороб	
Гомера	01004002	2003	806 /	ЛП	9	зерн	рс (190)	7	7	7		7	
Гран 220	00004017	2003	736 /	Л	7	зерн	рс (190)	5	5	5		7	
Говерла МВ	03004014	2005	345 / 345	СЛ	9	зерн	р/с(190)	8	8	9		9	
Джекпот МС	05004082	2008	962 /	Л	7-8	зерновий	рс (170)		8-9	8-9		9	
Дніпровський 181 СВ	99004018	2002	311 /	П	7	зерн	рс (180)	7	7	7		7	
Дніпровский 187 МВ	95004011	1998	311 /	СЛ	5	зерн	рс (180)	>5	5	5		7	
Дніпровський 196 СВ	00004023	2003	311 /	ЛП	7	зерн	рс (190)	7	7	7		7	
Депутат МВ	03004013	2005	345 / 345	СЛП	8	зерн	р/с (195)	7	8	9		9	
Ерлі Стар	01004001	2003	806 /	ЛП	9	зерн	рс (150)	7	7	7		7	
Ензо	95004080	1999	806 /	ЛП	7	зерн	рс (170)	7	5	7		7	
ЕКСП 178 (ТК 178)	92004043	1995	901 /	Л	5	зерн	рс (170)	5	5	5		7	
ЕСМ 601х	05004092	2008	806 /	С (зрош)	10	зерновий	рс (180)		9	7		9	
ЗПТК 196	80004032	1999	936 /	Л	7	зерн	рс (190)	7	5	7		7	
Зорень	01004012	2004	355 /	слп	7-9	зерн	рс/180/	7-9	8,6	8,9		9	
Заліщицький 191 СВ ®	04004060	2007	311 /	ЛП	9,0	зерн	р/с/190/	8,9	8,5	8,7		9,0	
Кишкун СЦ 4194	97004005	2001	998 /	ЛП	7	зерн	рс (160)	>5	5	7		5	
Краснодарський 194 МВ	05004033	2008	25 /	СЛ	5-8	зерновий	рс (190)		8-9	8-9		8-9	
Кадр 195 СВ	98004111	2001	311 /	Л	9	зерн	рс (190)	>5	7	7		7	
Колізей 180 ВС ®	04004098	2007	954 /	ЛП	8-9	зерн	р/с/180/	8,8	8,6-9,0	8,8		8,5	
Кільчень 190 МВ ®	02004054	2006	1167 /	СЛП	9	зерно	рс	9	8,6	9,0		9,0	
ЛГ 2244	95004022	1999	793 /	ЛП	7	зерн	рс (180)	7	5	7		7	
МОС 182 СВ ®	02004060	2006	966 /	СЛП	7-9	зерн	р/с/180/	7-9	8,5	8,9		7-9	
Матеус	03004050	2006	938 /	СЛП	9	зерн	р/с/185/	7-9	8,8	9,0		7-9	
Маріїн 190 СВ ®	02004075	2005	1180 /	СЛП	9	зерно	р/с (190)	8	8,7	9		9	
НС 101	98004087	2001	879 / 879	СЛ	7	зерн	рс (110)	5	5	7		5	
НС 208 ®	03004018	2005	879 / 879	СЛП	9	зерн	р/с (190)	9	9	9		9	
Оксана (SZE TC 191)	95004029	1998	937 /	П	7	зерн	рс (160)	7	7	7		7	
Остер СВ	04004042	2006	345 /	ЛП	7-9	зерн	р/с/190/	7-8	8,9	8,9		7-9	
Оріоль	05004017	2008	924 /	СЛП	5-9	зерновий	рс (190)		8	8-9		8-9	

Сорт				Код	Зона	Характеристики								
						Продук-тивність	Напрям викорис-тання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєст-рації	Заявник / Підтримувач						посухи	поля-гання	осипання	хвороб	
ПР39Г12		00004042	2003	767 /	ЛП	9	зерн	рс (180)	7	7	7		7	
Подих МВ		05004047	2008	404 /	ЛП	7-8	зерновий	рс (190)		8-9	8-9		9	
Поліський 177 МВ		01004013	2004	355 /	слп	7	зерн	рс/170/	7-9	9	9		9	
Петрівський 169 СВ	®	98004041	2001	1028 /	СЛП	7	зерн,сил	рс (170)	>5	5	5		7	
ПР39Г32		02004028	2005	767 /	СЛП	9	зерн	рс/180/	7-9	8	9		9	
Премія 190 МВ	®	02004049	2005	962 /	СЛП	9	зерн	р/с (190)	9	9	9		9	
ПВ 75 - 01		06004027	2008	685 /	Л	8-9	зерновий	ср (160)		8-9	9		9	
Пірс МВ		05004050	2008	378 /	Л	7-8	зерновий	рс (190)		8-9	8-9		9	
Рональдіс		02004001	2004	806 /	лп	7-9	зерн	рс/180/	5-7	9	8,9		9	
Радіус		95004079	1998	806 /	П	7	зерн	рс (150)	>5	5	7		5	
Руно 198 СВ	®	02004041	2005	311 /	СЛП	8	зерн	р\с (190))	8	8	9		9	
Сурський 197 МВ		01004027	2004	311 /	сл	7-9	зерн	рс/190/	5-7	8,5	8,8		9	
Славутич 162 СВ		92004025	1995	311 /	С	5	зерн,сил	рс (160)	5	5	5		5	
Садгір		03004035	2007	432 /	ЛП	7	зерн	р/с/190/	7-9	8,3-8,5	8,6-8,7	-	7-9	
Случ СВ		03004015	2005	345 / 345	СЛП	9	зерн	р/с (195)	9	8,6	9		9	
Суботівський 190 СВ		06004040	2008	355 /	СЛП	5-8	зерновий	рс (190)		8-9	8-9		9	
Стіжок 192 СВ		05004063	2008	432 /	Л	8	зерновий	рс (190)		8	8		9	
ТОСС 156 МВ		92004115	1997	1109 / 345	С	5	зерн	рс (150)	5	5	5		7	
Товтрянський 188 СВ	®	04004054	2007	311 /	ЛП	8-9	зерн	р/с/180/	8,5	8,6-9,0	8,8-9,0		8,5	
ТОСС 235 М		91004087	1994	1109 /	Л	5	зерн,сил	рс (200)	5	5	5		5	
ТОСС 218 МВ		90004053	1994	345 / 345	П	5	зерн,сил	рс (200)	5	5	5		5	
Ушицький 167 СВ		04004062	2007	311 /	СЛ	8,7	зерн	р/с/160/	8,5	8,7	8,5		8,8	
Філу		03004007	2005	924 /	СЛП	9	зерн	р/с (180)	8	8	9		9	
Фрівол		97004029	2000	806 /	ЛП	5	зерн	рс (190)	5	5	5		5	
ХЛ 2017		06004044	2008	749 /	ЛП	7-8		рс (150)		8-9	8-9		9	
ХЛ 2093		06004045	2008	749 /	ЛП	7-8	зерновий	рс (180)		8-9	8-9		9	
Харківський 195 МВ		98004095	2002	404 / 404	Л	5	зерн	рс (190)	5	5	5		5	
Явір 180 СВ	®	04004013	2006	355 /	СЛП	9	зерн	р/с/180/	7-9	8,6	8,9		7-9	
Явдошин 200 СВ		01004048	2004	336 /	лп	5-7	зерно	рс/190/	5-7	8,8	9		9	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продук-тивність	Напрям викорис-тання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєст-рації	Заявник / Підтримувач					посухи	поля-гання	осипання	хвороб	
Яринин 176 СВ	®	04004071	2007	1028 /	ЛП	8,5-8,8	зерно	р/с	8,6	8,5	9,0	8,6	
Анжу 292		04004010	2006	793 /	СЛП	9	зерно	ср	7-9	7-9	9	7-9	
МАС 20Ф		05004028	2008	924 /	Л	8-9	зерновий	ср (220)		8-9	9	9	
Анжу 450		04004005	2006	793 /	СЛП	7-9	зерно	ср	9	7-9	9	7-9	
Алаксі		94004069	1997	793 /	СЛ	7	зерно	с/р (260)	7	7	7,5	7	
Акселль		05004020	2008	924 /	Л	9-10	зерновий	ср (270)		8-9	9	9	
Арабіка		05004027	2008	924 /	Л	8-9	зерновий	ср (210)		8-9	9	9	
Аробас		03004047	2006	1079 /	СЛП	9	зерн	с/р/230/	9	7-9	9	9	
Анжу 400		04004009	2007	793 /	СЛП	9,0	зерн	с/р/240/	8,6	8,5	8,7	8,6	
Амеліор		05004030	2008	924 /	Л	9-10	зерновий	ср (260)		8-9	9	9	
Аталіс		02004002	2004	806 /	лп	7-9	зерн	ср/230/	5-7	9	9	9	
АДН 220 МВ		03004032	2008	1167 /	С	7-8	зерновий	ср (220)		7-8	9	9	
Антій		97004030	2002	806 /	СЛП	9	зерн	ср (260)	7	7	7	7	
Абонданс		00004002	2003	1079 /	ЛП	9	зерн	ср (200)	7	7	7	7	
Аттракт		06004042	2008	806 /	Л	9	зерновий	ср (240)		8-9	9	9	
Асор		98004137	2002	806 /	ЛП	9	зерн	ср (220)	7	7	7	7	
Авіас 277 СВ	®	04004063	2007	311 /	СЛП	8,6	зерн	с/р/270/	8,8	8,7	8,8	8,9	
Авангард		00004001	2003	938 /	ЛП	7	зерн	ср (260)	>5	5	5	5	
Агро 200 СВ		99004021	2003	1112 /	ЛП	7	зерн	ср (200)	5	5	7	5	
БМ 281 СВ		93004011	1996	432 /	СЛ	5	зерн,сил	ср (280)	5	5	5	5	
Бц 282		05004023	2007	993 /	СЛП	8,7	зерн	с/р/280/	8,8	8,5	8,7	9,0	
Бц 288 Б		05004025	2007	993 /	СЛП	8,8	зерн	с/р/290/	8,8	8,5	8,6	8,8	
БМ 281 АСВ		96004016	1999	432 /	Л	7	зерн	ср (280)	>5	5	5	7	
Богун		01004015	2004	355 /	слп	7-9	зерн	ср/250/	5-7	8,7	9	9	
Бершадь		99004016	2003	345 /	Л	7	зерн	ср (260)	>5	7	7	7	
Бюрлі		06004026	2008	485 /	Л	8-9	зерновий	ср (230)		8-9	8-9	9	
Богатир		01004045	2006	938 /	СЛП	7-9	зерн	с/р/240/	7-9	8,6	8,8	7-9	
Базальт 270 ВС		04004096	2007	954 /	ЛП	8,5-8,9	зерн	с/р/270/	9,0	8,7	8,8	8,9	
Борисфен 250 МВ		99004031	2003	1070 /	Л	9	зерн	ср (270)	7	7	7	7	

Сорт			Код	Зона	Характеристики							
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)			Якість
Назва Вид	Номер	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляганння	осипання	хвороб	
Барвінок МВ	04004087	2008	404 /	Л	7-8	зерновий	ср (230)		8-9	9		9	
Бігстар	06004043	2008	806 /	Л	8-9	зерновий	ср (210)		9	9		9	
Борозенський 277 МВ	05004060	2008	376 /	Л	8-9	зерновий	ср (270)		8-9	9		9	
Білозірський 295 СВ ®	02004040	2005	311 /	СЛП	9	зерн	с/р (290)	9	9	9		9	
Бестселер 287 СВ ®	04004059	2007	311 /	СЛ	9,0	зерн	с/р/280/	8,8	8,6	8,7		9,0	
Бангі	02004063	2005	793 /	СЛП	9	зерно	с/р (250)	9	9	9		9	
Борозенський 277 МВ	05004060	2008	311 /	Л	8-9	зерновий	ср (270)		8-9	9		9	
Водограй	04004104	2008	340 /	Л	7-8	зерновий	ср (250)		8-9	9		9	
Вимпел МВ	05004044	2008	404 /	Л	9	зерновий	ср (260)		9	9		9	
Вись 287 СВ	05004057	2008	311 /	Л	9	зерновий	ср (280)		9	9		9	
Василів 273 СВ ®	02004076	2006	1028 /	СЛП	7-9	зерн	с/р/270/	7-9	8,5	8,8		7-9	
Газель	03004046	2006	1079 /	СЛП	9	зерн	с/р/220/	7-9	7-9	9		9	
Гексер ®	04004002	2006	1194 /	ЛП	7-9	зерн	с/р/240/	7-9	8,5	9		7-9	
Гран 310	00004019	2003	736 /	Л	7	зерн	ср (280)	5	5	5		5	
Гран 1	98004035	2001	736 /	Л	7	зерн,сил	ср (230)	5	5	5		7	
Голосіївський 260 СВ	06004037	2008	568 /	Л	9	зерновий	ср (260)		8-9	8-9		9	
Григорів 270 СВ ®	02004073	2005	1028 /	СЛП	9	зерн	с/р (270)	9	8,6	9		9	
Гран 5	98004110	2001	736 /	Л	5	зерн	ср (260)	5	5	5		7	
Гран 6	99004026	2002	736 /	Л	7	зерн	ср (260)	>5	5	7		5	
Гаїті	98004135	2002	806 /	ЛП	9	зерн	ср (210)	>5	7	7		7	
Дельфін	04004003	2006	806 /	СЛП	9	зерн	с/р/240/	7-9	8,4	7-9		7-9	
Деррік	93004129	1996	924 /	Л	7	зерн	ср (270)	7	8	8		7	
ДК 315	03004002	2005	437 /	СЛП	9	зерн	с/р (290)	9	9	9		9	
Дніпровський 228 МВ	93004014	1996	340 /	С	5	зерн	ср (220)	5	5	5		5	
Дерезуватський 291 СВ ®	04004056	2007	311 /	СЛ	8,8	зерн	с/р/290/	8,9	8,5	8,7		9,0	
Дніпровський 293 МВ	99004020	2002	311 /	Л	7	зерн	ср (290)	>5	5	7		5	
ДК 243	03004003	2007	437 /	СЛ	9,0	зерн	с/р/240/	8,9	8,8	9,0		9,0	
Десна СВ	98004018	2002	841 / 345	Л	7	зерн	ср (280)	>5	5	7		7	
Джерба	98004078	2002	806 /	П	7	зерн	ср (200)	>5	5	7		7	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продук-тивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поля-гання	осипання	хвороб	
ДКС 2960	06004022	2008	437 /	Л	9	зерновий	ср (250)		8-9	8-9		9	
ДОК МВ	05004054	2008	378 /	Л	8-9	зерновий	ср (270)		8-9	9		9	
ДКС 3759	06004020	2008	437 /	Л	9	зерновий	ср (290)		9	9		9	
ДКС 3420	06004018	2008	437 /	Л	9	зерновий	ср (290)		8-9	9		9	
Дніпровський 223 СВ	99004019	2002	311 /	Л	7	зерн	ср (220)	>5	5	7		7	
ЕС Лаймс	05004003	2008	806 /	Л	8-9	зерновий	ср (210)		8-9	9,0		9,0	
ЕС Анамур	05004004	2008	806 /	Л	8-9	зерновий	ср (200)		8-9	9		9	
ЕС Паролі	05004005	2008	806 /	Л	8-9	зерновий	ср (220)		8-9	9		9	
Елегія МВ	00004038	2003	378 /	ЛП	7	зерн	ср (240)	>5	7	7		7	
Ера МС	05004078	2008	962 /	Л	8-9	зерновий	ср (290)		9	9		9	
Еміліо	03004051	2007	938 /	СЛП	8,9	зерн	с/р/250/	9,0	8,9	9,0		9,0	
ЕС Нінфеа	05004091	2008	806 /	Л	9	зерновий	ср (250)		9	9		9	
Еден Стар	00004044	2003	806 /	ЛП	9	зерн	ср (220)	7	7	7		7	
ЕС Беніта	05004089	2008	806 /	Л	8-9	зерновий	сс (300)		9	9		9	
Еліта	98004007	2000	767 /	ЛП	9	зерн	ср (270)	7	7	7		7	
ЕСМ 602х	05004090	2008	806 /	Л	9	зерновий	ср (220)		8-9	9		9	
ЄС Тріо	06004041	2008	806 /	Л	9	зерновий	ср (220)		8-9	9		9	
Євростар	98004138	2001	806 /	СП	7	зерн	ср (210)	7	7	7		7	
Жаззі	05004100	2008	485 /	Л	8-9	зерновий	ср (235)		8-9	8-9		9	
Жавір 290 МВ	02004044	2005	962 /	СЛП	9	зерн	с/р (290)	9	9	9		9	
ЗПТК 256	88004044	1996	936 /	С	5	зерн	ср (250)	5	5	7		7	
ЗПТК 209	86004025	1999	936 /	П	7	сил	ср (200)	7	7	5		7	
Зомба	05004086	2008	793 /	Л	8-9	зерновий	ср (260)		8-9	8-9		9	
Іннагуа	98004076	2001	806 /	С	7	зерн	ср (210)	>5	5	7		7	
Кишкун СЦ 4297	91004058	1994	998 /	С	5	зерн	ср (290)	5	5	7		7	
Кишкун ТЦ 190	91004057	1994	998 /	С	7	зерн	ср (200)	5	5	7		7	
Кадр 267 МВ	98004024	2001	311 /	Л	7	зерн,сил	ср (260)	>5	5	7		7	
Контур 250 ВС ®	04004097	2007	954 /	СЛ	9,0	зерн	с/р/250/	8,9	8,5	8,7		9,0	
Кремінь 200 СВ	00004026	2003	311 /	ЛП	7	зерн	ср (210)	>5	7	7		7	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продук-тивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер	Рік реєст-рації	Заявник / Підтримувач						посухи	поля-гання	осипання	хвороб	
Капітан	00004035	2004	938 /	лп	7-9	зерн	ср/220/	7-9	8,8	8,8		9	
Кий 250 СВ	98004042	2001	1028 /	П	7	зерн,сил	ср (250)	>5	5	7		7	
Київський 271 М	90004025	1993	355 /	ЛП	5	зерн,сил	ср (270)	5	5	5		7	
Кишкун ТЦ 4240	91004056	1994	998 /	С	7	зерн	ср (240)	5	5	7		5	
Краснодарський 291 АМВ	05004034	2008	25 /	Л	9-10	зерновий	ср (290)		9	9		9	
КВ 2704	04004106	2007	279 /	ЛП	9,0	зерн	с/р/260/	8,5	8,6	8,7		8,9	
Кішкун 4244	02004013	2007	998 /	ЛП	7,8-8,0	зерно	с/р	8,0	8,5	8,7		8,6	
Каресс	04004099	2008	938 /	Л	8-9	зерновий	ср (210)		8-9	8-9		9	
Кішкун 4220 (Наталія)	04004040	2007	998 /	ЛП	8,5	зерно	с/р	8,2	8,4	8,3		8,8	
Коло МС 280	04004093		962 /	Л	9-10	зерновий	ср (280)		9	9		9	
Кадет	05004109	2008	924 /	Л	9-10	зерновий	ср (260)		8-9	8-9		9	
Кадр 217 МВ	98004113	2002	311 /	Л	9	зерн	ср (220)	7	7	7		7	
Корнелі	05004010	2007	485 /	СЛП	9,0	зерн	с/р/250/	8,7	8,5	8,6		9,0	
Корсунський 297 МВ	05004014	2007	355 /	СЛП	9,0	зерн	с/р/290/	9,0	8,7	8,9		9,0	
Король	99004050	2003	938 /	ЛП	7	зерн	ср (280)	>5	5	5		7	
Кішкун 4230	04004041	2007	998 /	ЛП	8,0	зерно	с/р	8,2	8,5	8,4		8,6	
Коксімо	04004114	2007	1194 /	Сб,зрЛП	9,0	зерн	с/р/220/	8,9	8,5	9,0		9,0	
Космо 230	04004107	2008	279 /	Л	8	зерновий	ср (240)		8-9	9		9	
Кішкун СЦ 4280 (Ленчі)	02004015	2006	998 /	ЛП	7-8	зерн	с/р/260/	7	7	7-9		7-9	
Колективний 225 МВ	86004037	1990	1109 / 345, 841	ЛП	5	зерн,сил	ср (220)	5	5	5		5	
Клаптон	03004006	2005	924 /	СЛП	9	зерн	с/р (230)	9	9	9		9	
Кішкун ТЦ 4250 (Джіна)	02004014	2007	998 /	СЛП	8,6	зерно	с/р	7,9	8,4	8,6		8,5	
Криничанський 257 СВ	05004061	2008	311 /	Л	9	зерновий	ср (250)		8-9	8-9		9	
Канада	02004086	2005	1079 /	СЛП	9	зерн	с/р (290)	9	9	9		9	
Кішкун СЦ 4282 (Жужанна)	02004016	2006	998 /	ЛП	7	зерн	с/р/250/	5-7	7-9	7-9		7-9	
Кішкун СЦ 4291 (Ольга)	02004017	2005	998 /	СЛ	9	зерн	с/р (240)	8,5	8	9		9	
Луганський 287 МВ	94004009	1997	309 /	СЛ	5	сил	ср (280)	5	5	5		5	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продук-тивність	Напрям викорис-тання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер	Рік реєст-рації	Заявник / Підтримувач						посухи	поля-гання	осипання	хвороб	
ЛГ 3215	04004004	2006	793 /	СЛП	9	зерно	ср	7-9	8,0	9		7-9	
Латізана	04004006	2007	793 /	ЛП	8,5	зерн	с/р/230/	8,8	8,5	8,6		9,0	
ЛГ 3409	04004008	2007	793 /	СЛП	8,9	зерн	с/р/250/	8,8	8,6	8,7		8,9	
ЛГ 2222	93004030	1997	793 /	П	7	зерн	ср (240)	7	5	7		7	
ЛГ 3214	93004033	1996	793 /	С	7	зерн	ср (270)	7	7	7		7	
Луганський 222 МВ	95004010	1998	309 /	С	7	зерн	ср (220)	>5	5	5		7	
ЛГ 2306	01004044	2004	793 /	СЛП	7-9	зерно	с/р (250)	5-7	8,5	9		9	
Любава 279 МВ ®	04004057	2007	311 /	Л	9,0	зерн	с/р/270/	8,5	8,6	8,4		8,6	
ЛГ 2289	99004012	2002	793 /	СЛ	7	зерн	ср (280)	>5	5	7		7	
Лактор	02004023	2005	924 /	ЛП	9	зерн	с/р (220)	9	8	9		9	
ЛГ 2195	01004043	2006	793 /	СЛП	9	зерно	ср	7-9	7-9	9		7-9	
Лелека МВ	04004085	2007	404 / 404	ЛП	8,5	зерн	с/р/260/	8,4	8,5	8,7		8,6	
ЛГ 2447	04004112	2007	793 /	Сб,зрЛП	8,9	зерн	с/р/250/	8,5	8,6	9,0		8,6	
Лайка	05004111	2008	924 /	Л	9	зерновий	ср (250)		8-9	9		9	
Міф 227 МВ	01004033	2004	311 /	сл	7	зерн	ср/220/	5-7	8,8	9		9	
Монкада	03004045	2006	1079 /	СЛП	9	зерн	с/р/240/	9	9	9		7-9	
МВ 251 ®	04004047	2006	720 / 1112	СЛП	9	зерн	с/р/250/	7-9	7-9	9		7-9	
Магріте	95004001	1999	1079 /	СЛ		зерн	с/р/260/						
МВ ТС 277 ®	04004049	2006	720 / 1112	СЛП	9	зерн	с/р/270/	7-9	8,5	9		7-9	
МС 300 МВ	92004017	1996	355 /	С	5	сил	ср (300)	5	5	7		7	
Маїс 226 МВ ®	01004006	2004	962 / 962	СЛП	7-9	зерн	с/ р (220)	5-7	8,3	9	-	9	
Мучо	02004085	2005	1079 /	СЛП	9	зерн	с/р (290)	9	9	9		9	
МАС 24А	05004021	2008	924 /	Л	9-10	зерновий	ср (260)		8-9	9		9	
Монументал	99004004	2001	437 /	СП	7	зерн	ср (280)	7	7	7		7	
Маг	05004058	2008	311 /	Л	9	зерновий	ср (280)		8-9	8-9		9	
Модем МС 280 ®	03004049	2006	962 /	СЛП	9	зерн	с/р/280/	7-9	8,6	9		7-9	
МЕЛ 272 МВ ®	02004057	2005	966 /	СЛП	8	зерн	с/р (270)	9	9	9		9	
Наутилус	00004016	2003	350 /	ЛП	7	зерн	ср (290)	>5	7	7		7	
НС 205	05004022	2007	879 /	СЛ	8,6	зерн	с/р/210/	8,9	8,6	9,0		9,0	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продук-тивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєст-рації	Заявник / Підтримувач					посухи	поля-гання	осипання	хвороб	
Нептун СВ		96004002	1999	355 /	СЛП	5	зерн,сил	ср (280)	5	5	7		5
НС 2012		05004007	2007	879 /	ЛП	8,5	зерн	с/р/240/	8,9	8,7	8,7		9,0
НХ 1480		02004003	2004	1079 /	лп	7-9	зерн	ср/250/	7-9	9	8,7		9
Нєбора		05004029	2008	924 /	Л	9-10	зерновий	ср (250)		8-9	9		9
НК ЛУГАН		02004087	2005	1079 /	ЛП	9	зерн	с/р (260)	9	9	9		9
НС 251		03004020	2005	879 / 879	ЛП	9	зерн	с/р (250)	9	9	9		9
Нексос	®	03004005	2006	1194 /	СЛП	/	зерн	с/р/230/	7-9	8,3	8,8		7-9
НК Равело		04004110	2008	1079 /	Л	9-10	зерновий	ср (190)		8-9	9		9
НК Фантус		06004013	2008	1079 /	Л	9-10	зерновий	ср (240)		9	8-9		9
НК Фалькон		06004008	2008	1079 /	Л	8-9	зерновий	ср (240)		9	8-9		9
НК Перформ		06004009	2008	1079 /	Л	9-10	зерновий	ср (240)		8-9	9		9
Овідій 295 МВ	®	02004072	2006	378 /	СЛ	7-9	зерн	с/р/290/	7-9	8,3	9		7-9
Олдхем		02004004	2004	1079 /	лп	7-9	зерн	ср/270/	7-9	9	9		9
ОДЛ-1		99004045	2003	1083 / 1083	Л	7	зерн	ср (240)	>5	7	7		7
Олегів 286 СВ	®	05004043	2006	1028 /	ЛП	9	зерн	с/р/280/	7-9	7-9	9		7-9
ПР39Н72 (Сандріна)		00004043	2003	767 /	Л	9	зерн	ср (220)	9	7	7		7
ПР39Т45		04004020	2007	767 / 767	СЛ	8,8	зерн	с/р/240/	8,9	8,4	8,7		9,0
ПР39Г83		04004019	2006	767 / 767	СЛП	9	зерн	ср/230/	7-9	7-9	9		9
ПР39Ф58		04004018	2007	767 / 767	СЛ	9,0	зерн	с/р/230/	8,5	8,7	8,8		9,0
Прім 247 МВ		01004029	2004	311 /	л	7	зерн	ср/240/	7-9	9	9		9
Переяславський 230 СВ		06004039	2008	355 /	СЛП	5-9	зерновий	ср (230)		8-9	9		9
ПР39Т13		05004002	2008	767 /	Л	9	зерновий	ср (240)		9	9		9
ПВ 81-01		06004031	2008	691 /	Л	8-9	зерновий	ср		8-9	9		9
ПР39Р20		05004108	2008	767 /	Л	9-10	зерновий	ср (280)		9	8-9		9
Пустоварівський 280 СВ		05004037	2008	655 /	Л	8-9	зерновий	ср (280)		8-9	8-9		9
П'ятихатський 270 СВ	®	03004025	2006	311 /	СЛП	9	зерн	с/р/270/	7-9	8,6	9		7-9
Піонер-Гран 3978		98004107	2001	736 /	Л	5	зерн	ср (260)	5	5	7		7
ПР39Р86	®	02004029	2005	767 /	СЛП	9	зерн	с/р (275)	9	9	9		9
ПР39Д81		98004102	2001	767 /	П	9	зерн	ср (260)	7	7	7		7

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поля-гання	осипання	хвороб	
Подільський 274 СВ	® 04004055	2007	311 /	СЛП	8,5-8,9	зерн	с/р/270/	8,6	8,5	9,0		8,9	
Роналдініо	04004103	2008	938 /	СЛП	5-9	зерновий	ср (210)		7-9	8-9		9	
Славутич 271 МВ	95004016	1999	340 /	С	5	зерн	ср (270)	>5	5	7		7	
Слобожанський МВ	04004084	2008	404 /	Л	7-8	зерновий	ср (290)		8-9	8-9		9	
Сидорів 251 МВ	® 00004040	2003	1028 /	Л	7	зерн	ср (250)	5	5	7		7	
Сеіді	04004082	2008	485 /	СЛП	6-9	зерновий	ср (280)		7-9	8-9		9	
Селект	93004031	1997	793 /	П	7	зерн	ср (260)	7	5	7		7	
Славутич 230 СВ	92004028	1996	340 /	С	5	зерн	ср (230)	5	5	5		5	
Сатурн	94004014	1997	355 /	СЛП	5	зерн,сил	ср (240)	5	5	5		5	
Сиваш	02004062	2005	411 /	СЛ	9	зерн	с/р (280)	8	8,6	9		9	
Сплендіс	98004136	2002	806 /	ЛП	9	зерн	ср (200)	7	7	7		7	
Солонянський 298 СВ	® 03004026	2006	311 /	СЛП	9	зерн	с/р/280/	7-9	7-8	9		7-9	
Союз	® 02004051	2005	311 /	СЛП	9	зерн	с/р (200)	9	9	9		9	
Сочава	05004012	2007	568 /	СЛП	8,8	зерн	с/р/240/	8,5	8,6	8,7		9,0	
Сталкер	® 03004021	2006	404 /	СЛП	7	крохмал	с/р/260/	7-9	7	7-9		7-9	
Сплав МС 290	04004089	2007	962 /	СЛ	8,9	зерн	с/р/290/	9,0	8,6	8,7		8,6	
ТОСС 231 МВ	92004116	1996	345 / 345, 841	С	7	сил	ср (230)	7	5	7		5	
Тарас	01004010	2004	355 /	лп	7	зерно	ср/230/	7	9	9		9	
Тітус	94004054	1997	806 /	Л	7	зерн	ср (250)	7	7	7		7	
Титан 220 СВ	97004019	2000	355 /	СЛП	7	зерн	ср (220)	7	7	7		7	
Теофанів 295 СВ	01004047	2004	1028 /	слп	5-7	зерн	ср/290/	7	8	8,5		9	
Тясьмин МВ	97004018	2001	355 /	Л	7	зерн,сил	ср (250)	7	5	7		7	
Успіх МВ	04004079	2008	378 /	СЛ	6-8	зерновий	ср (290)		7-9	8-9		9	
Ударник	® 02004081	2006	938 /	СЛП	9	зерн	с/р/230/	7-9	8,5	8,6		7-9	
Фантастік	04004007	2006	793 /	СЛ	7-9	зерно	ср	7-9	8,6	9		7-9	
Флавіус	95004083	1998	806 /	Л	7	зерн	ср (210)	>5	5	5		7	
Фруктіс	03004008	2005	806 /	СЛП	9	зерн	с/р (230)	9	9	9		9	
Харківський 250 МВ	94004021	1999	404 / 404	П	5	сил	ср (250)	5	5	5		5	
ХЛ 2222	06004046	2008	749 /	Л	8-9	зерновий	ср (230)		8-9	9		9	

Сорт			Код	Зона	Характеристики							
					Продук-тивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)			Якість
Назва Вид	Номер	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поля-гання	осипання	хвороб	
Хельга	91004035	1996	767 /	Л	7	зерн	ср (300)	7	7	7		7	
Хмельницький ®	04004064	2007	311 /	Сб,зрЛП	8,9	зерн	с/р/250/	8,6	8,9	9,0		8,7	
Ханні	04004081	2008	485 /	СЛ	6-8	зерновий	ср (240)		7-9	9		9	
Харківський 295 МВ	98004051	2001	404 / 404	Л	5	зерн,сил	ср (290)	5	5	5		7	
Харківський 291 МВ	99004036	2003	404 / 404	Л	7	зерн	ср (290)	>5	5	5		7	
Челленджер	93004066	1997	437 /	П	7	зерн	ср (250)	7	7	7		7	
Чемеровецький 260 СВ ®	04004053	2007	311 /	С,Л	8,5	зерн	с/р/260/	8,8	8,5	8,7		8,8	
Чумацький 260 МВ	02004055	2006	1167 /	СЛ	7-9	зерно	ср	7-9	8,5	9		7-9	
Чигиринський 267 СВ	05004015	2007	355 /	ЛП	8,6	зерн	с/р/260/	9,0	8,7	9,0		9,0	
Ювілейний 70 М	90004060	1993	355 /	СЛП	7	зерн,сил	ср (260)	7	5	7		7	
Ювілейний 60 МВ	84004105	1985	1109 /	ЛП	5	зерн,сил	ср (250)	5	5	5		5	
Аванс МС 350	04004090	2007	962 /	С	9,0	зерн	с/с/350/	8,9	8,7	8,9		8,6	
Альфа	95004027	1999	1079 /	С	7	зерн	сс (380)	7	7	7		7	
Апостолівський 310 ВС	04004095	2008	954 /	СЛ	6-9	зерновий	сс (310)		8-9	8-9		9	
Аалвіто	95004042	1999	713 /	С	5	зерн	сс (370)	>5	5	7		7	
Аманда	03004053	2007	938 /	СЛ	9,0	зерн	с/с/330/	8,9	8,6	9,0		9,0	
Арія МС 330 ®	03004055	2006	962 /	СЛ	9	зерн	с/с/330/	7-9	8,9	9		7-9	
Анжу 425	04004111	2008	793 /	СЛ	6-9	зерновий	сс (330)		8-9	9		8-10	
Армані	05004018	2008	924 /	Л	8-9	зерновий	сс (310)		8-9	9		9	
Борисфен 380 МВ	98004040	2001	411 /	Л	7	зерн,сил	сс (380)	>5	5	7		5	
Богдан	01004016	2004	355 /	сл	>7	зерн	сс/350/	7-9	8,9	9		9	
Борисфен 301 МВ	94004003	1997	411 /	С	7	зерн	сс (300)	5	5	7		7	
Веселка МВ ®	00004039	2003	378 /	Л	7	зерн	сс (340)	>5	5	7		7	
Витязь МВ	04004086	2008	404 /	Л	7-8	зерновий	сс (340)		8-9	9		9	
Верітіс	03004009	2006	806 /	СЛ	9	зерн	с/с/340/	9	8,4	9		7-9	
ВЦ 380 МВ ®	03004028	2007	311 /	С	8,5	зерн	с/с/380/	8,5	8,4	8,6		8,8	
ВАР 330 МВ ®	02004056	2005	966 /	СЛ	8	зерн	с/с (330)	8	8	9		9	
Господар 360 СВ	03004031	2007	1167 /	С	8,5	зерн	с/с/360/	8,5	8,4	8,6		8,8	
Глорія МВ	00004028	2004	1040 /	СЛ	9	зерно	с\с (340)	7	7,5	8		9	

Сорт				Код	Зона	Характеристики								
						Продук-тивність	Напрям викорис-тання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєст-рації	Заявник / Підтримувач						посухи	поля-гання	осипання	хвороб	
Гифт 310 СВ		05004080	2008	962 /	Л	8-9	зерновий	сс (310)		9	9		9	
Галера МВ		03004041	2008	378 /	СЛ	6-8	зерновий	сс (370)		7-9	8-9		9	
Гунор	®	04004046	2006	720 / 1112	СЛ	9	зерн	с/с/330/	9	7-9	9		7-9	
Гельвін 387 МВ		05004070	2008	311 /	Л	8-9	зерновий	сс (380)		9	9		9	
Донор МВ		05004045	2008	404 /	Л	8-9	зерновий	сс (310)		9	9		9	
Дніпровський 325 МВ		93004015	1996	311 /	С	7	зерн	сс (320)	7	5	7		5	
ДКС 4626		03004004	2005	437 /	СЛ	9	зерн	с/с (360)	9	9	9		9	
Дар 347 МВ		00004025	2003	311 /	ЛСзр	9	зерн	сс (340)	7	7	7		7	
Діброва МВ		01004035	2004	1040 /	л,сзрош	5-7	зерно	сс/340/	7-9	9	9		9	
Долар		92004139	1995	1079 /	СЛ	7	зерн	сс (390)	7	7	7		7	
ДК 391		02004007	2004	437 /	Л	9	зерн	сс/350/	7-9	8,6	9		9	
ДК 443		97004037	2000	766 /	СЛ	9	зерн	сс (380)	7	7	7		7	
ДК 440		99004007	2003	437 /	СзрЛ	9	зерн	сс (350)	7	7	7		7	
Діалог		05004053	2008	378 /	Л	8	зерновий	сс (350)		8-9	9		9	
ДКС 3511		03004001	2008	437 /	С	7	зерновий	сс (330)		8-9	9		9	
ДК 312		05004094	2008	1194 /	Л	8	зерновий	сс (310)		8-9	9		9	
Джуксін		05004096	2008	1194 /	Л	9-10	зерновий	сс (330)		9	9		9	
Евріка МВ	®	02004071	2005	378 /	СЛ	8	зерн	с\с (390)	8	9	9		9	
Екватор 338 МВ		01004024	2006	957 /	СЛ	9	зерн	с/с/330/	7-9	8,6	9		7-9	
СВРО 301 МВ	®	99004028	2003	962 / 962	Л	9	зенр	сс (300)	>5	7	7		7	
ЗПСК 434		99004017	2002	936 /	С	7	зерн	сс (400)	7	5	7		7	
Злагода МВ		01004004	2005	404 / 404	СЛ		зерн	3(310)	9	8,4	9		9	
ЗПСК 330		88004020	2001	936 /	С	5	зерн	сс (330)	5	5	7		7	
ЗУМ 0243	®	04004025	2006	926 /	СЛ	9	зерн	сс/350/	7-9	8,6	9		7-9	
ЗП 341		02004006	2004	936 /	сзрош,л	7-9	зерн	сс/340/	7-9	8,5	8,5		9	
Іскра МВ	®	02004067	2006	404 /	СЛ	7-9	зерн	с/с/340/	7-9	7-8	9		7-8	
Кобза МВ		01004040	2005	378 /	С,Л		зерн	с/с (350)	7	9	9		9	
Корона 350 МВ	®	01004007	2004	962 / 962	сл	7	зерн	сс/350/	5-7	8,5	9		9	
Кадр 328 МВ		98004028	2001	311 /	Л	7	зерн	сс (330)	>5	5	5		5	

Сорт			Код	Зона	Характеристики							
					Продук-тивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)			Якість
Назва Вид	Номер	Рік реєст-рації	Заявник / Підтримувач						посухи	поля-гання	осипання	хвороб	
Каліс	96004045	2000	806 /	С	5	зерн	сс (340)	>5	5	5		5	
КВС 381	05004066	2008	938 /	Л	9	зерновий	сс (350)		8-9	9		9	
Комета МВ	99004023	2002	355 /	СЛ	9	зерн	сс (300)	9	7	7		7	
Кішкун СЦ 4340 (Лейла)	02004020	2006	998 /	СЛ	7	зерн	с/с/340/	7	7	9		7-9	
Кларіка	98004003	2000	767 /	СЛ	7	зерн	сс (340)	>5	5	7		7	
Круг 340 ВС ®	02004047	2006	962 /	СЛ	9	зерн	с/с/340/	7-9	8,6	9		9	
КВС Амбер	05004072	2008	938 /	Л	9	зерновий	сс (350)		8-9	9		9	
Кішкун ТЦ 4344 (Шеріна)	04004028	2007	998 /	Л	8,5	зерно	с/с	8,4	8,5	8,6		8,9	
Кадр 327 МВ	97004009	2001	311 /	Л	7	зерн,сил	сс (330)	>5	5	7		5	
Кочубей 342 СВ	05004038	2008	1167 /	Л	9	зерновий	сс (340)		9	9		9	
ЛГ 3330	05004087	2008	793 /	Л	8-9	зерновий	сс (340)		9	9		9	
ЛГ 3232	05004088	2008	793 /	Л	8-9	зерновий	сс (390)		9	9		9	
Лаксот	04004113	2007	1194 /	Л	9,0	зерн	с/с	9,0	8,5	8,6		8,8	
ЛГ 3362	02004066	2006	793 /	СЛ	9	зерно	сс	9	8,4	9		7-9	
Лебідь МВ	96004019	2000	378 / 378	С	5	зерн	сс (340)	5	5	7		5	
ЛГ 2305	02004064	2006	793 /	СЛ	9	зерно	сс	7-9	8,5	9		7-9	
ЛГ 2372	02004065	2005	793 /	СЛ	9	зерно	с/с (380)	9	8,5	9		9	
Меридіан 341 МВ	01004020	2004	957 /	л	7-9	зерн	сс/340/	5-7	9	9		9	
МВ 355	91004023	1994	720 / 1112	Л	7	зерн	сс (350)	7	7	7		7	
Метеор 317 МВ	03004011	2005	355 /	СЛ	9	зерн	с/с (310)	9	9	9		9	
Моналіза	98004009	2000	767 /	СЛ	9	зерн	сс (340)	7	7	7		7	
МАС 33А	05004019	2008	924 /	СЛ	7-9	зерновий	сс (330)		8-9	9		9	
Моніка 350 МВ ®	03004029	2006	311 /	СЛ	7-9	зерн	с/с/350/	7-9	8,5	9		7-9	
Новація МВ ®	03004039	2006	378 /	СЛ	7-9	зерн	с/с/330/	7	8,6	9		7-9	
Нива МВ ®	02004070	2005	404 / 404	СЛ	8	зерн	с/с (320)	7	8	9		9	
Натура	05004031	2008	924 /	Л	8	зерновий	сс (320)		9	9		9	
НС 400	98004086	2001	879 / 879	С	9	зерн	сс (400)	>5	5	5		7	
НС 301	03004019	2005	879 / 879	СЛ	9	зерн	с/с(300)	9	9	9		9	

Сорт				Код	Зона	Характеристики								
						Продук-тивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєст-рації	Заявник / Підтримувач						посухи	поля-гання	осипання	хвороб	
НС 300		97004038	2000	879 / 879	С	7	зерн	сс (300)	7	7	7		7	
НК Леморо		06004011	2008	1079 /	Л	9	зерновий	сс (300)		9	9		9	
НК Термо		02004083	2005	1079 /	СЛ	9	зерн	с/с (390)	9	9	9		9	
НК Альтіус		06004004	2008	1079 /	СЛ	5-8	зерновий	сс (300)		7-8	8-9		9	
Орлик 330 МВ		06004038	2008	355 /	СЛ	5-9	зерновий	сс (330)		8-9	9		9	
Оксітан		02004027	2004	1079 /	сл	9	зерн	сс/340/	7-9	8	9		9	
Одеський 385 МВ		98004037	2001	378 / 378	С	7	зерн	сс (380)	>5	5	5		7	
Одеський 346 МВ		92004019	1995	378 / 378	С	5	зерн	сс (360)	5	5	5		5	
ОдМа 310 М		84004085	1987	720 / 378	СЛ	7	зерн,сил	сс (350)	7	7	7		7	
Оазис 315 СВ		01004021	2004	957 /	сл	>7	зерн	сс/350/	7-9	8,9	9		9	
Одісей 324 МВ		01004039	2004	378 /	с	7	зерн	сс/320/	7-9	8,1	9		9	
Одеський 375 МВ	®	99004053	2002	378 /	СЛ	7	зерн	сс (380)	>5	5	5		7	
Орільський 357 СВ		05004056	2008	311 /	Л	9	зерновий	сс (350)		9	9		9	
Одеський 360 МВ	®	98004103	2002	378 / 378	С	7	зерн	сс (350)	>5	5	7		7	
ПР38Б85	®	04004015	2006	767 /	СЛ	7-9	зерн	сс/340/	7-9	7-9	9		9	
Престиж 365 МВ		01004019	2004	957 /	л	7	зерн	сс/320/	7-9	9	9		9	
Петропавлівський 392 МВ		01004018	2004	957 /	с бог,зр	5-7	зерн	сс/360/	7-9	7,8	9		9	
ПР38В91	®	04004021	2007	767 /	С	9,0	зерн	с/с/330/	8,9	8,7	8,9		9,0	
Платан МВ		94004013	1997	378 / 378	С	7	зерн	сс (340)	7	5	7		5	
Пелікан		95004008	1999	1079 /	Л	7	зерн	сс (310)	>5	7	7		7	
ПР38Р92	®	02004031	2005	767 /	СЛ	9	зерн	с/с (330)	9	9	9		9	
ПР38Ф10	®	02004030	2005	767 /	СЛ	9	зерн	с/с (330)	9	9	9		9	
ПР38Г67	®	02004032	2005	767 /	СЛ	9	зерн	с/с(370)	9	9	9		9	
Песо		98004061	2001	1079 /	СЛ	7	зерн,сил	сс (320)	>5	5	7		7	
ПР38Б12		05004101	2008	767 /	СЛ	7-9	зерновий	сс (300)		8-9	9		8-10	
ПР39К38 (Синонім: Валюта)		98004069	2001	767 /	Л	9	зерн	сс (300)	7	7	7		7	
ПР38Д89 (Синонім: Аната)		98004072	2001	767 /	Л	9	зерн	сс (330)	7	7	7		7	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продук-тивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач					посухи	поля-гання	осипання	хвороб	
ПР37Д25		02004088	2005	767 /	СЛ	9	зерн	с/с (390)	9	9	9		9
Ранг МС 310		04004092	2008	962 /	СЛ	6-9	зерновий	сс (310)		8-9	9		9
Стожар 330 МВ		04004094	2008	954 /	СЛ	6-9	зерновий	сс (330)		8-9	8-9		9
Сід 357 МВ		01004028	2004	311 /	сл	7-9	зерн	сс /350/	7-9	8,9	9		9
Селест		02004005	2004	1079 /	сл	9	зерн	сс /330/	7-9	8,5	9		9
Січеславський 335 МВ		01004032	2004	311 /	сл		зерн	сс/330/	7	8,5	9,0		9,0
Сов 329 СВ		04004058	2007	311 /	СЛ	9,0	зерн	с/с/320/	8,9	8,7	8,6		9,0
СД 395 МВ		99004034	2002	1111 /	С	7	зерн	сс (390)	>5	5	5		7
Сітізен		02004021	2006	924 /	СЛ	7-9	зерн	с/с/320/	7-9	8,5	9		7-9
Тон 320 ВС		02004043	2005	962 /	СЛ	9	зерн	с/с (320)	9	9	9		9
ТАР 349 МВ		03004022	2007	966 /	С	8,9	зерн	с/с/340/	8,8	8,5	8,9		9,0
Усмішка		05004055	2008	378 /	Л	8-9	зерновий	сс (360)		9	9		9
Футура		04004100	2008	938 /	СЛ	6-9	зерновий	сс (330)		8-9	9		9
Фонд 404 МВ		02004045	2005	962 /	СЛ	9	зерн	с/с (400)	9	9	9		9
Флагман		05004051	2008	378 /	Л	7-8	зерновий	сс (360)		8-9	9		9
Фанжіо		05004016	2008	924 /	СЛ	7-9	зерновий	сс (320)		8-9	9		9
Харківський 311 МВ		93004029	1996	404 / 404	С	5	зерн	сс (310)	5	5	7		5
Харківський 325 МВ		98004093	2002	404 / 404	Л	5	зерн	сс (330)	5	5	7		5
Харківський 340 МВ		99004039	2002	404 / 404	Л	7	зерн	сс (340)	5	5	7		7
Харківський 329 МВ		99004038	2003	404 / 404	Л	7	зерн	сс (320)	>5	5	5		7
Шаланда МВ		03004040	2006	378 /	СЛ	7	зерн	с/с/350/	7-9	7-9	9		7-9
Юніон		03004027	2006	311 /	СЛ	9	зерн	с/с/340/	7-9	8,5	9		7-9
Ярем 326 МВ		02004059	2006	966 /	СЛ	7-9	зерн	с/с/320/	7-9	8,5	9		7-9
Борисфен 433 МВ		92004001	1995	311 /	С		зерн	сп (430)	7	5	5		5
Анжу 280		98004079	2001	713 /	С	7	зерн	сп (470)	>5	5	7		5
Бриз 396 МВ		01004026	2004	957 /	озрош	7	зерн	сп/410/	7-9	-	9		9
Борисфен 430 АМВ		89004005	1993	411 /	С	5	зерн	сп (430)	5	5	5		5
Башкировець		04004012	2006	355 /	С	9	зерн	с/п/420/	7-9	8,5	9		7-9
Базис		01004046	2005	938 /	С	9	зерн	с/п (400)	9	9	9		9

Сорт				Код	Зона	Характеристики								
						Продук-тивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєст-рації	Заявник / Підтримувач						посухи	поля-гання	осипання	хвороб	
Гейзер		04004011	2007	1079 /	С	9	зерн	с/п/430/	7-9	8,6	8,9		7-9	
ДКС 5143		05004006	2008	437 /	С	7-8	зерновий	сп (430)		8-9	8-9		9	
Дніпровський 425 МВ		92004008	1996	311 /	С	5	зерн	сп (420)	5	5	5		5	
Дніпровський 453 СВ		00004024	2003	311 /	Сзр	7	зерн	сп (450)	7	7	7		7	
Енергі Стар		02004008	2006	806 /	С	7-9	зерн	с/п/440/	9	8,6	9		7-9	
СВРО 401 СВ	®	99004029	2003	962 / 962	С	9	зерн	сп (400)	7	7	7		7	
ЗПГК 404		93004124	2001	936 /	С	7	зерн	сп (400)	7	7	7		7	
Квартал		03004010	2006	806 /	С	9	зерн	с/п/420/	7-9	8,6	9		7-9	
Карен	®	02004080	2006	938 /	С	9	зерн	с/п/430/	9	7-9	9		7-9	
Кодацький 442 СВ	®	02004039	2005	311 /	С	8	зерн	с/с (430)	9	9	9		9	
Кадр 443 СВ		98004116	2001	311 /	С	7	зерн	сп (420)	5	5	5		5	
Капорал		02004022	2005	924 /	С	9	зерн	с/п (430)	9	8,5	9		9	
Луч 471 МВ		88004072	1996	414 /	С	5	зерн	сп (470)	5	5	5		5	
Легіон 400		04004078	2008	378 /	С	6-7	зерновий	сп (400)		8-9	9		9	
МТІ	®	03004030	2007	311 /	С	8,8	зерн	с/п/440/	8,9	8,5	8,6		9,0	
НС 444		93004120	1997	879 / 879	С	7	сил	сп (440)	7	>5	7		7	
НК Такео		06004001	2008	1079 /	С	5-6	зерновий	сп (400)		8	8-9		9	
НС 4010		03004017	2005	879 / 879	С	9	зерн	с/п (420)	9	9	9		9	
Одеський 480 МВ		97004023	2001	378 / 378	С	5	зерн	сп (480)	5	5	5		5	
ПР37В05		04004023	2006	767 / 767	С	9	зерн	сп/420/	7-9	8,5	9		9	
ПР38А24		00004041	2003	767 /	Сзр	9	зерн	сп (400)	7	7	7		7	
Південь 480 СВ		92004020	1996	411 /	ЛП	5	сил	сп (480)	5	5	5		5	
ПР37К85	®	02004034	2005	767 /	С	9	зерн	с/п (410)	9	9	9		9	
ПР36Б08		02004035	2006	767 /	С	7-9	зерн	сп/420/	9	7-9	9		9	
Пульс МС 402		04004091	2007	962 /	С	9,0	зерн	с/п/400/	8,6	8,5	8,7		9,0	
Ріксер		05004097	2008	1194 /	С	6-7	зерновий	сп (400)		8	9		9	
Стіра		94004102	1999	767 /	СЛ	5	зерн	сп (420)	5	5	7		5	
Соколов 407 МВ		01004031	2004	311 /	сзрош	7	зерн	сп/400/	9	9,0	9		9	
Світ 400 МВ	®	01004008	2004	962 / 962	с/зрош/	7-9	зерн	сп/400/	5-7		9		9	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продук-тивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєст-рації	Заявник / Підтримувач					посухи	поля-гання	осипання	хвороб	
Сіско		02004084	2005	1079 /	С	8	зерн	с/п (420)	9	9	9		9
Фуріо		91004126	1993	1079 /	С	7	зерн	сп (450)	7	5	7		7
Фестиваль		04004102	2008	938 /	С	6-7	зерновий	сп (410)		8-9	8-9		9
Фабула		04004101	2008	938 /	С	7	зерновий	сп (410)		8-9	9		9
Аметист		01004009	2004	355 /	С	7-9	зерн	пс/520/	7	8,8	9		9
Бора (МС 02)		04004014	2006	273 /	С	9	зерн	п/с/500/	9	9	9		7-9
Борисфен 600 СВ	®	99004032	2003	311 /	Сзр	9	зерн	пс (550)	7	7	7		7
ЗПСК 704		95004048	1999	936 /	С	7	зерн	пс (600)	>5	5	7		7
Луч 630 МВ		89004049	1993	358 /	С	5	зерн,сил	пс (560)	5	5	5		5
Леоніс		02004009	2004	806 /	с	7-9	зерн	пс/520/	7-9	8,5	9		9
НС 640		93004045	1997	879 / 879	С	7	зерн	пс (600)	7	7	7		7
НС 420		93004043	1997	879 / 879	С	7	зерн	пс (600)	7	5	7		7
Наддніпрянська 50		78004038	1982	411 /	С	5	зерн,сил	пс (570)	5	5	5		5
Перекоп СВ		85004057	1990	411 /	С	7	зерн	пс (600)	7	7	7		7
Пшениця шарозерна													
Шарада		05466001	2008	25 /									
Сільськогосподарські: бобові													
Горох													
Вінець		00001002	2004	309 /	СЛП	7	зерн	сп		5	5	5-7	5-7	фж
Глянс		04001010	2008	404 /	СЛ	7-8	зерн	сс		5-7	5-8	5-8	5-7	зерн
Готівський		02001003	2006	946 /	СЛ	7-9	зерн	сс		5-7	5-7	5-7	7	фж
Девіз	®	03001007	2007	404 / 404	СП	7-8	зерн	сс		7-8	5-7	7-9	5-7	фж
Дамир 3		97001004	2000	1182 / 1182	Л	7	зерн	сп		5-7	7-9	5-7	5	фж
Дамир 2		97001003	2000	1184 /	СЛ	7-9	зерн	ср		7-9	7-9	7-9	5-7	фж
Дамир 1		97001002	2000	1174 / 1159, 1174	С	7	зерн	сс		7-9	7-9	5-7	5-7	фж
Елегант		98001002	2002	305 /	Л	5-7	зерн	рс		5-7	5	5-7	5-7	фж
Ефектний	®	02001001	2006	404 / 404	ЛП	7	зерн	сс		5-7	5	5-7	5-7	фж
Зекон		79001006	2000	880 /	СЛП	7-9	зерн	сс		7-9	7-9	5-7	5-7	цін

Сорт				Код	Зона	Характеристики								
						Продук-тивність	Напрям викорис-тання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєст-рації	Заявник / Підтримувач						посухи	поля-гання	осипання	хвороб	
Йезеро		03001001	2005	879 / 879	Л	7-9	зерно	сс		5-7	7-9	7-9	7-9	фж
Красноградський 8		92001003	1996	399 /	П	5	зерн	сс		5	5	5-7	5	фж
Конто	®	03001011	2006	912 /	Л	5-7	зерн	сс		5	7	7	5-7	фж
Камертон		01001004	2005	404 / 404	ЛП	7	зерно	сс		5-7	5-7	5-7	5-7	фж
Кардіфф		96001004	2004	1153 /	СЛ	7-9	зерн	ср		7-9	7-9	7-9	7-9	фж
Камелот	®	04001004	2006	888 /	ЛП	5-7	зерн	сс		5	7	7	5-7	фж
Кео		96001003	2004	1153 /	СЛ	7	зерн	ср		5-7	7-9	7-9	5-7	фж
Кадді		05001001	2008	1182 /	С	7-8	зерн	сс		7-9	7-8	5-8	5-7	фж
Комбайновий 1		99001003	2003	1121 /	Л	7	цін	сс		5-7	5-7	5-7	5-7	цін
Комет		95001002	1999	946 /	СЛП	7	зерн	сп		7-9	7-9	5-7	5-7	фж
Луганський		99001002	2003	309 /	СЛ	5-7	зерн	ср		7-9	5-7	5-7	5-7	фж
Лазер	®	98001006	2001	912 / 912	Л	7	зерн	сс		5-7	5-7	5-7	5	фж
Мадонна	®	00001004	2003	912 / 912	СЛП	9	зерн	ср		7-9	7-9	7-9	5-7	цін
Модус		01001003	2004	404 / 404	Л	7	зерн	сс		5-7	7-9	5-7	5-7	фж
Менгір		95001003	2000	946 /	СПП	7	зерн	рс		7-9	7-9	5-7	5-7	фж
Міллєнніум	®	04001001	2006	809 /	Л	7-9	зерн	сс		5-7	5-7	5-7	5-7	цін
Норд		88001009	1993	201 / 386	СЛП	7	зерн	сс		7-9	7-9	5-7	5	цін
Неосипаючий 1		74001010	1978	309 /	СЛП	5	зерн	сс		5-7	5	5-7	5	цін
Напарник		88001001	1993	309 /	С	5-7	зерн	сс		5-7	5	5-7	5	фж
Надійний		90001005	1995	309 /	СЛП	7	зерн	сс		7-9	5	5-7	5	цін
Намисто		02001002	2006	334 /	П	5	зерн	сс		5	5	5-7	5	фж
Петрониум		04001008	2008	376 /	ЛП	7-9	зерн	сп		5-7	5-7	7-9	5-7	фж
Полтавець 2		94001003	1999	952 /	Л	5-7	зерн	сс		5-7	5-7	5-7	5	фж
Ріалто	®	04001005	2006	1182 /	Л	5-7	зерн	сс		5-7	5-7	5-7	7	фж
Степовик		01001006	2004	309 /	СЛ	7	зерн	сс		7-9	7-9	7-9	5-7	цін
Сантана	®	04001002	2006	824 /	Л	5-7	зерн	сс		7	7-9	7	7	фж
Світ		03001003	2006	378 /	П	5-7	зерн	сс		7	7	5-7	5-7	фж
Труденик		80001003	1984	309 /	СЛП	5	зерн	сс		5-7	5	5	5	цін
Фаргус	®	04001007	2007	376 /	ЛП	7-8	зерн	сс		7-8	7-8	7-9	5-7	фж

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продук-тивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер	Рік реєст-рації	Заявник / Підтримувач						посухи	поля-гання	осипання	хвороб	
Харді ®	00001003	2004	912 / 912	СЛП	7-9	зерн	сп		5-7	5-7	5-7	5-7	фж
Харківський еталонний	97001008	2002	404 / 404	С	7	зерн	ср		7-9	7-9	5-7	5-7	фж
Царевич	04001009	2008	404 /	ЛП	5-7	зерн	сп		5-7	5-7	7-9	5-7	цін
Явор	03001002	2005	879 / 879	ЛП	7-9	зерно	ср		5-7	7-9	7-9	5-7	фж
Сочевиця													
Красноградська 49	91089001	1996	399 /	Л	5-7	зерн	сс		5-7	5-7	5-7	5-7	цін
Лінза	05089001	2008	311 /	С	7-8	зерн	сс		7-8	7-8	7-9	5-7	цін
Любава	03089001	2005	309 /	СЛ	7	зерн	сс		7-9	7-9	7-9	7-9	ціни
Нут													
Антей	01088001	2004	378 / 378	С	7	зерн	сс		7-9	7-9	7-9	7-9	цін
Буджак	05088001	2008	378 /	С	5-7	зерн	сс		9	9	9	9	цін
Добробут	01088002	2003	309 /	СЛ	7	зерн	ср		7-9	7-9	7-9	5-7	цін
Колорит	97088003	2000	309 /	СЛ	7	зерн	сс		7-9	7-9	7-9	5-7	фж
Орнамент	94088001	2002	309 /	С	7	зерн	сс		7-9	5-7	5-7	5-7	фж
Пегас ®	03088002	2005	378 / 378	С	7	зерно	сс		7-9	7-9	7-9	7-9	цін
Пам'ять	99088001	2002	378 / 378	С	7	зерн	сс		7-9	7-9	7-9	5-7	фж
Стоік	00088001	2002	909 /	С	7	зерн	сс		7-9	7-9	7-9	5-7	фж
Смачний	94088002	1999	309 /	С	7	зерн	сс		7-9	5-7	7-9	5-7	цін
Слобожанський	02088001	2004	399 /	С	7	зерн	сс		7-9	7-9	7-9	7-9	фж
Тріумф ®	03088001	2005	378 / 378	С	7	зерно	сс		7-9	7-9	7-9	7-9	цін
Чина													
Красноградська 8	99090001	2001	399 /	Л	7	зерн	сс		5-7	5-7	5-7	5-7	цін
Сподіванка	04090001	2006	311 /	Л	7	зерн	сс		5	5	5	5	цін
Квасоля звичайна													
Буковинка	02087003	2004	432 /	ЛС	7	зерно	сс		7	7	7	7	
Докучаєвська	94087004	2000	405 /	СЛ	7	зерн	сс		7-9	5-7	5-7	5-7	цін
Дніпрянка	03087001	2005	311 / 399, 311	С	7	зерно	сс		7-9	7-9	7-9	7-9	цін
Красноградська кущов	00087001	2002	399 /	Л	7	зерн	сс		5-7	5-7	5-7	5	фж

Сорт				Код	Зона	Характеристики								
						Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	полягання	осипання	хвороб	
Мавка		98087004	2001	345 / 345	ЛП	7	зерн	сс		5-7	5-7	5-7	5-7	цін
Надія		99087001	2001	432 /	Л	7	зерн	сс		5-7	5-7	5-7	5	цін
Перлина	®	04087003	2006	345 /	Л	5	зерн	сс		5	5	5	5	цін
Сільськогосподарські: круп'яні														
Гречка														
Амазонка		05002001	2008	1192 /	Л	5	зерн	ср	7	7	7	7	8	х
Астра		78002001	1983	345 / 345	Л	7	зерн	сс	5	5	7	5	5	цін
Аеліта		72002001	1978	417 / 417	П	5	зерн	сс	5	5	5	5	5	цін
Антарія		99002001	2002	1117 / 345	СЛП	7	зерн	ср	7	7	7	7	5	х
Вікторія		64002001	1969	371 /	ЛП	5	зерн	сп	5	5	5	5	5	х
Глорія		67002001	1973	371 /	С	5	зерн	сп	5	5	5	5	5	х
Єлена		00002004	2005	417 /	ЛП	7	зерн	сс	7	7-8	7-8	7-8	8	х
Зеленоквіткова 90		90002002	1995	417 / 417	П	5	зерн	сс	5	5	5	5	5	х
Іванна		92002001	1997	392 /	С	7	зерн	сс	7	7	7	7	5	цін
Крупинка		86002002	1990	392 /	СЛ	7	зерн	сс	7	7	7	7	5	цін
Кара-Даг		91002001	1996	417 / 417	С	5	цін	сс	5	5	5	5	5	цін
Лілея		83002003	1987	345 /	ЛП	5	зерн	ср	5	5	7	7	5	цін
Лада		73002004	1979	371 /	ЛП	5	зерн	сс	5	5	5	5	5	х
Любава		89002003	1993	417 / 345, 417	СЛП	7	зерн	сс	7	5	7	7	5	цін
Оранта	®	05002002	2007	345 /	СЛП	5	зерн	ср	7	7	7	7	7	х
Роксолана		94002004	2000	417 / 417	П	7	зерн	ср	7	7	7	7	5	х
Рубра		01002001	2004	417 / 417	ЛП	5	зерно	сс	7	7	7	7	7	х
Степова		92002005	1999	417 / 417	С	5	зерн	сс	5	5	7	7	5	х
Сумчанка		80002003	1985	392 /	СЛ	7	зерн	рс	5	5	7	7	5	цін
Слобожанка		00002002	2004	392 /	СЛП	8	зерно	сс	7	8,.2	7,9	7,8	8	цін
Українка		92002007	1997	345 / 345	СЛП	7	зерн	сс	7	7	7	7	5	цін
Ювілейна 100		05002003	2008	392 /	П	5	зерн	сс	7	7	7	7	8	х

Сорт				Код	Зона	Характеристики								
						Продук-тивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєст-рації	Заявник / Підтримувач						посухи	поля-гання	осипання	хвороб	
Просо														
Веселоподолянське 176		91006002	1995	388 /	СЛП	7	зерн	сс	5	7	7	7	5	цін
Веселоподільське 16		97006001	2000	388 /	СЛП	7	зерн	сп	5	5	7	7	5	х
Денвікське	®	02006002	2006	334 /	П	5	зерн	сп	5	7	7	5	7	х
Золушка	®	01006002	2006	386 /	ЛП	7	зерн	рс	7	7	7	7	7	цін
Золотисте		00006001	2003	388 /	Л	7	зерн	ср	7	7	7	7	7	цін
Київське 87		87006002	1991	345 / 345	СЛП	7	зерн	ср	7	7	5	7	5	цін
Константинівське	®	02006001	2006	404 /	С	7	зерн	ср	5	7	5	7	7	цін
Київське 96		96006002	1999	345 / 345	Л	7	зерн	рс	7	5	7	7	5	цін
Лана	®	04006001	2006	334 /	Л	7	зерн	сс	5	5	7	7	7	х
Миронівське 51		69006002	1978	341 / 341	СЛП	7	зерн	сп	7	7	7	7	5	цін
Новокиївське 01		00006003	2004	345 / 345	ЛП	8	зерно	сс	7	8	8	7	8	зерно
Олітан		05006001	2008	388 /	СП	8	зерн	сс	5	8	7	8	8	х
Омріяне	®	02006003	2005	345 / 345	СЛП	7	зерн	ср	7	8	8	7	8	цін
Полтавське золотисте	®	01006001	2005	386 /	ЛП	7	зерн	ср	7	8	7	8	7	цін
Сяйво		91006001	1994	345 / 345	СЛП	7	зерн, корм	ср	7	7	7	7	5	цін
Східне		01006003	2006	309 /	С	7	зерн	сс	5	7	7	7	7	х
Слобожанське		98006004	2001	404 / 404	ЛП	7	зерн	сс	7	7	7	7	5	цін
Таврійське	®	04006002	2006	1192 /	С	7	зерн	ср	5	7	7	7	7	х
Харківське 31		93006002	1996	404 / 404	СЛ	7	зерн	сс	7	7	7	7	5	цін
Сорго зернове														
Бургго		05064003	2008	1194 /	Л	7	зерн	рс		8	7	8	8	х
Генічеський 5/11		89064001	1994	414 /	С	7	зерн	сс	7	7	7	7	5	х,фр
Генічеське 209		99064003	2003	414 /	С	7.5	зерно	ср	7	7	7,5	7	7,6	х,фж
Дніпровський 39		94064006	2000	340 /	С	7	х	сс	7	7	7	7	7	х,фж
Донецьке 8		99064004	2003	909 /	С	7	зерно	ср	7	7,4	7,8	8	8	х,фж
Даш Е		03064001	2005	29 /	С	8	зерн	ср	7	7	8	8	8	х,фж
Кейрас F1		00064001	2003	806 /	С	7,5	зерно	ср	7,8	8	8	7,6	8	х,фж

Сорт				Код	Зона	Характеристики								
						Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляган ня	осипання	хвороб	
Кримбел		87064004	1992	361 /	С	5	зерн	сс	5	7	5	7	5	х,фр
Кримдар 10		87064005	1992	361 /	С	5	зерн	сс	5	5	5	5	5	х,фр
Максим	®	01064002	2005	309 /	Л	7	зерн	ср	7	7	7	7	7	х,фж
Одеський 205		91064001	1995	378 / 378	С	7	зерн	сс	5	7	7	7	5	х,фр
Слав'янське поле 210		02064001	2005	1039 /	С	7	зерн	ср	7	7	8	8	8	х,фж
Степовий 8 F1		99064002	2003	340 /	С	7	х,фж	ср	7,5	7,8	7	7	7	х,фж
Спринт W 341/22		03064003	2005	29 /	С	8	зерн	ср	7	7	8	8	8	х,фж
Спринт 2		03064002	2005	29 /	С	8	зерн	ср	7	7	8	8	8	х,фж
Анна	®	01064003	2004	309 / 361	С	7	зерно	ср	7	7,4	7,5	7,4	7	х,фж
Вінець		00064003	2004	414 /	С	7	зерно	ср	8	7,3	7,5	7,2	7,8	х,фж
Дніпрельстан		02064005	2006	311 /	СЛ	7	зерн	ср		7	7	7	8	х,фр
Краєвид		01064001	2004	311 /	С	7	зерно	ср	7	8	7,5	7,4	7,4	х,фж
Ковчег	®	04064003	2007	414 /	СЛ	7	зерн	рн		7	7	7	8	х,фр
Космосол		03064004	2006	767 /	С	7	зерн	сс		7	7	7	7	х,фр
Лан 59		02064004	2007	311 /	СЛ	7	зерн	рн		8	7	7	8	х,фр
Прайм		04064001	2006	29 /	СЛ	7	зерн	рс		7	7	7	8	х,фр
Свіфт 380/79		04064002	2006	29 /	СЛ	7	зерн	рс		8	8	7	7	х,фр
Сориз														
Аполлон		03330002	2008	378 /	С	7	х	рс		8	8	8	8	х
Дружний	®	01330001	2005	378 / 378	С	7	х	рс	7	7	8	8	7	х
Дарунок		00330002	2003	378 / 378	С	7	х	ср	5	5	7	7	7	х
Ізумруд		00330001	2003	378 / 378	С	7	х	ср	5	7	7	7	7	х
Коричневе 11		00330005	2003	361 / 361	С	7	х	ср	7	5	7	7	7	х
Крупинка 10		00330003	2003	361 / 361	С	7	х	ср	5	7	7	7	7	х
Одеський 302		95330002	1999	378 / 378	С	7	х	ср	7	5	7	7	7	х
Прогрес F1		00330004	2002	361 / 361	С	7	х	ср	5	5	7	7	7	х
Перлина		03330001	2006	414 /	С	7	х	рс		7	7	7	7	х
Сюрприз		96330002	2001	378 / 378	С	7	х	ср	5	5	7	5	7	х
Самаран 6	®	04330002	2006	311 /	С	7	х	рс		7	7	7	7	х

Сорт				Код	Зона	Характеристики								
						Продук-тивність	Напрям викорис-тання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєст-рації	Заявник / Підтримувач						посухи	поля-гання	осипання	хвороб	
Салют		04330001	2008	378 /	С	8	х	рс		8	8	8	8	х
Рис														
Агат	®	04009001	2007	412 /	С	7	цін	рс	7		7	7	7	зерн
Антей	®	02009009	2005	412 /	С	8	зерн	сп	7		7	7	8	цін
Дніпровський		99009001	2002	412 / 412	С	7	зерн	рс	7		7	5	5	зерн
Зубець		00009002	2003	412 / 412	С	7	зерно	рс	7		7	7	7	цін
Мутант 428		86009004	1989	412 / 412	С	7	зерн	рс	7		7	5	5	цін
Пам'яті Гічкіна	®	02009008	2005	412 /	С	7	зерн	сс	7		7	7	8	харчовий
Славутич		00009001	2003	412 / 412	С	7	зерно	рс	5		7	7	7	цін
Спальчик		76009009	1990	15 / 412	С	7	зерн	сс	7		5	5	5	цін
Україна 96		96009003	2001	412 / 412	С	7	зерн	ср	7		7	7	5	х
Янтарний	®	02009010	2005	412 /	С	7	зерн	рс	7		7	7	8	цін
Сільськогосподарські: олійні та прядивні														
Соняшник														
Альфа		02017016	2006	1169 /	Л	7	олн	скс		7	9	8	8	вл
Аліенор		98017003	2001	806 /	Л	8	олн	скс		5	7-9	8	5	вл
Байда		98017039	2003	329 / 329	СЛ	5	олн	скс		6	8	8	5	вл
Блейзер		06017016	2008	684 /	СЛ	8	вол	скс		8,5	8	8	9	вл
Гайдук		04017053	2008	1093 /	СЛ	7	олн	скс		8	8	8	8,5	вл
Гетьман F1		98017041	2001	1093 /	СЛ	8	олн	скс		6	7-9	8	6	вл
Донбас	®	01017015	2004	1083 /	СЛ	7	олн	скс		7	8	8	7	вл
Деркул	®	99017012	2004	1083 /	СЛ	7	олн	скс		7	8	8	7	вл
Евріка МЛ		00017009	2004	134 /	СЛ	7	конд	скс		7	8	8	7	сл
Еней	®	99017021	2002	404 / 404	СЛ	8	вол	скс		6	7-9	8	7	вл
Заграва		04017010	2007	736 /	Л	8	олн	скс		8	8	9	8	вл
Зубр		01017029	2004	378 /	СЛ	7	олн	скс		8	8	8	8	вл
Захват	®	02017038	2006	378 /	СЛ	7	олн	скс		9	8	8	8	вл
Заклик	®	01017040	2004	1114 /	Л	7	олн	скс		8	9	8	7	вл

Сорт				Код	Зона	Характеристики								
						Продук-тивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєст-рації	Заявник / Підтримувач						посухи	поля-гання	осипання	хвороб	
Злива	®	99017008	2002	378 /	С	7	олн	скс		7	8	7-9	7	вл
Завіт	®	02017040	2005	378 /	СЛ	7	олн	скс		8	8	9	8	вл
Карат	®	04017056	2007	404 /	Л	9	олн	скс		8	8,8	8	8,5	вл
Красень		97017020	2001	404 / 404	С	8	олн	скс		6	7-9	7-9	7	вл
Кий		97017022	2000	404 / 404	С	7-9	олн	скс		5	8	8	7-9	вл
Кошовий		04017057	2008	1093 /	СЛ	7	олн	скс		8	9	8	8,5	вл
Логос		04017065	2007	1169 /	Л	8	олн	скс		8	8,8	9	8,5	вл
МАС 96А		05017017	2008	924 /	СЛ	8	олн	скс		8,5	8	8	8,5	вл
Міраж	®	03017009	2007	216 /	СЛ	7	олн	скс		8	8	8	7	вл
Монарх	®	05017004	2007	879 /	СЛ	8	вол	скс		9	8,5	9	8	вл
Мірослав	®	04017034	2007	1141 /	СЛ	7	олн	скс		8	9	8	8	вл
МАС 97А		05017024	2008	924 /	СЛ	8	олн	скс		8,5	9	8	9	вл
Мілонга		05017016	2008	924 /	СЛ	8	олн	скс		8	9	8	8,3	вл
Мальком		05017015	2008	924 /	СЛ	8	олн	скс		8,5	9	8	8,5	вл
МАС 94С		05017099	2008	924 /	СЛ	9	олн	скс		9	9	8,5	8,5	вл
Октава	®	01017021	2005	51 / 366, 51	СЛ	7	олн	скс		7	7	8	7	вл
Оберіг		04017054	2007	1093 /	СЛ	9	олн	скс		8	8,5	9	8,5	вл
Онікс	®	04017067	2007	919 /	СЛ	7	конд	скс		8	8	8	8	сл
ПР62А91		00017017	2003	767 /	СЛ	8	олн	скс		6	8	8	7	вл
Партнер		03017018	2005	126 /	СЛ	7	олн	скс		8	8	9	7	вл
ПСФ 4639		06017015	2008	684 /	СЛ	8	вол	скс		8,5	9	8,5	9	вл
Прометей		97017033	2001	329 / 329	С	5	олн	скс		5	7-9	7-9	5	вл
Персей		04017066	2008	1169 /	СЛ	7	олн	скс		8	8	8	8,5	вл
Русіч		04017052	2007	1093 /	СЛ	9	олн	скс		8	8,8	9	8,5	вл
Рейна		06017012	2008	273 /	СЛ	8	олн	скс		8,5	9	8	8,2	вл
Ранок		99017023	2003	1110 /	Л	5	конд	скс		5	7	8	6	сл
Славутич		02017033	2006	1093 /	С	7	олн	скс		7	7	9	8	вл
Соната		01017031	2004	1093 /	СЛ	7	олн	скс		8	8,5	8	8	вл
Сонячний настрій		04017011	2007	736 /	Л	7	олн	скс		8	8	9	8	вл

Сорт				Код	Зона	Характеристики								
						Продук-тивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєст-рації	Заявник / Підтримувач						посухи	поля-гання	осипання	хвороб	
Степок		04017071	2008	1059 /	Л	7	олн	скс		8,3	9	8	8,5	вл
Спіру		05017023	2008	924 /	СЛ	8	олн	скс		8	9	8	8,5	вл
Сувенир		02017007	2005	329 /	Л	7	олн	скс		8	8	7	7	вл
Сяйво	®	99017009	2003	378 /	С	7	олн	скс		7	8	8	6	вл
Сотник		05017066	2008	1121 /	Л	7	олн	скс		8	8,5	8	8	вл
Сівер		99017022	2002	404 / 404	С	8	олн	скс		6	8	7-9	7	вл
Тіса		95017005	2000	879 / 879	С	7-9	олн	скс		5	7-9	7-9	5	вл
Тріумф		03017025	2007	16 / 1112	Л	7	олн	скс		8	8	8	7	вл
Українське сонечко		00017008	2004	736 /	Л	7	олн	скс		8	7	8	7	вл
Український скоростиглий		98017052	2001	736 /	СЛ	5	олн	скс		5	8	8	5	вл
Флокс	®	02017037	2005	1114 /	СЛ	7	олн	скс		7	8	9	8	вл
Форум		04017055	2007	1093 /	СЛ	9	олн	скс		8	8,7	8,5	8,5	вл
Харківський 49		88017007	1992	404 / 404	СЛ	5	олн	скс		5	5	7-9	5	вл
Чумак		98017040	2001	216 /	СЛ	5	олн	скс		5	7	8	5	вл
Ясон	®	04017042	2007	404 /	СЛ	9	олн	скс		8	8,5	9	8	вл
Айдар		04017070	2008	1059 /	СЛ	7	олн	рс		8,5	8,5	8	8,7	вл
Атланта		01017001	2004	806 /	Л	7	олн	рс		7	8	8	7	вл
Анонс	®	02017028	2005	378 /	С	8	олн	рс		7	8	7	7	вл
Алісон		02017001	2006	806 /	С	8	олн	рс		8	9	8		вл
Ант	®	01017025	2004	404 / 404	СЛ	7	вол	рс		8	8	8	7,5	вл
Альянс		95017025	1999	806 /	СЛ	7-9	олн	рс		5	7-9	7-9	5	вл
Алмаз	®	03017008	2005	1192 /	СЛ	8	конд	рс		8	8	7	7	вл
Айтана		00017002	2003	806 /	СЛ	8	олн	рс		6	8	8	6	вл
Альтес РМ		98017005	2002	806 /	Л	8	олн	рс		6	7	8	5	вл
Альманзор		98017054	2002	806 /	СЛ	7-9	олн	рс		5	8	8	5	вл
Аріадна Євраліс		05017078	2008	806 /	СЛ	8	вол	рс		8,5	9	8,5	8,5	вл
Альзан		98017004	2001	806 /	Л	8	олн	рс		6	7-9	7-9	5	вл
Босць	®	04017044	2008	404 /	Л	8	олн	рс		8	8	8	8,5	вл

Сорт				Код	Зона	Характеристики								
						Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляглання	осипання	хвороб	
Балкан		00017013	2004	879 / 879	Л	8	олн	рс		7	7	8	7,5	вл
Богун	®	04017047	2008	404 /	Л	8	вол	рс		8,5	8,5	8	8,5	вл
Всесвіт	®	04017049	2007	404 /	СЛ	9	олн	рс		8	8,5	9	8,5	вл
Віталія		01017016	2003	886 /	СЛ	7-9	олн	рс		7	8	8	7	вл
Віста		05017009	2007	485 /	СЛ	9	олн	рс		8	8,7	9	8	вл
Відок		03017020	2005	924 /	СЛ	9	олн	рс		9	8	8	8	вл
Дует	®	01017023	2005	51 / 366	СЛ	7	олн	рс		7	9	7	7	вл
Драган	®	02017011	2004	1141 /	Л	8	олн	рс		8	9	8	7,5	вл
Дунай		92017043	1996	879 / 879	С	5	олн	рс		5	7-9	7-9	5	вл
Доріана		04017041	2008	938 /	СЛ	8	олн	рс		8	9	8	8	вл
Джазі		01017038	2004	1079 /	Л	9	олн	рс		8	9	8	7,5	вл
Донський 60		82017010	1987	216 /	С	8	олн	рс		7	7	8	8	вл
Дарій	®	02017024	2005	404 / 404	СЛ	8	вол	рс		7	8	9	8	вл
Енергік РМО		01017002	2004	806 /	Л	7	олн	рс		7	8	8	7	вл
Етюд		01017026	2005	404 /	СЛ	8	олн	рс		9	8	9	7	вл
Ес Карамба		03017012	2006	806 /	СЛ	7-9	олн	рс		8	9	8	8	вл
ЕС Ізабелла		05017079	2008	806 /	СЛ	8	олн	рс		8,5	9	8,5	8,5	вл
Залік		01017030	2005	378 /	СЛ	7	олн	рс		7	8	9	7	вл
Запорізький кондитерський		94017001	1998	329 / 329	Л	5	конд	рс		5	5	7-9	5	сл
Злата		01017039	2005	1114 /	Л	8	олн	рс		7	8	9	8	вл
Знахідка	®	99017011	2002	1114 / 1114	С	8	олн	рс		6	8	8	6	вл
Захист	®	99017010	2003	1114 / 1114	С	8	олн	рс		6	8	8	6	вл
Застава		01017041	2005	1114 /	СЛ	8	олн	рс		7	8	9	8	вл
Запорізький 26		97017024	2000	329 / 329	С	5	олн	рс		5	7-9	7-9	5	вл
Запорізький 28		97017035	2001	329 / 329	Л	5	олн	рс		5	7-9	7-9	5	вл
Зевс		04017006	2007	879 /	Л	8	олн	рс		8	8,8	9	8,5	вл
Запорізький 32		98017038	2003	329 / 329	СЛ	5	олн	рс		5	8	8	5	вл
Златибор	®	04017021	2006	879 /	СЛ	8	олн	рс		8	9	9	7	вл

Сорт				Код	Зона	Характеристики								
						Продук-тивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєст-рації	Заявник / Підтримувач						посухи	поля-гання	осипання	хвороб	
Ізард		01017003	2003	793 /	СЛ	7-9	олн	рс		5	8	8	7	вл
Іберіко		04017028	2007	793 /	Л	8	вол	рс		8	8,5	9	8	вл
Імператор	®	04017031	2006	1141 /	С	7-9	олн	рс		8	8	8	7	вл
Ковчег	®	00017007	2003	404 / 404	Л	8	олн	рс		6	7-9	8	7	вл
Красотка		91017023	1997	806 /	СЛ	5	олн	рс		5	7-9	7-9	5	вл
Квін	®	04017045	2008	404 /	СЛ	7	олн	рс		8,5	9	8	9	вл
Капрал		05017052	2008	404 /	СЛ	7,5	пальм	рс		8	9	8,5	8,5	вл
КВС Гелія 04 РО		03017051	2007	938 /	СЛ	9	олн	рс		8	8,6	9	8	вл
Красотка РМ		98017028	1997	806 /	СЛ	5	олн	рс		5	8	8	5	вл
Кеопс		02017002	2004	806 /	С	7	олн	рс		8	8,6	8	7	вл
КВС Гелія 06	®	03017050	2006	938 /	СЛ	9	оли	рс		8	9	9	8	вл
Каньон	®	04017032	2006	1141 /	СЛ	7-9	олн	рс		9	8	9	8	вл
Косово	®	05017003	2007	879 /	СЛ	9	олн	рс		8,5	8,5	9	8	вл
ЛГ 5445		01017011	2004	793 /	Л	7	олн	рс		8	9	8	7,5	вл
Лейіла	®	05017007	2007	806 /	СЛ	9	олн	рс		8	8,5	9	8	вл
Латіно		04017029	2007	793 /	Л	8	вол	рс		7	8	9	8	вл
Лиман		04017072	2008	1059 /	СЛ	8	вол	рс		8,5	8,5	8	8	вл
Лайка		05017010	2007	485 /	СЛ	9	олн	рс		8	8,8	9	8	вл
Лакомка		03017022	2006	16 / 1112	Л	8	конд	рс		8	8	8	7	сл
Морава	®	05017002	2007	879 /	СЛ	9	олн	рс		8	9	9	8,5	вл
Майпо		01017004	2003	793 /	СЛ	8	олн	рс		6	7-9	8	7	вл
Меридиан		04017007	2006	879 /	СЛ	8	олн	рс		8	8	9	8	вл
Мастер		03017023	2006	16 / 1112	Л	8	олн	рс		7	7	8	7	вл
Мегасан		98017001	2001	719 /	СЛ	7	олн	рс		6	8	8	5	вл
МН 5319		05017093	2008	437 /	СЛ	9	олн	рс		8,5	9	8,5	8,5	вл
Нібас		01017013	2004	765 /	Л	7	олн	рс		7	8,8	8	7,5	вл
НПК 1207		06017007	2008	679 /	Л	8	олн	рс		8,5	9	8,5	8	вл
Надійний		02017008	2004	329 / 329	Л	9	олн	рс		7,5	8	8	7	вл
Одор		00017014	2005	378 /	С	7	вол	рс		7	8	7	7	вл

Сорт				Код	Зона	Характеристики								
						Продук-тивність	Напрям викорис-тання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєст-рації	Заявник / Підтримувач						посухи	поля-гання	осипання	хвороб	
Одеський 249		92017055	1998	378 / 378	СЛ	7-9	олн	рс		5	7-9	7-9	5	вл
Олівер 90	®	02017031	2006	378 /	С	7	вол	рс		8	8	8	7	вл
Орасол		03017005	2008	437 /	СЛ	8	вол	рс		8,5	9	8	8,5	вл
Оскіл	®	04017050	2007	404 /	СЛ	9	олн	рс		8,5	8,7	9	8,5	вл
Олстар РМ		98017057	2002	806 /	Л	8	олн	рс		6	8	7-9	6	вл
Одеський 122		85017006	1989	378 / 378	СЛ	5	олн	рс		7-9	5	7-9	7-9	вл
ПР63А40	®	04017024	2007	767 /	СЛ	9	олн	рс		8,5	9	9	8	вл
Песма	®	05017018	2007	1114 /	СЛ	9	олн	рс		8	9	9	8,5	вл
Петропавлівський		01017014	2004	765 /	СЛ	7	олн	рс		7	8	8	8	вл
Пасіфік		05017086	2008	806 /	СЛ	8	вол	рс		8,5	9	8,5	8,5	вл
ПР64Г45		04017027	2006	767 /	СЛ	8	вол	рс		8	9	9	8	вл
ПР63А86		05017075	2008	767 /	СЛ	8	олн	рс		8,5	9	8,5	8,5	вл
ПР64А63		00017020	2004	767 /	СЛ	9	олн	рс		8	9	8	8	вл
ПР64Г51		00017019	2004	767 /	СЛ	8	вол	рс		8	9	8	8	вл
ПСФ - 02		06017018	2008	690 /	СЛ	8	вол	рс		8,5	9	8,5	8	вл
Президент	®	04017033	2006	1141 /	С	8	олн	рс		8	9	9	7	вл
ПР63А90		98017044	2001	767 /	Л	8	олн	рс		6	7-9	8	7	вл
Ригасол ОР		03017029	2008	437 /	СЛ	7	олн	рс		8	9	8	8,5	вл
Рімісол	®	02017043	2006	879 /	СЛ	7	олн	рс		8	9	8	8	вл
Роднік		03017024	2006	16 / 1112	С	7	олн	рс		7	7	8	7	вл
Румбасол ОР		06017060	2008	437 /	С	8	олн	рс		8	9	8	8,5	вл
Рими	®	02017044	2005	879 / 879	СЛ	8	олн	рс		7	8	8	8	вл
Сирена (МС)		04017022	2006	273 /	Л	7	олн	рс		8	8	9	8	вл
Символ	®	02017029	2006	378 /	СЛ	8	олн	рс		7	8	8	7	вл
Слав'янин		94017042	1999	329 / 329	СЛ	5	вол	рс		5	7-9	7-9	5	вл
Світоч		92017004	1996	404 / 404	СЛ	5	олн	рс		5	7-9	7-9	5	вл
Савінка		94017009	1999	1079 /	СЛ	7-9	олн	рс		5	7-9	7-9	5	вл
Сержан		04017008	2006	879 /	Л	8	олн	рс		8	9	9	8	вл
Сальза РМ		05017006	2008	806 /	СЛ	8	вол	рс		8,5	9	8,5	8	вл

Сорт				Код	Зона	Характеристики								
						Продук-тивність	Напрям викорис-тання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєст-рації	Заявник / Підтримувач						посухи	поля-гання	осипання	хвороб	
Старобільський		02017004	2005	1083 /	Л	8	олн	рс		7	7	8	7	вл
Сула		97017037	2001	879 / 329	СЛ	7-9	олн	рс		5	7-9	7-9	5	вл
Саша	®	05017019	2007	1114 /	СЛ	9	олн	рс		8	9	9	8	вл
С 70165		03017011	2005	719 /	СЛ	9	олн	рс		8	8	9	8	вл
Тітанік	®	02017009	2004	1141 /	Л	9	олн	рс		8	9	8	7,5	вл
Терра	®	05017005	2007	806 /	СЛ	9	олн	рс		8	9	9	8,5	вл
ТРК 1804		01017044	2005	1000 /	СЛ	8	олн	рс		8	8	9	8	вл
Тайфун	®	03017010	2006	216 /	С	7	олн	рс		8	8	9	8	вл
Тсіде		98017055	2002	806 /	Л	8	вол	рс		6	8	8	7	вл
Український F1		97017018	2001	736 /	СЛ	5	олн	рс		5	8	8	5	вл
Франкасол	®	94017027	1999	437 / 437	СЛ	7-9	олн	рс		5	7-9	7-9	5	вл
Форвард		05017053	2008	404 /	СЛ	8	олн	рс		8,5	9	8,5	9	вл
Фрагмент	®	02017034	2005	1114 /	СЛ	7	олн	рс		8	8	9	8	вл
Форте ОР		06017059	2008	437 /	С	8	олн	рс		9	9	8,5	8	вл
Фабіола КС		06017010	2008	485 /	СЛ	9	олн	рс		8	9	8,5	8,5	вл
Флагман		03017026	2006	16 / 1112	Л	8	олн	рс		7	8	8	8	вл
Філліа		05017084	2008	1194 /	СЛ	8	олн	рс		8,5	9	8,5	8,5	вл
Хорс		04017009	2006	879 /	Л	8	олн	рс		8	9	8	8	вл
Хайсан 321 ПР		92017032	2000	713 /	Л	5	олн	рс		5	7-9	7-9	5	вл
ЧаС	®	03017047	2007	919 /	Л	7	олн	рс		8	8	9	7	вл
Шанс		04017038	2008	922 /	СЛ	7	олн	рс		8,5	8	8	8,5	вл
Ягуар		94017021	1999	806 /	СЛ	7-9	олн	рс		5	7-9	7-9	5	вл
Арена ПР		01017012	2003	1079 /	СЛ	8	олн	ср		6	7-9	8	7	вл
Аламо		94017019	1999	806 /	СЛ	7-9	олн	ср		5	7-9	7-9	5	вл
Алліум РМ		04017013	2006	806 /	С	7	олн	ср		8	8	9	7	вл
Арена		97017025	2000	1079 /	С	7-9	олн	ср		5	8	6	7	вл
Белград	®	02017012	2004	1141 / 879	Л	8	олн	ср		8	8,5	8	7,8	вл
Базальт		05017065	2008	922 /	СЛ	9	олн	ср		8,5	8,5	9	8,5	вл
Базальт		05017065	2008	378 /	СЛ	9	олн	ср		8,5	8,5	9	8,5	вл

Сорт				Код	Зона	Характеристики								
						Продук-тивність	Напрям викорис-тання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєст-рації	Заявник / Підтримувач						посухи	поля-гання	осипання	хвороб	
В 306		92017046	2000	901 /	С	5	олн	ср		5	5	7-9	5	вл
Вранац	®	03017016	2006	879 /	Л	8	конд	ср		8	9	8	8	сл
Гена		00017011	2003	879 / 879	СЛ	7	олн	ср		5	8	8	6	вл
Дніпр		92017042	1997	879 / 879	СЛ	5	олн	ср		5	7-9	7-9	5	вл
Згода		92017005	1996	378 / 378	С	5	олн	ср		5	7-9	7-9	5	вл
Конгрес		05017042	2007	1141 /	СЛ	9	олн	ср		8,5	9	9	8,5	вл
Казіо		79017016	1998	1079 /	СЛ	7-9	олн	ср		5	7-9	7-9	5	вл
Кандела		04017030	2008	793 /	СЛ	8	олн	ср		8	9	8	8,5	вл
ЛГ 5434М		01017007	2004	793 /	Л	8	олн	ср		8	9	8	7,5	вл
ЛГ 5670М		01017008	2004	793 /	СЛ	9	олн	ср		8	9	8	7	вл
ЛГ 5590		01017034	2006	793 /	Л	7-9	олн	ср		8	9	9	8	вл
Лан 26		98017053	2001	1096 / 1083	С	5	олн	ср		6	8	8	7	вл
ЛГ 5415		01017035	2006	793 /	СЛ	7-9	олн	ср		8	9	9	7	вл
Мілутін	®	02017010	2005	1141 /	СЛ	8	олн	ср		8	9	9	7	вл
Матеол РО		05017067	2008	938 /	Л	8	олн	ср		8	9	8,5	9	вл
НК Долбі		04017059	2007	1079 /	СЛ	9	олн	ср		8	9	9	8,5	вл
НК Ферті		04017061	2007	1079 /	С	9	вол	ср		9	9	9	8	вл
НК Делфі		04017060	2008	1079 /	СЛ	9	олн	ср		9	9	9	8	вл
Оріон		89017004	1993	216 / 1192, 1059	СЛ	5	олн	ср		5	5	5	5	вл
Одеський 504		92017006	1997	378 / 378	СЛ	7-9	олн	ср		5	7-9	7-9	5	вл
Одеський 123		85017007	1990	378 / 378	СЛ	5	олн	ср		5	5	7-9	5	вл
Оллеан		05017090	2008	1194 /	СЛ	8	олн	ср		9	9	8,5	8,5	вл
Перформер		01017019	2003	886 /	СЛ	7-9	олн	ср		6	8	8	7	вл
Псьол		04017048	2007	404 / 404	СЛ	9	вол	ср		8,5	8,5	9	8,5	вл
Погляд		94017002	1999	404 / 404	С	7-9	олн	ср		5	7-9	7-9	5	вл
ПР64Г91	®	04017023	2007	767 /	СЛ	8	вол	ср		8	8	9	8	вл
ПР64Е83		05017073	2008	767 /	СЛ	8	олн	ср		8,5	9	8,5	8,5	вл
ПР64А10 (Синонім: Міхаіл)		98017043	2001	767 /	С	8	олн	ср		7	7-9	8	7	вл

Сорт				Код	Зона	Характеристики								
						Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляглання	осипання	хвороб	
ПР64А71		® 02017014	2005	767 /	Л	9	олн	ср		9	8	9	8	вл
ПР64А58		02017013	2006	767 /	СЛ	9	олн	ср		8	9	9	8	вл.
ПР64А44		01017046	2004	767 /	СЛ	8	олн	ср		8	9	8	7	вл
ПАН 901		05017008	2007	558 /	С	9	олн	ср		8	8,5	8	8	вл
Супер 25		84017018	1998	719 /	Л	7-9	олн	ср		5	7-9	7-9	5	вл
Сена		01017006	2004	793 /	Л	8	олн	ср		8	8,7	8	8	вл
Сапфир		® 03017039	2006	378 /	Л	8	олн	ср		8	8	9	8	вл
Термінатор		05017041	2007	1141 /	СЛ	9	олн	ср		8,5	8,5	9	8,5	вл
АК 0324		® 01017045	2005	938 /	СЛ	9	олн	сс		8	8	9	7	вл
Аранго		02017019	2006	793 /	С	7	олн	сс		8	9	8	7	вл
Дністр		95017003	2000	879 / 879	СЛ	7-9	олн	сс		5	7-9	7-9	5	вл
Донський крупнонасінний		89017003	1993	216 / 1059, 1192	СЛ	5	конд	сс		5	5	5	5	сл
Єврофлор		93017003	1998	806 /	Л	7-9	олн	сс		5	7-9	7-9	5	вл
Ідальго		05017070	2008	793 /	СЛ	9	олн	сс		8	9	9	9	вл
Коралія КС		06017011	2008	485 /	СЛ	8	олн	сс		8,5	9	8,5	9	вл
ЛГ 5412		04017017	2008	793 /	С	8	олн	сс		8	8	8	8,5	
ЛГ 5450		05017071	2008	793 /	СЛ	8	олн	сс		8	9	8	8	вл
ЛГ 5634		04017018	2006	793 /	С	7-9	олн	сс		7	9	8	7	вл
ЛГ 5669КЛ		05017069	2008	793 /	СЛ	8	олн	сс		8,5	9	8,5	9	вл
ЛГ 5380		04017016	2006	793 /	С	7-9	олн	сс		7	8	8	7	вл
ЛГ 5635		04017068	2007	793 /	СЛ	9	олн	сс		8	9	9	8	вл
ЛГ 5420		02017020	2005	793 /	СЛ	8	олн	сс		8	8	9	7	вл
ЛГ 5665		02017021	2005	793 /	СЛ	9	олн	сс		8	9	9	8	вл
ЛГ 5660		02017022	2005	793 /	СЛ	8	олн	сс		8	8	9	7	вл
Макао		® 03017019	2006	924 /	С	9	олн	сс		7	9	9	7	вл
НК Роккі		03017046	2006	1079 /	СЛ	8	олн	сс		8	9	9	8	вл
Нікозі		02017042	2005	1079 /	СЛ	9	олн	сс		8	8	9	8	вл
НК Камен		06017006	2008	1079 /	СЛ	9	олн	сс		8,5	9	9	8,5	вл

Сорт				Код	Зона	Характеристики								
						Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	полягання	осипання	хвороб	
НК Мелдімі		04017058	2007	1079 /	СЛ	9	олн	сс		9	9	9	8	вл
НК Кантрі		06017001	2008	1079 /	СЛ	8	вол	сс		9	9	9	8	вл
НК Бріо		01017037	2004	1079 /	СЛ	9	олн	сс		8	8,8	8	8	вл
Оксана		01017017	2003	886 /	СЛ	8	олн	сс		6	8	8	7	вл
Опера ПР		02017005	2005	1079 /	Л	9	олн	сс		9	9	9	8	вл
ПР64А78	®	04017025	2007	767 /	СЛ	9	олн	сс		7,5	9	9	8	вл
ПР64А83		00017001	2002	767 /	Л	8	олн	сс		5	7-9	8	7	вл
ПР64А89		05017001	2008	767 /	СЛ	9	олн	сс		8,5	9	8,5	9	вл
Ригасол		98017026	2001	437 /	Л	8	олн	сс		6	8	8	5	вл
Сольвіда		04017019	2008	793 /	СЛ	8	олн	сс		8	9	8	8,5	
Санай		03017001	2006	1079 /	С	7	олн	сс		8	8	9	8	вл
Трегор		02017023	2005	793 /	С	8	олн	сс		7	8	9	7	вл
Флай		99017003	2001	437 /	СЛ	8	олн	сс		5	7-9	8	7	вл
Харківський 3		90017011	1994	404 / 780	СЛ	5	олн	сс		5	5	7-9	5	вл
Хортиця		92017045	1996	879 / 879	СЛ	7-9	олн	сс		5	7-9	7-9	5	вл
Соя														
Аннушка	®	04018007	2007	416 /	СЛП	7-8	зерн	скс		8	9	9	9	сл
Ворскла		05018012	2008	345 /	СЛ	8	зерн	скс		8	8,5	8,5	9	сл
Діона	®	03018016	2007	411 /	ЛП	7-8	зерн	рс		8	9	9	9	сл
Єлена	®	01018003	2004	345 / 345	СЛП	7-9	зерн	скс		7	7,5	7	8	сл
Знахідка	®	02018001	2005	356 /	СЛП	7-9	зерн	скс		8	7	8	9	сл
КСБ 938		06018001	2008	485 /	СЛ	8	зерн	сс		8	8	9	9	сл
Ксеня		01018002	2004	432 /	СЛП	7	зерн	скс		7	7,5	7,5	8	сл
Устя	®	98018003	2002	345 / 345	П	7-9	зерн	скс		6	6	6	5	сл
Фея	®	01018001	2004	404 / 404	СЛП	7-9	зерн	скс		7	6,5	8	8	сл
Фарватер		05018003	2008	378 /	Л	8	зерн	ср		8	7	9	9	сл
Аметист		94018009	1998	399 / 540	СЛ	6	зерн	рс		5	6	6	5	сл
Алмаз	®	04018013	2007	462 /	Л	7-8	зерн	рс		8	9	9	9	сл
Аполон		99018002	2003	411 /	СЛП	7-9	зерн	рс		7	6	6	5	сл

Сорт				Код	Зона	Характеристики								
						Продук-тивність	Напрям викорис-тання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєст-рації	Заявник / Підтримувач						посухи	поля-гання	осипання	хвороб	
Анжеліка	®	04018010	2007	345 /	ЛП	7-8	зерн	рс		8	9	8	9	сл
Білосніжка		75018001	1981	349 /	СЛ	5	зк	рс		5	5	5	5	сл
Блискавиця		00018006	2004	355 / 378	СЛП	7	зерн	рс		7	8	7	8	сл
Бояна		03018004	2005	879 / 879	СЛП	9	зерн	рс		8	7	8	9	сл
Донька	®	99018005	2003	378 /	СЛ	7-9	зерн	рс		7	6	6	5	сл
Іна		05018021	2008	879 /	С	8	зерн	сс		8	9	9	9	сл
Київська 91		90018016	1996	345 / 345	Л	5	зерн	рс		5	6	5	5	сл
Краса Поділля		94018003	1999	305 /	СЛП	7	зерн	рс		5	6	6	5	сл
Київська 98	®	97018008	2001	345 / 345	ЛП	7	зерн	рс		5	6	6	5	сл
КиВін	®	04018009	2007	305 /	Л	7	зерн	рс		8	8	9	9	сл
Корада	®	03018006	2005	142 /	СЛП	9	зк	рс		8	8	8	9	сл
Лара		03018001	2005	879 / 879	СЛП	9	зерн	рс		8	8	8	9	сл
Медея		94018005	1998	356 /	СЛ	6	зерн	рс		6	5	5	5	сл
Мрія		95018001	1999	404 / 404	СЛ	7	зерн	рс		6	6	6	5	сл
ОАЦ-Віжіон	®	03018007	2006	142 /	Л	9	харч/корм	рс		8	8	8	9	сл
Протеїнка		03018003	2005	879 / 879	СЛП	9	зерн	рс		8	8	8	9	сл
Прип'ять	®	03018017	2007	1001 /	ЛП	7-8	зерн	рс		8	9	9	9	сл
Романтика		94018008	1998	404 / 404	СЛ	7	зерн	рс		6	6	6	5	сл
Скеля	®	03018014	2007	404 /	Л	7-8	з/к	ср		8	8	9	9	сл
Седміца		03018002	2005	879 / 879	СЛП	9	зерн	рс		8	7	8	9	сл
Святкова		02018004	2005	736 /	СЛП	7-9	зерн	рс		8	8	7	9	сл
Фаетон		95018002	2000	411 /	СЛП	7	зерн	рс		6	6	5	5	сл
Юг 30		87018007	1990	411 /	СЛП	5	зк	рс		6	5	5	5	сл
Ювілейна	®	02018002	2005	356 /	СЛП	9	зерн	рс		8	7	8	9	сл
Ясельда		01018004	2005	1001 /	СЛП	9	зерн	рс		8	8	7	8	сл
Артеміда		97018003	2001	399 /	С	7	зерн	ср		6	6	6	5	сл
Аркадія одеська		83018001	1986	378 / 378	С	5	зерн	ср		7-9	5	5	5	сл
Берегиня	®	99018001	2002	378 /	С	7	зерн	ср		7	6	6	5	сл
Валюта		97018002	2001	356 /	С	7	зерн	ср		5	6	6	5	сл

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач					посухи	поляган ня	осипання	хвороб	
Валентіа		00018008	2003	355 / 378	СЛ	7-9	зерн	ср	7	6	6	5	сл
Васильківська		00018007	2003	378 / 345, 378	СЛП	7-9	зерн	ср	7	6	6	5	сл
Версія	®	04018015	2007	404 /	ЛП	7-9	зерн	ср	8	7	9	9	сл
Вілана		04018005	2007	16 / 1112	СЛ	7-9	зерн	ср	9	8	9	9	сл
Величава	®	04018014	2007	404 /	ЛП	7-8	зерн	ср	8	9	9	9	сл
Горлиця	®	03018012	2006	950 /	СЛП	7-9	зерн	ср	8	8	8	9	сл
Горизонт	®	98018002	2002	404 / 404	С	7-9	зерн	ср	6	7	6	5	сл
Дельта		04018004	2007	16 / 1112	Л	9	зерн	ср	8	7	9	9	сл
Ентерпрайс		06018004	2008	749 /	Л	9	зерн	ср	8	8,5	9	9	сл
Ельдорадо	®	02018003	2005	378 /	СЛП	9	зерн	ср	8	7	8	9	сл
Золотиста		00018005	2004	305 /	СЛП	7-9	зерн	ср	7	8	8	8	сл
Іванка		91018001	1996	345 /	Л	5	зерн	ср	5	6	6	5	сл
Ізумрудна		90018004	1995	356 /	С	5	зерн	ср	6	5	5	5	сл
Київська 27		86018003	1990	345 / 345	ЛП	5	зк	ср	5	5	5	5	сл
Медісон		06018006	2008	749 /	ЛП	9	зерн	ср	8,5	9	8	9	сл
Офелія		05018002	2003	329 / 329	С	7	зерн	ср	7	6	6	5	сл
Особлива	®	03018010	2006	950 /	ЛП	7-9	зерн	ср	8	8	8	9	сл
Омега вінницька	®	04018008	2007	305 /	Л	7	зерн	ср	8	8	8	9	сл
Оксана		97018004	2001	411 /	С	7	зерн	ср	6	6	6	5	сл
Оріана		98018001	2002	305 /	С	7	зерн	ср	6	6	6	5	сл
Прикарпатська 96		97018005	2001	330 /	С	6	зерн	ср	5	6	6	5	сл
Подільська 416	®	96018003	2001	950 /	Л	7	зерн	ср	5	6	6	5	сл
Равніца		03018005	2005	879 / 879	СЛП	9	зерн	ср	8	8	8	9	сл
Східна		00018002	2004	404 / 404	СЛП	7-9	зерн	ср	7	8	7	8	сл
Супра	®	03018008	2006	142 /	СЛП	9	харч/корм	ср	9	9	8	9	сл
Сонячна		92018005	1997	329 / 329	СЛ	5	зерн	ср	6	6	5	5	сл
Стратегія	®	00018003	2004	950 /	СЛП	7-9	зерн.	ср	7	8	8	7	сл
Спринт		99018003	2003	329 / 329	СЛ	7	зерн	ср	6	6	6	5	сл
Таврія		05018016	2008	879 /	СЛ	8	зерн	ср	8	9	9	9	сл

Сорт				Код	Зона	Характеристики								
						Продук-тивність	Напрям використ-тання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєст-рації	Заявник / Підтримувач						посухи	поля-гання	осипання	хвороб	
Харківська зернокормова		90018003	1994	404 / 404	СЛП	5	зк	ср		6	6	5	5	сл
Чернівецька 9		96018002	2001	432 /	СЛ	7	зерн	ср		5	6	6	5	сл
Юг 40		83018013	1987	411 /	С	5	зк	ср		6	5	5	5	сл
Ятрань	®	03018009	2006	378 /	СЛП	7-9	зерн	ср		9	8	9	9	сл
Агат		94018017	2000	399 /	СЛ	7	зерн	сс		5	6	6	5	сл
Анатоліївка		97018007	2001	305 /	С	7	зерн	сс		6	5	6	5	сл
Витязь 50		88018009	1992	411 /	С	5	зерн	сс		5	5	5	5	сл
Вінничанка	®	03018011	2006	950 /	ЛП	7-9	зерн	сс		9	8	8	8	сл
Деймос		94018002	1998	411 /	С	7	зерн	сс		6	6	5	5	сл
Колбі		06018003	2008	749 /	Л	8	зерн	сс		8	8	9	9	сл
Мар'яна		94018001	1999	345 / 378	П	7	зерн	сс		6	5	6	5	сл
Маша	®	03018013	2006	329 /	ЛП	7-9	зерн	сс		9	9	8	8	сл
Мельпомена	®	04018012	2007	378 /	Л	9	зерн	сс		8	7	9	9	сл
Одеська 150А		97018011	2001	378 / 378	ЛС	7	зерн	сс		6	6	6	5	сл
Подолянка		94018004	1999	950 /	П	7	зерн	сс		5	6	6	5	сл
Подільська 1		92018017	1997	417 /	СЛ	5	зерн	сс		6	5	5	5	сл
Срібна		99018004	2003	329 / 329	СЛ	7	зерн	сс		6	6	6	6	сл
Феміда		00018004	2004	305 /	СЛ	5	зерн	сс		7	8	8	7,5	сл
Чернівецька 8		89018019	1994	432 /	Л	5	зерн	сс		5	5	6	5	сл
Ріпак озимий														
Аліот	®	04016003	2007	350 /	СЛП	7-9-	олн		8-8,5	7,9-8,7	8,3-9,0	8,0-8,9	8,9	00
Артус	®	03016004	2006	912 / 912	СЛП	5	олн		8	8	9	8	8	00
Анна		02016011	2007	329 /	Л,П	8-9	олн		8,0	8,5	8,6	7,5-8,4	8,4-9,0	00
Антарія		03016002	2006	306 /	СЛП	5	олн		9	9	8	8	6	00
Вектра	®	04016004	2007	1213 /	Л,П	8-9	олн		7,8-8,3	8,5-8,8	8,7-8,8	7,8-8,0	9,0	00
Геліо		01016002	2005	423 /	СЛП	9	олн		8,7	8,5	9	9	9	00
Дембо		01016001	2005	332 /	СЛП	9	олн		8,5	8	8,7	9	8,7	00
Джеспер		04016006	2008	934 /	Л	8	олн		8	9	9	8	9	00
Декатлон		05016019	2008	934 /	Л	8	олн		8	9	9	7	9	00

Сорт				Код	Зона	Характеристики								
						Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляган ня	осипання	хвороб	
ЕС Астрід		03016008	2006	806 /	СЛП	5	олн		8	9	8	8	6	00
Київський 18		75016001	1982	348 /										
Контакт		97016018	2001	437 /	ЛП	7	олн		7,5	7	8	7,8	9	00
Ландар		01016003	2005	350 /	СЛП	9	олн		8,5	8,7	8,6	8,7	9	00
Митницький 2		73016002	1998	350 /	П	5	тхн		5	7	7	5	5	++
НПЦ 9800	®	00016004	2005	912 / 912	СЛП	9	олн		9	9	9	9	9	00
Нельсон		05016018	2008	1079 /	ЛП	9	олн		8-9	9	9	8	9	00
Опус		04016005	2008	519 /	Л	7	олн		8	8,5	9	8	9	00
ПР46В31		05016005	2008	767 /	Л	9	олн		8	9	9	7	9	00
Сенатор Люкс		02016008	2006	345 /	П	5	олн		8	8	8	8	8	00
Таурус	®	04016007	2007	912 / 912	Л,П	8-9	олн		7,8-8,3	8,5-8,8	8,8-9,0	7,8-8,0	8,5-9,0	00
Токата		05016016	2008	1079 /	ЛП	9	олн		8-9	8	9	8	9	00
Тітан	®	03016005	2006	912 / 912	СЛП	5	олн		9	8	9	8	7	00
Трабант	®	03016006	2006	912 / 912	СЛП	5	олн		9	8	9	9	9	00
Чемпіон України		02016009	2006	345 /	ЛП	5	олн		8	8	8	8	8	00
Атлант		97016010	2001	329 / 329	Л	7	олн		7	>5	>5	5	7	00
Бажаний		94016001	1998	306 /	Л	5	олн		5	>5	>5	>5	7	0
Валєска		94016002	2001	926 /	Л	7	олн		7	7	5	7	7	00
Вотан		92016008	1997	912 /	П	7	олн		7	>5	7	7	>5	00
Галицький		92016004	1997	332 /	СЛ	7	олн		7	5	7	5	5	0
Горизонт		92016002	1997	306 /	СЛ	5	олн		7	>5	>5	>5	5	00
Горинський		99016023	2003	1115 /	СЛП	7	олн		7	7	7	5	7	00
Гібрид соколівський		97016009	2001	350 /	Л	5	олн		5	5	5	5	5	0
Дангал		97016013	2001	332 /	ЛП	7	олн		>5	>5	5	5	7	00
Елвіс		98016012	2001	806 /	ЛП	7	олн		7-9	7	7	>5	7	00
Еліт		98016013	2002	806 /	СЛП	7	олн		7	7	7	7	7	00
Ксаверівський		90016006	1995	350 /	ЛП	5	олн		5	>5	5	>5	5	0
Кронос	®	99016019	2003	912 /	СЛП	9	олн		9	7	7	7	7	00
Капітоль		97016017	2001	437 /	Л	7,5	олн		8	8	8	8,5	9	00

Сорт				Код	Зона	Характеристики								
						Продук-тивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поля-гання	осипання	хвороб	
Ліраджет		92016011	2001	807 /	П	7	олн		7	7	>5	>5	7	00
Лібеа	®	98016022	2001	807 /	П	7	олн		7	7	7	>5	7	00
Надія		99016011	2003	350 /	СЛП	7	олн		>5	>5	>5	>5	7	00
Оділа		99016012	2002	946 /	Л	7	олн		7-9	7	>5	>5	7	00
Ранок Поділля		97016023	2002	306 / 791	ЛП	7	олн		7-9	>5	>5	7	7	00
Свєта		88016008	1995	332 /	ЛП	5	олн		5	>5	>5	5	>5	00
Світоч		90016017	1995	306 / 791	ЛП	5	олн		5	5	7	>5	5	00
Тисменицький		84016001	1989	332 /	СЛП	7	оли		7	>5	>5	>5	>5	00
Федорівський поліпшений		92016015	1998	350 /	СЛ	5	олн		>5	7	>5	>5	5	0
Чорний велетень		97016022	2002	306 / 791	ЛП	7	олн		7	>5	7	7	7	00
Ріпак ярий														
Абіліті	®	04016001	2006	807 /	ЛП	6	олн		9	8	9	9	9	00
Айдар		02016006	2006	736 /	ЛП	5	олн		7	8	9	8	9	00
Аріон		91016002	1996	332 /	Л	7-9	олн		7	7	7	7	7	00
Аіра		03016003	2005	306 /	СЛП	9	олія		9	9	9	9	9	00
Байкал	®	98016002	2001	912 / 912	ЛП	7-9	олн		7-9	9	9	9	9	00
Болеро		97016004	2001	926 /	П	7-9	олн		7-9	7	9	9	7	00
ВНІС 100		01016004	2004	736 /	ПЛ	7	олн		7	7-9	9	9	9	00
Герос	®	04016009	2006	1213 /	ЛП	5	олн		9	9	9	8	9	00
Гайдн	®	03016013	2006	912 / 912	ЛП	5	олн		9	9	9	8	9	00
Добробут		01016005	2004	736 /	ПЛ	7	олн		7	9	9	7-9	9	00
Клітинний 1		91016009	1996	350 /	СЛП	5	олн		5-7	5	7	5	7	00
Калинівський		90016015	1994	350 /	СЛП	5-7	олн		5	5	7	5-7	7	00
Кліфф	®	00016005	2003	912 / 912	СЛП	9	олн		7-9	9	9	9	9	00
Квантум		97016003	2001	926 /	Л	7-9	олн		7	7-9	7	7	7	00
Клітинний 8		95016001	2000	350 /	ЛП	5-7	олн		5	5	5-7	7	7	00
Ліколли		95016002	2000	807 /	П	7-9	олн		7-9	7-9	9	9	9	00
Ліга		97016014	2001	332 /	П	5-7	олн		5	5	7	7	7	00

Сорт				Код	Зона	Характеристики								
						Продук-тивність	Напрям викорис-тання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєст-рації	Заявник / Підтримувач						посухи	поля-гання	осипання	хвороб	
Лужок		98016005	2003	332 /	СЛП	5-7	олн		5-7-	7	7	9	9	00
Микитинецький		92016017	1997	332 /	СП	6,5	олн		5	5	5	5-7	7	00
Марія		99016018	2003	1106 /	СП	7-9	олн		7-9	7-9	7-9	9	9	00
Магнат		02016007	2005	345 / 345	СЛП	8,6	олн		9	8,7	8,6	9	9	00
Отаман		94016026	1999	329 / 329	С	7-9	олн		7	7	7-9	7	7-9	00
Ольга	®	97016005	2001	912 / 912	П	7-9	олн		7-9	9	9	9	9	00
Обрій		03016012	2006	329 /	ЛП	5	олн		7	8	9	8	9	00
Оксамит		99016017	2003	1106 /	СП	5-7	олн		7	7	9	9	9	00
Отма	®	03016010	2006	350 /	ЛП	5	олн		7	9	9	8	9	00
РГС 003/Сари/	®	04016008	2006	1213 /	ЛП	5	олн		9	9	9	9	9	00
Сіріус	®	03016009	2006	350 /	ЛП	5	олн		7,5	8	9	9	8-9	00
Сріблястий 1	®	03016011	2007	350 /	С,Л,П	8-9	олн		8	8,5	8,5	8,5	9,0	00
Сієста F1	®	99016009	2002	912 / 912	СЛП	7-9	олн		7-9	9	9	9	9	00
Терра	®	99016010	2002	912 / 912	СЛП	9	олн		7-9	9	9	9	9	00
Форте		87016003	2001	938 /	Л	7-9	олн		5-7	7	9	9	7	00
Фаворит		99016022	2003	1115 /	П	7	олн		7	7-9	9	7	9	00
Юра		05016028	2008	806 /	Л	6	олн		7	8	8	8	9	00
Янтарь		79016003	1984	348 /										
Льон кудряш														
Айсберг		00094001	2001	329 / 329	СЛ	8	олн			7	8	7	7	
Блакитно помаранчевий	®	06094002	2007	345 /	СЛП	8	олн			7	8	8	9	
ВНІІМК 620		05094002	2007	16 / 1112	СЛП	8	олн			7	8	8	7	
Дебют		99094002	2001	329 / 329	СЛ	8	олн			7	8	8	7	
Еврика		03094001	2004	345 / 345	СЛП	7	олн			8	9	8	7-9	
Золотистий		03094002	2005	329 /	СЛ	8	олн			7	5	7	8	
Ківіка	®	05094003	2007	329 /	С	8	олн			7	7	8	8	
Лірина		00094002	2002	807 /	СЛ	7-9	олн			7	8	8	7	
Надійний	®	06094001	2007	216 /	СЛ	8	олн			8	8	8	9	
Орфей		00094004	2002	329 / 329	СЛ	8	олн			7	8	8	7	

Сорт				Код	Зона	Характеристики								
						Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	полягання	осипання	хвороб	
Південна ніч		99094001	2001	329 / 329	СЛ	8	олн			7	8	8	7	
Славний	®	05094001	2006	329 /	С	8	олн			7	7	8	8	
Симпатик	®	06094003	2007	345 /	СЛП	8	олн			8	8	8	9	
Рижій ярий														
Гірський		97097001	2000	332 /	СЛ	7	олн			6	8	8	6	
Клондайк		03097001	2004	345 / 345	СЛ	7	олн			8	9	9	7	
Міраж		94097001	2000	329 / 329	СЛП	7	олн			6	8	8	6	
Престиж	®	05097001	2006	329 /	СЛП	7	олн			8	7	7	8	
Степовий 1		92097001	1996	329 / 329	СЛП	5	олн			5	7	7	5	
Гірчиця сарептська														
Мрія		94144003	2000	329 / 329	СЛ	7	олн			6	8	8	7	
Роксолана		94144002	1999	332 /	С	5	олн			6	7	7	5	
Ракета		05144002	2008	16 /	СЛ	8	олн			8	7	7	8	
Росава		94144001	1999	348 /	С	5	олн			6	7	7	5	
Світлана		03144003	2005	329 /	СЛ	7	олн			7	7	5	7	
Тавричанка		92144001	1996	329 / 329	СЛ	5	олн			5	7	7	5	
Чорнява		04144004	2006	466 /	СЛ	7	олн			8	7	7	7	
Гірчиця біла														
Еталон		03092001	2004	345 / 345	СЛП	7	олн,сд			7	9	8	8	
Кароліна		90092002	1994	305 /	СЛП	5	олн			6	7	8	5	
Підпечерецька		94092001	2000	332 /	Л	8	олн			5	7	8	6	
Талісман		94092002	2000	329 / 329	ЛП	7	олн			6	8	7	5	
Юлія		02092001	2003	1115 /	СЛП	8	олн			6	8	8	6	
Рицина														
Олеся		00098002	2001	329 / 329	СЛ	7	олн			6	8	8	6	
Хортицька 1		92098002	1996	329 / 329	С	5	олн			6	7	8	6	
Хортицька 3		98098001	2001	329 / 329	СЛ	7	олн			6	7	8	6	
Хортичанка		00098001	2001	329 / 329	СЛ	7	олн			6	7	8	6	

Сорт				Код	Зона	Характеристики								
						Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	полягання	осипання	хвороб	
Мак														
Беркут		92095001	1996	332 /	СЛ	5	олн			5	6	7	5	боп
Вікторія		04095003	2005	1115 /	СЛП	8	олн			7	7	9	8	боп
Грей	®	05095004	2006	583 /	Л	7	олн			7	7	9	8	боп.
Європейський	®	05095002	2007	711 /	ЛП	8	олн			8	8	7	8	боп
Жар	®	05095008	2006	329 /	С	7	озл.			7	8	9	9	
Камея	®	05095007	2007	711 /	ЛП	8	олн			7	8	7	8	боп
Кристал		99095002	2002	389 / 389, 329	СЛ	5	олн			6	7	7	5	боп
Кривотульський		99095007	2001	1115 /	СЛ	7	олн			6	7	8	6	боп
Корал		97095001	2001	329 / 389, 329	СЛ	6	олн			5	7	8	5	боп
Колорит	®	05095009	2006	329 /	СЛ	7	олн			7	8	9	8	боп
Меркурій		04095001	2005	1115 /	СЛП	8	олн			7	7	9	9	боп
Марс		99095006	2002	1115 /	СЛ	7	олн			6	7	8	6	боп
Поділля	®	05095003	2006	583 /	Л	8	олн			7	7	9	7	боп.
Скорпіон		04095002	2005	1115 /	СЛП	7	олн			9	9	9	8	боп
Спартак		04095004	2005	1115 /	СЛП	8	олн			7	7	9	7	боп
Сатурн		99095004	2002	1108 /	ЛП	7-9	лік			8	8	9	7	
Тарновецький		99095005	2001	1115 /	СЛ	7	олн			6	7	8	6	боп
Уран		99095008	2002	1115 /	СЛ	7	олн			6	7	8	6	боп
Франківський		99095003	2001	1115 /	СЛ	7	олн			6	7	8	6	боп
Шарго	®	05095010	2007	654 /	ЛП	8	олн			8	8	7	8	боп
Юпітер		99095009	2001	1115 /	СЛ	7	олн			6	7	8	6	боп
Ямгорів		01095001	2006	332 /	ЛП	8	олн.конд.			7	8	8	7	боп.
Арахіс														
Валар	®	06091001	2007	29 /	СЛП	9	олн,х			9	9		8	
Клинський		97091001	2002	410 /	С	5	олн,конд			7	7	7-9	5	
Лінар 90	®	06091002	2007	29 /	СЛП	8	олн,х			9	9		8	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продук-тивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поля-гання	осипання	хвороб	
Кунжут індійський													
Боярин	® 05093002	2006	329 /	С	8	олн			7	9	8	7	
Гусар	® 05093001	2006	329 /	С	8	олн			7	9	8	8	
Ілона	® 05093003	2006	329 /	С	8	олн			7	9	8	7	
Кадет	® 05093004	2006	329 /	С	7	олн			7	9	6	7	
Надія	98093001	2001	329 / 329	ЛС	7	олн			7	8	7	5	
Суріпиця озима													
Оріана	02145001	2003	348 /	СЛП	7	олн		>5	7	7		7	
Суріпиця яра													
Горянка	98145002	2001	332 /	П	7	олн			6	7	8	5	
Льон-довгунець													
Батист	® 05015001	2007	345 /	П	7	пряд			7	8	8	8	
Вручий	03015001	2007	345 /	П	8	пряд			7	8	8	8	
Глухівський ювілейний	92015003	1996	393 / 393	ЛП	5	пряд	сс		5	7	7	5	
Глазур	01015001	2005	393 /	П	8	пряд	рс		7	8	8	8	
Гладіатор	05015004	2008	393 /	П	7	пряд	рс		8	8	8	8	
Глобус	05015003	2008	393 /	П	7	пряд	рс		7	8	8	7,5	
Зоря 87	82015001	1988	371 /	Л	5	пряд	пс		5	6	6	5	
Ірма	95015001	1999	320 /	П	6	пряд	ср		5	7	7	5	
Київський	79015001	1991	345 / 345	П	5	пряд	ср		5	6	6	5	
Каменяр	99015001	2003	371 /	П	7	пряд	ср		6	7	7	5	
Могильовський 2	88015004	1993	454 / 461	П	5	пряд	пс		5	6	6	5	
Персей	94015001	1999	320 /	ЛП	6	пряд	рс		5	7	7	6	
Рушничок	97015001	2000	345 / 345	ЛП	7	пряд	рс		5	7	7	5	
Синільга	91015001	1995	320 /	П	5	пряд	сс		5	6	6	5	
Український ранній	94015002	1999	345 / 345	ЛП	6	пряд	рс		5	7	7	5	
Український 3	92015001	1997	345 /	ЛП	5	пряд	сс		5	6	6	5	
Чарівний	92015002	1996	393 / 393	ЛП	5	пряд	сс		6	6	7	5	

Сорт				Код	Зона	Характеристики								Якість
						Продук-тивність	Напрям викорис-тання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				
Назва	Вид	Номер	Рік реєст-рації	Заявник / Підтримувач						посухи	поля-гання	осипання	хвороб	
Борец	®	04015004	2007	461 /	П	7	пряд	ср		7	8	8	8	
Глінум		00015002	2004	393 / 393	ЛП	7-9	пряд.	ср		7	8	8	7-9	
Довіра	®	04015003	2007	461 /	П	7	пряд	ср		7	8	8	8	
Ліра		02015002	2005	320 / 320	П	7	пряд	ср		7	8	8	8	
Прамень	®	04015002	2007	461 /	П	7	пряд	ср		7	8	8	8	
Світанок		00015001	2004	320 /	ЛП	7-9	пряд.	ср		7	8	8	7-9	
Коноплі														
Глухівські 33		92014001	1997	393 / 393	Л	7	пряд			6	7	7	5	
Глухівські 46		97014001	2000	393 / 393	Л	7-9	пряд			7	7	7	5	
Гляна	®	05014001	2007	393 /	ЛП	8	пряд			9	9	7	8	
Глера	®	01014001	2004	393 / 393	ЛП	7-9	пряд.			8	7	7	7	
Дніпровські однодомні 14		91014001	1995	393 /	Л	5	пряд			7	7	7	5	
Золотоніські 15		94014002	1998	393 / 393	Л	5	пряд			7	7	7	5	
Золотоніські однодомні 11		79014001	1984	393 / 393	Л	5	пряд			5	7	7	5	
Зоряна	®	05014002	2007	393 /	Л	9	пряд			9	9	8	8	
ЮСО 14		75014001	1981	393 / 393	Л	5	пряд			5	7	7	5	
ЮСО 31		82014002	1987	393 / 393	Л	5	пряд			7	7	7	5	
Бавовник														
Валент	®	06366002	2007	29 /	С	7	пряд			9	9		7	
Дніпровський 5		97366001	2001	411 /	С	5	пряд			7	7-9	7	7	
Підозерський 4	®	03366001	2007	411 /	С	7	пряд			9	9		8	
Рейкот 22	®	06366001	2007	29 /	С	7	пряд			9	9		7	
Гірчиця сарептська озима														
Аннушка		04144002	2006	329 /	СЛП	8	олн		7	8	8	8	9	
Венера		04144003	2006	329 /	СЛП	8	олн		7	8	6	8	8	
Деметра	®	04144001	2005	329 / 329	СЛ	8	олн		7	7	7	5	8	
Новинка		02144001	2004	329 / 329	ЛСП	9	олн		7	8	9	9	7	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач					посухи	поляг-ання	осипання	хвороб	
Романтика		03144002	2005	345 / 345	СЛП	8	олн	7	7	9	7	9	
Гірчиця чорна													
Софія		05428001	2006	332 /	ЛП	8	олн		8	7	6	6	
Смикавець їстівний (Чуфа)													
Новинка		05436001	2006	329 /	С	8	олн., х		8	9		8	
Сільськогосподарські: буряк													
Буряк цукровий													
Аратта		94013096	2001	736 /	ЛП	8	уц					5-7	сц
Акку		04013015	2008	829 /	Л	8	уц					7	сц
Аббатіса		00013030	2003	736 /	СЛП	9	уц					5-7	сц
Аватар		94013095	1999	736 /	ЛП	8	уц					5-7	сц
Аспікард		02013028	2006	334 /	С	9	уц					6-9	сц
Атаманша		04013026	2008	1086 /	СП	9	уц					6	сц
Авторитетний		02013030	2006	736 /	СЛП	9	уц					6-9	сц
Ахат		02013034	2006	829 /	СЛП	9	ц					6-9	сц
Арій 1		98013056	2002	736 /	Л	8	уц					5-7	сц
Анічка		00013019	2003	334 /	ЛП	8	уц					7	сц
Білоцерківський ЧС 90		94013093	1999	335 / 334	СЛ	8	уц					5-7	сц
Бакара		04013012	2007	743 /	СЛП	8	уц					5-7	ср
Борута		03013022	2007	1086 /	СЛП	9	у					6-7	сц
Білоцерківський ЧС 57		91013011	1995	335 / 334	Л	7	уц					5-7	сц
Білоцерківський однонасінний 45		79013001	1984	335 / 334	П	8	уц					5-7	сц
БТС 903 УА		99013001	2002	1032 /	Л	8	уц					5-7	сц
Верхняцький ЧС 63		91013004	1996	422 / 334	Л	7	уц					5-7	сц
Веселоподолянський однонасінний 29		71013002	1979	388 / 334	СЛП	8	уц					5	сц
Венчац		05013016	2008	879 /	П	9	уц					5-6	сц

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач					посухи	поляган-ня	осипання	хвороб	
Ворскла		00013013	2003	334 /	ЛП	9	уц					7	сц
Весто		98013049	2001	1082 /	Л	8	уц					5-7	сц
Вінцент		03013012	2007	829 /	СЛП	8	уц					6	сц
Галина		92013006	1998	334 /	ЛП	8	уц					5-7	сц
Гранате		05013003	2008	504 /	ЛП	9	уц					6-7	сц
Гезіна		04013021	2008	938 /	СЛ	8	уц					6	сц
Галактік		05013014	2008	539 /	СЛП	8	уц					5-7	сц
Газета		03013016	2007	1086 /	СЛП	6	у					6-7	сц
Галілео		03013002	2006	1032 /	СЛП	9	уц					6-9	сц
Доброслава		03013024	2006	230 /	СЛП	9	цу					6-9	сц
Дана		92013097	1997	879 / 879	Л	7	уц					5-7	сц
Джорджина		00013037	2004	938 /	СЛП	9	уц					7-8	вц
Дануб		05013029	2008	796 /	ЛП	9	уц					5-8	сц
Делеіта		03013023	2007	1086 /	СЛП	7	уц					6-7	сц
Двіна		97013002	2001	743 /	ЛП	8	уц					5-7	сц
Етюд		02013026	2006	334 /	С	8	уц					6-9	сц
Еквінокс		02013038	2006	938 /	СЛП	9	уц					6-9	сц
Елоді		99013034	2002	796 /	П	8	цукр					5-7	вц
Євгенія		01013024	2005	938 /	СЛП	9	уц					7-9	сц
Зорина		05013013	2008	539 /	СЛП	8	уц					6-8	сц
Золеа		04013019	2008	829 /	СЛП	8	уц					6-8	сц
Зоряний		03013025	2007	230 /	СЛП	8	уц					6-7	сц
Іванівсько-Веселоподільський ЧС 84		95013002	1999	394 / 334	ЛП	8	уц					5-7	сц
Імперіал		05013001	2008	788 /	СЛ	8	уц					6-8	сц
Іванівський ЧС 33		87013002	1993	394 / 334	ЛП	8	уц					5-7	сц
Імпакт		04013011	2008	743 /	Л	8	ц					8	вц
Константа		01013015	2004	334 /	СЛП	9	уц					8	вц

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач					посухи	поляг-ання	осипання	хвороб	
Ківа		92013063	1997	938 /	СЛП	9	уц					5-7	сц
Куявська		01013017	2003	884 /	СЛП	9	уц					7	сц
Кобра		94013024	1999	829 /	П	8	уц					5-7	сц
Кубанський ЧС 36		88013002	1995	736 /	СЛ	8	уц					5-7	сц
КВ Ялтушків		94013049	1999	938 /	СЛП	9	уц					5-7	сц
Кармеліта		04013020	2007	938 /	СЛП	9	уц					6-7	вц
Каньйон		05013002	2007	743 /	СЛП	9	уц					7-8	вц
Каверось		94013005	1998	938 /	Л	8	уц					5-7	сц
Крокодил		02013016	2005	743 /	СЛП	9	ур					7-9	сц
КВ-Збруч		98013036	2001	1082 /	Л	8	уц					5-7	сц
Класика		03013010	2007	938 /	ЛП	7	уц					6	сц
Казино		01013030	2007	788 /	СЛП	8	у					8	сц
Леонарда		04013022	2008	938 /	СЛП	9	уц					6-7	сц
Лангуста		04013023	2008	1086 /	СЛП	9	ц					6-8	вц
Лавінія		02013037	2006	938 /	СЛП	9	уц					6-9	сц
Лєнора		98013064	2002	938 /	СЛП	9	уц					5-7	сц
Ліберо		03013015	2007	829 /	СЛП	8	уц					6-7	сц
Люміна		03013003	2006	796 /	СЛ	9	уц					5-9	сц
Модус		04013017	2008	829 /	Л	7	уц					8	сц
Максим		01013004	2004	334 /	СЛП	8-9	уц					7-8	вц
Мілан		02013033	2006	829 /	СЛ	9	уц					5-9	сц
Мерак		02013035	2006	829 /	ЛП	9	уц					6-9	сц
Мозаік		03013014	2007	829 /	СЛП	7	уц					6	сц
НМ 7163 Рз		04013025	2008	1086 /	ЛП	8	уц					6-7	сц
Настя		03013009	2007	938 /	ЛП	7-8	уц					6-7	сц
Олександрія		92013058	1997	394 / 334	ЛП	8	уц					5-7	сц
Орікс		88013012	1993	743 /	ЛП	8	уц					5-7	сц
Орегон		03013001	2005	1032 /	СЛП	9	уц					6-9	сц
Ольжич		02013027	2006	334 /	СЛ	8	уц					6-9	сц

Сорт				Код	Зона	Характеристики								
						Продук-тивність	Напрям викорис-тання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєст-рації	Заявник / Підтримувач						посухи	поля-гання	осипання	хвороб	
Портланд		05013007	2007	504 /	СЛП	9	уц						6-8	вц
Пірат		99013049	2003	829 /	ЛП	8	уц						5-7	сц
Ризольт	®	04013010	2007	334 /	С	6	уц						5	сц
Роберта		95013017	2000	938 /	ЛП	8	уц						5-7	сц
Резімакс		04013030	2008	796 /	СП	8	уц						5-6	сц
Ремос		04013018	2008	829 /	СЛ	8	уц						6-8	сц
Ромул		02013009	2005	334 /	СЛП	8	уц						5-9	сц
Слов'янський ЧС 94		88013017	1992	304 / 334	ЛП	8	уц						5-7	сц
Сара		00013033	2004	879 / 879	СЛП	9	цукр						8	вц
Софія		01013011	2004	334 /	СЛ	8	уц						7-8	сц
Севастьянівський		02013010	2005	334 /	СЛП	8	уц						5-9	сц
Смарагд		02013023	2006	653 /	СЛ	9	уц						6-9	сц
Стабіла		03013006	2006	796 /	СЛ	9	уц						6-9	сц
Свіфт		98013060	2002	743 /	ЛП	8	уц						5-7	сц
Серенаде		97013008	2001	1032 /	Л	7	уц						5-7	сц
Сніжана		03013011	2007	938 /	ЛП	8	уц						6-7	сц
Травіата		03013021	2007	1086 /	СЛП	7	цукр						6	сц
Уладівський однонасінний 35		73013005	1979	304 / 334	П	7	уц						5	сц
УЛВ ЧС 37		88013003	1993	304 / 334	Л	7	уц						5-7	сц
Уманський ЧС 90		99013045	2003	334 /	СЛП	9	цукр						5-7	вц
Уладівський ЧС 35		98013058	2002	736 /	Л	8	уц						5-7	сц
Український ЧС 72		99013030	2002	334 / 334	Л	8	уц						5-7	сц
Уманський ЧС 97		99013044	2003	334 /	ЛП	8	цукр						5-7	вц
Фертіла		03013004	2006	796 /	СЛ	9	уц						5-9	сц
Хамбер		05013005	2007	504 /	СЛП	9	уц						6-7	вц
Хеліта		04013024	2008	1086 /	СЛП	9	уц						6-8	сц
Шаннон		05013004	2008	504 /	СЛП	9	уц						6-7	сц
Шевченківський		99013023	2002	334 / 334	СЛ	8	ур						5-7	сц

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляг-ання	осипання	хвороб	
Юстіна	02013036	2006	938 /	ЛП	9	уц						6-9	сц
Ялтушківський ЧС 72	92013108	1997	872 /	ЛП	8	уц						5-7	сц
Яміра	92013098	1997	884 /	СЛ	8	уц						5-7	сц
Ялтушківський однонасінний 64	94013001	1992	303 / 334	Л	7	уц						5-7	сц
Яриса	04013027	2007	884 /	СЛ	7	ур						6-8	ср
Япола	04013028	2007	884 /	СЛ	7	ур						6-7	ср
Буряк кормовий													
Адра	97046004	2001	736 /	Л	7	корм						8	
Болеро	90046012	1993	713 /	СЛП	9	корм						8	
Бізон Полі	05046002	2007	598 /	слп	9	корм						8	
Галицький	00046002	2004	371 /	СЛП	8	корм						7-8	
Дністер	05046003	2008	330 /	П	7							5	
Дарина	99046001	2003	345 / 345	Л	7	корм						7	
Екендорфський жовтий	37046003	1947	812 / 330	СЛП	8-9	корм						7-8	
Кракус	95046008	1999	991 /	С	8	корм						7-8	
Козіма	95046004	1999	938 /	С	7	корм						8	
Київський	72046001	1979	345 / 345	ЛП	8	нц						8-9	
Кірос	97046001	2000	788 /	Л	8	нц						7-8	
Кацпер	02046001	2005	991 /	СЛП	8	корм						7-9	
Львівський жовтий	72046002	1977	371 /	СЛП	9	корм						8	
Полтавський білий	58046001	1959	387 /	СЛП	8-9	корм						7	
Переможець	40046001	1947	387 /	СЛП	9	корм						7	
Полтавський 71	90046010	1995	387 /	СЛП	9	корм						6-8	
Полтавський напівцукровий	82046001	1985	387 /	ЛП	8	нц						7-8	
Рекорд-Полі	95046007	2000	991 /	СЛП	8	корм						8	
Селена	94046005	2000	345 / 345	Л	7	корм						8	
Сонет	00046001	2004	334 / 345	СЛП	8	корм						7-8	

Сорт				Код	Зона	Характеристики								
						Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляган ня	осипання	хвороб	
Солідар		02046002	2004	991 /	СЛП	8	корм						7-9	
Тамара		92046001	1999	938 /	С	8	корм						7	
Урсус Полі		95046009	1999	991 /	С	8-9	корм						7-8	
Центаур Полі		95046010	1999	991 /	СЛ	9	нц						8-9	
Сільськогосподарські: картопля														
Картопля														
Астерікс		91031009	1996	738 /	СЛП	7	стл	рс	5	5			9	вкр
Адретта		77031007	1985	1011 /	П	9	стл	ср	5	5			5	вкр
Аноста		94031010	1999	741 /	ЛП	7	тхст	рс	5	5			5	скр
Альвара		96031015	2001	1006 /	П	9	стл	ср	5	5			9	вкр
Аграрна		01031013	2006	919 /	СЛП	7	стл	рс	7	7			7	скр
Аріелль		02031005	2007	741 /	СЛП	7	стл.ран.	ср	7	5			7	скр
Агаве	®	02031015	2004	1011 /	П	9	стл	рс	9	9			9	вкр
Бородянська рожева		89031011	1993	347 / 347	СЛП	7	стл	рс	5	5			5	вкр
Бернадетте		02031010	2005	1006 /	СЛ	7-9	стл	пс		7			9	скр
Белларoза	®	00031013	2003	1046 /	ЛП	9	стл	рс	7	7			9	вкр
Божедар		92031014	1996	319 /	СЛП	9	стл	рс	5	9			9	вкр
Билина		01031010	2006	347 /	СЛП	7	стл	сс	7	7			7	скр
Багряна	®	98031008	2001	347 / 347	СЛП	7	стл	сс	5	5			9	вкр
Веста		00031009	2003	319 / 319	СЛ	9	стл	рс	7	5			9	вкр
Віринея	®	97031013	2001	347 / 347	П	7	стл	сс	5	5			9	скр
Віра		97031011	2001	371 /	П	7	стл	сс	7	5			9	вкр
Воля		00031006	2004	369 /	ЛП	7	стл	сс	7	7			7-9	вкр
Вітара	®	00031011	2003	1046 /	ЛП	9	стл	рс	5	5			9	вкр
Водограй		91031004	1995	347 / 347	ЛП	5	стл	ср	5	5			5	скр
Вінета	®	97031003	2001	1046 /	СЛП	9	стл	рс	7	5			9	вкр
Велокс		97031001	2001	938 /	СЛП	7	стл	рс	5	5			5	скр
Гермес		98031011	2001	941 /	П		стл	сс						

Сорт				Код	Зона	Характеристики								
						Продук-тивність	Напрям викорис-тання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєст-рації	Заявник / Підтримувач						посухи	поля-гання	осипання	хвороб	
Джаерла		94031012	1998	738 /	СЛП	5	стл	рс	5	5			5	скр
Дзвін		94031001	2000	320 /	П	7	тхст	сп	5	5			9	вкр
Дара		00031008	2004	319 / 319	СЛП	7-9	стл	сс	7	7			7-9	скр
Делікат	®	02031014	2004	1011 /	П	9	стл	ср	9	9			9	вкр
Доброчин		91031006	1995	319 /	СЛП	7	стл	ср	5	5			9	вкр
Древлянка		79031003	1984	320 /	П	5	стл	пс	5	5			5	скр
Дніпрянка	®	98031009	2002	347 / 347	СЛП	7	стл	рс	5	5			5	скр
Дубравка		97031015	2001	319 /	П	5	стл	сп	5	5			5	скр
Дарина		98031005	2002	320 /	П	7	стл	сп	5	5			5	вкр
Жеран		03031005	2006	319 /	П	7-9	стл	рс	7	7			7	скр
Зоряна	®	00031005	2004	428 /	СЛП	7-9	стл	сс	7-9	709			7-9	вкр
Загадка		01031009	2006	347 /	СЛП	7	стл	рс	7	7			7	скр
Західний		92031002	1998	369 /	П	5	стл	сс	>5	>5			5	скр
Забава	®	01031011	2004	347 /	СЛП	7-9	стл	ср	9	9			9	вкр
Золушка F1		01031004	2003	751 /	П	9	стл	сс	7	5			9	скр
Імпала		95031001	2000	741 /	СЛП	7	стл	рс	5	5			9	вср
Косень 95		94031019	1999	319 /	СЛП	7	стл	рс	5	7			9	вкр
Кобза		91031003	1995	347 / 347	СЛП	7	стл	рс	5	5			5	вкр
Карлик 04		04031011	2007	319 /	СЛП	5	стл	рс	7	5			7	скр
Кондор		83031001	1999	741 /	СЛП	9	стл	сс	5	5			5	вкр
Космос		94031006	1999	741 /	СЛП	7	стл	ср	5	5			5	скр
Каталіна F1		01031005	2003	751 /	П	7	стл	сс	5	5			9	вкр
Карлена		92031020	1997	1011 /	СЛ	7	стл	рс	5	5			9	вкр
Коллетта	®	97031004	2001	1046 /	СЛП	9	стл	рс	7	5			9	вкр
Каратоп	®	02031012	2004	1011 /	П	9	стл	рс	9	9			9	вкр
Лілея	®	00031003	2003	347 /	ЛП	9	стл	сс	7	5			9	вкр
Лікарія		92031024	1997	1011 /	П	7	стл	рс	5	5			5	вкр
Луговська		82031003	1987	347 / 347	ЛП	5	стл	сс	5	5				скр
Латона		92031044	1997	738 /	СЛП	5	стл	рс	5	5			5	скр

Сорт				Код	Зона	Характеристики								
						Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	полягання	осипання	хвороб	
Ластівка		® 99031001	2002	919 / 919	Л	7	стл	рс	5	5			9	вкр
Ліщина		02031011	2006	369 /	СЛП	7	стл	рс	7	7			7	вкр
Леді Розетта		® 98031004	2001	995 / 995	П	9	тхст	сс	7	7			9	вкр
Лелека		® 99031005	2002	347 / 347	СЛП	7	стл	сс	5	5			5	вкр
Мавка		77031002	1982	371 /	ЛП	5	стл	ср	5	5			5	скр
Марфона		88031002	1999	741 /	П	7	стл	сс	5	5			5	вкр
Малинська біла		01031017	2005	319 /	Л	7-9	стл	ср	7	7			7	вкр
Мелодія		® 02031007	2005	347 /	СЛП	7-9	стл	рс	7	7			7	вкр
Молодіжна		® 92031018	1996	919 / 919	СЛП	5	стл	рс	5	5			5	скр
Мрія		® 02031006	2004	1151 /	СЛП	9	стл	рс	9	9			9	вкр
Моллі		® 02031013	2004	1011 /	П	9	стл	рс	9	9			9	вкр
Нагорода		® 04031009	2007	428 /	Л П	7	стл	ран.	7	7			7	скр
Невська		77031003	1984	138 /	СЛП	5	стл	ср	5	5			5	скр
Надійна		® 02031009	2006	347 /	СЛП	9	стл	сс	7	7			7	скр
Незабудка		77031004	1981	347 / 347	СЛ	5	стл	рс	5	5			5	скр
Немішаївська 100		® 00031004	2004	347 /	СЛП	7-9	стл	рс	7	7			9	вкр
Обрій		® 92031013	1997	347 / 347	СЛП	7	стл	ср	5	5			5	вкр
Ольвія		94031018	1999	347 / 347	СЛП	5	стл	сс	5	5			5	скр
Оксамит 99		99031002	2002	371 /	СЛП	9	стл	сп	7	7			9	вкр
Поліська рожева		74031002	1978	319 / 319	П	7	стл	сп	5	5			9	вкр
Пікассо		94031008	1998	741 /	СЛП	7	стл	сп	5	5			5	скр
Провенто		92031043	1997	741 /	СЛП	7	стл	рс	5	5			9	вкр
Промінь		® 02031008	2006	347 /	СЛ	7	стл	сп	7	7			9	вкр
Придеснянська		92031017	1996	428 /	СЛП	5	тхст	сс	5	5			5	скр
Палма		96031016	2001	1006 /	ПС	7	стл	ср	5	5			9	вкр
Панда		01031007	2003	927 /	Л	7	стл	сс	5	5			9	вкр
Пекуровська		90031004	1995	428 /	П	5	стл	ср	5	5			5	скр
Престо		® 00031014	2004	1046 /	СЛП	9	стл	рс	9	9			9	вкр
Повінь		® 96031001	2000	347 / 347	СЛП	7	стл	рс	7	5			9	вкр

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляглання	осипання	хвороб	
Подолянка ®	03031003	2006	347 /	ЛП	9	стл	рс	7	7			7-9	скр
Поляна ®	99031006	2002	347 / 347	СЛП	7	стл	ср	5	5			5	скр
Поран	97031016	2001	319 /	СЛП	7	стл	рс	7	5			9	скр
Рая	92031037	1997	741 /	П	7	стл	ср	5	5			9	вкр
Розара	92031023	1997	927 /	Л	9	стл	рс	7	7			9	вкр
Розалінд ®	00031010	2004	1046 /	ЛП	9	стл	рс	9	9			9	вкр
Рікеа	96031017	2001	1006 /	ПС	7	стл	рс	5	5			5	скр
Роко ®	02031004	2006	741 /	П	7-9	стр	сс	7	7			7	скр
Ракурс	93031001	1997	347 / 347	ЛП	7	стл	сп	5	5			9	вкр
Рів'єра ®	04031001	2007	741 /	СЛП	9	стл.ран.	др	7	7			7	скр
Слов'янка ®	94031017	1999	347 / 347	СЛП	7	стл	сс	5	5			5	вкр
Світанок київський	82031002	1987	347 / 347	СЛП	7	стл	рс	5	5			9	вкр
Сєднєвська рання	90031012	1994	428 /	СЛП	5	стл	рс	5	5			5	скр
Серпанок ®	97031014	2001	347 / 347	СЛП	5	стл	рс	5	5			5	скр
Санте	95031003	2000	741 /	СЛП	9	стл	ср	5	5			9	вкр
Сантана	00031001	2003	1127 /	СЛП	9	стл	сс	5	5			9	вкр
Сатіна	97031002	2001	938 /	П	5	стл	ср	5	5			5	скр
Сатурна	98031010	2001	1087 /	П	7	тхст	сп	5	5			9	вкр
Солара ®	97031005	2001	1046 /	СЛП	9	стл	ср	7	5			5	вкр
Тирас	01031015	2004	319 /	СЛП	9	стл	рс	9	9			9	вкр
Тетерів	99031004	2002	319 /	СЛП	9	стл	сп	7	7			9	вкр
Фермерська	01031014	2006	919 /	СЛП	7	стл	рс	7	7			7	скр
Фантазія ®	98031007	2001	347 / 347	СЛП	7	тхст	ср	5	5			9	вкр
Червона рута	01031012	2005	347 /	СЛ	7-9	стл	сп		7			9	вкр
Чернігівська рання	94031020	1999	428 /	ЛП	7	стл	рс	7	5			9	скр
Чернігівська 98	98031006	2002	428 /	ЛП	7	стл	сс	7	5			9	вкр
Явір ®	96031002	2000	347 / 347	СЛП	7	стл	сс	5	5			9	вкр
Довіра ®	03031008	2007	347 /	П	5	стл	ср	7	5			7	вкр
Завія	04031012	2008	319 /	П.	5	стл	ср	5	5			7	вкр

Сорт				Код	Зона	Характеристики								
						Продук-тивність	Напрям викорис-тання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєст-рації	Заявник / Підтримувач						посухи	поля-гання	осипання	хвороб	
Лаура		05031008	2008	1046 /	П.	7	стл	ср	5	5			7	скр
Левада	®	03031004	2007	347 /	П	5	стл	ср	7	5			7	вкр
Дорогинь		05031015	2008	319 /	П.	7	стл	сс	5	5			7	вкр
Звіздаль		05031014	2008	319 /	П.	5	стл	ср	5	5			7	скр
Курода	®	04031002	2008	741 /	Л.П.	7	пер.стл	сс	7	7			7-9	скр
Легенда	®	04031005	2007	371 /	СЛП	7	тхст	сс	7	7			7	скр
Марлен		02031003	2007	741 /	ЛП	7	стл	сс	7	5			5	скр
Оберіг		05031013	2008	347 /	Л.П.	7	стл	ср	5	7			7	скр
Романо		79031001	1980	741 /										
Скарбниця		05031010	2008	347 /	Л.П.	5	стл	рс	5	5			5	скр
Верді		05031001	2008	927 /	П	7	пер	сп	7	7			7	вкр
Мелоді		05031018	2008	939 /	П.	5	стл	сс	5	5			5	скр
Поліська ювілейна		04031010	2007	319 /	П	5	стл	сп	7	5			7	скр
Поліське джерело		05031012	2008	347 /	П	7	стл	сп	5	7			7	скр
Тайфун		05031006	2008	599 /	П	7	стл	сс	7	7			7	вкр
Сільськогосподарські: кормові														
Пайза														
Лебедина 2		95126001	1998	320 /	ЛП	7	сил	пс		7	7	5	7	скліт
Надія		98126001	2000	371 /	ЛП	7	корм	сс		7	7	5	7	скліт
Сорго віникове														
Карликове 45		94135001	1999	311 /	ЛП	7	він	рс	-	5	7	7	5	-
Красень	®	04135001	2007	311 /	СЛП	7-9	він	рс	-	7-9	7	7	7-9	-
Любиме 80		00135001	2003	361 / 361	СЛ	7	він	ср	-	7-9	7	7	7	-
Раївське		01135001	2003	309 /	СЛ	7-9	він	ср	-	7-9	7	7	7	-
Таврійське 1		94135002	1999	414 /	СЛ	7	він	ср	-	7	7	7	7	-
Таврійське 2		99135001	2003	414 /	СЛ	7	він	рс	-	7	7	7	7	
Українське 20		90135001	1995	361 / 361	С	7	він	ср	-	7-9	5	5	7	-
Фараон	®	05135001	2007	414 /	СЛП	7-9	він	сс	-	7-9	7-9	7-9	7-9	-

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продук-тивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєст-рації	Заявник / Підтримувач					посухи	поля-гання	осипання	хвороб	
Фермерське		99135002	2003	909 /	СЛ	7	він	ср	-	7	5	5	5	-
Сорго цукрове													
Сс 506		06010001	2007	1079 /	С	7-9	корм	пс	-	7-9	7-9	7	7	сбіл, скліт
Аграрний 5F		00010001	2004	361 / 361	СЛ	7-9	корм	пс	-	7-9	7-9	7	7	вкліт, сбіл
Г 1990		06010002	2007	1079 /	С	7-9	корм	сп	-	7-9	7	7-9	7	сбіл, скліт
Довіста		07472001	2008	311 /	СЛ	9	корм	сп	-	5	5	5	9	сбіл, вкліт
Кримське 15		98010001	2001	361 / 361	С	7	корм	сс	-	7-9	7	7	7	скліт, сбіл
Медовий F1		95010001	1998	378 / 378	С	7-9	корм	ср	-	7-9	7	7	7	вкліт, сбіл
Пам"яті Шепеля		06472001	2008	361 /	СЛ	9	корм	сс	-	9	9	9	9	сбіл, вкліт
Сиваський 85		85010005	1991	414 /	С	5	корм	сп	-	7	7	7	7	скліт, сбіл
Сило 700Д		04010001	2007	29 /	СЛ	7-9	корм	сс	-	7	7-9	7	7-9	сбіл, вкліт
Силосне 42		99010002	2003	311 /	Л	7	корм	сс	-	7-9	7-9	7	7	вкліт, сбіл
Троїстий		03010001	2007	311 /	СЛ	7	корм	сс	-	7-9	7	7	7	сбіл, вкліт
Фаворит		99010001	2003	378 / 378	Л	5	корм	сс	-	5	7	7	7	скліт, сбіл
Суданська трава													
Білявка		06067001	2008	414 /	СЛП	7	корм	сс	-	9	9	9	9	вбіл, скліт
Голубівська 25		97067002	2002	311 /	СП	7	корм	ср		7	7		7	вкліт, сбіл
Дніпровська 54		00067001	2004	340 /	СЛ	7	корм	сс		7-9	7		>5	вкліт, сбіл
Донецька 5		78067001	1984	315 /	Л	5	корм	сс		5	5		5	скліт, сбіл
Луганка 3		99067001	2003	909 /	СЛ	7-9	корм	сс		7	7		7	вкліт, сбіл
Миронівська 36		78067002	1983	341 / 341	СЛ	5	корм	сс		5	5		5	скліт, сбіл
Меотида		03067001	2006	414 /	СЛ	7-9	корм	сс		7-9	5		5	сбіл,вкліт
Одеська 221		86067003	1991	378 / 378	С	7	корм	сс		7	7		7	вкліт, сбіл
Фіолета		90067002	1996	361 / 361	СЛ	7	корм	сс		7	7		5	скліт, сбіл
Сорго-суданковий гібрид													
Арабат	®	04063002	2007	414 /	Л	7-9	корм	сс	-	7-9	7-9	-	7	сбіл,вкліт
ДССГ 90		89063002	1995	340 /	С	7	корм	сс	-	7-9	7	-	7	вкліт, сбіл
Кадан 19		03063001	2007	311 /	Л	7	корм	сс	-	7-9	7	-	7-9	сбіл,вкліт

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляглання	осипання	хвороб	
Почин II	00063001	2004	340 /	С	7	корм	сс	-	9	7	-	7	вкліт, сбіл
Присиваський 4	02063002	2006	414 /	СЛ	7	корм	сс	-	7-9	8	-	7	вкліт,сбіл
Сократор 87	90063003	1992	361 /	-	7	корм	сс	-	7-9	7	-	7	скліт, сбіл
Слав'янське поле 15	02063001	2005	1039 /	Л	7-9	корм	сс	-	7-9	7-9	-	7	вбіл, вкліт
Чудовий ВМР	04063001	2007	29 /	СЛ	7-9	корм	сс	-	7-9	7-9	-	7	сбіл, вкліт
Ювілей 50	94063001	1998	361 / 361	СЛП	7	корм	сс	-	7	7	-	7	скліт, сбіл
Ювілейний 75	98063001	2001	361 / 361	Л	7	корм	рс	-	5	7	-	7	скліт, сбіл
Елевсина (Дагуса)													
Тропіканка	99344001	2001	348 /	СЛ	7-9	корм	сс		7	7	7	7	скліт
Пажитниця однорічна (Вестервольдська)													
Еней	87397005	1991	371 /	П	7	ск,лп	сс		7	7	7	7	скліт
Ореол	97397001	2000	305 /	ЛП	7	ск,лп	сс		7	7	7	7	вкліт
Росавій	92397004	1997	371 /	ЛП	7	ск,лп	сс		7	7	7	7	скліт
Тиверський	91397001	1996	305 /	ЛП	7	ск, лп	сс		7	7	7	7	вкліт
Грястиця збірна													
Дрогобичанка	73049001	1979	370 /	СП	5	лп	сс	5	5	5		5	скліт
Київська рання 1	71049002	1979	337 /	СЛП	5	ск, лп	рс	5	5	5		5	скліт
Лідакта	94049004	2000	600 / 807	ЛП	9	ск, лп	сп	5	7	7		7	вкліт
Муравка	95049001	2001	337 /	ЛП	7-9	лп, ск	сп	7	9	7		7	вкліт
Наталка	00049001	2005	337 /	ЛП	7	ск	сс	7	5	7	7	5	вкліт
Олешка 14	94049001	2001	411 /	СЛП	7	ск	сс	7	7	7		5	вкліт
ФРКЛ-1	94049002	2000	971 /	Л	7	ск, лп	ср	5	7	7		7	вкліт
Херсонська рання 1	84049002	1994	411 /	С	7	ск, лп	сс	5	7	7		7	скліт
Костриця східна													
Лиманська ®	06110001	2007	317 /	С	7	ск	ср	7	7	8		7	сбіл
Костриця лучна													
Веселоподолянська 1883	50054001	1961	388 /	СЛП	5	ск, лп	рс	5	5	5	5	5	скліт

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продук-тивність	Напрям викорис-тання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєст-рації	Заявник / Підтримувач					посухи	поля-гання	осипання	хвороб	
Венера		00054001	2005	392 /	ЛП	5	ск	сс	7-9	7	7-9	7	5	вкліт
Діброва		03054001	2007	305 /	ЛП	7-9	ск,лп	сс	7	7-8	7	-	7-9	вкліт
Звьоздочка 5		90054002	1997	411 /	П	7	ск, лп	рс	5	7	7	7	7	скліт
Козаровицька		65054002	1973	337 /	П	7	ск, лп	рс	7	5	5	5	5	скліт
Ліфара		97054001	2002	600 / 807	ЛП	7	ск	рс	5	7	7	7	7	вкліт
Літава		95054001	2001	337 /	ЛП	7	ск, лп	рс	5	7	7	7	7	скліт
Росинка		92054001	1998	392 /	ЛП	7	ск, лп	рс	7	8	8	5	7	скліт
Сарненська 134		68054001	1979	390 /	П	5	ск, лп	сс	5	5	5	5	5	скліт
Сіверянка		00054002	2005	337 /	ЛП	7-9	ск	сс	7	5	7-9	7	7	вкліт
Сену		98054001	2002	724 /	ЛП	5	ск	рс	5	7	7	7	7	скліт
Фіола		94054001	2000	971 /	Л	8	ск, лп	сс	5	7	7	7	7	вкліт
Костриця очеретяна														
Доменіка		00109001	2001	337 /	СЛП		озл	сс	7-9	7-9			7	дек,вщі
Кочиз		98109002	2001	724 /	СЛП		озл	сс	7	7-9			7	дек,сщі
Кора		98109001	2002	724 /	ЛП	7	ск	ср	5	5	7	5	5	вкліт
Людмила		97109001	2001	305 /	Л	7	ск, лп	рс	5	5	7	7	7	вкліт
Мустанг		99109002	2001	971 /	СЛП		озл	сс	5	7			7	дек,сщі
Меандре		05109001	2006	600 /	СЛП		озл	сс	7	7			8	дек,сщі
Ода		97109002	2003	305 /	ЛП	7	ск,лп	сп	7	7	7	7	7	скліт
Садівничанка		92109001	1998	392 /	ЛП	9	ск, лп	сс	7	7	7	7	7	вкліт
Смерічка		99109003	2003	370 /	ЛП	7-9	ск	сс	7	7	7	7	7	вкліт
ФРРСЦ 1		94109001	2000	971 /	ЛП	7	ск, лп	сс	5	7	7	7	7	скліт
Чабанська		01109001	2003	345 / 345	ЛП	9	ск,лп	сс	7	7-9	7	7	7	вкліт
Мітлиця велетенська														
Галичанка		91123001	1997	370 /	П	7	лп	сс	7	7	5	7	7	скліт
Очеретянка звичайна														
Київська		69125001	1977	337 /	ЛП	7	лп	сс	5	7	7-9	7	7	скліт
Сарненська 40/100		92125001	1998	390 /	ЛП	7-9	лп	сс	7	7	5	5	7	вкліт

Сорт				Код	Зона	Характеристики								
						Продук-тивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєст-рації	Заявник / Підтримувач						посухи	поля-гання	осипання	хвороб	
Пирій видовжений														
Сарматський		04345001	2006	317 /	С	7-9	ск	пс	7	7	7-9		7-9	сбіл,скліт
Райграс високий														
Дронго		03060001	2004	305 /	ЛП	7	лп	сс	7-9	7	7	5	7	вкліт
Полтавський 521		65060001	1982	387 /	С	5	лп, зак	сс	5	5	5	5	5	скліт
Пажитниця багаторічна														
Андріана- 80		02062001	2003	337 /	СЛП	7	лп,озл	сс	7-9	7	7	7	7	скліт,вдек
Вінницька		90062004	1982	348 /	ЛП	-	озл	сс	5	5	-	-	5	дек,сщі
Граффіті		05062002	2006	598 /	СЛП	-	озл	сс	>5	5	-	-	7	дек,сщі
Геркулес		94062003	2000	971 /	П	7	ск, лп	сп	5	5	5	5	7	скліт
Грілла		05062001	2006	598 /	СЛП	-	озл		>5	7	-	-	7	дек, сщі
Генрієтта		99062004	2001	971 /	СЛП	-	озл		5	7	-	-	7	вдек
Дрогобицький 2		67062001	1974	370 /	ЛП	5	лп	сс	5	5	5	5	5	скліт
Дрогобицький 16		91062001	1997	370 /	П	7	лп	сс	5	7	>5	7	5	скліт
Дрогобицький 1		66062001	1976	371 /	П	5	лп	рс	5	5	5	5	5	скліт
Ексел		99062003	2001	971 /	СЛП	-	озл		5	7	-	-	7	дек
Інка		98062005	2001	991 /	СЛП	-	озл		>5	7	-	-	7	вдек
Київська 101		90062005	1978	348 /	ЛП	-	озл	сс	5	5	-	-	5	дек,сщі
Квінтус		05062003	2006	600 /	СЛП	-	озл		7	7	-	-	7	дек,сщі
Лізуна		97062002	2001	600 / 807	СЛП	-	озл		5	7	-	-	7	вдек
Литвинівський 1		79062001	1986	337 /	Л	7	лп, озл	сс	7	7	7	7	7	вкліт
Лібронко		05062006	2006	600 /	СЛП	-	озл	сс	7	7	-	-	7	дек,сщі
Ліфранс		05062005	2006	600 /	СЛП	-	озл		7	7	-	-	7	дек,сщі
Лета		99062008	2002	337 /	ЛП	7	лп, озл	рс	>5	9	7	>5	7	вкліт,дек
Ніга	®	06062002	2007	991 /	СЛ	-	озл	сс	7	7	-	-	7	дек
Ніра		99062006	2001	1104 /	СЛП	-	озл		5	7	-	-	7	дек
Обрій		97062001	2001	305 /	Л	7	ск, лп	сс	5	7	7	7	7	скліт
Оріон		00062002	2001	337 /	ЛП	-	озл		7	7-9	-	-	5	вдек

Сорт				Код	Зона	Характеристики								
						Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляган ня	осипання	хвороб	
Плезір		99062005	2001	600 / 807	СЛП	-	озл		5	7	-	-	7	дек
Руслана		04062001	2005	305 /	СЛП	-	озл	сс	7-9	7	-	-	7	дек
Сакіні		94062008	1999	724 /	ЛП	-	озл	сс	5	7	-	-	7	вдек
Святошинський		89062002	1995	345 / 345	ЛП	7	ск, лп	сс	5	7	5	>5	7	скліт
Тайя		94062009	1999	724 /	ЛП	-	озл		7	7	-	-	7	дек
Талго		99062007	2001	971 /	СЛП	-	озл		5	7	-	-	7	вдек
Тітус		05062004	2006	600 /	СЛП	-	озл		7	7	-	-	7	дек,сщі
Фієста 3	®	04062002	2006	914 /	СЛП	-	озл	сс	>5	5	-	-	7	дек, сщі
Гребінник звичайний декоративний														
Деснянський 126		90254001	1982	348 /	ЛП		озл		7	7			7	дек
Костриця червона мінлива														
Аіда		99186001	2001	971 /	СЛП		озл		7	7-9			7	вдек,сщі
Дарвін		98186001	2000	740 /	СЛ		озл		7	7			7	вдек,сщі
Ліфалла		97186002	2000	600 / 807	СЛ		озл		7-9	7			7	вдек,вщі
Лікато		99186006	2001	600 / 807	СЛП		озл	сс	7-9	7			7-9	вдек,сщі
Луцінда		05186001	2006	600 /	СЛП		озл	сс	7	8			7	вдек,вщі
Костриця жорстка														
Ріду		95333002	1999	724 /	ЛП		озл	сс	7	7			7	вдек
Костриця овеча														
Борніто		99331002	2001	600 / 807	СЛП	-	озл	сс	5	7-9	-	-	7	дек,сщі
Дєва		05331002	2006	337 /	СЛП	-	озл	сс	8	8		-	7	дек,сщі
Забава		94331001	1998	305 /	СЛП	5	озл, лп	сс	5	7	7	7	7	скліт,дек
Ментор		05331001	2006	600 /	СЛП	-	озл	сс	8	8	-	-	7	дек,сщі
Ноні	®	06331001	2007	991 /	СЛ	-	озл	сс	7-9	7-9	-	-	7	вдек,вщі
Спартан		99331001	2001	971 /	СЛП	-	озл	сс	5	7	-	-	7	дек,сщі
Костриця різнолиста														
Ізумрудна		90255001	1980	348 /	ЛП		озл		5	5			5	дек

Сорт				Код	Зона	Характеристики								
						Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляган ня	осипання	хвороб	
Костриця червона														
Агата		94111001	1999	305 /	ЛП	5	лп, озл	ср	7	8	7	7	7	вкліт, дек,сщі
Адіо	®	06111001	2007	991 /	СЛ	-	озл	сс	7	7	-	-	7	дек,вщі
Богданка		00111001	2001	337 /	ЛП	-	озл	ср	7-9	7	-	-	7-9	вдек,вщі
Видубецька славна		90111003	1977	348 /	ЛП	-	озл	сс	7	5	-	-	5	дек,сщі
Говерла		05111006	2008	370 /	ЛП	8	лп, ск	сс	9	8	8	8	9	вбіл
Гросс		05111004	2006	598 /	СЛП	-	озл		7	8	-	-	7	вдек,вщі
Гробла		05111003	2006	598 /	СЛП	-	озл	сс	8	8	-	-	7	вдек,вщі
Дніпровська		90111004	1982	348 /	ЛП	-	озл	сс	7	7	-	-	7	дек,сщі
Джаспер II	®	04111001	2006	914 /	СЛП	-	озл	сс	7	8	-	-	7-9	дек,сщі
Древлянська		97111001	2001	320 /	ЛП	7	лп	ср	7	7	7	5	7	скліт
Ехо		98111001	2001	724 /	СЛП	-	озл	сс	5	7	-	-	7	вдек,сщі
Київлянка		90111005	1980	348 /	ЛП	-	озл	сс	7	7	-	-	5	дек,сщі
Ліпроза		97111003	2000	600 / 807	СЛП	-	озл	сс	7	7	-	-	7	вдек,вщі
Лівинус		99111005	2000	600 / 807	СЛП	-	озл	сс	7	5	-	-	7	вдек,сщі
Лівізіон		05111005	2006	600 /	СЛП	-	озл	сс	7	8	-	-	8	вдек,вщі
Ліфайн		99111004	2001	600 / 807	СЛП	-	озл	сс	7	7	-	-	7	вдек,сщі
Лакстон		98111002	2001	724 /	СЛП	-	озл	сс	5	сс	-	-	7	вдек,сщі
Лео	®	06111002	2007	991 /	СЛ	-	озл	сс	7	7	-	-	7	дек,вщі
Німба		99111009	2001	1104 /	СЛП	-	озл	сс	7-9	7	-	-	7	дек,сщі
Оленка		02111001	2003	337 /	СЛП	-	озл	сс	7-9	7	-	-	7-9	вдек,сщі
Перніле		94111006	1999	724 /	ЛП	-	озл	сс	7	7	-	-	7	дек,сщі
Руфілла		99111007	2001	971 /	СЛП	-	озл	сс	7	7	-	-	7-9	дек,сщі
Роланд		99111008	2001	971 /	СЛП	-	озл	пс	7-9	7	-	-	7	дек,сщі
Сирецька		90111006	1987	348 /	ЛП	-	озл	сс	7	7	-	-	7	дек,сщі
Сава	®	06111003	2007	991 /	СЛ	-	озл	сс	7	7-9	-	-	7	дек,вщі
Татьяна		95111001	1999	724 /	ЛП	-	озл	ср	5	7-9	-	-	7	вдек,вщі
Янка		94111002	1999	305 /	ЛП	5	лп, озл	скс	7	7-9	7	7	7	скліт, дек

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продук-тивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер	Рік реєст-рації	Заявник / Підтримувач						посухи	поля-гання	осипання	хвороб	
Костриця тонколиста													
Барва	04295001	2005	305 /	СЛП	-	озл	сс	7	7			5	дек
Костриця шорстколиста													
Борнадо	99364001	2001	971 /	СЛП		озл		5	7			7	вдек
Саманта	98364002	2000	740 /	СЛ		озл		7	5			5	вдек
Мітлиця повзуча													
Клонова	90352001	1977	348 /	ЛП		озл		7-9	7-9			7	вдек
Като	99352001	2001	971 /	СЛП		озл		7	7			5	дек
Мітлиця тонка													
Деснянська 51	90294002	1980	348 /	ЛП		озл		5	5			5	дек
Тонконіг лісовий													
Шадоу	99343001	2001	971 /	СЛП		озл		5	7-9			7	вдек
Тонконіг лучний													
Альпіна ®	04069002	2006	914 /	СЛП		озл	сс	7	7			7	дек,сщі
Аліція	99069001	2001	1104 /	СЛП		озл	сс	7-9	7			7	дек,сщі
Балін	92069003	1999	724 /	сс		озл		>5	5			5	дек,сщі
Еска	98069005	2000	991 /	СЛ		озл	сс	>5	7			7	дек,сщі
Конні	94069003	1999	724 /	СЛ		озл	ср	5	7-9			7	дек,сщі
Лімузине	97069002	2000	600 / 807	СЛ		озл	сс	7	7-9			7	вдек,сщі
Ліли	97069001	2000	600 /	СЛ		озл	ср	7-9	7			7	вдек,сщі
Лімерік	05069002	2006	600 /	СЛП		озл	сс	5	7			7	дек,сщі
Меркурій ®	04069004	2006	914 /	СЛП		озл	сс	7	5			7	дек,сщі
Макс-1	00069001	2001	337 /	ЛП		озл	рс	7-9	7			7	вдек,сщі
Орфео	05069001	2006	600 /	СЛП		озл	сс	7	7			8	дек,сщі
Сирецький 27	90069002	1980	348 /	ЛП		озл	ср	5	5			5	дек,сщі
Тачдаун ®	04069003	2006	914 /	СЛП		озл	сс	7	5			7	вдек,сщі
Удич	04069001	2005	305 /	СЛП		озл	сс	7	7	7	-	5	дек,сщі

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач					посухи	поляг-ання	осипання	хвороб	
Тонконіг фіолетовий													
Алекс		02402001	2003	337 /	СЛП		озл		7-9	7			7 вдек
Стоколос безостий													
Вишгородський		90065001	1997	337 /	ЛП	7-9	ск, лп	сс	7	7	7	7	7 вкліт,сбіл
Всеслав		97065001	2002	305 /	СЛП	7	ск	ср	7	7	7	7	7 вкліт, сбіл
Геліус		00065001	2004	337 /	СЛ	9	ск	сс	7-9	7-9	7		>5 вкліт,сбіл
Козаровицький		54065002	1980	337 /	ЛП	5	ск, лп	сс	7	7	7	7	7 скліт
Марс		97065002	2001	305 /	Л	7	ск, лп	скс	7	5	7	7	5 вкліт,вбіл
Полтавський 30		60065003	1967	387 /	Л	5	ск, лп	сс	5	5	5	5	5 скліт, сбіл
Полтавський 52		81065004	1987	387 /	ЛП	7	лп	сс	7	5	5	5	5 скліт,сбіл
Полтавський 5		98065001	2002	387 /	СЛП	7-9	ск	ср	7	7	7	7	7 вкліт,сбіл
Скіф		00065003	2004	873 /	С	7-9	ск	сс	7	9	9		7 скліт,вбіл
Топаз		00065002	2004	337 /	СЛП	7	ск	сс	9	7	9		7 вкліт,сбіл
Таврійський		95065001	2000	411 /	С	7	ск, лп	рс	5	7	7	7	7 скліт,сбіл
Тимофіївка лучна													
Аргента		91068001	1996	337 /	ЛП	7	ск,лп	сс	7	7	7	7	7 вкліт, сбіл
Вишгородська		94068003	2001	337 /	ЛП	7-9	ск, лп	сс	7	7	7	7	7 вкліт, сбіл
Витава		02068001	2006	305 /	П	7	ск,лп	сс	7-9	7	7-9		7 вкліт
Каріна		00068001	2005	337 /	ЛП	7	ск	сс	7-9	7-9	7-9	7	5 вкліт,вбіл
Козаровицька		54068001	1979	337 /	П	7	ск, лп	сс	7	5	7	5	7 скліт,сбіл
Лішка		97068001	2001	600 / 807	ЛП	7-9	ск, лп	ср	5	7	7	7	7 вкліт, сбіл
Підгірянка		99068002	2004	370 /	ЛП	7	ск лп	сс	7	7-9	9		7-9 вкліт, сбіл
Сарненська 35		68068001	1980	390 /	ЛП	7	ск, лп	сс	5	5	5	5	5 скліт, сбіл
ФРВЛ-1		94068001	1999	971 /	ЛП	7	ск, лп	ср	5	7	5	7	7 вкліт, сбіл
Трава Колумба													
Надежда Востока		91139001	1995	909 /	С	7	сил		7	7	7	7	7 скліт
Парана		98139002	2000	348 /	ЛП	9	сил	сс	7	7	7	7	7 вкліт

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляг-ання	осипання	хвороб	
Пажитниця багатоквіткова													
Гібридний (Ярослав)	87061002	1992	345 /	Л	7-9	лп	сс	7	7	5	7	7	вкліт, сбіл
Жайвір	98061001	2003	371 /	П	7	ск	сс	7	7	7		7	скліт, сбіл
Київський	92061001	1999	345 / 345	ЛП	7	ск, лп	сс	5	>5	7	>5	7	вкліт, сбіл
Мальмі	92061003	1997	912 /	П	7	ск, лп	сс	5	7	5	7	7	вкліт, сбіл
Мирослав	90061005	1997	345 / 345	П	7	ск, лп	сс	7	5	5	7	7	скліт, сбіл
Боби кормові													
Білун	98043001	2000	330 /	ЛП	7	корм	скс		5	7	7	7	вбіл
Візир	03043001	2005	305 /	ЛП	7-9	корм	сс	-	7	7	7	7	вбіл
Карсон	01043001	2002	1050 /	СЛП		ун	рс						
Карадаг	97043002	1999	357 / 357	СЛП		ун	сс						
Оріон	97043003	1999	305 /	ЛП	7	корм	сс		5	7	5	7	вбіл
Пікуловицькі 1	58043003	1962	371 /	П	5	корм	сс		5	5	5	5	сбіл
Прикарпатські 4	82043001	1986	332 /	ЛП	5	корм	сс		5	5	5	5	сбіл
Українські слобідські	97043001	1999	357 / 357	СЛП		ун	сс						
Форум	01043002	2002	1050 /	СЛП		ун	рс						
Янкель білий	02043001	2003	1081 /	СЛП		ун	рс						
Горошок (Вика озима)													
Вусата	94047006	1999	371 /	С	7	корм	сс	7	7	5	7	>5	сбіл
Львів'янка	92047001	1997	371 /	СП	7	корм	сс	7	7	5	5	7	сбіл
Лебедина пісня	00133001	2003	387 /	СЛ	9	корм	сс	7	7	5	7	7	вбіл
Полтавська 25	63047001	1976	387 /	СЛ	5	корм	сс	7	7	5	5	7	сбіл
Полтавська 77	80047005	1987	387 /	СЛ	9	корм	сс	7	7	5	5	5	сбіл
Приморка	98047001	2001	305 /	Л	7	корм	сс	7	7	5	7	>5	сбіл
Степна	90047005	1996	387 /	П	7	корм	сс	7	7	5	7	7	сбіл
Ювілейна	97047004	2001	387 /	СЛ	9	корм	сс	7	7	5	6	7	вбіл
Горошок (Вика яра)													
Аріадна	99047001	2003	306 /	ЛП	9	корм	сс		7	5	7	7	сбіл

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач					посухи	поляг-ання	осипання	хвороб	
Білоцерківська 10		00047002	2003	335 /	ЛП	7	корм	сс		7	5	7	7	сбіл
Білоцерківська 88		87047004	1992	335 /	ЛП	7	корм	сс		7	5	7	7	сбіл
Білоцерківська 34		94047005	1998	335 /	СЛП	7	корм	сс		7	5	7	7	сбіл
Білоцерківська 7		97047002	2000	335 /	СЛП	7	корм	сс		7	5	7	7	вбіл
Білоцерківська 96		98047004	2001	335 /	ЛП	9	корм	сс		5	5	5	7	вбіл
Віаріка		01047001	2005	306 / 791	ЛП	7	корм	сс	-	7-9	5	7	7	вбіл
Гібридна 97		92047002	1999	387 /	СЛП	9	корм	сс		5	5	5	7	сбіл
Гібридна 85		99047002	2002	387 /	СП	7	корм	сс		5	5	5	7	вбіл
Євгена		05047002	2008	335 /	СЛП	8	корм	сс	-	7	5	8	8	вбіл
Знахідка		00047003	2004	399 /	П	7	корм	сс		>5	>5	8	7	вбіл
Ірина	®	03047002	2007	306 /	СЛП	7-9	корм	сс		>5	5	7-9	7-9	вбіл
Ліліана		05047001	2008	306 /	СЛП	8	корм	сс	-	7	6	7	8	вбіл
Маргарита		94047003	1999	306 /	ЛП	7	корм	сс		7	5	7	7	сбіл
Подільська 9		94047002	2000	306 /	СЛП	7	корм	сс		7	5	7	7	сбіл
Прибузька 19		92047004	1997	306 / 791	СЛ	9	корм	сс		7	5	5	7	сбіл
Подільська 18		92047003	1998	306 /	П	8	корм	сс		5	5	7	7	вбіл
Світлана		02047001	2006	306 /	ЛП	7-9	корм	сс		7-9	5	7	7	вбіл
Ярослава	®	03047001	2006	335 /	ЛП	7-9	корм	сс		7	5	7	7	вбіл
Пелюшка														
Зв"ягельська		01048001	2003	320 /	ЛП	5	корм	пс		7	5	7	8	сбіл
Поліська 1		98048002	2000	320 /	ЛП	5	корм	ср		7	5	5	7	сбіл
Конюшина відкритозіва														
Діана		97361001	1999	305 /	ЛП	7	ск	сс	7	7	5	7	7	сбіл
Конюшина олександрійська														
Оріана		92143001	1996	305 /	ЛП	7	корм	сс	5	7	5	7	7	вбіл
Люпин білий														
Борки		97055002	2000	345 / 345	ЛП	7-9	х,корм	скс		5	7	7	7	сбіл
Володимир		94055001	1998	345 / 345	ЛП	7	х,корм	сс		7	5	7	7	сбіл

Сорт				Код	Зона	Характеристики								
						Продук-тивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєст-рації	Заявник / Підтримувач						посухи	поля-гання	осипання	хвороб	
Вересневий		99055001	2003	345 / 345	ЛП	7-9	корм	сс		7	7	9	7	вбіл
Гарант		94055002	1998	429 /	ЛП	7	корм	сс		7	5	7	7	сбіл
Дієта		94055003	2004	345 / 345	ЛП	7-8	корм	скс		7-9	9	7-9	7	вбіл
Козелецький		87055008	1993	429 /	ЛП	7	х,корм	пс		7	5	7	7	сбіл
Либідь		00055001	2002	429 /	ЛП	7-9	корм	сс		7	7	7	7	сбіл
Макарівський		05055001	2008	345 /	ЛП	7	корм	сс	-	8	9	9	8	вбіл
Олєжка		84055007	1989	345 / 345	ЛП	5	корм	сс		5	5	5	5	сбіл
Піщовий		81055002	1987	345 / 345	ЛП	5	корм	сс		5	5	5	5	сбіл
Синій парус		87055003	1991	345 / 345	П	7	корм	рс		5	5	5	7	сбіл
Серпневий	®	03055001	2006	345 /	ЛП	7	корм	скс		7	7-9	7	5	вбіл
Туман		99055002	2002	345 / 345	ЛП	7	корм	сс		7	7-9	9	>5	сбіл
Люпин жовтий														
Бурштин		01057001	2004	345 / 345	ЛП	7	корм	скс		7	9	7-9	7	вбіл
Волинський 1		82057001	1985	307 /	ЛП	5	корм	сс		5	5	5	5	сбіл
Індустріальний		85057001	1991	320 /	П	5	корм	рс		5	5	5	7	сбіл
Круглик		01057002	2005	345 / 345	ЛП	7-9	корм	скс	-	7	7-9	7-9	7	вбіл
Лідер		98057001	2001	320 /	ЛП	7-9	корм	ср		7	7	7	7	сбіл
Обрій		98057002	2002	345 / 345	ЛП	>5	корм	сс		9	7	9	7	вбіл
Промінь (Ленінець)		87057001	1992	345 /	П	7	корм	сс		7	5	5	7	сбіл
Чернігівець		97057001	2001	429 /	ЛП	5	корм	скс		7-9	7	7	7	сбіл
Люпин вузьколистий														
Зірковий	®	04056001	2005	345 / 345	ЛП	7-9	сд	скс	-	7	7-9	7	7	сбіл
Пелікан		05056002	2008	345 /	ЛП	7	корм	рс	-	8	9	8	7	сбіл, мал
Серадела														
Іскорость		02132001	2003	320 /	ЛП	5	корм	рс		5	5	5	5	сбіл
Ольгінська		06132001	2008	320 /	П	8	корм	сс	-	9	5	5	7	сбіл
Горох кормовий														
Богун		88048006	1993	305 /	СЛП	7	корм	сс		7	5	7	7	сбіл

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач					посухи	поляган ня	осипання	хвороб	
Люлінецький 1		83048001	1986	304 /	С	5	корм	сс		5	5	5	5	сбіл
Подільський		81048005	1986	305 /	СЛ	5	корм	сс		5	5	5	5	сбіл
Резонатор		92048004	1997	404 / 404	СЛ	9	корм	сс		7	5	7	7	вбіл
Фундатор		03048001	2005	376 /	СЛП	7-9	корм	сс	-	7-9	7	7-9	7	вбіл
Харківський 74		73048002	1978	404 / 404	СЛП	5	корм	сп		5	5	5	5	сбіл
Буркун білий														
Грозинський		87044002	1992	320 /	П	7	ск, лп	сс	5	7	5	5	5	сбіл
Еней		87044003	1992	305 /	СЛ	7	ск, лп	сс	7	7	5	7	7	сбіл
Еспарцет														
Аметист донецький		99050001	2004	315 /	С	7	корм	сс	>5	7-9	7	-	7	вкліт, сбіл
Інгульський		71050001	1978	356 /	С	5	корм	ср	7	9	7	5	5	сбіл,вкліт
Костянтин		90050003	1996	356 /	С	7	корм	ср	5	7	7	7	7	сбіл,вкліт
Кіровоградський 27		87050002	1994	356 /	С	9	корм	сс	7	7	7	7	7	вбіл,вкліт
Кіровоградський 83		67050001	1974	356 /	СЛ	7	корм	ср	5	7	5	7	7	сбіл,вкліт
Кримський		97050001	2002	358 /	СЛ	7	корм	сс	5	9	7	7	5	сбіл,вкліт
Кіровоградський 22		98050001	2002	356 /	СЛ	9	корм	сс	5	7-9	7	5	7	сбіл,вкліт
Піщаний 1251		40050001	1948	388 / 388	СЛП	7	корм	сс	7	7	7	7	7	вбіл, вкліт
Смарагд		04050001	2007	356 /	СЛ	7	ск	сс	7-9	7-9	7	-	7	вбіл
Люцерна мінлива														
Вавіловка 2		90392001	1996	411 /	СЛ	7-9	ск	сс	7	7-9	7	7	7	вбіл
Веселка		92392001	1998	411 /	С	7	ск	сс	5	7	7	7	7	вбіл
Лідія		00392001	2005	387 /	СЛП	7	ск	сс	7-9	7	7	7-9	7	вбіл
Ласка	®	06392001	2007	378 /	СЛ	7-9	ск	сс	7-9	7	7	-	7	вбіл,вкліт
Люба		04392001	2007	378 /	СЛП	7	ск	ср	9,0	9,0	7,0	-	7	сбіл,вкліт
Росинка		03392001	2007	378 /	СЛ	5	ск	рс	7-9	7-9	7	-	7	сбіл,вкліт
Синська		80392001	1986	411 /	СЛ	7-9	ск	рс	5	7	7	7	7	вбіл
Унітро		89392001	1995	411 /	ЛП	9	ск	сс	7	7	7	7	7	вбіл
Херсонська 9		74392001	1979	411 /	С	5	ск	сс	5	5	5	5	5	сбіл

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продук-тивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєст-рації	Заявник / Підтримувач					посухи	поля-гання	осипання	хвороб	
Козлятник лікарський (кормовий)													
Гарант		01107002	2003	348 /	СЛП	8	ск,корм	сс	7	8	5	5	5	вбіл
Козлятник східний													
Донецький 90		90321001	1996	909 /	С	7	ск	сс	7	7-9	5	5	5	сбіл
Кавказький бранець		90321002	1996	348 /	Л	7	ск	сс	7	7-9	5	5	5	сбіл
Салют		00321001	2001	348 /	ЛП	7	ск	сс	7	7-9	5	5	5	сбіл
Конюшина лучна													
Атлас		75052001	1983	429 /	ЛП	7	корм	сс	>5	5	5	>5	5	сбіл
Анітра		94052001	1999	305 /	ЛП	5	корм	ср	>5	>5	7	7	>5	сбіл
Агрос 12		87052001	1993	429 /	СЛП	7	корм	сс	>5	7	7	5	7	сбіл
Дарунок		84052002	1991	345 / 345	ЛП	7	корм	рс	7	7	7	6	7	сбіл
Кумач		82052002	1989	345 / 345	ЛП	7	корм	рс	7	>5	7	7	7	сбіл
Кварта		94052004	2000	971 /	ЛП	8	корм	сп	>5	7	7	7	7	сбіл
Красуня		02052001	2006	334 /	ЛП	7-9	ск	рс	7	7	8		8	вбіл
Маруся		92052002	1998	345 / 345	ЛП	7-9	корм	сс	7	7	7	7	7	вбіл
Миронівська 45		68052001	1975	341 / 341	СЛ	5	корм	рс	5	>5	7	7	>5	сбіл
Мільвус		97052002	2002	807 / 807	ЛП	7	корм	рс	>5	>5	7	7	7	сбіл
Миронівська 5		94052003	2000	341 / 341	ЛП	7	корм	рс	>5	>5	7	7	5	сбіл
Мрія		97052003	2001	341 / 341	Л	7	корм	рс	7	5	7	5	7	сбіл
Носівська 5		51052002	1961	429 /	ЛП	>5	корм	рс	7	7	7	7	>5	сбіл
Носівська 4		64052001	1971	429 /	ЛП	5	корм	рс	5	>5	7	7	7	сбіл
Поліс		92052001	1996	345 / 345	ЛП	7-9	корм	рс	7	7	7	7	7	вбіл
Полтавська 75		60052003	1968	387 /	Л	7	корм	рс	>5	7	7	7	7	сбіл
Предкарпатська 33		71052003	1977	371 /	П	5	корм	рс	5	5	7	7	7	сбіл
Передкарпатська 6		92052003	1997	370 /	Л	7	корм	сс	7	5	7	7	>5	сбіл
Полянка		98052001	2003	345 / 345	П	7-9	корм	сс	7	7	7	7	7	вбіл
Спарта		99052001	2002	305 /	ЛП	7	корм	рс	7	>5	7	7	7	вбіл

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач					посухи	поляг-ання	осипання	хвороб	
Темпус		94052007	2000	946 /	ЛП	5	корм	сс	5	7	7	7	7	сбіл
Фалкон		03052001	2006	430 /	ЛП	7-9	ск	рс	7	8	7		7	вбіл
Конюшина гібридна														
Левада		94051001	2000	305 /	П	7	корм	рс	7	5	8	7	7	сбіл
Придністровська		01051001	2002	370 /	ЛП	9	корм	сс	7	7-9	7	7	7	вбіл
Рожева 27		73051001	1979	330 /	П	5	корм	сс	5	7	7	5	7	сбіл
Конюшина повзуча (біла)														
Даная		94053004	2000	305 /	ЛП	7	корм	рс	7	5	7	7	7	вбіл
Лишнянська		91053001	1997	370 /	П	7	корм	рс	7	5	7	7	7	вбіл
Ліфлекс		05053001	2006	600 /	СЛП		озл	рс	7	8			7	вдек
Міло		94053003	2000	724 /	П	7	корм	сс	5	7	7	7	7	сбіл
Муравка		05053002	2008	963 /	ЛП	8	корм	рс	9	7	5	9	9	вбіл
Предкарпатська 1		67053001	1979	370 /	П	7	корм	рс	5	5	5	>5	5	сбіл
Рівендел		98053002	2001	724 /	СЛП		озл	сс	5	7-9			7	вдек
Юра		04053001	2008	971 /	ЛП	7	корм	рснд	9	4	5	5	9	вбіл
Люцерна посівна														
Анді		88058001	1996	429 /	П	5	ск	сп	5	5	5	5	7	сбіл
Власта		00058001	2004	912 /	С	7-9	ск	сс	7	7-9	7-9	7	7	сбіл
Вінничанка		83058001	1989	305 /	Л	5	ск	сс	5	5	5	5	5	сбіл
Владислава		94058002	2001	430 /	СЛП	7-9	ск	сп	7	7	7	7	>5	вбіл
Веселоподолянська 11		57058001	1960	388 /	СЛП	7	ск, лп	сс	7	7	7	7	7	вбіл
Верко		81058002	1986	971 /	ЛП	5	ск	ср	5	5	5	5	5	сбіл
Віра		92058001	1999	387 /	СЛ	7	ск	ср	5	5	5	5	5	сбіл
Сва		98058001	2002	378 / 378	ЛП	7	ск	сс	7	7	7	7	>5	сбіл
Зайкевича		25058001	1931	387 /	СЛП	5	ск, лп	сс	5	5	5	5	5	сбіл
Зарниця		78058001	1982	378 / 378	С	5	ск	сс	5	5	5	5	5	сбіл
Капрі		97058001	2002	796 /	С	7	ск	сс	5	5	5	5	5	сбіл
Любава		90058021	1995	305 /	Л	5	ск, лп	сс	5	5	5	5	5	сбіл

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	полягання	осипання	хвороб	
Мрія одеська	90058023	1996	378 / 378	Л	5	ск	сс	5	5	7	5	5	сбіл
Надєжда	78058003	1982	411 /	СЛП	5	ск	сп	7	7	7	7	7	вбіл
Ольга	94058001	2000	345 / 345	П	5	ск	сс	5	5	7	7	7	сбіл
Планет	94058003	1999	600 / 807	СЛ	7-9	ск	сп	5	7	7	7	7	сбіл
Плато	94058004	2000	971 /	ЛП	7-9	ск	сп	5	7	7	7	7	вбіл
Полтавчанка	83058004	1987	387 /	СЛП	7-9	ск	рс	7	7	7	7	7	вбіл
Роксолана	89058004	1997	345 / 345	ЛП	7	ск	сс	5	5	7	7	7	сбіл
Регіна	92058004	1997	305 /	СЛ	5	ск	сс	5	7	5	7	7	сбіл
Радуга	75058002	1979	378 / 378	С	5	ск	сс	5	5	5	5	5	сбіл
Серафіма	99058001	2004	411 /	СЛП	7-9	ск	сс	7-9	9	7	7	7-9	біл
Світоч	92058002	1999	378 / 378	С	7	ск	ср	5	7	7	5	7	сбіл
Ярославна	82058002	1987	345 / 345	СЛП	7-9	ск	рс	7	7	7	7	7	вбіл
Люцерна хмелевидна													
Берегиня	94313002	1998	305 /	СЛП	7	лп	сс	7	7	7		7	сбіл
Лядвенець рогатий													
Аякс	97119001	2000	305 /	ЛП	7	лп	рс	7	7	5	5	7	сбіл
Ант	99119001	2001	305 /	СЛП	7	лп	сс	7	7	5	>5	7	вбіл
Динамо	01119001	2002	320 /	ПЛ	7	лп	сс	7	7	7	>5	7	вбіл
Лотос	90119001	1995	305 /	ЛП	7	лп	сс	7	7	5	7	7	сбіл
ОВіМарС-2	00119002	2002	324 /	ПЛ	7	лп	сп	7	9	5	7	7	вбіл
ОВіМарС-1	00119001	2002	324 /	ПЛ	7	ск	сп	5	7	5	5	>5	вбіл
Чина лісова гібридна													
Попелюшка	97356001	1998	348 /	ЛП	7-9	ск, сил	сс	7	7-9	5	7	7	сбіл
Щириця													
Атлант	90099001	1994	305 /	ЛП	7	сил	сс		7	7	7	7-9	вкліт
Ацтек	94099001	1998	305 /	СЛП	5	зерн	сс		7	7	7	5	вкліт
Галицька	99099001	2002	371 /	ЛП	5	зерн	рс		7	5	5	7	скліт
Жайвір	98099003	2000	348 /	СЛ	7	зерн	рс		7	7	5	>5	вкліт

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач					посухи	поляг-ання	осипання	хвороб	
Котигорошок		94099004	1999	305 /	Л	5	зерн	рс			5	7	7	скліт
Кремовий ранній		94099003	1998	348 /	П	7	сил	рс		7	7-9	7	7	скліт
Кармін		98099002	2000	348 /	ЛП	7	сил	рс		7-9	>5	7	7	вкліт
Легінь		91099001	1996	305 /	СЛП	7	зерн	сс		7-9	7	7	5	скліт
Лєра		02099002	2003	405 /	СЛП	7	зерн	сс		7	7	7	7	вкліт
Надія		97099002	2000	405 /	СЛП		озл, зріз	сс		7	7	7	7	дек
Орхідея		94099005	1999	305 /	СЛ	5	зерн	сс		5	7	7	7	скліт
Поліщук		97099003	1999	320 /	ЛП	5	зерн	сс		7-9	7	7	7	скліт
Роганський		98099001	2001	405 /	СЛП		озл, зріз	сс		7	7	5	7	дек
Стерх		88099001	1994	348 /	ЛП	7	сил	сс		7	9	7	7-9	скліт
Скіф		92099002	1998	371 /	П	7-9	сил	сс		7	7-9	7	7-9	скліт
Сем		02099001	2003	405 /	СЛП	7	зерн	сс		7	7	5	7	вкліт
Садівський		00099003	2003	392 /	ЛП	9	сил	пс		7	7		7	вкліт
Ультра		93099001	1998	405 /	СЛП	7-9	зерн	рс		7	7	7	7	скліт
Харківський 1		97099001	2001	405 /	СЛП		лік	сс		7	7	5	7	
Віниччя справжнє														
Істок		91113001	1995	909 /	С	7	сил	сп		7	7	5	7	скліт
Мальва кучерява														
Приазовська 84		91322001	1995	909 /	С	5	сил	сс		5	5	5	5	скліт
Рада		02322001	2003	348 /	СЛП	7-9	сил,корм	сп		7	7	5	7	вкліт
Унава		97322001	1999	348 /	СЛП	7-9	сил	сс		7	7	5	7	вкліт
Мальва пулхела														
Рюзана		98120001	2000	348 /	ЛП	7-9	корм,сил	ср		7-9	7	5	7	вкліт
Сильва		97120001	1998	348 /	СЛП	7-9	корм,сил	сс		7-9	7	5	7	вкліт
Мальва мелюка														
Кормела		97318001	1998	348 /	СЛП	7-9	корм,сил	сс		7-9	7	5	7	вкліт
Топінамбур														
Дієтичний		85138001	1990	348 /	СЛ	5	корм,овоч	сс	5	5	5		5	скліт

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продук-тивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєст-рації	Заявник / Підтримувач					посухи	поля-гання	осипання	хвороб	
Подільський 94		94138001	1999	417 /	ЛП	7	корм	сп	7	7	7		7	вкліт
Фіолет київський		98138001	2000	348 /	ЛП	7-9	корм	сс	7	7	7		7	вкліт
Топінсоняшник														
Старт		98334001	2000	348 /	ЛП	7-9	корм	пс	7	7	7		7	вкліт
Лаватера тюрінгська														
Стугна-1		97170001	1999	348 /	СЛП	7-9	сил	ср	7	7	7	5	7	скліт
Щавель тяншанський														
Румекс ОК-2		00142001	2001	348 /	СЛП	9	корм	сс	7	7-9	7	7	7	вкліт
Сильфій пронизанолистий														
Канадчанка		90134001	1996	348 /	СЛ	7	сил	рс		7	7	5	7	скліт
Свербига східна														
Золотінка		89131001	1996	348 /	Л	7	сил	сс		7-9	7	5	7	скліт
Тіфон														
Оракам		97282001	1998	348 /	Л	7	сил, корм	сс		7	5	5	7	скліт
Фацелія														
Аліна		91199004	1995	302 /	ЛП	9	мед,корм	сс		7	5	7	7	скліт
Мальва гібридна														
Ніка		00299001	2001	348 /	СЛП	7-9	корм, сил	сс		7-9	7	5	7	вкліт
Сіда багаторічна														
Вірджінія		00283001	2001	348 /	СЛП	7-9	корм	сс	7	7	7	5	7	вкліт
Турнепс														
Сонячний ранок		06140001	2008	1163 /	ЛП	9	корм	сс	-	7	-	-	9	-
Гарбуз кормовий														
Валок		88102002	1993	310 /	С	7	корм	сс		7			7	вкліт
Гібрид 72		55102001	1959	387 /	СЛ	5	корм	сс		5			5	скліт
Кавбуз Здоров'яга		99102002	2003	808 /	ЛП	9	корм	пс		7			7	вкліт

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продук-тивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєст-рації	Заявник / Підтримувач					посухи	поля-гання	осипання	хвороб	
Пирій середній													
Вітас		04423001	2005	337 /	СЛП	7-9	ск,лп	сс	7-9	7-9	7	7	7	сбіл, вкліт
Щавнат													
Біекор-1	®	04424001	2005	463 /	ЛП	7-9	корм,овоч	ср	7-9	7-9	7	7-9	7	вбіл,скліт
Люцерна жовта (серповидна)													
Наречена Півночі	®	05462001	2007	345 /	ЛП	7-9	ск,лп	сс	7-9	7	7-9		7	вбіл,вкліт
Еспарцет закавказький													
Адам		02050001	2008	378 /	СЛП	8	корм	сс	8	8	8	-	9	вбіл
Блиск		01050001	2006	378 /	С	5-9	корм	сс	7	7	7	-	7	вбіл
Сільськогосподарські: овочеві													
Баклажан													
Анет F1		05022005	2006	753 /	СЛ	9	салат	рс	7	7			7-9	
Адоніс F1		98022004	2002	402 /	С	7-9	ун	рс	7-9	7-9			7	
Буян		05022009	2008	313 /	Сл	7	ун	рс	7	7			7	
Віола	®	04022003	2007	1054 /	ЗГр	7-9	ун	ср	7	7			7	
Вагомий		02022001	2004	1054 / 1054	ЗГр(ПТ)	7	салат	рн	7	7			7	
Геліос		98022002	2002	313 /	С	7-9	конс	ср	7	5			7	
Спик F1		98022001	2005	744 /	С	7-9	ун	рс	7	7			7	
Калігула		05022001	2008	635 /	СЛ	7	ун	рс	7	7			7	
Коломбо		05022012	2008	1163 /	Сл	7	ун	рс	7	7			7	
Кашалот		06022004	2007	703 /	ЗГр	7	ун	рс	7	7			7	
Ліловий ранок		02022003	2005	736 /	С	7-9	унів	рс	7	7			7	
Лонг Поп	®	04022001	2006	1163 /	СЛ	7	ун	сс	7	7			7	
Міледа F1		05022008	2008	1050 /	СЛ	7	стл	сс	7	7			7	
Оріон		05022003	2006	1197 /	Зг	9	ун	рс	7	7			7	ун
Прем"єр		05022002	2008	402 /	СЛ	7	ун	сс	7	7			7	
Пущанський-60	®	04022002	2007	1054 /	ЗГр	7	ун	рс	7	7			9	

Сорт				Код	Зона	Характеристики								
						Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляган ня	осипання	хвороб	
Робін Гуд		06022005	2007	703 /	ЗГр	5	ун	рс	5	5			5	
Сауран	®	03022001	2006	313 /	СЛ	7	ун	сс	7	7			7	ун
Тірренія F1		05022004	2006	753 /	СЛ	9	ун	рс	7	7			7-9	ун
Ультраранній F1		98022003	2001	402 /	СЛП	7	пер	рс	7	7			7	пер
Фабіна F1		95022001	2000	900 /	СЛП	7	конс	ср	7-9	7-9			7	конс
Алмаз		96022003	1983	313 /										
Фарама F1	®	04022004	2007	900 /	ЗГр	7	ун	рс	7	7			7	
Боби кінські														
Переможець		05043001	2008	330 /	ЛП	9	корм	сс	-	8	9	9	8	вбіл
Буряк столовий														
Січовий		05023004	2008	635 /	СЛП	7	ун	сс	7	7			7	
Атоман	®	04023004	2006	293 /	СЛП	7	ун	сс	7	7			7	
Астар F1		02023006	2006	1072 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Болтарді		96023001	1999	1050 /	СЛП	9	ун	сс	7-9	7-9			7-9	
Болівар		81023002	1999	753 /	СЛП	9	ун	сс	7	7			7-9	
Бастард		05023003	2008	635 /	СОП	пс	ун	7	7				7	
Бікорес		07023002	2008	751 /	Зг,Ст	7-9	ун	сс	7	7			7	
Боро F1	®	02023005	2006	751 /	СЛП	7	ун	сп	7	7			9	
Бордо київський	®	04023005	2007	343 /	СЛП	7	стл	сс	7	7				
Буллет		98023002	2002	1013 /	ЛП	9	ун	сс	7	7			9	
Багряний		96023003	2000	402 /	СЛП	7	ун	сс	7-9	7-9			7	
Бона		97023001	2001	969 /	ЛП	7-9	ун	сс	7-9	7-9			7	
Бордо харківський		96023002	2000	402 /	СЛП	9	ун	сс	9	9			9	
Водан F1		03023003	2006	751 /	СЛП	7	ун	сс	7	7			7	
Ворріор F1		97023005	2001	900 /	СП	9	ун	сс	9	9			9	
Дій		81023001	1997	402 /	СЛП	7		сс	9	7			7	
Двонасінний		75023001	1990	157 /	СЛП	5	ун	сс	7	7			7	
Делікатесний		90023006	1994	339 /	СЛП	7	ун	сс	7	7			7	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач					посухи	поляг-ання	осипання	хвороб	
Детроит 2 - Неро		03023001	2004	744 /	С,Л,П	9	свж	рс	7-9	7-9		9	
Ефіоп		03023005	2008	647 /	СЛП	7	ун	пс	7	7		7	
Сгіпос	®	02023002	2005	1163 /	СП	7-9	свж	рс	7	7		7	
Зміна		92023001	1996	339 /	СЛП	7	ун	сс	7	7		7	
Кардинал		05023006	2008	1163 /	СОП	7	ун	пс	7	7		7	
Кедрі	®	02023003	2006	1163 /	СЛП	7	ун	сс	7	7		7	
Кадет	®	04023003	2006	293 /	СЛП	7	ун	сс	7	7		7	
Ларка	®	04023001	2007	1102 /	СЛП	7-9	стл	ср	7	7			7-9
Лома	®	04023002	2007	1102 /	СЛП	9	стл	рс	7	7		7	
Ліко	®	02023001	2006	339 /	СЛП	7	ун	сс	7	7		7	
Ліберо		00023001	2002	1102 /	С	9	ун	рс	9	9		9	
Моніка	®	05023001	2006	888 /	СЛП	7	ун	сс	7	7		7	
Носівський плоский		34023001	1937	430 /	СЛП	5	ун	сс	5	5		7	
Нобол		06023004	2008	900 /	СЛП	7-9	ун	сс	7	7		9	
Опольський	®	02023004	2005	1084 /	СЛП	7-9	стл	ср	7	7		7	
Ривал F1		06023005	2007	707 /	СЛП	7	стл	сс	7	7		7	
Регульський циліндр		03023002	2006	1081 /	СЛП	7	ун	сс	7	7		7	
Регала		92023007	1997	751 /	СЛП	7	ун	сс	7-9	7-9		7	
Ройал Цилиндра F1		03023004	2005	744 /	С	7-9	стл	рс	7	7		7-9	
Цітадела	®	05023002	2007	888 /	СЛП	7-9	стл	сс	7	7			
Червона куля		65023001	1991	712 /	СЛП	7	ун	сс	7	7		7	
Вівсяний корінь													
Поляна		91146001	1994	339 /	СЛП	7	ун	сс	7	7		7	ун
Гірчиця салатна													
Зорянка		03144001	2005	984 /	СЛП	7	унів	рс	7	7		7	
Гарбуз													
Арабатський		80102002	1985	357 / 357	СЛ	5	ун	сс	5	5		5	
Альтаїр		02102003	2004	410 /	С,Л	7	овоч	рс	7	7		7	

Сорт				Код	Зона	Характеристики							
						Продук-тивність	Напрям викорис-тання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)			Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєст-рації	Заявник / Підтримувач						посухи	поля-гання	осипання	хвороб	
Гілея		92102001	1996	410 /	СЛП	7	ун	сс	7	7			7	
Гамлет		02102001	2004	310 /	С,Л	7	овоч	рс	7	7			7	
Диво		01102001	2004	410 /	С	7	овоч	ср	7	7			7	
Ждана		94102002	2000	310 /	СЛП	7	ун	сс	7	7			7	
Лель		94102001	1998	310 /	СЛП	7	ун	сс	7	7			7	
Мозоліївський 15		49102003	1950	402 /	СЛП	5	ун	сс	5	5			5	
Новинка		84102001	1993	410 /	СЛП	5	ун	сс	5	5			5	
Піза		03102001	2004	1081 /	С,Л	7-9	овоч	рс	7	7			7	
Польовичка		97102002	2001	410 /	Л	7	ун	сс	7	7			7	
Південний		99102003	2003	410 /	С	7-9	ун	рс	7	7			7	
Славута		80102005	1987	310 /	СЛП	5	ун	сс	5	5			5	
Світень		99102001	2003	310 /	С	7	ун	сс	7	7			7	
Український багатоплідний		49102004	1950	310 /	СЛП	5	ун	сс	5	5			5	
Херсонський		73102001	1982	410 /	СЛП	5	ун	сс	5	5			5	
Горох овочевий														
Авола АС		97024003	1999	744 /	СЛП	7-9	конс	рс	7	7			7	
Бастіон		05024001	2008	753 /	СЛП	9	ун	ср	7	7			7	
Віолена		92024003	1997	339 /	СЛП	5	конс	рс	5	5			5	
Вікма		97024005	2001	339 /	ЛП	7	конс	рс	7	7			7	
Вада		05024002	2008	753 /	СЛП	9	ун	ср	7	7			7	
Гермес		89024001	1994	339 /	СЛП	5	конс	рс	5	5			5	
Гунтер		97024004	2001	969 /	П	7	конс	рс	7	7			7	
Дінга		92024004	1995	721 /	СЛП	5	конс	рс	5	5			5	
Добриня		03024001	2007	309 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Женева		05024004	2008	753 /	СЛП	9	ун	ср	7	7			7	
Каскад		92024001	1997	313 /	СЛП	7	конс	сс	7	7			7	
Каріна		05024003	2008	753 /	СЛП	9	ун	рс	7	7			7	
Ода		04024007	2008	506 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	

Сорт				Код	Зона	Характеристики							
						Продук-тивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)			Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поля-гання	осипання	хвороб	
Овочеве диво		99024002	2003	1121 /	СЛП	7-9	конс	сс	7	7			7	
Пегас		89024005	1995	339 /	СЛП	5	конс	сс	5	5			5	
Селена		92024002	1996	339 /	СЛП	5	конс	сс	5	5			5	
Салют ДТР		01024002	2005	974 /	П	7-9	унів	рс	7	7			7	
Стригунок		02024001	2005	339 /	П	7	унів	рс	7	7			7	
Стриж		04024010	2008	177 /	СЛП	7	ун	ср	7	7			7	
Уладовський харчовик ов.		98024001	2001	304 /	СЛП	7-9	ун	рс	7	7			7	
Диня														
Сега F1		06025002	2007	786 /	ЗГр	7	свж	рс	7	7			7	
Алушта		84025002	1989	357 / 357	СЛ	5	свж	рс	5	5			5	
Амал F1	®	04025002	2007	900 /	СЛ	7	свж	рс	7	7			7	
Альтанка	®	03025003	2006	313 /										
Анзер F1		06025003	2007	786 /	ЗГр	7	свж	рс	7	7			7	
Борівчанка	®	05025005	2007	1054 /	ЗГр	7	свж	рс	7	7			7	
Берегиня		91025002	1995	310 /	Л	5	свж	сс	5	5			5	
Голянка		85025003	1990	410 /	С	5	свж	рс	5	5			5	
Гопрінка		86025001	1991	410 /	С	5	свж	ср	5	5			5	
Грідоу F1		00025002	2003	900 /	Л	7-9	свж	рс	7	7			7-9	
Голді ТЗ F1		06025001	2008	900 /										
Дідона		03025002	2007	410 /	Сл	7	свж	рс	7	7			7	
Думка	®	02025004	2007	310 /	Сл	7	свж	рс	7	7			7	
Дачниця		97025001	2001	1044 /	С	7	свж	сс	7	7			7	
Діана	®	02025003	2007	312 /	СЛ	7	ун	рс	7	7			7	
Злата		99025001	2003	310 /	Л	7-9	свж	рс	7	7			7-9	
Заряна F1		03025001	2004	744 /	С	7-9	стл	рн	7-9	7-9			7-9	
Забавка	®	02025005	2007	310 /	СЛ	7	ун	рс	7	7			7	
Інея		88025001	1992	310 /	СЛ	5	свж	сс	5	5			5	
Інгулка		99025003	2003	410 /	Л	7-9	свж	рс	7	7			7	

Сорт				Код	Зона	Характеристики								
						Продук-тивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєст-рації	Заявник / Підтримувач						посухи	поля-гання	осипання	хвороб	
Криничанка		80025002	1985	402 /	СЛ	5	свж	рс	5	5			5	
Константа F1		00025004	2003	753 /	Л	7-9	свж	рс	7	7			7	
Киянка	®	02025001	2005	1054 /	С,ЗГ	7	унів	рс	7	7			7	
Липнева		90025001	1995	310 /	СЛП	5	свж	рс	5	5			5	
Лада		92025001	1998	410 /	СЛП	5	свж	сс	5	5			5	
Монарх		05025013	2007	840 /	ЗГр	7	свж	рс	7	7			7	
Мулатка	®	02025006	2007	312 /	СЛ	7	ун	рс	7	7			7	
Ольвія		02025007	2007	410 /	Сл	7	ун	рс	7	7			7	
Рада F1		02025002	2004	343 /	ЗГр(Пт)	7-9	стл	рн	7	7			7	
Серпянка		89025003	1997	410 /	СЛП	5	свж	рс	5	5			5	
Самарська		82025001	1983	310 /	С	5	свж	сс	5	5			5	
Супер Стар F1		97025002	2001	900 /	С	7-9	свж	рс	7	9			7-9	
Тітовка		94025003	2000	310 /	СЛП	7	свж	рс	7	7			7	
Кабачок														
Аеронавт		83026001	1989	313 /	П	5	конс, стл	рс	5	5			5	
Алія F1		03026001	2006	900 /	СЛ	7-9	ун	рс	7	7			7-9	
Барбі		05026002	2008	635 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Грибовський 37		42026001	1955	149 /	СЛП	5	конс, стл	рс	5	5			5	
Гайдамака		03026004	2007	410 /	СЛП	5	ун	сс	7	7			5	
Езра F1		06026001	2008	887 /	СЛП	7	ун	сс	7	7			7	
Золотінка		87026001	1993	410 /	СЛП	5	конс, стл	рс	5	5			5	
Искандер F1		00026001	2001	744 /	СЛП	7-9	ун	рс	7-9	7-9			7-9	
Кавілі F1		00026003	2003	753 /	СЛ	7-9	ун	рс	7-9	7-9			9	
Кларнет F1		05026007	2008	1163 /	СЛП	7	ун	сс	7	7			7	
Лебідь		05026003	2008	635 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Медуза F1		05026001	2007	786 /	СЛП	5	ун	сс	7	7			5	
Мостра F1		06026004	2008	900 /	ЗГр,Ст	7	ун	рс	7	7			7	
Нефріт F1		03026003	2004	1081 /	С,Л	7	стл	рн	7	7			7	
Одеський 52		49026002	1950	381 /	СЛП	5	конс, стл	рс	5	5			5	

Сорт				Код	Зона	Характеристики							
						Продук-тивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)			Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєст-рації	Заявник / Підтримувач						посухи	поля-гання	осипання	хвороб	
Опал F1		03026002	2006	900 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Престиж F1		05026005	2008	313 /	СЛП	7	ун	сс	7	7			7	
Скворушка		91026001	1997	313 /	СЛП	7-9	конс, стл	рс	5	7			7	
Сорая		98026001	2001	1081 /	С	7	пер	рс	7	7			7	
Садко F1		00026004	2006	1044 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Світозар		99026001	2003	313 /	Л	7-9	ун	рс	7	7			7	
Таміно F1		00026002	2003	900 /	С	7-9	ун	сс	7	7			9	
Чаклун		99026002	2002	402 /	ЛП	7-9	ун	рс	7	7			7	
Кавун														
Атлант		01027004	2004	410 /	С,Л	7	стл	рс	7	7			7	
Альянс		02027002	2007	410 /	СЛ	7	ун	рс	7	7			7	
Борчанський		79027002	1983	402 /	СЛП	5	свж, зс	рс	5	5			5	
Восход		78027001	1987	410 /	СЛ	5	свж, зс	сс	5	5			5	
Васко F1		05027001	2006	887 /	СЛ	7	ун	рс	7	7			7	
Гетьман		97027005	2001	1067 /	СЛ	7	свж	рс	7	7			7	
Голопристаньський		85027009	1990	410 /	СЛ	5	свж, зс	рс	5	5			5	
Граніт F1		99027001	2001	1050 /	С	7-9	свж	рс	7	7			7	
Гарний		95027001	1999	402 /	СЛП	7	свж, зс	рс	7	7			7	
Дебют F1		01027010	2005	410 /	СЛ	7	всж	рс	7	7			7	
Дарунок		01027002	2004	410 /	С	7	стл	рс	7	7			7	
Думара F1		80027001	1999	753 /	СЛ	5	свж, зс	рс	5	5			5	
Долбі F1		99027003	2002	753 /	СЛ	7	свж	рс	7	7			7	
Єврика F1		99027005	2001	744 /	С	7	свж	рс	7	7			7	
Зоряний		97027016	2001	310 /	С	7	свж	сс	7	7			7	
Красень		85027003	1991	410 /	С	5	свж, зс	сс	5	5			5	
Козацький		97027006	2001	1067 /	СЛ	7	свж	рс	7	7			7	
Крімсон Світ ХМ		96027001	1999	1012 /	С	7-9	свж, зс	ср	7	7			7	
Крісбі F1		94027002	1997	753 /	СЛП	7	свж, зс	рс	5	5			5	
Каховський		97027013	2001	410 /	С	7	свж	сс	7	7			7	

Сорт				Код	Зона	Характеристики							
						Продук-тивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)			Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєст-рації	Заявник / Підтримувач						посухи	поля-гання	осипання	хвороб	
Княжич		99027006	2003	410 /	С	7	свж	рс	7	7			7	
Кримсон Глори F1		03027001	2004	744 /	С,Л	7-9	стл	рн	7	7			7-9	
Легінь		97027004	2001	410 /	СЛ	7	свж	рс	7	7			7	
Леді F1		98027002	2001	753 /	С	7-9	свж	рс	7	7			9	
Мишутка	®	04027001	2007	1054 /	ЗГр	7	ун	рс	7	7			7	
Мелітопольський 60		50027001	1953	310 /	СЛ	5	свж, зс	сп	5	5			5	
Мадера F1		97027009	2001	744 /	С	7	свж	рс	7	7			7	
Новорічний		01027001	2004	410 /	С,Л	7	стл	сс	7	7			7	
Нікопольський		97027011	2001	310 /	С	7	свж	сс	7	7			7	
Обрій F1		94027001	1998	310 /	СЛП	7	свж, зс	рс	5	5			5	
Орфей		92027001	1997	410 /	СЛП	7	свж, зс	рс	5	5			7	
Огоньок		55027004	1960	402 /	СЛ	5	свж, зс	рс	5	5			5	
Порційний		03027003	2006	410 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Північне Сяйво		97027012	2001	310 /	С	7	свж	рс	7	7			7	
Рясний		91027003	1997	410 /	СЛП	5	свж, зс	сп	5	5			5	
Ройал Мєджести F1		98027003	2001	744 /	С	7-9	свж	рс	7	7			7	
Ройал Кримсон Свит		03027002	2004	744 /	С	7-9	стл	рн	7	7			9	
Серьоженька		91027004	1997	410 /	СЛП	5	свж, зс	рс	5	5			5	
Січеслав		91027006	1995	310 /	П	5	свж, зс	сс	5	5			5	
Сніжок		81027003	1987	410 /	С	5	свж, зс	сп	5	5			5	
Сотник		01027006	2003	410 /	С	7	свж	рс	7	7			7	
Скарб		94027003	2000	310 /	С	7	свж	рс	7	7			7	
Стетсон F1	®	04027002	2007	900 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Таврійський		78027005	1982	410 /	СЛ	5	свж, зс	сс	5	5			5	
Трофі F1		84027004	1999	753 /	С	5	свж, зс	ср	5	5			5	
Фаворит		02027001	2006	310 /	СЛ	7	ун	рс	7	7			7	
Херсонський		01027007	2005	410 /	С	7	свж	рс	7	7			7	
Чорногорець		91027005	1997	402 /	СЛП	7	свж, зс	рс	5	5			7	
Широнінський		86027002	1990	402 /	Л	5	свж, зс	сс	5	5			5	

Сорт				Код	Зона	Характеристики								
						Продук-тивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєст-рації	Заявник / Підтримувач						посухи	поля-гання	осипання	хвороб	
Кенді МС F1		05027002	2007	786 /	СЛ	7	ун	рс	7	7			7	
Спаський		03027004	2007	410 /	СЛ	7	ун	рс	7	7			7	
Фарао F1		01027011	2006	1050 /	СЛ	7	ун	рс	7	7			7	
Капуста білоголова														
Адмірал F1		95028002	2000	900 /	ЛП	7	сал	рс	7	7			7	
Амагер 611		37028001	1950	149 /	СЛП	5	зс	пс	7	7			5	
Адема F1		03028011	2004	1102 /	С,Л,П	9	ун	сс	9	9			9	
Амтрак F1		92028010	2001	751 /	СЛ	9	ун	пс	7	7			9	
Атрия F1		94028003	1997	744 /	СЛП	9	ун	пс	7	7			7	
Агрессор F1		01028001	2003	1050 /	СЛ	9	ун	сп	9	7			9	
Арривист F1		98028010	2001	744 /	СЛ	7-9	сал	рс	7	7			9	
Арос F1		97028001	2001	969 /	СЛП	9	ун	пс	7	7			9	
Анкома F1		99028002	2001	1102 /	П	9	ун	пс	7	7			9	
Аммон F1		03028009	2004	744 /	С	9	ун	пс	9	9			9	
Аніта F1		02028009	2006	1072 /	СЛП	7	свж	рс	7	7			7	
Блоктор F1		05028004	2006	1050 /	СЛП	7	ун	пс	7	7			7	
Білосніжка		68028002	1974	402 /	СЛП	5-7	зс	пс	7	5			7	
Бартоло F1		92028011	1997	751 /	СЛП	7-9	зс	пс	9	9			9	
Балбро F1		01028002	2003	887 /	Л	7	ун	сс	7	7			9	
Бронко F1		94028010	1997	751 /	СЛП	7	зс	пс	7	7			7	
Бригадир F1		99028006	2003	900 /	ЛП	9	пер	сп	7	7			9	
Брага F1		98028004	2002	1013 /	ЛП	7	ун	пс	7	7			7	
Бородін F1		06028003	2008	887 /	СЛП	7	ун	рн	7	7			7	
Бірюза	®	04028013	2006	293 /	СЛП	7	ун	сп	7	7			9	
Бенсон F1		98028002	2001	751 /	СЛ	9	сал	рс	7	7			9	
Белтис F1		03028016	2005	744 /	С	7-9	унів	сс	7	7			7	
Віоланта	®	91028002	1995	343 / 343	СЛП	5-7	ун	пс	7	7			7	
Веснянка		94028001	1997	339 /	СЛП	7	сал	рс	7	7			7	
Вестри F1		97028005	2001	744 /	П	9	сал	рс	7	7			9	

Сорт				Код	Зона	Характеристики							
						Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)			Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляг-ання	осипання	хвороб	
Галакси F1		95028005	1998	744 /	СЛП	9	ун	пс	9	7			7	
Герда		05028012	2008	1163 /	СЛП	7	ун	пс	7	7			7	
Гранада F1	®	04028012	2006	293 /	СЛП	7	ун	сс	7	7			7	
Гермес F1		97028006	2001	744 /	П	9	ун	сп	7	7			9	
Діта		94028006	1999	969 /	СЛП	9	сал	рс	7	7			9	
Дитмаршер фрюер		57028001	1966	721 /	СЛП	7	сал	рс	7	7			7	
Дидон F1		03028013	2005	744 /	СЛ	7-9	свж	рс	7	7			7-9	
Ердено F1		84028002	1996	1050 /	СЛП	9	ун	пс	7	7			9	
Експрес F1		00028003	2003	1044 /	СЛ	7	ун	рс	7	7			7	
Ельвіра F1	®	04028015	2006	293 /	СЛП	7	ун	ср	7	7			9	
Єленовська	®	77028002	1982	343 / 343	СЛП	5	ун	сп	5	5			5	
Єтма F1		99028003	2001	1102 /	СЛ	9	сал	рс	7	7			9	
Жозефіна	®	92028001	1997	343 / 343	СЛП	7	ун	сп	7	7			7	
Золотий Акр	®	02028005	2006	1163 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Иксион F1		03028014	2005	744 /	СЛ	7-9	свж	рс	7	7			7-9	
Іюньська		67028002	1971	149 /	СЛП	5	сал	рс	5-7	5-7			5	
Коронет F1		96028001	1999	753 /	СЛП	7	ун	сп	7	7			7-9	
Куісто F1		96028002	1999	1050 /	СЛП	9	ун	пс	9	9			9	
Каунт F1	®	03028003	2006	900 /	СЛП	9	ун	пс	7	7			9	
Каунтер F1		03028012	2006	751 /	СЛП	7	ун	сс	7	7			7	
Краутман F1		92028015	1997	751 /	СЛП	7	зс	пс	7	7			7	
Колорит F1		04028002	2008	888 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Княгиня		94028016	2001	343 /	СЛП	7	ун	пс	7	7			7	
Куізор F1		05028005	2006	1050 /	СЛП	7	ун	сс	7	7			9	
Колобок F1	®	03028008	2006	964 /	СЛП	7	ун	сп	7	7			7	
Капорал F1	®	03028002	2006	900 /	СЛП	7	свж	сс	7	7			9	
Каліна F1		02028008	2005	1072 /	Л	7	унів	пс	7-9	7			7	
Кріптон F1		05028001	2006	887 /	СЛП	7	ун	пс	7	7			9	
Кастелло F1		06028004	2008	887 /	СЛП	7-9	ун	ср	7	7			7	

Сорт			Код	Зона	Характеристики							
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)			Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач					посухи	поляг-ання	осипання	хвороб	
Калібро F1		01028006	2005	888 /	ЛП	7	унів	сс	7	7			7
Камінна голова		,	2004	1081 /	С,Л,П	9	ун	сс	7	7			9
Камбрія F1		07028007	2008	751 /	Зг,Ст	7	ун	сс	7	7			7
Крюмон F1	®	03028007	2006	964 /	СЛП	7	ун	пс	7	7			9
Лєннокс F1		92028014	1999	751 /	Л	9	ун	пс	7	7			9
Лангедейкер децема		72028005	1989	999 /	СЛП	7	зс	пс	7	7			7
Ліка		80028001	1985	402 /	СЛП	5	зс	пс	5	5			7
Лангесвит Бевар	®	02028004	2006	1163 /	СЛП	7	ун	сп	7	7			9
Леся		95028001	1999	402 /	СЛП	7	ун	пс	7	7			7
Ліон F1		02028003	2005	887 /	СП	7	унів	пс	7	7			7
Леопольд F1		07028006	2008	751 /	Зг,Ст	7	ун	сс	7	7			7
Марабу F1	®	03028001	2006	900 /	СЛП	7	ун	пс	9	7			9
Мидор F1		94028007	1999	969 /	СЛП	9	зс	сп	7	7			7
Мегатон F1		92028021	1997	751 /	СЛП	9	ун	сс	7	7			9
Мандарин F1		94028005	1997	900 /	СЛП	7-9	зс	пс	7-9	7			7-9
Марселло F1		99028005	2002	1102 /	СЛП	9	ун	сс	7	7			9
Менді F1		07028005	2008	751 /	Зг, Ст	9	ун	сс	7	7			7
Мушкетер F1		97028008	1999	1050 /	СЛП	9	сал	рс	9	9			9
Меджик F1		06028009	2008	900 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7
Новатор F1		05028003	2006	1050 /	СЛП	7	ун	пс	9	7			9
Ольга	®	00028002	2003	343 /	СЛ	7	ун	пс	7	7			7
Оракл F1		06028008	2008	900 /	СЛП	9	ун	рс	7	7			7
Олімп		97028002	2001	969 /	СЛП	9	ун	пс	7	7			9
Орион F1		03028010	2004	744 /	С	9	сал	рс	9	9			9
Парел F1		90028012	1997	751 /	СЛП	7-9	сал	рс	7	7			7-9
Пандион F1		02028002	2003	744 /	СЛ	9	сал	рс	7	7			9
Ринда F1		97028007	1999	744 /	П	9	сал	ср	7	7			9
Резістор F1		99028009	2001	1050 /	СЛП	9	сал	рс	7	7			9
Руссо F1		06028001	2008	887 /	СЛП	7	ун	пс	7	7			7

Сорт				Код	Зона	Характеристики							
						Продук-тивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)			Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєст-рації	Заявник / Підтримувач						посухи	поля-гання	осипання	хвороб	
Ріспект F1	®	04028014	2006	293 /	СЛП	7	ун	сп	7	7			9	
Росава		94028017	1999	343 /	СЛП	7	сал	ср	7	7			7	
Саратога F1		92028009	2001	751 /	ЛП	9	ун	пс	7	7			9	
Столична	®	79028005	1983	343 / 343	СЛП	5	зс	сп	5	5			5	
Славія	®	04028001	2006	1163 /	СЛП	7	ун	сс	7	7			9	
Супер казачок F1	®	00028001	2003	1044 /	СЛ	9	ун	пс	7	7			7	
Сілема F1	®	04028010	2007	1102 /	СЛп	7	ун	сп	7	7			7	
Старт F1		99028001	2003	888 /	ЛП	9	сал	рс	7	7			7	
Структон F1		06028002	2008	887 /	СЛП	7	ун	пс	7	7			7	
Супер екстра F1		97028003	2001	1044 /	СЛП	9	ун	пс	7-9	7-9			7	
Сюрприз F1		02028006	2005	751 /	СЛ	7	свж	рс	7	7			7	
Трансам F1		94028012	1999	751 /	Л	7	ун	пс	7	7			7	
Тетянка		94028015	2000	343 /	СЛП	7	ун	сп	7	7			7	
Терас F1		03028015	2005	744 /	С	7-9	унів	сс	7	7			7-9	
Томас F1		06028006	2008	751 /	СЛП	9	ун	ср	7	7			9	
Тарас F1	®	03028004	2006	647 /	СЛП	7	ун	сс	7-9	7			9	
Українська осінь		83028003	1987	402 /	СЛП	7	зс	пс	7	7			7	
Увертюра	®	04028006	2006	1163 /	СЛП	7	7	рс	7	7			7	
Фарао F1		91028003	2001	751 /	СЛ	9	сал	рс	7-9	7-9			9	
Футошки		98028008	2001	879 /	СЛП	9	сал	рс	7	7			9	
Хінова F1		92028005	1997	751 /	СЛП	7	ун	пс	7	7			7	
Харківська зимова		71028002	1976	402 /	СЛП	7	зс	пс	7	7			7	
Харікейн F1		02028007	2006	751 /	СЛП	7	ун	сс	7	7			7	
Чіз F1		94028004	1997	900 /	СЛП	7-9	ун	пс	7	7			7	
Чесма F1		99028004	2001	1102 /	СЛ	9	сал	рс	9	9			9	
Ярославна		90028006	1993	402 /	СЛП	7	зс	пс	5	5			7	
Яна	®	99028008	2002	402 / 402	П	9	ун	пс	9	7			7	
Авак F1		05028009	2008	888 /	СЛП	7	ун	пс	9	9			9	
Геліос F1		04028005	2008	888 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	

Сорт				Код	Зона	Характеристики								
						Продук-тивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєст-рації	Заявник / Підтримувач						посухи	поля-гання	осипання	хвороб	
Гігант F1		06028011	2008	900 /	СЛП	7	ун	пс	7	7			7	
Кубок F1		06028010	2008	900 /	СЛП	7	ун	ср	7	7			7	
Мерідор F1		04028004	2008	888 /	СЛП	7	ун	пс	7	7			7	
Селма F1	®	04028008	2007	1102 /	СЛП	7-9	ун	сп	7	7			7	
Толеро F1		04028003	2008	888 /	СЛП	7	ун	пс	7	7			7	
Талсма F1	®	04028009	2007	1102 /	СЛП	7-9	ун	сс	7	7			7	
Центуріон F1		06028007	2008	900 /	СЛП	9	ун	пс	7	7			7	
Віват F1		05028007	2008	964 /	СЛП	7	ун	пс	7	7			7	
Калорама F1	®	04028011	2007	1102 /	СЛП	7-9	ун	пс	7	7			7	
Мостар F1		05028008	2007	786 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Парадокс F1		06028005	2008	751 /	СЛП	7-9	ун	пс	7	7			7	
Перлина F1		05028006	2007	647 /	СЛП	7	ун	сс	7	7			7	
Скіф F1		06028012	2008	900 /	СЛП	7	ун	пс	7	7			7	
Капуста броколі														
Вітамінна		74148001	1983	348 /	СЛП	5	сал	5	5	5			5	
В'ярус		02148001	2003	1081 /	СЛП	7-9	ун	рс	7	7			9	
Ледніцка		04148001	2005	888 / 888	СЛП	7-9	свж	рс	7	7			7	
Миледи F1		82148001	2005	744 /	СЛП	7-9	свж	рс	7	7			7	
Трубадур	®	06148001	2007	647 /										
Цезар		03148001	2007	1081 /										
Капуста брюссельська														
Філімон F1		01149001	2002	1050 /	СЛП	7-9	пер	сп	7	7			7	
Капуста качанна (червоноголова)														
Ауторо F1		92030004	1997	751 /	СЛП	7	сал	сс	7	7			7	
Антрацит		06030002	2008	699 /	СЛП	7	ун	сс	7	7			7	
Лангесвит Ред	®	04030001	2006	1163 /	СЛП	7	ун	пс	9	7			7	
Олена	®	02030001	2006	339 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	

Сорт				Код	Зона	Характеристики							
						Продук-тивність	Напрям викорис-тання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)			Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєст-рації	Заявник / Підтримувач						посухи	поля-гання	осипання	хвороб	
Палета		06030003	2008	402 /	СЛП	ун	7	сс	7	7			7	
Редма F1	®	04030003	2007	1102 /	СЛП	7-9	ун	сс	7	7			7	
Реліант F1		83030001	1997	1050 /	СЛП	9	сал	сс	7	7			7	
Родон F1		06030001	2008	887 /	СЛП	7	ун	сс	7	7			7	
Рокси F1		03030001	2004	744 /	С	9	стл	рн	9	9			9	
Топарані	®	04030002	2006	293 /	СЛП	7	ун	сс	7	7			7	
Фуего F1		99030002	2002	900 /	С	9	ун	ср	7	7			9	
Капуста кольрабі														
Віденська біла 1350		61105001	1968	149 /	П	5	конс	сс	5	5			5	
Глобус		04105003	2005	888 / 888	СЛП	7-9	свж	рс	7	7			7	
Наталка		04105002	2005	888 / 888	СЛП	7-9	свж	рс	7	7			7	
Пурпурова	®	04105001	2005	1163 /	С ЛП	7-9	свж	рс	7	7			7	
Сніжана	®	06105002	2007	647 /										
Фея	®	06105001	2007	647 /										
Капуста пекінська														
Білко F1		03152002	2005	751 /	СЛП	7-9	свж	рс	7	7			7	
Виктория F1		03152001	2004	744 /	С	7-9	ун	рн	7	7			7	
Гілтон		04152005	2006	888 /	СЛП	7	ун.	рс	7	7			7	
Мішель	®	04152001	2005	1163 / 1013, 1163	СЛП	7-9	свж	рс	7	7			7	
Маноко F1		02152001	2004	751 /	С,Л,П	7-9	стл	рн	7	7			7	
Піонер F1		00152001	2002	157 /	СЛП	7-9	сал	рс	7	7			7	
Капуста савойська														
Вертю 1340		61153002	1966	149 /	П	7	ун	сс	7	7			7	
Отава		04153001	2005	888 / 888	СЛП	7-9	свж	рс	7	7			7	
Капуста цвітна														
Гілея		05029001	2008	647 /	СЛП	7	ун	ср	7	7			7	
Авізо		94029001	1997	900 /	СЛП	9	ун	сс	7	7			9	
Амейзін F1		92029008	1997	751 /	СЛП	9	ун	сс	7	7			7	

Сорт				Код	Зона	Характеристики							
						Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)			Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляган ня	осипання	хвороб	
Америго F1		01029001	2006	1050 /	СЛП	9	ун	рс	7	7			9	
Акварель		06029003	2008	647 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Алабастра F1		06029005	2008	1163 /	СЛП	7	ун	сс	7	7			7	
Бейкер F1		05029002	2007	1050 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Барселона F1		02029002	2005	887 /	Л	7-9	свж	рс	7	7			7	
Балдо F1		03029006	2004	744 /	С,Л	9	ун	рс	9	9			9	
Винсон F1		02029001	2003	744 /	СЛ	9	ун	рс	9	9			9	
Гудмен		92029004	1999	751 /	СЛП	9	ун	сс	7	7			9	
Дельта		04029005	2008	888 /	СЛП	7	ун	сс	7	7			7	
Діадом F1		02029005	2005	751 /	Л	7-9	свж	сс	7	7			7	
Зефір		06029008	2008	635 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Кортес		84029001	1997	1050 /	СЛП	9	ун	сс	7	7			9	
Лейла F1		06029007	2007	786 /	ЗГр	7	ун	рс	7	7			7	
Лівінгстон F1		05029003	2007	1050 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Мобі дік F1	®	03029002	2006	900 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			9	
Мейфлауер F1	®	04029006	2007	900 /	СЛП	7-9	ун	рс	7	7			7	
Монтано F1		97029002	1999	1050 /	Л	9	ун	сс	7	7			7	
Матін F1		06029004	2008	900 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Малимба F1		98029003	2001	744 /	СП	9	ун	рс	7	7			9	
Міньйон F1	®	03029001	2006	900 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Наутілус F1		00029001	2003	900 /	СЛ	9	ун	сс	9	9			9	
Немо F1	®	04029007	2007	900 /	СЛП	7-9	ун	рс	7	7			7	
Опал	®	04029002	2007	1102 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Профіл		99029002	2001	1102 /	С	9	ун	рс	7	7			9	
Планита F1		97029005	2005	744 /	С	7-9	свж	рс	7	7			7	
Пролісок F1	®	04029003	2006	293 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Поранек	®	02029003	2005	1084 /	С	7-9	свж	рс	7	7			7	
Робер		98029002	2001	1081 /	СП	9	ун	рс	7	7			7	
Сновхед	®	04029001	2006	1163 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	

Сорт				Код	Зона	Характеристики								
						Продук-тивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поля-гання	осипання	хвороб	
Сірія F1		95029001	1999	900 /	СЛП	9	ун	сс	9	9			9	
Скайвокер F1		02029004	2005	751 /	С	7-9	свж	пс	7	7			7	
Тофар F1		06029001	2008	751 /	СЛП	7	ун	сс	7	7			7	
Уніботра	®	04029004	2006	293 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Фарго F1		92029007	1997	751 /	СЛП	9	ун	сс	9	7			9	
Фламінго		06029002	2008	647 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Фаті F1		06029006	2007	786 /	ЗГр	7	ун	рс	7	7			7	
Фремонт F1		97029001	1999	744 /	Л	9	ун	сс	9	9			9	
Квасоля овочева														
Артеміс	®	04087001	2005	1013 / 1013	СЛП	7-9	свж	рс	7	7			7	
Білозерна 361		52087001	1959	339 /	СЛП	7	ун	сс	7	7			7	
Вид		98087003	2001	879 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Голубка		05087004	2008	1163 /	СЛП	5-7	зерн	рн		7	7	7	7	цін
Галопка		02087001	2003	1081 /	СЛП	7-9	ун	рс	7	7			7	
Даяна		02087008	2004	888 /	СЛП	9	унів	рс	7	7			7	
Еурека		02087006	2004	1084 /	СЛП	7	стл	рн	7	7			7	
Зіронька		96087001	2000	405 /	ЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Загадка		02087004	2004	1163 /	СЛП	7	стл	рн	7	7			7	
Киліан		04087002	2005	1013 /	СЛП	7-9	свж	рс	7	7			7	
Ксеня		94087003	2001	339 /	П	7	ун	сс	7	7			7	
Лібра		97087003	2001	1072 /	СЛП	7-9	ун	рс	7	7			7	
Ляура		97087002	2001	1072 /	СЛП	7-9	ун	рс	7	7			7	
Ольга		92087002	1997	721 /	СЛП	5	ун	рс	5	5			5	
Присадибна		90087002	1994	339 /	СЛП	5	ун	сс	5	5			5	
Пантера	®	03087002	2005	1084 /	СЛП	7-9	свж	рс	7	7			7	
Пітра		02087007	2004	888 /	СЛП	9	стл	рс	7	7			9	
Полька		02087002	2003	1081 /	СЛП	7-9	ун	рс	7	7			7	
Поп Топ		02087005	2004	1163 /	СЛП	7	стл	рн	7	7			7	
Сонеста F1		95087001	1999	1013 /	С	7	ун	рс	5	5			5	

Сорт				Код	Зона	Характеристики								
						Продук-тивність	Напрям викорис-тання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєст-рації	Заявник / Підтримувач						посухи	поля-гання	осипання	хвороб	
Скуба		98087001	2002	1013 /	СЛП	7-9	ун	рс	7	7			7	
Сюїта		03087003	2005	313 /	СЛП	7	свж	рс	7	7			7	
Українка		94087005	1999	339 /	СЛ	7	ун	сс	7	7			7	
Царівна		05087006	2008	1163 /	СЛП	5-7	зерн	рн		7	7	7	7	цін
Ювілейна 287		69087001	1973	402 /	ЛП	5	ун	рс	5	5			5	
Крес-салат														
Вість		84157002	1990	402 /	СП	5	свж	рс	5	5			5	
Холодок	®	04157001	2006	984 /	СЛП	7	свж.	рс	7	7			7	
Кукурудза розлусна														
Дніпровський 925		92033001	1996	311 /	СЛП	7	стл	рс	7	7			7	
Даніель		99033001	2003	402 /	Л	7	ун	сс	7	7			7	
Дніпровський 929		98033001	2002	311 /	С	7	стл	рс	7	7			7	
Ірида F1	®	04033001	2006	404 /	ПЛС	7	ун	рс	7	7			7	
Люкс	®	02033001	2006	378 /	ПЛС	7	зерн.	рс	7	7			7	
Гостинець		05004067	2008	340 /										
Гостинець		05004067	2008	311 /										
Кукурудза цукрова														
Андріївський F1		00032003	2003	736 /	П	7	стл,конс	ср	7	7			7	
Ароматна		79032001	1982	340 /	С	5	стл, конс	сс	5	5			5	
Апетитна 5		92032001	1997	340 /	СЛП	5	стл	сс	5	5			5	
Андріа F1		02032003	2008	888 /										
Брусниця		91032001	1995	339 /	СЛП	5	стл, конс	рс	5	5			5	
Бостон F1		01032001	2003	1050 /	Л	7-9	стл,конс	рс	7	7			9	
Внесок		04032006	2007	311 /	СЛП	7	ун	ср	7	7			7	
Веге 1		00032002	2003	736 /	С	7	стл,конс	ср	7	7			7	
Венілія		04032005	2007	311 /	СЛП	7-9	ун	ср	7	7			7	
Дракон		01032002	2005	339 /	С	7-9	унів	ср	7	7			7	
Делікатесна		89032001	1992	340 /	С	5	стл, конс	рс	5	5			5	

Сорт				Код	Зона	Характеристики								
						Продук-тивність	Напрям викорис-тання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєст-рації	Заявник / Підтримувач						посухи	поля-гання	осипання	хвороб	
Дмитрик	®	03032001	2007	404 / 404	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Джубілі F1		98032001	2001	1050 /	СЛ	7-9	стл, конс	рс	7	7			7	
Єль Торо F1		97032001	2000	744 /	СЛ	7	стл, конс	ср	7	5			5	
ЗПСК 504 су		93033001	1997	936 /	СЛП	5	стл	рс	5	5			5	
ЗПСК 311 су		94033002	1997	936 /	СЛП	5	стл	рс	5	5			5	
Куліковський F1		84032002	1990	339 /	СЛП	5	стл, конс	сс	5	5			5	
Кєндл F1		03032004	2005	744 /	С	7-9	унів	рс	7	7			7-9	
Ласуня одеська		94032002	2004	378 /	СЛ	7	стл	рн	7	7			7	
Лукомор'є F1		98032002	2002	339 /	С	7	стл,конс	рс	7	7			7	
Леженд F1		97032002	2001	900 /	С	7	стл, конс	ср	5	5			5	
Мамалижний	®	98032005	2001	1028 / 336, 1028	СЛП	7	стл, пер	ср	7	7			7	
Мадонна F1	®	04032001	2007	1013 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Перфекта F1		04032004	2008	888 /										
Роставиця F1		92032004	1997	339 /	СЛП	5	стл, конс	рс	5	5			5	
Ромашка		98032004	2002	340 /										
Ромашка		98032004	2002	311 /										
Роялті F1		01032003	2003	1013 /	Л	7	стл,конс	ср	7	7			7	
Сквирка (Роксолана) F1		85032001	1990	339 /	СЛП	5	стл, конс	рс	5	5			5	
Сюрприз		99032044	2003	311 /	С	7	стл,конс	рс	7	7			7	
Спіріт		04032003	2006	1050 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Санданс F1		06032002	2008	900 /										
Спокуса		02032001	2007	311 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Трофи F1		03032002	2004	744 /	С	7-9	стл	рн	7	7			7	
Тронка F1		06032001	2008	647 /										
Мангольд														
Зимній		83159001	1991	348 /	С	5	свж	рс	5	5			5	
Морква														
Абако F1		03034005	2004	744 /	С	7-9	ун	рн	7	7			9	

Сорт				Код	Зона	Характеристики								Якість
						Продук-тивність	Напрям викорис-тання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				
Назва	Вид	Номер	Рік реєст-рації	Заявник / Підтримувач						посухи	поля-гання	осипання	хвороб	
Ассоль		03034009	2006	647 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Бангор F1		94034004	1997	751 /	СЛП	7	ун	сс	7	7			7	
Байон F1	®	04034010	2007	1102 /	СЛП	7-9	ун	рс	7	7			7	
Болєро		04034001	2006	215 /	СЛП	9	свж	ср	7	7			7	
Бюро F1		65034001	1997	753 /	СЛП	5	ун	рс	5	5			5	
Болтекс		06034007	2008	900 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Бастія F1		07034001	2008	751 /	Зг, Ст	9	ун	сс	7	7			7	
Балтімор F1		07034002	2008	751 /	Зг,Ст	7	уе	сс	7	7			7	
Берлікумер 2		02034001	2004	1081 /	СЛП	7-9	ун	рн	7	7			7	
Билбо F1		97034004	2005	744 /	С	7-9	унів	сс	7	7			7-9	
Вереснева		05034008	2008	402 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Віта-Лонга F1		95034001	1997	751 /	СЛП	7	ун	сс	7	7			7	
Виктория F1		82034004	2005	744 /	С	7-9	унів	пс	7	7			7	
Велес F1	®	04034013	2006	293 /	СЛП	7	ун	пс	7	7			7	
Веста F1		03034002	2006	900 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			9	
Голландка	®	04034008	2006	1163 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Гіганта		06034002	2008	887 /	СЛП	7	ун	сс	7	7			7	
Долянка		05034009	2008	1072 /	СЛП	7	ун	пс	7	7			7	
Дарина		05034002	2006	888 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Дарунок F1		96034004	2001	402 /	П	7	ун	сс	7	7			7	
Длінная красная	®	04034011	2006	293 /	СЛП	7	ун	сс	7	7			7	
Колтан F1		05034007	2006	753 /	СЛП	9	ун	сс	7	7			7	
Квітневська		00034001	2004	339 /	СЛ	7-9	стл	рн	7	7			7	
Камаран F1		92034006	1997	751 /	СЛП	5	ун	сс	5	5			5	
Карлена		91034002	1995	721 /	СЛП	5	ун	сс	5	5			5	
Кампо		78034002	1997	753 /	СЛП	5	ун	рс	5	5			5	
Кораль		97034011	2001	1072 /	СП	7	ун	сс	7	7			7	
Кримчанка		01034002	2004	402 /	Л	7	стл	рн	7	7			7	
Корріда		05034004	2008	635 /	СЛП	7	ун	сс	7	7			7	

Сорт				Код	Зона	Характеристики								
						Продук-тивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєст-рації	Заявник / Підтримувач						посухи	поля-гання	осипання	хвороб	
Красний велікан	®	04034015	2006	293 /	СЛП	7	ун	пс	7	7			7	
Каротан	®	04034009	2007	1102 /	СЛП	7	ун	пс	7-9	7			9	
Каліcто F1		97034010	2001	1044 /	С	7	ун	сс	7	7			7	
Кампіно		06034011	2008	1163 /	СЛП	7	ун	сс	7	7			7	
Колгоспниця	®	04034016	2007	984 /	СЛП	7	ун	сс	7	7			7	
Кадріль	®	03034004	2007	647 /	СЛП	7	ун	сс	7	7			7	
Канада F1		06034005	2008	751 /	СЛП	7	ун	сс	7	7			7	
Кортіна		05034001	2008	888 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			9	
Купар F1		07034003	2008	751 /	Зг,Ст	7	ун	сс	7	7			7	
Каскад F1		07034004	2008	751 /	Зг,Ст	7	ун	сс	7	7			7	
Карнавал		03034010	2006	647 /	СЛП	9	ун	сс	7	7			9	
Кармен		03034011	2006	647 /	СЛП	7	ун	сс	7	7			9	
Купало F1	®	04034014	2006	293 /	СЛП	7	сал	рс	7	7			7	
Ласуня		01034003	2004	343 /	СЛ	7	рн	рн	7	7			7	
Лагуна F1		05034003	2008	753 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Лангесвит Фрютфул	®	02034003	2005	1163 / 1013, 1163	С	7	унів	сп	7	7			7	
Майя F1		03034003	2006	900 /	СЛП	7	ун	сс	7	7			7	
Монанта		03034007	2004	1102 /	СЛП	7-9	ун	рн	7	7			7	
Магно F1		99034001	2001	1102 /	СП	7-9	ун	сс	7	7			7	
Мазурка		06034004	2008	647 /	СЛП	7	ун	сс	7	7			7	
Нантська харківська		49034001	1952	402 /	СЛП	5	ун	сс	5	5			5	
Нанда F1		01034001	2003	887 /	П	7	ун	рс	7	7			7	
Наполі F1		92034010	1997	751 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Натофі	®	04034006	2006	1163 /	СЛП	9	ун	рс	7	7			7	
Нарбоне F1		92034002	1997	751 /	СЛП	5	ун	сс	5	5			5	
Наюва		06034009	2008	1163 /	СЛП	7	ун	сс	7	7			7	
Олімпус		94034003	1999	969 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Оленка		92034001	1995	402 /	СЛП	5	ун	рс	5	5			5	
Осіння королева	®	04034005	2006	1163 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продук-тивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєст-рації	Заявник / Підтримувач					посухи	поля-гання	осипання	хвороб	
Перший збір		03034006	2006	1081 /	СЛП	7	ун	рс	7	7		7	
Памелла		06034010	2008	1163 /	СЛП	7	ун	сс	7	7		7	
Перун F1	®	04034012	2006	293 /	СЛП	7	ун	пс	7	7		7	
Ройал Форто		94034002	1999	744 /	СЛП	7	ун	рс	7	7		7	
Ред Кор		54034001	1997	753 /	СЛП		ун	сс					
Регульська		03034008	2006	1084 /	СЛП	7	ун	сс	9	7		9	
Розал		06034003	2008	887 /	СЛП	7	ун	сс	7	7		7	
Ройал Шансон		97034003	1999	744 /	СЛП	7	ун	сс	7	7		7	
Ранок F1		95034002	1998	402 /	СЛП	7	ун	сс	7	7		7	
Сіркана F1		05034006	2006	753 /	СЛП	9	ун	ср	7	7		7	
Свитшан		04034003	2006	1163 /	СЛП	9	ун	сс	7	7		7	
Скарла		06034008	2008	900 /	СЛП	7	ун	сс	7	7		7	
Талісман	®	04034004	2007	888 /	СЛП	7	ун	сс	7	7		7	
Трофі		97034007	1999	1050 /	СЛП	7	ун	рс	7	7		7	
Тінга		97034001	2001	969 /	СЛ	7	ун	сс	7	7		7	
Флаккенарія	®	02034002	2005	1163 / 1013, 1163	СП	7-9	унів	пс	7	7		7	
Флайові	®	04034007	2006	1163 /	СЛП	7	ун	сп	9	7		9	
Чумак F1		98034006	2002	402 /	Л	7	ун	рс	7	7		7	
Шантене сквирська		46034002	1949	339 /	СЛП	5	ун	сс	5	5		5	
Шантане червоне серце		04034002	2006	215 /	СЛП	9	ун	сс	7	7		7	
Яскрава		96034001	2000	402 /	СЛП	7	ун	сс	7	7		7	
Огірок													
/Бейо 2640 F1/		05035001	2007	751 /	СЛП	7	конс	рс	7	7		9	
Апрельський F1		72035001	1985	157 /	СЛП	7	ун	рс	7	7		7	
Анжеліна F1		05035019	2006	753 /	СЛП	7-9	ун	рс	7	7		9	
Астерікс F1		95035005	1999	751 /	СЛП	7	конс	рс	7	7		7	
Акорд F1		00035007	2003	751 /	Л	7	конс,свж	рс	7	7		7	
Анулька F1	®	05035040	2007	1072 /	СЛП	7	ун	рс	7	5		7	
Аладін F1	®	02035002	2005	1178 /	С	7	унів	рс	7	7		7	

Сорт				Код	Зона	Характеристики							
						Продук-тивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)			Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєст-рації	Заявник / Підтримувач						посухи	поля-гання	осипання	хвороб	
Аякс F1		74035001	1996	753 /	СЛП	7	конс	рс	7	7			7	
Атлет F1		06035020	2007	898 /	ЗРг	7	сал	рс	7	7			7	
Амур F1		02035004	2005	751 /	Л	7-9	унів	рс	7	7			7-9	
Аскольд F1		02035007	2005	888 /	ЛП	7-9	конс	ср	7	7			7	
Анніка F1	®	04035005	2006	293 /	СЛП	7-9	ун	рс	7	7			7	
Андрус F1	®	06035002	2007	1072 /	СЛП	7	ун	сс	7	7			7	
Афіна F1		05035018	2006	753 /	СЛП	9	ун	рс	7	7			9	
Атлантіс F1		97035002	2001	751 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Буян F1		06035011	2007	703 /	ЗГр	7	конс	рс	7	7			7	
Борис F1	®	05035006	2007	541 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Бобрик F1		06035021	2007	898 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Бріз F1		03035010	2008	647 /	СЛП	7	ун	пс	7	7			7	
Внучок F1	®	05035020	2007	1054 /	ЗГр	7	свж	рс	7	7			7	
Владко F1		97035011	2001	1072 /	СЛП	7	конс, свж	рс	7	7			7	
Водограй F1		97035009	2001	313 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Вокал F1		99035006	2001	1102 /	СЛП	7-9	конс, свж	рс	7	7			7	
Вентура F1		99035007	2001	1102 /	Згр, гідроп	7	свж,сал	рс	7	7			7	
Весєлая Компанія F1	®	05035008	2007	541 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Весна F1	®	05035011	2007	541 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Вєрниє Друзья F1		06035013	2007	703 /	ЗГр	7	ун	рс	7	7			7	
Веласко F1		06035025	2007	786 /	ЗГр	7	ун	рс	7	7			7	
Гармонія F1		04035004	2006	1102 /	СЛП	9	ун	рс	7	7			9	
Горностай F1		06035007	2007	703 /	ЗГр	7	сал	рс	7	7			7	
Галіт F1		92035021	1999	402 /	ЗГр	5	сал	рс	5	5			5	
Гейм		92035004	1997	402 /	СЛП	5	зс	сп	5	5			5	
Гладківський		96035008	2000	313 /	СЛ	5	конс	рс	5	5			5	
Гінга F1		99035003	2004	721 /	ЗГр	7-9	конс	рн	7	7			7	
Геркулес F1		06035009	2007	703 /	ЗГр	7	сал	рс	7	7			7	
Галина F1		03035001	2004	744 /	С	7	ун	рн	7	7			7	

Сорт				Код	Зона	Характеристики								
						Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляглання	осипання	хвороб	
Гектор F1		99035013	2002	753 /	СЛП	7	ун	ср	7	7			7	
Гермес Скерневіцький F1		00035001	2001	1081 /	СЛП	7	конс, свж	пс	7	7			7	
Діва		93035003	1997	955 /	СЛП	5	конс	ср	5	5			5	
Даліла		00035008	2003	888 /	Л	7	ун	рс	7	7			7	
Дездемона		01035002	2003	888 /	Л	7	ун	рс	7	7			7	
Денек F1	®	05035012	2007	541 /	СЛП	7	зс	рс	7	7			7	
Дельтастар F1		99035008	2001	1102 /	ЗГр, гідроп	7-9	свж, сал	рс	7	7			7	
Джерело		94035008	1999	402 /	СЛП	7	зс	рс	7	7			7	
Делпіна F1		00035002	2003	753 /	Л	7-9	конс,свж	рс	7	7			7	
Джин F1	®	05035005	2007	541 /	СЛП	7	зс	рс	7	7			7	
Ера		90035005	1997	429 /	СЛП	5	зс	сс	5	5			5	
Естафета F1		79035016	1983	157 / 964	ЗГр	5	сал	ср	5	5			5	
Ексельсіор		05035038	2007	840 /	Згр	7	свж	рс	7	7			7	
Еліза F1	®	04035002	2006	1163 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			9	
Знаток F1	®	04035007	2007	1054 /	ЗГр	7	свж	рс	7	7			7	
Зефір F1	®	03035012	2006	647 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Зубрьонок F1	®	98035010	2001	1044 /	СЛП, ПТ	7	конс, свж	рс	7	7			7	
Іра		92035006	1997	721 /	СЛП	5	зс	ср	5	5			5	
Ізід		98035001	2003	1081 /	П	7	ун	рс	7	7			7	
Кріспіна F1		94035018	1997	753 /	ЗГр	7	сал	рс	7	7			7	
Крак F1		97035010	2001	1072 /	СЛП	7	конс, свж	рс	7	7			7	
Компоніст F1		03035006	2004	1102 /	СЛП	7-9	конс	рн	7	7			7	
Кронос Скерневіцький F1	®	03035004	2006	1081 /	СЛП	7	ун	сс	7	7			9	
Криниця F1		78035003	1985	402 /	Л	5	конс	рн	5	5			5	
Кадет F1		06035019	2007	898 /	ЗГр	7	ун	рс	7	7			7	
Ксана F1	®	99035011	2003	402 /	ЗГр(СТ,ПТ)	7	свж	сс	7	7			7	
Кураж F1		06035018	2007	898 /	ЗГр	7	сал	рс	7	7			7	

Сорт				Код	Зона	Характеристики								
						Продук-тивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєст-рації	Заявник / Підтримувач						посухи	поля-гання	осипання	хвороб	
Квартет F1	®	05035016	2007	541 /	СЛП	7	зс	рс	7	7			7	
Казанова F1		06035024	2007	898 /	ЗГр	7	сал	рс	7	7			7	
Костік F1		98035008	2003	1044 /	ЗГр(ПТ,СТ)	7	свж	рс	7	7			7	
Конні F1		99035002	2004	721 /	ЗГр	7-9	ун	рн	7	7			9	
Левадний F1	®	03035007	2006	339 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Льоша F1		00035006	2003	313 /	П	7	ун	рс	7	7			7	
Лялюк		91035001	1995	402 /	СЛП	5	конс	сс	5	5			5	
Левина		94035001	1998	744 /	СЛП	7	конс	сс	7	7			7	
Леон		96035005	2000	1013 /	СЛП	7	зс	рс	7	7			7	
Лорд F1		06035008	2007	703 /	ЗГр	7	конс	рс	7	7			7	
Мона		93035001	1997	955 /	СЛП	7	конс	ср	7	7			7	
Маша F1		00035003	2001	744 /	СЛ	7-9	ун	рс	9	9			9	
Мудрець F1	®	04035006	2007	1054 /	ЗГр	7	свж	рс	7	7			7	
Маринда F1		94035002	1998	744 /	СЛП	7	конс	пс	7	7			7	
Морин F1		94035016	1997	744 /	ЗГр	7	сал	рс	7	7			7	
Мамай F1		03035011	2008	647 /	СЛП	7	ун	пс	7	7			7	
Мотильок F1	®	05035014	2007	541 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Мотіва F1		99035009	2001	1102 /	СП	7-9	ун	ср	7	7			7	
Матильда F1		98035005	2001	744 /	СП	7-9	конс	рс	7	7			7	
Медіа F1		99035010	2001	1102 /	ЗГр, гідроп	7	свж, сал	рс	7	7			7	
Марта F1		06035012	2007	703 /	ЗГр	7	ун	рс	7	7			7	
Мирабелл F1		02035001	2004	744 /	С	7	ун	рн	7	7			7	
Мила F1		03035002	2004	744 /	С	7	ун	рн	7	7			7	
Мальчик-с-пальчик F1		06035014	2007	703 /	ЗГр	7	конс	рс	7	7			7	
Морінга F1		99035004	2004	721 /	СЛП	7	конс	рн	7	7			7	
Ніжинський 12		34035001	1937	402 /	СЛП	5	зс	сп	5	5			5	
Наташа F1		98035004	2001	744 /	СП	7-9	конс	рс	7	7			7	
Одис F1	®	03035005	2006	1081 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Офікс F1		92035018	1997	1050 /	СЛП	5	конс	ср	5	5			5	

Сорт				Код	Зона	Характеристики								
						Продук-тивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поля-гання	осипання	хвороб	
Отелло F1		05035003	2006	1050 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			9	
Октопус F1		96035004	1999	1050 /	СЛП	7	конс	рс	7	7			7	
Орлик F1		06035023	2007	898 /	ЗГр	7	сал	рс	7	7			7	
Олімпіада F1		06035015	2007	703 /	ЗГр	7	сал	рс	7	7			7	
Опера F1		99035005	2001	1102 /	СЛП	7	конс, свж	рс	7	7			7	
Патріот F1		04035001	2008	888 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Парсіфал F1		01035001	2006	887 /	СЛП	9	ун	рс	7	7			7	
Пасалімо F1	®	05035002	2006	1050 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Поліна F1	®	05035015	2007	541 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Пікобелло		04035009	2006	1197 /										
Паркер F1		75035001	1996	753 /	СЛП	7	конс	ср	7	7			7	
Пасадена F1		97035006	1999	1050 /	ЗГр	7	сал	рс	7	7			7	
Престо F1		04035003	2006	1102 /										
Потомак F1		03035009	2005	744 /	С	7-9	унів	рс	7	7			7	
Пасамонте F1		98035006	2002	1050 /	СЛ	7-9	конс	рс	7	7			7	
Регія		94035006	1999	969 /	СЛП	7	конс	рс	7	7			7	
Роял F1		66035001	1997	900 /	СЛП	5	конс	ср	5	5			5	
Регаль F1		95035002	1999	900 /	СЛП	7	конс	рс	7	7			7	
Родос F1	®	05035004	2007	1081 /	СЛП	7	стл	рс	7	7			7	
Спікер F1		05035021	2008	635 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Старекс F1		05035017	2007	786 /	СЛП	7	ун	сс	7	7			7	
Сєвєрянін		92035005	1996	402 /	СЛП	5	конс	сс	5	5			5	
Смушковий F1	®	04035008	2007	1054 /	ЗГр	7	свж	рс	7	7			7	
Самородок F1	®	99035016	2002	402 /	С	7	ун	сс	7	7			7	
Сандер F1	®	06035003	2007	1072 /	СЛП	7	ун	сс	7	7			7	
Сувенір F1	®	03035008	2007	402 /	СЛП	7	ун	сп	7	7			7	
Смак F1	®	99035017	2002	402 /	ЛП	7	ун	сс	7	7			7	
Сремський F1		01035005	2003	712 /	Л	7	ун	рс	7	7			7	
Слобожанський F1	®	99035012	2002	402 /	СЛП	7-9	конс	рс	7	7			7	

Сорт			Код	Зона	Характеристики							
					Продук-тивність	Напрям викорис-тання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)			Якість
Назва Вид	Номер	Рік реєст-рації	Заявник / Підтримувач						посухи	поля-гання	осипання хвороб	
Син Полка F1	® 05035007	2007	541 /	СЛП	7	ун	рс	7	7		7	
Салтан F1	06035010	2007	703 /	ЗГр	7	ун	рс	7	7		7	
Сквирський 1/27 F1	96035007	2000	1025 /	ЛП	5	конс	рс	5	5		5	
Трой F1	05035034	2008	313 /	СЛП	7	ун	рс	7	7		7	
Трембіта F1	06035022	2007	898 /	ЗГр	7	ун	рс	7	7		7	
Тристан	05035037	2007	840 /	ЗГр	9	свж	рс	7	7		7	
Тайга F1	06035016	2007	703 /	ЗГр	7	сал	рс	7	7		7	
Тітус F1	02035005	2005	1072 /	СП	7-9	унів	рс	7	7		7	
Фермер F1	06035005	2007	703 /	ЗГр	7	конс	рс	7	7		7	
Філіппок F1	® 05035009	2007	541 /	СЛП	7	зс	рс	7	7		7	
Хробри F1	® 06035004	2007	1072 /	СЛП	7	ун	рс	7	7		7	
Цетріоліно	05035022	2008	635 /	СЛП	7	ун	сс	7	7		7	
Цезар	® 98035002	2004	1084 /	СЛП	7-9	стл	рн	7	7		7	
Шебелинський F1	89035007	1995	402 /	ЗГр	5	сал	рс	5	5		5	
Щедрик F1	06035017	2007	898 /	ЗГр	7	ун	рс	7	7		7	
Ювіляр F1	94035010	1999	381 /	ЗГр	7	сал	рн	7	7		7	
Юліан F1	02035006	2006	1072 /	СЛп	7	ун	рс	7	7		7	
Язер F1	95035004	2000	751 /	ЗГр	5	сал	рс	5	5		5	
Пастернак												
Гормон	02161001	2003	339 /	СЛП	7	ун	рс	7	7		7	
Петрик	92161001	1995	402 /	СЛП	5	спц	сс	5	5		5	
Патисон												
Малахіт	99162001	2001	313 /	СЛП	7	пер	рс	7	7		7	
Оранжевий	92162001	2000	410 /	СЛП	5	ун	сс	5	5		5	
Перлинка	01162001	2002	402 /	СЛП	7	пер	рс	7	7		7	
Поло F1	00162001	2001	1081 /	СЛП	7-9	пер	сс	7	7		7	
Сашенька	03162001	2005	313 /	СЛП	7-9	унів	рс	7	7		7	

Сорт				Код	Зона	Характеристики								
						Продук-тивність	Напрям викорис-тання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєст-рації	Заявник / Підтримувач						посухи	поля-гання	осипання	хвороб	
Перець гіркий														
Український гіркий		46036001	1947	402 /	СЛП	5	спц	сс	5	5			5	
Харківський		79036001	1983	402 /	СЛП	5	спц	сс	5	5			5	
Перець солодкий														
Атлант		00037007	2004	1044 /	СЛ	7	стл	рн	7	7			7	
Араміс F1		05037018	2007	541 /	СЛП	7	ун	рс	5	5			5	
Антей		98037007	2001	1044 /	СЛП	7	ун	сс	7	7			7	
Айвенго		98037008	2001	1044 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Боцман		06037003	2007	703 /	ЗГр	7	ун	рс	7	7			7	
Бактянець	®	04037003	2007	323 /	СЛП	7	свж	рс	7	7			7	
Біанка		04037002	2006	840 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Бонета		05037002	2006	888 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Блонді F1		99037001	2002	1050 /	СЛП	7-9	ун	сс	7	7			7	
Віккон		00037006	2004	313 /	П	7	стл	сс	7	7			7	
Велетень		05037025	2008	402 /	СЛП	7	ун	сс	7	7			7	
Валюша	®	03037006	2006	402 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Ватаг		02037002	2004	1054 / 1054	ЗГр(ПТ)	7	ун	рн	7	7			7	
Голубок		91037002	1997	402 /	СЛП	5	ун	ср	5	5			5	
Геркулес F1	®	04037004	2007	900 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Гранд F1	®	03037007	2006	313 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Геліос	®	03037008	2006	647 /										
Добірний		05037021	2007	1054 /	ЗГр	7	ун	ср	7	7			7	
Дружок		92037013	1990	402 /	ЗГр	5	ун	сс	5	5			5	
Етюда	®	03037004	2005	1081 / 50, 1081	СЛП	7	ун	ср	7	7			7	
Еней	®	03037010	2006	647 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Срошка		06037004	2007	703 /	ЗГр	7	ун	рс	7	7			7	
Жовтий дивосвіт	®	02037005	2005	1163 / 1013, 1163	Л	7-9	унів	рс	7	7			7	
Злагода F1		01037001	2004	402 /	С	7	ун	рн	7	7			7	

Сорт			Код	Зона	Характеристики							
					Продук-тивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)			Якість
Назва Вид	Номер	Рік реєст-рації	Заявник / Підтримувач						посухи	поля-гання	осипання	хвороб	
Звєзда Востока оранжевая F1	05037014	2007	541 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Звєзда Востока фіолетовая	05037013	2007	541 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Звєзда Востока шоколадная F1	05037012	2007	541 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Зорька	05037011	2007	541 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Золоте руно ®	03037002	2006	647 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Звєзда Востока жовтая F1	05037007	2007	541 /										
Звєзда Востока F1	05037005	2007	541 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Звєзда Востока золотистая F1	05037004	2007	541 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Звєзда Востока біла F1	05037016	2007	541 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Клаудіо F1	94037005	1997	753 /	ЗГр	7	ун	рс	7	7			7	
Купон	90037001	1995	357 / 357	СЛП	5	ун	сс	5	5			5	
Каліпсо ®	02037007	2005	1084 /	С	7-9	унів	сс	7	7			7	
Ковбой F1	05037009	2007	541 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Лада	05037024	2008	402 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Люкс ®	02037003	2006	357 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Мадонна F1 ®	03037001	2006	900 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Монтекрісто F1	06037002	2007	900 /	ЗГр	7	ун	рс	7	7			7	
Миролюбівський F1	99037003	2003	343 /	П	7	ун	рс	7	7			7	
Міраж	05037017	2007	541 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Мерцедес ®	02037006	2005	1084 /	С	7	унів	сс	7	7			7	
Ноктюрн ®	03037005	2005	1081 /	Л	7-9	унів	сп	7	7			7	
Надія	95037001	1998	402 /	СЛП	7	ун	сс	7	7			7	
Нікіта F1	06037001	2007	900 /	ЗГр	7	ун	рс	7	7			7	
Обрій	94037004	1998	339 /	СЛП	5	ун	рс	5	5			5	
Ожарівський	00037002	2001	1081 /	СЛ	7-9	ун	рс	7	7			7	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продук-тивність	Напрям викорис-тання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєст-рації	Заявник / Підтримувач					посухи	поля-гання	осипання	хвороб	
Оленка		05037003	2007	1081 /	СЛП	7	ун	рс	7	7		7	
Полтавський		90037002	1995	402 /	СЛП	5	ун	ср	5	5		5	
Піонер		82037006	1990	402 /	ЗГр	5	ун	рс	5	5		5	
Пігмаліон F1		05037010	2007	541 /	СЛП	7	ун	рс	7	7		7	
Полька F1		99037002	2001	1102 /	ЗГр	7	сал	рс	7	7		7	
Подстоліна		00037001	2001	1081 /	СЛ	7	ун	рс	7	7		7	
Паланська Бабура		06037013	2008	860 /	ЗГр,Ст	9	ун	рс	9	9		9	
Самоцвіт		97037005	2001	313 /	СЛП	5	ун	рс	5	5		5	
Сонар F1		95037002	1999	900 /	П	7	ун	сс	7	7		7	
Сонячний		02037001	2004	1054 / 1054	ЗГр(ПТ)	7	ун	рн	7	7		7	
Світлячок	®	98037010	2002	402 /	П	7	ун	сс	7	7		7	
Сандра		05037001	2008	888 /	СЛП	7	ун	пс	7	7		7	
Смарагд		98037009	2001	357 / 357	СЛП	7	ун	сс	7	7		7	
Снігур		97037006	2001	402 /	ЛП	5	ун	рс	5	5		5	
Тетяна		05037020	2007	541 /	СЛП	7	ун	рс	5	5		7	
Фунтік		06037005	2007	703 /	ЗГр	7	ун	рс	7	7		7	
Фламінго F1		97037007	2001	900 /	СЛП	7	ун	рс	7	7		7	
Центурі F1		04037001	2005	1102 /	Зг/Ст	7-9	унів	рс	7	7		7	
Цинтія F1		05037036	2008	888 /	СЛП	7	ун	рс	7	7		7	
Червоний дивосвіт	®	02037004	2005	1163 / 1013, 1163	Л	7-9	унів	рс	7	7		7	
Петрушка													
Астра		97163001	1999	969 /	СЛП	7	спц	рс	7	7		7	
Ароматна		02163004	2004	1163 /	СЛП	7	ун	рн	7	7		7	
Берлінія		02163002	2004	1163 /	CKG	7-9	ун	рн	7	7		7	
Господиня		98163002	2000	357 / 357	СЛП	7	спц	рс	7	7		7	
Ігл		95163001	1999	751 /	СЛП	7-9	спц	рс	7	7		7	
Кучерявая Триплекс		03163001	2004	744 /	СЛП	7	ун	рн	7	7		7	
Листовая Комун-3		03163002	2004	744 /	СЛП	7	ун	рн	7	7		7	
Мосспоп		02163003	2004	1163 /	СЛП	7	ун	рн	7	7		7	

Сорт			Рік реєстрації	Код	Зона	Характеристики								
						Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва	Вид	Номер		Заявник / Підтримувач						посухи	поляг-ання	осипання	хвороб	
Наталка		03163003	2005	1084 /	СЛП	7-9	свж	рс	7	7			7	
Оломунська		02163001	2003	1081 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Росава		04163001	2005	888 / 888	СЛП	7-9	свж	рс	7	7			7	
Стихія	®	04163002	2006	984 /	СЛП	7	свж, спц	рс	7	7			7	
Урожайна		58163001	1959	348 /	СЛП	5	спц	рс	5	5			5	
Фреска	®	06163002	2007	647 /										
Харків'янка		92163001	1995	402 /	СЛП	5	спц	рс	5	5			5	
Цукрова		49163003	1981	149 /	СЛП	5	спц	рс	5	5			5	
Челеста	®	06163001	2007	647 /										
Помідор														
Серж F1		04040002	2007	213 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Атласний		94040021	2000	343 /	СЛП	7	конс	рс	7	7			7	
Антошка F1		94040028	1999	402 /	ЗГр	5	сал	рс	5	5			5	
Арлекін F1		00040016	2004	725 /	ЗГр,ПТ	7	ун	рн	7	7			7	
Аміко		94040002	1998	343 /	СЛП	7	ун	сс	7	7			7	
Адмірал F1		00040012	2004	725 /	ЗГр,ПТ	7	ун	рн	7	7			7	
Аврелий F1		97040019	2001	744 /	С	7	ун	ср	7	7			7	
Астероїд	®	04040035	2007	402 /	СЛП	7	свж	рс	7	7			7	
Аркадія F1		99040031	2002	1119 /	ЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Анабел F1		99040014	2001	1102 /	ЗГр	7	свж, сал	рс	7	7			7	
Атоль		98040004	2001	1081 /	ЛП	7	ун	ср	7	7			7	
Арфа F1	®	03040035	2006	647 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Аделаїда F1		97040017	1999	1050 /	ЗГр	7-9	сал	рс	7	7			7	
Аламбра F1		98040018	2001	900 /	СЛП	7	ун	ср	7	7			7	
Алета		02040014	2006	313 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Боян		87040004	1992	343 /	СЛ	7	ун	рс	7	7			7	
Беллє		04040011	2005	840 /	ЗГр,СТ/ ПТ	7-9	унів	рс	7	7			7	
Беллавіза F1		04040012	2005	1102 /	ЗГр,СТ	7-9	унів	рс	7	7			7	
Бусинка F1		01040004	2003	725 /	ЗГр,СТ/ ПТ	7	свж	рс	7	7			7	

Сорт				Код	Зона	Характеристики							
						Продук-тивність	Напрям викорис-тання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)			Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєст-рації	Заявник / Підтримувач						посухи	поля-гання	осипання	хвороб	
Беріл F1		04040013	2005	1102 /	ЗГр,СТ	7-9	унів	рс	7	7			7-9	
Баядерка F1		00040020	2004	725 /	ЗГр,ПТ	7	ун	рн	7	7			7	
Буран		05040102	2007	840 /	ЗГр	7	ун	рс	7	7			7	
Бумеранг F1		00040015	2004	725 /	ЗГр,ПТ	7	ун	рн	7	7			7	
Бачка		98040009	2001	879 /	СЛП	5	ун	рс	5	5			5	
Барвінок F1		96040006	2000	343 /	ЗГр	5	сал	рс	5	5			5	
Богун F1	®	99040017	2003	402 /	ЗГр,ПТ	7	сал	рс	7	7			7	
Баллада	®	99040009	2001	606 /	СЛ	7	ун	сс	7	7			7	
Більшовик F1		05040015	2008	603 /										
Болдвін		05040103	2007	840 /	ЗГр	7-9	ун	рс	7	7			7	
Бармалєй F1		04040026	2008	343 /										
Биг Биф F1		97040018	2001	744 /	С	7	ун	ср	7	7			7	
Василівна F1		00040018	2003	725 /	ЗГр,СТ/ ПТ	7	свж	рс	7	7			7	
Верліока F1		86040030	1990	157 / 964	ЗГр	7	сал	рс	7	7			7	
Водограй		00040007	2005	343 /	ЛП	7	унів	ср	7	7			7	
Вікторія		01040011	2004	1109 /	СЛ	7	ун	рн	7	7			7	
Весняний F1		01040009	2004	402 /	ЗГр,ПТ	7	ун	рн	7	7			7	
Волюм F1		98040016	2001	753 /	ЗГр	7	свж, сал	рс	7	7			7	
Ганія		05040116	2007	215 /	ЗГр	7	ун	рс	7	7			7	
Гожий F1		05040039	2007	1054 /	ЗГр	7	ун	ср	7	7			7	
Господар		92040001	1997	402 /	СЛП	5	ун	рс	5	5			5	
Голда		93040004	1997	955 /	СЛП	7	ун	рс	5	7			5	
Гектор F1	®	03040004	2005	900 /	СЛ	7-9	унів	рс	7	7			7	
Грейс F1		03040005	2004	1197 /	ЗГр,СТ	7	ун	рн	7	7			7	
Доля F1		01040012	2004	343 /	ЗГр,ПТ	7	салат	рн	7	7			7	
Добродій F1		05040038	2007	1054 /	СЛП	7	ун	ср	7	7			7	
Дружба		92040005	1995	1109 /	СЛП	5	ун	рс	5	5			5	
Дораль		93040002	1997	955 /	СЛП	5	ун	рс	5	5			5	
Дуєл Єрли F1		97040002	2001	744 /	С	7-9	ун	ср	7	7			7	

Сорт				Код	Зона	Характеристики								
						Продук-тивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєст-рації	Заявник / Підтримувач						посухи	поля-гання	осипання	хвороб	
Данило F1		00040004	2004	343 /	ЗГр,ПТ	7	ун	рн	7	7			7	
Джадело		05040114	2007	215 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Діво F1		00040011	2003	725 /	ЗГр,СТ/ ПТ	7	свж	сс	7	7			7	
Джина		03040032	2005	744 /	С	7-9	унів	рс	7	7			7	
Дельфін F1		97040015	2000	1050 /	Л	7-9	конс	рс	7	7			7	
Дієз F1		06040009	2007	703 /	ЗГр	7	ун	рс	7	7			7	
Денар		99040012	2004	721 /	СЛ	7	ун	пс	7	7			7	
Дуєл Плас F1		03040008	2004	744 /	С	7-9	ун	рн	7	7			7	
Ейджен		05040104	2007	840 /	ЗГр	7	ун	рс	7	7			7	
Елкоу F1		99040030	2003	900 /	С	7	ун	рс	7	7			7	
Ельф		02040006	2004	1054 / 1054	СЛП	7	ун	рн	7	7			7	
Женарос F1		03040006	2004	1197 /	ЗГр,СТ	7	ун	рн	7	7			7	
Жаворонок F1		99040010	2002	606 /	СЛ	7	ун	рс	7	7			7	
Золотий дощ	®	03040025	2004	1081 /	ЗГр,СТ/ ПТ	7	конс, свж	рн	7	7			7	
Зорень		85040004	1991	343 /	Л	7	ун	рс	7	7			7	
Золоте руно F1		97040005	2003	343 /	Л	7	пер	сс	7	7			7	
Зоряний		99040036	2003	1109 /	Л	7	ун	рс	7	7			7	
Ігранда		95040002	2000	721 /	СЛ	7	конс	рс	7	7			7	
Івет F1		05040076	2007	1050 /	ЗГр	7	ун	рс	7	7			7	
Інкас F1		83040009	1997	753 /	СЛП	7	конс	ср	7	7			7	
Іришка	®	99040035	2003	402 /	Л	7	ун	рс	7	7			7	
Іван Мазепа		02040013	2006	1157 /	СЛП	7	салат	ср	7	7			7	
Імператор київський F1		97040020	2001	343 /	ЗГр,ПТ	7	свж	рс	7	7			7	
Красунчик		01040014	2004	736 /	СЛП	7	ун	рн	7	7			7	
Карстена		05040022	2007	122 /	ЗГр	7	свж	рс	7	7			7	
КДС-5 F1		94040027	2000	402 /	ЗГр	7	сал	рс	7	5			7	
Карась		01040010	2004	402 /	ЗГр,ПТ	7	ун	рн	7	7			7	
Кременчуцький		90040017	1993	402 /	СЛП	5	ун	рс	5	5			5	
Класік F1		93040010	1997	753 /	СЛП	5	конс	ср	5	5			5	

Сорт				Код	Зона	Характеристики							
						Продук-тивність	Напрям викорис-тання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)			Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєст-рації	Заявник / Підтримувач						посухи	поля-гання	осипання	хвороб	
КДС-1 F1		94040026	2000	343 /	ЗГр	7	сал	рс	7	7			7	
Козачок F1		97040007	2000	343 /	СЛП	5	ун	рс	5	5			5	
Красна стріла F1		00040025	2002	725 /	ЗГр	7	свж	рс	7	7			7	
Кравіс	®	03040034	2007	313 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Кіммерієць		99040019	2007	411 /	СЛП	7	свж	рс	7	7			5	
Клондайк	®	04040032	2007	402 /	СЛП	7	уи	сс	7	7			7	
Княжич F1	®	99040016	2003	402 /	ЗГр,ПТ	7	сал	рс	7	7			7	
КНДЦ 45 F1	®	04040029	2007	343 /	СЛП	7	свж	рс	7	7			7	
Кміціц		98040002	2001	1081 /	СЛП	7	ун	ср	7	7			7	
Кронос F1		99040020	2001	753 /	ЗГр,СТ/ ПТ	7	свж	рс	7	7			7	
Кібіц	®	02040018	2006	1084 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Лагідний		89040009	1992	343 /	СЛП	5	ун	рс	5	5			5	
Ласунчик		01040013	2004	736 /	СЛП	7	ун	рн	7	7			7	
Любимий		82040008	1987	402 /	СЛ	5	ун	ср	5	5			5	
Лагоранж	®	03040029	2006	402 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Лаурідса		05040027	2007	122 /	ЗГр	7	свж	рс	7	7			7	
Ліра F1	®	00040027	2008	1044 /										
Маркіза F1		00040022	2004	725 /	ЗГр,ПТ	7	ун	рн	7	7			7	
Марфа F1		94040012	2001	744 /	ЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Мондіал		04040010	2005	840 /	ЗГр,СТ/ ПТ	7-9	унів	рс	7	7			7-9	
Миколка F1		00040005	2005	343 /	ЛП	7	унів	ср	7	7			7	
Муза F1	®	03040036	2006	647 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Малік F1	®	03040001	2005	900 /	СЛП	7-9	унів	рс	7	7			7	
Маєва F1		99040013	2001	1102 /	ЗГр	7	сал	рс	7	7			7	
Миссури Оригинал		03040011	2004	744 /	С	7-9	салат	рн	7	7			7	
Малинове Віканте	®	04040033	2007	402 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Марисса F1		03040013	2004	744 /	С	7	свж	рн	7	7			7	
Меді		02040021	2007	1109 /	СЛП	7	ун	сс	7	7			7	
Макіївський		02040008	2007	402 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	

Сорт				Код	Зона	Характеристики								
						Продук-тивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєст-рації	Заявник / Підтримувач						посухи	поля-гання	осипання	хвороб	
Наско-2001		00040029	2003	1044 /	СЛ	7	ун	ср	7	7			7	
Надбужанський	®	04040025	2007	1109 /	СЛП	7	свж	рс	7	7			7	
Наско-2000	®	00040028	2003	1044 /	СЛ	7	ун	ср	7	7			7	
Ньютон F1		05040075	2007	1050 /	ЗГр	7	ун	рс	7	7			7	
Надія		97040004	2000	1109 /	СЛ	7	конс	сс	7	7			7	
Надєжда		99040011	2002	1044 /	С	7	ун	рс	7	7			7	
Незабудка F1		02040012	2006	402 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Наддніпрянський 1	®	03040037	2007	411 /	СЛП	7	свж	сс	5	7			7	
Олена		03040020	2005	122 /	С	7	унів	сс	7	7			7	
Оля F1		00040013	2003	725 /	ЗГр,СТ/ ПТ	7	свж	рс	7	7			7	
Орко F1		97040022	2000	753 /	СЛ	7	ун	сс	5	5			5	
Одета		97040023	2001	969 /	С	7	ун	сс	7	7			7	
Оберіг		00040008	2005	343 /	ЛП	7	унів	ср	7	7			7	
Оксамит		02040010	2006	1054 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Опера		05040115	2007	215 /	СЛП	7-9	ун	рс	7	7			7	
Побратим F1		00040006	2004	343 /	ЗГр,ПТ	7	ун	рн	7	7			7	
Південна Пальміра	®	04040024	2007	381 /	СЛП	7	ун	сс	7	7			7	
Перлина	®	03040030	2006	1163 /	СЛП	7-9	ун	рс	7	7			7	
Пето 86 Оригинал		79040001	1999	744 /	С	7	ун	ср	7	7			7	
Прекрасна Леді F1		00040021	2004	725 /	ЗГр,ПТ	7	ун	рн	7	7			7	
Попугайчик F1		01040005	2003	725 /	ЗГр,СТ/ ПТ	7	свж	рс	7	7			7	
Плідний		02040004	2004	1054 / 1054	ЗГр,ПТ	7	салат	рн	7	7			7	
Перфектпил F1		03040018	2004	744 /	С	7	всж	рн	7	7			7	
Пинк Фортрест F1		98040013	2005	744 /	С	7-9	унів	рс	7	7			7	
Платус F1		04040008	2005	1197 /	ЗГр,СТ/ ПТ	7-9	унів	рс	7	7			7-9	
Принадний	®	04040021	2007	1054 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Президент II F1		03040010	2004	744 /	С	7-9	салат	рн	7	7			7	
Попільнянський		99040018	2005	343 /	С	7	унів	сс	7	7			7	
Пріма F1	®	03040002	2006	900 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	

Сорт			Код	Зона	Характеристики							
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)			Якість
Назва Вид	Номер	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поля-гання	осипання	хвороб	
Пинки Леди F1	03040014	2004	744 /	С	7	свж	рн	7	7			7	
Ред Хантер	76040010	1997	753 /	СЛП	5	конс	ср	5	5			5	
Румба Ожаровська	02040002	2004	1081 /	СЛП	7	ун	рн	7	7			7	
Ріо Гранo ®	02040017	2006	1163 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Розовие щочкі F1	06040011	2007	703 /	ЗГр	7	ун	рс	7	7			7	
Райса F1	97040016	1999	1050 /	ЗГр	7-9	сал	рс	9	7			9	
Радісний ®	03040028	2006	1109 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Рио Гранде Оригинал	03040017	2004	744 /	С	7-9	свж	рн	7	7			7	
Рио Фуего Оригинал	98040011	2001	744 /	С	7-9	ун	ср	7	7			9	
Ранді	04040023	2006	840 /	Зг	7	ун	рс	7	7			7	
Регіон ®	03040033	2006	313 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Селебрити F1	00040002	2002	744 /	СЛ	7	ун	рс	7	7			7	
СХ-3	94040007	1998	1109 /	СЛП	7	ун	сс	7	7			7	
Сплует F1	05040077	2007	1050 /	ЗГр	7	ун	рс	7	7			7	
СХ-1	88040013	1996	1109 /	СЛП	5	конс	сс	5	5			5	
Санстарт F1	01040001	2002	744 /	СЛ	7	ун	рс	7	7			7	
СХ-2	91040005	1997	1109 /	СЛП	5	конс	рс	5	5			5	
СХ-4	94040008	1998	1109 /	СЛП	7	ун	сс	7	7			7	
Сомероссо F1	05040014	2006	753 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Сріблевий	90040022	1996	402 /	СЛП	5	ун	сс	5	5			5	
Скіф F1	94040016	1997	753 /	СЛП	7	конс	ср	7	7			7	
Сергій 153 F1 ®	04040030	2007	343 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
СХД 187	04040004	2007	213 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Святослав F1	99040038	2003	402 /	Л	5	ун	рс	5	5			5	
Саньяго F1	00040001	2002	1050 /	С	7	ун	рс	7	7			7	
Саншайн F1	03040007	2004	744 /	С	7-9	ун	рн	7	7			7	
СХД 219	04040003	2007	213 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Сяйво ®	02040009	2006	402 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Стожар	02040005	2004	1054 / 1054	ЗГр,ПТ	7	салат	рн	7	7			7	

Сорт				Код	Зона	Характеристики								
						Продук-тивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєст-рації	Заявник / Підтримувач						посухи	поля-гання	осипання	хвороб	
Санрайз F1		03040012	2004	744 /	С	7-9	прм	рн	7	7			7	
Скарб F1		96040004	2000	343 /	ЗГр	7	сал	рс	7	5			5	
Титанік F1		00040019	2004	725 /	ЗГр,ПТ	7	ун	рн	7	7			7	
Толстой F1		02040019	2005	751 /	С	7-9	унів	рс	7	7			7	
Тамаріс F1	®	03040003	2006	900 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Топкапі		04040005	2006	215 /	СЛП	7-9	ун	рс	7	7			9	
Тесті F1		02040020	2005	751 /	С	7-9	унів	рс	7	7			7	
Траян		02040003	2005	964 /	СЛ	7	свж	рс	7	7			7	
Унавський		86040003	1991	343 /	П	5	сал	рс	5	5			5	
Українець		77040013	1983	402 /	ЗГр	5	сал	рс	5	5			5	
Фаворит F1		00040014	2003	725 /	ЗГр,СТ/ ПТ	7	свж	сс	7	7			7	
Флора		92040006	1996	343 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			5	
Флорида 47 Р F1		03040031	2005	744 /	С	7-9	унів	рс	7	7			7	
Фастівський 1	®	03040026	2006	343 /										
Флейта F1		06040010	2007	703 /	ЗГр	7	ун	рс	7	7			7	
Хиларио F1		94040014	2005	744 /	С	7-9	унів	рс	7	7			7	
Хорів	®	04040039	2007	343 /	СЛП	7	ун	ср	7	7			7	
Хайпил 108 F1		03040009	2004	744 /	С	7-9	конс	рн	7	7			7	
Целсус F1		04040009	2005	1197 /	ЗГр,СТ/ ПТ	7-9	унів	рс	7	7			7	
Церасо F1		03040015	2004	744 /	С	7-9	салат	рн	7	7			7	
Цвєтік F1	®	04040034	2007	402 /	СЛП/ЗГр	7	сал	рс	7	7			7	
Цілао F1		06040007	2007	900 /	ЗГр	7	ун	рс	7	7			7	
Чорноморець		04040040	2007	357 /	СЛП	7	свж	рс	7	7			7	
Чарівний F1		92040030	1999	402 /	ЗГр	5	сал	рс	5	5			5	
Чаусянський	®	03040027	2006	1109 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Чарльстон F1		05040078	2007	1050 /	Згр	7	ун	рс	7	7			7	
Чайка	®	02040011	2007	402 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Шафер F1		05040037	2007	1054 /	ЗГр	7	ун	рс	7	7			7	
Шанс		97040030	2001	357 / 357	П	7	ун	рс	7	7			7	

Сорт				Код	Зона	Характеристики								
						Продук-тивність	Напрям викорис-тання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєст-рації	Заявник / Підтримувач						посухи	поля-гання	осипання	хвороб	
Шаста		04040001	2007	213 /	СЛП	7	ун	сс	7	7			7	
Шевальє F1	®	04040031	2007	402 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Шедевр 1		97040031	2001	1109 /	ЛП	5	ун	сс	5	5			7	
Ягуар F1		98040014	2005	744 /	С	7-9	унів	рс	7	7			7	
Яки F1		03040016	2004	744 /	С	7-9	конс	рн	7	7			7	
Достойний F1		05040036	2007	1054 /	СЛП	7	ун	ср	7	7			7	
Джокер		04040007	2006	215 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7-9	
Донхосе F1	®	04040042	2007	900 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Колібрі F1		04040043	2007	900 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Орфей F1	®	00040026	2008	1044 /										
Ольга		04040006	2006	215 /	СЛП	7-9	ун	рс	7	7			7	
Ротор F1		05040016	2008	621 /										
Ротор F1		05040016	2008	603 /										
Сіта F1	®	04040041	2007	900 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Фараон F1		01040008	2007	892 /										
Форсаж F1		06040005	2007	900 /	ЗГр	7	ун	рс	7	7			7	
Хілма F1		06040006	2007	900 /	ЗГр	7	ун	рс	7	7			7	
Щедрик F1	®	04040020	2006	293 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Яна	®	04040019	2008	647 /										
Левада		04040022	2007	432 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Магнус		04040044	2006	1197 /	Зг,Пт	7-9	ун	рс	7	7			7	
Полбіг F1		06040003	2008	751 /										
Самсон		04040014	2008	888 /										
Точ F1		06040002	2008	751 /										
Український		05040011	2008	596 /										
Айша F1		05040010	2007	786 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Ріпа														
Богема	®	06130003	2008	647 /										
Золота куля		02130001	2004	1163 /	СЛП	9	свж	рс	7	7			9	

Сорт			Код	Зона	Характеристики							
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)			Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач					посухи	поляган ня	осипання	хвороб	
Пурпурлепоп		02130002	2004	1163 /	СЛП	9	свж	рс	7	7		7	
Редиска													
18 Карат		02038002	2006	1163 /	СЛП	7	свж	рс	7	7		7	
Арсенал		06038001	2008	647 /	СЛП	7	свж	сс	7	7		7	
Богиня		90038003	1994	402 /	СЛП	5	свж, сал	рс	5	5		5	
Базис		85038003	1989	402 /	СЛП	7	свж, сал	рс	7	7		7	
Білосніжка		03038002	2006	1163 /	СЛП	7	ун	рс	7	7		7	
Вайт Брекфаст		99038002	2002	721 /	С	7	свж	рс	7	7		7	
Герда		06038006	2008	647 /	СЛП	7	свж	сс	7	7		7	
Дабел F1		05038004	2006	753 /	СЛП	7	свж	рс	7	7		7	
Дует		99038001	2002	721 /	С	7	свж,сал	рс	7	7		7	
Джолі		06038008	2008	900 /	СЛП	7	свж	рс	7	7		7	
Еспресо F1	®	04038005	2006	293 /	СЛП	7	свж	рс	7	7		7	
Ілка		92038003	1995	721 /	СЛП	5	свж, сал	ср	5	5		5	
Крімсон	®	04038002	2006	1163 /	СЛП	7	свж	рс	7	7		7	
Ксенія		90038004	1994	402 /	СЛП	7	свж, сал	рс	5	5		5	
Карбона		06038005	2008	647 /	СЛП	7	свж	пс	7	7		7	
Краковянка		06038007	2008	1072 /	СЛП	7	свж	рс	7	7		7	
Кларія		06038009	2008	721 /	СЛП	7	свж	рс	7	7		7	
Кампус	®	04038004	2007	1102 /	СЛП	7	свж	рс	7	7		7	
Катруся		95038001	2000	402 /	СЛП	5	свж, сал	рс	5	5		5	
Лада		00038001	2003	888 /	ЛП	7	свж	рс	7	7		7	
Льодяна бурулька		50038002	1955	381 /	СЛП	5	свж, сал	ср	5	5		5	
Лінда		06038004	2008	647 /	СЛП	7	свж	пс	7	7		7	
Люцинка		02038001	2004	1081 /	СЛ	7	салат	рн	7	7		7	
Міла		98038002	2004	1084 /	СЛ	7	салат	рн	7	7		7	
Марта		05038003	2008	647 /	СЛП	7	свж	сс	7	7		7	
Новиред		03038003	2005	744 /	СЛ	7-9	свж	рс	7	7		7	
Опус		06038003	2008	647 /	СЛП	7	свж	пс	7	7		7	

Сорт				Код	Зона	Характеристики								
						Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляглання	осипання	хвороб	
Пася		05038002	2007	1081 /	СЛП	7	свж	рс	7	7			7	
Пікнік		06038002	2008	647 /	СЛП	7	свж	пс	7	7			7	
Покер		98038003	2000	751 /	СЛП	7	свж,сал	рс	7	7			7	
Рова		97038002	2001	1072 /	СЛП	5	свж	рс	5	5			5	
Рондар F1		05038008	2007	1050 /	СЛП	9	свж	рс	7	7			7	
Рубін		55038005	1947	402 /	СЛП	5	свж, сал	ср	5	5			5	
Ронділ		99038004	2001	1102 /	СЛП	7	свж	рс	7	7			7	
Ребел		98038004	2000	751 /	СЛП	7	свж,сал	рс	7	7			7	
Рудольф		02038005	2005	751 /	С	7-9	всж	рс	7	7			7	
Сора		96038001	1999	753 /	СЛП	7-9	свж, сал	рс	9	7			9	
Селеста		05038007	2006	840 /	Зг	9	свж	рс	7	7			7	
Сакса 2 Нова		01038001	2002	1050 /	СЛП	7	свж	рс	7	7			7	
Снєжка	®	03038001	2006	1081 /	СЛП	7	свж	рс	7	7			7	
Спарта	®	04038003	2007	888 /	СЛП	7	свж	рс	7	7			7	
Саксонія	®	04038001	2006	1163 /	СЛП	7	свж	7	7	7			7	
Тарзан		04038006	2006	840 /	Зг	9	свж	рс	7	7			9	
Фараон		05038001	2006	888 /	СЛП	9	свж	рс	7	7			7	
Френчпоп		02038003	2005	1163 /	СЛ	7-9	свж	рс	7	7			7	
Хельро		99038003	2001	1102 /	СЛП	7	свж, сал	рс	7	7			7	
Червона з білим кінчиком		46038001	1949	313 /	СЛП	7	свж, сал	рс	7	5			5	
Червоний гігант		05038005	2008	635 /	СЛП	7	свж	сс	7	7			7	
Ютренка		05038010	2007	50 /	СЛП	7	свж	рс	7	7			7	
Ясочка	®	04038007	2007	343 /	СЛП	7	свж	рс	7	7			7	
Редька посівна														
Агата		00039001	2001	1081 /	СЛП	7	свж	сс,літ,зим	7	7			7	
Гулівер		06039001	2008	647 /	СЛП	7	ун	сс	7	7			7	
Дуенья		06039002	2008	647 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Лебідка		97039001	1999	402 /	СЛП	7	свж, сал	сс,літ	7	7			7	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач					посухи	поляган-ня	осипання	хвороб	
Одеська 5		51039001	1960	381 /	СЛП	5	свж	сс,літ	5	5			5
Сквирська біла		73039001	1978	339 /	СЛП	7	свж, сал	пс,зим	7	7			7
Сквирська чорна		73039002	1978	339 /	СЛП	7	свж, сал	пс,зим	7	7			7
Сударушка		84039001	1993	402 /	СЛП	7	свж, сал	сс,літ	7	7			7
Трояндова		97039002	1999	402 /	СЛП	7	свж, сал	сс,літ	7	7			7
Тефі		06039003	2008	647 /	СЛП	7	ун	пс	7	7			7
Редька олійна													
Журавка		97096001	2000	332 /	СЛ	7	олн, корм			6	7	8	6
Либідь		91096001	1995	348 /	ЛП	5	корм			5	7	7	5
Райдуга		79096001	1984	348 /									
Ямайка		94096001	1998	430 /	Л	5	олн, корм			5	7	7	5
Салат головчастий													
Годар		97165004	1999	984 /	СЛП	7	свж, сал	рс	7	7			7
Етті		01165001	2002	888 /	СЛП	7	сал	сс	7	7			7
Ларавера	®	04165001	2005	1163 / 1163	СЛП	7	свж	рс	7	7			7
Ленто		01165002	2002	888 /	СЛП	7	сал	сс	7	7			7
Мажор		06165001	2008	647 /	СЛП	7	сал	рс	7	7			7
Марина		06165003	2008	1072 /	СЛП	7	сал	пс	7	7			7
Ольжич		00165002	2001	984 /	СЛП	7	сал	рс	7	7			7
Піжон		06165002	2008	647 /	СЛп	7	сал	пс	7	7			7
Сенатор		05165001	2008	1163 /	СЛП	7	сал	пс	7	7			7
Смуглянка	®	03165001	2005	177 / 984, 177	СЛП	7	свж	рс	7	7			7
Стоік		06165005	2008	635 /	СЛП	7	сал	сс	7	7			7
Фортунас 421		00165001	2001	1102 /	СЛП	7	сал	ср	7	7			7
Цуд Воорбургу		06165004	2008	1072 /	СЛП	7	сал	рс	7	7			7
Салат латук													
Бона		02291003	2004	1084 /	СЛП	7	ун	рн	7	7			7
Вагомий		97291001	1999	357 / 357	СЛП	5	свж, сал	рс	5	5			5

Сорт				Код	Зона	Характеристики								
						Продук-тивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєст-рації	Заявник / Підтримувач						посухи	поля-гання	осипання	хвороб	
Грін Корал		05291012	2008	1163 /	СЛП	7	сал	пс	7	7			7	
Гренада Ожаровська		98291001	2000	1081 /	СЛП	7	свж, сал	рс	7	7			7	
Думка		03291001	2004	1081 /	СЛП	7	ун	рн	7	7			7	
Дивограй		01291003	2006	984 /	СЛП	7	ун.	рс	7	7			7	
Евеліна		02291002	2003	1081 /	СЛП	7	ун	rs	7	7			7	
Заграва		05291005	2008	635 /	СЛП	7	сал	рс	7	7			7	
Зорепад	®	03291002	2005	177 / 984, 177	СЛП	7	свж	рс	7	7			7	
Золотий шар		00291002	2001	984 /	СЛП	7	сал	рс	7	7			7	
Кучерявець одеський		53291001	1987	381 /	СЛ	5	свж, сал	сс	5	5			5	
Королева літа		02291001	2003	1081 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Модесто		98291003	2000	1013 /	СЛП	7	свж, сал	рс	7	7			7	
Оксамит		05291004	2008	635 /	СЛП	7	сал	сс	7	7			7	
Росела		01291002	2002	888 /	СЛП	7	сал	rs	7	7			7	
Рішельє		05291001	2008	635 /	СЛП	7	сал	рс	7	7			7	
Ред Корал		05291013	2008	1163 /	СЛП	7	сал	пс	7	7			7	
Совський		86291003	1991	348 /	СЛП	5	свж, сал	сс	5	5			5	
Слободжанин		97291002	1999	357 /	СЛП	5	свж, тхст	рс	5	5			5	
Сніжинка		97291003	1999	984 /	СЛП	5	свж, сал	рс	5	5			5	
Червоний змій		05291003	2008	635 /	СЛП	7	сал	рс	7	7			7	
Шар малиновий		00291001	2001	984 /	СЛП	7	сал	рс	7	7			7	
Юстина		98291002	2000	1081 /	СЛП	7	свж, сал	рс	7	7			7	
Селера листкова														
Албін		01167001	2002	888 /	СЛП	7	свж	ср	7	7			7	
Аніта		95167001	1999	721 /	СЛП	7	спц	сс	7	7			7	
Діамант		02167003	2004	751 /	СЛП	7	спц	рн	7	7			7	
Едвард		02167001	2003	1081 /	СЛП	7	ун	сс	7	7			7	
Іванко		97167001	1999	402 /	СЛП	7	спц	сс	7	7			7	
Красилівська		88167003	1993	348 /	СЛП	5	спц	сс	7	7			7	
Монарх		86167001	1999	753 /	СЛП	5	спц	сс	5	5			5	

Сорт			Код	Зона	Характеристики							
					Продук-тивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)			Якість
Назва Вид	Номер	Рік реєст-рації	Заявник / Підтримувач						посухи	поля-гання	осипання	хвороб	
Рома ®	04167001	2006	984 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Цілитель	02167002	2003	339 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Чорномор	94167001	1997	339 /	СЛП	7	спц	сс	7	7			7	
Тиква звичайна													
Чарівниця	01401001	2002	357 / 357	СЛП	7	ун	сс	7	7			7	
Фізаліс													
Дачний	92171001	1996	343 /	Л	7	конс	сс	7	7			7	
Жаринка	02171001	2003	348 /	СДП	7	ун	рс	7	7			7	
Ліхтарик	02171002	2003	348 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Хрін													
Валківський	75172001	1977	402 /	СЛП	7	спц	рс	7	7			7	
Цибуля батун													
Байа Верде	05174001	2006	744 /	ПЛС	7	ун.	рс	7	7			7	
Изумрудний остров	03174001	2005	744 /	СЛП	7-9	свж	рс	7	7			7-9	
П'єро	01174001	2003	402 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Параде	06174001	2007	751 /										
Цибуля городня													
Сібір (BGS 204)	07041006	2008	751 /	ЗГр,Ст	7	ун	сс	7	7			7	
Саброссо F1	05041020	2008	753 /	СЛП	7	ун	пс	7	7			7	
Амфора	01041002	2004	402 /	ЛП	7	ун,гост	рн	7	7			7	
Алмадон	90041002	1995	313 /	СЛП	7	ун,г	сс	7	7			7	
Буран	91041002	1998	430 /	СЛП	7	ун,нг	сс	7	7			7	
Банко F1	92041018	1999	1050 /	СЛП	7	ун,нг	сс	7	7			7	
Браво F1	05041003	2006	887 /	СЛП	7	гостра	сс	7	7			7	
Вольська	97041009	2001	1071 /	СЛП	7	ун,г	пс	7	7			7	
Веселка	91041001	1994	402 /	СЛП	7	ун,нг	сс	7	7			7	
Вікторія	00041006	2003	888 /	СЛ	7	ун,г	рс	7	7			7	
Вікторія Скєрнєвіц	05041006	2007	1081 /	СЛП	7	стл	сс	7	7			7	

Сорт				Код	Зона	Характеристики								
						Продук-тивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєст-рації	Заявник / Підтримувач						посухи	поля-гання	осипання	хвороб	
Володимир		04041002	2007	122 /	СЛП	7	стл	рс	7	7			7	
Вольф F1		05041010	2007	887 /	СЛП	7	стл	озимий	7-9	7			7	
Глобус		94041001	1997	402 /	СЛП	7	ун,нг	сс	7	7			7	
Грандина		87041001	1992	429 /	П	5	ун,нг	сс	5	5			5	
Голубка		05041032		350 /	СЛП	7	ун	пс	7	7			7	
Дайтона F1		92041014	1997	751 /	СЛП	7	ун,нг	сс	7	7			7	
Донецька золотиста		70041001	1977	313 /	С	5	ун,г	сс	5	5			5	
Дакапо F1		05041005	2006	887 /	СЛП	7	гостра	сп	7	7			7	
Дербі F1		07041005	2008	751 /	ЗГр,Ст	7	ун	сс	7	7			7	
Золотиста		66041001	1972	402 /	ЛП	5	ун,г	сс	5	5			5	
Кампіло F1		05041027	2006	753 /	СЛП	7	солодка	ср	7	7			7	
Копра F1		88041004	1997	751 /	СЛП	5	ун,нг	сс	5	5			5	
Краса F1		04041001	2008	888 /	СЛП	7	ун	сс	7	7			7	
Кєнди F1		97041005	2001	744 /	СЛ	7-9	ун,г	пс	7	7			9	
Комета F1		99041003	2002	753 /	СП	7	ун	рс	7	7			7	
Львівська		03041002	2007	402 /	СЛП	7	стл	рс	7	7			7	
Лілія		96041003	1999	1019 /	СЛП	5	ун,нг	сс	5	5			5	
Леоне		07041008	2008	751 /	ЗГр,Ст	7	ун	сс	7	7			7	
Любчик	®	03041001	2006	402 /	СЛ	7	гостра	рс	7	7			7	
Марс F1		97041004	2001	744 /	Л	7	ун,нг	сс	7	7			7	
Моноліт 4		05041022	2008	635 /	СЛП	7	ун	сс	7	7			7	
Мавка		00041003	2003	402 /	С	5	ун,г	рс	5	5			5	
Мундіал F1		05041029	2007	1050 /	СЛП	7	стл	ср	7	7			7	
Маріна		96041004	1999	1019 /	СЛП	7	ун,нг	сс	7	7			7	
Манас F1		05041001	2007	751 /	СЛП	7	стл	сс	7	7			7	
Маяк		97041011	2001	984 /	ЛП	7	ун,г	пс	7	7			7	
Нерато F1		05041004	2006	887 /	СЛП	7	гостра	пс	7	7			7	
Оліна		94041004	2001	969 /	Л	7	ун,г	сс	7	7			7	
Пінакл F1		00041002	2002	744 /	С	7	ун,нг	рс	7	7			7	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продук-тивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер	Рік реєст-рації	Заявник / Підтримувач						посухи	поля-гання	осипання	хвороб	
Позолочений Глобус	05041023	2008	635 /	СЛП	7	ун	сс	7	7			7	
Поляновська	06041014	2008	1072 /	СЛп	7	ун	пс	7	7			7	
Пірожка	99041004	2002	1012 /	СЛ	7	ун,нг	сс	7	7			7	
Рейсбургер Балстора	94041007	1997	751 /	СЛП	7	ун,нг	сс	7	7			7	
Рубін	94041003	1999	313 /	СЛП	7	ун,г	рс	7	7			7	
Роккаде F1	98041009	2002	1013 /	П	7	ун,г	сс	7	7			7	
Ред Булл F1	07041007	2008	751 /	ЗГр,Ст	7	ун	сс	7	7			7	
Ред Барон	02041003	2005	751 /	П	7	унів	сс	7	7			7	
Робот (Райнсбургер 5)	06041004	2008	887 /	СЛП	7	ун	пс	7	7			7	
Стерлинг F1	00041001	2002	744 /	С	7-9	ун,со	рс	7	7			7	
Серпнева	05041024	2008	635 /	СЛП	7	ун	сс	7	7			7	
Стригунівська носівська	37041007	1940	429 /	СЛП	5	ун,г	сп	5	5			5	
Сквирська	52041001	1955	339 /	СЛП	5	ун,г	сп	5	5			5	
Стакато F1	01041001	2005	887 /	П	7-9	унів	рс	7	7			7	
Солюшн F1	05041030	2007	1050 /	СЛП	7	стл	ср	7	7			7	
Славний	00041004	2004	313 /	П	7	ун,гост	рн	7	7			7	
Сьерра Бланка F1	03041004	2005	744 /	С	7-9	унів	сс	7	7			7	
Слава Ожарова	05041007	2007	1081 /	СЛП	7	стл	рс	7	7			7	
Спіріт F1	02041002	2006	751 /	ЛП	7	гостра	рс	7	7			7	
Супра	98041001	2003	1081 /	ЛП	7	ун,г	рс	7	7			7	
Ткаченківська	85041004	1991	402 /	Л	5	ун,г	сс	5	5			5	
Тетон F1	78041003	2005	744 /	С	7	свж	рс	7	7			7	
Тамара F1	03041003	2006	751 /	СЛП	7	гостра	ср	7	7			7	
Тареско F1	05041002	2006	887 /	СЛП	7	гостра	сс	7	7	7		7	
Топольська	03041005	2006	1072 /	Л	7	гостра	рс	7	7			7	
Універсо F1	99041002	2002	753 /	СП	7-9	ун	рс	7	7			9	
Форум	05041009	2008	647 /	СЛП	7	ун	сс	7	7			7	
Харківська 82	90041005	1994	402 /	СЛП	5	ун,г	сс	5	5			5	
Червоний Глобус	05041025	2008	635 /	СЛП	7	ун	сс	7	7			7	

Сорт				Код	Зона	Характеристики								
						Продук-тивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєст-рації	Заявник / Підтримувач						посухи	поля-гання	осипання	хвороб	
Черняковська		98041003	2001	1081 /	ЛП	7	ун,г	сп	7	7			7	
Штутті		05041040	2008	1163 /	СЛП	7	ун	пс	7	7			7	
Ялтинська місцева		38041001	1950	357 / 357, 357	С	7	сал,со	рс	7	7			7	
Ялтинський рубін	®	04041003	2007	402 /	СЛП	7	стл	ср	7	7			7	
Яліско F1		06041002	2008	887 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Цибуля порей														
Голет		01175001	2002	888 /	СЛП	7	свж	рс	7	7			7	
Голіас		99175001	2001	1102 /	СЛП	7	сал	сс	7	7			7	
Йолант		82175001	1997	751 /	СЛП	5	сал	сс	5	5			5	
Казімір		95175001	1999	721 /	СЛП	5	сал	сс	5	5			5	
Мацек	®	03175001	2005	1084 /	СЛП	7-9	свж	рс	7	7			7	
Цибуля скорода														
Ельвіра		04177001	2005	888 / 888	СЛП	7-9	свж	рс	7	7			7	
Приліпський		03177001	2005	402 /	СЛП	7-9	свж	рс	7	7			7	
Цибуля слизун														
Лілейна		91309001	1995	348 /	СЛП	7	сал	сс	7	7			7	
Цибуля шалот														
Забава		00176001	2002	402 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Кущівка місцева		90176002	1950	402 /	СЛП	7	сал	рс	7	7			7	
Ліра		02176001	2004	402 /	СЛП	7	ун	рн	7	7			7	
Сюрприз		00176002	2002	402 /	СЛП	7	ун	рс	7	7			7	
Часник														
Дюшес		01042002	2004	402 /	СЛП	9	свж	рс	7	7			7	влеж
Лідер		94042001	2000	369 /	ЛП	7	спц	зим	5	5			9	влеж
Мереф'янський білий	®	01042001	2006	402 /	СЛП	7	ун,	зим	7	7			7	влеж
Промінь		92042001	1999	343 /	СЛП	7	спц	зим	7	5			5	влеж
Спас		93042001	1999	369 /	СЛП	7	спц	зим	9	5			5	слеж
Сакський		61042001	1961	357 / 357, 357	СЛ	5	спц	зим	5	5			5	слеж

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продук-тивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер	Рік реєст-рації	Заявник / Підтримувач						посухи	поля-гання	осипання	хвороб	
Тройка ®	05042001	2006	293 /	СЛП		ун.							
Харківський фіолетовий	90042001	1987	402 /	С	5	спц	зим	7	5			5	слеж
Чорнушка посівна (Нігела)													
Іволга	96280001	1999	984 /	СЛП	7	сал, спц	сс	7	7			7	
Легенда	02280001	2004	357 / 357	СЛП		прм	сс	9				9	
Шпинат													
Бос	97179001	1999	357 / 357	СЛП	7	свж, сал	рс	7	7			7	
Красень Полісся	01179001	2006	984 /	СЛП	7	стол.	рс	7	7			7	
Лазіо F1	02179002	2004	1163 /	СЛП	7	ун	рн	7	7			7	
Щавель													
Одеський 17	63180001	1969	381 /	СЛП	7	свж, стл	рс	7	7			7	
Широколистий	60180003	1963	313 /	СЛП	5	свж, стл	рс	5	5			5	
Цибуля запашна													
Етюд	03416001	2005	313 /	СЛП	7-9	свж	рс	7	7			7	
Гібіск їстивний (Бамія)													
Діброва ®	04426001	2006	984 /	СЛП	7	харч.	рс	7	7			7	
Сопілка ®	04426002	2007	984 /										
Гарбуз мускусний													
Яніна	03228001	2005	410 /	СЛП	7	унів	рс	7	7			7	
Квасоля багатоквіткова													
Дністрівка ®	05463002	2007	334 /	Л	7-8	зерн	сс		5-7	5	5-7	5-7	цін
Сокільчанка ®	05463001	2007	334 /	Л	7-8	зерн	сс		5-7	5	5-7	5-7	цін
Сільськогосподарські: інші													
Аніс													
Артек	94370001	1999	366 / 366	П		х, лік	сс						

Сорт				Код	Зона	Характеристики								
						Продук-тивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поля-гання	осипання	хвороб	
Васильки справжні														
Аметіст	®	05340001	2007	635 /	СЛП	5	ун	пс		4,3	4,7		9	
Бадьорий		98340001	2000	357 / 357	СЛП		свж, сал	рс						
Етруск	®	06340001	2007	647 /	СЛП	7	свж,сал	дп	5	5	5	5	9	
Кримські фіолетові		99340001	2001	357 / 357	СЛП		сал	рс						
Ніжний аромат	®	04340001	2005	317 /	С		спц	рс		9	9	9	9	
Перекотиполе		01340001	2004	984 /	СЛП		спц, зс	рс	9	9			9	
Пурпурова зоря	®	04340002	2005	317 /	С		спц	пс		9	9	9	9	
Рутан		01340002	2004	984 /	СЛП		спц, зс	рс	9				9	
Сяйво		01340003	2004	984 /	СЛП		спц, зс	рс	9				8	
Філософ		06340002	2007	898 /	СЛ	5	ун	рс					8	
Юнга		00340001	2003	402 /	ЛП		х	сс						
Гісоп лікарський														
Атлант		97376001	1999	348 /	СЛП		сал, спц	сс						
Маркіз		02376001	2003	348 /	Л		х	сс						
Нікітський білий		99376001	2002	365 /	Кр		фарм,х	сс						
Ельшольція Стаунтона														
Розове облако		98256001	2002	365 /	Кр		фарм							
Змієголовник														
Медоніс		00336002	2003	402 /	ЛП		х	сс						
Змієголовник молдавський														
Перлинка		00336001	2001	348 /	Л		спц	сс						
Катран Стевена														
Кримський		68184001	1973	357 / 357	СЛП		спц	рс						
Кмин														
Пултівський		94156001	2000	305 /	П		тхн, х	сс						
Перевал		00156001	2004	909 /	С		х, фарм	сс	9	9			9	

Сорт			Код	Зона	Характеристики							
					Продук-тивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)			Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєст-рації	Заявник / Підтримувач					посухи	поля-гання	осипання	хвороб	
Рубін		04156001	2005	1115 /	СЛП		тхн,х	сс	8	7	7	9	9	
Тонус		72156001	1994	339 /	СЛП		тхн, х,спц	сс						
Коріандр														
Американо	®	05185001	2007	635 /	СЛП	5	ун	пс		4,2	4,6	5	4,8	
Айдар		95185001	1999	366 / 366	СЛП		тхн, х	сс						
Гарант		97185001	2003	366 / 366	С		х	сс						
Кіровоградський		69185001	1973	356 /	СЛП		тхн, х	сс						
Лідер		04185001	2005	1115 /	СЛП		тхн,х	сс		5	5	5	8	
Міус		05185002	2007	366 /	СЛ	5	тхн, х, лік	сс		5	5	5	8	
Медун		98185001	2003	366 / 366	С		х	сс						
Нектар		90185002	1999	366 / 366	ЛП		тхн, х	сс						
Оксаніт		90185003	1997	356 /	С		тхн, х	сс						
Пікантний		97185002	1999	357 / 357	СЛП		сал, спц	рс						
Ранній		71185001	1980	366 / 366	С		тхн, х	сс						
Янтар		72185001	1980	366 / 366	СП		тхн, х	сс						
Котяча м'ята														
Мелодія		97112001	1999	348 /	СЛП		сал, спц	сс						
Первенець		82112001	1983	366 / 366	С		тхн, х	сс						
Переможець 3	®	04112001	2007	365 /	С	5	тхн, х	рс	5	4	5	5	9	
Ювілей Вавилова		88112001	1991	366 / 366	С		тхн	сс						
Кріп														
Амброзія		98158002	2000	1084 /	СЛП		спц	рс						
Атлант		02158001	2004	1163 /	СЛП	9	спц	рс	7	7			7	
Грибовський		71158001	1978	149 /	СЛП		спц	рс						
Лісногородський		83158001	1988	149 /	СЛП		спц	рс						
Пахучий		83158002	1997	402 /	СЛП		спц	рс						
Ройал Дилл		03158001	2004	744 /	СЛП	7-9	свж	рс	7	7			7	
Скіф		02158002	2004	366 / 366	СЛ	9	спц	сс	9	7			7	

Сорт				Код	Зона	Характеристики								
						Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляг ання	осипання	хвороб	
Татран		04158001	2005	888 / 888	СЛП	7-9	свж	рс	7	7			7	
Туркус	®	05158002	2006	1081 /	СЛП		свж, спц							
Харківський 85		82158001	1986	402 /	СЛП		спц	рс						
Шмарагд		98158001	2000	1081 /	СЛП		спц	рс						
Лаванда														
Ізіда		92187001	2000	366 / 366	С		парф	сс						
Рання		73187002	1983	366 / 366	С		тхн, х	рс						
Рекорд		57187001	1962	365 / 365	С		тхн, х	сс						
Степова		57187002	1962	366 / 366	С		тхн, х	сс						
Сінєва		86187002	1997	366 / 366	С		тхн, х	пс						
Лавандин														
Темп		92188001	2002	365 /	Кр		фарм.,парф							
Лаконос американський														
Кримський Південнобережний		97298001	2000	365 / 365	Кр	5	хп			6	6	7	5	
Лофант														
Лелека		97281002	1999	348 /	СЛП		сал, спц	сс						
Пам'ять Капелєва		99281001	2002	365 /	С		сал,спц	сс						
Синій велетень		97281001	1999	348 /	СЛП		сал, спц	сс						
Майоран														
Дзвіночок		97190001	1999	348 /	СЛП		сал, спц	сс						
Меліса лікарська														
Мілана		99356001	2002	909 /	Кр		арм.,х.,пр							
Цитронелла		00356002	2002	402 /	ЛП		лік							
Меліса лимонна														
Соборна		00356001	2003	402 /	ЛП		х							

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продук-тивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поля-гання	осипання	хвороб	
Молочай чиновий													
Запорізький	00101001	2001	329 / 329	С	7	олн			8	8	7-9	7	
М'ята													
Заграва	90116001	1995	427 /	СЛП		тхн, х	сс						
Краснодарська 2	61116001	1967	366 / 366	ЛП		тхн, х	сс						
Лідія	91116001	1999	385 /	Л		лік	пс						
Лубенчанка	83116001	1989	385 /	Л		тхн, х	сс						
Мама	98116002	2001	385 /	Л		лік	сс						
Прилуцька карвонна	97116002	2001	427 /	П		х	сс						
Прилуцька 6	49116001	1956	366 / 366	ЛП		тхн, х	сп						
Прилуцька 14	82116001	1988	427 /	ЛП		тхн, х	сп						
Симферопольська 200	84116002	1990	427 /	СП		тхн, х	сс						
Удайчанка	97116001	2001	427 /	СП		х	сс						
Українська перцева	92116001	1998	366 / 366	П		лік, х	сс						
Чорнолиста	78116002	1985	385 /	Л		лік	сс						
Полин лимонний													
Еллада	92196001	2001	365 / 365	С		лік, х	сс						
Рожа рожева													
Олександра	97297002	1999	365 / 365	С	5	хп			6	7	7	5	
Україночка	97297001	2001	365 / 365	С		хп							
Розмарин лікарський													
Горізонт	98339001	2002	365 /	Кр		парф,х							
Сафлор красильний													
Професор Машанов	95323001	2000	365 / 365	С	5	хп			6	7	7	5	
Сонячний	99323001	2001	329 / 329	С	5	олн			6	7	7	5	
Степовий ®	05323001	2006	1192 /	С	7	олн			8	8	9	8	

Сорт				Код	Зона	Характеристики								Якість
						Продук-тивність	Напрям викорис-тання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				
Назва	Вид	Номер	Рік реєст-рації	Заявник / Підтримувач						посухи	поля-гання	осипання	хвороб	
Троянда ефіроолійна дамаська														
Лура		97238001	2001	366 / 366	С		тхн, х	сс						
Лань		86238001	1990	366 / 366	С		тхн, х	рс						
Радуга		90238001	1984	366 / 366	С		тхн, х	рс						
Тютюн														
Американ 307		75019002	1981	360 /	С	5	аром			7	7		8	
Американ 26		01019002	2004	360 /	С	9	скел.,аром.			8	8		7	
Американ 63		94019009	2000	360 /	С	5	аром			7	7		5	
Американ 14		01019001	2004	360 /	С	9	аром			8	8		7	
Ароматний 1		98019001	2004	360 /	С	8	аром.			8	8		7	
Галицький оригінальний	®	05019001	2007	396 /	СЛ	9	аром			9	9		8	
Дюбек новий		86019002	1990	360 /	С	7	аром			7	8		7	
Дюбек 50		72019001	1979	360 /	С	5	аром			7	8		8	
Ранішеспілий		98019002	2004	360 /	С	8	скел, аром.			8	8		7	
Берлей 38		97019002	2001	396 /	ЛП	7-9	аром			8	8		7-9	
Вірджинія 15		97019003	2002	396 /	Л	7-9	аром			8	8		7	
Крупнолистий 4		94019005	1999	396 /	Л	7-9	склт			8	8		7-9	
С-9		94019007	2002	396 /	Л	7-9	склт			8	8		7-9	
Тернопільський 7		90019008	1995	396 /	Л	7	склт			8	8		7-9	
Тернопільський 14		94019008	1999	396 /	Л	7-9	склт			8	8		7-9	
Фенхель														
Зефір		91200001	1996	357 / 357	СЛП		свж, сал	рс						
Кримський		78200001	1984	366 / 366	Л		тхн, х	сс						
Мерцишор		86200001	1999	366 / 366	П		тхн, х	сс						
Оксамит Криму		99200001	2003	366 / 366	С		х	сс						
Хміль														
Альта		90021004	1997	318 /	П	7	пв,пер	рс	>5	7			7-9	

Сорт				Код	Зона	Характеристики								
						Продук-тивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєст-рації	Заявник / Підтримувач						посухи	поля-гання	осипання	хвороб	
Житомирський 75		03021002	2006	320 /	П	8	пв.	сс	6	7			8	т.аром.
Заграва		92021001	1999	318 /	П	7-9	пв,пер	сс	7	7			7	
Клон 18		65021003	1969	318 /	ЛП	5	пв	сс	>5	7			5	
Національний	®	03021003	2004	191 / 192, 191	П	7	аром.	сс	8	7			7	
Полісянка		98021005	2004	320 /	П	7-9	аром.	сс	7	7			7	
Пивовар		03021001	2006	320 /	ЛП	7-9	пив, хмел.	сс	6	7			8	т. Аром
Регент		90021007	1996	318 /	ЛП	5	пв	сс	>5	7			5	
Славянка		88021001	1995	318 /	ЛП	5	пв,пер	сс	7	7			7	
Хмелеслав		98021001	2004	320 /	П	7	аром.	сс	7	7			7,5	
Видибор		05021001	2006	320 /	П	8	пв.фарм.	сс	7	7			8	т.аром.
Зміна		90021003	2001	318 /	П	7-9	пв,пер	сс	7	7			7-9	
Злато Полісся		99021003	2002	1100 /	П	7-9	пв	сс	7	7			7-9	
Кумир		90021005	1995	318 /	ЛП	5	пв,пер	сс	5	7			5	
Назарій		98021010	2004	320 /	П	7-9	пром.	сс	7	7			7,5	
Надія		98021012	2004	320 /	П	7	гірк.	сс	6	6			7,5	
Оскар		05021002	2006	320 /	П	8	пв.фарм.	сс	7	7			8	т.аром.
Оболонський		99021001	2003	1100 /	П	7-9	пв	сс	7	7			7	
Промінь		92021002	2001	318 /	П	7-9	пв,пер	сс	7	8			7-9	
Тріумф	®	05021005	2006	1100 /	П	8	пв.фарм.	сс	7	7				т.аром.
Граніт		85021001	1993	318 /	П	5	пв,пер	пс	>5	7			7	
Гайдамацький		94021003	1999	318 /	П	7-9	пв,пер	пс	7-9	7			7-9	
Житич		85021006	1992	318 /	П	5	пв,пер	пс	>5	7			7	
Потіївський		90021008	1997	318 /	П	7	пв,пер	пс	7	7			7-9	
Руслан		99021002	2003	1100 /	П	7-9	пв	сс	7-9	8			7-9	
Хризантема ефіроолійна														
Тала 86-4		91250009	1999	906 /	С		парф	сс						
Тала 86-3		91250008	1999	906 /	С		парф	сс						
Тала 86-1		91250006	1999	906 /	С		парф	сс						

Сорт				Код	Зона	Характеристики								
						Продук-тивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поля-гання	осипання	хвороб	
Хризантема увінчана														
Еліксир		00382001	2002	357 / 357	СЛП		свж							
Цмин італійський														
ВІМ		99296001	2007	365 /	С	5	лік, тхн	сс	4	5			5	
Кристал		99296002	2007	365 /	С	5	лік	сс	4	5			9	
Чабер гірський														
Кримський Смарагд		99371001	2007	365 /	С	5	тхн, х	рс	5	5			5	
Чабер садовий														
Март'ян		98279002	2002	365 /	Кр		х							
Остер		96279001	1999	984 /	СЛП		сал, спц	сс						
Чебрець														
Фантазія		01390001	2004	365 /	С		фарм	пс	9	4			9	
Чебрець камфорний														
Світлячок		00473001	2007	365 /	С	5	фарм	пс	5	5			5	
Чорнобривці прямостоячі, повняки														
Лимонний 1		97363002	1999	365 / 365	С	5	хп			7	7-9	7-9	5	
Оранжевий 1		97363001	1999	365 / 365	С	5	хп			6	7-9	7-9	7	
Шавлія мускатна														
Ай-Тодор		98204001	2003	366 / 366	С		х	ср						
Дуаліст		99204001	2002	909 /	Кр		фарм	сс						
Кримська пізня		81204001	1991	366 / 366	С		тхн, х	пс						
Кримська однорічна		92204001	2000	366 / 366	С		парф	сс						
Мрія		96204001	2001	366 / 366	С		тхн	ср						
Однорічна		88204001	1995	366 /	С		тхн, х	сс						
С 785		61204001	1967	366 / 366	С		тхн, х	сс						
С 1112		90204001	1976	366 / 366	С		тхн, х	сс						

Сорт				Код	Зона	Характеристики								
						Продук-тивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєст-рації	Заявник / Підтримувач						посухи	поля-гання	осипання	хвороб	
М'ята довголиста														
Діана		04430001	2008	427 /										
Посульська ліналоольна		03430001	2008	385 /										
Монарда трубчата														
Прем"єра	®	05445001	2007	1067 /	С	5	арф, тхн, лі	рс	5	4			5	
Плодові та ягідні														
Яблуня домашня														
Алкмене		84086009	1996	1010 / 344	ЛП		ун	осін	9	7		7	7	
Аскольда		88086001	1999	344 / 344	ЛП		свж	зим	9	7		7	9	влеж
Айдаред		73086026	1986	1010 / 344	СЛ		свж	зим	9	9		9	9	влеж
Аврора кримська		73086019	1977	359 / 359	С		свж	зим	9	9		9	9	влеж
Антонівка звичайна		90086015	1928	1010 / 344	ЛП		ун	осін	9	9		7	7	
Аполлон	®	05086001	2007	324 /	ЛП		свж, тхн	літ	9	7			8	9
Алі паруси		82086007	1994	359 / 359, 359	С		свж	літ	9	7			7	
Амулет	®	94086020	2006	344 /	СЛ		ун	рзим	9	9			9	9
Балаклавське		85086004	2001	359 / 359	С		свж	зим	9	7		7	7	влеж
Благодать	®	02086003	2006	424 /	СЛ		ун	зим	9	9			9	7
Голден Делішес		66086002	1969	1010 / 344	СЛ		свж	зим	9	9		9	9	влеж
Гала		78086013	1993	1010 / 344	С		свж	осін	7	7		7	7	
Гарант	®	01086004	2006	344 /	СЛП		ун	пзим	9	9			9	
Городищенське		97086008	2008	424 /	СЛ	85	дес.	зим.	9	8			7	8
Д-1071		94086002	2000	314 /	С		підщ.		9	9			9	
Джонатан		47086010	1954	1010 / 344	Л		свж	зим	9	9		7	7	влже
Д- 471		88086002	2000	314 /	С		підщ.		9	9			9	
Даринка	®	02086004	2006	424 /	СЛ		ун	зим	9	9			9	7
ЕМ-IX		75086010	1976	1010 / 344	С		підщ.		9	9			9	
Едера		97086007	2001	344 / 344	ЛП		свж	зим	9	9		7	9	влеж
Зимове лимонне		55086001	1969	403 /	ЛП		свж	зим	9	7		7	7	слеж

Сорт				Код	Зона	Характеристики								
						Продук-тивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поля-гання	осипання	хвороб	
Катерина		94086013	2001	344 / 344	ЛП		свж	зим	9	7		7	7	слеж
Кимерія		92086003	1997	359 / 359	С		свж	зим	7	7		7	7	слеж
Кальвіль донецький		71086001	1987	314 /	С		свж	зим	9	7		7	7	слеж
Кальвіль сніговий		47086005	1957	1010 / 424	ЛПС		свж	зим	9	7		5	7	влеж
Краснокутське солодке		86086003	2003	403 /	Л		свж	осін	7	9		7	7	
Кримське		75086004	1999	359 / 359	Кр		свж	зим	7	7		7	7	слеж
Кримське зимове		69086006	1984	359 / 359	С		свж	зим	9	7		7	7	влеж
Каразинське		97086002	1999	403 /	Л		свж	зим	7	7		7	7	слеж
Любава	®	02086005	2006	424 /	Л		ун	зим	9	9			9	
Мліївське літнє		61086002	1962	424 /	Л		свж	літ	9	7		7	7	
ММ-106		75086014	1984	1010 / 344	СЛП		підщ.		9	9			9	
Мелба		40086003	1962	1010 / 344	СЛП		свж	літ	9	9		7	7	
Мінкар		90086006	2002	325 /	СЛ		свж	зим	7	7		7	7	влеж
Мантуанер		38086009	1989	1010 / 590	С		свж	зим	9	9		9	9	влеж
Орнамент	®	92086009	2005	344 / 344	СЛ	7	свж	зим	9	9			9	9
Паніровка		38086003	1950	1010 / 344	СЛП		свж	літ	9	9		7	7	
Прима		76086023	1991	1010 / 344	С		свж	осін	9	7		7	7	
Пепінка золотиста		55086002	1971	424 /	СЛП		свж	осін	9	9		7	7	
Предгорне		75086026	1999	359 / 359	Кр		свж	зим	7	7		7	7	слеж
Перлина Києва		94086021	2001	344 / 344	ЛП		свж	зим	9	7		7	7	слеж
Ровесник		78086006	2000	424 /	СЛ		свж	зим	7	7		7	7	слеж
Ренет Симиренка		47086006	1957	424 /	СЛП		свж	зим	9	9		9	7	влеж
Рубінове Дуки		74086003	1983	344 / 344	Л		свж	зим	7	7		7	7	слеж
Рум'яний альпініст		87086002	1997	365 / 365	С		свж	зим	7	7		7	7	слеж
Радогость		92086018	2000	344 / 344	ЛП		свж	зим	7	7		7	7	слеж
Росавка		80086003	1992	424 /	СЛ		свж	зим	9	9		7	7	влеж
Спартан		70086013	1986	1010 / 344	СЛП		свж	зим	9	9		7	7	влеж
Салгірське		73086021	1981	359 / 359	С		свж	осін	7	7		7	7	
Старсол	®	05086002	2007	324 /	ЛП		свж, тхн	осін	9	8			8	8

Сорт				Код	Зона	Характеристики								
						Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляглання	осипання	хвороб	
Сапфір		82086011	2001	424 /	ЛП		свж	зим	7	7		7	7	слеж
Сентябрське красне		69086010	1989	359 / 359	С		свж	осін	9	7		7	7	
Симиренківець		80086004	1997	424 /	Л		свж	зим	9	7		7	7	влеж
Скіфське золото	®	92086010	2006	344 /	СЛ		ун	рзим	9	9			9	
Слава переможцям		47086008	1954	424 /	СЛП		ун	осін	9	9		7	7	
Теремок		90086002	1999	344 / 344	ЛП		ун	осін	9	7		7	7	
Таврія		75086008	1984	359 / 359	С		свж	зим	7	7		7	7	слеж
Флоріна		94086011	2003	1010 / 424	СЛ		свж	зим	9	7		9	9	слеж
Ювілейне Міс	®	04086003	2006	424 /	Л		ун	зим	9	9			9	9
Брейберн		04086001	2007	420 /	С		свж	пс	7	7			8	8-9
Власта	®	02086002	2006	424 /	Л		ун	осін	9	9			9	7
Мліївчанка осіння		92086020	2008	424 /	Л	98	дес.	посін.	9	9			8	8
Чемпіон		04086002	2007	420 /	С		свж	сс	7	7			8	8-9
Скіфянка		92086001	2006	325 /	С		свж.	літ	9	9			9	7
Груша														
Буковинка		87076007	1997	433 /	Л		ун	осін	7	7		7	7	
Бере київська		72076001	1991	344 / 344	Л		свж	зим	9	9		7	7	влеж
Бере Боск		40076005	1950	1010 / 344	СЛ		свж	осін	9	9		9	7	
Вільямс Руж Дельбара		68076003	1988	1010 / 344	С		свж	літ	9	9		7	7	
Вижниця		87076012	1999	344 / 344	ЛП		свж	осін	9	7		7	7	
Вільямс		40076009	1950	1010 / 344	СЛ		ун	літ	9	7		7	7	
Васса		66076001	1979	359 / 359	С		свж	зим	9	7		7	7	слеж
Вітчизняна		57076002	1969	359 / 359	СЛ		свж	зим	9	7		7	7	слеж
Гранд Чемпіон		73076005	1988	1010 / 344	С		свж	осін	9	9		7	7	
Десертна		57076001	1969	359 / 359	С		свж	осін	7	7		7	7	
Етюд		87076013	1999	372 / 344	ЛП		свж	зим	9	7		7	7	влеж
Звеняченська		92076024	1997	433 /	Л		ун	осін	7	7		7	7	
Золотава	®	05076004	2007	403 /	Л		свж	осін	7	7-8			8-9	7-8
Зимова мліївська		68076001	1989	424 /	Л		свж	зим	9	7		7	7	влеж

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач					посухи	поля-гання	осипання	хвороб	
Золотиста		58076001	1975	359 / 359	С		свж	зим	9	7		7	7	влеж
Золотоворітська		81076004	1995	372 / 344	Л		свж	зим	9	9		9	9	влеж
Ізюминка Криму		83076003	1995	359 / 359	С		свж	зим	9	7		7	7	слеж
Ізумрудна		82076009	1994	359 / 359	С		свж	зим	9	7		7	7	слеж
ІС 4-6		98076002	2000	344 / 344	ЛП		підщ.		9	9			9	
ІС 2-10		98076001	2000	344 / 344	ЛП		підщ.		9	9			9	
Корсунська		49076001	1972	424 /	Л		свж	літ	9	7		7	7	
Крупноплідна		87076011	1997	433 /	Л		ун	осін	9	7		7	7	
Кучерянка		88076003	1997	433 /	Л		ун	зим	9	9		9	9	влеж
Кюре		40076013	1950	1010 / 344	СЛП		свж	зим	9	9		9	9	влеж
Конференція		54076001	1975	1010 / 344	ЛП		свж	осін	9	9		7	9	
Лимонка		40076003	1950	1010 / 344	СЛ		ун	літ	9	9		7	7	
Марія		92076011	2001	359 / 359	Кр		свж	зим	7	7		7	7	слеж
Малевчанка		88076002	1997	433 /	Л		ун	осін	7	7		7	7	
Мліївська рання		55076001	1962	424 /	Л		ун	літ	7	7		7	7	
Мрія		97076002	2008	359 /	СЛ	92	техн.	зим.	9	9			8	9
Надежда степу		87076003	2000	365 / 365	С		свж	осін	7	7		7	7	
Ноябрська Молдавії		95076002	2000	365 / 365	Кр		свж	зим	9	7		7	7	влеж
Основ'янська		69076001	1987	403 /	СЛ		свж	осін	9	9		7	7	
Осінь Буковини		88076001	1997	433 /	Л		ун	осін	9	7		7	7	
Придністрянка		87076005	1997	433 /	П		ун	осін	7	7		7	7	
Платонівська	®	06076001	2007	424 /	Л		свж	осін	8	9			8-9	9
Роксолана		81076005	1995	372 / 344	СЛ		свж	зим	9	9		9	9	слеж
Стрійська		86076002	1999	344 / 344	ЛП		свж	зим	9	9		9	9	влеж
Солодка з Млієва		52076001	1981	424 /	Л		свж	літ	77	7		7	7	
Смерічка		83076002	1995	372 / 344	Л		свж	осін	7	7		9	7	
Старкримсон		73076007	1985	1010 / 344	С		свж	літ	9	9		9	7	
Сторожинецька		92076005	1997	433 /	Л		ун	зим	9	9		9	9	слеж
Трембіта		80076008	1995	372 / 344	Л		свж	осін	7	7		7	9	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляган ня	осипання	хвороб	
Таврійська	74076003	1976	359 / 359	СЛ		свж	осін	9	7		9	7	
Улюблена осіння	82076006	1987	403 /	Л		свж	осін	7	7		7	7	
Улюблена Клаппа	40076015	1950	1010 / 344	СЛП		свж	літ	9	7		7	7	
Черемшина	82076002	2000	344 / 344	ЛП		свж	зим	9	9		7	7	влеж
Чернівчанка	87076006	1997	433 /	Л		ун	осін	7	7		7	7	
Щедра	51076002	1978	424 /	Л		свж	осін	7	7		7	7	
Яблунівська	87076009	1997	433 /	Л		ун	зим						влеж
Яніс ®	06076002	2007	433 /	Л		ун	посін	8-9	8-9			9	8-9
Весільна	03076003	2006	325 /	С		ун	осін	9	9			9	7
Вересневе Дево ®	05076001	2006	344 /	ЛП		ун	осін	9	9			9	9
Оксамит ®	01076002	2006	424 /	Л		ун	осін	9	9			9	7
Посмішка	04076005	2006	325 /	С		ун	росін	9	9			9	9
Чистенька	04076006	2006	325 /	С		ун	росін	9	9			9	7
Якимівська	86076003	2000	359 / 359	С		свж	осін	9	7		9	7	
Провінціалка	03076002	2006	325 /	С		ун	посін	9	9			9	7
Бере Десятова ®	04076001	2006	344 /	СЛ		свж	рс	9	9			9	9
Уманська ювілейна ®	04076002	2006	344 /	СЛ		свж	рс	9	9			9	9
Дитяча	04076007	2006	325 /	С		ун	посін	9	9			7	7
Райдуга ®	01076001	2006	424 /	Л		ун	пс	9	9			9	7
Катюша	04076003	2006	325 /			ун	посін	9	9			9	7
Пекторалъ	03076001	2006	325 /	С		ун	осін	9	9			9	7
Кандидатка	04076004	2006	325 /	С		ун	зим	9	9			9	7
Айва													
Академічна	97207004	1999	348 /	СЛП		ун	сс	7	7		5	5	
Дарунок онуку	97207002	1999	348 /	СЛП		ун	ср	7	7		5	7	
Кримська ароматна	72207001	1981	365 / 365	СЛ		ун	сс	9	7		7	7	
Кримська рання	68207004	1982	365 / 365	С		ун	рс	7	7		7	5	
Кащенка №18	97207001	1999	348 /	ЛП		ун	рс	9	7		7	5	
Мир	72207003	1981	365 / 365	СЛ		ун	сп	7	7		5	7	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продук-тивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач					посухи	поля-гання	осипання	хвороб	
Марія		97207003	1999	348 /	СЛП		ун	сс	7	7	5	5	
Отличниця		68207005	1976	365 / 365	С		ун	сс	7	7	5	5	
Студентка		87207001	1999	348 /	СЛП		ун	сс	7	7	7	7	
Сєдобна		98207001	2001	365 / 365	С		ун	сс	9	7	7	5	
Сказочна		98207002	2001	365 / 365	С		ун	сс	9	7	5	5	
Хеномелес													
Вітамінний		99362001	2001	348 /	ЛП		ун	рс	9	7	7	5	
Караваєвський		99362003	2001	348 /	ЛП		ун	пс	9	7	7	5	
Каліф		98362004	2001	314 /	СЛ		тхн	рс	9	7	7	5	
Ніколай		98362001	2001	314 /	СЛП		тхн	рс	9	7	7	7	
Ніна		98362002	2001	314 /	СЛП		тхн	рс	9	7	7	7	
Ніка		98362003	2001	314 /	СЛП		тхн	рс	9	7	7	7	
Помаранчевий		99362002	2001	348 /	ЛП		ун	сс	9	7	7	5	
Цитриновий		99362004	2001	348 /	ЛП		ун	сс	9	7	7	5	
Абрикос													
Ананасний мічурінський		40070001	1962	365 / 365	С		ун	сс	9	7	7	7	
Авіатор		83070001	1995	365 / 365	С		ун	пс	7	7	5	5	
Ботсадівський		83070006	2001	348 /	СЛ		ун	ср	7	5	7	5	
Буревісник		78070001	1991	365 / 365	С		стл	рс	7	7	5	5	
Зоряний		84070001	2000	325 /	С		ун	ср	7	5	7	7	
Кумір		03070003	2006	325 /	С		ун	надранній.	9	7		9	
Кримський амур		83070002	1994	365 / 365	С		ун	сп	7	7	5	7	
Краснощокий		48070001	1958	1010 / 424	СЛ		ун	сс	9	9	7	7	
Консервний пізній		47070001	1969	365 / 365	С		ун	пс	9	7	7	7	
Олімп		69070001	1983	365 / 365	СЛ		ун	сс	7	7	7	7	
Пам'ять Кащенка		78070003	2001	348 /	СЛ		ун	рс	9	7	7	7	
Парнас		69070002	1982	365 / 365	С		ун	сс	9	9	7	7	

Сорт				Код	Зона	Характеристики								
						Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	полягання	осипання	хвороб	
Поліський крупноплідний		74070001	1985	344 / 344	С		ун	сс	7	7		5	5	
Форум		72070001	1992	365 /	С		ун	рс	7	7		5	5	
Тащенакський		03070002	2006	325 /	С		ун	ср	7	9			9	
Дар Мелітополя		04070002	2006	325 /	С		ун	сп		9			9	
Садовий		04070001	2006	325 /	С		ун	сп						
Алича														
Генерал	®	06072002	2007	314 /	ЛС		ун	сп	9	9			9	7-8
Десертна		48072001	1969	365 / 365	С		ун	сс	9	9		5	7	
Дончанка рання		92072004	1997	314 /	Л		свж	рс	9	9		7	7	
Київська гібридна		84072002	2001	348 /	СЛ		ун	рс	9	7		7	7	
Найдьониш		86072005	1998	314 /	Л		ун	пс	9	7		7	5	
Обільна		57072001	1969	365 / 365	С		ун	рс	9	9		7	7	
Оленька		86072001	1995	365 / 365	СЛ		ун	сс	9	9		7	7	
Пламенна		86072004	1998	314 /	Л		ун	пс	9	7		5	5	
Тетяна	®	06072001	2007	344 /	ЛС		ун	сп	8	8			9	7-8
Вишня														
Альфа		79074001	2000	424 /	Л		ун	сп	9	9		5	5	
Взгляд		92074002	2005	325 /	СЛ	7	ун	сс	9	9			7	
Воспомінаніє		92074001	2005	325 /	СЛП	7	ун	сс	9	9			7	
Гріот мелітопольський		80074001	2002	325 /	С		ун	сс	9	9		7	7	
Гріот Подбєльський		38074008	1948	1010 / 344	СЛП		ун	сс	9	9		7	7	
Мелітопольська десертна		47074005	1954	325 /	СЛ		ун	сс	9	7		5	7	
Норд Стар		84074005	1995	1010 / 344	П		ун	пс	9	9		9	9	
Ранній десерт		94074003	2005	325 /	СЛ	7	ун	рс	9	9			9	
Спутниця		94074005	2005	325 /	СЛП	7	ун	сс	9	9			9	
Любительська		02074001	2006	325 /	С		ун	пс	9	9			9	
Відродження	®	04074002	2006	325 /	С		ун	пс	9	9			9	
Ерудитка		89074002	2006	325 /	С		ун	пс	9	9			7	

Сорт				Код	Зона	Характеристики								
						Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляглання	осипання	хвороб	
Солідарність		92074012	2005	325 /										
Зміниця	®	04074001	2006	325 /	С		ун	пс	9	7			9	
Згода	®	04074003	2006	325 /	С		ун	пс	9	7			9	
Нотка		89074003	2006	325 /	С		ун	пс	7	9			7	
Черешня														
Аеліта		77085004	1989	314 /	СЛ		ун	сп	9	7		5	5	
Амазонка		90085002	2001	314 /	Л		ун	пс	7	7		5	5	
Валерій Чкалов		52085001	1954	238 /	СЛП		ун	рс	9	9		7	7	
Валерія		88085004	2001	314 /	Л		ун	сс	9	7		5	7	
Виставочна		47085001	1972	365 / 365	СЛ		ун	пс	9	9		7	7	
Генеральська		48085002	1989	365 / 365	С		ун	пс	9	9		7	7	
Дружба		76085001	2001	325 /	С		ун	сс	9	7		7	5	
Дрогана жовта		40085002	1950	1010 / 344	СЛП		ун	пс	9	9		7	7	
Дончанка		71085001	1985	314 /	СЛ		ун	сп	7	7		5	7	
Донецький угольок		77085007	1990	314 /	СЛ		ун	пс	7	7		7	7	
Донецька красавиця		82085006	1987	314 /	С		ун	сс	9	7		7	5	
Зодіак		94085002	2005	325 /	СЛП	9	ун	сп	9	9			9	
Заря Востока		72085002	1996	365 / 365	Л		ун	сс	9	7		5	5	
Забута		86085008	2002	325 /	П		ун	пс	7	9		7	5	
Зоряна (Возвращеніс)		99085006	2002	424 /	Л		ун	пс	9	7		7	7	
Іскра		79085001	1998	325 /	С		ун	сп	7	7		7	7	
Китаївська чорна		50085003	1962	344 / 344	ЛП		ун	сс	7	5		5	5	
Кримська ніч		75085002	1998	365 /	СЛ		ун	сс	7	7		5	5	
Любава	®	06085002	2007	314 /	СЛП		ун	сп	7	7			8	8
Легенда Мліїва	®	06085001	2007	424 /	Л		ун	сс	7	7			8	9
Міраж		88085002	2003	325 /	Л		ун	рс	9	7		7	7	
Мелітопольська красна		71085004	1996	325 /	СЛ		ун	сс	9	9		7	7	
Меотіда		02085001	2003	325 /	Л		ун	сс	9	7		7	7	
Нектарна		49085003	1954	424 /	СЛ		ун	пс	9	7		7	7	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач					посухи	поляган ня	осипання	хвороб	
Оріон		81085001	1998	325 /	Л		ун	сс	7	7	5	5	
Престижна		74085003	1990	325 /	С		ун	сп	9	7	7	7	
Патріотка Криму		82085003	2003	365 /	С		ун	рс	9	9	7	7	
Рожева мліївська		49085001	1962	424 /	ЛП		ун	пс	7	7	5	7	
Рання Дуки		49085002	1972	344 / 344	Л		свж	рс	7	7	5	5	
Сюрприз		70085004	1982	325 /	С		ун	сп	9	7	5	5	
Чорнокримка		86085006	2003	365 /	С		ун	рс	9	7	7	5	
Янтарна		47085009	1980	365 / 365	Л		ун	пс	7	7	5	5	
Ярославна		77085003	1989	314 /	СЛ		ун	ср	9	7	7	5	
Визнання		02085002	2007	325 /	ЛС		свж	ран	9	9		7	8
Ера		89085003	2007	325 /	ЛС		ун	ран	9	9		7-8	9
Дебют		02085004	2007	325 /	СЛ		ун	сер	7	7		8	8-9
Аншлаг	®	04085003	2007	325 /	ЛС		ун	сс	9	7		8	9
Ласуня	®	04085005	2007	325 /	ЛС		ун	сс	9	7		8	9
Ніжність	®	05085001	2006	344 /	ЛП		ун	сс	9	9		9	
Простір		02085006	2007	325 /	СЛ		ун	сс	9	7		7	8-9
Шанс	®	04085004	2007	325 /	ЛС		ун	сс	9	7		8	9
Епос		89085002	2007	325 /	СЛ		ун	сер	9	9		7	9
Суперниця		02085003	2007	325 /	СЛ		ун	сп	9	7		8	9
Віха		02085005	2007	325 /	ЛС		ун	пізн	9	7		8	8
Дивна	®	04085001	2007	325 /	ЛС		ун	пізн	9	7		8	8-9
Любимиця Туровцева	®	04085002	2007	325 /	ЛС		ун	пізн	9	7		8	8
Темпоріон		89085001	2007	325 /	СЛ		ун	пізн	9	9		7	9
Слива													
Анна Шпет		39080001	1949	1010 / 344	СЛП		ун	пс	9	9	7	5	
Валор		89080001	1997	1010 / 344	Л		ун	сп	9	9	5	5	
Волошка		76080001	1980	424 /	СЛП		ун	пс	9	9	5	5	
Ненька	®	06080001	2007	424 /	Л		ун	ран	8	8		8-9	9
Ода		79080003	1986	424 /	Л		свж	рс	9	9	5	5	

Сорт			Код	Зона	Характеристики							
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)			Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач					посухи	поляглання	осипання	хвороб	
Ренклод Альтана		39080009	1954	1010 / 344	СЛП		ун	сп	9	9	7	7	
Ренклод Карбишева		75080001	1984	314 /	Л		ун	рс	9	9	7	7	
Ренклод ранній		90080002	1988	314 /	С		свж	рс	9	7	5	5	
Сентябрська		48080002	2003	424 /	Л		ун	сп	9	9	7	7	
Стенлей		76080006	1988	1010 / 344	СЛ		ун	пс	9	9	7	7	
Угорка крупна		90080001	1992	365 /	С		ун	сс	9	9	7	7	
Угорка донецька рання		71080001	1984	314 /	С		ун	пс	9	7	5	5	
Угорка донецька		71080004	1985	314 /	С		ун	пс	9	7	7	5	
Угорка італійська		39080003	1949	1010 / 424	СЛП		ун	пс	9	9	7	7	
Чачакська найкраща		90080005	1999	363 / 363	С		ун	пс	9	7	5	5	
Персик													
Волшебний		68079008	1995	365 / 365	С		ун	сс	9	7	7	7	
Восток 3		81079002	1995	365 / 365	С		ун	сс	7	7	7	7	
Віренся		94079001	2003	325 /	С		ун	сс	7	7	7	7	
Дніпровський		67079001	1979	348 /	СЛ		ун	рс	7	5	5	5	
Дружба		70079001	1972	348 /	Л		стл	сс	7	5	5	5	
Золота Москва		72079004	1982	365 / 365	С		стл	сп	7	7	7	7	
Знамя		74079002	1986	365 / 365	С		ун	пс	7	7	7	7	
Златогор		51079001	1976	365 / 365	С		ун	рс	7	7	7	7	
Іван Туніцин		94079002	2005	325 /	СЛП	7	ун	сс	9	9		7	
Красна дівиця		63079002	1977	365 / 365	С		стл	сп	7	7	7	7	
Кримський фейєрверк		84079009	1995	365 / 365	С		ун	рс	7	7	5	7	
Кримська осінь		83079003	1999	365 / 365	С		ун	пс	7	7	7	7	
Київський ранній		50079001	1954	344 / 344	СЛ		стл	рс	5	7	7	5	
Кремлівський		47079002	1954	365 / 365	С		стл	рс	7	7	7	7	
Лебедєв		48079001	1969	365 / 365	С		ун	сс	7	7	7	7	
Лісостеповий		78079001	1993	348 /	С		стл	рс	7	7	7	7	
Любимець II		97079005	2001	348 /	СЛ		ун	сс	7	7	7	5	
Муза		68079003	1982	365 / 365	С		стл	пс	7	7	7	7	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач					посухи	поляг-ання	осипання	хвороб	
Мрія		94079003	2005	325 /	СЛП	7	ун	пс	9	9		9	
Молодіжний		63079004	1982	365 / 365	СЛ		стл	сс	5	5	5	5	
Оксамитовий		92079014	2001	348 /	Л		ун	ср	7	5	5	5	
Пам'ять Гришко		92079005	2001	348 /	СЛ		ун	пс	5	5	5	5	
Посол миру		92079001	2002	365 /	С		ун	рс	7	7	7	7	
Подарок Києва		78079003	1993	348 /	С		стл	сс	7	7	7	7	
Потомок		77079002	1992	365 /	С		ун	сс	7	7	7	7	
Пушистий ранній		47079004	1954	365 / 365	СЛ		стл	рс	5	5	5	5	
Підщепний 1		75079004	1990	348 /	С				9	9	-	9	
Пам'ять Шевченка		71079002	1978	348 /	С		ун	сс	7	7	7	7	
Парацельс		03079003	2006	324 /	ЛП		ун	рс	9	9		9	9
Редхавен		68079012	1985	1010 / 344	С		стл	сс	7	7	7	7	
Рум'яний		68079006	1972	348 /	СЛ		стл	рс	5	5	5	5	
Стартовий		94079005	2000	365 / 365	С		ун	рс	7	7	7	7	
Сяйво		92079009	2005	325 /	СЛП	9	ун	сс	9	9		7	
Сказка		79079002	1993	365 / 365	С		стл	сс	7	7	7	7	
Совєтський		48079002	1954	365 / 365	С		стл	ср	7	7	7	7	
Славутич		71079004	1984	348 /	СЛ		стл	сс	7	5	7	7	
Сочний		47079005	1954	365 / 365	СЛ		стл	рс	7	7	7	7	
Франт		68079007	1974	365 / 365	С		стл	рс	7	7	7	7	
Чемпіон ранній		81079003	1983	365 / 365	С		стл	рс	7	7	7	7	
Щедрий		92079004	2001	348 /	Л		ун	пс	7	5	5	5	
Ювілейний Сидоренка		90079002	2003	325 /	С		ун	сп	7	7	7	7	
Згода		04079002	2006	325 /	С		ун	рс	9	7	9	7	9
Медведівський жовтий		03079002	2006	324 /	ЛП		ун	рс	9	9		9	9
Чарівник		03079006	2006	325 /	С		ун	рс	9	9		9	9
Фодор		03079001	2006	324 /	ЛП		ун	сс	9	9		9	9
Златодар		04079001	2006	325 /	С		ун	рс	9	9		9	9
Ерітрокарпа 1	®	03079004	2006	324 /	ЛП		ун	пс	9	9		9	9

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач					посухи	поляган ня	осипання	хвороб	
Спокуса		03079005	2006	325 /		ун	пс	9	9			9	9
Нектарін													
Рубіновий 8		84396001	2001	365 / 365		ун	пс	7	7		5	7	
Кизил													
Билда		98212001	2001	314 /		ун	пс	7	7		5	7	
Видубецький		87212004	2000	348 /		ун	сс	7	7		5	7	
Вавіловець		92212007	2000	348 /		ун	рс	7	5		5	7	
Володимирський		97212002	1999	348 /		ун	сс	9	5		5	7	
Гренадер		92212001	2000	348 /		ун	нр	7	5		5	7	
Елегантний		92212006	1999	348 /		ун	рс	9	5		5	7	
Екзотичний		00212001	2001	348 /		ун	пс	9	5		5	7	
Євгенія		97212003	1999	348 /		ун	сс	9	5		5	7	
Кораловий Марка		00212002	2001	348 /		ун	рс	9	5		5	7	
Лук'янівський		87212003	1999	348 /		ун	сс	7	7		5	7	
Миколка		92212002	2000	348 /		ун	рс	7	5		5	7	
Олена		92212004	1999	348 /		ун	рс	9	5		5	7	
Радість		92212005	2000	348 /		ун	рс	7	5		5	7	
Світлячок		92212003	1999	348 /		ун	пс	9	5		5	5	
Семен		97212001	1999	348 /		ун	пс	9	5		5	7	
Михайлівський		04212001	2008	424 /	93	ун.	ран.	9	7			9	9
Агрус													
Артемівський		68071001	1998	314 /		ун	рс	9	7		5	5	
Бахмутський		68071002	1978	314 /		ун	сс	9	7		5	5	
Високий замок		85071001	1995	372 / 344		ун	сс	9	7		5	5	
Донецький крупноплідний		68071003	1976	314 /		ун	сс	9	7		5	5	
Донецький первенець		68071004	1979	314 /		ун	рс	9	7		7	5	
Каменяр		85071002	1994	372 / 344		ун	сс	9	7		5	5	

Сорт			Код	Зона	Характеристики							
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)			Якість
Назва Вид	Номер	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляган-ня	осипання	хвороб	
Карпати	84071001	1995	372 / 344	Л		ун	сс	9	7		5	5	
Красень	75071001	1986	424 /	ЛП		ун	сс	9	7		5	5	
Консервний	66071001	1981	424 /	Л		ун	сс	9	7		5	5	
Легінь	® 06071001	2007	424 /	Л		ун	сс	7-8	7-8			7-8	7
Мліївський жовтий	51071001	1969	424 /	ЛП		ун	рс	9	7		5	7	
Неслухівський	84071002	1990	372 / 344	ЛП		ун	сс	9	7		5	5	
Карат	® 04071002	2006	344 /	ЛП		ун	рс	9	9			9	
Елегант	® 04071003	2006	424 /	Л		ун	сс	9	9			9	9
Златогор	® 04071001	2006	344 /	ЛП		ун	рс	9	9			9	
Оксамит	® 05071001	2006	344 /	СЛП		ун	сс	9	9			9	7
Славута	® 05071002	2006	344 /	ЛП		ун	сс	9	9			9	
Княжич	® 05071003	2006	344 /	ЛП		ун	сп	9	9			9	
Актинідія													
Загадкова	00208004	2001	348 /	СЛ		ун	сс	>5	5		5	7	
Караваївська урожайна	92208002	2001	348 /	СЛ		ун	пс	>5	5		5	7	
Київська крупноплідна	84208004	1992	348 /	СЛП		ун	сс	>5	5		5	5	
Київська гібридна	84208003	1992	348 /	СЛП		ун	сс	>5	5		5	5	
Надія	00208003	2001	348 /	СЛ		ун	сп	>5	5		5	7	
Оригінальна	92208003	2001	348 /	СЛ		ун	сс	>5	5		5	7	
Перлина саду	00208002	2001	348 /	СЛ		ун	рс	>5	5		5	7	
Пурпурна садова	84208006	1992	348 /	слп		ун	сс	>5	5		5	7	
Ріма	00208001	2001	348 /	СЛ		ун	сс	>5	5		5	7	
Рубінова	92208001	2001	348 /	СЛ		ун	рс	>5	5		5	7	
Сентябрська	84208002	1992	348 /	СЛП		ун	сс	>5	5		5	5	
Фігурна	84208005	1992	348 /	СЛП		ун	сс	>5	5		5	5	
Жимолость													
Богдана	98341001	2000	403 /	Л		ун	сс	7	7		7	5	
Дончанка	97341004	2001	317 / 317	СЛ		ун	рс	9	7		7	5	

Сорт				Код	Зона	Характеристики								
						Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляган ня	осипання	хвороб	
Степова		97341002	2001	317 / 317	СЛ		ун	рс	9	7		7	5	
Скіфська		97341001	2001	317 / 317	СЛ		ун	рс	9	7		7	5	
Українка		97341003	2001	317 / 317	СЛ		ун	рс	9	7		7	5	
Фіалка		98341002	2000	403 /	Л		ун	сс	7	7		7	5	
Калина														
Великоплідна		97211002	2001	424 /	ЛП		ун	сс	9	9		7	7	
Коралова		97211001	2001	424 /	ЛП		ун	рс	9	9		7	7	
Лимонник														
Садовий 1		96213001	1998	348 /	ЛП		ун	сс	7	7		7	9	
Малина														
Зєва		90077004	1995	1010 / 344	СЛ		ун	рм	9	7		7	7	
Космічна	®	05077002	2007	350 /	ЛП		ун	рем	7	7			8	8-9
Мар'янушка		81077001	1993	403 /	СЛ		ун	сс	9	7		7	7	
Новость Миколайчука		73077001	1987	424 /	ЛП		ун	сс	9	7		7	7	
Новокитаївська		51077001	1969	344 / 344	СЛП		ун	рс	9	7		7	7	
Одарка		80077002	1988	403 /	СЛП		ун	рс	9	7		7	7	
Персея	®	06077002	2007	344 /	ЛП		ун	ран	8	9			8	8-9
Рось		86077001	1999	424 /	СЛ		ун	рс	9	7		7	7	
Сяйво	®	05077003	2007	350 /	ЛП		ун	рем	7-8	7			7-8	8-9
Саня	®	06077001	2007	344 /	ЛП		ун	ран	8	9			7-8	8-9
Осіння	®	03077002	2006	350 /	ЛП		ун	рем	9	9			9	9
Феномен	®	99077002	2007	403 /	Л		ун	сс	8	8			7-8	8-9
Промінь	®	03077001	2006	350 /	ЛП		ун	сс	9	9			9	9
Обліпиха														
Солодка жінка		98078003	2000	314 /	С		ун	сс	9	7		7	7	
Порічки (червоні і білі)														
Йонкер ван Тетс		81082001	1987	1010 / 424	СЛП		ун	рс	9	7		7	7	
Львівська солодка		94082002	2000	372 /	ЛП		ун	сс	9	7		5	7	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляган ня	осипання	хвороб	
Любава	94082003	2000	372 /	ЛП		ун	сс	9	7		5	7	
Ласуня ®	06082001	2007	344 /	ЛП		свж	рс	9	8			8-9	9
Святкова	94082004	2000	372 /	ЛП		ун	рс	9	7		7	7	
Святомихайлівська	98082001	2001	344 / 344	СЛП		ун	сп	9	7		7	7	
Троїцька	94082008	2001	344 / 344	СЛП		ун	сп	9	7		7	7	
Чародійка	94082006	2000	372 /	ЛП		ун	пс	9	7		5	7	
Ярославна	97082002	2001	372 /	ЛП		ун	сп	9	7		5	7	
Дарниця ®	94082010	2006	344 /	ЛП		ун	сс	9	9			9	9
Самбурська ®	94082011	2006	344 /	ЛП		ун	рс	9	9			9	9
Смородина чорна													
Аметист	92083005	2002	344 / 344	П		ун	сс	9	7		7	7	
Вєрность	87083001	1995	163 /	ЛП		ун	пс	9	7		7	7	
Вернісаж	94083007	2003	344 / 344	СЛП		ун	сс	9	9		7	7	
Вербна	97083007	2004	372 /	ЛП		ун	рс	9	7		7	7	
Говтва	87083008	1999	350 /	ЛП		ун	сс	9	7		7	7	
Дочка Ворскли	90083007	1999	350 /	СЛ		ун	рс	9	9		7	7	
Зоря Галицька	94083003	2000	372 /	ЛП		ун	рс	9	7		7	7	
Козацька	92083003	2001	344 / 344	ЛП		ун	ср	9	7		7	7	
Краса Львова	94083004	2000	372 /	ЛП		ун	сп	9	9		7	7	
Консул ®	06083001	2007	424 /	Л		ун	ран	9	9			8-9	9
Либідь	94083005	2001	372 /	ЛП		ун	сп	9	5		5	7	
Надбужанська	97083006	2004	372 /	ЛП		ун	сп	9	7		7	7	
Оріана ®	06083003	2007	344 /	ЛП		ун	рс	9	8			8-9	7
Пам'ять Правику	90083002	1994	424 /	Л		ун	сс	9	7		7	7	
Пам'яті Леоніда Михайлевського ®	05083002	2007	350 /	ЛП		ун	ран	9	5-6			8-9	7-8
Санюта	87083007	1995	344 / 344	СЛ		ун	сп	9	9		7	7	
Славута	75083002	1989	424 /	Л		ун	рс	9	7		7	7	
Сюїта київська	87083006	1995	344 / 344	СЛ		ун	ср	9	7		7	7	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач					посухи	поляглання	осипання	хвороб	
Софія		97083005	2001	372 /		ун	сс	9	7		7	7	
Софіївська		97083010	2001	344 / 344		ун	сп	9	7		7	7	
Тітанія		90083003	1997	1010 / 424		ун	сс	9	7		7	7	
Університетська	®	05083001	2007	350 /		ун	пс	9	7-8			8-9	8
Українка		94083006	2000	372 /		ун	сс	9	7		5	5	
Черешнева		91083007	1999	344 / 344		ун	сп	9	7		7	7	
Чернеча		88083003	2000	344 / 344		ун	сс	9	9		7	7	
Ювілейна Копаня		97083001	2001	344 / 344		ун	сп	9	7		7	7	
Ластівка		01083002	2006	344 /		ун	рс	9	9			9	9
Мелодія	®	04083002	2006	424 /		ун	рс	9	9			9	9
Казкова	®	01083003	2006	344 /		ун	сс	9	9			9	9
Муза	®	04083001	2006	424 /		ун	сс	9	9			9	9
Радужна	®	01083001	2006	344 /		ун	ср	9	9			9	9
Володимирська	®	97083002	2006	344 /		ун	сп	9	9			9	9
Суниця													
Симфонія	®	05084008	2007	670 /		ун	сп	9	9			9	8
Багряна		90084005	1999	344 / 344		ун	рс	7	7			7	
Берегиня		03084003	2005	350 /	9	ун	рс	9	9			9	
Веселка	®	06084001	2007	344 /		свж	ран	9	8			9	
Дарунок вчителю		85084001	1993	344 / 344		свж	рс	7	7			7	
Десна		78084001	1987	344 / 344		свж	рс	9	7			7	
Ельсанта		97084004	1999	1012 /		ун	рс	7	7			5	
Ерос	®	05084009	2007	672 /		ун	сп	7	9			8	8-9
Зенга Зенгана		68084001	1975	1010 / 557, 424		ун	сп	7	7			7	
Історник		80084005	1989	344 / 344		ун	сс	7	7			5	
Кримчанка 87		80084008	1987	359 / 359		ун	сс	7	7			5	
Кримська ремонтантна		81084001	1985	359 / 359		свж	рс	7	7			5	
Кримська рання		77084002	1985	359 / 359		свж	рс	7	7			5	
Корона	®	05084010	2007	601 /		ун	ран	9	7			7	8

Сорт				Код	Зона	Характеристики								
						Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляган-ня	осипання	хвороб	
Львівська рання		71084001	1979	372 / 344	СЛП		ун	рс	7	7			5	
Мачужинка		82084001	1990	372 /	П		свж	рс	7	7			5	
Ольвія		97084002	2001	344 / 344	СЛП		ун	рс	7	7			7	
Покахонтас		72084003	1980	1010 / 424	П		ун	ср	9	7			7	
Присвята		86084001	1992	344 / 344	СЛП		ун	сп	7	7			7	
Русанівка		78084003	1986	344 / 344	СП		ун	рс	7	7			7	
Ред Гонтлет		76084002	1982	1010 / 424	СЛП		ун	сп	7	7			7	
Теніра		84084004	1992	1010 / 424	П		ун	сп	7	7			7	
Фестивальна ромашка		85084002	1992	344 / 344	СЛП		ун	сс	7	7			7	
Факел		03084002	2005	350 /	СЛП	7	ун	сп	9	9			7	
Розана київська	®	03084004	2006	344 /	СЛП		ун	рс	9	9			9	9
Хонейо		05084001	2006	557 /	Л		ун	рс	9	9			9	9
Презент	®	05084004	2006	344 /	СЛП		ун	сп	9	7			9	9
Полка	®	05084003	2007	601 /	Л		ун	сп	9	7			9	8-9
Горіх грецький														
Буковинська бомба		87075007	1995	433 /	Л		ун	сс	5	7			7	
Буковинський 2		87075003	1995	433 /	Л		ун	сс	5	7			7	
Буковинський 1		79075004	1997	433 /	Л		ун	сс	5	7			5	
Клішківський		91075009	1995	433 /	Л		ун	рс	5	7			7	
Прикарпатський		91075010	1995	433 /	Л		ун	рс	5	5			7	
Придністровський		84075001	1997	433 /	Л		ун	сс	5	7			5	
Рудківський	®	97075002	2007	433 /	Л		ун	ран	7				7	9
Топорівський		91075014	1995	433 /	Л		ун	сп	7	5			7	
Чернівецький 1		95075001	1997	433 /	Л		ун	сс	5	7			5	
Ярівський		91075012	1995	433 /	Л		ун	сс	5	5			7	
Гранат														
Сочний 110		65209001	1994	365 / 365	С		ун	сс	5	7			7	

Сорт				Код	Зона	Характеристики								
						Продук-тивність	Напрям використ-тання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєст-рації	Заявник / Підтримувач						посухи	поля-гання	осипання	хвороб	
Інжир														
Сабруція рожева		81210001	1994	365 / 365	С		ун	сс	>5	7			7	
Ківі														
Монті		98342002	2000	365 / 365	С		ун	ср	>5	7		5	7	
Томурі		98342001	2000	365 / 365	С		зпл	ср	<5	7		5	7	
Лимон														
Лісбон		01310002	2004	365 /	Згр		свж	пс	7	5			5	
Мейєр		01310001	2003	365 /	Згр		свж	рем	7	5		5	5	
Маслина														
Кримська превосходна		81214002	1994	365 / 365	С		ун	рс	>5	7			7	
Мигдаль														
Десертний		49215001	1976	365 / 365	С		ун	сс	7	7		7	7	
Мілас		97215004	2000	365 / 365	С		ун	рс	7	7		7	7	
Нікітський 2240		65215002	1986	365 / 365	С		ун	сс	7	7		7	7	
Нікітський 62		49215002	1954	365 / 365	С		ун	сс	7	7		7	7	
Прибрежний		72215002	1986	365 / 365	С		ун	пс	7	7		7	7	
Унабі														
Китайський 60		81124002	1994	1010 /	С		ун	рс	7	7			7	
Хурма														
Спутник		64217001	1994	365 /	С		ун	рс	7	7			7	
Хурма східна														
Гора Говерла	®	05442002	2006	1067 /	С		ун	сс	7	9			9	9
Гора Роман Кош	®	05442003	2006	1067 /	С		ун	сс	9	9			9	9
Гора Роджерс	®	05442004	2006	1067 /	С		ун	сс	9	9			9	9
Новінка	®	05442001	2006	1067 /	С		ун	сс	9	9			9	9

Сорт				Код	Зона	Характеристики								
						Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляган ня	осипання	хвороб	
Актинідія пурпурна х актинідія гостра														
Ласунка	®	05444001	2006	348 /	Л		ун	сс	9	9			9	9
Помаранчева	®	05444003	2006	348 /	Л		ун	сс	9	9			9	9
Яблуня (підщепа)														
КД 4	®	05086006	2007	403 /	ЛП		підщ		8-9	7-9			9	9
КД 5	®	05086007	2007	403 /	ЛП		підщ		8-9	7			9	9
Виноград														
Виноград														
Альбільо кримський		57073008	1958	1010 / 488	2,4-6		тхн	сс	9	9			7	
Ассоль	®	00073003	2005	364 /	1 - 6	5	стл	рс	9	9			7	
Алеатіко		54073004	1958	1010 / 488	5,6		тхн	пс	9	7			7	
Аркадія	®	90073004	1995	379 /	7,8-10		стл	др	7	7			5	
Антей магарацький	®	80073001	1988	364 / 364	1-4, 7		тхст	пс	9	7			7	
Аліготе		48073001	1956	1010 / 488, 379	1-6, 8-15		тхн	рс	7	7			7	
Аврора Магарача	®	82073012	1995	364 /	8-10		тхн	сс	9	7			7	
Асма		80073010	1986	1010 / 488	5-6		стл	дп	7	7			5	
Бастардо магарацький		69073001	1969	364 / 364	2-10,14		тхн	пс	9	9			9	
Берландієрі х Рипарія Кобера 5 ББ		76073010	1978	1010 / 226	1-15		підщ,		9	9			9	
Берландієрі х Рипарія СО4		76073011	1978	1010 / 241	1-15		підщ,		9	9			9	
Берландієрі х Рипарія Телекі 5Ц		76073003	1978	1010 / 379	1-15		підщ,		9	9			9	
Бордо	®	01073008	2006	364 /	С	7	тхн	дп	7	6			7	
Буковинка	®	92073004	2006	1068 /	,6-8,9,11,12,1	5	тхн	сс	7	7			7	
Восторг		90073019	1992	211 /	1-6,13,14		стл	др	7	7			7	
Вердельо		52073003	1958	1010 / 488	2,4-6		тхн	сс	7	7			7	
Восток	®	68073001	1978	379 /	11-14		стл	сс	7	7			7	

Сорт				Код	Зона	Характеристики								
						Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляган ня	осипання	хвороб	
Гарс Левелю		49073005	1958	1010 / 379	4-7		тхн	дп	9	7			7	
Гурзуфський розовий	®	97073008	2006	1068 /	6-8,9,11,12,13	5	тхст	сс	7	7			7	
Голубок	®	70073001	1981	379 /	7-12,15		тхн, всш	рс	7	7			7	
Данко	®	81073004	2003	364 / 364	1-6		тхн	сс	7	7			7	
Дністровський рожевий	®	65073001	1972	379 /	8-10		тхст	дп	9	9			7	
Джеват кара		01073002	2002	917 / 517	5		тхн	пс	9	7			7	
Екім кара		59073010	1969	364 / 517	5,6		тхн	дп	9	7			7	
Золотистий устойчивий	®	70073002	1990	379 /	10		тхст, всш	пс	7	7			7	
Загрей	®	00073008	2006	379 /	,6,8,9,11,13,1	7	тхн	пс	8	6			6	
Загадка	®	00073007	2006	379 /	,6,8,9,11,13,1	5	стл	сс	6	5			7	
Іршаї Олівер		57073009	1958	1010 / 379	7-10		стл	др	9	7			7	
Інтервітіс Магарача	®	94073012	2006	364 /	C	7	стл	пс	7	5			8	
Італія		51073002	1969	1010 / 379	2-6,8-10,13,14		стл	дп	9	7			7	
Кефесія		79073006	1995	917 / 517	5,6		тхн	дп	7	7			7	
Крона		92073013	1995	917 / 517	5,6		тхн	пс	7	7			7	
Капсельський білий		92073012	1995	917 / 517	5,6		тхн	пс	9	9			7	
Кобзар	®	90073011	2006	379 /	,2,6-9,11,13,1	5	стл	рс	5	6			6	
Королева виноградників		49073001	1959	1010 / 379	2,4-6,8-12,15		стл	рс	7	7			7	
Кокур білий		57073001	1958	364 /	2,4-6		тхн	дп	7	7			7	
Карабурну		52073005	1962	1010 / 379	2-15		стл	дп	9	7			7	
Київський золотистий		67073004	1983	348 /	10		стл	др	7	7			7	
Каберне Совіньйон		52073004	1962	1010 / 379	1-12,13-15		тхн, всш	дп	9	9			7	
Кардинал		65073005	1969	1010 / 364	1-6,8,14		стл	др	7	7			7	
Князь Кіранов		02073002	2006	917 /	C	5	тхн	дп	9	5			8	
Любительський	®	00073002	2006	1068 /	6,7,8,9,11,12,	7	стл	сс	7	7			7	
Леся	®	74073008	1985	379 /	8-10,13-15		стл	рс	7	7			7	
Ланка	®	79073002	1990	379 /	8-10,15		стл	сс	9	7			7	
Ліваділйський чорний	®	97073007	2006	1068 /	;6-8,9,11,12,1	7	тхн	рс	7	7			7	
Морастель		57073010	1958	1010 / 488	2,4-6		тхн	дп	7	7			7	

Сорт				Код	Зона	Характеристики								
						Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляглання	осипання	хвороб	
Молдова		74073004	1987	614 /	1-14		стл, всш	дп	9	9			9	
Мускат гамбургський		49073009	1958	1010 / 379	1-15		стл	пс	9	9			7	
Мускат Голодриги	®	97073006	2006	1068 /	;,6-8,9,11,12,1	7	тхн	др	7	7			7	
Мерло		59073011	1983	1010 / 379	1,2,4,7-14		тхн	сс	7	7			7	
Марсельський чорний ранній		50073003	1969	1010 / 379	8,9		тхст	рс	7	7			7	
Мускат білий		49073003	1959	1010 / 364	2,4-6,13,14		тхн	рс	7	7			7	
Мускат Лівадія	®	04073002	2006	1068 /	5,6,8,7,9-12,1:	7	стл	др	7	7			7	
Мускат рожевий		52073006	1958	1010 / 488, 517	2,4,6		тхн	рс	7	7			7	
Мускат чорний		52073007	1958	1010 / 364	2,5,6		тхн	рс	7	7			7	
Мускат жемчужний	®	79073003	1988	379 /	8-10,15		стл	др	7	7			7	
Мурведр		00073011	2001	364 /	2,5,6		тхн	дп	7	7			7	
Мускат одеський	®	82073003	1993	379 /	8-14		тхн	рс	7	7			7	
Мускат таїровський	®	68073004	1976	379 /	7-14		стл	др	7	7			7	
Мюллер Тургау		49073010	1958	1010 / 379	7		тхн	сс	7	7			7	
Мускат янтарний		69073002	1986	614 / 488	1-6,13-15		стл	др	7	7			7	
Мускат Оттонель		50073004	1952	1010 / 379	1-4,7-9,11-14		тхст	рс	7	7			7	
Одеський ранній	®	61073004	1978	379 /	10		стл	др	7	7			7	
Овідіопольський	®	72073001	1986	379 /	8-15		тхн, всш	сс	7	7			7	
Одеський чорний	®	57073002	1972	379 /	1-6,8-14		тхн, всш	дп	7	7			7	
Олімпійський		77073023	1989	413 /	12		тхн	дп	7	7			7	
Оригінал	®	87073003	2002	379 /	8		стл	пс	9	9			9	
Одеський сувенір	®	74073001	1985	379 /	7-12		стл	пс	9	9			7	
Олег	®	00073001	2006	1068 /	;,6-8,9,11,12,1	5	тхн	рс	9	7			7	
Подарок Магарача	®	77073014	1987	364 / 364	1-3,12-14		тхст	рс	7	7			7	
Піно чорний		57073011	1959	1010 / 379	2,4,8-14		тхн	рс	7	7			7	
Первенець Магарача	®	76073014	1994	364 / 364	1-14		тхн	пс	7	9			7	
Піно сірий		49073012	1959	1010 / 379	6,8-14		тхн	рс	7	7			7	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляган ня	осипання	хвороб	
Рипарія х Рупестрис 3309	76073008	1978	1010 / 379	1-15		підщ.		9	9			9	
Рипарія х Рупестрис 101-14	76073007	1978	1010 / 241	1-15		підщ.		9	9			9	
Рубіновий Магарача	59073007	1969	364 / 364	4-6,11,12,15		тхн, всш	пс	9	9			7	
Рубін таїровський ®	79073005	1990	379 /	8-10,14		тхн	дп	9	9			9	
Ркацителі	49073004	1958	1010 / 379	1-5,7-15		тхн	дп	9	9			9	
Ранній Магарача	52073002	1969	364 / 364	1-6,8-15		стл	др	7	7			7	
Роднічок	90073018	2006	379 /	,2,6-9,11,13,1	7	тхн	дп	8	6			7	
Рісус ®	92073016	2006	1068 /	,6-8,9,11,12,1	7	тхн	сс	7	7			9	
Рислінг рейнський	39073001	1949	1010 / 379	1-5,7-15		тхн, всш	пс	9	7			7	
Рубін Голодриги ®	92073005	2006	1068 /	,6-8,9,11,12,1	5	тхн	пс	9	9			9	
Сорок лєт Побєди	90073021	1998	413 /	12		тхн	дп	7	7			7	
Совіньйон зелений	49073017	1969	1010 / 379	1,2,4-6,8-14		тхн	сс	9	7			7	
Смєна ®	90073020	2006	379 /	,2,6-9,11,13,1	5	стл	сс	6	6			7	
Сари пандас	79073007	1995	917 / 517	5,6		тхн	пс	9	9			7	
Семільон	00073010	2001	364 /	2,5,6,9		тхн	пс	7	7			7	
Сапераві	50073001	1958	1010 / 379	1-15		тхн	пс	9	9			7	
Сухолиманський білий ®	58073001	1969	379 /	2,8-14		тхн	сс	7	7			7	
Сурученський білий	75073007	1992	607 /	2,4-6,11,12		стл	пс	9	9			7	
Сонячнодолинський	92073007	1995	364 / 517	5,6		тхн	пс	7	7			7	
Сільванер	49073016	1958	1010 / 379	1-5,8-10,12		тхн	рс	7	7			7	
Серсіаль	49073015	1958	1010 / 488	2,4-6		тхн	сс	9	9			7	
Солдайя	01073003	2002	917 / 517	5,6		тхн	пс	7	7			7	
Трамінер рожевий	49073018	1958	1010 / 379	1-5,7-11,13-15		тхн	рс	7	7			7	
Тавквері Магарача ®	85073004	2006	364 /	2	7	тхн	дп	9	9			9	
Тельті курук	50073002	1969	1010 / 379	9,10		тхн	пс	7	7			7	
Український 85 ®	68073002	1985	379 /	10		стл	др	7	7			7	
Фурмінт	49073019	1958	1010 / 379	6,7		тхн	дп	9	7			7	

Сорт				Код	Зона	Характеристики								
						Продук-тивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєст-рації	Заявник / Підтримувач						посухи	поля-гання	осипання	хвороб	
Фетяска біла		52073008	1958	1010 / 379	1-4,7-15		тхн, всш	рс	7	7			7	
Цитронний Магарача	®	94073006	2002	364 / 364	1-6		тхн	рс	7	7			7	
Цимлянський чорний		60073003	2002	1010 / 488	2,4-6		тхн	сс	7	7			7	
Шасла біла		48073002	1958	1010 / 379	1-15		стл	рс	7	7			7	
Шоколадний	®	05073001	2006	1068 /	6,7,8,9,11,12,	7	стл	сс	7	7			7	
Шабаш		57073007	1958	1010 / 488	2-6		стл	дп	9	9			7	
Шардоне		49073020	1958	1010 / 379	1-5,8-14		тхн	сс	7	7			7	
Кок пандас		01073001	2002	917 / 517	5,6		тхн	рс	7	7			7	
Біанка		94073015	2007	379 /	),10,11,12,13,	5	тхн	сс	7				7	
Альмінський	®	97073003	2007	364 /	2	5	тхн	пс	8	8			7	
Рислінг Магарача	®	83073001	2007	364 /	4	7	тхн	пс	8	8			7	
Спартанець Магарача	®	82073001	2007	364 /	2	5	тхн	пс	5	7			7	
Анатсликон	®	00073006	2007	364 /	6	5	тхн	дп	7	7			7	
Чорна опіана	®	00073005	2007	364 /	6	7	тхн	дп	7	7			7	
Огоньок таїровський	®	90073015	2007	379 /	,2,6-9,11,13,1	5	стл	др		6			7	
Ялтинський безнасінний	®	97073010	2007	364 /	6	5	стл	сс	5	6			7	
Етюд	®	05073002	2007	379 /	',6,8,911,13,1	5	стл	сс	7	7			8	
Кишмиш таїровський	®	05073007	2007	379 /	,2,6-9,11,13,1	5	стл	пс		5			6	
Таїр	®	84073003	2007	379 /	,6,8,9,11,13,1	5	стл	рс		7			7,6	
Геркулес	®	97073001	2007	364 /	6	5	стл	дп	5	6			7	
Добриня	®	05073004	2007	379 /	8-12		підщ		8	9			6-7	

Декоративні та лікарські

Азалія

Алєнькій цвєточек		87219002	1999	348 /	СЛП		дкр					7	7	
Героям Війни		87219003	1999	348 /	СЛП		дкр					7	7	
Київський вальс		95219002	1999	348 /	СЛП		дкр					7	7	
Огоньок		95219001	1999	348 /	СЛП		дкр					7	7	
Сузір'я		87219001	1999	348 /	СЛП		дкр					7	7	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								Якість
					Продук-тивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				
Назва Вид	Номер	Рік реєст-рації	Заявник / Підтримувач						посухи	поля-гання	осипання	хвороб	
Алтея лікарська													
Мальвіна	97081001	2001	385 /	ЛП		лік	сс	7	7	7		7	
Белладонна													
Красавка	79181001	1981	385 /	С		лік	сс			7	7	7	
Бузок													
Богдан Хмельницький	74223006	1985	348 /	ЛП		цкр,озл,зріз		9	9			7	
Вогні Донбасу	74223003	1985	348 /	ЛП		цкр,озл,зріз		9	9			7	
Вогні Донецька	97223005	2002	317 / 317	СЛП		озл., зріз		9	9			7	
Донецькі зорі	97223002	2002	317 / 317	СЛП		озл., зріз		9	9			7	
Донецькй сувенір	97223003	2002	317 / 317	СЛП		озл., зріз		9	9			7	
Леся Українка	82223001	1996	348 /	ЛП		цкр,озл,зріз		9	9			7	
Професор М.Л.Рева	97223004	2002	317 / 317	СЛП		озл., зріз		9	9			7	
Професор О.Л.Липа	97223001	2002	317 / 317	СЛП		озл., зріз		9	9			7	
Професор В.І.Чопик	04223001	2005	317 /	С		озл	рс	7	9	9	9	9	
Тарас Бульба	74223005	1985	348 /	ЛП		цкр,озл,зріз		9	9			7	
Валеріана лікарська													
Левада	99182001	2002	909 /	СЛП		лік	сс		7			7	
Україна	92182001	1997	385 /	Л		лік	сс		7			7	
Вовчуг польовий													
Рожевий	92354001	1999	385 /	ЛП		лік	сс	9	9			7	
Гладіолус													
Амфора	96228001	2001	348 /	ЛП		зріз, озл			7	5		5	
Вій	94228001	2001	348 /	ЛП		озл, зріз			7	5		5	
Дебют	94228006	2000	348 /	ЛП		озл, зріз			7	5		5	
Леда	98228001	2001	348 /	ЛП		зріз, озл			7	5		5	
Мереживо	94228002	2001	348 /	ЛП		зріз, озл			7	5		5	
Міраж	96228002	2001	348 /	ЛП		озл, зріз			7	5		5	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продук-тивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер	Рік реєст-рації	Заявник / Підтримувач						посухи	поля-гання	осипання	хвороб	
Пам'яті Івана Миколайчука	94228007	2000	348 /	СЛП		озл, зріз			7	5		5	
Сувенір	94228003	2000	348 /	ЛП		озл, зріз			7	5		5	
Софія	96228004	2001	348 /	ЛП		озл, зріз			7	5		5	
Сільва	94228005	2000	348 /	ЛП		озл, зріз			7	5		5	
Талісман	94228004	2001	348 /	ЛП		зріз, озл			7	5		5	
Головатень круглоголовий													
Глобус	02405001	2008	385 /										
Сахалинська гречка													
Біла чарівниця	01399001	2005	317 /	СЛ		озл	рс	7	7		9	9	
Травнева красуня	01399002	2005	317 /	СЛ		озл	ср	9	9		9	7	
Чорна перлина	01399003	2005	317 /	СЛ		озл	рс	9	9	9	9	9	
Еремур													
Кримські зорі	92351001	1999	365 / 365	С		озл, зріз					7	7	
Руслан	91351001	1999	365 / 365	С		озл, зріз					7	7	
Ехінацея пурпурова													
Вітаверна	99322001	2002	909 /	СЛП		лік	сс	9	9	7		7	
Зірка Миколи Вавилова	04303001	2007	477 /	СЛП	5	к, фарм, ме	сс	5	5			8	
Поліська красуня ®	05303002	2007	596 /	СЛП	5	фарм, мед	сс	5	5			5	
Принцеса	94303001	1999	385 /	Л		лік	сс	9	9	7		7	
Чарівниця ®	05303001	2007	385 /	СЛП	7	лік	сс	5	5	5	5	4	
Юзівська ®	04303002	2007	317 /	С	7	корм	сс	7-9	7-9	7-9	-	7	сбіл,скл
Женьшень													
Український 2	95171001	1998	986 /	Л		лік, х	сс	7	7			7	
Жовтушник лакфіолевидний													
Сонячний	99379001	2001	385 /	Л		лік	сс	7	7			7	
Жоржина													
Астероїд	90230001	1991	348 /	ЛП		дкр,озл,зріз			7			7	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продук-тивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач					посухи	поля-гання	осипання	хвороб	
Бабин Яр		94230001	1999	348 /	ЛП	озл, зріз			7			7	
Вічний вогонь		72230001	1977	348 /	СЛП	дкр,озл,зріз			7			7	
Вечірні дзвони		94230009	2000	348 /	СЛП	озл			7			7	
Валерія		97230003	2002	348 /	ЛП	озл., зріз			7			7	
Веселі Терни		92230003	1998	348 /	СЛП	озл			7			7	
Видубецькі куполи		97230006	2000	348 /	ЛП	озл, зріз			7			7	
Журавушка		73230001	1981	348 /	С	дкр,озл,зріз			7			7	
Золоті ворота		94230005	1999	348 /	ЛП	озл, зріз			7			7	
Залп Аврори		78230001	1984	348 /	ЛП	дкр,озл,зріз			7			7	
Київ вечірній		94230012	1999	348 /	ЛП	озл, зріз			7			7	
Лунохід		88230002	1994	348 /	ЛП	дкр,озл,зріз			7			7	
Луганчанка		94230010	2000	348 /	СЛП	озл			7			7	
Ламбада		94230011	1999	348 /	СЛП	озл, зріз			7			7	
Ніна		94230013	1999	348 /	ЛП	озл, зріз			7			7	
Осінь в Софіївці		94230008	2000	348 /	ЛП	озл, зріз			7			7	
Осіннє золото		97230005	2001	348 /	СЛП	озл			7			7	
Рудана		90230006	1996	348 /	ЛП	озл			7			7	
Спокуса		97230001	2002	348 /	ЛП	озл., зріз			7			7	
Смуглянка		94230004	1998	348 /	ЛП	озл			7			7	
Свічадо		97230002	2002	348 /	ЛП	озл., зріз			7			7	
Сполох		90230005	1996	348 /	ЛП	озл			7			7	
Серце Данко		75230006	1980	348 /	С	дкр,озл,зріз			7			7	
Флагман революції		88230001	1998	348 /	ЛП	озл			7			7	
Звіробій													
Антос		97373001	2002	1073 /	ЛП	фарм			5	7	7	7	
Калістефус китайський													
Аметист		79285002	1997	344 / 344	ЛП	озл			5	7	7	7	
Анюточка		97285002	2000	348 /	ЛП	озл,зріз			5	7	7	7	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляглання	осипання	хвороб	
Веснянка	79285004	1999	344 / 344	ЛП		зріз,озл			7	7	7	7	
Вереснева	90285001	1991	348 /	ЛП		озл,зріз			7	7	7	7	
Варя	97285009	2001	348 /	ЛП		зріз,озл			5	7	7	7	
Голубий павучок	97285003	2001	348 /	ЛП		озл,зріз			5	7	7	7	
Жемчуг	76285003	1985	348 /	ЛП		озл,зріз			7	7	7	7	
Звєзда Полєсья	90285006	1995	344 / 344	ЛП		озл,зріз			7	7	7	7	
Київський вальс	83285002	1988	348 /										
Лебедине озеро	76285001	2001	344 / 344	ЛП		озл,зріз			7	7	7	7	
Либідь	00285001	2004	344 / 344						5	7	7	7	
Лелека	87285003	1991	348 /	ЛП		озл,зріз			5	7	7	7	
Малиновий блєск	92285001	1994	348 /	ЛП		озл,зріз			5	7	7	7	
Надія	94285001	1998	425 /	ЛП		озл			7	7	7	7	
Нєжность	79285005	1999	344 / 344	ЛП		зріз,озл			5	7	7	7	
Наречена	97285004	2001	348 /	ЛП		зріз,озл			7	7	7	7	
Одарка	97285001	1999	344 / 344	ЛП		зріз,озл			5	7	7	7	
Оксана	90285005	1996	344 / 344	ЛП		озл,зріз			7	7	7	7	
Осінній вечір	90285007	1996	344 / 344	ЛП		зріз,озл			5	7	7	7	
Павліна	91285003	1996	344 / 344	ЛП		озл,зріз			5	7	7	7	
Поліна	76285009	1996	344 / 344	ЛП		озл,зріз			7	7	7	7	
Празднічна	74285002	1978	348 /	СЛП		зріз,озл			7	7	7	7	
Рубінові звьозди	79285003	1985	344 / 344	ЛП		озл,зріз			7	7	7	7	
Ранкова зоря	83285001	1989	348 /	ЛП		озл,зріз			5	7	7	7	
Сапфірове плам'я	90285004	1991	348 /	ЛП		озл,зріз			5	7	7	7	
Юлія	79285001	1997	344 / 344	ЛП		озл,зріз			5	7	7	7	
Яблунева	92285004	1994	344 / 344	ЛП		озл,зріз			5	7	7	7	
Канна індійська													
Красніє розсипи	79234003	1995	365 / 365	С		озл				5		7	
Комсомолія	80234005	1985	365 / 365	СЛП		озл				5		7	
Кримська Рів'єра	69234002	1970	365 / 365	СЛП		озл				5		7	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач					посухи	поляг-ання	осипання	хвороб	
Кримські зорі		80234003	1984	365 / 365	С	озл				5		7	
Надія		69234004	1970	365 / 365	С	озл				5		7	
Нуї Кайо		73234002	1974	365 / 365	ЛП	озл				5		7	
Маестро		87234001	1992	365 /	С	озл				5		7	
Отблеск заката		84234003	1990	365 / 365	С	озл				5		7	
Парфенон		91234001	1997	365 / 365	С	озл				5		7	
Пламя Криму		65234003	1970	365 / 365	С	озл				5		7	
Ред Кінг Гумберт		93234001	1975	365 / 365	СЛП	озл				5		7	
Салют Победи		80234004	1984	365 / 365	С	озл				5		7	
Сонячна красавиця		69234003	1970	365 / 365	С	озл				5		7	
Ломиніс													
Анастасія Анісімова		83237001	2000	365 / 365	С	озл		7	7		7	7	
Альонушка		82237001	1998	365 / 365	СЛ	озл		7	5		7	7	
Альпініст		79237004	1998	365 / 365	СЛ	озл		7	7		7	7	
Березинка		74237003	1985	365 /	ЛП	озл		7	7		7	7	
Вічний зов		96237002	2003	365 /	С	озл		5	5		7	7	
Золотий ювілей		76237002	1998	365 / 365	СЛ	озл		5	7		7	7	
Звездоград		92237001	1998	365 / 365	СЛ	озл		5	7		7	7	
Сизантиця		88237002	1998	365 / 365	СЛ	озл		5	7		7	5	
Синє пламя		65237003	1998	365 / 365	СЛ	озл		5	7		7	7	
Спутник		83237007	1988	348 /									
Серенада Криму		86237006	1998	365 / 365	Л	озл		7	5		7	7	
Фаргезіодес		73237001	1987	365 /	С	озл		7	7		7	7	
Чайка		81237001	1998	365 / 365	СЛ	озл		5	5		7	7	
Чехонте		91237002	2000	365 / 365	С	озл		5	7		7	7	
Юность		72237003	1998	365 / 365	СЛ	озл		7	5		7	5	
Ялтинський етюд		78237002	1985	365 / 365	ЛП	озл		7	5		7	5	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва Вид	Номер	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляглання	осипання	хвороб	
Льон великоквітковий (декоративний)													
Аврора	01308001	2003	329 / 329	СЛП		зріз			7	5	5	5	
Марс	00308001	2001	329 / 329	С		озл, зріз			7	5	5	5	
Рум'янець	01308002	2003	329 / 329	СЛП		зріз			7	5	5	5	
Мачок жовтий													
Геліос	02304001	2008	385 /										
Наперстянка пурпурова													
Зірочка	90192001	1999	385 /	П		лік	сс	5	5	5	7	7	
Наперстянка шерстиста													
Карікола	79193001	1981	385 /	Л		лік	сс	5	5	5	7	7	
Сульчанка	90193002	1996	385 /	ЛП		лік	сс	5	5	5	7	7	
Оман високий													
Гулівер	98332001	2001	385 /	Л		лік	сс	9	9	7	7	7	
Півники													
Скіф	90231008	2001	365 / 365	С		озл, зріз		9	9			7	
Півонія													
Антей	94242002	2000	348 /	ЛП		зріз, озл		9	9	7	7	7	
Берегиня	92242003	1998	348 /	ЛП		озл		9	9	7	7	7	
Бенефіс	03242003	2004	348 /					9	9	7	7	7	
Весільна	92242005	1998	348 /	ЛП		зріз, озл		9	9		7	7	
Дукат	92242007	1998	348 /	ЛП		зріз, озл		9	9		7	7	
Жемчужна розсип	84242004	1995	348 /	ЛП		озл, зріз		9	9	7	7	7	
Корифей	03242004	2004	348 /					9	9		7	7	
Либідь	92242002	1998	348 /	ЛП		зріз, озл		9	9	7	7	7	
Мрія	92242004	1998	348 /	ЛП		зріз, озл		9	9	7	5	7	
Офелія	98242001	2001	348 /	ЛП		озл, зріз		9	9	7	5	7	

Сорт			Код	Зона	Характеристики								
					Продук-тивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач					посухи	поля-гання	осипання	хвороб	
Світоч		85242001	1995	348 /	ЛП		озл, зріз		9	9	7	5	7
Скарбниця		94242001	1999	348 /	ЛП		зріз, озл		9	9	7	7	7
Хохлома		86242001	1994	348 /	ЛП		озл, зріз		9	9	7	7	7
Червоний оксамит		85242002	1994	348 /	ЛП		озл, зріз		9	9	7	7	7
Чаклунка		03242001	2004	348 /					9	9	7	5	7
Червоні вітрила		98242002	2001	348 /	ЛП		озл, зріз		9	9	7	7	7
Ювілей Києва		03242002	2004	348 /					9	9	7	7	7
Ясочка		92242006	1998	348 /	ЛП		зріз, озл		9	9	7	7	7
Персик декоративний													
Життєдь		97359002	1999	365 / 365	С		озл, зріз		9	7		7	5
Ніль	®	00359001	2007	365 /									
Маленький принц	®	04359001	2007	365 /									
Сольвейг		97359001	1999	365 / 365	С		озл, зріз		9	7		7	5
Фрезі Грант	®	04359002	2007	365 /									
Подорожник блошиний													
Березотіцький		97377001	2001	385 /	Л		лік	сс	9	9			7
Подорожник великий													
Полтавський		84195001	1989	385 /	ЛП		лік	сп	9	9			7
Ехінацея бліда													
Красуня прерій		03412001	2005	386 /	С		лік	сс		9	9	9	7
Розторопша плямиста													
Бойківчанка	®	05194001	2007	332 /	СЛ	5	лік, х	сс		7	8	5	7
Ромашка аптечна													
Перлина Лісостепу		92197001	1999	385 /	Л		лік	сс					
Ротики садові													
Фламме		74221007	1978	344 /	ЛП		озл		7	7	7	7	5

Сорт				Код	Зона	Характеристики								
						Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляган ня	осипання	хвороб	
Солодка гола														
Соло 1		98335001	2001	909 /	С		лік	сс	7	5	5	7	5	
Соняшник декоративний однорічний														
Ела	®	04316002	2007	1059 /										
Жемчужний		03316001	2004	1059 /						7	7	9	7	
Забава		03316002	2004	1059 /						7	7	9	7	
Золоте руно	®	03316004	2007	328 /										
Кармен F1		00316004	2001	329 / 329	СЛП		озл, зріз			7	7	9	7	
Малиш		02316001	2003	329 / 329	СЛП		зріз			7	7	9	7	
Маленький Принц	®	04316001	2007	1059 /										
Ніжність		02316002	2003	329 / 329	СЛП		зріз			7	7	9	7	
Надєжда		00316003	2001	329 / 329	СЛП		озл, зріз			7	7	9	7	
Сиреневий туман	®	03316003	2007	328 /										
Сонячний промінь		02316004	2004	329 / 329						7	7	9	7	
Чарівник		02316003	2004	329 / 329						7	7	9	7	
Юліана F1		00316005	2001	329 / 329	СЛП		озл, зріз			7	7	9	7	
Стевія														
Берегиня		92278001	1999	334 /	С		лік	сс	5	5	7	7	7	
Славутич		92278002	1999	334 /	П		лік	сс	5	5	7	7	7	
Троянда														
Аджимушкай		91246004	1999	365 / 365	С		озл		5	5	9	7	5	
Аю-даг		67246001	1976	365 / 365			дкр,озл,зріз		7	5	9	7	5	
Білянка		81246004	1987	365 / 365	СЛП		дкр,озл,зріз		7	7		5	5	
Весенняя Заря		91246001	1999	365 / 365	С		озл		5	7		7	5	
Діна		94246001	1999	365 / 365	С		озл		5	7		5	7	
Дєвічьі грьози		83246001	1999	365 / 365	С		озл		7	7		5	5	
Золотая осень		61246003	1970	365 / 365	С		дкр,озл,зріз		7	7		7	7	

Сорт				Код	Зона	Характеристики								
						Продук-тивність	Напрям використ-тання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєст-рації	Заявник / Підтримувач						посухи	поля-гання	осипання	хвороб	
Золотий юбілей		77246005	1981	365 / 365	С		цкр,озл,зріз		5	7		7	7	
Кримські огонькі		94246002	1999	365 / 365	С		озл		5	7		5	7	
Кримське сонечко	®	01246001	2006	365 /	С	9	оз	сс	9	7			9	7
Комсомольський огоньок		70246005	1980	365 / 365	СЛП		цкр,озл,зріз		7	7		7	7	
Красний маяк		97246006	2000	365 / 365	С		озл, зріз		5	7		5	7	
Красний мак		65246001	1976	365 / 365	СЛП		цкр,озл,зріз		5	7		5	7	
Кораловий сюрприз		77246003	1981	365 / 365	СЛП		цкр,озл,зріз		5	7		7	7	
Мейдебенне		00246001	2002	1 /	ЛП Згр	9	зріз., прм		7	7		7	5	
Мейяспер		00246002	2002	1 /	ЛП Згр	9	зріз., прм		7	7		5	7	
Мейовскі		99246001	2002	1103 /	ЛП	9	озл		5	7		5	7	
Октябрина		70246002	1980	365 / 365	С		цкр,озл,зріз		5	7		7	7	
Прекрасна Таврида		66246007	1980	365 / 365	С		цкр,озл,зріз		5	7		7	7	
Пламя Востока		61246015	1970	365 / 365	С		цкр,озл,зріз		5	7		7	7	
Пьострая фантазія		88246005	2000	365 / 365	С		озл, зріз		5	7		7	7	
Професор Віктор Іванов		98246003	2003	365 /	С		зріз		5	7		5	7	
Сєда дама		98246002	2001	365 / 365	С		озл		5	7		7	5	
Тан01693	®	05246010	2006	484 /	ЗГ	9	зріз						9	9
Тан99303	®	05246006	2006	484 /	ЗГ	9	зріз						9	9
Тан00163	®	05246004	2006	484 /	ЗГ	9	зріз						9	9
Таналепін	®	05246002	2006	484 /	ЗГ	9	зріз						9	9
Танобмил	®	05246007	2006	484 /	ЗГ	9	зріз						9	9
Танотіка	®	05246008	2006	484 /	ЗГ	9	зріз						9	9
Танавл	®	05246003	2006	484 /	ЗГ	9	зріз						9	9
Танкальсіг	®	05246001	2006	484 /	ЗГ	9	зріз						9	9
Таналедев	®	05246005	2006	484 /	ЗГ	9	зріз						9	9
Феодосіївська красуня	®	01246003	2006	365 /	С	9	оз	сс	7	7			9	9
Херсонес		90246006	1999	365 / 365	С		озл		5	5		7	5	
Чатир-Даг	®	01246002	2006	365 /	С	9	оз	сс	9	9			9	7

Сорт				Код	Зона	Характеристики								
						Продуктивність	Напрям використання	Група стиглості	Зимост. Холодост.	Стійкість до (бали)				Якість
Назва	Вид	Номер	Рік реєстрації	Заявник / Підтримувач						посухи	поляган ня	осипання	хвороб	
Тюльпан														
Академік Барабашов		96247011	2001	1029 /	ЛП		зріз, озл		7	7	7	5	7	
Арлекин		96247006	2001	1029 /	ЛП		зріз, озл		7	7	7	7	7	
Галіна Уланова		84247001	1997	365 / 365	С		озл, зріз		7	7	7	5	7	
Жемчужний		96247013	2001	365 / 365	ЛП		зріз, озл		7	7	7	5	7	
Кримський		90247001	1985	365 / 365	ЛП		озл, зріз		7	7	7	7	7	
Каменний цвєток		96247009	2001	1029 /	ЛП		озл, зріз		7	7	7	5	7	
Міраж		96247002	2001	365 / 365	ЛП		зріз, озл		7	7	7	7	7	
Майське утро		96247010	2001	1029 /	ЛП		зріз, озл		7	7	7	7	7	
Микола Вавілов		96247008	2005	1029 /	С		озл	рс	9	9	9	9	7	
Роман-Кош		96247001	2000	365 / 365	С		озл, зріз		7	7	7	7	7	
Сказочне видіння		96247014	2001	365 / 365	ЛП		зріз, озл		7	7	7	7	7	
Скіф		96247012	2000	365 / 365	СЛП		озл, зріз		5	7	7	5	7	
Славутич		96247005	2001	1029 /	ЛП		зріз, озл		7	7	7	7	7	
Тоня		85247002	1997	365 / 365	С		озл, зріз		5	7	7	7	7	
Тарас Шевченко		96247004	2000	1029 /	СЛП		озл, зріз		7	7	7	5	7	
Тарантелла		96247007	2000	1029 /	ЛП		озл, зріз		7	7	7	5	7	
Тютюн крилатий														
Многоцвєтковий		88245002	1991	92 /	ЛП		озл		7	7	7	7	7	
Флокс волотистий														
Микола Щорс		63248001	1970	348 /	ЛП		озл, зріз		7	5	7	5	5	
Новінка		61248033	1970	348 /	ЛП		озл, зріз		7	5	7	5	5	
Снєжний шар		68248001	1981	348 /	ЛП		озл, зріз		7	5	7	5	5	
Тарас Шевченко		74248001	1981	348 /	ЛП		озл, зріз		7	5	7	5	5	
Ювілейний		73248002	1981	348 /	ЛП		озл, зріз		7	5	7	5	5	
Хризантема														
Абрис		99250001	2005	365 /	СЛ		озл	рс		7	9	9	9	
Біла ромашка		75250006	1983	348 /										

Характеристики сортів рослин, занесених до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні у 2008 році

Характеристики сортів рослин, занесених до Державного реєстру сортів рослин, придатних до поширення в Україні у 2008 році

Сільськогосподарські: злаки

Пшениця м'яка озима

05007030 Актер

Заявник: Дойче Заатфеределунг Ліппштадт-Бремен ГмбХ

Власник(и):

Підтримувач(і):

Тип розвитку — озимий. Кущ — напівпрямостоячий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок має сильний восковий наліт на піхві і відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабовиповнена з сильним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та слабким опушенням опуклої поверхні верхнього вузла. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, нещільний, середньої довжини із сильним восковим нальотом, остюки і зубці – відсутні. Нижня колоскова луска: овальна, плече піднесене та вузьке, зубець середньо-зігнутий, короткий, опушення внутрішньої поверхні — сильне, зовнішньої — слабке. Зернівка червоного кольору, коротка, середньої ширини та крупності. Язичок — короткий, кіль на нижній квітковій лусці — наявний, вушка — гострі.

Рослини заввишки 91см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування середня-вищесередня, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,9 бала. Стійкість сорту до вилягання 8,8 бала. Стійкість до осипання 8,7 бала. Стійкість до посухи 8,3 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньостиглий, достигає за 290 діб.
Середня врожайність за роки випробування в зоні Полісся 55,9 ц/га. Прибавка до національного стандарту 6,0 ц/га. Маса 1000 зерен 43,1 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі та відмінні. Зерно містить 14,0 % білка, клейковини — 30,8 %, сила борошна — 314 о. а., об'єм хліба зі 100 г борошна — 1100 мл. Сильна пшениця.

04007038 Ассоль

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича агрокорпорація "Степова"

Власник(и):

Підтримувач(і):

Тип розвитку — озимий. Кущ — прямостоячий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок має сильний восковий наліт на піхві і слабке антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабовиповнена з сильним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та відсутнім або дуже слабким опушенням опуклої поверхні верхнього вузла. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, нещільний, середньої довжини із помірним восковим нальотом, наявні остюки. Нижня колоскова луска: овально-ланцетна, плече пряме та відсутнє або дуже вузьке, зубець середньо зігнутий та середньої довжини, опушення внутрішньої поверхні — слабке, зовнішньої — слабке. Зернівка червоного кольору, середньої довжини, ширини та крупна. Язичок — середній, кіль на нижній квітковій лусці — наявний, вушка — гострі.

Рослини заввишки 83 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування підвищена, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,5 бала. Стійкість сорту до вилягання 9,0 бала. Стійкість до осипання 9,0 бала. Стійкість до посухи 7,9 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньоранній, достигає за 276 діб.
Середня врожайність за роки випробування у зоні Степу 58,2 ц/га. Прибавка до національного стандарту 1,0 ц/га. Маса 1000 зерен 37,1г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі та відмінні. Зерно містить 14,3% білка, клейковини — 29,0%, сила борошна — 488 о. а., об'єм хліба зі 100 г борошна — 1280 мл. Сильна пшениця.

02007022 Артеміда

Заявник: ТОВ "Всеукраїнський науковий інститут селекції (ВНІС)"

Власник(и):

Підтримувач(і):

Тип розвитку — озимий. Кущ — напівпрямостоячий, рослини низькі. Прапорцевий листок має сильний восковий наліт на піхві і відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабовиповнена з сильним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та слабким опушенням опуклої поверхні верхнього вузла. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, середньої щільності, середньої довжини із сильним восковим нальотом та наявними остюками. Нижня колоскова луска: плече піднесене, вузьке, зубець середньо-зігнутий та довгий, опушення внутрішньої поверхні — слабке, зовнішньої — слабке, ланцетної форми. Зернівка червоного кольору, крупна, середньої довжини і ширини. Язичок — короткий, кіль на нижній квітковій лусці — наявний, вушка — гострі.

Рослини заввишки 94-96 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування середня-вищесередня, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,8 бала. Стійкість сорту до вилягання 8,6-8,9 бала. Стійкість до осипання 8,3-8,7 бала. Стійкість до посухи 8,0 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньостиглий, достигає за 293-300 діб.
Середня врожайність за роки випробування в зоні Лісостепу 67,9 ц/га, зоні Полісся — 57,3 ц/га. Прибавка до національного стандарту в зоні Лісостепу 3,0 ц/га, зоні Полісся — 2,7 ц/га. Маса 1000 зерен 43,1-45,7 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі. Зерно містить 13,8-14,4 % білка, клейковини 28,9-30,3 %, сила борошна 292-300 о. а., об'єм хліба зі 100 г борошна — 1080 мл. Сильна пшениця.

04007030 Антара

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича агрокорпорація "Степова"

Власник(и):

Підтримувач(і):

Тип розвитку — озимий. Кущ — прямостоячий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок має сильний восковий наліт на піхві і відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабовиповнена з сильним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та помірним опушенням опуклої поверхні верхнього вузла. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, нещільльний, довгий із відсутнім або дуже слабким восковим нальотом та наявними остюками. Нижня колоскова луска: плече піднесене з наявністю другої вершини та вузьке, зубець ледь зігнутий та довгий, ланцетної форми, опушення внутрішньої поверхні — слабке, зовнішньої — слабке. Зернівка червоного кольору, середньої довжини, ширини та крупності. Язичок — короткий, кіль на нижній квітковій лусці — наявний, вушка — гострі.

Рослини заввишки 89 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування вищесередня, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,6 бала. Стійкість сорту до вилягання 8,6 бала. Стійкість до осипання 9,0 бала. Стійкість до посухи 8,2 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньоранній, достигає за 277 діб.
Середня врожайність за роки випробування в зоні Степу 63,3 ц/га, Прибавка до національного стандарту 5,4 ц/га. Маса 1000 зерен 39,3 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі та відмінні. Зерно містить 14,3 % білка, клейковини — 30,4 %, сила борошна — 318 о. а., об'єм хліба зі 100 г борошна — 1290 мл. Сильна пшениця.

05007007 Антонівка

Заявник: Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Тип розвитку — озимий. Кущ — прямостоячий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок має сильний восковий наліт на піхві і відсутнє або

дуже слабке антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабовиповнена з помірним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та відсутнім або дуже слабким опушенням опуклої поверхні верхнього вузла. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, середньої щільності, середньої довжини із помірним восковим нальотом та наявними остюками. Нижня колоскова луска: плече піднесене з наявністю другої вершини та середньої ширини, зубець середньо-зігнутий, середньої довжини, овальна, опушення внутрішньої поверхні — слабке, зовнішньої — слабке. Зернівка червоного кольору, середньої довжини, ширини та крупності. Язичок — короткий, кіль на нижній квітковій лусці — наявний, вушка — гострі.

Висота рослин 84-85 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування підвищена, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,7 бала. Стійкість сорту до вилягання 8,5-9,0 бала. Стійкість до осипання 8,1-9,0 бала. Стійкість до посухи 7,6-8,2 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньоранній, достигає за 275-278 діб.
Середня врожайність за роки випробування в зоні Степу 57,6 ц/га, Лісостепу 61,7 ц/га . Прибавка до національного стандарту 0,4 ц/га. Маса 1000 зерен 35,5-37,0 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі та відмінні. Зерно містить 14,0 % білка, клейковини — 29,4-30,8 %, сила борошна — 407-414 о. а., об'єм хліба зі 100 г борошна — 1100-1250 мл. Сильна пшениця.

04007008 Безмежна

Заявник: **Закрите акціонерне товариство " Селена"**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Тип розвитку — озимий. Кущ — прямостоячий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок має сильний восковий наліт на піхві і відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабовиповнена з сильним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та помірним опушенням опуклої поверхні верхнього вузла. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, середньої щільності, середньої довжини із сильним восковим нальотом , наявні остюки . Нижня колоскова луска: ланцетна, плече пряме та вузьке, зубець ледь зігнутий, короткий, опушення внутрішньої поверхні — слабке, зовнішньої — слабке. Зернівка червоного кольору, середньої довжини, ширини та крупності. Язичок — середній, кіль на нижній квітковій лусці — наявний, вушка — гострі.

Рослини заввишки 79-85 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування вищесередня-підвищена, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,8 бала. Стійкість сорту до вилягання 8,8-9,0 бала. Стійкість до осипання 8,2-9,0 бала. Стійкість до посухи 7,7-8,0 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньоранній, достигає за 277-281добу.
Середня врожайність за роки випробування в зоні Степу 59,6 ц/га, Лісостепу 64,7 ц/га . Прибавка до національного стандарту в зоні Степу 2,4 ц/га, Лісостепу — 3,4 ц/га. Маса 1000 зерен 37,2-40,0 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі та відмінні. Зерно містить 13,9 % білка, клейковини — 29,0-29,5 %, сила борошна — 357-436 о. а., об'єм хліба з 100 г борошна — 1110-1200 мл. Сильна пшениця.

04007021 Богиня

Заявник: **Донецький інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Тип розвитку — озимий. Кущ — прямостоячий, рослини низькі. Прапорцевий листок має сильний восковий наліт на піхві і відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабовиповнена з сильним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та слабким опушенням опуклої поверхні верхнього вузла. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, пірамідальної форми, середньої щільності, довгий із помірним восковим нальотом , наявні остюки . Нижня колоскова луска: ланцетна, плече піднесене з наявністю другої вершини та середньої ширини, зубець ледь зігнутий середньої довжини, опушення внутрішньої поверхні — слабке, зовнішньої — слабке. Зернівка червоного кольору, середньої довжини, ширини та крупності. Язичок — короткий, кіль на нижній квітковій лусці — наявний, вушка — гострі.

Рослини заввишки 74-79 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування вищесередня, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,7-8,8 бала. Стійкість сорту до полягання 9,0 бала. Стійкість до осипання 8,2-9,0 бала. Стійкість до посухи 7,8-7,9 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньоранній, достигає за 277-281 діб.
Середня врожайність за роки випробування у зоні Степу 62,0 ц/га, Лісостепу 62,8 ц/га . Прибавка до національного стандарту в зоні Степу 3,8 ц/га, Лісостепу — 1,5 ц/га. Маса 1000 зерен 35,4-37,1 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі та відмінні. Зерно містить 14,1-14,2 % білка, клейковини — 29,0-30,6 %, сила борошна — 300-412 о. а., об'єм хліба зі 100 г борошна — 1100-1150 мл. Сильна пшениця.

04007023 Вінничанка

Заявник: **Приватне мале підприємство " Тирас"**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Тип розвитку — озимий. Кущ — напівпрямостоячий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок має сильний восковий наліт на піхві і відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабовиповнена з сильним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та слабким опушенням опуклої поверхні верхнього вузла. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, середньої щільності, довгий із помірним восковим нальотом , наявні остюки . Нижня колоскова луска: овально-ланцетна, плече пряме та середньої ширини, зубець ледь зігнутий, дуже короткий, опушення внутрішньої поверхні — слабке, зовнішньої — слабке. Зернівка червоного кольору, середньої довжини, ширини та крупності. Язичок — середній, кіль на нижній квітковій лусці — наявний, вушка — гострі.

Рослини заввишки 88-89 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування вищесередня, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,6-8,8 бала. Стійкість сорту до вилягання 8,5-8,6 бала. Стійкість до осипання 8,5-8,9 бала. Стійкість до посухи 8,2-8,5 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньостиглий, достигає за 283-291 добу.
Середня врожайність за роки випробування у зоні Лісостепу 64,7 ц/га, Полісся 51,9 ц/га . Прибавка до національного стандарту в зоні Лісостепу 3,4 ц/га, Полісся — 2,0 ц/га. Маса 1000 зерен 38,8-40,9 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі. Зерно містить 13,3-14,0 % білка, клейковини — 27,4-30,2 %, сила борошна — 252-260 о. а., об'єм хліба зі 100 г борошна — 970-1050 мл. Цінна пшениця.

04007026 Волошкова

Заявник: **Миронівський інститут пшениці ім. В.М. Ремесла Української академії аграрних наук**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Тип розвитку — озимий. Кущ — прямостоячий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок має сильний восковий наліт на піхві і відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення вушок. Соломина помірно виповнена з сильним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та помірним опушенням опуклої поверхні верхнього вузла. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, нещільний, середньої довжини із сильним восковим нальотом, наявні зубці. Нижня колоскова луска: овально-ланцетна, плече піднесене, широке, зубець ледь зігнутий та короткий, опушення внутрішньої поверхні — слабке, зовнішньої — слабке. Зернівка червоного кольору, середньої довжини, ширини та крупності. Язичок — середній, кіль на нижній квітковій лусці — наявний, вушка — гострі.

Рослини заввишки 90 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування вищесередня, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,7-8,8 бала. Стійкість сорту до вилягання 8,4-8,7 бала. Стійкість до осипання 8,4-8,7 бала. Стійкість до посухи 8,2-8,6 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньостиглий, достигає за 282-291 добу.
Середня врожайність за роки випробування у зоні Лісостепу 65,3 ц/га, Полісся 54,1 ц/га . Прибавка до національного стандарту в зоні Лісостепу 4,0 ц/га, Полісся — 4,2 ц/га. Маса 1000 зерен 41,9-43,6 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі та задовільні. Зерно містить 13,9-14,3 % білка, клейковини — 29,4-31,4 %, сила борошна — 249-281о. а., об'єм хліба зі 100 г борошна — 890-1090 мл. Цінна пшениця.

05007008 Єдність

Заявник: Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Тип розвитку — озимий. Кущ — прямостоячий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок має сильний восковий наліт на піхві і відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабовиповнена з помірним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та відсутнім або дуже слабким опушенням опуклої поверхні верхнього вузла. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, середньої щільності, середньої довжини із сильним восковим нальотом, наявні зубці. Нижня колоскова луска: овальна, плече піднесене з наявністю другої вершини, середньої ширини, зубець ледь зігнутий та дуже короткий, опушення внутрішньої поверхні — слабке, зовнішньої — слабке. Зернівка червоного кольору, середньої довжини, ширини, дрібна. Язичок — короткий, кіль на нижній квітковій лусці — наявний, вушка — гострі.

Рослини заввишки 77-82 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування підвищена, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,7-8,9 бала. Стійкість сорту до вилягання 8,3-8,9 бала. Стійкість до осипання 8,5-9,0 бала. Стійкість до посухи 8,1-8,6 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньоранній, достигає за 275-287діб.
Середня врожайність за роки випробування у зоні Степу 61,1 ц/га, Лісостепу 60,5 ц/га, Полісся 52,9 ц/га . Прибавка до національного стандарту в зоні Степу 3,9 ц/га, Лісостепу — 0,8 ц/га, Полісся — 3,0 ц/га. Маса 1000 зерен 34,5-36,4 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі та відмінні. Зерно містить 14,0-14,5% білка, клейковини — 28,5-31,0%, сила борошна — 323-434 о. а., об'єм хліба зі 100 г борошна — 1100-1200 мл. Сильна пшениця.

04007018 Запорука

Заявник: Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Тип розвитку — озимий. Кущ — напівпрямостоячий, рослини низькі. Прапорцевий листок має сильний восковий наліт на піхві і відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабовиповнена з сильним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та відсутнім або дуже слабким опушенням опуклої поверхні верхнього вузла. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, нещільний, середньої довжини із слабким восковим нальотом, наявні остюки. Нижня колоскова луска: ланцетна, плече піднесене, середньої ширини, зубець середньо-зігнутий та середньої довжини, опушення внутрішньої поверхні — слабке, зовнішньої — слабке. Зернівка червоного кольору, середньої довжини, ширини та крупності. Язичок — короткий, кіль на нижній квітковій лусці — наявний, вушка — гострі.

Рослини заввишки 72-74 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування вищесередня, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,6-8,8 бала. Стійкість сорту до вилягання 9,0 бала. Стійкість до осипання 8,2-8,9 бала. Стійкість до посухи 8,0 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньоранній, достигає за 277-281 добу.
Середня врожайність за роки випробування в зоні Степу 60,9 ц/га, Лісостепу 63,1 ц/га . Прибавка до національного стандарту в зоні Степу 3,7 ц/га, Лісостепу — 1,8 ц/га. Маса 1000 зерен 35,5-37,7 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту відмінні. Зерно містить 14,0-14,5 % білка, клейковини — 29,9-30,3 %, сила борошна — 357-403 о. а., об'єм хліба зі 100 г борошна — 1200-1430 мл. Сильна пшениця. Добрий поліпшувач борошна слабких пшениць.

05007027 Калинова

Заявник: Миронівський інститут пшениці ім. В.М. Ремесла Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Тип розвитку — озимий. Кущ — прямостоячий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок має сильний восковий наліт на піхві і слабке антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабовиповнена з сильним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та відсутнім або дуже слабким опушенням опуклої поверхні верхнього вузла. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, середньої щільності, дуже довгий із сильним восковим нальотом, наявні зубці. Нижня колоскова луска: ланцетна, плече піднесене, вузьке, зубець ледь зігнутий, короткий, опушення внутрішньої поверхні — помірне, зовнішньої — слабке. Зернівка червоного кольору, середньої довжини, ширини та крупності. Язичок — короткий, кіль на нижній квітковій лусці — наявний, вушка — гострі.

Рослини заввишки 94-97 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування вищесередня, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,8-8,9 бала. Стійкість сорту до вилягання 8,0-8,3 бала. Стійкість до осипання 8,3-8,4 бала. Стійкість до посухи 8,1-8,4 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньостиглий, достигає за 281-288 діб.
Середня врожайність за роки випробування у зоні Лісостепу 64,3 ц/га, Полісся 54,9 ц/га . Прибавка до національного стандарту в зоні Лісостепу 3,0 ц/га, Полісся — 5,0 ц/га. Маса 1000 зерен 37,4-39,9 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі та відмінні. Зерно містить 14,5-14,7% білка, клейковини — 28,7-29,0%, сила борошна — 260-275 о. а., об'єм хліба зі 100 г борошна — 1100-1200 мл. Цінна пшениця.

04007009 Кнопа

Заявник: **Одеський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Тип розвитку — озимий. Кущ — прямостоячий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок має помірний восковий наліт на піхві і відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабовиповнена з сильним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та відсутнім або дуже слабким опушенням опуклої поверхні верхнього вузла. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, пірамідальної форми, середньої щільності, середньої довжини із помірним восковим нальотом, наявні остюки. Нижня колоскова луска: ланцетна, плече пряме, середньої ширини, зубець прямий, короткий, опушення внутрішньої поверхні — слабке, зовнішньої — слабке. Зернівка червоного кольору, середньої довжини, ширини та крупності. Язичок — короткий, кіль на нижній квітковій лусці — наявний, вушка — гострі.

Рослини заввишки 83-89 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування вищесередня, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,7-8,8 бала. Стійкість сорту до вилягання 8,5-8,8 бала. Стійкість до осипання 8,0-8,9 бала. Стійкість до посухи 7,9 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньоранній, достигає за 278-282 доби.
Середня врожайність за роки випробування у зоні Степу 62,5 ц/га, Лісостепу 64,3 ц/га . Прибавка до національного стандарту в зоні Степу 4,3 ц/га, Лісостепу 3,0 ц/га. Маса 1000 зерен 35,8-39,5 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі. Зерно містить 13,2-13,9% білка, клейковини — 26,7-27,9%, сила борошна — 320-360 о. а., об'єм хліба зі 100 г борошна — 1100-1170 мл. Цінна пшениця.

04007002 Кобіра

Заявник: **Ходовля Рослин Рольничих "Насьона Кобєжиц"спулка з о.о.**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Тип розвитку — озимий. Кущ — прямостоячий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок має слабкий восковий наліт на піхві і відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабовиповнена з сильним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та відсутнім або дуже слабким опушенням опуклої поверхні верхнього вузла. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, середньої щільності, довгий із слабким восковим нальотом, наявні зубці. Нижня колоскова луска: овальна, плече піднесене, середньої ширини, зубець середньозігнутий, короткий, опушення внутрішньої поверхні — слабке, зовнішньої — слабке. Зернівка червоного кольору, коротка, середньої

ширини та крупності. Язичок — короткий, кіль на нижній квітковій лусці — наявний, вушка — гострі.

Рослини заввишки 90-92 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування вищесередня, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,6-8,8 бала. Стійкість сорту до вилягання 8,8-8,9 бала. Стійкість до осипання 8,4-8,8 бала. Стійкість до посухи 8,2-8,5 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньостиглий, достигає за 282-294 доби.
Середня врожайність за роки випробування у зоні Лісостепу 64,3 ц/га, Полісся 53,3 ц/га . Прибавка до національного стандарту в зоні Лісостепу 3,0 ц/га, Полісся — 3,4 ц/га. Маса 1000 зерен 37,5-38,8 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі та задовільні. Зерно містить 12,6-14,2% білка, клейковини — 25,8-30,4%, сила борошна — 261-277 о. а., об'єм хліба зі 100 г борошна — 970-1060 мла. Цінна пшениця.

04007022 Краплина

Заявник: **Донецький інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Тип розвитку — озимий. Кущ — прямостоячий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок має дуже сильний восковий наліт на піхві і відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабовиповнена з сильним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та відсутнім або дуже слабким опушенням опуклої поверхні верхнього вузла. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, пірамідальної форми, нещільний, довгий із слабким восковим нальотом, наявні остюки. Нижня колоскова луска: ланцетна, плече пряме, вузьке, зубець ледь зігнутий, середньої довжини, опушення внутрішньої поверхні — слабке, зовнішньої — слабке. Зернівка червоного кольору, середньої довжини, ширини та крупності. Язичок — середній, кіль на нижній квітковій лусці — наявний, вушка — гострі.

Рослини заввишки 78 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування вищесередня, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,6 бала. Стійкість сорту до вилягання 9,0 бала. Стійкість до осипання 8,9 бала. Стійкість до посухи 7,8 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньоранній, достигає за 277 діб.
Середня врожайність за роки випробування в зоні Степу 61,8 ц/га. Прибавка до національного стандарта в зоні Степу 3,6 ц/га. Маса 1000 зерен 35,2 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі та відмінні. Зерно містить 14,1% білка, клейковини 30,2%, сила борошна 347о. а., об'єм хліба з 100 г борошна 1020 мл. Сильна пшениця.

04007005 Косовиця

Заявник: **Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Тип розвитку — озимий. Кущ — напівпрямостоячий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок має сильний восковий наліт на піхві і відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабовиповнена з сильним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та відсутнім або дуже слабким опушенням опуклої поверхні верхнього вузла. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, середньої щільності, середньої довжини із помірним восковим нальотом, наявні остюки. Нижня колоскова луска: ланцетна, плече піднесене з наявністю другої вершини, вузьке, зубець середньо зігнутий, короткий, опушення внутрішньої поверхні — слабке, зовнішньої — слабке. Зернівка червоного кольору, середньої довжини, ширини та крупності. Язичок — короткий, кіль на нижній квітковій лусці — наявний, вушка — гострі.

Рослини заввишки 81-87 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування вищесередня-підвищена, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,7-8,8 бала. Стійкість сорту до вилягання 8,8-9,0 бала. Стійкість до осипання 8,2-9,0 бала. Стійкість до посухи 8,2 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньоранній, достигає за 276-282 доби.
Середня врожайність за роки випробування в зоні Степу 60,9 ц/га, в зоні Лісостепу 66,4 ц/га . Прибавка до національного стандарту в зоні Степу 3,7 ц/га, в зоні Лісостепу 5,1 ц/га. Маса 1000 зерен 37,2-40,7 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі та відмінні. Зерно містить 13,9-

14,0% білка, клейковини 29,0-30,2%, сила борошна 337-406 о. а., об'єм хліба з 100 г борошна 1100-1180 мл. Сильна пшениця.

05007025 Колос Миронівщини

Заявник: Миронівський інститут пшениці ім. В.М. Ремесла Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Тип розвитку — озимий. Кущ — прямостоячий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок має сильний восковий наліт на піхві і відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабовиповнена з сильним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та відсутнім або дуже слабким опушенням опуклої поверхні верхнього вузла. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, середньої щільності, середньої довжини із сильним восковим нальотом, наявні зубці. Нижня колоскова луска: ланцетна, плече піднесене, вузьке, зубець середньо зігнутий, дуже короткий, опушення внутрішньої поверхні — слабке, зовнішньої — слабке. Зернівка червоного кольору, середньої довжини, ширини та крупності. Язичок — середній, кіль на нижній квітковій лусці — наявний, вушка — гострі.

Рослини заввишки 92-93 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування вищесередня, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,5-8,8 бала. Стійкість сорту до вилягання 8,5-8,9 бала. Стійкість до осипання 8,4-8,7 бала. Стійкість до посухи 8,1-8,4 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньостиглий, достигає за 280-288 діб.
Середня врожайність за роки випробування у зоні Лісостепу 63,8 ц/га, Полісся 56,0 ц/га . Прибавка до національного стандарту в зоні Лісостепу 2,5 ц/га, Полісся — 6,1 ц/га. Маса 1000 зерен 37,9-38,0 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі. Зерно містить 13,8-13,9% білка, клейковини — 28,9-30,1%, сила борошна — 350-353 о. а., об'єм хліба зі 100 г борошна 1000-1100 мл. Цінна пшениця.

05007045 Косоч

Заявник: Кочубей Олександр Васильович

Власник(и):

Підтримувач(і):

Тип розвитку — озимий. Кущ — прямостоячий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок має середній восковий наліт на піхві і відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабовиповнена з помірним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та відсутнім або дуже слабким опушенням опуклої поверхні верхнього вузла. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, середньої щільності, довгий із помірним восковим нальотом, наявні осьтюки. Нижня колоскова луска: ланцетна, плече скошене, відсутнє або дуже вузьке, зубець дуже зігнутий, середньої довжини, опушення внутрішньої поверхні — слабке, зовнішньої — слабке. Зернівка червоного кольору, середньої довжини, ширини та крупна. Язичок — короткий, кіль на нижній квітковій лусці — наявний, вушка — гострі.

Рослини заввишки 84 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування середня-вищесередня, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,8 бала. Стійкість сорту до вилягання 9,0 бала. Стійкість до осипання 8,3 бала. Стійкість до посухи 7,7 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Ранньостиглий, достигає за 270 діб.
Середня врожайність за роки випробування у зоні Лісостепу 59,3 ц/га. Маса 1000 зерен 39,3 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі. Зерно містить 14,3% білка, клейковини — 31,0%, сила борошна — 272 о. а., об'єм хліба зі 100 г борошна — 1000 мл. Цінна пшениця.

05007017 Лугастар

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Насіння Луганщини"

Власник(и):

Підтримувач(і):

Тип розвитку — озимий. Кущ — прямостоячий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок має помірний восковий наліт на піхві і відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабовиповнена з сильним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та слабким опушенням опуклої поверхні верхнього вузла. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, середньої щільності, середньої довжини із помірним восковим нальотом, наявні остюки. Нижня колоскова луска: овально-ланцетна, плече скошене, вузьке, зубець середньо зігнутий, короткий, опушення внутрішньої поверхні — помірне, зовнішньої — слабке. Зернівка червоного кольору, коротка середньої ширини та крупності. Язичок — середній, кіль на нижній квітковій лусці — наявний, вушка — гострі.

Рослини заввишки 87 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування вищесередня-підвищена, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,6 бала. Стійкість сорту до вилягання 9,0 бала. Стійкість до осипання 9,0 бала. Стійкість до посухи 7,6 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньоранній, достигає за 275 діб.
Середня врожайність за роки випробування у зоні Степу 61,3 ц/га . Прибавка до національного стандарту в зоні Степу 4,1 ц/га. Маса 1000 зерен 35,7 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі та відмінні. Зерно містить 14,0% білка, клейковини — 30,4%, сила борошна — 311 о. а., об'єм хліба зі 100 г борошна — 1200 мл. Сильна пшениця.

04007020 Олексіївка

Заявник: **Донецький інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Тип розвитку — озимий. Кущ — прямостоячий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок має помірний восковий наліт на піхві і відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабовиповнена з помірним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та дуже слабким або відсутнім опушенням опуклої поверхні верхнього вузла. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, нещільний, довгий із слабким восковим нальотом, наявні остюки. Нижня колоскова луска: ланцетна, плече пряме, середньої ширини, зубець ледь зігнутий, середньої довжини, опушення внутрішньої поверхні — помірне, зовнішньої — слабке. Зернівка червоного кольору, середньої довжини, ширини та крупна. Язичок — середній, кіль на нижній квітковій лусці — наявний, вушка — шилоподібні.

Рослини заввишки 80-88 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування вищесередня, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,7-8,9 бала. Стійкість сорту до вилягання 8,7-9,0 бала. Стійкість до осипання 8,2-9,0 бала. Стійкість до посухи 7,9 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньоранній, достигає за 278-281 добу.
Середня врожайність за роки випробування у зоні Степу 60,0 ц/га, Лісостепу 64,2 ц/га . Прибавка до національного стандарту в зоні Степу 2,8 ц/га, Лісостепу 2,9 ц/га. Маса 1000 зерен 36,2-38,9 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі та відмінні. Зерно містить 14,0-14,3% білка, клейковини — 30,3-31,1%, сила борошна — 355-394 о. а., об'єм хліба зі 100 г борошна — 1200-1390 мл. Сильна пшениця.

04007044 ПАЛПИЧ

Заявник: **Державна наукова установа Краснодарський науково-дослідний інститут сільського господарства ім. П.П. Лук'яненка**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Тип розвитку — озимий. Кущ — прямостоячий, рослини низькі. Прапорцевий листок має дуже сильний восковий наліт на піхві і відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабовиповнена з сильним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та дуже слабким або відсутнім опушенням опуклої поверхні верхнього вузла. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, веретеноподбної форми, нещільний, середньої довжини із сильним восковим нальотом, наявні зубці. Нижня колоскова луска: овально-ланцетна, плече піднесене, середньої ширини, зубець прямий, дуже короткий, опушення внутрішньої поверхні — помірне, зовнішньої — слабке. Зернівка червоного кольору, коротка, середньої ширини та крупна. Язичок — короткий, кіль на нижній квітковій лусці — наявний, вушка — гострі.

Рослини заввишки 74-77 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування вищесередня, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,6-8,8 бала. Стійкість сорту до вилягання 9,0 бала. Стійкість до осипання 8,7-9,0 бала. Стійкість до посухи 7,9-8,0 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньоранній, достигає за 276-281добу.
Середня врожайність за роки випробування у зоні Степу 58,8 ц/га, Лісостепу 63,9 ц/га . Прибавка до національного стандарту в зоні Степу 0,6 ц/га, Лісостепу — 3,1 ц/га. Маса 1000 зерен 35,8-39,8 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі та відмінні. Зерно містить 14,0-14,5% білка, клейковини — 29,5-31,0%, сила борошна — 411-443 о. а., об'єм хліба зі 100 г борошна — 1100-1200 мл. Сильна пшениця.

04007035 Паляниця

Заявник: **Луганський інститут селекції і технологій у формі товариства з обмеженою відповідальністю**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Тип розвитку — озимий. Кущ — напівпрямостоячий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок має сильний восковий наліт на піхві і відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабовиповнена з сильним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та помірним опушенням опуклої поверхні верхнього вузла. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, пірамідальної форми, щільний, середньої довжини із помірним восковим нальотом, наявні остюки. Нижня колоскова луска: овально-ланцетна, плече піднесене, середньої ширини, зубець середньо зігнутий, дуже довгий, опушення внутрішньої поверхні — помірне, зовнішньої — слабке. Зернівка червоного кольору, середньої довжини, ширини та крупності. Язичок — короткий, кіль на нижній квітковій лусці — наявний, вушка — гострі.

Рослини заввишки 70-73 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування вищесередня, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,5-8,6 бала. Стійкість сорту до вилягання 9,0 бала. Стійкість до осипання 7,9-9,0 бала. Стійкість до посухи 7,8-8,1 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньоранній, достигає за 274-279 діб.
Середня врожайність за роки випробування в зоні Степу 63,9 ц/га, в зоні Лісостепу 64,1 ц/га . Прибавка до національного стандарту в зоні Степу 5,7 ц/га, в зоні Лісостепу 2,8 ц/га. Маса 1000 зерен 34,8-36,6 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі та відмінні. Зерно містить 13,6-13,8% білка, клейковини 29,1-30,2%, сила борошна 278-334 о. а., об'єм хліба з 100 г борошна 1040-1200 мл. Цінна пшениця.

04007046 Пам'ять

Заявник: **Державна наукова установа Краснодарський науково-дослідний інститут сільського господарства ім. П.П. Лук'яненка**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Тип розвитку — озимий. Кущ — прямостоячий, рослини високі. Прапорцевий листок має сильний восковий наліт на піхві і відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабовиповнена з сильним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та помірним опушенням опуклої поверхні верхнього вузла. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, пірамідальної форми, нещільний, довгий із помірним восковим нальотом, наявні зубці. Нижня колоскова луска: яйцеподібна, плече пряме, вузьке, зубець прямий, дуже короткий, опушення внутрішньої поверхні — слабке, зовнішньої — слабке. Зернівка червоного кольору, середньої довжини, ширини та крупності. Язичок — середній, кіль на нижній квітковій лусці — наявний, вушка — гострі.

Рослини заввишки 88 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування вищесередня, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,9 бала. Стійкість сорту до вилягання 8,9 бала. Стійкість до осипання 8,7 бала. Стійкість до посухи 7,8 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньоранній, достигає за 283 доби.
Середня врожайність за роки випробування у зоні Лісостепу 62,3 ц/га. Прибавка до національного стандарту в зоні Лісостепу 1,0 ц/га. Маса 1000 зерен 39,0 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі та відмінні. Зерно містить 14,2% білка, клейковини — 31,7%, сила борошна — 364 о. а., об'єм хліба зі 100 г борошна — 1200 мл. Сильна пшениця.

04007017 Подяка

Заявник: Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Тип розвитку — озимий. Кущ — напівпрямостоячий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок має помірний восковий наліт на піхві і слабке антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабовиповнена з сильним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та помірним опушенням опуклої поверхні верхнього вузла. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, пірамідальної форми, середньої щільності, середньої довжини із помірним восковим нальотом, наявні остюки. Нижня колоскова луска: ланцетна, плече піднесене, вузьке, зубець ледь зігнутий, довгий, опушення внутрішньої поверхні — слабке, зовнішньої — слабке. Зернівка червоного кольору, середньої довжини, ширини та крупності. Язичок — середній, кіль на нижній квітковій лусці — наявний, вушка — гострі.

Рослини заввишки 74-76 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування вищесередня, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,7 бала. Стійкість сорту до вилягання 8,7-9,0 бала. Стійкість до осипання 8,2-9,0 бала. Стійкість до посухи 8,2-8,4 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньоранній, достигає за 276-280 діб.
Середня врожайність за роки випробування у зоні Степу 61,8 ц/га, Лісостепу 63,6 ц/га . Прибавка до національного стандарту в зоні Степу 4,6 ц/га, Лісостепу — 2,3 ц/га. Маса 1000 зерен 36,1-38,8 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі та відмінні. Зерно містить 14,2% білка, клейковини — 29,8-30,1%, сила борошна — 343-357 о. а., об'єм хліба зі 100 г борошна — 1270-1430 мл. Сильна пшениця.

04007019 Станіслава

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Насіння Луганщини"

Власник(и):

Підтримувач(і):

Тип розвитку — озимий. Кущ — прямостоячий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок має помірний восковий наліт на піхві і відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабовиповнена з сильним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та сильним опушенням опуклої поверхні верхнього вузла. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, середньої щільності, довгий із сильним восковим нальотом, наявні остюки. Нижня колоскова луска: ланцетна, плече піднесене, вузьке, зубець ледь зігнутий, середньої довжини, опушення внутрішньої поверхні — слабке, зовнішньої — слабке. Зернівка червоного кольору, середньої довжини, ширини та крупності. Язичок — довгий, кіль на нижній квітковій лусці — наявний, вушка — гострі.

Рослини заввишки 97-98 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування вищесередня, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,7 бала. Стійкість сорту до вилягання 8,1-8,9 бала. Стійкість до осипання 8,2-8,7 бала. Стійкість до посухи 8,1-8,3 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньоранній, достигає за 277-282 доби.
Середня врожайність за роки випробування у зоні Степу 61,9 ц/га, Лісостепу 64,1 ц/га . Прибавка до національного стандарту в зоні Степу 4,7 ц/га, Лісостепу — 2,8 ц/га. Маса 1000 зерен 37,8-40,3 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі та відмінні. Зерно містить 14,2-14,3% білка, клейковини — 30,5-31,0%, сила борошна — 468-526 о. а., об'єм хліба з 100 г борошна — 1210-1300 мл. Сильна пшениця, поліпшувач: від доброго до відмінного.

05007006 Тітона

Заявник: Приватне сільськогосподарське селекційно-дослідне підприємство "БОР"

Власник(и):

Підтримувач(і):

Тип розвитку — озимий. Кущ — прямостоячий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок має помірний восковий наліт на піхві і відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабовиповнена з помірним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та відсутнім або дуже слабким опушенням опуклої поверхні верхнього вузла. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, середньої щільності, середньої довжини із помірним восковим нальотом, наявні остюки. Нижня колоскова луска: овально- ланцетна, плече піднесене з наявністю другої вершини, середньої ширини, зубець середньо зігнутий, середньої довжини, опушення внутрішньої поверхні — слабке, зовнішньої — слабке. Зернівка червоного кольору, середньої довжини, ширини та дрібна. Язичок — короткий, кіль на нижній квітковій лусці — наявний, вушка — гострі.

Рослини заввишки 79-84 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування вищесередня, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,6-8,9 бала. Стійкість сорту до вилягання 7,8-8,7 бала. Стійкість до осипання 8,2-9,0 бала. Стійкість до посухи 8,2-8,4 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньоранній, достигає за 275-286 діб.
Середня врожайність за роки випробування у зоні Степу 65,1 ц/га, Лісостепу 67,1 ц/га, Полісся 53,2 ц/га. Прибавка до національного стандарту в зоні Степу 7,9 ц/га, Лісостепу — 5,8 ц/га, Полісся — 3,3 ц/га, Маса 1000 зерен 34,9-38,4 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі та відмінні. Зерно містить 14,0-14,3% білка, клейковини — 29,9-30,3%, сила борошна — 284-432 о. а., об'єм хліба зі 100 г борошна — 1100-1240 мл. Сильна пшениця.

04007015 Трипільська

Заявник: **Фермерське господарство "Теософ"**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Тип розвитку — озимий. Кущ — напівпрямостоячий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок має сильний восковий наліт на піхві і відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабовиповнена з сильним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та помірним опушенням опуклої поверхні верхнього вузла. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, середньої щільності, середньої довжини із помірним восковим нальотом, наявні зубці. Нижня колоскова луска: овально- ланцетна, плече скошене, середньої ширини, зубець ледь зігнутий, короткий, опушення внутрішньої поверхні — слабке, зовнішньої — слабке. Зернівка червоного кольору, середньої довжини, ширини та крупна. Язичок — середній, кіль на нижній квітковій лусці — наявний, вушка — гострі.

Рослини заввишки 90-93 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування вищесередня, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,6-8,9 бала. Стійкість сорту до вилягання 8,5-8,9 бала. Стійкість до осипання 8,4-8,8 бала. Стійкість до посухи 8,2-8,4 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньостиглий, достигає за 290-290 діб.
Середня врожайність за роки випробування у зоні Степу 58,6 ц/га, Лісостепу 65,9 ц/га, Полісся 50,4 ц/га. Прибавка до національного стандарту в зоні Степу 1,4 ц/га, Лісостепу — 3,6 ц/га, Полісся — 0,5 ц/га. Маса 1000 зерен 39,8-42,3 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі та відмінні. Зерно містить 13,9% білка, клейковини — 29,3-30,1%, сила борошна — 280-315 о. а., об'єм хліба зі 100 г борошна — 1000-1160 мл. Сильна пшениця.

05007036 Царівна

Заявник: **Білоцерківська дослідно-селекційна станція ім. О.К. Коломієць Інституту цукрових буряків Української академії аграрних наук**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Тип розвитку — озимий. Кущ — прямостоячий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок має сильний восковий наліт на піхві і відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабовиповнена з сильним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та слабким опушенням опуклої поверхні верхнього вузла. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, середньої щільності, середньої довжини із дуже сильним восковим нальотом, наявні остюки. Нижня колоскова луска: ланцетна, плече скошене, вузьке, зубець середньо зігнутий, середньої довжини, опушення внутрішньої поверхні — слабке, зовнішньої — слабке. Зернівка червоного кольору, коротка, середньої ширини та

крупності. Язичок — короткий, кіль на нижній квітковій лусці — наявний, вушка — гострі.

Рослини заввишки 87-88 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування підвищена, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,6-8,9 бала. Стійкість сорту до вилягання 8,5-8,9 бала. Стійкість до осипання 8,1 бала. Стійкість до посухи 8,1-8,3 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньоранній, достигає за 278-287 діб.
Середня врожайність за роки випробування у зоні Лісостепу 61,2 ц/га, Полісся 50,0 ц/га . Маса 1000 зерен 38,4-39,9 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі та відмінні. Зерно містить 14,0-14,2% білка, клейковини — 30,1-31,0%, сила борошна — 342-375 о. а., об'єм хліба зі 100 г борошна — 1100-1180 мл. Сильна пшениця.

04007045 Ювілейна 100

Заявник: **Державна наукова установа Краснодарський науково-дослідний інститут сільського господарства ім. П.П. Лук'яненка**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Тип розвитку — озимий. Кущ — прямостоячий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок має сильний восковий наліт на піхві і відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабовиповнена з сильним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та відсутнім або дуже слабким опушенням опуклої поверхні верхнього вузла. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, нещільний, середньої довжини із сильним восковим нальотом, наявні остюки. Нижня колоскова луска: ланцетна, плече піднесене з наявністю другої вершини, вузьке, зубець середньо зігнутий, короткий, опушення внутрішньої поверхні — слабке, зовнішньої — слабке. Зернівка червоного кольору, середньої довжини, ширини та дрібна. Язичок — короткий, кіль на нижній квітковій лусці — наявний, вушка — гострі.

Рослини заввишки 80-83 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування вищесередня, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,5-8,8 бала. Стійкість сорту до вилягання 9,0 бала. Стійкість до осипання 8,6-8,9 бала. Стійкість до посухи 7,8-8,1 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Ранньостиглий, достигає за 271-280 діб.
Середня врожайність за роки випробування у зоні Степу 58,3 ц/га, Лісостепу 71,6 ц/га . Прибавка до національного стандарту в зоні Степу 0,1 ц/га, Лісостепу — 10,3 ц/га. Маса 1000 зерен 37,1-42,3 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі та відмінні. Зерно містить 14,3-15,2% білка, клейковини — 31,0-33,4%, сила борошна — 353-396 о. а., об'єм хліба зі 100 г борошна — 1150-1220 мл. Сильна пшениця.

Пшениця м'яка яра

04007043 Євдокія

Заявник: **Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Тип розвитку — ярий. Кущ — напівпрямостоячий, рослини високі. Прапорцевий листок має слабкий восковий наліт на піхві і дуже слабке або відсутнє антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабовиповнена з слабким восковим нальотом на верхньому міжвузлі та відсутнім або дуже слабким опушенням опуклої поверхні верхнього вузла. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, пірамідальної форми, середньої щільності та довгий із помірним восковим нальотом та наявними зубцями. Нижня колоскова луска: яйцеподібна, плече скошене, середньої ширини, зубець прямий, короткий, опушення внутрішньої поверхні — слабке, зовнішньої — слабке. Зернівка червоного кольору, середньої довжини, широка, середньої крупності. Язичок — довгий, кіль на нижній квітковій лусці — наявний, вушка — гострі.

Рослини заввишки 107 см. Стійкість сорту до вилягання 7,0 бала. Стійкість до осипання 8,1 бала. Стійкість до посухи 8,4 бала. За роки випробування сорт слабо вражався основними хворобами та шкідниками. Середньоранній, достигає за 100 діб.
Середня врожайність за роки випробування у зоні Лісостепу 39,0 ц/га. Прибавка до національного стандарту 0,6 ц/га. Маса 1000 зерен 38,9 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі та відмінні. Зерно містить 14,0% білка, клейковини — 29,8%, сила борошна — 312 о. а., об'єм хліба зі 100 г борошна — 1050 мл. Сильна пшениця.

06007003 ПХРСВ - 02

Заявник: **Експериментальна станція Мінесоти**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Тип розвитку — ярий. Кущ — прямостоячий, рослини низькі. Прапорцевий листок має слабкий восковий наліт на піхві і дуже слабке або відсутнє антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабовиповнена з помірним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та слабким опушенням опуклої поверхні верхнього вузла. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, пірамідальної форми, нещільний та середньої довжини із відсутнім або дуже слабким восковим нальотом та наявними остюками. Нижня колоскова луска: овальна, плече піднесене, широке, зубець прямий, середньої довжини, опушення внутрішньої поверхні — слабке, зовнішньої — слабке. Зернівка білого кольору, коротка, середньої ширини та дрібна. Язичок — довгий, кіль на нижній квітковій лусці — наявний, вушка — шилоподібні.

Рослини заввишки 78-79 см. Стійкість сорту до вилягання 7,2-8,3 бала. Стійкість до осипання 8,2-8,3 бала. Стійкість до посухи 8,0-8,3 бала. За роки випробування сорт слабо вражався основними хворобами та шкідниками. Ранньостиглий, достигає за 96-99 діб.
Середня врожайність за роки випробування у зоні Лісостепу 39,7 ц/га, Полісся 37,1 ц/га. Маса 1000 зерен 37,3-38,1 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі та відмінні. Зерно містить 15,7-16,5% білка, клейковини — 32,1-33,2%, сила борошна — 291-329 о. а., об'єм хліба зі 100 г борошна — 1000-1050 мл. Сильна пшениця, сорт схильний до накопичення білку.

06007004 ПХРСВ - 03

Заявник: **Сіннер Брос & Бреснахан**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Тип розвитку — ярий. Кущ — прямостоячий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок має помірний восковий наліт на піхві і слабке

антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабовиповнена з слабким восковим нальотом на верхньому міжвузлі та вівдсуинім або дуже слабким опушенням опуклої поверхні верхнього вузла. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, пірамідальної форми, нещільний та короткий із відсутнім або дуже слабким восковим нальотом та наявними остюками. Нижня колоскова луска: яйцеподібна, плече піднесене, широке, зубець прямий, короткий, опушення внутрішньої поверхні — слабке, зовнішньої — слабке. Зернівка білого кольору, коротка, середньої ширини та дрібна. Язичок — середній, кіль на нижній квітковій лусці — наявний, вушка — гострі.

Висота рослин 82 см. Стійкість сорту до вилягання 8,8 бала. Стійкість до осипання 8,2 бала. Стійкість до посухи 8,1бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Ранньостиглий, достигає за 96 діб.
Середня врожайність за роки випробування в зоні Лісостепу 38,3 ц/га. Маса 1000 зерен 37,6 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі та відмінні. Сорт здатний накопичувати білок, вміст білка від 14,6 до 20,8% , (середній вміст білка 17,1%), вміст клейковини — 35,4%, клейковина розтяжна та еластична, відноситься до 1 групи якості, сила борошна 392 о. а.. Реологічні властивості тіста відмінні: відношення пружності до розтяжності 0,8-1,1, що дає можливість у більшості випадків одержувати високий обєм хліба до 1400 мл, середній об'єм хліба зі 100 г борошна — 1020 мл. Сильна пшениця, відмінний поліпшувач.

05007057 Струна миронівська

Заявник: **Миронівський інститут пшениці ім. В.М. Ремесла Української академії аграрних наук**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Тип розвитку — ярий. Кущ — напівпрямостоячий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок має слабкий восковий наліт на піхві і дуже слабке або відсутнє антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабовиповнена з помірним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та відсутнім або дуже слабким опушенням опуклої поверхні верхнього вузла. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, пірамідальної форми, нещільний та довгий із помірним восковим нальотом та наявними остюками. Нижня колоскова луска: овально-ланцетна, плече пряме, широке, зубець прямий, короткий, опушення внутрішньої поверхні — слабке, зовнішньої — слабке. Зернівка червоного кольору, середньої довжини, ширини та крупності. Язичок — середній, кіль на нижній квітковій лусці — наявний, вушка — шилоподібні.

Висота рослин 76-81 см. Стійкість сорту до вилягання 8,7-9,0 бала. Стійкість до осипання 8,3-8,8 бала. Стійкість до посухи 8,7-8,9 бала. За роки випробування сорт слабо вражався основними хворобами та шкідниками. Середньоранній, достигає за 98-101 добу.
Середня врожайність за роки випробування у зоні Лісостепу 53,2 ц/га, Полісся 49,6 ц/га . Прибавка до національного стандарту в зоні Лісостепу 6,4 ц/га, Полісся — 7,2 ц/га. Маса 1000 зерен 41,2 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі. Зерно містить 13,1-13,9% білка, клейковини — 26,9-28,6%, сила борошна — 245-281о. а., об'єм хліба зі 100 г борошна — 980-1080 мл. Цінна пшениця.

04007053 Торчинська

Заявник: **Селянсько фермерське господарство " Родень 10"**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Тип розвитку — ярий. Кущ — напівпрямостоячий, рослини низькі. Прапорцевий листок має відсутній або дуже слабкий восковий наліт на піхві і відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабовиповнена з помірним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та вівдсутнім або дуже слабким опушенням опуклої поверхні верхнього вузла. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, пірамідальної форми, середньої щільності та довжини із помірним восковим нальотом, остюки або зубці відсутні. Нижня колоскова луска: овальна, плече пряме, широке, зубець прямий, дуже короткий, опушення внутрішньої поверхні — слабке, зовнішньої — слабке. Зернівка червоного кольору, коротка, вузька та середньої крупності. Язичок — короткий, кіль на нижній квітковій лусці — наявний, вушка — гострі.

Висота рослин 86-90 см. Стійкість сорту до вилягання 8,1-8,5 бала. Стійкість до осипання 8,5-8,9 бала. Стійкість до посухи 8,7-8,8 бала. За роки

випробування сорт слабо вражався основними хворобами та шкідниками. Середньоранній, достигає за 100-102 доби.
Середня врожайність за роки випробування у зоні Лісостепу 52,0 ц/га, Полісся 49,1 ц/га . Прибавка до національного стандарту в зоні Лісостепу 5,2 ц/га, Полісся 6,7 ц/га. Маса 1000 зерен 37,8-39,0 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі. Зерно містить 13,0% білка, клейковини — 26,9%, сила борошна — 265-291 о. а., об'єм хліба з 100 г борошна — 990-1000 мл. Цінна пшениця.

06007005 Тюбалт

Заявник: Заатен-Уніон ГмбХ

Власник(и):

Підтримувач(і):

Тип розвитку — ярий. Кущ — напівпрямостоячий, рослини дуже низькі. Прапорцевий листок має слабкий восковий наліт на піхві і дуже слабке або відсутнє антоціанове забарвлення вушок. Соломина виповнена з слабким восковим нальотом на верхньому міжвузлі та відсутнім або дуже слабким опушенням опуклої поверхні верхнього вузла. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, середньої щільності та довжини із слабким восковим нальотом та наявними зубцями. Нижня колоскова луска: яйцеподібна, плече округле, широке, зубець ледь зігнутий, короткий, опушення внутрішньої поверхні — слабке, зовнішньої — слабке. Зернівка червоного кольору, середньої довжини, ширини та крупності. Язичок — довгий, кіль на нижній квітковій лусці — наявний, вушка — гострі.

Висота рослин 68-77 см. Стійкість сорту до вилягання 9,0 бала. Стійкість до осипання 8,5-9,0 бала. Стійкість до посухи 8,6-8,9 бала. За роки випробування сорт слабо вражався основними хворобами та шкідниками. Середньоранній, достигає за 100-101 добу.
Середня врожайність за роки випробування у зоні Степу 44,6 ц/га, Лісостепу 51,8 ц/га, Полісся 48,2 ц/га. Прибавка до національного стандарту в зоні Степу 9,0 ц/га, Лісостепу — 5,0 ц/га, Полісся — 5,8 ц/га. Маса 1000 зерен 36,0-40,9 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі та відмінні. Зерно містить 13,5-14,3% білка, клейковини — 27,7-29,7%, сила борошна — 268-353 о. а., об'єм хліба з 100 г борошна — 1000-1100 мл. Цінна пшениця.

06007024 Хофман

Заявник: Хайленд Сидс Томпсонс ЛТД

Власник(и):

Підтримувач(і):

Тип розвитку — ярий. Кущ — прямостоячий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок має помірний восковий наліт на піхві і відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабовиповнена з помірним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та вівдсутнім або дуже слабким опушенням опуклої поверхні верхнього вузла. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, пірамідальної форми, дуже нещільний та довгий із помірним восковим нальотом та наявними остюками. Нижня колоскова луска: овально-ланцетна, плече піднесене з наявністю другої вершини, вузьке, зубець прямий, середньої довжини, опушення внутрішньої поверхні — слабке, зовнішньої — слабке. Зернівка червоного кольору, середньої довжини, ширини та крупності. Язичок — середній, кіль на нижній квітковій лусці — наявний, вушка — шилоподібні.

Висота рослин 97см. Стійкість сорту до вилягання 7,9 бала. Стійкість до осипання 9,0 бала. Стійкість до посухи 8,7 бала. За роки випробування сорт слабо вражався основними хворобами та шкідниками. Середньостиглий, достигає за 104 доби.
Середня врожайність за роки випробування у зоні Полісся 44,7 ц/га. Прибавка до національного стандарту в зоні Полісся 2,3 ц/га. Маса 1000 зерен 40,8 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту задовільні. Зерно містить 13,6% білка, клейковини 27,2%, сила борошна 251о. а., об'єм хліба з 100 г борошна 940 мл. Філер.

Пшениця м'яка двуручка

04007013 Хуторянка

Заявник: Фермерське господарство "Теософ"

Власник(и):

Підтримувач(і):

Тип розвитку — дворучка (альтернативний). Кущ — напівпрямостоячий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок має сильний восковий наліт на піхві і відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабовиповнена з помірним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та відсутнім або дуже слабким опушенням опуклої поверхні верхнього вузла. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, пірамідальної форми, нещільний, довгий із відсутнім або дуже слабким восковим нальотом, наявні остюки. Нижня колоскова луска: яйцеподібна, плече піднесене, вузьке, зубець прямий, середньої довжини, опушення внутрішньої поверхні — слабке, зовнішньої — слабке. Зернівка червоного кольору, середньої довжини, ширини та крупна. Язичок — середній, кіль на нижній квітковій лусці — наявний, вушка — гострі.

Рослини заввишки 83 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування нижчесередня-низька, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 7,7 бала. Рекомендовано висівати у озимому посіві в кінці строків посіву озимини. Вимагає ранньої весняної сівби, можна висівати у „лютневі вікна". Стійкість сорту до вилягання 8,8 бала. Стійкість до осипання 8,2 бала. Стійкість до посухи 7,4 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньостиглий, достигає за 286 діб.
Середня врожайність за роки випробування у зоні Лісостепу 65,8 ц/га. Прибавка до національного стандарту в зоні Лісостепу 4,5 ц/га. Маса 1000 зерен 38,0 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі. Зерно містить 13,6% білка, клейковини — 27,9%, сила борошна — 375 о. а., об'єм хліба зі 100 г борошна — 1100 мл. Цінна пшениця.

Пшениця тверда озима

04008002 Кассіопея

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробнича фірма "Дріада, Лтд"

Власник(и):

Підтримувач(і):

Тип розвитку - озимий. Кущ - прямостоячий, рослини високі. Прапорцевий листок має дуже сильний восковий наліт на піхві та сильний на листковій пластинці з нижнього боку. Остюки світлокоричневого кольору з відсутнім або дуже слабким антоціаном. Остюки на верхівці колосу довші самого колосу. Соломина має сильний восковий наліт на верхньому міжвузлі та слабке опушення верхнього вузла. Колос середньої довжини, циліндричної форми, середньої щільності, слабо забарвлений при достиганні і має дуже сильний восковий наліт. Зернівка видовжена з коротким чубчиком. Нижня колоскова луска видовжена, плече піднесене з наявністю другої вершини, вузьке, зубець середньозігнутий, короткий.

Рослини заввишки 78-79 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування середня, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,6 бала. Стійкість сорту до вилягання 8,5-8,8 бала. Стійкість до осипання 8,5-9,0 бала. Стійкість до посухи 8,2 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Ранньостиглий, достигає за 270-278 діб.
Середня врожайність за роки випробування у зоні Степу 59,7 ц/га, Лісостепу 51,7 ц/га . Прибавка до національного стандарту в зоні Степу 0,8 ц/га, Лісостепу — 2,6 ц/га. Маса 1000 зерен 40,7-43,6 г. Зерно містить 13,5-14,5% білка. Загальна оцінка макаронів 8,0-8,5 бала.

05008001 Континент

Заявник: Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Тип розвитку - озимий. Кущ - прямостоячий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок має сильний восковий наліт на піхві та листковій пластинці з нижнього боку. Остюки білого кольору з слабким антоціаном. Остюки на верхівці колосу довші самого колосу. Соломина має помірний восковий наліт на верхньому міжвузлі та слабке опушення верхнього вузла. Колос середньої довжини, пірамідальної форми, середньої щільності, слабо забарвлений при достиганні і має сильний восковий наліт. Зернівка видовжена з коротким чубчиком. Нижня колоскова луска видовжена, плече скошене з наявністю другої вершини, вузьке, зубець ледь зігнутий, короткий.

Висота рослин 73 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування середня, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,2 бала. Стійкість сорту до вилягання 8,7-8,8 бала. Стійкість до осипання 8,4-9,0 бала. Стійкість до посухи 8,1 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Ранньостиглий, достигає за 270-280 діб.
Середня врожайність за роки випробування у зоні Степу 59,8 ц/га, Лісостепу 51,4 ц/га . Прибавка до національного стандарту в зоні Степу 0,7 ц/га, Лісостепу — 2,3 ц/га. Маса 1000 зерен 42,8-43,2 г. Зерно містить 14,3% білка. Загальна оцінка макаронів 8,0-8,5 бала.

Пшениця тверда яра

05008006 Жізель

Заявник: **Миронівський інститут пшениці ім. В.М. Ремесла Української академії аграрних наук**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Тип розвитку ярий. Кущ напівпрямостоячий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок має помірний восковий наліт на нижньому боці листкової пластинки і дуже слабке, або відсутнє антоціанове забарвлення. Соломина слабко виповнена з слабким восковим нальотом на верхньому міжвузлі та слабким опушенням верхнього вузла. Колос білий або солом'яно-жовтий, слабко забарвлений, циліндричної форми, щільний із наявними остюками, які розміщені по всій довжині колосу. Остюки на верхівці колосу довші відносно колосу, світлокоричневого кольору. Нижня колоскова луска видовжена, плече піднесене та вузьке, зубець ледь зігнутой і короткий, опушення зовнішньої поверхні - відсутнє. Зернівка яйцеподібна, має чубчик короткий. Язичок - довгий, трикутний, вушка: охоплення соломини - неповне.

Висота рослин 100-106 см. Стійкість сорту до вилягання 7,0-8,0 бала. Стійкість до осипання 8,0-9,0 бала. Стійкість до посухи 8,6-8,9 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньоранній, достигає за 95-100 діб.
Середня врожайність за роки випробування у зоні Лісостепу 42,1 ц/га, Полісся 40,8 ц/га . Прибавка до національного стандарту в зоні Полісся 2,9 ц/га. Маса 1000 зерен 44,3-45,6 г. Зерно містить 13,9-14,4% білка, загальна оцінка макарон 8,5 бала.

05008007 Нащадок

Заявник: **Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Тип розвитку ярий. Кущ напівпрямостоячий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок має слабкий восковий наліт на нижньому боці листкової пластинки і дуже слабке, або відсутнє антоціанове забарвлення. Соломина помірно виповнена з слабким восковим нальотом на верхньому міжвузлі та відсутнім або дуже слабким опушенням верхнього вузла. Колос червоний, слабко забарвлений, циліндричної форми, щільний із наявними остюками, які розміщені по всій довжині колосу. Остюки на верхівці колосу довші відносно колосу, світлокоричневого кольору. Нижня колоскова луска видовжена, плече піднесене та середньої ширини, зубець ледь зігнутой і середньої довжини, опушення зовнішньої поверхні - наявне. Зернівка видовжена, має чубчик короткий. Язичок - середній, кільцевий, вушка: охоплення соломини - повне.

Висота рослин 83-106 см. Стійкість сорту до вилягання 7,2-8,3 бала. Стійкість до осипання 8,2-8,9 бала. Стійкість до посухи 7,0-8,5 бала. За роки

випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньоранній, достигає за 97-102 доби. Середня врожайність за роки випробування у зоні Степу 27,4 ц/га, Лісостепу 43,4 ц/га, Полісся 41,6 ц/га. Прибавка до національного стандарту в зоні Степу 1,1 ц/га, Лісостепу — 0,5 ц/га,Полісся — 3,7 ц/га. Маса 1000 зерен 40,5-44,4 г. Зерно містить 14,2-15,7% білка, загальна оцінка макарон 8,5-9,0 бала.

Жито озиме

04003004 Купалинка

Заявник: **Республіканське унітарне підприємство"Науково-практичний центр Націоенальної академії наук Білорусі по землеробству"**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Тип розвитку – озимий. Рослина - диплоїд, середня за висотою, форма куща напіврозлога. Колеоптиле короткий за довжиною із слабким антоціановим забарвленням. Прапорцевий листок із короткою піхвою, яка має помірний восковий наліт та короткою листковою пластинкою. Підпрапорцевий листок має середньої довжини та ширини листкову пластинку. Соломина має коротку відстань між верхнім вузлом і колосом та слабке опушення під колосом. Колос короткий, нещільний, має похиле положенням в просторі та помірний сизий наліт. Зернівка середньої довжини із світлим забарвленням алейронового шару.

Середня урожайність сорту за роки випробування в зоні Степу 51,3 ц/га. Гарантована прибавка 3,5 ц/га. Вегетаційний період 270 днів. Сорт в цій зоні стійкий до хвороб борошнистої роси, снігової плісняви. Стійкість до вилягання 7,9 балів, осипання 7,9 балів, засухи 7,5 балів. Число падіння 213. Вміст білку 9,9%. Середня урожайність сорту за роки випробування в зоні Лісостепу 50,1 ц/га. Гарантована прибавка 0,2 ц/га. Вегетаційний період 289 днів. Сорт стійкий до хвороб борошнистої роси, бурої іржі, снігової плісняви. Стійкий до вилягання, осипання. Число падіння 202. Вміст білку 9,8%. Сорт відноситься до вищесередньої і підвищеної групи зимостійкості. Добрі результати дає при внесенні повного мінерального живлення. Агротехніка звичайна для зон вирощування.

05003002 Слобожанець F1

Заявник: **Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Тип розвитку – озимий. Рослина - диплоїд, низька, форма куща напівпрямостояча. Колеоптиле короткий за довжиною із слабким антоціановим забарвленням. Прапорцевий листок із короткою піхвою, яка має помірний восковий наліт та короткою листковою пластинкою. Підпрапорцевий листок має середньої довжини та вузьку листкову пластинку. Соломина має коротку відстань між верхнім вузлом і колосом та помірне опушення під колосом. Колос середньої довжини, середньої щільності, має напівпохиле положенням в просторі та помірний сизий наліт. Зернівка середньої довжини із світлим забарвленням алейронового шару.

Середня урожайність сорту за роки випробування в зоні Степу 49,1 ц/га., гарантована прибавка 1,3 ц/га. Вегетаційний період 269 днів. Сорт в цій зоні стійкий до хвороб борошнистої роси, снігової плісняви. Стійкий до вилягання, осипання. Число падіння 238. Вміст білку 10,8%. Середня урожайність сорту за роки випробування в зоні Лісостепу 53,3 ц/га. Гарантована прибавка 3,3 ц/га. Вегетаційний період 280 днів. Сорт стійкий до хвороб, борошнистої роси, бурої іржі, снігової плісняви. Стійкий до осипання, засухи. Число падіння 222. Вміст білку 9,4 %. Сорт відноситься до вищесередньої і підвищеної групи зимостійкості. Добрі результати дає при внесенні повного мінерального живлення. Агротехніка звичайна для зон вирощування.

Тритикале озиме

04011008 Валентин 90

Заявник: Державна наукова установа Краснодарський науково-дослідний інститут сільського господарства ім. П.П. Лук'яненка

Власник(и):

Підтримувач(і):

Тип розвитку — озимий. Рослини низькі, кущ — напівпрямий. Прапорцевий листок: мало рослин з похилим прапорцевим листком, антоціанове забарвлення вушок слабке, сизий восковий наліт на піхві – сильний, листкова пластинка коротка та середньої ширини. Остюки: антоціанове забарвлення слабке, довжина відносно колосу — короткі. Соломина середньовиповнена з помірним опушенням на верхньому міжвузлі. Колос: білий, середньої щільності, широкий та довгий, пірамідальної форми з напівпониклим положенням в просторі. Вісь колосу — гнучка. Нижня колоскова луска: кільовий зубець короткий, другий зубець малий. Колосок має середню кількість плідних квіток. Зернівка жовто-біла, крупна, видовжена, слабкозморшкувата.

Висота рослин 102-103 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування підвищена, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,6-8,7 бала. Стійкість сорту до вилягання 7,9-8,4 бала. Стійкість до осипання 8,8-9,0 бала. Стійкість до посухи 8,1-8,4 бала. За роки випробування сорт слабо вражався основними хворобами та шкідниками. Середньостиглий, достигає за 280-295 діб.
Середня врожайність за роки випробування у зоні Лісостепу 64,7 ц/га, Полісся 52,5 ц/га . Прибавка до національного стандарту в зоні Лісостепу 9,6 ц/га, Полісся — 3,9 ц/га. Маса 1000 зерен 45,4-46,5 г. Зерно містить 12,6-13,0% білка.

04011001 Інтерес

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Насіння Луганщини"

Власник(и):

Підтримувач(і):

Тип розвитку — озимий. Рослини низькі, кущ — прямий. Прапорцевий листок: середня кількість рослин з похилим прапорцевим листком, антоціанове забарвлення вушок слабке, сизий восковий наліт на піхві – сильний, листкова пластинка середньої довжини та вузька. Остюки: антоціанове забарвлення відсутнє або дуже слабке, довжина відносно колосу — короткі. Соломина порожниста з слабким опушенням на верхньому міжвузлі. Колос: білий, нещільний, середньої довжини та вузький, циліндричної форми з напівпониклим положенням в просторі. Вісь колосу — гнучка. Нижня колоскова луска: кільовий зубець середній,другий зубець середній. Колосок має середню кількість плідних квіток. Зернівка жовто-біла, крупна, видовжена, зморшкувата.

Рослини заввишки 96-106 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування підвищена, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,6-8,8 бала. Стійкість сорту до вилягання 8,0-9,0 бала. Стійкість до осипання 8,8-9,0 бала. Стійкість до посухи 7,7-8,6 бала. За роки випробування сорт слабо вражався основними хворобами та шкідниками. Середньоранній, достигає за 274-290 діб.
Середня врожайність за роки випробування у зоні Степу 54,7 ц/га, Лісостепу 60,6 ц/га, Полісся 54,2 ц/га. Прибавка до національного стандарту в зоні Степу 1,0 ц/га, Лісостепу — 5,5 ц/га, Полісся — 5,6 ц/га. Маса 1000 зерен 42,4-45,9 г. Зерно містить 13,3-13,7% білка.

04011010 Пурпурний

Заявник: Селянсько фермерське господарство " Родень 10"

Власник(и):

Підтримувач(і):

Тип розвитку — озимий. Рослини низькі, кущ — напівпрямий. Прапорцевий листок: середня кількість рослин з похилим прапорцевим листком,

антоціанове забарвлення вушок помірне, сизий восковий наліт на піхві – сильний, листкова пластинка коротка та середньої ширини. Остюки: антоціанове забарвлення помірне, довжина відносно колосу — середні. Соломина середньовиповнена з помірним опушенням на верхньому міжвузлі. Колос: сіро-димчастий, середньої щільності, довгий та середньої ширини, циліндричної форми з напівпониклим положенням в просторі. Вісь колосу — гнучка. Нижня колоскова луска: кільовий зубець короткий, другий зубець відсутній або дуже малий. Колосок має середню кількість плідних квіток. Зернівка жовто-біла, крупна, видовжена, слабкозморшкувата.

Висота рослин 102-104 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування вищесередня, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,6-8,8 бала. Стійкість сорту до вилягання 7,7-8,2 бала. Стійкість до осипання 8,9-9,0 бала. Стійкість до посухи 8,5 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньостиглий, достигає за 280-292 доби.
Середня врожайність за роки випробування у зоні Лісостепу 57,4 ц/га, 51,1 ц/га . Прибавка до національного стандарту в зоні Лісостепу 2,3 ц/га, Полісся 2,5 ц0/га. Маса 1000 зерен 48,4-50,2 г. Зерно містить 13,6-13,9% білка.

04011004 Раритет

Заявник: **Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Тип розвитку — озимий. Рослини низькі, кущ — напіврозлогий. Прапорцевий листок: середня кількість рослин з похилим прапорцевим листком, антоціанове забарвлення вушок слабке, сизий восковий наліт на піхві – сильний, листкова пластинка середньої довжини та середньої ширини. Остюки: антоціанове забарвлення слабке, довжина відносно колосу — середні. Соломина порожниста з помірним опушенням на верхньому міжвузлі. Колос: білий, щільний, довгий та середньої ширини, циліндричної форми з пониклим положенням в просторі. Вісь колосу — гнучка. Нижня колоскова луска: кільовий зубець короткий, другий зубець малий. Колосок має середню кількість плідних квіток. Зернівка жовто-біла, крупна, видовжена, слабкозморшкувата.

Висота рослин 111-112 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування вищесередня, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,6-8,8 бала. Стійкість сорту до вилягання 7,5-8,2 бала. Стійкість до осипання 8,8-9,0 бала. Стійкість до посухи 8,4-8,5 бала. За роки випробування сорт слабо вражався основними хворобами та шкідниками. Середньостиглий, достигає за 279-292 доби.
Середня врожайність за роки випробування у зоні Лісостепу 60,9 ц/га, Полісся 53,5 ц/га . Прибавка до національного стандарту в зоні Лісостепу 5,8 ц/га, Полісся — 4,9 ц/га. Маса 1000 зерен 44,7-46,3 г. Зерно містить 12,6-13,6% білка.

Тритикале яре

05011006 Вересоч

Заявник: **Національний аграрний університет**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Тип розвитку — ярий. Рослини низькі, форма куща — напівпрямий. Прапорцевий листок: відсутні або дуже мало рослин з похилим прапорцевим листком, антоціанове забарвлення вушок відсутнє або дуже слабке, сизий восковий наліт на піхві – слабкий, листкова пластинка середньої довжини та середньої ширини. Остюки: антоціанове забарвлення слабке, довжина відносно колосу — середні. Соломина порожниста з дуже сильним опушенням на верхньому міжвузлі. Колос: сіро-димчастий, середньої щільності, середньої довжини та середньої ширини, пірамідальної форми з пониклим положенням в просторі. Вісь колосу — гнучка. Нижня колоскова луска — кільовий зубець середній, другий зубець відсутній або дуже малий. Колосок має середню кількість плідних квіток. Зернівка світло-коричнева, крупна, видовжена, слабко-зморшкувата.

Висота рослин 95 см. Стійкість сорту до вилягання 8,1 бала. Стійкість до осипання 8,7 бала. Стійкість до посухи 8,5 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньостиглий, достигає за 102 доби.
Середня врожайність за роки випробування в зоні Полісся 42,7 ц/га. Прибавка до національного стандарту 2,9 ц/га. Маса 1000 зерен 42,9 г. Зерно містить 12,3% білка.

04011007 Легінь харківський

Заявник: **Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Тип розвитку — ярий. Рослини низькі, форма куща — напівпрямий. Прапорцевий листок: середня кількість рослин з похилим прапорцевим листком, антоціанове забарвлення вушок помірне, сизий восковий наліт на піхві – помірний, листкова пластинка довга та вузька. Остюки: антоціанове забарвлення слабке, довжина відносно колосу — середні. Соломина середньо-виповнена з сильним опушенням на верхньому міжвузлі. Колос: білий, середньої щільності, середньої довжини та вузький, пірамідальної форми з напівпониклим положенням в просторі. Вісь колосу — гнучка. Нижня колоскова луска — кільовий зубець довгий, другий зубець малий. Колосок має середню кількість плідних квіток. Зернівка світло-коричнева, крупна, видовжена, слабко-зморшкувата.

Висота рослин 108 см. Стійкість сорту до вилягання 7,4 бала. Стійкість до осипання 8,9 бала. Стійкість до посухи 8,6 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньостиглий, достигає за 104 доби.
Середня врожайність за роки випробування у зоні Полісся 44,7 ц/га. Прибавка до національного стандарту 0,4 ц/га, гарантоване відхилення 4,3 ц/га. Маса 1000 зерен 43,3 г. Зерно містить 12,6% білка.

Овес ярий

04005004 Житомирський

Заявник: Державний вищий навчальний заклад "Державний агроекологічний університет"

Власник(и):

Підтримувач(і):

Рослина за габітусом напівпряма, середньої довжини, рослини із закрученими прапорцевими листками рідко зустрічаються, час викидання волоті – дуже ранній. На найнижчих листках опушеність листкової пластинки відсутня або дуже слабка. Опушеність на найвищому вузлі стебла помірна. Волоть: середньої довжини, орієнтація гілочок розкидиста, положення гілочок напівпряме, положення вторинних колосків поникле. Колоскові луски середньої довжини, сіруватість помірна. Первинне зерно: сіруватість нижньої квіткової луски – дуже слабка, тенденція до остистості відсутня або дуже слабка. Колір нижньої квіткової луски - коричневий. Первинне зерно: має короткі базальні волоски, та короткий стрижень другого зерна.

Тип розвитку - ярий . Різновидність - мутіка . Середньостиглий , вегетаційний період -102 дні . Стійкий до полягання , осипання та посухи . Урожайний . За роки випробування на обласних державних центрах експертизи сортів рослин отримали середній урожай - 50,9 ц / га , що на 2,2 ц / га більше стандартів . Вирівняність зерна 95 % , плівчастість - 26,3 % .Бактеріальним опіком , корончастою іржею уражувався від слабкого до середнього . Придатний для поширення зоні Полісся .

Ячмінь озимий

04012019 Сейм

Заявник: Миронівський інститут пшениці ім. В.М. Ремесла Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Тип розвитку - озимий. Рослини з напівпрямостоячим габітусом, низькі. Прапорцевий листок з слабким антоціановим забарвленням вушок та сильним восковим нальотом на піхві. Початок колосіння - ранній. Соломина - слабовиповнена. Остюки мають слабке антоціанове забарвлення на кінчиках і довші відносно колоса. Колос з відсутнім або дуже слабким восковим нальотом, з горизонтальним положенням в просторі, має більше двох рядів, циліндричної форми, щільний, середньої довжини. Стрижень колосу має середню довжину першого сегмента та помірний вигин. Зернівка має плівку, довгі волоски основної щетинки, слабке антоціанове забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски, відсутнє опушення вентральної боріздки, фронтальне розташування лодикул. Алейроновий шар зернівки білястий, форма видовжено-еліптична, поверхня тонкозморшкувата, опушення зовнішньої квіткової луски відсутнє. Вушка мають шилоподібну форму верхівки та перкриваюче охоплення соломини. Язичок - середній.

Середня урожайність сорту у зоні Степу за роки випробування 57,3 ц/га., гарантована прибавка 3,0 ц/га. Вегетаційний період 260 днів. Сорт стійкий до хвороб борошнистої роси, бурої іржі, та гельмінтоспоріозу. Стійкий до осипання, вилягання, та засухи. Вміст білку 13,0%. В зоні Полісся середня урожайність сорту 50,3 ц/га. Гарантована прибавка врожаю 0,5 ц/га. Вегетаційний період 275 днів. Сорт стійкий до хвороб, борошнистої роси, бурої іржі. Стійкий до осипання, та засухи. Вміст білку 13,6%. Сорт відноситься до середньонижчої і середньої групи зимостійкості. Добрі результати дає при внесенні повного мінерального живлення. Агротехніка звичайна для зон вирощування.

05012005 Сіндерелла

Заявник: Дойче Заатфеределунг Ліппштадт-Бремен ГмбХ

Власник(и):

Підтримувач(і):

Тип розвитку - озимий. Рослини з напівпрямостоячим габітусом, дуже низькі. Прапорцевий листок з сильним антоціановим забарвленням вушок та сильним восковим нальотом на піхві. Початок колосіння - ранній. Соломина - слабовиповнена. Остюки мають слабке антоціанове забарвлення на кінчиках і довші відносно колоса. Колос з помірним восковим нальотом, з горизонтальним положенням в просторі, має більше двох рядів, циліндричної форми, середньої довжини та щільності. Стрижень колосу має середню довжину першого сегмента та слабкий вигин. Зернівка має плівку, довгі волоски основної щетинки, слабке антоціанове забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски, наявне опушення вентральної боріздки, охплююче розташування лодикул. Алейроновий шар зернівки білястий, форма видовжено-еліптична, поверхня тонкозморшкувата, опушення зовнішньої квіткової луски відсутнє. Вушка мають шилоподібну форму верхівки та перкриваюче охоплення соломини. Язичок - короткий.

Середня урожайність сорту за роки випробування в зоні Степу 55,4 ц/га., гарантована прибавка 1,1 ц/га. Вегетаційний період 258 днів. Сорт в цій зоні стійкий до хвороб бурої іржі. Стійкий до осипання, вилягання. Вміст білку 12,0%. Середня урожайність сорту за роки випробування в зоні Лісостепу 56,2 ц/га., гарантована прибавка 1,4 ц/га. Вегетаційний період 269 днів. Сорт в цій зоні стійкий до хвороб борошнистої роси, бурої іржі, гельмінтоспоріозу. Стійкий до осипання, вилягання, засухи. Вміст білку 12,1%. Середня урожайність сорту за роки випробування в зоні Полісся 51,7 ц/га. Гарантована прибавка врожаю 1,9 ц/га. Вегетаційний період 268 днів. Сорт стійкий до хвороб борошнистої роси, бурої іржі. Стійкий до осипання, засухи, та вилягання. Вміст білку 12,5%. Сорт відноситься до нижчесередньої групи зимостійкості. Добрі результати дає при внесенні повного мінерального живлення. Агротехніка звичайна для зон вирощування.

Ячмінь ярий

04012020 Авгій

Заявник: **Миронівський інститут пшениці ім. В.М. Ремесла Української академії аграрних наук**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Тип розвитку - ярий. Кущ напівпрямостоячий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок – антоціанове забарвлення вушок дуже сильне, восковий наліт на піхві сильний. Початок колосіння – середній. Соломина - слабовиповнена. Остюки мають сильне антоціанове забарвлення на кінчиках і довші відносно колосу. Колос із відсутнім або дуже слабким восковим нальотом, горизонтальний, має два ряди, циліндричної форми, дуже нещільний та довгий. Стрижень колосу має довгий перший сегмент та помірний вигин. Зернівка з наявною плівкою, має короткі волоски основної щетинки, відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски, відсутнє опушення вентральної боріздки, фронтальне розташування лодикул. Алейроновий шар зернівки слабкозабарвлений, видовжено-еліптична, поверхня тонкозморшкувата, опушення зовнішньої квіткової луски відсутнє. Вушка мають шилоподібну форму верхівки та перекриваюче охоплення соломини. Язичок – середній.

Різновидність- нутанс . Середньостиглий , в умовах Лісостепу та Полісся дозріває за 89 - 98 днів . Сорт напівінтенсивного типу . В закладах експертизи за роки випробування отримали середній урожай 43,6 - 45,7 ц / га , що на 4,9 - 5,3 ц / га більше стандартів . Добрі результати дає при внесені повного мінерального живлення . Відноситься до сортів пивоварного призначення . Білка має 11,4 % , екстрактивність -80 % . Борошнистою росою , гельмінтоспоріозом уражується менше стандартів . Протруєння насіння препаратом Вітавакс 200 ФФ забезпечує повний захист рослин від хвороб і підвищення врожаїв . Рекомендований для поширення в зонах Лісостеп та Полісся .

06012005 Баланс

Заявник: **Хайленд Сидс Томпсонс ЛТД**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Тип розвитку - ярий. Кущ напівпрямостоячий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок – антоціанове забарвлення вушок слабке, восковий наліт на піхві сильний. Початок колосіння – ранній. Соломина - слабовиповнена. Остюки мають сильне антоціанове забарвлення на кінчиках і довші відносно колосу. Колос із відсутнім або дуже слабким восковим нальотом, напівпрямий, має більше двох рядів, циліндричної форми, середньої

довжини та щільності. Стрижень колосу має довгий перший сегмент та слабкий вигин. Зернівка з наявною плівкою, має короткі волоски основної щетинки, відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски, відсутнє опушення вентральної боріздки, фронтальне розташування лодикул. Алейроновий шар зернівки слабкозабарвлений, видовжено-еліптична, поверхня тонкозморшкувата, опушення зовнішньої квіткової луски відсутнє. Вушка мають загострену форму верхівки та перекриваюче охоплення соломини. Язичок – середній.

Середньостиглий , вегетаційний період 84 - 96 днів . Сорт інтенсивного типу . Добре реагує на повне мінеральне живлення . За даними заявника рекомендується висівати за 100 - відсоткової господарської придатності - 4 - 4,5 млн / га насінин . Дуже реагує на запізнення із сівбою . Агротехніка звичайна для зони вирощування . За роки випробування на державних сортодослідних станціях отримали середній урожай - 47,1 - 53,2 ц / га , що на 8,8 - 12,1 ц / га більше стандартів . Потенційна можливість сорту -90 ц / га . Стійкий проти вилягання , осипання . Посухостійкість середня . Пивоварні якості добрі . Білка має 11,5 % .Борошнистою росою уражується на рівні стандартів . Придатний для поширення в зонах Лісостеп та Полісся .

06012006 Брюсефілд

Заявник: **Хайленд Сидс Томпсонс ЛТД**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Тип розвитку – ярий. Кущ напівпрямостоячий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок – антоціанове забарвлення вушок дуже слабке, восковий наліт на піхві сильний. Початок колосіння – ранній. Соломина - слабовиповнена. Остюки мають помірне антоціанове забарвлення на кінчиках і довші відносно колосу. Колос із відсутнім або дуже слабким восковим нальотом, прямий, має більше двох рядів, циліндричної форми, середньої щільності та довжини. Стрижень колосу має середньої довжини перший сегмент та відсутній або дуже слабкий вигин. Зернівка з наявною плівкою, має короткі волоски основної щетинки, відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски, відсутнє опушення вентральної боріздки, охоплююче розташування лодикул. Алейроновий шар зернівки слабкозабарвлений, видовжено-еліптична, поверхня тонкозморшкувата, опушення зовнішньої квіткової луски відсутнє. Вушка мають загострену форму верхівки та перекриваюче охоплення соломини. Язичок – середній.

Середньостиглий , вегетаційний період 96 днів . Сорт інтенсивного типу . Добре реагує на внесення мінеральних добрив .За роки випробування на обласних державних центрах експертизи сортів рослин отримали середній урожай 53,8 ц \ га , що на 13 ц / га більше стандартів . Потенційна можливість сорту 95 ц \ га . Запізнення із сівбою на 5 - 10 днів призводить до значного недобору врожаю .Агротехніка звичайна для зони вирощування . Стійкий до полягання , осипання .Білка має 13 - 14 % . На рівні стандартів пошкоджується листостеблевими хворобами , стійкий до летючої сажки . Рекомендований для поширення в зоні Полісся .

04012018 Виклик

Заявник: **Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Тип розвитку - ярий. Кущ напівпрямостоячий, рослини низькі. Прапорцевий листок – антоціанове забарвлення вушок слабке, восковий наліт на піхві помірний. Початок колосіння – середній. Соломина - слабовиповнена. Остюки мають сильне антоціанове забарвлення на кінчиках і довші відносно колосу. Колос із відсутнім або дуже слабким восковим нальотом, прямий, має два ряди, циліндричної форми, нещільний та довгий. Стрижень колосу має довгий перший сегмент та слабкий вигин. Зернівка з наявною плівкою, має довгі волоски основної щетинки, відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски, відсутнє опушення вентральної боріздки, охоплююче розташування лодикул. Алейроновий шар зернівки слабкозабарвлений, еліптична, поверхня тонкозморшкувата, опушення зовнішньої квіткової луски відсутнє. Вушка мають загострену форму верхівки та перекриваюче охоплення соломини. Язичок – середній.

Середньоранній , вегетаційний період 88 - 98 днів .Сорт напівінтенсивного типу . В закладах експертизи за роки випробування отримали середній

урожай - 45,6 - 51,2 ц / га , що на 7,3 - 10,4 ц / га більше стандартів . Стійкий до полягання , осипання . Добрі результати дає при внесені повного мінерального живлення . Відноситься до сортів пивоварного призначення . Білка має 10,6 - 11,7 % . Рекомендований для поширення в зонах Лісостеп та Полісся .

04012008 Ебсон

Заявник: **Осева Ексімпо Прага с.р.о.**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Тип розвитку - ярий. Кущ напівпрямостоячий, рослини низькі. Прапорцевий листок – антоціанове забарвлення вушок помірне, восковий наліт на піхві помірний. Початок колосіння - середній. Соломина - слабовиповнена. Остюки мають помірне антоціанове забарвлення на кінчиках і довші відносно колосу. Колос із відсутнім або дуже слабким восковим нальотом, напівпрямий, має два ряди, циліндричної форми, нещільний та середньої довжини. Стрижень колосу має короткий перший сегмент та слабкий вигин. Зернівка з наявною плівкою, має довгі волоски основної щетинки, відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски, відсутнє опушення вентральної боріздки, охоплююче розташування лодикул. Алейроновий шар зернівки сильно забарвлений, форма ромбічна, поверхня тонкозморшкувата, опушення зовнішньої квіткової луски відсутнє. Вушка мають загострену форму верхівки та перекриваюче охоплення соломини. Язичок – середній.

Середньостиглий , вегетаційний період 90 - 97 . Рослини висотою - 73 см . Сорт стійкий проти полягання , осипання . Посухостійкість вище середрьої Сорт інтенсивного типу . За даними заявника рекомендується висівати за 100 - відсоткової господарської придатності -4- 4,5 млн / га схожих насінин . За роки випробування в закладах експертизи отримали середній урожай - 49,9 - 50,3 ц / га . Запізнення із сівбою на 5 -10 днів призводить до значного недобору врожаю . Потенційна можливість сорту - 105 Ц / га . Пивоварні якості добрі . Білка має 11,3 % , плвчастість - 8-9 % , екстрактивних речовин - 82 % . Вирівняність зерна складає - 96 % . Індекс пивоварної цінності 98 . Стійкий для поширення в ззонах Лісостепу та Полісся .

05012011 Еней

Заявник: **Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Тип розвитку - дворучка (альтернативний). Кущ напівпрямостоячий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок – антоціанове забарвлення вушок помірне, восковий наліт на піхві помірний. Початок колосіння – середній. Соломина - слабовиповнена. Остюки мають сильне антоціанове забарвлення на кінчиках і довші відносно колосу. Колос із відсутнім або дуже слабким восковим нальотом, горизонтальний, має два ряди, циліндричної форми, середньої довжини та нещільний. Стрижень колосу має короткий перший сегмент та великий вигин. Зернівка з наявною плівкою, має довгі волоски основної щетинки, відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски, відсутнє опушення вентральної боріздки, охоплююче розташування лодикул. Алейроновий шар зернівки слабкозабарвлений, еліптична, поверхня тонкозморшкувата, опушення зовнішньої квіткової луски відсутнє. Вушка мають шилоподібну форму верхівки та перекриваюче охоплення соломини. Язичок – середній.

Рослини висотою 75 - 80 см .Середньоранній , дозріває за 80 - 94 дні , що на 3 -4 дні раніше стандартів . Зерно велике , жовте .Маса 1000 насінин - 45,6 г . Сорт інтенсивного типу . Високоадаптований для будь - яких умов вирощування , має підвищену посухостійкість .Добрі результата дає при внесені повного мінерального живлення . Слабко уражується гельмінтоспоріозом і твердою сажкою . В закладах експертизи за роки випробування отримали середній урожай 54,5 - 55,7 ц / га , що на 13,7 - 17,4 ц / га більше стандартів . Протруєння насіння перед сівбою Вітаваксом 200 ФФ забезпечує повний захист рослин від хвороб і підвищення врожаю . Рекомендований для поширення в зонах Степ , Лісостеп та Полісся .

04012002 Максим

Заявник: Науково-виробниче товариство з обмеженою відповідальністю "Агро-Інтер"

Власник(и):

Підтримувач(і):

Тип розвитку - ярий. Кущ напівпрямостоячий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок - антоціанове забарвлення вушок слабке, восковий наліт на піхві помірний. Початок колосіння - середній. Соломина - слабовиповнена. Остюки мають помірне антоціанове забарвлення на кінчиках і довші відносно колосу. Колос із відсутнім або дуже слабким восковим нальотом, горизонтальний, має два ряди, циліндричної форми, середньої довжини та нещільний. Стрижень колосу має середньої довжини перший сегмент та помірний вигин. Зернівка з наявною плівкою, має довгі волоски основної щетинки, помірне антоціанове забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски, відсутнє опушення вентральної боріздки, охоплююче розташування лодикул. Алейроновий шар зернівки білястий, форма видовжено-еліптична, поверхня тонкозморшкувата, опушення зовнішньої квіткової луски відсутнє. Вушка мають загострену форму верхівки та перекриваюче охоплення соломини. Язичок – середній.

Солома середньої довжини - 90 см . Середньостиглий , вегетаційний період - 95 днів . За даними заявника рекомендується висівати за 100 - відсоткової господарської придатності 4,5 - 5 млн / га насінин . Запізнення із сівбою на 5 - 10 днів призводить до недобору врожаю до 7,5 ц / га .На обласних державних центрах експертизи сортів рослин за роки випробування отримали середній урожай - 44,4 ц / га , що на 6,1 ц / га більше стандартів . Сорт має комплексну стійкість до більшості поширених в Україні хвороб : летючої , кам"яної та чорної сажок , борошнистої роси . Посухостійкий , що дає можливість формувати пивоварне зерно навіть в умовах нетривалої посухи .Рекомендований для поширення в зонах Степ , Лісостеп , Полісся .

04012010 Маурітія

Заявник: Лохов-Петкус ГмбХ

Власник(и):

Підтримувач(і):

Тип розвитку - ярий. Кущ напівпрямостоячий, рослини низькі. Прапорцевий листок – антоціанове забарвлення вушок помірне, восковий наліт на піхві сильний. Початок колосіння – пізній. Соломина - слабовиповнена. Остюки мають сильне антоціанове забарвлення на кінчиках і довші відносно колосу. Колос із відсутнім або дуже слабким восковим нальотом, прямий, має два ряди, циліндричної форми, нещільний та середньої довжини. Стрижень колосу має короткий перший сегмент та слабкий вигин. Зернівка з наявною плівкою, має короткі волоски основної щетинки, відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски, відсутнє опушення вентральної боріздки, охоплююче розташування лодикул. Алейроновий шар зернівки слабкозабарвлений, еліптична, поверхня тонкозморшкувата, опушення зовнішньої квіткової луски відсутнє. Вушка мають шилоподібну форму верхівки та перекриваюче охоплення соломини. Язичок – короткий.

Середньостиглий , дозріває за 99 днів . Особливістю сорту є те , що він відрізняється тійкістю до весняних заморозків , високим температурам . Сорт інтенсивного типу . Добре реагує на внесення мінеральних добрив . На обласних державних центрах експертизи сортів рослин за роки випробування отримали середній урожай 48,8 ц / га , що на 8 ц / га більше стандартів . Відноситься до сортів пивоварного призначення . Білка має 11 % ,екстрактивність речовин 80 % . Стійкий до ураження бурою іржею . Рекомендований для поширення у зоні Полісся .

04012026 Набат

Заявник: Вінницька державна сільськогосподарська дослідна станція Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Тип розвитку - ярий. Кущ напівпрямостоячий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок – антоціанове забарвлення вушок сильне, восковий

наліт на піхві сильний. Початок колосіння - середній. Соломина - слабовиповнена. Остюки мають помірне антоціанове забарвлення на кінчиках і довші відносно колосу. Колос із відсутнім або дуже слабким восковим нальотом, горизонтальний, має два ряди, циліндричної форми, нещільний та довгий. Стрижень колосу має середньої довжини перший сегмент та помірний вигин. Зернівка з наявною плівкою, має довгі волоски основної щетинки, відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски, відсутнє опушення вентральної боріздки, охоплююче розташування лодикул. Алейроновий шар зернівки сильно забарвлений, форма еліптична, поверхня тонкозморшкувата, опушення зовнішньої квіткової луски відсутнє. Вушка мають загострену форму верхівки та перекриваюче охоплення соломини. Язичок – короткий.

Стебло міцне , завввишки 56 - 72 см . Середньопізній , дозріває за 96 - 98 днів . Сорт напівінтенсивного типу . Стійкий до посухи , полягання та осипання . За даними заявника рекомендується висівати за 100 - відсоткової господарської придатності - 4 - 4,5 млн / га насінин . Агротехніка звичайна для зони вирощування . Рекомендується протруювання насіння Вітаваксом 200 ФФ . За роки випробування в закладах експертизи отримали середній урожай - 40,8 - 45,6 ц / га , що на 4,8 - 8,8 ц / га більше стандартів .Потенційна можливість сорту - 85 ц / га . Відноситься до сортів пивоварного призначення . Білка має - 10,3 -11,3 % , екстрактивність - 80 % .Стійкий до борошнистої роси , гельмінтоспоріозу . Рекомендований для поширення в зонах Степу та Лісостепу .

03012009 Партнер

Заявник: **Донецький інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Тип розвитку - ярий. Кущ напівпрямостоячий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок - антоціанове забарвлення вушок дуже слабке, восковий наліт на піхві помірний. Початок колосіння - ранній. Соломина - слабовиповнена. Остюки мають помірне антоціанове забарвлення на кінчиках і довші відносно колосу. Колос із слабким восковим нальотом, напівпрямий, має два ряди, циліндричної форми, середньої довжини та щільності. Стрижень колосу має короткий перший сегмент та сильний вигин. Зернівка з наявною плівкою, має довгі волоски основної щетинки, відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски, відсутнє опушення вентральної боріздки, охоплююче розташування лодикул. Алейроновий шар зернівки слабо забарвлений, форма еліптична, поверхня тонкозморшкувата, опушення зовнішньої квіткової луски відсутнє. Вушка мають шилоподібну форму верхівки та перекриваюче охоплення соломини. Язичок – середній.

Рослини висотою 66 см . Середньостиглий , вегетаційний період 93 дні . Насіння еліптично - видовжене . Маса 1000 насінин 48,1 г . В закладах експертизи отримали середній урожай 39,5 ц / га , що на 7,5 ц / га більше стандартів .За даними заявника рекомендується висівати за 100 - відсоткової господарської придатності 4 - 4,5 млн / га насінин . Посухостійкий . Борошнистою росою , бурою іржею , гельмінтоспоріозом та летючою сажкою уражується нижче стандартів . Протруєння насіння препаратом Вітавакс 200 ФФ забезпечує повний захист рослин від хвороб . Рекомендований для поширення в зоні Степу .

04012022 Парнас

Заявник: **Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Тип розвитку - ярий. Кущ напівпрямостоячий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок – антоціанове забарвлення вушок помірне, восковий наліт на піхві сильний. Початок колосіння - середній. Соломина - слабовиповнена. Остюки мають дуже сильне антоціанове забарвлення на кінчиках і довші відносно колосу. Колос із відсутнім або дуже слабким восковим нальотом, горизонтальний, має два ряди, циліндричної форми, середньої довжини та щільності. Стрижень колосу має середньої довжини перший сегмент та великий вигин. Зернівка з наявною плівкою, має короткі волоски основної щетинки, відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски, відсутнє опушення вентральної боріздки, охоплююче розташування лодикул. Алейроновий шар зернівки слабко забарвлений, форма видовжено-еліптична, поверхня тонкозморшкувата, опушення зовнішньої квіткової луски відсутнє. Вушка мають загострену форму верхівки та перекриваюче охоплення соломини. Язичок – середній.

Рослини висотою - 59 - 77 см . Середньостиглий , вегетаційний період - 88- 94 дні . Напівінтенсивного типу . В закладах експертизи за роки випробування отримали середній урожай - 39,7 - 45,3 ц / га , що на 7,0 - 7,6 ц / га більше стандартів . Сорт має високу посухостійкість , стійкий до полягання та осипання . Добре реагує на внесення мінеральних добрив . Стійкий до полягання та осипання . Добре реагує на внесення мінеральних добрив . За даними заявника рекомендується висівати за 100 - відсоткової господарської придатності - 4 -4,5 млн / га насінин . Запізнення із сівбою на 5 -10 днів призводить до значного недобору врожаю та погіршення якості зерна . Пивоварений . Білка має - 11,5 % , екстрактивних речовин - 79 - 80 % . Стійкий до борошнистої роси . Рекомендований для поширення у зонах Степ та Лісостеп .

04012013 Ростенций

Заявник: **Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича агрокорпорація "Степова"**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Тип розвитку - ярий. Кущ напівпрямостоячий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок – антоціанове забарвлення вушок слабке, восковий наліт на піхві помірний. Початок колосіння - середній. Соломина - слабовиповнена. Остюки мають помірне антоціанове забарвлення на кінчиках і довші відносно колосу. Колос із відсутнім або дуже слабким восковим нальотом, напівпрямий, має два ряди, циліндричної форми, довгий та дуже нещільний. Стрижень колосу має середньої довжини перший сегмент та помірний вигин. Зернівка з наявною плівкою, має довгі волоски основної щетинки, відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски, відсутнє опушення вентральної боріздки, охоплююче розташування лодикул. Алейроновий шар зернівки сильно забарвлений, форма видовжено-еліптична, поверхня тонкозморшкувата, опушення зовнішньої квіткової луски відсутнє. Вушка мають шилоподібну форму верхівки та перекриваюче охоплення соломини. Язичок – середній.

Середньостиглий , достигає за 86 -94 дні , що на 2 - 3 дні раніше стандартів . Сорт інтенсивного типу . Добрі результати дає при внесені повного мінерального живлення .Пластичний , стійкий до посухи , полягання та осипання .Краще стандартів використовує осадки другої половини вегетації . За даними заявника рекомендується висівати за 100 - відсоткової господарської придатності - 4 -4,5 млн / га насінин . Урожайний . На обласних державних центрах експертизи сортів рослин за роки випробування отримали середній урожай - 47,6 ц / га , що на 10,6 ц / га більше стандартів . Відноситься до сортів пивоварного призначення . Білка має - 11,3 % , екстрактивних речовин - 79 - 81 % . Стійкий до борошнистої роси , гельмінтоспоріозу .Рекомендований для поширення у зонах Степ , Лісостеп ,Полісся .

04012009 Созонівський

Заявник: **Кіровоградський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Тип розвитку - ярий. Кущ напівпрямостоячий, рослини низькі. Прапорцевий листок – антоціанове забарвлення вушок слабке, восковий наліт на піхві помірний. Початок колосіння – дуже ранній. Соломина - слабовиповнена. Остюки мають помірне антоціанове забарвлення на кінчиках і довші відносно колосу. Колос із відсутнім або дуже слабким восковим нальотом, прямий, має два ряди, циліндричної форми, нещільний та середньої довжини. Стрижень колосу має середньої довжини перший сегмент та помірний вигин. Зернівка з наявною плівкою, має довгі волоски основної щетинки, відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски, відсутнє опушення вентральної боріздки, охоплююче розташування лодикул. Алейроновий шар зернівки білястий, видовжено-еліптична, поверхня тонкозморшкувата, опушення зовнішньої квіткової луски відсутнє. Вушка мають шилоподібну форму верхівки та перекриваюче охоплення соломини. Язичок – середній.

Рослини висотою 85 - 87 см .Сорт напівінтенсивного типу . Середньостиглий , вегетаційний період - 86 -96 днів . В закладах експертизи за роки випробування отримали середній урожай - 46,1 - 47,8 ц / га , що на 7,0 - 7,8 ц / га більше стандартів . Борошнистою росою , гельмінтоспоріозом уражується менше стандартів . Перед посівом рекомендується протруювати насіння препаратом Вітавакс 200 ФФ . Рекомендований для поширення в зонах Лісостеп та Полісся .

04012025 Серпанок

Заявник: Селянсько фермерське господарство " Родень 10"

Власник(и):

Підтримувач(і):

Тип розвитку - ярий. Кущ напіврозлогий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок – антоціанове забарвлення вушок помірне, восковий наліт на піхві помірний. Початок колосіння – середній. Соломина - слабовиповнена. Остюки мають помірне антоціанове забарвлення на кінчиках і довші відносно колосу. Колос із відсутнім або дуже слабким восковим нальотом, горизонтальний, має два ряди, пірамідальної форми форми, нещільний та довгий. Стрижень колосу має середньої довжини перший сегмент та помірний вигин. Зернівка з наявною плівкою, має короткі волоски основної щетинки, слабке антоціанове забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски, відсутнє опушення вентральної боріздки, охоплююче розташування лодикул. Алейроновий шар зернівки слабкозабарвлений, видовжено-ромбічна, поверхня тонкозморшкувата, опушення зовнішньої квіткової луски відсутнє. Вушка мають загострену форму верхівки та перекриваюче охоплення соломини. Язичок – довгий.

Середньопізній , вегетаційний період - 98 - 100 днів . Сорт напівінтенсивного типу .За даними заявника рекомендується висівати за 100 - відсоткової господарської придатності 4 - 4,5 млн / га насінин . Агротехніка звичайна для зони вирощування . За роки випробування в закладах експертизи отримали середній урожай - 49,8 - 50,1 ц / га , що на 9,3 - 11,5 ц / га більше стандартів . Потенційна можливість сорту - 105 ц / га .Пивоварні якості добрі . Білка має 11,3 % . Стійкий до борошнистої роси , карликової іржі . Рекомендований для поширення в зоні для Полісся .

® 05012024 Себастьян

Заявник: Сейєт Плантефоредлінг І/С

Власник(и): Сейєт Плантефоредлінг І/С

Підтримувач(і):

Тип розвитку - ярий. Кущ напіврозлогий, рослини низькі. Прапорцевий листок – антоціанове забарвлення вушок сильне, восковий наліт на піхві сильний. Початок колосіння – середній. Соломина - слабовиповнена. Остюки мають помірне антоціанове забарвлення на кінчиках і довші відносно колосу. Колос із сильним восковим нальотом, прямий, має два ряди, пірамідальної форми, середньої довжини та щільності. Стрижень колосу має середньої довжини перший сегмент та помірний вигин. Зернівка з наявною плівкою, має довгі волоски основної щетинки, помірне антоціанове забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски, відсутнє опушення вентральної боріздки, охоплююче розташування лодикул. Алейроновий шар зернівки білястий, видовжено-еліптична, поверхня тонкозморшкувата, опушення зовнішньої квіткової луски відсутнє. Вушка мають загострену форму верхівки та перекриваюче охоплення соломини. Язичок – середній.

Рослини висотою 59 - 66 см . Середньостиглий , вегетаційний період 87 - 95 днів . Маса 1000 - насінин - 45 г .За даними заявника рекомендується висівати за 100 - відсоткової господарської придатності 4 - 4,5 млн / га насінин . Потенційна врожайність сорту 105 ц / га . Особливістю сорту є те , що він відрізняється підвищеною кущистістю та ранніми строками сівби . В закладах експертизи отримали середній урожай 50,1 - 51,2 ц / га , що на 10,4 - 11,8 ц / га більше стандартів . Відноситься до сортів пивоварного призначення . Білка має 10,7 - 11,5 % , екстрактивних речовин 80 - 82 % . Рекомендований для поширення у зонах Лісостеп та Полісся .

Кукурудза

05004028 МАС 20Ф

Заявник: **Маісадур Семанс**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - дуже сильне. Положення листкової пластинки в просторі пряме. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - ранній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - слабке. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - ранній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - дуже слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня (10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини проміжний, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - сильна.

Урожайність по зоні Лісостепу - 88,8 ц/га, гарантований приріст - 23,9 ц/га. Стійкість до засухи - 9 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті - 81 %. Вміст крохмалю - 76%, білка - 8 %.

04004111 Анжу 425

Заявник: **Лімагрейн Вернеуль Холдінг**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - помірне. Положення листкової пластинки в просторі похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла сильне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок слабке. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - дуже довга (понад 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана) - середня (від 8,1 до 10,0 см). Ніжка качана за довжиною - середня (10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини зубоподібний, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня помірна.

Урожайність по зоні Степу - 63,1 ц/га, Лісостепу - 90,3 ц/га, гарантований приріст відповідно 11,3 і 23,5 ц/га. Стійкість до засухи 8 і 9 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті 80-79 %. Вміст крохмалю 72-76%, білка 10 - 9 %.

05004020 Акселль

Заявник: **Маісадур Семанс**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка сильне. Положення листкової пластинки в просторі пряме. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла сильне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - ранній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок помірне. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - ранній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" дуже сильна. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана) - середня (від 8,1 до 10,0 см). Ніжка качана за довжиною - коротка (5,1 до 10 см). Качан за

формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (15-18 см). Тип зернини кременистоподібний, кількість зернових рядів мала, колір зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня дуже сильна.

Урожайність по зоні Лісостепу - 93,5 ц/га, гарантований приріст - 28,6 ц/га. Стійкість до засухи - 9 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті - 79 %. Вміст крохмалю - 77%, білка - 9 %.

05004030 Амеліор

Заявник: Маісадур Семанс

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка помірне. Положення листкової пластинки в просторі похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від дуже раннього до раннього. Волоть середньої щільності. Інтенсивність антоціанове забарвлення "шовку" помірне. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана) - вузька (від 6,1 до 8.0 см). Ніжка качана за довжиною - середня (від 10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини кременистоподібний, кількість зернових рядів мала, колір зернини - оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня сильне.

Урожайність по зоні Лісостепу - 96,1 ц/га, гарантований приріст - 31,2 ц/га. Стійкість до засухи - 8 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті - 78 %. Вміст крохмалю - 77%, білка - 9 %.

03004032 АДН 220 МВ

Заявник: Науково-виробниче підприємство "Агродніпро-насіння"

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка сильне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - ранній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок відсутнє або дуже слабке. Волоть щільна. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - ранній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана) - середня (від 8,1 до 10,0см). Ніжка качана за довжиною - середня (10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини жовто - оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня помірна.

Урожайність по зоні Степу - 73,0 ц/га, гарантований приріст - 22,8 ц/га. Стійкість до засухи - 7 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті - 79 %. Вміст крохмалю - 74 %, білка - 9 %.

05004068 Аматус

Заявник: КВС ЗААТ АГ

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка сильне. Положення листкової пластинки в просторі похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла сильне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - ранній. Волоть середньої щільності. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" сильна. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) -

довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана) - вузька (від 6,1 до 8 см). Ніжка качана за довжиною - середня (від 10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (15-18 см). Тип зернини кременистоподібний, кількість зернових рядів середня, колір зернини - жовто-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня дуже слабке.

Урожайність по зоні Лісостепу - 83,3 ц/га, Полісся - 87,8 ц/га, гарантований приріст відповідно 22,7 і 21,2 ц/га. Стійкість до засухи 9 і 8 балів, вилягання 9 і 8 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті 79 і 78 %. Вміст крохмалю 75 - 77%, білка - 10 і 8 %.

05004018 Армані

Заявник: **Маісадур Семанс**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - помірне. Положення листкової пластинки в просторі похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - відсутнє або дуже слабке. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення "шовку" - відсутнє. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - дуже довга (понад 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня (10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19-22). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - слабка.

Урожайність по зоні Лісостепу - 86,2 ц/га, гарантований приріст - 19,3 ц/га. Стійкість до засухи - 9 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті - 82 %. Вміст крохмалю 74-78%, білка 8 - 7 %.

06004042 Аттракт

Заявник: **Євраліс Семанс**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - від загостреної до округлої. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - сильне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - сильне. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - сильна. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня (10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (15 - 18 см). Тип зернини зубоподібний, кількість зернових рядів середня, колір зернини оранжевий, антоціанове забарвлення лусок стрижня - відсутнє.

Урожайність по зоні Лісостепу - 90,7 ц/га, гарантований приріст - 25,8 ц/га. Стійкість до засухи - 8 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті - 80,1 %. Вміст крохмалю - 76 %, білка - 9,3 %.

05004027 Арабіка

Заявник: **Маісадур Семанс**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка сильне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від дуже раннього до раннього. Інтенсивність антоціанове забарвлення "шовку" помірне. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10). Ніжка качана за довжиною - середня (від 10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини кременистоподібний, кількість зернових рядів середня, колір зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня помірна.

Урожайність по зоні Лісостепу - 83,5 ц/га, гарантований приріст - 18,7 ц/га. Стійкість до засухи - 9 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті - 77 %. Вміст крохмалю - 76%, білка - 9 %.

04004095 Апостолівський 310 ВС

Заявник: **Приватна виробнича фірма " Агроцентр"**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка помірне. Положення листкової пластинки в просторі похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок помірне. Волоть щільна. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення "шовку" відсутнє. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня (10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (15-18 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини жовто - оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня сильна.

Урожайність по зоні Степу - 67,7 ц/га, Лісостепу - 85,7 ц/га, гарантований приріст відповідно 15,9 і 18,9 ц/га. Стійкість до засухи 8 і 9 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті 81-78 %. Вміст крохмалю 71-77%, білка 10 - 8 %.

04004087 Барвінок МВ

Заявник: **Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка помірне. Положення листкової пластинки в просторі похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від пізнього до дуже пізнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок волоті за виключенням основи помірне. Волоть щільна. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) -середній. Інтенсивність антоціанове забарвлення "шовку" відсутня або дуже слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга від 151 до 200 см. Пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана) - середня від 8,1 до 10 см. Ніжка качана за довжиною - середня від 10,1 до 20 см. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (15 - 18 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовтий, низу зернини - оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня сильна.

Урожайність по зоні Лісостепу - 73,6 ц/га, гарантований приріст - 8,7 ц/га. Стійкість до засухи - 8 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті - 79 %. Вміст крохмалю - 76%, білка - 8 %.

05004095 Баксос

Заявник: **Р2н**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - від загостреної до округлої. Антоціанове забарвлення піхви першого листка сильне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Кут між листковою пластинкою і стеблом - середній (26-50). Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла сильне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - ранній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок відсутнє або дуже слабке. Волоть щільна. Бічні гілочки: за довжиною - середні, положення на нижній третині волоті - пряме, кількість первинних бічних гілочок на волоті - мала (від 5 до 15 шт.), головна вісь волоті за довжиною - середня. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - ранній. Антоціанове забарвлення "шовку" відсутнє. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) - дуже довга. Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня. Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній. Тип зернини зубоподібний, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, низу зернини - оранжевий, антоціанове забарвлення лусок стрижня помірне.

Урожайність по зоні Лісостепу - 83,4 ц/га, гарантований приріст - 22,8 ц/га. Стійкість до засухи - 8 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті - 81 %. Вміст крохмалю - 76%, білка - 8 %.

06004043 Бігстар

Заявник: **Євраліс Семанс**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - слабке. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - сильне. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від раннього до середнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - коротка (5,1 до 10 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (15 - 18 см). Тип зернини зубоподібний, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, колір низу зернини оранжевий, антоціанове забарвлення лусок стрижня - відсутнє.

Урожайність по зоні Лісостепу - 89,0 ц/га, гарантований приріст - 24,1 ц/га. Стійкість до засухи - 9 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті - 80,7 %. Вміст крохмалю - 75,7 %, білка - 9,3 %.

06004026 Бюрлі

Заявник: **Кассад Семанс**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка помірне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок відсутнє або дуже слабке. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від раннього до середнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" помірне. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - вузька (від 6,1 до 8,0 см). Ніжка качана за довжиною - коротка (5,1 до 10 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (15-18 см). Тип зернини проміжний, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, низу зернини - оранжевий, інтесивність антоціанового забарвлення лусок

стрижня слабка.

Урожайність по зоні Лісостепу - 84,9 ц/га, гарантований приріст - 20,0 ц/га. Стійкість до засухи - 8 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті - 80 %. Вміст крохмалю - 72 %, білка - 9 %.

05004060 Борозенський 277 МВ

Заявник: **Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича агрокорпорація "Степова"**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка слабке. Положення листкової пластинки в просторі похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла сильне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок відсутнє або дуже слабке. Волоть щільна. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення "шовку" відсутнє. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня (10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини зубоподібний, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня сильна.

Урожайність по зоні Лісостепу - 87,6 ц/га, гарантований приріст - 22,8 ц/га. Стійкість до засухи - 9 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті - 79 %. Вміст крохмалю - 76%, білка - 8 %.

05004060 Борозенський 277 МВ

Заявник: **Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка слабке. Положення листкової пластинки в просторі похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла сильне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок відсутнє або дуже слабке. Волоть щільна. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення "шовку" відсутнє. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня (10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини зубоподібний, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня сильна.

Урожайність по зоні Лісостепу - 87,6 ц/га, гарантований приріст - 22,8 ц/га. Стійкість до засухи - 9 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті - 79 %. Вміст крохмалю - 76%, білка - 8 %.

04004086 Витязь МВ

Заявник: **Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка помірне. Положення листкової пластинки в просторі похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок помірне. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від раннього до

середнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - вузька (від 6,1 до 8,0). Ніжка качана за довжиною - середня (10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (15-18). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини жовто - оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня слабка.

Урожайність по зоні Лісостепу - 79,5 ц/га, гарантований приріст - 12,7 ц/га. Стійкість до засухи - 9 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті - 77 %. Вміст крохмалю - 75 %, білка - 8 %.

05004044 Вимпел МВ

Заявник: **Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка сильне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок слабке. Волоть щільна. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня (10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня сильна.

Урожайність по зоні Лісостепу - 91,1 ц/га, гарантований приріст - 26,3 ц/га. Стійкість до засухи - 9 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті - 78 %. Вміст крохмалю - 74 %, білка - 8 %.

05004057 Вись 287 СВ

Заявник: **Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка від округлої до лопатоподібної. Антоціанове забарвлення піхви першого листка сильне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла сильне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок помірне. Волоть щільна. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" відсутнє або дуже слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня (10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (15-18 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини жовтий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня сильна.

Урожайність по зоні Лісостепу - 93,3 ц/га, гарантований приріст - 28,5 ц/га. Стійкість до засухи - 9 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті - 78 %. Вміст крохмалю - 74 %, білка - 8 %.

04004104 Водограй

Заявник: **Синельниківська селекційно-дослідна станція Інституту зернового господарства Української академії аграрних наук**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - від загостреної до округлої. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - помірне. Положення листкової пластинки в просторі похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла сильне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок волоті відсутнє або дуже слабке. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній. Інтенсивність антоціанове забарвлення "шовку" помірна. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга від 151 до 200 см. Пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана, см) - середня від 8,1 до 10 см. Ніжка качана за довжиною - середня від 10,1 до 20 см. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19 - 22 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня від 16 до 18, колір верхівки зернини - жовтий, низу зернини - оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня сильна.

Урожайність по зоні Лісостепу - 79,9 ц/га, гарантований приріст - 15,0 ц/га. Стійкість до засухи - 9 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті - 79 %. Вміст крохмалю - 72%, білка - 9 %.

05004080 Гифт 310 СВ

Заявник: **Науково- виробниче фермерське господарство "Компанія "Маїс"**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластинки в просторі пряме. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - сильне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - слабке. Волоть щільна. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - широка (від 10,1 до 12,0). Ніжка качана за довжиною - середня (10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня від 16 до 18 шт., колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - сильна.

Урожайність по зоні Лісостепу - 88,7 ц/га, гарантований приріст - 21,9 ц/га. Стійкість до засухи - 9 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті - 78 %. Вміст крохмалю - 74%, білка - 7 %.

03004041 Галера МВ

Заявник: **Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка помірне. Положення листкової пластинки в просторі похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок відсутнє або дуже слабке. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"- відсутня або дуже слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - вузька (від 6,1 до 8,0). Ніжка качана за довжиною - середня (10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (19-22 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини жовто - оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня сильна.

Урожайність по зоні Степу - 61,2 ц/га, Лісостепу - 76,5 ц/га, гарантований приріст відповідно 9,4 і 9,6 ц/га. Стійкість до засухи 8 і 9 балів, вилягання 8 і 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті 80-77 %. Вміст крохмалю 76-77%, білка 9 - 8 %.

05004070 Гельвін 387 МВ

Заявник: Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка сильне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла сильне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - пізній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок помірне. Волоть щільна. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - пізній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня (10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини жовтий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня сильна.

Урожайність по зоні Лісостепу - 87,6 ц/га, гарантований приріст - 20,8 ц/га. Стійкість до засухи - 9 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті - 78 %. Вміст крохмалю - 73 %, білка - 9 %.

06004037 Голосіївський 260 СВ

Заявник: Приватне підприємство "Насіннєва фірма "Софія"

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - помірне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - відсутнє або дуже слабке. Волоть щільна. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - помірна. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня (10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19-22). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - дуже сильна.

Урожайність по зоні Лісостепу - 91,7 ц/га, гарантований приріст - 26,8 ц/га. Стійкість до засухи - 9 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті - 77 %. Вміст крохмалю - 76%, білка - 9 %.

06004022 ДКС 2960

Заявник: Монсанто Інтернешнл Сьорл

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - від загостреної до округлої. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - ранній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - слабке. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від дуже раннього до раннього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - сильна. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - довга (20,1 до 40 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19-22). Тип зернини зубоподібний, кількість

зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - помірна.

Урожайність по зоні Лісостепу - 90,1 ц/га, гарантований приріст - 25,2 ц/га. Стійкість до засухи - 9 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті - 82 %. Вміст крохмалю - 74 %, білка - 8 %.

06004018 ДКС 3420

Заявник: **Монсанто Інтернешнл Сьорл**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - від загостреної до округлої. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - помірне. Волоть щільна. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня (10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (15-18 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини жовто-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - сильна.

Урожайність по зоні Лісостепу - 93,5 ц/га, гарантований приріст - 28,6 ц/га. Стійкість до засухи - 8 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті - 81 %. Вміст крохмалю - 74 %, білка - 8 %.

06004020 ДКС 3759

Заявник: **Монсанто Інтернешнл Сьорл**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи - сильне. Волоть щільна. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - помірна. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня (10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - сильна.

Урожайність по зоні Лісостепу - 92,6 ц/га, гарантований приріст відповідно - 27,7 ц/га. Стійкість до засухи - 9 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті - 81 %. Вміст крохмалю - 77 %, білка - 8 %.

03004001 ДКС 3511

Заявник: **Монсанто Інтернешнл Сьорл**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластинки в просторі

ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - сильне. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - помірна. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня (10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня від 16-18 шт., колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини жовто-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - сильна.

Урожайність по зоні Степу - 72,6 ц/га, гарантований приріст - 8,2 ц/га. Стійкість до засухи - 8 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті - 82 %. Вміст крохмалю - 74 %, білка - 9 %.

05004045 Донор МВ

Заявник: **Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - сильне. Волоть щільна. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня (10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня від 16-18 шт., колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини жовто-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - помірна.

Урожайність по зоні Лісостепу - 86,3 ц/га, гарантований приріст - 19,5 ц/га. Стійкість до засухи - 9 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті - 79 %. Вміст крохмалю - 77 %, білка - 9 %.

05004053 Діалог

Заявник: **Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - від загостреної до округлої. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - слабке. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - слабке. Волоть щільна. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - помірна. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня (10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (15-18 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня від 16 -18 шт., колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини жовто-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - сильна.

Урожайність по зоні Лісостепу - 80,9 ц/га, гарантований приріст - 14,1 ц/га. Стійкість до засухи - 9 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті - 79 %. Вміст крохмалю - 72%, білка - 8 %.

05004006 ДКС 5143

Заявник: Монсанто Інтернешнл Сьорл

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - слабке. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - відсутня або дуже слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня (10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня від 16 до 18 шт., колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини жовто-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - слабка.

Урожайність по зоні Степу - 74,3 ц/га, гарантований приріст - 22,6 ц/га. Стійкість до засухи - 8 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті - 79 %. Вміст крохмалю - 76 %, білка - 9 %.

05004094 ДК 312

Заявник: P2н

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - від загостреної до округлої. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - відсутнє або дуже слабке. Волоть щільна. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення "шовку" - відсутнє. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня (10,1 до 20 см). Качан за формою циліндричний, за довжиною - короткий (15-18 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - сильна.

Урожайність по зоні Лісостепу - 81,0 ц/га, гарантований приріст - 14,1 ц/га. Стійкість до засухи - 9 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті - 80 %. Вміст крохмалю - 73%, білка - 9 %.

05004096 Джуксін

Заявник: P2н

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластинки в просторі похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - помірне. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - помірна. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня (10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини -

жовтий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - помірна.

Урожайність по зоні Лісостепу - 95,5 ц/га, гарантований приріст - 28,7 ц/га. Стійкість до засухи - 9 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті - 82 %. Вміст крохмалю - 77%, білка - 8 %.

05004082 Джекпот МС

Заявник: **Науково- виробниче фермерське господарство "Компанія "Маїс"**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - сильне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи - відсутнє або дуже слабке. Волоть щільна. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від раннього до середнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0 см). Ніжка качана за довжиною - середня (10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (15 - 18 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини жовто-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - сильна.

Урожайність по зоні Лісостепу - 78,5ц/га, гарантований приріст - 17,9 ц/га. Стійкість до засухи - 9 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті - 80 %. Вміст крохмалю - 75 %, білка - 8 %.

05004054 ДОК МВ

Заявник: **Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - від загостреної до округлої. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - помірне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - помірне. Волоть щільна. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - помірна. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня (10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19-22). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини жовто - оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - сильна.

Урожайність по зоні Лісостепу - 84,4 ц/га, гарантований приріст - 19,6 ц/га. Стійкість до засухи - 8 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті - 76 %. Вміст крохмалю - 73 %, білка - 9 %.

05004090 ECM 602x

Заявник: **Євраліс Семанс**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - сильне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 %

рослин) - від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи - сильне. Волоть щільна. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - ранній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - сильна. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня (10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (15-18 см). Тип зернини зубоподібний, кількість зернових рядів середня від 16 до 18, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, колір низу зернини оранжевий, антоціанове забарвлення лусок стрижня - відсутнє.

Урожайність по зоні Лісостепу - 90,6 ц/га, гарантований приріст - 25,7 ц/га. Стійкість до засухи - 9 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті - 82 %. Вміст крохмалю - 75 %, білка - 9 %.

05004004 ЕС Анамур

Заявник: Євраліс Семанс

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - від загостреної до округлої. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - слабке. Волоть щільна. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від раннього до середнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - дуже сильна. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня (10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини зубоподібний, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини жовто-оранжевий, антоціанове забарвлення лусок стрижня - відсутнє.

Урожайність по зоні Лісостепу - 89,5 ц/га, гарантований приріст - 24,6 ц/га. Стійкість до засухи - 9 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті - 79 %. Вміст крохмалю - 75%, білка - 9 %.

05004005 ЕС Паролі

Заявник: Євраліс Семанс

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - слабке. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - ранній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - відсутнє або дуже слабке. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від раннього до середнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - дуже сильна. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня (10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (15-18 см). Тип зернини проміжний, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини жовто-оранжевий, антоціанове забарвлення лусок стрижня - відсутнє.

Урожайність по зоні Лісостепу - 86,4 ц/га, гарантований приріст - 21,5 ц/га. Стійкість до засухи - 9 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті - 79 %. Вміст крохмалю - 76%, білка - 8 %.

05004089 ЕС Беніта

Заявник: Євраліс Семанс

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластинки в просторі пряме. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключення основи - сильне. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - помірна. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0 см). Ніжка качана за довжиною - середня (10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (15 - 18 см). Тип зернини проміжний, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - помірна.

Урожайність по зоні Лісостепу - 84,9 ц/га, гарантований приріст - 18,1 ц/га. Стійкість до засухи - 9 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті - 81 %. Вміст крохмалю - 77 %, білка - 8 %.

05004092 ECM 601x

Заявник: **Євраліс Семанс**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - помірне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - сильне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - ранній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи - помірне. Волоть щільна. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від дуже раннього до раннього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - сильна. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0 см). Ніжка качана за довжиною - середня (10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (15 - 18 см). Тип зернини зубоподібний, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, колір низу зернини оранжевий, антоціанове забарвлення лусок стрижня - відсутнє.

Урожайність по зоні Степу (на зрошенні) - 107 ц/га, гарантований приріст відповідно - 30,3 ц/га. Стійкість до засухи - 9 балів, вилягання - 7 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті - 80 %. Вміст крохмалю - 73 %, білка - 8 %.

05004003 EC Лаймс

Заявник: **Євраліс Семанс**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - сильне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок волоті -помірне. Волоть щільна. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) -від дуже раннього до раннього. Інтенсивність антоціанове забарвлення "шовку" - сильна. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга від 151 до 200 см. Пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана, см) - середня від 8,1 до 10 см. Ніжка качана за довжиною - середня від 10,1 до 20 см. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (15 - 18 см). Тип зернини зубоподібний, кількість зернових рядів мала, колір зернини - жовто-оранжевий, антоціанове забарвлення лусок стрижня відсутнє.

Урожайність по зоні Лісостепу - 84,9 ц/га, гарантований приріст - 20,1 ц/га. Стійкість до засухи - 9 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті - 80 %. Вміст крохмалю - 73 %, білка - 9 %.

05004078 Ера МС

Заявник: **Науково- виробниче фермерське господарство "Компанія "Маїс"**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластинки в просторі похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - сильне. Волоть щільна. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - відсутня або дуже слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня (10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19-22). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - помірна.

Урожайність по зоні Лісостепу - 88,2 ц/га, гарантований приріст - 23,3 ц/га. Стійкість до засухи - 9 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті - 78 %. Вміст крохмалю - 74 %, білка - 9 %.

05004091 ЕС Нінфеа

Заявник: **Євраліс Семанс**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - від округлої до лопатоподібної. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - слабке. Положення листкової пластинки в просторі пряме. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - ранній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - слабке. Волоть щільна. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - ранній. Антоціанове забарвлення "шовку" - відсутнє або дуже слабке. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня (8,1 до 10 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (15-18 см). Тип зернини зубоподібний, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, колір низу зернини оранжевий, антоціанове забарвлення лусок стрижня - відсутнє.

Урожайність по зоні Лісостепу - 91,0 ц/га, гарантований приріст - 26,2 ц/га. Стійкість до засухи - 9 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті - 81 %. Вміст крохмалю - 74 %, білка - 9 %.

06004041 ЄС Тріо

Заявник: **Євраліс Семанс**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - від округлої до лопатоподібної. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - сильне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - сильне. Волоть щільна. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - сильна. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від

151до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня (10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (15-18 см). Тип зернини зубоподібний, кількість зернових рядів середня, колір зернини оранжевий, антоціанове забарвлення лусок стрижня - відсутнє.

Урожайність по зоні Лісостепу - 91,5 ц/га, гарантований приріст - 26,6 ц/га. Стійкість до засухи - 9 балів, вилягання - 8,8 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті - 79 %. Вміст крохмалю - 75,8 %, білка - 8,7 %.

05004100 Жаззі

Заявник: **Кассад Семанс**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластинки в просторі похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - ранній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - сильне. Волоть щільна. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - ранній. Інетенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - помірна. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга. Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0) Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий. Тип зернини зубоподібний, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, низу зернини - оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня сильна.

Урожайність по зоні Лісостепу - 89,0 ц/га, гарантований приріст - 24,1 ц/га. Стійкість до засухи - 8 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті - 79 %. Вміст крохмалю - 74 %, білка - 9 %.

05004086 Зомба

Заявник: **Лімагрейн Вернеуль Холдінг**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластинки в просторі пряме. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - сильне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - ранній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - помірне. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - ранній. Антоціанове забарвлення "шовку" - відсутнє. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня (10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (15-18). Тип зернини кременистоподібний, кількість зернових рядів мала, колір зернини - оранжевий, антоціанове забарвлення лусок стрижня - відсутнє.

Урожайність по зоні Лісостепу - 82,8 ц/га, гарантований приріст - 17,9 ц/га. Стійкість до засухи - 9 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті - 78 %. Вміст крохмалю - 71 %, білка - 9 %.

05004034 Краснодарський 291 АМВ

Заявник: **Державна наукова установа Краснодарський науково-дослідний інститут сільського господарства ім. П.П. Лук'яненка**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластинки в просторі

похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - помірне. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - помірна. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня (10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - слабка.

Урожайність по зоні Лісостепу - 92,0 ц/га, гарантований приріст - 27,1 ц/га. Стійкість до засухи - 9 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті - 79 %. Вміст крохмалю - 74%, білка - 9 %.

05004072 КВС Амбер

Заявник: КВС ЗААТ АГ

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластинки в просторі похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - слабке. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня (10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (15-18 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, колір низу зернини червоно-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - сильна.

Урожайність по зоні Лісостепу - 90,8 ц/га, гарантований приріст - 24,0 ц/га. Стійкість до засухи - 9 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті - 81 %. Вміст крохмалю - 74 %, білка - 9 %.

05004033 Краснодарський 194 МВ

Заявник: Державна наукова установа Краснодарський науково-дослідний інститут сільського господарства ім. П.П. Лук'яненка

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - помірне. Положення листкової пластинки в просторі похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від раннього до середнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення основи колоскових лусок волоті - слабка. Інтенсивність антоціавнового забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі волоті) - помірна. Волоть щільна. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення "шовку" - наявне. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга. Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня. Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий. Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, низу - оранжевий, антоціанове забарвлення лусок стрижня сильне.

Урожайність по зоні Степу 57,8 ц/га, Лісостепу - 81,5 ц/га, гарантований приріст відповідно 11,7 і 21,0 ц/га. Стійкість до засухи 8; 9 балів, вилягання - 9 балів, проти пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті - 79 %. Вміст крохмалю 74 - 76%, білка 9 і 8 %.

05004066 КВС 381

Заявник: КВС ЗААТ АГ

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка дуже сильне. Положення листкової пластинки в просторі пряме. Антоціанове забарвлення повітряних коренів сильне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Волоть щільна. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" сильна. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня (від 10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (15-18 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини жовто - оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня помірна.

Урожайність по зоні Лісостепу - 90,8 ц/га, гарантований приріст - 24,0 ц/га. Стійкість до засухи - 9 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті - 79 %. Вміст крохмалю - 76 %, білка - 8 %.

05004038 Кочубей 342 СВ

Заявник: Науково-виробниче підприємство "Агродніпро-насіння"

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - пізній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)- сильне. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0 см). Ніжка качана за довжиною - середня (10,1 до 20 см). Качан за формою -циліндричний, за довжиною - середній (19 - 22 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - слабка.

Урожайність по зоні Лісостепу - 89,2 ц/га, гарантований приріст - 22,4 ц/га. Стійкість до засухи - 9 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті - 80 %. Вміст крохмалю - 70 %, білка - 8 %.

04004099 Каресс

Заявник: КВС ЗААТ АГ

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - від загостреної до округлої. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - сильне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи - сильне. Волоть нещільна. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від дуже раннього до раннього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - сильна. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня (10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (15-

18 см). Тип зернини кременистоподібний, кількість зернових рядів мала, колір зернини оранжевий, антоціанове забарвлення лусок стрижня - відсутнє.

Урожайність по зоні Лісостепу - 88,5 ц/га, гарантований приріст - 23,6 ц/га. Стійкість до засухи - 9 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті - 80 %. Вміст крохмалю - 73%, білка - 10 %.

04004107 Космо 230

Заявник: **Ходовля Рослин Рольничих "Насьона Кобєжиц"спулка з о.о.**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - помірне. Положення листкової пластинки в просторі похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - сильне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - ранній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок волоті за виключенням основи -помірне. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від раннього до середнього. Інтенсивність антоціанове забарвлення "шовку" - слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга від 151 до 200 см. Пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана, см) - середня від 8,1 до 10 см. Ніжка качана за довжиною - середня від 10,1 до 20 см. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (15 - 18 см). Тип зернини проміжний, кількість зернових рядів мала, колір зернини - оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня помірна.

Урожайність по зоні Лісостепу - 89,8 ц/га, гарантований приріст - 15,7 ц/га. Стійкість до засухи - 9 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті - 77 %. Вміст крохмалю - 74%, білка - 9 %.

05004061 Криничанський 257 СВ

Заявник: **Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка від загостреної до округлої. Антоціанове забарвлення піхви першого листка сильне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок помірне. Волоть щільна. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" помірна. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня (від 10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (15-18 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини жовто - оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня помірна.

Урожайність по зоні Лісостепу - 89,1 ц/га, гарантований приріст - 24,2 ц/га. Стійкість до засухи - 8 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті - 80 %. Вміст крохмалю - 74 %, білка - 9 %.

05004109 Кадет

Заявник: **Маісадур Семанс**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 %

рослин) - від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - помірне. Волоть щільна. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - сильна. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - довга (20,1 до 40 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19-22). Тип зернини кременистоподібний, кількість зернових рядів мала, колір зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - сильна.

Урожайність по зоні Лісостепу - 94,9 ц/га, гарантований приріст - 30,0 ц/га. Стійкість до засухи - 9 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті - 80 %. Вміст крохмалю - 75 %, білка - 8 %.

04004078 Легіон 400

Заявник: **Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - відсутнє або дуже слабке. Положення листкової пластинки в просторі похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - помірне. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - відсутня або дуже слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня (10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (15-18 см). Тип зернини зубоподібний, кількість зернових рядів середня від 16 до 18 шт., колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - помірна.

Урожайність по зоні Степу - 65,9 ц/га, гарантований приріст - 14,3 ц/га. Стійкість до засухи - 8 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті - 79 %. Вміст крохмалю - 74 %, білка - 9 %.

05004111 Лайка

Заявник: **Маісадур Семанс**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - помірне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - ранній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - помірне. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - ранній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - помірна. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня (10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини кременистоподібний, кількість зернових рядів мала, колір зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - сильна.

Урожайність по зоні Лісостепу - 92,3 ц/га, гарантований приріст - 27,4 ц/га. Стійкість до засухи - 9 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті - 79 %. Вміст крохмалю - 75 %, білка - 9 %.

05004088 ЛГ 3232

Заявник: **Лімагрейн Вернеуль Холдінг**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - відсутнє або дуже слабке. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - слабке. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0 см). Ніжка качана за довжиною - середня (10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини жовто - оранжевий, антоціанове забарвлення лусок стрижня - відсутнє.

Урожайність по зоні Лісостепу - 88,1 ц/га, гарантований приріст - 21,3 ц/га. Стійкість до засухи - 9 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті - 79 %. Вміст крохмалю - 74 %, білка - 9 %.

05004087 ЛГ 3330

Заявник: **Лімагрейн Вернеуль Холдінг**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - відсутнє або дуже слабке. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - помірна. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0 см). Ніжка качана за довжиною - середня (10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (15 - 18 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, колір низу зернини оранжевий, антоціанове забарвлення лусок стрижня - відсутнє.

Урожайність по зоні Лісостепу - 87,0 ц/га, гарантований приріст - 20,2 ц/га. Стійкість до засухи - 9 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті - 79 %. Вміст крохмалю - 74 %, білка - 8 %.

05004019 МАС 33А

Заявник: **Маісадур Семанс**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - помірне. Положення листкової пластинки в просторі похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - відсутнє або дуже слабке. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - помірна. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня (10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19-22). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини жовто - оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - сильна.

Урожайність по зоні Степу - 74,5 ц/га, Лісостепу - 91,6 ц/га, гарантований приріст відповідно 22,7 і 24,8 ц/га. Стійкість до засухи 8 і 9 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті 82 і 81 %. Вміст крохмалю -73%, білка - 10 %.

05004021 МАС 24А

Заявник: Маісадур Семанс

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - від округлої до лопатеподібної. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластинки в просторі пряме. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - ранній. Волоть середньої щільності. Інтенсивність антоціанове забарвлення "шовку" - сильна. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10 см). Ніжка качана за довжиною - середня (від 10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини кременистоподібний, кількість зернових рядів мала, колір зернини - оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня дуже сильна.

Урожайність по зоні Лісостепу - 98,3 ц/га, гарантований приріст - 33,5 ц/га. Стійкість до засухи - 9 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті - 78 %. Вміст крохмалю - 75%, білка - 7 %.

05004058 Маг

Заявник: Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - помірне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - помірне. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня (10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною -короткий (15-18). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - сильна.

Урожайність по зоні Лісостепу - 90,6 ц/га, гарантований приріст - 25,8 ц/га. Стійкість до засухи - 9 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті - 79 %. Вміст крохмалю - 76 %, білка - 8 %.

06004001 НК Такео

Заявник: Сінгента Сідз С.А.С.

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - від загостреної до округлої. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - дуже сильне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - пізній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - слабке. Волоть щільна. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - пізній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - сильна. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - коротка (5,1 до 10 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини жовто-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - сильна.

Урожайність по зоні Степу - 58,8 ц/га, гарантований приріст - 7,5 ц/га. Стійкість до засухи - 8 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті - 79 %. Вміст крохмалю - 75 %, білка - 8 %.

05004031 Натура

Заявник: **Маісадур Семанс**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - помірне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - сильне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - помірне. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від раннього до пізнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня (10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (15-18 см). Тип зернини кременистоподібний, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини жовтий, колір низу зернини - оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - помірна.

Урожайність по зоні Лісостепу - 81,9 ц/га, гарантований приріст - 15,1 ц/га. Стійкість до засухи - 9 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті - 81 %. Вміст крохмалю - 76 %, білка - 8 %.

06004011 НК Леморо

Заявник: **Сінгента Сідз С.А.С.**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - від загостреної до округлої. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - помірне. Волоть щільна. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня (10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (15-18 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - сильна.

Урожайність по зоні Лісостепу - 91,3 ц/га, гарантований приріст - 24,5 ц/га. Стійкість до засухи - 9 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті - 81 %. Вміст крохмалю - 73 %, білка - 8 %.

06004004 НК Альтіус

Заявник: **Сінгента Сідз С.А.С.**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - від округлої до лопатоподібної. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - дуже сильне. Положення листкової пластинки в просторі пряме. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - сильне. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку"

(у 50 % рослин) - середній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - коротка (5,1 до 10 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (15-18 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - помірна.

Урожайність по зоні Степу - 56,8 ц/га, Лісостепу - 83,5 ц/га, гарантований приріст відповідно 4,9 і 16,7 ц/га. Стійкість до засухи 7 і 8 балів, вилягання 8 і 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті - 80 %. Вміст крохмалю 72-73%, білка - 8 %.

04004110 НК Равело

Заявник: Сінгента Сідз С.А.С.

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - від загостреної до округлої. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - помірне. Положення листкової пластинки в просторі похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - ранній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок волоті за виключенням основи -слабке. Волоть щільна. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - ранній. Інтенсивність антоціанове забарвлення "шовку" - слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга від 151 до 200 см. Пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана, см) - вузька від 6,1 до 8,0 см. Ніжка качана за довжиною - середня від 10,1 до 20 см. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (15 - 18 см). Тип зернини кременистоподібний, кількість зернових рядів мала, колір зернини - оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня сильна.

Урожайність по зоні Лісостепу - 92,0 ц/га, гарантований приріст - 27,1 ц/га. Стійкість до засухи - 9 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті - 80 %. Вміст крохмалю - 74%, білка - 9 %.

05004029 Нєбора

Заявник: Маісадур Семанс

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - помірне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від дуже раннього до раннього. Волоть середньої щільності. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - помірна. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - вузька (від 6,1 до 8.0 см). Ніжка качана за довжиною - середня (від 10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини кременистоподібний, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, низу зернини - оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня сильна.

Урожайність по зоні Лісостепу - 93,7 ц/га, гарантований приріст - 28,9 ц/га. Стійкість до засухи - 9 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті - 78 %. Вміст крохмалю - 75%, білка - 9 %.

06004013 НК Фантус

Заявник: Сінгента Сідз С.А.С.

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - від округлої до лопатоподібної. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - помірне. Положення листкової пластинки в просторі сильно похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - сильне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - слабке. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від раннього до середнього. Інетенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - вузька (від 6,1 до 8,0 см). Ніжка качана за довжиною - коротка (від 5,1 до 10 см). Качан конусної форми, за довжиною - короткий (15-18 см). Тип зернини кременистий, кількість зернових рядів мала, колір зернини - оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня слабка.

Урожайність по зоні Лісостепу - 99,5 ц/га, гарантований приріст - 34,7 ц/га. Стійкість до засухи - 9 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті - 81 %. Вміст крохмалю - 74 %, білка - 8 %.

06004009 НК Перформ

Заявник: Сінгента Сідз С.А.С.

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластинки в просторі похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - дуже ранній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - відсутнє або дуже слабке. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від раннього до середнього. Інетенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - помірна. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - вузька (від 6,1 до 8,0 см). Ніжка качана за довжиною - коротка (від 5,1 до 10 см). Качан конусно-циліндричної форми, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини кременистоподібний, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини жовто- оранжевий, низу зернини - оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня слабка.

Урожайність по зоні Лісостепу - 94,9 ц/га, гарантований приріст - 30,0 ц/га. Стійкість до засухи - 9 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті - 80 %. Вміст крохмалю - 76%, білка - 9 %.

06004008 НК Фалькон

Заявник: Сінгента Сідз С.А.С.

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка -від округлої до лопатеподібної. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - помірне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній. Інетенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0 см). Ніжка качана за довжиною - середня (від 10,1 до 20 см). Качан циліндричної форми, за довжиною - довгий (23-26 см). Тип зернини зубоподібний, колір верхівки зернини - оранжевий, колір низу зернини - синьо-чорний, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня дуже слабка.

Урожайність по зоні Лісостепу - 88,3 ц/га, гарантований приріст - 23,5 ц/га. Стійкість до засухи - 9 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті - 81 %. Вміст крохмалю - 71%, білка - 9 %.

05004017 Оріоль

Заявник: Маісадур Семанс

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - відсутнє або дуже слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - ранній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок волоті - слабке. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - ранній. Антоціанове забарвлення "шовку" - наявне. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга. Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня. Ніжка качана за довжиною - коротка. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий. Тип зернини проміжний, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, низу - оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня слабка.

Урожайність по зоні Степу 57,2 ц/га, Лісостепу - 86,4ц/га, Полісся - 89,1ц/га, гарантований приріст відповідно 11,1; 25,8; 22,6 ц/га. Стійкість до засухи 8; 9; 9 балів, вилягання 8; 9; 9 балів, проти пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті 81; 80; 80 %. Вміст крохмалю 73 - 76%, білка 10; 8; 9 %.

05004056 Орільський 357 СВ

Заявник: Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - від загостреної до округлої. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення основи колоскових лусок - слабке. Антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи - помріне. Волоть щільна. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня (10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (15 - 18 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - сильна.

Урожайність по зоні Лісостепу - 90,0 ц/га, гарантований приріст - 23,2 ц/га. Стійкість до засухи - 9 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті - 79 %. Вміст крохмалю - 74%, білка - 9 %.

06004038 Орлик 330 МВ

Заявник: Інститут фізіології рослин і генетики Національної академії наук України

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - від округлої до лопатоподібної. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластинки в просторі похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - відсутнє або дуже слабке. Волоть щільна. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до

10,0). Ніжка качана за довжиною - середня (10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - сильна.

Урожайність по зоні Степу - 52,0 ц/га, Лісостепу - 86,5 ц/га, гарантований приріст відповідно 1,5 і 19,7 ц/га. Стійкість до засухи 8 і 9 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті 79 і 78 %. Вміст крохмалю 78-79%, білка 9 - 8 %.

06004039 Переяславський 230 СВ

Заявник: **Інститут фізіології рослин і генетики Національної академії наук України**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - від загостреної до округлої. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластинки в просторі похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи - слабке. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - помірна. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня (10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (15-18 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - сильна.

Урожайність по зоні Степу - 53,7 ц/га, Лісостепу - 78,5 ц/га, Полісся - 89,3 ц/га, гарантований приріст відповідно 3,5; 13,6; 13,6 ц/га. Стійкість до засухи 8; 9; 9 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті 76-79 %. Вміст крохмалю 73-76%, білка 8 - 10 %.

06004031 ПВ 81-01

Заявник: **Сейбр ТОВ**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - помірне. Положення листкової пластинки в просторі похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - сильне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - сильне. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від раннього до середнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - сильна. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - коротка (5,1 до 10 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (15-18 см). Тип зернини кременистоподібний, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, колір низу зернини оранжевий, антоціанове забарвлення лусок стрижня - відсутнє.

Урожайність по зоні Лісостепу - 88,4 ц/га, гарантований приріст - 23,5 ц/га. Стійкість до засухи - 8 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті - 79 %. Вміст крохмалю - 74%, білка - 8 %.

05004047 Подих МВ

Заявник: **Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - від загостреної до округлої. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - слабке. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - відсутнє або дуже слабке. Волоть щільна. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення "шовку" - відсутнє. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга. Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня. Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній. Тип зернини зубоподібний, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, низу зернини - оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня сильна.

Урожайність по зоні Лісостепу - 76,4 ц/га, Полісся - 86,8 ц/га, гарантований приріст відповідно 15,8; 20,3 ц/га. Стійкість до засухи - 8 балів, вилягання 9; 8 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті 75 і 76 %. Вміст крохмалю 74 - 76%, білка - 8 %.

05004050 Пірс МВ

Заявник: **Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - помірне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від дуже раннього до раннього. Волоть щільна. Інтенсивність антоціанове забарвлення "шовку" - відсутня або дуже слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10 см). Ніжка качана за довжиною - середня (від 8,1 до 10 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - корткий (15-18 см). Тип зернини зубоподібний, кількість зернових рядів мала, колір зернини - жовто-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня сильна.

Урожайність по зоні Лісостепу - 74,3ц/га, гарантований приріст - 13,7 ц/га. Стійкість до засухи - 8 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті - 78 %. Вміст крохмалю - 76%, білка - 8 %.

05004101 ПР38Б12

Заявник: **Піонер Семена Холдінг ГезмбХ**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - помірне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - слабке. Волоть щільна. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення "шовку" - відсутнє. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - коротка (5,1 до 10 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (15-18 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - сильна.

Урожайність по зоні Степу - 72,9 ц/га, Лісостепу - 90,4 ц/га, гарантований приріст відповідно 21,0 і 23,6 ц/га. Стійкість до засухи 8 і 9 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті - 80 %. Вміст крохмалю - 74%, білка 10 - 9 %.

06004027 ПВ 75 - 01

Заявник: **Кітчен Сід кампані Інк.**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - слабке. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - відсутнє або дуже слабке. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення "шовку" - відсутнє. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0 см). Ніжка качана за довжиною - середня (10,1 до 20 см). Качан за формою циліндричний, за довжиною - короткий (15 - 18 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - сильна.

Урожайність по зоні Лісостепу - 86,7 ц/га, гарантований приріст відповідно - 26,1 ц/га. Стійкість до засухи - 8 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті - 79 %. Вміст крохмалю - 75 %, білка - 8 %.

05004002 ПР39Т13

Заявник: **Піонер Семена Холдінг ГезмбХ**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - помірне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - пізній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок волоті за виключенням основи -слабке. Волоть нещільна. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) -середній. Інтенсивність антоціанове забарвлення "шовку" - слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга від 151 до 200 см. Пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана, см) - середня від 8,1 до 10 см. Ніжка качана за довжиною - середня від 10,1 до 20 см. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (15 - 18 см). Тип зернини проміжний, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, низу зернини - оранжевий, антоціанове забарвлення лусок стрижня відсутнє.

Урожайність по зоні Лісостепу - 90,1 ц/га, гарантований приріст - 26,1 ц/га. Стійкість до засухи - 9 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті - 80 %. Вміст крохмалю - 74 %, білка - 8 %.

05004037 Пустоварівський 280 СВ

Заявник: **Товариство з обмеженою відповідальністю "Агрофірма Колос"**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - від округлої до лопатоподібної. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - сильне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Волоть щільна. Антоціанове забарвлення "шовку" - відсутнє або дуже слабке. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10 см). Ніжка качана за довжиною - середня (від 10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, низу зернини - оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня сильна.

Урожайність по зоні Лісостепу - 88,7 ц/га, гарантований приріст - 23,8 ц/га. Стійкість до засухи - 8 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті - 80 %. Вміст крохмалю - 76%, білка - 9 %.

05004108 ПР39Р20

Заявник: Піонер Семена Холдінг ГезмбХ

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - помірне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - відсутнє або дуже слабке. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від раннього до середнього. Інетенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - сильна. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0 см). Ніжка качана за довжиною - середня (від 10,1 до 20 см). Качан конусно-циліндричної форми, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини кременистоподібний, кількість зернових рядів мала, колір зернини - оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня помірна.

Урожайність по зоні Лісостепу - 96,3 ц/га, гарантований приріст - 31,4 ц/га. Стійкість до засухи - 9 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті - 81 %. Вміст крохмалю - 75%, білка - 9 %.

04004103 Роналдініо

Заявник: КВС ЗААТ АГ

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - від загостреної до округлої. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - помірне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - ранній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - помірне. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - ранній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня (10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (19-22 см). Тип зернини кременистоподібний, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, колір низу зернини оранжевий, антоціанове забарвлення лусок стрижня - відсутнє.

Урожайність по зоні Степу - 58,6 ц/га, Лісостепу - 89,8 ц/га, Полісся - 88,7 ц/га, гарантований приріст відповідно 8,4; 24,9; 13,0 ц/га. Стійкість до засухи 7; 9; 9 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті 79; 78; 77 %. Вміст крохмалю 72; 73; 75%, білка 9; 9; 10 %.

05004097 Ріксер

Заявник: Р2н

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластинки в просторі похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - сильне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - відсутнє або дуже слабке. Волоть щільна. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - пізній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - відсутня або дуже слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня (10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (15-18 см). Тип зернини зубовий, кількість

зернових рядів середня від 16 до 18 шт., колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини жовто-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - помірна.

Урожайність по зоні Степу - 66,6 ц/га, гарантований приріст - 15,0 ц/га. Стійкість до засухи - 8 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті - 80 %. Вміст крохмалю - 76 %, білка - 8 %.

04004092 Ранг МС 310

Заявник: **Науково- виробниче фермерське господарство "Компанія "Маїс"**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - помірне. Положення листкової пластинки в просторі похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - ранній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - помірне. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - пізній. Антоціанове забарвлення "шовку" - відсутнє. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня (10,1 до 20 см). Качан циліндричної форми, за довжиною - середній (19-22). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - сильна.

Урожайність по зоні Степу - 63,9 ц/га, Лісостепу - 91,4 ц/га, гарантований приріст відповідно 12,1 і 24,6 ц/га. Стійкість до засухи 8 і 9 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті 78-77 %. Вміст крохмалю 73-76%, білка 9 - 7 %.

04004084 Слобожанський МВ

Заявник: **Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - від загостреної до округлої. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - помірне. Положення листкової пластинки в просторі похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок волоті за виключенням основи - помірне. Волоть щільна. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній. Інтенсивність антоціанове забарвлення "шовку" - слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга від 151 до 200 см. Пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана, см) - середня від 8,1 до 10 см. Ніжка качана за довжиною - середня від 10,1 до 20 см. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (15 - 18 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, низу зернини - оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня сильна.

Урожайність по зоні Лісостепу - 77,0 ц/га, гарантований приріст - 12,1 ц/га. Стійкість до засухи - 9 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті - 74 %. Вміст крохмалю - 72%, білка - 10 %.

05004063 Стіжок 192 СВ

Заявник: **Буковинський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - від округлої до лопатоподібної. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової

пластинки в просторі ледь похиле. Кут між листковою пластинкою і стеблом - середній. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - відсутнє або дуже слабке. Волоть щільна. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення "шовку" - слабке. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга. Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня. Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній. Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовтий, низу зернини - оранжевий, антоціанове забарвлення лусок стрижня сильне.

Урожайність по зоні Лісостепу - 78,8ц/га, гарантований приріст - 17,3 ц/га. Стійкість до засухи - 8 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті - 79 %. Вміст крохмалю 74%, білку 8 %.

06004040 Суботівський 190 СВ

Заявник: **Інститут фізіології рослин і генетики Національної академії наук України**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - помірне. Положення листкової пластинки в просторі похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Інтенсивність антоціанового забарвлення основи колоскових лусок волоті - сильна. Інтенсивність антоціавнового забарвлення колоскових лусок за виключення основи (на середній третині головної осі волоті) - слабка. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення "шовку" - відсутнє. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга. Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - вузька. Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній. Тип зернини кременистий, кількість зернових рядів мала, колір зернини - оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня помірна.

Урожайність по зоні Степу - 52,4 ц/га, Лісостепу - 76,8 ц/га, Полісся - 81,7 ц/га, гарантований приріст відповідно 1,5; 16,2; 15,1 ц/га. Стійкість до засухи 8; 9; 9 балів, вилягання 8; 9; 8 балів, проти пухирчастої сажки 9 балів. Вихід зерна при обмолоті 80; 78; 76 %. Вміст крохмалю 74 - 76%, білка 9; 8; 9 %.

04004082 Сеіді

Заявник: **Кассад Семанс**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластинки в просторі похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - сильне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від раннього до середнього. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від раннього до середнього. Інтенсивність антоціанове забарвлення "шовку" - помірна. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - дуже довга. Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня. Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий. Тип зернини кременистоподібний, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, низу зернини - оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня дуже сильна.

Урожайність по зоні Степу - 63,6 ц/га, Лісостепу - 92,9 ц/га, Полісся - 90,1 ц/га, гарантований приріст відповідно 13,4; 28,1; 14,4 ц/га. Стійкість до засухи 7; 9; 9 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті 77-78 %. Вміст крохмалю - 75%, білка 9 - 10 %.

04004094 Стожар 330 МВ

Заявник: **Приватна виробнича фірма " Агроцентр"**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - помірне. Положення листкової пластинки в просторі похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - сильне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - слабке. Волоть щільна. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - широка (від 10,1 до 12,0). Ніжка качана за довжиною - середня (10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19-22). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - сильна.

Урожайність по зоні Степу - 66,8 ц/га, Лісостепу - 91,6 ц/га, гарантований приріст відповідно 15,0 і 24,7 ц/га. Стійкість до засухи 8 і 9 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті - 78 %. Вміст крохмалю - 75 %, білка 9 - 8 %.

05004055 Усмішка

Заявник: **Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - помірне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - пізній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - слабке. Волоть щільна. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня (10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (15-18 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня від 16 - 18 шт., колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини жовто-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - сильна.

Урожайність по зоні Лісостепу - 84,9 ц/га, гарантований приріст - 18,1 ц/га. Стійкість до засухи - 9 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті - 79 %. Вміст крохмалю - 76 %, білка - 9 %.

04004079 Успіх МВ

Заявник: **Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - помірне. Положення листкової пластинки в просторі похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - пізнє. Волоть щільна. Інтенсивність антоціанове забарвлення "шовку" - слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга. Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня. Ніжка качана за довжиною - середня (від 10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною -середній (19-22 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, низу зернини - оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня помірна.

Урожайність по зоні Степу 68,4 ц/га, Лісостепу - 84,5ц/га, гарантований приріст відповідно 18,2 і 19,6 ц/га. Стійкість до засухи 8 і 8 балів, вилягання 8 і 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті 78-81 %. Вміст крохмалю 72 - 77%, білка 9 - 7 %.

05004016 Фанжіо

Заявник: Маісадур Семанс

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - слабке. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - довга (20,1 до 40 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19-22). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - сильна.

Урожайність по зоні Степу - 72,3 ц/га, Лісостепу - 88,2 ц/га, гарантований приріст відповідно 20,4 і 21,4 ц/га. Стійкість до засухи 8 і 9 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті - 82 %. Вміст крохмалю 74-75%, білка 10 - 8 %.

04004100 Футура

Заявник: КВС ЗААТ АГ

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - помірне. Положення листкової пластинки в просторі похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - слабке. Волоть нещільна. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - відсутня або дуже слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня (10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (15-18 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня від 16 до 18 шт., колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - помірна.

Урожайність по зоні Степу - 64,3 ц/га, Лісостепу - 93,2 ц/га, гарантований приріст відповідно 12,4 і 26,4 ц/га. Стійкість до засухи 8 і 9 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті 81 і 78 %. Вміст крохмалю 73-74%, білка 9 - 8 %.

04004101 Фабула

Заявник: КВС ЗААТ АГ

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - помірне. Положення листкової пластинки в просторі пряме. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - дуже пізній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - відсутнє або дуже слабке. Волоть щільна. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - дуже

пізній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - дуже довга (понад 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - широка (від 10,1 до 12,0). Ніжка качана за довжиною - коротка (5,1 до 10 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня від 16 до 18 шт., колір зернини жовто-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - помірна.

Урожайність по зоні Степу - 69,1 ц/га, гарантований приріст - 17,5 ц/га. Стійкість до засухи - 9 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті - 79 %. Вміст крохмалю - 75 %, білка - 8 %.

04004102 Фестиваль

Заявник: **КВС ЗААТ АГ**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - дуже пізній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - слабке. Волоть щільна. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від пізнього до дуже пізнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - відсутня або дуже слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) -дуже довга (понад 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня (10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня від 16 до 18 шт., колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини жовто-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - помірна.

Урожайність по зоні Степу 66,8 ц/га, гарантований приріст - 15,1 ц/га. Стійкість до засухи - 8 балів, вилягання - 8 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті - 80 %. Вміст крохмалю - 76 %, білка - 8 %.

05004051 Флагман

Заявник: **Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - від загостреної до округлої. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - пізній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - слабке. Волоть щільна. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - пізній. Антоціанове забарвлення "шовку" - відсутня. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня (10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (15-18 см). Тип зернини зубоподібний, кількість зернових рядів середня, колір зернини оранжевий, антоціанове забарвлення лусок стрижня - відсутнє.

Урожайність по зоні Лісостепу - 78,2 ц/га, гарантований приріст - 11,4 ц/га. Стійкість до засухи - 9 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті - 77 %. Вміст крохмалю - 75%, білка - 8 %.

04004081 Ханні

Заявник: **Кассад Семанс**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластинки в просторі похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - сильне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - ранній. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - ранній. Інтенсивність антоціанове забарвлення "шовку" - слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - середня. Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня. Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий. Тип зернини кременистоподібний, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, низу зернини - оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня сильна.

Урожайність по зоні Степу - 63,0 ц/га, Лісостепу - 84,0 ц/га гарантований приріст відповідно 12,8 і 19,1 ц/га. Стійкість до засухи 7 і 9 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті 77-78 %. Вміст крохмалю 73 - 76%, білка 9 - 8 %.

06004045 ХЛ 2093

Заявник: Хайленд Сидс Томпсонс ЛТД

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластинки в просторі похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - ранній. Волоть середньої щільності. Інтенсивність антоціанове забарвлення "шовку" - слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10 см). Ніжка качана за довжиною - коротка (від 5,1 до 10 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - корткий (15-18 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, низу зернини - оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня помірна.

Урожайність по зоні Лісостепу - 82,3 ц/га, Полісся - 75,9 ц/га, гарантований приріст відповідно 21,7 і 9,4 ц/га. Стійкість до засухи 8 і 9 балів, вилягання 9 і 8 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті 79 і 82 %. Вміст крохмалю 74 - 75%, білка 8 і 9 %.

06004044 ХЛ 2017

Заявник: Хайленд Сидс Томпсонс ЛТД

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - помірне. Положення листкової пластинки в просторі похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - ранній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи - помірне. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - ранній. Антоціанове забарвлення "шовку" - відсутнє. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0 см). Ніжка качана за довжиною - середня (10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (15 - 18 см). Тип зернини зубоподібний, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - сильна.

Урожайність по зоні Лісостепу - 79,8ц/га, Полісся - 76,8ц/га, гарантований приріст відповідно 19,3 і 10,2 ц/га. Стійкість до засухи 8 і 9 балів, вилягання 9 і 8 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті 78 і 80 %. Вміст крохмалю 73 - 75%, білка 8; 10 %.

06004046 ХЛ 2222

Заявник: Хайленд Сидс Томпсонс ЛТД

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - помірне. Положення листкової пластинки в просторі похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - помірне. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від раннього до середнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - коротка (5,1 до 10 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (15-18 см). Тип зернини зубоподібний, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - помірна.

Урожайність по зоні Лісостепу - 87,7 ц/га, гарантований приріст - 22,8 ц/га. Стійкість до засухи - 9 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті - 80 %. Вміст крохмалю - 74%, білка - 9 %.

Сільськогосподарські: бобові

Горох

04001010 Глянс

Заявник: **Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Рослини сорту низькі за висотою, без антоціанового забарвлення, з відсутніми вторинними листочками, з двома квітками на вузлі, мають середній час як цвітіння , так і достигання.

Стебло нефасційоване, середньої довжини,з середньою кількістю вузлів.

Черешок листка середньої довжини. Прилисток добре розвинений, жовто-зеленого кольору з наявною формою "кролячих вух" без воскового нальоту, має середні довжину та ширину, з малою плямистістю.

Квітка з середньою довжиною квітконіжки від стебла да першої квітки, має середню ширину чашолистка з загостреною формою верхівки верхнього чашолистика. Колір паруса білий, з середньою максимальною його шириною, піднесеною формою основи та слабкою інтенсивністю хвилястості паруса.

Біб має середню кількість насінних зачатків, середньої довжини та ширини, жовтого кольору, з наявною пергамент-ністю, зі слабким ступенем вигину та випуклим типом його прояву.

Насінина округлої форми, з простими крохмальними зернами та сім'ядолями жовтого кольору, з відсутньою зморшкуватістю та чорним забарвленням рубчика.

Маса 1000 насінин - середня.

Тип розвитку ярий. Середньостиглий , вегетаційний період - 79 - 85 діб .Напівінтенсивного типу , придатний до механізованого збирання. Різновидність констекстум. За даними заявника норма висіву - 1,1 - 1,2 млн./ га схожих насінин.

,Агротехніка звичайна для зони вирощування . Урожайний . За роки випробування отримали середній урожай на обласних державних центрах експертизи сортів рослин - 35,8 - 36,9 ц / га , що на 3,5 - 5,5 ц / га більше стандартів .

Вміст сирого протеїну - 19 - 20 % . Сорт має підвищену стійкість до посухи . Стійкий до аскохітозу , кореневих гнилей .

Рекомендований для поширення в зонах Степу та Лісостепу.

05001001 Кадді

Заявник: **Товариство з обмеженою відповідальністю "Верес"**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Рослини сорту середньої висоти, без антоціанового забарвлення, з відсутніми вторинними листочками (вусаті), двома квітками на вузлі, мають дуже ранній час цвітіння та ранній достигання.

Стебло - нефасційоване, середньої довжини з дуже великою кількістю вузлів.

Черешок листка середньої довжини. Прилисток добре розвинений, зеленого кольору, з середньою інтенсивністю забарвлення та відсутнім сіруватим відтінком, з відсутньою формою "кролячих вух" та наявним восковим нальотом, має середні довжину та ширину, з дуже щільною плямистістю.

Квітка з малою довжиною квітконіжки від стебла да першої квітки, має середню ширину чашолистка із загостреною формою верхівки верхнього чашолистка. Колір паруса білий, із малою максимальною його шириною, прямою формою основи та середною інтенсивністю хвилястості паруса.

Біб жовтого кольору, має середню кількість насінних зачатків, середньої довжини, вузький, із наявною пергамент-ністю, з відсутнім або дуже слабким ступенем вигину та увігнутим типом його прояву.

Насінина сферичної форми, з простими крохмальними зернами та сім'ядолями жовтого кольору, з відсутніми ямкуватістю та зморшкуватістю сім'ядолей і чорним забарвленням рубчика.

Маса 1000 насінин - середня.

Тип розвитку - ярий. Середньостиглий , вегетаційний період - 82 діб. Сорт інтенсивного типу, придатний до механізованого збирання. За даними Заявника норма висіву 1,0 - 1,2 млн./ га схожих насінин. Різновидність - екадукум.

Агротехніка звичайна для зони вирощування. Урожайний. За роки випробування середній урожай на обласних державних центрах експертизи сортів рослин отримали 34,5 ц / га, що на 5,3 ц / га більше стандартів. Білка має 22,6 %.

Стійкий до посухи . Аскохітозом та кореневими гнилями уражується нижче стандартів

Рекомендований для поширення в зоні Степу .

04001008 Петрониум

Заявник: **Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича агрокорпорація "Степова"**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Рослини сорту середньої висоти, без антоціанового забарвлення, з відсутніми вторинними листочками (вусаті), з максимальною кількістю квіток на вузлі (від двох до трьох), мають середній час і цвітіння, і достигання.

Стебло - нефасційоване, коротке з середньою кількістю вузлів.

Черешок листка середньої довжини. Прилисток добре розвинений, зеленого кольору з середньою інтенсивністю забарвлення та наявними: сіруватим відтінком, із наявною формою "кролячих вух" та восковим нальотом, має середні довжину та ширину з середньою плямистістю.

Квітка з середньою довжиною квітконіжки від стебла да першої квітки, має середню ширину чашолистка із загостреною формою верхівки верхнього чашолистика. Колір паруса білий з середньою максимальною його шириною, піднесеною формою основи та слабкою інтенсивністю хвилястості паруса.

Біб має велику кількість насінних зачатків, довгий, середньої ширини, жовтого кольору, з наявною пергаментністю , зі слабким ступенем вигину та випуклим типом його прояву.

Насінина сферичної форми, з простими крохмальними зернами та сім'ядолями жовтого кольору, з відсутніми ямкуватістю та зморшкуватістю сім'ядолей і чорним забарвленням рубчика.

Маса 1000 насінин - середня.

Середньопізній, вегетаційний період - 89 - 96 діб. Інтенсивного типу. Придатний до механізованого збирання

Агротехніка звичайна для зони вирощування. Урожайний. За роки випробування на обласних державних центрах експертизи сортів рослин отримали середній урожай 35,2 - 36,6 ц/ га, що на 3,1 - 3,8 ц / га більше стандартів .

Високобілковий , білка має 23,7- 25,6 %. Стійкий до посухи . Сорт стійкий до аскохітозу та антракнозу . Кореневими гнилями пошкоджується на

рівні стандартів.

Рекомендований для поширення в зонах Лісостепу та Полісся .

04001009 Царевич

Заявник: **Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Рослини сорту за висотою низькі, без антоціанового забарвлення, з відсутніми вторинними листочками (вусаті), мають дві-три квітки на вузлі, ранній час цвітіння та середній час достигання.

Стебло нефасційоване коротке з середньою кількістю вузлів.

Листок помірно зелений, без сіруватого забарвлення, з середньої довжини черешком від пазухи до першого вусика.

Прилисток добре розвинений, з наявною формою "кролячих вух" та з відсутнім восковим нальотом, має середні довжину та ширину з малою щільністю плямистості.

Квітка з малою довжиною квітконіжки від стебла до першої квітки, має середню ширину чашолистка з загостреною формою верхівки верхнього чашолистика.

Парус має білий колір з середньою максимальною його шириною, піднесеною формою основи та помірною інтенсивністю хвилястості.

Біб - жовтого кольору, має середню кількість насінних зачатків, довгий, середньої ширини, з наявною пергаментністю, з увігнутим типом вигину та слабким ступенем його прояву.

Насінина сферичної форми, має прості крохмальні зерна, сім'ядолі жовтого кольору без зморшкуватості. Інтенсивність зеленого забарвлення нестиглих насінин слабка. Чорне забарвлення рубчика насінини - відсутнє.

Маса 1000 насінин - середня.

Тип розвитку - ярий .Середньостиглий, вегетаційний період - 84 - 92 діб .Різновидність - екадукум . Напівінтенсивного типу, придатний до механізоапного збирання. За даними Заявника норма висіву 1,1- 1,3 млн./ га схожих насінин.

Агротехніка звичайна для зони вирощування. Урожайний. За роки випробування отримали середній урожай на обласних державних центрах експертизи сортів рослин - 34,4 - 35,2 ц / га, що на 0,9 - 3,7 ц / га більше стандартів .

Вміст сирого протеїну - 22,6 - 23,6 %. Сорт стійкий до аскохітозу та антракнозу. Кореневими гнилями пошкоджується на рівні стандартів .

Рекомендований для поширення в зонах Лісостепу та Полісся

Сочевиця

05089001 Лінза

Заявник: Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Сім'ядольний листочок у рослин сорту зеленувато-жовтий.

Рослина під час цвітіння середньої висоти, пряма, без антоціанового забарвлення, середньою інтенсивністю галуження, середніми показниками часу цвітіння та достигання.

Листок має середню кількість листочків. Листочки середні за розміром, оберненояйцевидної форми, зеленого кольору середньої інтенсивності.

Суцвіття з трьома квітками на вузлі. Квітка середнього розміру. Парус білого кольору з наявними фіолетовими смугами на ньому та відсутніми фіолетовими смугами на веслах.

Біб перед збиральною стиглістю середньої інтенсивності забарвлення, має два або три насінних зачатки. У фазі повної стиглості колір бобу - жовтий, має середні показники довжини та ширини. Форма верхівки бобу – від усіченої до гострої.

Сухе насіння - однокольорове (зеленувато-жовте), широке, з еліптичним поздовжнім розрізом.

Маса 1000 насінин – середня.

Вегетаційний період рослин сорту - 85 діб. Урожайність зерна за стандартної вологості - 17,4 ц/га. Вміст протеїну - 27 %. Збір білка - 4,2 ц/га. Ураження аскохітозом - 1 бал, кореневими гнилями - 2. Стійкість до вилягання та обсипання - по 4 бали.

Тривалість розварюваності зерна та смак звареного зерна оцінено по 5 балів.

Нут

05088001 Буджак

Заявник: Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Рослини сорту середньої висоти із сильною інтенсивністю галуження та напівпрямостоячим положенням після цвітіння, мають ранні показники часу як цвітіння, так і збирання.

Стебло без антоціанового забарвлення з високим прикріпленням першої квітки. Листки помірно зелені, з великою листковою пластинкою за розміром. Квітки - білі, мають середньої довжини пелюстки.

Біб дуже великий з коротким носиком, має переважно два насінних зачатки. Насіння світло-бежевого кольору. Форма насінини - від круглої до кутастої, з відсутньою або дуже слабкою ребристістю. Маса 100 насінин – дуже велика.

Сорт має вегетаційний період 90 діб. Товарний урожай рослин сорту становить 1,8 т/га при вмісті сирого протеїну - 27,4 % та загальній вирівняності зерна - 95 %, а фракції 5,5 - 5,0 – 100-93 % . Збір білка – 4,2 ц/га.

Оцінка стійкості до обсипання – 5 балів, вилягання – 4, посухостійкості – 5, механізованого збирання – 5 балів. Ураження аскохітозом та кореневими гнилями – по 4 бали.

Час варіння зерна зі смаковими якостями його – оцінено по 5 балів.

Сільськогосподарські: круп'яні

Гречка

05002001 Амазонка

Заявник: **Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича агрофірма "Землеробець"**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Сорт диплоїдний. Рослина за габітусом слаборозлогого типу, висока (більше 91-110 см), з середньою кількістю гілок (4-6), має середні час настання масового цвітіння (26-32 доби) та достигання (71-80 діб).

Висота головного пагона (стебла) стосовно висоти гілок знаходитьсяна рівні гілок. Пагін слаборебристий, на третьому вузлі - товстий, з середніми зонами галуження та плодоутворення, має середню кількість вузлів у зоні галуження,.

Квітка - середня за рзміром, має блідо-червоний колір пиляків, грибоподібну форму нектарників та середньо ароматизована.

Пазушне суцвіття (третє суцвіття на головному пагоні) характеризується такими показниками: має середньої довжини квітконос, вузькоциліндричну форму середньої щільності та середню його довжину.

Термінальне (верхнє) суцвіття на головному пагоні - щиток, який має більше трьох китиць середньої довжини.

Плід довгий, середньої ширини, краплеподібної форми з середніми крилами, має середню довжину. Оплодень плоду зеленого кольору на час наливу, а за повного достигання стає світло-коричнеаим з наявними дрібними крапками та слабким восковим нальотом на ньому. Форма граней плоду - плеската, верхівки - гостра з середнім ступенем вираженням основи.

Сорт характеризується великою масою 1000 плодів і середніми показниками вирівняності та плівчастості.

Середня урожайність сорту за роки випробування в зоні Лісостепу - 17,9 ц/га. Вегетаційний період 92 доби. Сорт стійкий проти борошнистої роси, переноспорозу. Відносно стійкий до вилягання, осипання, засухи.

Вміст білку становить 14,9%, крупність ядра - 53,7%, плівчастість - 23,6%, вихід крупи - 71,0%.

Агротехніка звичайна для зони вирощування. Добрі результати дає при внесенні повного мінерального живлення.

05002003 Ювілейна 100

Заявник: **Сумський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Сорт диплоїдний. Рослина за габітусом компактна, детермінантного типу, дуже висока (більше 110 см), з середньою кількістю гілок (4-6), має середні час настання масового цвітіння (26-32 доби) та достигання (71-80 діб).

Висота головного пагона (стебла) стосовно висоти гілок знаходиться вище. Головний пагін - слабо ребристий, на третьому вузлі - товстий, з середньою зоною галуження та довгою зоною плодоутворення, має такі середні показники: кількість вузлів у зоні галуження, висоту прикріплень першої гілки та першого суцвіття.

Пагони з майже суцільним антоціановим забарвленням середньої інтенсивності. Вузли пагонів добре виражені, темно-зеленого кольору . Опушення перших двох вузлів середньої інтенсивності.

Третій листок має середні довжину, ширину та розмір. Листкова пластинка має середню товщину, слабо хвиляста, серцевиднотрикутна, зеленого кольору, зі слабовираженою антоціановою плямою біля основи та слабочервоним забарвленням жилок біля неї, слабким опушенням жилок з нижнього боку та нещільними волокнами на жилках.

Квітка - середнього розміру, гомостильного типу з блідо-рожевим кольором оцвітини та видовженою формою її листочків, роташування яких відокремлене. Квітка має блідо-червоний колір пиляків, овальну форму нектарників та слабкий аромат.

Пазушне суцвіття (третє суцвіття на головному пагоні) характеризується такими показниками: має середньої довжини квітконос, вузькоциліндричну форму середньої щільності та середню його довжину.

Термінальне (верхнє) суцвіття на головному пагоні - щиток, який складається з трьох китиць середньої довжини.

Плід - середніх розмірів (довжина та ширина), краплеподібної форми з малими крилами, має середні довжину та товщину плодоніжки. Оплодень плоду блідо-зеленого кольору на час наливу, а за повного достигання стає темно-сірим з наявними дрібними крапками та помірним восковим нальотом на ньому. Форма граней плоду - плеската, а верхівки - коротка з помірним ступенем вираженням основи.

Сорт характеризується великою масою 1000 плодів і середніми показниками вирівняності та плівчастості.

Середня урожайність сорту за роки випробування в зоні Полісся - 17,9 ц/га. Гарантована прибавка - 1,0 ц/га. Вегетаційний період - 97 діб.

Сорт стійкий проти борошнистої роси, переноспорозу. Відносно стійкий до вилягання, осипання, засухи.

Вміст білка становить 16,9%, крупність ядра - 39,0%, плівчастість - 23,7%, вихід крупи - 71,3%.

Агротехніка звичайна для зони вирощування. Добрі результати дає при внесенні повного мінерального живлення

Просо

05006002 Вітрило

Заявник: **Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Рослина висока, із середньою кількістю вузлів на головному стеблі, має пізній час викидання волоті.

Листки без антоціанового забарвлення, відносно стебла слабко - похилені. Прапорцевий листок має середні показники довжини та ширини.

Верхнє міжвузля - коротке, товсте.

Волоть - стиснута, довга, вузька, з відхиленими в 2-х напрямках гілочками, нещільна. Гілочки першого порядку середньої довжини, зі слабким ступенем звисання. Подушечки на гілочках виражені тільки у гілочок 1-го та 2-го порядків.

Колосок має еліптичну форму, жовтий. Колоскові луски без антоціанового забарвлення. Приймочка маточки -фіолетова.

Зернівка - середнього розміру, майже кулястої форми. Квіткові луски - жовті, грубі. Ядро (нешліфоване) також жовте. Плацентна пляма ядра - коричнева.

Маса 1000 зерен – велика.

Середня урожайність сорту за роки випробування в зоні Степу становила 31,3 ц/га. Гарантована прибавка - 2,6 ц/га. Вегетаційний період 87діб.

Сорт стійкий до хвороб, бактеріальної плямистості, сажки. Стійкий до посухи, осипання, полягання. Вміст білка - 14,8%, вихід крупи - с76,5%, плівчатість - 18,3%.

Агротехніка звичайна для зони вирощування.

05006001 Олітан

Заявник: **Веселоподільська дослідно-селекційна станція Інституту цукрових буряків Української академії аграрних наук**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Рослина середньої висоти, із середньою кількістю вузлів на головному стеблі, має середній час викидання волоті.

Листки з антоціаном, відносно стебла слабко - похилені. Прапорцевий листок має середні показники довжини та ширини.

Верхнє міжвузля середньої довжини, товсте.

Волоть - розлога, дуже довга, середньої ширини, із відхиленими в усі сторони гілочками, нещільна. Гілочки першого порядку довгі, з середнім ступенем звисання . Подушечки на гілочках виражені до 1/2 волоті.

Колосок має еліптичну форму, жовтий. Колоскові луски зі слабким антоціановим забарвленням. Приймочка маточки -рожева.
Зернівка - середнього розміру, майже кулястої форми. Квіткові луски - темно-жовті, грубі. Ядро (нешліфоване) - яскраво-жовте. Плацентна пляма ядра - коричнева.
Маса 1000 зерен – велика.

Середня урожайність сорту за роки випробування в зоні Степу - 30,8 ц/га., гарантована прибавка - 2,1 ц/га.
Вегетаційний період - 84 діб. Сорт стійкий проти хвороб бактеріальної плямистості, сажки та відносно стійкий до осипання, вилягання, засухи. Вміст білка - 12,5%, вихід крупи - 76,7%, плівчастість - 18,0%.
Середня урожайність сорту за роки випробування в зоні Полісся - 35,1 ц/га. Гарантована прибавка врожаю - 2,1 ц/га. Вегетаційний період - 106 діб. Сорт стійкий проти хвороб, бактеріальної плямистості, сажки та відносно стійкий до засухи, вилягання, осипання. Вміст білку - 12,9%, вихід крупи - 78,4%, плівчастість - 16,3%.
Агротехніка звичайна всіх зон вирощування.

Сорго зернове

05064003 Бургго

Заявник: Р2н

Власник(и):

Підтримувач(і):

Рослини сорту характеризуються раннім часом викидання волоті та дуже низькою висотою як на час викидання волоті , так і на час достигання та тонким стеблом.
Паросток із відсутнім або дуже слабким антоціановим забарвленням колеоптиля, відсутнім або дуже слабким забарвленням як дорсального боку першого листка, так і пазухи першого листка.
Листок із помірним антоціановим забарвленням листової пластинки у стадії 5-го листка та помірним зеленим забарвленням її за викидання волоті. За достигання третій листок від верхівки середньої довжини, вузький.
Прапорцевий листок має середнє обезбарвлення середньої жилки, яке світліше від забарвлення пластинки листка, та сильно жовте її забарвлення.
Волоть в кінці цвітіння середньої довжини. За достигання довжина волоті без шийки - також середня з середньою щільністю, симетричної форми, із середньою видимою шийкою над пазухою та середніми гілочками в середній її третині.
Квітка з квітконіжкою – середньої довжини. Остюк на нижній квітковій лусці відсутній або дуже слабко розвинутий. На час цвітіння колоскова луска жовто-зелена із відсутнім або дуже слабким антоціановим забарвленням і відсутнім або дуже слабким забарвленням опушення. На час достигання квітка стає чорною, середньої довжини.
Приймочка - середньої довжини із відсутнім або дуже слабким антоціановим забарвленням та помірним жовтим забарвленням. Забарвлення сухих тичинок після цвітіння - оранжево-червоне.
Зернівка після достигання світло-коричневого кольору, має округлу форму як зі спинки так і в профіль, з великим розміром зародка та середньою величиною поверхні, вкритою насінною шкіркою.
Структура ендосперму в зерні - на 1/2 склоподібна. Забарвлення склоподібного ендосперму – жовте.
Маса 1000 зерен - велика.

Середня урожайність сорту за роки випробування в зоні Лісостепу - 58,9 ц/га., гарантована різниця - 5,1 ц/га. Сорт відноситься до ранньостиглої групи стиглості. Маса 1000 зерен 29,5 г. Висота рослини 102 см. Стійкий до вилягання, засухи. Стійкий проти, пухирчатої сажки. Вміст білка - 9,8 %. Вміст крохмалю - 73,4 %.

Сориз

03330002 Аполлон

Заявник: Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Паросток - світло-зеленого кольору. Рослини сорту мають ранні строки кущіння та викидання волоті. Висота рослин на цей час - середня. Рослини на час достигання низькі та характеризуються середньою здатністю до кущистості та слабкою здатністю до гілкування, мають тонке головне стебло та середню його залистяність.

Листок на час викидання волоті помірно зелений. На час дозрівання листок за довжиною – короткий та вузький.

Прапорцевий листок на час викидання волоті має відсутнє або слабке знебарвлення середньої жилки. Інтенсивність зеленого забарвлення середньої жилки порівняно з пластинкою листка світліша, а жовте її забарвлення слабке.

Квітка середньої довжини. Приймочка також середньої довжини, помірно жовтого забарвлення. На нижній квітковій лусці остюк або відсутній, або дуже слабко розвинений. Сухі тичинки - тьмяно-жовтого кольору.

Волоть на кінець цвітіння, помірно щільна. На час достигання волоть також помірно щільна, пірамідальна, має середню довжину без шийки та середні за довжиною гілочки першого порядку в середній третині волоті. Шийка волоті над пазухою – середня.

Зернівка після достигання світло-жовтого кольору, має еліптичні форми як зі спинки, так і в профіль, середній розмір зародку, дуже відкриту поверхню від насінної шкірки.

Структура ендосперму зерна в поздовжньому розрізі на 3/4 склоподібна з високими екструзивною здатністю та твердістю, світло-жовтого кольору.

Маса 1000 зерен – велика.

Середня урожайність сорту за роки випробування в зоні Степу - 40,8 ц/га., гарантована прибавка - 7,0 ц/га. Сорт відноситься до ранньостиглої групи. Маса 1000 зерен - 34,5 г. Висота рослин - 90 см. Стійкий до вилягання, засухи. Стійкий проти пухирчастої сажки. Вміст білка -14,5 %. Вміст крохмалю - 71 %.

05330001 Кварц

Заявник: Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Паросток світло-зеленого кольору. Рослини сорту мають середні строки кущіння та викидання волоті. Висота рослин на цей час низька. На час достигання рослини також низькі та характеризуються слабкою здатністю до кущистості та відсутньою здатністю до гілкування, мають товсте головне стебло та сильну його залистяність.

Листок на час викидання волоті - світло-зелений. На час дозрівання листок - довгий та широкий.

Прапорцевий листок на час викидання волоті має сильне знебарвлення середньої жилки. Інтенсивність зеленого забарвлення середньої жилки порівняно з пластинкою листка світліша, а жовте її забарвлення - помірне.

Квітка за довжини - довга. Приймочка середньої довжини, має сильне жовте забарвлення. Остюки на нижній квітковій лусці мають слабкий розвиток. Сухі тичинки світло-жовтого кольору.

Волоть на кінець цвітіння - нещільна. На час достигання волоть також нещільна, овальна, без шийки, довга та має середньої довжини гілочки першого порядку в середній третині волоті. Довжина шийки над пазухою – коротка.

Зернівка після достигання світло-жовтого кольору, має еліптичну форму як зі спинки, так і в профіль, середній розмір зародка, наполовину

відкриту поверхню від насінної шкірки.

Структура ендосперму зерна в поздовжньому розрізі на 3/4 склоподібна з високими твердістю та екструзивною здатністю, жовтого кольору.

Маса 1000 зерен – середня.

Середня урожайність сорту за роки випробування в зоні Степу - 41,5 ц/га, гарантована прибавка - 7,7 ц/га. Сорт відноситься до ранньостиглої групи. Маса 1000 зерен - 34,8 г. Висота рослин - 95 см.

Стійкий до вилягання, засухи. Стійкий проти пухирчастої сажки. Вміст білка -13,8 %. Вміст крохмалю - 71 %.

04330001 Салют

Заявник: **Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Паросток яскраво-зеленого кольору. Рослини сорту мають ранні строки кущіння та викидання волоті. Висота рослин на цей час середня. На час достигання рослини також середньої висоти та характеризуються середньою здатністю до кущистості та відсутньою здатністю до гілкування, мають тонке головне стебло та середню його залистяність.

Листок на час викидання волоті помірно зелений. На час дозрівання третій листок від волоті має параметри середньої довжини та ширини.

Прапорцевий листок на час викидання волоті має слабке знебарвлення середньої жилки. Інтенсивність зеленого забарвлення середньої жилки порівняно з пластинкою листка світліша, а жовте забарвлення її відсутнє або дуже слабке.

Квітка за довжини - коротка. Приймочка за довжиною – також коротка, має помірно жовте забарвлення. На нижній квітковій лусці остюк або відсутній, або слабко розвинений. Сухі тичинки - тьмяно-жовтого кольору.

Волоть на кінець цвітіння помірно щільна. На час достигання волоть також помірно щільна, еліпсоподібна, має середню довжину без шийки та середньої довжини гілочки першого порядку в середній третині волоті. Шийка волоті над пазухою – середня.

Зернівка після достигання світло-жовтого кольору, має еліптичну форму як зі спинки, так і в профіль, малий розмір зародка, дуже відкриту поверхню від насінної шкірки.

Структура ендосперму зерна в поздовжньому розрізі повністю склоподібна із дуже високими твердістю та екструзивною здатністю, жовтого кольору.

Маса 1000 зерен – велика.

Середня урожайність сорту за роки випробування в зоні Степу - 41,5 ц/га, гарантована прибавка - 7,7 ц/га. Сорт відноситься до ранньостиглої групи. Маса 1000 зерен - 35,2 г. Висота рослин - 90 см.

Стійкий до вилягання та засухи. Стійкий проти пухирчастої сажки. Вміст білка - 14,7 %. Вміст крохмалю - 70 %.

06330002 Титан

Заявник: **Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Паросток - яскраво-зеленого кольору. Рослини сорту мають середні строки кущіння та викидання волоті. Висота рослин на цей час низька. На час достигання рослини середньої висоти та характеризуються середньою здатністю до кущистості та слабкою здатністю до гілкування, мають тонке головне стебло та середню його залистяність.

Листок на час викидання волоті помірно зелений. На час дозрівання третій від волоті листок середньої довжини, вузький.

Прапорцевий листок на час викидання волоті має помірне знебарвлення середньої жилки. Інтенсивність зеленого забарвлення середньої жилки

порівняно з пластинкою листка світліша, а жовте забарвлення її відсутнє або дуже слабке.

Квітка за довжини - коротка. Приймочка за довжиною – також коротка, помірно жовтого забарвлення. На нижній квітковій лусці остюк або відсутній, або дуже слабко розвинений. Сухі тичинки - тьмяно-жовтого кольору.

Волоть на кінець цвітіння помірно щільна, На час достигання волоть також помірно щільна, конусоподібна, має середню довжину без шийки та середні за довжиною гілочки першого порядку в середній третині волоті. Шийка волоті над пазухою – середня.

Зернівка після достигання світло-жовтого кольору, має еліптичну форму зі спинки, а в профіль – вузькоеліптичну, малий розмір зародку, наполовину відкриту поверхню від насінної шкірки.

Структура ендосперму зерна в поздовжньому розрізі на 3/4 склоподібна з середніми показниками твердості та екструзивної здатності, жовтого кольору.

Маса 1000 зерен – велика.

Середня урожайність сорту за роки випробування в зоні Степу - 39,1 ц/га, гарантована прибавка - 5,3 ц/га. Сорт відноситься до ранньостиглої групи. Маса 1000 зерен - 35,6 г. Висота рослин - 95 см.

Стійкий проти вилягання, засухи. Стійкий проти пухирчастої сажки. Вміст білка - 13,5 %. Вміст крохмалю - 72 %.

Рис

05009002 Аметист

Заявник: **Всеросійський науково-дослідний інститут рису**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Рослини сорту із безбарвним колеоптиле, відсутньою чоловічою стерильністю, мають пряме положення стебел із середнім часом як викидання волоті, так і її достигання.

Стебло - довге, має середню товщину без антоціанового забарвлення вузлів і міжвузлів.

Листки - середньої довжини та ширини, з помірною інтенсивністю зеленого забарвлення, без антоціанового забарвлення, відсутньою або дуже слабкою опушеністю поверхні пластинки та середнім старінням (пожовтінням): на час збирання врожаю один листок зберігає свій колір.

Шийка та вушка - без антоціанового забарвлення. Язичок подвійний і безбарвний.

Прапорцевий листок як за раннього обстеження, так за пізнього має напівпряме положення пластинки.

Рослини сорту мають середню кількість волотей без остюків з середньою довжиною головної осі та напівпрямим її вигином, з явним проявом основи верхнього міжвузля та з сильним наявним вторинним гілкування. Положення гілок волоті - від прямого до напівпрямого.

Колосок із білим забарвленням приймочки, має коротку нижню стерильну колоскову луску солом'яного кольору.

Нижня квіткова луска зі слабким антоціановим забарвленням кіля та відсутнім або дуже слабким антоціановим забарвлення як зони під її верхівкою, так і самої верхівки, з помірним її опушенням та жовтуватим кольором її верхівки.

Зернівка - довга та вузька. Маса 1000 розвинених зерен - велика. Обрушена зернівка білого кольору, без запаху, має напівкруглий вигляду збоку, довга та вузька.

Ендосперм – неглютинозний, має менше 5 % амілази та повністю дигестує (розщеплюється).

Середня урожайність сорту за роки випробування в зоні Степу - 74,4 ц/га. Гарантована прибавка - 3,2 ц/га. Відноситься до середньостиглої групи. Має подовжену форму зерна. Висота рослин - 104 см.

Сорт стійкий проти хвороб пірикуляріозу та кореневої гнилі. Стійкий до осипання, вилягання. Вихід крупи - 67,0 %, плівчастість - 17,1 %, склоподібність - 94 %.

05009001 Янтар

Заявник: **Всеросійський науково-дослідний інститут рису**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Рослини сорту із безбарвним колеоптиле, відсутньою чоловічою стерильністю, мають пряме положення стебел із середнім часом як викидання волоті, так і її достигання.

Стебло середніх довжини та товщини без антоціанового забарвлення вузлів і міжвузлів.

Листки - довгі, середньої ширини з помірною інтенсивністю зеленого забарвлення, без антоціанового забарвлення, відсутньою або дуже слабкою опушеністю поверхні пластинки та середнім старінням (пожовтінням): на час збирання врожаю один листок зберігає свій колір..

Шийка та вушка - без антоціанового забарвлення. Язичок подвійний і безбарвний.

Прапорцевий листок як за раннього обстеження, так за пізнього має напівпряме положення пластинки.

Рослини сорту мають середню кількість волотей без остюків з середньою довжиною головної осі та напівпрямим її вигином, з явним проявом основи верхнього міжвузля та з сильним наявним вторинним гілкування. Положення гілок волоті - напівряме.

Колосок з білим забарвленням приймочки, має коротку нижню стерильну колоскову луску солом'яного кольору.

Нижня квіткова луска з відсутнім або дуже слабким антоціановим забарвленням як кіля та зони під верхівкою, так і самої верхівки, зі слабким її опушенням та жовтуватим кольором її верхівки.

Зернівка має середні довжину та ширину. Маса 1000 розвинених зерен - велика. Обрушена зернівка білого кольору, без запаху, має напівкруглий вигляду збоку, середні довжину та ширину.

Ендосперм – неглютинозний, має менше 5 % амілази та повністю дигестує (розщеплюється).

Рослини сорту з безбарвним колеоптиле, відсутньою чоловічою стерильністю, мають пряме положення стебел з середнім часом як викидання волоті, так і її достигання.

Стебло середніх довжини та товщини без антоціанового забарвлення вузлів і міжвузлів.

Листки довгі, середньої ширини з помірною інтенсивністю зеленого забарвлення, без антоціанового забарвлення, відсутньою або дуже слабкою опушеністю поверхні пластинки та середнім старінням (пожовтінням): на час збирання врожаю один листок зберігає свій колір..

Шийка та вушка - без антоціанового забарвлення. Язичок - подвійний і безбарвний.

Прапорцевий листок як за раннього обстеження, так за пізнього має напівпряме положення пластинки.

Рослини сорту мають середню кількість волотей без остюків з середньою довжиною головної осі та напівпрямим її вигином, з явним проявом основи верхнього міжвузля та сильним наявним вторинним гілкування. Положення гілок волоті - напівряме.

Колосок із білим забарвленням приймочки, має коротку нижню стерильну колоскову луску солом'яного кольору.

Нижня квіткова луска з відсутнім або дуже слабким антоціановим забарвленням як кіля та зони під верхівкою, так і самої верхівки, зі слабким її опушенням та жовтуватим кольором її верхівки.

Зернівка має середні довжину та ширину. Маса 1000 розвинених зерен - велика. Обрушена зернівка білого кольору, без запаху, має напівкруглий вигляду збоку, середні довжину та ширину.

Ендосперм – неглютинозний, має менше 5 % амілази та повністю дигестує (розщеплюється).

Середня урожайність сорту за роки випробування в зоні Степу - 68.9 ц/га. Відноситься до середньостиглої групи. Має подовжену форму зерна. Висота рослин - 98 см. Сорт стійкий проти хвороб, пірикуляріозу, кореневої гнилі. Стійкий до осипання, вилягання. Вихід крупи - 70,0 %, склоподібність - 96 %, плівчастість - 16,7 %.

За якісними показниками сорт відноситься до цінного.

Сільськогосподарські: олійні та прядивні

Соняшник

04017070 Айдар

Заявник: Луганський інститут селекції і технологій у формі товариства з обмеженою відповідальністю

Власник(и):

Підтримувач(і):

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилю - помірна. Листок середнього розміру з слабкою пухирчастістю, зубці та вушка - помірні. Форма поперечного розрізу листка - плеската. Опушеність верхівки стебла слабка. Час цвітіння дуже ранній. Язичкові квітки щільні, помірно жовті, вузькояйцевидної форми та середньої довжини. Трубчасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніших листків обгортки - чітко видовжені й чітко округлі, верхівка середньої довжини, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки - помірний. Рослина середньої висоти, галуження відсутнє. Положення кошика - обернене донизу разом з прямим стеблом, розмір кошика - середній, форма кошика (з боку сім'янок) - сильно випукла. Сім'янка середнього розміру, широкояйцеподібної форми, за основним кольором - чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила - 26,7 ц/га, гарантована прибавка - 1,1 ц/га, у зоні Лісостепу – середня урожайність - 29,4 ц/га, гарантована прибавка - 4,1 ц/га. Потенційна урожайність - 50,1 ц/га. Вміст жиру - 49,1-51,2%, білка - 16,0-17,3%, вихід олії - 1274-1549 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

05017078 Аріадна Євраліс

Заявник: Євраліс Семанс

Власник(и):

Підтримувач(і):

Паросток має помірне антоціанове забарвлення гіпокотилю. Листок середнього розміру, пухирчатість слабка, зубці та вушка помірні. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушення верхівки стебла слабке. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності та довжини, помірно-жовтого кольору, вузько-яйцевидної форми. Трубчасті квітки оранжевого кольору. Зовнішні листки обгортки помірно-зеленого кольору, за формою чітко видовжені, верхівка середньої довжини. Рослина середня за висотою, галуження відсутнє. Кошик сильно випуклий, середнього розміру. Положення кошика напівобернене донизу разом із прямим стеблом. Сім'янка середнього розміру, широко-яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки дуже сильна, смугастість між краями сім'янки відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила 28,8 ц/га, гарантована прибавка 3,2 ц/га, у зоні Лісостепу – середня урожайність 28,1 ц/га, гарантована прибавка 2,8 ц/га. Потенційна урожайність 44,4 ц/га. Вміст жиру 48,8-49,9%, олеїнової кислоти 82,8%, білку 16,3-17,2%, вихід олії 1304-1435 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

06017016 Блейзер

Заявник: Сідс 2000

Власник(и):

Підтримувач(і):

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилю помірна. Листок середнього розміру з помірними пухирчатістю, зубцями та вушками. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушеність верхівки стебла сильна. Час цвітіння середній. Язичкові квітки щільні, помірно-жовті, вузько-

яйцевидної форми та середньої довжини. Трубчасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішнішніх листків обгортки- чітко округлі, верхівка середньої довжини, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина середньої висоти, галуження відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із прямим стеблом, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) сильно випукла. Сім'янка середнього розміру, вузько- яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки дуже сильна, смугастість між краями слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила 28,5 ц/га, гарантована прибавка 5,5 ц/га, у зоні Лісостепу – середня урожайність 28,7 ц/га, гарантована прибавка 4,8 ц/га. Потенційна урожайність 47,8 ц/га. Вміст жиру 49,2-51,9%, олеїнової кислоти 55,8%, білку 15,3-16,4%, вихід олії 1344-1476 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

05017065 Базальт

Заявник: Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Паросток має помірне антоціанове забарвлення гіпокотилю. Листок великий з слабкою пухирчатістю, зубці грубі, вушка помірні. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушення верхівки стебла помірне. Час цвітіння пізній. Язичкові квітки середньої щільності, довгі помірно-жовтого кольору, вузько-яйцевидної форми. Трубчасті квітки оранжевого кольору. Зовнішні листки обгортки темно-зеленого кольору, за формою чітко округлі, верхівка середньої довжини. Рослина висока, галуження відсутнє. Кошик середнього розміру, сильно випуклий. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла. Сім'янка середнього розміру, вузько-яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях та між краями сім'янки відсутня або дуже слабка.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила 30,6 ц/га, гарантована прибавка 4,2 ц/га, у зоні Лісостепу – середня урожайність 30,4 ц/га, гарантована прибавка 3,1 ц/га. Потенційна урожайність 52,1 ц/га. Вміст жиру 50,1-51,0%, білку 16,3-17,0%, вихід олії 1460-1656 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

05017065 Базальт

Заявник: Закрите акціонерне товариство " Селена"

Власник(и):

Підтримувач(і):

Паросток має помірне антоціанове забарвлення гіпокотилю. Листок великий з слабкою пухирчатістю, зубці грубі, вушка помірні. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушення верхівки стебла помірне. Час цвітіння пізній. Язичкові квітки середньої щільності, довгі помірно-жовтого кольору, вузько-яйцевидної форми. Трубчасті квітки оранжевого кольору. Зовнішні листки обгортки темно-зеленого кольору, за формою чітко округлі, верхівка середньої довжини. Рослина висока, галуження відсутнє. Кошик середнього розміру, сильно випуклий. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла. Сім'янка середнього розміру, вузько-яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях та між краями сім'янки відсутня або дуже слабка.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила 30,6 ц/га, гарантована прибавка 4,2 ц/га, у зоні Лісостепу – середня урожайність 30,4 ц/га, гарантована прибавка 3,1 ц/га. Потенційна урожайність 52,1 ц/га. Вміст жиру 50,1-51,0%, білку 16,3-17,0%, вихід олії 1460-1656 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

® 04017044 Боєць

Заявник: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Власник(и): Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Підтримувач(і):

Паросток має слабке антоціанове забарвлення гіпокотилю. Листок великий, пухирчастість помірна, зубці та вушка помірні. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушення верхівки стебла помірне. Час цвітіння дуже ранній. Язичкові квітки довгі, середньої щільності, помірно жовтого кольору, вузько яйцевидної форми. Трубчасті квітки оранжевого кольору. Зовнішні листки обгортки помірно зеленого кольору, за формою чітко округлі, верхівка середньої довжини. Рослина висока, галуження відсутнє. Кошик злегка випуклий, середнього розміру. Положення кошика напівобернене донизу разом з прямим стеблом. Сім'янка середнього розміру, широкояйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки дуже сильна, смугастість між краями сім'янки відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування у зоні Лісостепу становила - 27,6 ц/га, гарантована прибавка - 2,3 ц/га. Потенційна урожайність - 49,0 ц/га. Вміст жиру - 50,0%, білка - 16,8%, вихід олії - 1314 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

® 04017047 Богун

Заявник: **Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук**

Власник(и): **Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук**

Підтримувач(і):

Паросток має помірне антоціанове забарвлення гіпокотилю. Листок великий, пухирчатість помірна, зубці грубі, вушка помірні. Форма поперечного розрізу листка слабко увігнута. Опушення верхівки стебла помірне. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності та довжини, помірно-жовтого кольору, вузько-яйцевидної форми. Трубчасті квітки жовтого кольору. Зовнішні листки обгортки помірно-зеленого кольору, за формою чітко округлі, верхівка середньої довжини. Рослина висока, галуження відсутнє. Кошик середній, сильно випуклий. Положення кошика обернене донизу разом із прямим стеблом. Сім'янка середнього розміру, широко-яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки дуже сильна, смугастість між краями слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування у зоні Лісостепу становила 27,3 ц/га, гарантована прибавка 2,0 ц/га. Потенційна урожайність 46,5 ц/га. Вміст жиру 50,0%, олеїнової кислоти 60,5%, білку 16,2%, вихід олії 1636 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

04017053 Гайдук

Заявник: **Товариство з обмеженою відповідальністю "Незалежна аграрна індустрія"**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Паросток має сильне антоціанове забарвлення гіпокотилю. Листок великий з слабкою пухирчастістю, зубці та вушка помірні. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушення верхівки стебла відсутнє або дуже слабке. Час цвітіння середній. Язичкові квітки довгі, середньої щільності, помірно жовтого кольору, вузькояйцевидної форми. Трубчасті квітки жовтого кольору. Зовнішні листки обгортки помірно зеленого кольору, за формою чітко округлі, верхівка середньої довжини. Рослина висока, галуження відсутнє. Кошик середнього розміру, злегка випуклий. Положення кошика обернене донизу разом з легким викривленням стебла. Сім'янка середнього розміру, вузько- яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки дуже сильна, смугастість між краями сім'янки слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила - 25,3 ц/га, гарантована прибавка - 2,6 ц/га, у зоні Лісостепу – середня урожайність - 27,0 ц/га, гарантована прибавка - 3,1 ц/га. Потенційна урожайність - 42,6 ц/га. Вміст жиру - 48,0-49,8%, білку - 15,6-16,1%, вихід олії - 1276-1365 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

04017041 Доріана

Заявник: **КВС ЗААТ АГ**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Паросток має слабке антоціанове забарвлення гіпокотилю. Листок великий, пухирчастість слабка, зубці грубії, вушка - помірні. Форма поперечного розрізу листка - слабко увігнута. Опушення верхівки стебла помірне. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої довжини та щільності, помірно жовтого кольору, вузькояйцевидної форми. Трубчасті квітки оранжевого кольору. Зовнішні листки обгортки помірно зеленого кольору, за формою - чітко видовжені й чітко округлі, верхівка середньої довжини. Рослина висока, галуження відсутнє. Кошик сильно випуклий, середнього розміру. Положення кошика - обернене донизу разом з легким викривленням стебла. Сім'янка середнього розміру, вузько яйцеподібної форми, за основним кольором - чорна, смугастість на краях та між краями сім'янки слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила - 30,5 ц/га, гарантована прибавка - 4,9 ц/га, у зоні Лісостепу – середня урожайність - 33,5 ц/га, гарантована прибавка - 8,3 ц/га. Потенційна урожайність - 50,3 ц/га. Вміст жиру - 48,1-48,5%, білка - 17,0-17,8%, вихід олії - 1346-1440 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

05017079 ЕС Ізабелла

Заявник: **Євраліс Семанс**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Паросток має помірне антоціанове забарвлення гіпокотилю. Листок середнього розміру, пухирчастість слабка, зубці дрібні, вушка помірні. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушення верхівки стебла сильне. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої довжини та щільності, помірно жовтого кольору, веретеновидної форми. Трубчасті квітки оранжевого кольору. Зовнішні листки обгортки світло-зеленого кольору, за формою чітко видовжені, верхівка середньої довжини. Рослина середньої висоти, галуження лише біля основи. Кошик сильно випуклий, середнього розміру. Положення кошика - обернене донизу разом з прямим стеблом. Сім'янка середнього розміру, широко- яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки дуже сильна, смугастість між краями сім'янки відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила - 31,5 ц/га, гарантована прибавка - 5,9 ц/га, у зоні Лісостепу – середня урожайність - 33,8 ц/га, гарантована прибавка - 8,6 ц/га. Потенційна урожайність - 51,3 ц/га. Вміст жиру - 49,5-50,9%, білка - 16,1-17,0%, вихід олії - 1544-1629 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, відносно стійкий до ураження хворобами.

05017070 Ідальго

Заявник: **Лімагрейн Вернеуль Холдінг**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Антоціанове забарвлення гіпокотилю відсутнє. Листок середнього розміру, пухирчатість слабка, зубці дрібні, вушка - помірні. Форма поперечного розрізу листка - плеската. Опушення верхівки стебла помірне. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої довжини та щільності, помірно-жовтого кольору, вузько яйцевидної форми. Трубчасті квітки оранжевого кольору. Зовнішні листки обгортки помірно - зеленого кольору, за формою - чітко округлі, верхівка середньої довжини. Рослина сердньої висоти, галуження відсутнє. Кошик плескатий, середнього розміру. Положення кошика - напівобернене донизу разом із прямим стеблом. Сім'янка велика, широко яйцеподібної форми, за основним кольором - чорна, смугастість на краях сім'янки дуже сильна, смугастість між краями сім'янки слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила 32,7 ц/га, гарантована прибавка 5,6 ц/га, у зоні Лісостепу – середня урожайність 34,3 ц/га, гарантована прибавка 7,8 ц/га. Потенційна урожайність 51,4 ц/га. Вміст жиру 48,0%, білку 15,8-16,8%, вихід олії 1487-1554 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

04017057 Кошовий

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Незалежна аграрна індустрія"

Власник(и):

Підтримувач(і):

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилю помірна. Листок великий за розміром з слабкою пухирчастістю, зубці та вушка помірні. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушення верхівки стебла помірне. Час цвітіння дуже ранній. Язичкові квітки довгі, середньої щільності, помірно жовті, вузько-яйцевидної форми. Трубчасті квітки жовтого кольору. Форма зовнішніх листків обгортки чітко округла, верхівка середньої довжини, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина висока, галуження відсутнє. Положення кошика напівобернене донизу разом з стеблом, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) злегка випукла. Сім'янка середнього розміру, широкояйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки дуже сильна, смугастість між краями слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила - 24,8 ц/га, гарантована прибавка - 2,1 ц/га, у зоні Лісостепу – середня урожайність - 27,2 ц/га, гарантована прибавка - 3,4 ц/га. Потенційна урожайність - 42,8 ц/га. Вміст жиру - 48,2-51,7%, білка - 17,4-18,6%, вихід олії - 1237-1459 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

04017030 Кандела

Заявник: Лімагрейн Вернеуль Холдінг

Власник(и):

Підтримувач(і):

Паросток має слабке антоціанове забарвлення гіпокотилю. Листок середнього розміру, пухирчатість та зубці помірні, вушка великі. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушення верхівки стебла сильне. Час цвітіння середній. Язичкові квітки довгі, середньої щільності, помірно-жовтого кольору, вузько-яйцевидної форми. Трубчасті квітки жовтого кольору. Зовнішні листки обгортки помірно-зеленого кольору, за формою чітко видовжені й чітко округлі, верхівка довга. Рослина висока, галуження відсутнє. Кошик плескатий, середнього розміру. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла. Сім'янка середнього розміру, широко-яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями сім'янки відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила 27,2 ц/га, гарантована прибавка 0,8 ц/га, у зоні Лісостепу – середня урожайність 28,3 ц/га, гарантована прибавка 1,0 ц/га. Потенційна урожайність 45,4 ц/га. Вміст жиру 50,8-51,4%, білку 15,8-16,2%, вихід олії 1406-1522 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

® 04017045 Квін

Заявник: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Паросток має сильне антоціанове забарвлення гіпокотилю. Листок великий, пухирчастість та вушка помірні, зубці дрібні. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушення верхівки стебла помірне. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої довжини та щільності, помірно жовтого кольору, вузькояйцевидної форми. Трубчасті квітки жовтого кольору. Зовнішні листки обгортки помірно зеленого кольору, за формою чітко видовжені й чітко округлі, верхівка довга. Рослина висока, галуження відсутнє. Кошик сильно випуклий, середнього розміру. Положення кошика - обернене донизу разом з легким викривленням стебла. Сім'янка середнього розміру, широкояйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями сім'янки відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила - 26,3 ц/га, гарантована прибавка - 0,7 ц/га, у зоні Лісостепу – середня урожайність - 28,3 ц/га, гарантована прибавка - 3,0 ц/га. Потенційна урожайність - 53,0 ц/га. Вміст жиру - 49,9-50,8%, білка - 16,0-17,1%, вихід олії - 1308-1418 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

05017052 Капрал

Заявник: **Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Паросток має слабке антоціанове забарвлення гіпокотилю. Листок середнього розміру, пухирчатість та зубці помірні, вушка великі. Форма поперечного розрізу листка слабко увігнута. Опушення верхівки стебла помірне. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої довжини та щільності, помірно-жовтого кольору, вузько-яйцевидної форми. Трубчасті квітки оранжевого кольору. Зовнішні листки обгортки світло-зеленого кольору, за формою чітко округлі, верхівка середньої довжини. Рослина середньої висоти, галуження відсутнє. Кошик злегка випуклий, середнього розміру. Положення кошика напівобернене донизу разом із стеблом. Сім'янка середнього розміру, широко-яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями сім'янки відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила 25,8 ц/га, гарантована прибавка 0,2 ц/га, у зоні Лісостепу – середня урожайність 27,5 ц/га, гарантована прибавка 2,2 ц/га. Потенційна урожайність 47,1 ц/га. Вміст жиру 50,0-51,0%, пальмітинової кислоти 20,1%, білку 15,6-16,4%, вихід олії 1322-1392 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

06017011 Коралія КС

Заявник: **Кассад Семанс**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Паросток має помірне антоціанове забарвлення гіпокотилю. Листок середнього розміру, пухирчатість слабка, зубці дрібні, вушка великі. Форма поперечного розрізу листка слабко увігнута. Опушення верхівки стебла слабке. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності та довжини, помірно-жовтого кольору, вузько-яйцевидної форми. Трубчасті квітки оранжевого кольору. Зовнішні листки обгортки помірно-зеленого кольору, за формою чітко видовжені, верхівка довга. Рослина висока, галуження відсутнє. Кошик сильно випуклий, середнього розміру. Положення кошика обернене донизу разом із сильним викривленням стебла. Сім'янка середнього розміру, широко-яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки дуже сильна, смугастість між краями сім'янки відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила 29,1 ц/га, гарантована прибавка 2,1 ц/га, у зоні Лісостепу – середня урожайність 30,9 ц/га, гарантована прибавка 4,4 ц/га. Потенційна урожайність 43,9 ц/га. Вміст жиру 52,4%, білку 15,6%, вихід олії 1614 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

04017072 Лиман

Заявник: **Луганський інститут селекції і технологій у формі товариства з обмеженою відповідальністю**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Паросток має помірне антоціанове забарвлення гіпокотилю. Листок середнього розміру, пухирчатість та зубці помірні, вушка - дуже великі. Форма поперечного розрізу листка - сильно увігнута. Опушення верхівки стебла сильне. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої довжини та щільності, помірно-жовтого кольору, вузько яйцевидної форми. Трубчасті квітки оранжевого кольору. Зовнішні листки обгортки помірно - зеленого

кольору, за формою - чітко видовжені, верхівка середньої довжини. Рослина висока, галуження відсутнє. Кошик сильно випуклий, середнього розміру. Положення кошика - обернене донизу разом із прямим стеблом. Сім'янка середнього розміру, вузько яйцеподібної форми, за основним кольором - чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями сім'янки відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила 26,4 ц/га, гарантована прибавка 0,8 ц/га, у зоні Лісостепу – середня урожайність 28,5 ц/га, гарантована прибавка 3,2 ц/га. Потенційна урожайність 51,8 ц/га. Вміст жиру 50,6-51,8%, олеїнової кислоти 72,0%, білку 15,6-16,8%, вихід олії 1374-1478 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

04017017 ЛГ 5412

Заявник: **Лімагрейн Вернеуль Холдінг**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Паросток має слабке антоціанове забарвлення гіпокотилю. Листок середнього розміру, пухирчатість слабка, зубці та вушка помірні. Форма поперечного розрізу листка слабко увігнута. Опушення верхівки стебла помірне. Час цвітіння дуже ранній. Язичкові квітки щільні, середньої довжини, помірно-жовтого кольору, вузько-яйцевидної форми. Трубчасті квітки оранжевого кольору. Зовнішні листки обгортки темно-зеленого кольору, за формою чітко видовжені, верхівка довга. Рослина висока, галуження відсутнє. Кошик сильно випуклий, середнього розміру. Положення кошика обернене донизу разом із сильним викривленням стебла. Сім'янка середнього розміру, широко-яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки дуже сильна, смугастість між краями сім'янки слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила 28,1 ц/га, гарантована прибавка 1,1 ц/га. Потенційна урожайність 46,6 ц/га. Вміст жиру 51,4%, білку 16,9%, вихід олії 1500 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

05017069 ЛГ 5669КЛ

Заявник: **Лімагрейн Вернеуль Холдінг**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Паросток має помірне антоціанове забарвлення гіпокотилю. Листок середнього розміру, пухирчатість відсутня або дуже слабка, зубці помірні, вушка великі. Форма поперечного розрізу листка слабко увігнута. Опушення верхівки стебла дуже сильне. Час цвітіння пізній. Язичкові квітки щільні, середньої довжини, помірно-жовтого кольору, вузько- яйцевидної форми. Трубчасті квітки оранжевого кольору. Зовнішні листки обгортки помірно-зеленого кольору, за формою чітко видовжені, верхівка середньої довжини. Рослина висока, галуження відсутнє. Кошик великий, плескатої форми. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла. Сім'янка середнього розміру, вузько-яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями сім'янки відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила 29,0 ц/га, гарантована прибавка 2,0 ц/га, у зоні Лісостепу – середня урожайність 30,8 ц/га, гарантована прибавка 4,3 ц/га. Потенційна урожайність 46,5 ц/га. Вміст жиру 48,8-50,8%, білку 15,6-16,6%, вихід олії 1348-1672 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

05017071 ЛГ 5450

Заявник: **Лімагрейн Вернеуль Холдінг**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилю помірна. Листок середнього розміру, пухирчатість слабка, зубці помірні, вушка великі. Форма

поперечного розрізу листка слабко увігнута. Опушеність верхівки стебла слабка. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності та довжини, помірно-жовті, вузько-яйцевидної форми. Трубчасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішнішніх листків обгортки чітко округлі, верхівка коротка, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина висока, галуження відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із сильним викривленням стебла, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) злегка випукла. Сім'янка середнього розміру, вузько-яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки дуже сильна, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила 28,2 ц/га, гарантована прибавка 1,1 ц/га, у зоні Лісостепу – середня урожайність 27,5 ц/га, гарантована прибавка 1,2 ц/га. Потенційна урожайність 44,0 ц/га. Вміст жиру 49,8-51,8%, білку 15,2-16,2%, вихід олії 1402-1659 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

05017093 МН 5319

Заявник: **Монсанто Інтернешнл Сьорл**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилю помірна. Листок середнього розміру, пухирчастість слабка, зубці помірні, вушка великі. Форма поперечного розрізу листка слабко увігнута. Опушення верхівки стебла помірне. Час цвітіння пізній. Язичкові квітки середньої довжини та щільності, помірно жовті, веретеновидної форми. Трубчасті квітки оранжевого кольору, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Зовнішні листки обгортки за формою чітко видовжені, верхівка за довжиною середня, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина середньої висоти, галуження відсутнє. Положення кошика - обернене донизу разом з легким викривленням стебла, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) злегка випукла. Сім'янка середнього розміру, широко- яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила - 32,6 ц/га, гарантована прибавка - 7,0 ц/га, у зоні Лісостепу – середня урожайність - 31,1 ц/га, гарантована прибавка- 5,9 ц/га. Потенційна урожайність - 46,6 ц/га. Вміст жиру - 49,5-51,4%, білка - 15,8-16,9%, вихід олії - 1420-1655 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

05017015 Мальком

Заявник: **Маісадур Семанс**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Антоціанове забарвлення гіпокотилю відсутнє. Листок середнього розміру з слабкою пухирчастістю, зубці помірні, вушка великі. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушення верхівки стебла слабке. Час цвітіння середній. Язичкові квітки щільні, середньої довжини, помірно жовті, вузькояйцевидної форми. Трубчасті квітки оранжевого кольору. Зовнішні листки обгортки помірно зеленого кольору, за формою чітко видовжені й чітко округлі, верхівка середньої довжини. Рослина висока, галуження відсутнє. Положення кошика напівобернене донизу разом з прямим стеблом, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) плеската. Сім'янка середнього розміру, вузько- яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями сім'янки відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила - 28,7 ц/га, гарантована прибавка - 5,7 ц/га, у зоні Лісостепу – середня урожайність - 32,7 ц/га, гарантована прибавка - 8,8 ц/га. Вміст жиру - 49,4-50,0%, білка - 17,0-18,6%, вихід олії - 1237-1438 кг/га. Потенційна урожайність - 49,5 ц/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

05017024 МАС 97А

Заявник: Маісадур Семанс

Власник(и):

Підтримувач(і):

Паросток має слабке антоціанове забарвлення гіпокотилю . Листок середнього розміру з слабкою пухирчастістю, зубці та вушка помірні. Форма поперечного розрізу листка сильно увігнута. Опушення верхівки стебла сильне. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності та довжини, помірно жовті, веретеновидної форми. Трубчасті квітки оранжевого кольору. Зовнішні листки обгортки темно-зеленого кольору, за формою чітко видовжені й чітко округлі, верхівка довга. Рослина висока, галуження відсутнє. Кошик великий, плескатий. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла. Сім'янка середнього розміру, вузькояйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями сім'янки відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила - 27,1 ц/га, гарантована прибавка - 4,1 ц/га, у зоні Лісостепу – середня урожайність - 32,6 ц/га, гарантована прибавка - 8,7 ц/га. Потенційна урожайність - 46,3 ц/га. Вміст жиру - 49,8-50,6%, білку - 16,4-17,9%, вихід олії - 1464-1496 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

05017017 МАС 96А

Заявник: Маісадур Семанс

Власник(и):

Підтримувач(і):

Антоціанове забарвлення гіпокотилю відсутнє . Листок середнього розміру з слабкою пухирчастістю, зубці та вушка помірні. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушення верхівки стебла слабке. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, короткі, помірно жовтого кольору, вузькояйцевидної форми. Трубчасті квітки оранжевого кольору. Зовнішні листки обгортки помірно зеленого кольору, за формою чітко видовжені й чітко округлі, верхівка середньої довжини. Рослина висока, галуження відсутнє. Кошик середнього розміру, сильно випуклий. Положення кошика обернене донизу разом з легким викривленням стебла. Сім'янка середнього розміру, широко- яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями сім'янки відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила - 29,7 ц/га, гарантована прибавка - 6,7 ц/га, у зоні Лісостепу – середня урожайність - 32,7 ц/га, гарантована прибавка - 8,8 ц/га. Потенційна урожайність - 51,1 ц/га. Вміст жиру - 48,9-51,9%, білка - 16,0-18,2%, вихід олії - 1278-1699 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

05017016 Мілонга

Заявник: Маісадур Семанс

Власник(и):

Підтримувач(і):

Паросток має помірне антоціанове забарвлення гіпокотилю. Листок середнього розміру з слабкою пухирчастістю, зубці та вушка помірні. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушення верхівки стебла помірне. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, короткі, помірно жовтого кольору, вузькояйцевидної форми. Трубчасті квітки оранжевого кольору. Зовнішні листки обгортки помірно зеленого кольору, за формою чітко видовжені й чітко округлі, верхівка коротка. Рослина середньої висоти, галуження відсутнє. Кошик середнього розміру, сильно випуклий. Положення кошика - напівобернене донизу разом з стеблом. Сім'янка середнього розміру, широкояйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями сім'янки відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила - 26,5 ц/га, гарантована прибавка - 3,5 ц/га, у зоні Лісостепу – середня урожайність - 31,0 ц/га, гарантована прибавка - 7,1 ц/га. Вміст жиру - 49,3-50,4%, білку - 16,7-17,8%, вихід олії - 1297-1628 кг/га. Потенційна урожайність - 49,4 ц/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

05017099 МАС 94С

Заявник: Маісадур Семанс

Власник(и):

Підтримувач(і):

Паросток має слабке антоціанове забарвлення гіпокотилю. Листок середнього розміру, пухирчастість слабка, зубці та вушка помірні. Форма поперечного розрізу листка слабко увігнута. Опушення верхівки стебла помірне. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої довжини та щільності, помірно жовтого кольору, вузькояйцевидної форми. Трубчасті квітки оранжевого кольору. Зовнішні листки обгортки темно-зеленого кольору, за формою чітко округлі, верхівка середньої довжини. Рослина висока, галуження відсутнє. Кошик злегка випуклий, середнього розміру. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла. Сім'янка середнього розміру, широкояйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях та між краями сім'янки слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила - 31,0 ц/га, гарантована прибавка - 8,0 ц/га, у зоні Лісостепу – середня урожайність - 34,1 ц/га, гарантована прибавка - 10,2 ц/га. Потенційна урожайність - 48,5 ц/га. Вміст жиру - 48,4-49,2%, білка - 16,0-17,5%, вихід олії - 1320-1508 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

05017067 Матеол РО

Заявник: КВС ЗААТ АГ

Власник(и):

Підтримувач(і):

Паросток має помірне антоціанове забарвлення гіпокотилю. Листок середнього розміру, пухирчастість слабка, зубці та вушка помірні. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушення верхівки стебла дуже сильне. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої щільності та довжини, помірно жовтого кольору, вузькояйцевидної форми. Трубчасті квітки оранжевого кольору. Зовнішні листки обгортки помірно зеленого кольору, за формою чітко округлі, верхівка середньої довжини. Рослина середня за висотою, галуження відсутнє. Кошик плескатий, середнього розміру. Положення кошика - обернене донизу разом з легким викривленням стебла. Сім'янка середнього розміру, широко- яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки дуже сильна, смугастість між краями сім'янки слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування у зоні Лісостепу становила - 34,4 ц/га, гарантована прибавка - 7,0 ц/га. Потенційна урожайність - 49,4 ц/га. Вміст жиру - 51,9%, білка - 16,2%, вихід олії -1571 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

04017060 НК Делфі

Заявник: Сінгента Сідз С.А.С.

Власник(и):

Підтримувач(і):

Паросток має помірне антоціанове забарвлення гіпокотилю. Листок великого розміру, пухирчатість слабка, зубці та вушка помірні. Форма поперечного розрізу листка слабко увігнута. Опушення верхівки стебла помірне. Час цвітіння середній. Язичкові квітки щільні, середньої довжини, помірно-жовтого кольору, вузько-яйцевидної форми. Трубчасті квітки оранжевого кольору. Зовнішні листки обгортки помірно-зеленого кольору, за формою чітко видовжені й чітко округлі, верхівка середньої довжини. Рослина висока, галуження відсутнє. Кошик сильно випуклий, середнього

розміру. Положення кошика напівобернене донизу разом із стеблом. Сім'янка середнього розміру, широко-яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях та між краями сім'янки відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила 33,7 ц/га, гарантована прибавка 7,2 ц/га, у зоні Лісостепу – середня урожайність 32,9 ц/га, гарантована прибавка 5,4 ц/га. Потенційна урожайність 51,3 ц/га. Вміст жиру 50,0-50,9%, білку 16,5-17,0%, вихід олії 1474-1521 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

06017007 НПК 1207

Заявник: **Товариство з обмеженою відповідальністю "Насіннева Приватна Компанія"**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Паросток має помірне антоціанове забарвлення гіпокотилю. Листок середнього розміру, пухирчастість, зубці та вушка помірні. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушення верхівки стебла помірне. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки щільні, середньої довжини, помірно жовтого кольору, вузькояйцевидної форми. Трубчасті квітки жовтого кольору. Зовнішні листки обгортки світло зеленого кольору, за формою чітко видовжені й чітко округлі, верхівка середньої довжини. Рослина висока, галуження відсутнє. Кошик сильно випуклий, середнього розміру. Положення кошика - обернене донизу разом з прямим стеблом. Сім'янка середнього розміру, вузькояйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки дуже сильна, смугастість між краями сім'янки слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила - 28,0 ц/га, гарантована прибавка - 2,4 ц/га, у зоні Лісостепу – середня урожайність - 29,2 ц/га, гарантована прибавка - 4,0 ц/га. Потенційна урожайність - 40,0 ц/га. Вміст жиру - 50,0-50,2%, білка - 16,2-16,9%, вихід олії - 1464-1500 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

06017001 НК Кантрі

Заявник: **Сінгента Сідз С.А.С.**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Паросток має помірне антоціанове забарвлення гіпокотилю. Листок середнього розміру, пухирчатість слабка, зубці та вушка помірні. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушення верхівки стебла відсутнє або дуже слабке. Час цвітіння середній. Язичкові квітки короткі, щільні, помірно-жовтого кольору, вузько-яйцевидної форми. Трубчасті квітки оранжевого кольору. Зовнішні листки обгортки помірно-зеленого кольору, за формою чітко видовжені, верхівка середньої довжини. Рослина середньої висоти, галуження відсутнє. Кошик злегка випуклий, великий. Положення кошика обернене донизу разом із сильним викривленням стебла. Сім'янка середнього розміру, широко-яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями сім'янки відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила 29,4 ц/га, гарантована прибавка 2,4 ц/га, у зоні Лісостепу – середня урожайність 33,4 ц/га, гарантована прибавка 6,9 ц/га. Потенційна урожайність 41,7 ц/га. Вміст жиру 48,2-49,0%, олеїнової кислоти 86,9%, білку 17,3-18,4%, вихід олії 1554-1688 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

06017006 НК Камен

Заявник: **Сінгента Сідз С.А.С.**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Паросток має слабке антоціанове забарвлення гіпокотилю. Листок середнього розміру, пухирчатість відсутня або дуже слабка, зубці дрібні, вушка

помірні. Форма поперечного розрізу листка плескатa. Опушення верхівки стебла слабке. Час цвітіння середній. Язичкові квітки щільні, середньої довжини, помірно-жовтого кольору, вузько-яйцевидної форми. Трубчасті квітки оранжевого кольору. Зовнішні листки обгортки помірно-зеленого кольору, за формою чітко округлі, верхівка середньої довжини. Рослина середня за висотою, галуження відсутнє. Кошик злегка випуклий, середнього розміру. Положення кошика напівобернене донизу разом із стеблом. Сім'янка середнього розміру, вузько-яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки дуже сильна, смугастість між краями сім'янки відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила 30,4 ц/га, гарантована прибавка 3,4 ц/га, у зоні Лісостепу – середня урожайність 32,3 ц/га, гарантована прибавка 5,8 ц/га. Потенційна урожайність 49,3 ц/га. Вміст жиру 48,8-50,4%, білку 16,7-17,4%, вихід олії 1446-1497 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

05017090 Оллеан

Заявник: **Р2н**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилю слабка. Листок середнього розміру, пухирчатість відсутня або дуже слабка, зубці дрібні, вушка малі. Форма поперечного розрізу листка плескатa. Опушеність верхівки стебла помірна. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки короткі, середньої щільності, помірно-жовті, вузько-яйцевидної форми. Трубчасті квітки оранжеві. Форма зовнішнішніх листків обгортки чітко видовжені й чітко округлі, верхівка середньої довжини, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина висока, галуження відсутнє. Положення кошика напівобернене донизу разом із прямим стеблом, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) сильно випукла. Сім'янка середнього розміру, видовженої форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила 29,0 ц/га, гарантована прибавка 2,6 ц/га, у зоні Лісостепу – середня урожайність 33,1 ц/га, гарантована прибавка 5,6 ц/га. Потенційна урожайність 45,4 ц/га. Вміст жиру 50,8-51,4%, білку 16,0-16,7%, вихід олії 1629-1729 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

03017005 Орасол

Заявник: **Монсанто Інтернешнл Сьорл**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Паросток має помірне антоціанове забарвлення гіпокотилю. Листок середнього розміру, пухирчатість слабка, зубці та вушка помірні. Форма поперечного розрізу листка плескатa. Опушення верхівки стебла сильне. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності та довжини, помірно-жовтого кольору, вузько-яйцевидної форми. Трубчасті квітки оранжевого кольору. Зовнішні листки обгортки світло зеленого кольору, за формою чітко видовжені й чітко округлі, верхівка довга. Рослина висока, галуження відсутнє. Кошик плескатий, середнього розміру. Положення кошика напівобернене донизу разом із прямим стеблом. Сім'янка середнього розміру, вузько-яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях та між краями сім'янки слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила 29,3 ц/га, гарантована прибавка 3,7 ц/га, у зоні Лісостепу – середня урожайність 27,8 ц/га, гарантована прибавка 2,6 ц/га. Потенційна урожайність 42,1 ц/га. Вміст жиру 49,0-49,9%, олеїнової кислоти 70,4%, білку 17,0-17,9%, вихід олії 1225-1345 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

04017066 Персей

Заявник: **Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково - виробнича фірма "Агротехнологія"**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Паросток має помірне антоціанове забарвлення гіпокотилю. Листок середнього розміру з слабкою пухирчастістю, зубці помірні, вушка великі. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушення верхівки стебла помірне. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої довжини та щільності, помірно жовтого кольору, вузькояйцевидної форми. Трубчасті квітки оранжевого кольору. Зовнішні листки обгортки помірно зеленого кольору, за формою чітко видовжені й чітко округлі, верхівка довга. Рослина середньої висоти, галуження відсутнє. Кошик середнього розміру, сильно випуклий. Положення кошика напівобернене донизу разом з прямим стеблом. Сім'янка середнього розміру, вузькояйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями сім'янки відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила - 24,0 ц/га, гарантована прибавка - 1,3 ц/га, у зоні Лісостепу – середня урожайність - 25,7 ц/га, гарантована прибавка - 2,0 ц/га. Потенційна урожайність - 43,5 ц/га. Вміст жиру - 49,7-50,2%, білку - 16,4-17,2%, вихід олії - 1312-1420 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

05017001 ПР64А89

Заявник: **Піонер Семена Холдінг ГезмбХ**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Антоціанове забарвлення гіпокотилю відсутнє. Листок середнього розміру з слабкою пухирчатістю, зубці дрібні, вушка малі. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушення верхівки стебла слабке. Час цвітіння пізній. Язичкові квітки середньої довжини та щільності, помірно-жовтого кольору, вузько-яйцевидної форми. Трубчасті квітки оранжевого кольору. Зовнішні листки обгортки помірно-зеленого кольору, за формою чітко видовжені й чітко округлі, верхівка середньої довжини. Рослина висока, галуження відсутнє. Кошик середнього розміру, сильно випуклий. Положення кошика обернене донизу разом із сильним викривленням стебла. Сім'янка середнього розміру, широко- яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки дуже сильна, смугастість між краями сім'янки слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила 34,2 ц/га, гарантована прибавка 7,0 ц/га, у зоні Лісостепу – середня урожайність 30,9 ц/га, гарантована прибавка 4,4 ц/га. Потенційна урожайність 51,1 ц/га. Вміст жиру 48,4-50,1%, білку 17,1-17,9%, вихід олії 1362-1552 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

05017073 ПР64Е83

Заявник: **Піонер Семена Холдінг ГезмбХ**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Паросток має слабке антоціанове забарвлення гіпокотилю. Листок великого розміру, пухирчатість відсутня або дуже слабка, зубці окремі або дуже дрібні, вушка помірні. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушення верхівки стебла помірне. Час цвітіння пізній. Язичкові квітки щільні, середньої довжини, помірно-жовтого кольору, вузько-яйцевидної форми. Трубчасті квітки оранжевого кольору. Зовнішні листки обгортки світло-зеленого кольору, за формою чітко видовжені й чітко округлі, верхівка довга. Рослина висока, галуження відсутнє. Кошик плескатий, середнього розміру. Положення кошика напівобернене донизу разом із прямим стеблом. Сім'янка середнього розміру, широко- яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки дуже сильна, смугастість між краями сім'янки слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила 32,8 ц/га, гарантована прибавка 6,3 ц/га, у зоні Лісостепу – середня урожайність 29,9 ц/га, гарантована прибавка 2,6 ц/га. Потенційна урожайність 47,3 ц/га. Вміст жиру 49,5%, білку 16,9%, вихід олії 1591 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

05017075 ПР63А86

Заявник: Піонер Семена Холдінг ГезмбХ

Власник(и):

Підтримувач(і):

Антоціанове забарвлення гіпокотилю відсутнє. Листок середнього розміру, пухирчастість помірна, зубці грубі, вушка великі. Форма поперечного розрізу листка слабко увігнута. Опушення верхівки стебла слабке. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої довжини та щільності, помірно жовтого кольору, вузькояйцевидної форми. Трубчасті квітки оранжевого кольору. Зовнішні листки обгортки помірнозеленого кольору, за формою чітко видовжені, верхівка середньої довжини. Рослина висока, галуження відсутнє. Кошик сильно випуклий, середнього розміру. Положення кошика - обернене донизу разом з легким викривленням стебла. Сім'янка середнього розміру, вузькояйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях та між краями сім'янки відсутня або дуже слабка.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила - 29,0 ц/га, гарантована прибавка - 3,4 ц/га, у зоні Лісостепу – середня урожайність - 30,4 ц/га, гарантована прибавка - 5,2 ц/га. Потенційна урожайність - 49,8 ц/га. Вміст жиру - 48,6-52,4%, білка - 16,2-17,5%, вихід олії - 1517-1522 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

06017018 ПСФ - 02

Заявник: Просід Інк.

Власник(и):

Підтримувач(і):

Паросток має помірне антоціанове забарвлення гіпокотилю. Листок середнього розміру, пухирчатість слабка, зубці та, вушка помірні. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушення верхівки стебла помірне. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності та довжини, помірно-жовтого кольору, вузько-яйцевидної форми. Трубчасті квітки оранжевого кольору. Зовнішні листки обгортки помірно-зеленого кольору, за формою чітко округлі, верхівка середньої довжини. Рослина висока, галуження відсутнє. Кошик сильно випуклий, середнього розміру. Положення кошика обернене донизу разом із сильним викривленням стебла. Сім'янка середнього розміру, широко- яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки дуже сильна, смугастість між краями сім'янки відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила 28,5 ц/га, гарантована прибавка 2,9 ц/га, у зоні Лісостепу – середня урожайність 30,7 ц/га, гарантована прибавка 5,3 ц/га. Потенційна урожайність 42,3 ц/га. Вміст жиру 49,9-50,0%, олеїнової кислоти 69,3%, білку 16,2-16,6%, вихід олії 1350-1383 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

05017086 Пасіфік

Заявник: Євраліс Семанс

Власник(и):

Підтримувач(і):

Паросток має сильне антоціанове забарвлення гіпокотилю. Листок середнього розміру, пухирчатість, зубці та вушка помірні. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушення верхівки стебла помірне. Час цвітіння середній. Язичкові квітки довгі, середньої щільності, помірно-жовтого кольору, веретеновидної форми. Трубчасті квітки оранжевого кольору. Зовнішні листки обгортки помірно-зеленого кольору, за формою чітко видовжені, верхівка середньої довжини. Рослина висока, галуження відсутнє. Кошик сильно випуклий, середнього розміру. Положення кошика напівобернене донизу разом із стеблом. Сім'янка середнього розміру, широко-яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки дуже сильна, смугастість між краями сім'янки слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила 28,3 ц/га, гарантована прибавка 2,8 ц/га, у зоні Лісостепу – середня урожайність 31,8 ц/га, гарантована прибавка 6,5 ц/га. Потенційна урожайність 47,9 ц/га. Вміст жиру 48,4-49,5%, олеїнової кислоти 84,4%, білку 16,4-17,3%, вихід олії 1422-1485 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

06017015 ПСФ 4639

Заявник: Сідс 2000

Власник(и):

Підтримувач(і):

Паросток має помірне антоціанове забарвлення гіпокотилю. Листок середнього розміру, пухирчатість слабка, зубці та, вушка помірні. Форма поперечного розрізу листка слабко увігнута. Опушення верхівки стебла помірне. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності та довжини, помірно-жовтого кольору, вузько-яйцевидної форми. Трубчасті квітки оранжевого кольору. Зовнішні листки обгортки помірно-зеленого кольору, за формою чітко видовжені, верхівка середньої довжини. Рослина середня за висотою, галуження відсутнє. Кошик малий, сильно випуклий. Положення кошика обернене донизу разом із прямим стеблом. Сім'янка середнього розміру, широко-яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки дуже сильна, смугастість між краями сім'янки слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила 29,8 ц/га, гарантована прибавка 6,8 ц/га, у зоні Лісостепу – середня урожайність 31,9 ц/га, гарантована прибавка 8,0 ц/га. Потенційна урожайність 48,9 ц/га. Вміст жиру 49,4-50,1%, олеїнової кислоти 80,2%, білку 15,8-16,9%, вихід олії 1406-1597 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

06017060 Румбасол ОР

Заявник: Монсанто Інтернешнл Сьорл

Власник(и):

Підтримувач(і):

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилю слабка. Листок середнього розміру, пухирчатість відсутня, зубці дрібні, вушка помірні. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушення верхівки стебла помірне. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої довжини та щільності, помірно-жовті, вузько-яйцевидної форми. Трубчасті квітки оранжевого кольору, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Зовнішні листки обгортки за формою чітко видовжені й чітко округлі, верхівка середньої довжини, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина середньої висоти, галуження відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із сильним викривленням стебла, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) злегка випукла. Сім'янка середнього розміру, вузько- яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила 30,7 ц/га, гарантована прибавка 4,2 ц/га. Потенційна урожайність 46,3 ц/га. Вміст жиру 50,6%, білку 16,0%, вихід олії 1447 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

03017029 Ригасол ОР

Заявник: Монсанто Інтернешнл Сьорл

Власник(и):

Підтримувач(і):

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилю помірна. Листок за розміром великий, пухирчастість відсутня, зубці та вушка помірні. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушення верхівки стебла дуже сильне. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої довжини та щільності, помірно жовтого кольору, вузькояйцевидної форми. Трубчасті квітки оранжевого кольору, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Зовнішні

листки обгортки за формою чітко видовжені й чітко округлі, верхівка середньої довжини, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина висока, галуження відсутнє. Положення кошика напівобернене донизу разом з стеблом, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) злегка випукла. Сім'янка середнього розміру, вузькояйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила - 25,1 ц/га, у зоні Лісостепу –24,7 ц/га. Потенційна урожайність - 44,7 ц/га. Вміст жиру - 48,0-48,6%, білка - 17,0-17,4%, вихід олії - 1395-1652 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

06017012 Рейна

Заявник: Мей Агро Сід Корпорейшн ((Мей Агро Тохумсулук Санаі ве Тісарет А.С)

Власник(и):

Підтримувач(і):

Паросток має слабке антоціанове забарвлення гіпокотилю. Листок середній, пухирчастість слабка, зубці грубі, вушка великі. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушення верхівки стебла помірне. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої довжини та щільності, помірно жовтого кольору, вузькояйцевидної форми. Трубчасті квітки оранжевого кольору. Зовнішні листки обгортки світло-зеленого кольору, за формою чітко видовжені й чітко округлі, верхівка коротка. Рослина висока, галуження відсутнє. Кошик сильно випуклий, середнього розміру. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла. Сім'янка середнього розміру, вузькояйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями сім'янки відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила - 27,8 ц/га, гарантована прибавка - 4,8 ц/га, у зоні Лісостепу – середня урожайність - 29,2 ц/га, гарантована прибавка - 5,32 ц/га. Потенційна урожайність - 43,4 ц/га. Вміст жиру - 48,2-49,1%, білка - 16,1-17,7%, вихід олії - 1237-1528 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

05017023 Спіру

Заявник: Маісадур Семанс

Власник(и):

Підтримувач(і):

Паросток має слабке антоціанове забарвлення гіпокотилю. Листок середнього розміру з слабкою пухирчастістю, зубці дрібні, вушка помірні. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушення верхівки стебла сильне. Час цвітіння середній. Язичкові квітки щільні, середньої довжини, помірно жовтого кольору, вузькояйцевидної форми. Трубчасті квітки оранжевого кольору. Зовнішні листки обгортки помірно зеленого кольору, за формою чітко видовжені, верхівка середньої довжини. Рослина висока, галуження відсутнє. Кошик середнього розміру, плескатий. Положення кошика обернене донизу разом з прямим стеблом. Сім'янка середнього розміру, вузькояйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями сім'янки відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила - 26,1 ц/га, гарантована прибавка - 3,4 ц/га, у зоні Лісостепу – середня урожайність - 29,7 ц/га, гарантована прибавка - 5,8 ц/га. Потенційна урожайність - 40,6 ц/га. Вміст жиру - 48,5-50,0%, білку - 16,4-18,4%, вихід олії - 1255-1626 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

04017071 Степок

Заявник: Луганський інститут селекції і технологій у формі товариства з обмеженою відповідальністю

Власник(и):

Підтримувач(і):

Паросток має слабке антоціанове забарвлення гіпокотилю. Листок середнього розміру з слабкою пухирчастістю, зубці помірні, вушка - великі. Форма поперечного розрізу листка - плеската. Опушення верхівки стебла помірне. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої довжини та щільності, помірно жовтого кольору, вузькояйцевидної форми. Трубчасті квітки оранжевого кольору. Зовнішні листки обгортки помірно зелені, за формою - чітко округлі, верхівка середньої довжини. Рослина середньої висоти, галуження відсутнє. Положення кошика - напівобернене донизу разом із прямим стеблом. Кошик середнього розміру, злегка випуклий. Сім'янка середнього розміру, широкояйцеподібної форми, за основним кольором - чорна, смугастість на краях та між краями сім'янки відсутня або дуже слабка.

Середня урожайність за період випробування у зоні Лісостепу становила - 25,2 ц/га, гарантована прибавка - 1,5 ц/га. Потенційна урожайність - 39,7 ц/га. Вміст жиру - 51,4%, білка - 15,7%, вихід олії - 1357 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

05017066 Сотник

Заявник: **Товариство з обмеженою відповідальністю "Насіння Луганщини"**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Паросток має помірне антоціанове забарвлення гіпокотилю. Листок великий, пухирчастість слабка, зубці та вушка помірні. Форма поперечного розрізу листка слабко увігнута. Опушення верхівки стебла помірне. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки щільні, середньої довжини, помірно жовтого кольору, вузькояйцевидної форми. Трубчасті квітки оранжевого кольору. Зовнішні листки обгортки темно-зеленого кольору, за формою чітко видовжені й чітко округлі, верхівка середньої довжини. Рослина висока, галуження відсутнє. Кошик плескатий, середнього розміру. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла. Сім'янка середнього розміру, широкояйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки дуже сильна, смугастість між краями сім'янки відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування у зоні Лісостепу становила - 25,7 ц/га, гарантована прибавка - 2,0 ц/га. Потенційна урожайність - 42,4 ц/га. Вміст жиру - 49,8%, білку - 15,5%, вихід олії - 1324 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

05017006 Сальза РМ

Заявник: **Євраліс Семанс**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Паросток має помірне антоціанове забарвлення гіпокотилю. Листок великий, пухирчатість слабка, зубці помірні, вушка великі. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушення верхівки стебла помірне. Час цвітіння дуже ранній. Язичкові квітки довгі, середньої щільності, помірно-жовтого кольору, веретеновидної форми. Трубчасті квітки жовтого кольору. Зовнішні листки обгортки помірно-зеленого кольору, за формою чітко округлі, верхівка середньої довжини. Рослина висока, галуження відсутнє. Кошик сильно випуклий, середнього розміру. Положення кошика вертикальне. Сім'янка середнього розміру, широко яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях та між краями сім'янки дуже сильна, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила 28,5 ц/га, гарантована прибавка 2,9 ц/га, у зоні Лісостепу – середня урожайність 32,0 ц/га, гарантована прибавка 6,7 ц/га. Потенційна урожайність 47,4 ц/га. Вміст жиру 51,2-52,2%, олеїнової кислоти 79,1%, білку 16,3-16,5%, вихід олії 1400-1469 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

04017019 Сольвіда

Заявник: **Лімагрейн Вернеуль Холдінг**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Паросток має слабке антоціанове забарвлення гіпокотилю. Листок середнього розміру, пухирчатість слабка, зубці та вушка помірні. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушення верхівки стебла слабке. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої довжини та щільності, помірно-жовтого кольору, вузько-яйцевидної форми. Трубчасті квітки оранжевого кольору. Зовнішні листки обгортки помірно зеленого кольору, за формою чітко округлі, верхівка середньої довжини. Рослина висока, галуження відсутнє. Кошик сильно випуклий, середнього розміру. Положення кошика напівобернене донизу разом із стеблом. Сім'янка середнього розміру, широко-яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях та між краями сім'янки відсутня або дуже слабка.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила 27,3 ц/га, гарантована прибавка 0,3 ц/га, у зоні Лісостепу – середня урожайність 27,7 ц/га, гарантована прибавка 1,3 ц/га. Потенційна урожайність 40,7 ц/га. Вміст жиру 51,0-52,1%, білку 15,9-16,8%, вихід олії 1458-1473 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

06017059 Форте ОР

Заявник: **Монсанто Інтернешнл Сьорл**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилю слабка. Листок середнього розміру, пухирчастість відсутня, зубці дрібні, вушка помірні. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушення верхівки стебла відсутнє або дуже слабке. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої довжини та щільності, помірно жовті, вузькояйцевидної форми. Трубчасті квітки оранжевого кольору, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Зовнішні листки обгортки за формою чітко видовжені й чітко округлі, верхівка за довжиною коротка, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина середньої висоти, галуження відсутнє. Положення кошика - напівобернене донизу разом з стеблом, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) злегка випукла. Сім'янка середнього розміру, вузько- яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила - 30,9 ц/га, гарантована прибавка - 4,4 ц/га. Потенційна урожайність - 42,0 ц/га. Вміст жиру - 50,3%, білка - 16,7%, вихід олії - 1548 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

05017053 Форвард

Заявник: **Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Паросток має помірне антоціанове забарвлення гіпокотилю. Листок малий, пухирчастість помірна, зубці дрібні, вушка дуже великі. Форма поперечного розрізу листка сильно увігнута. Опушення верхівки стебла слабке. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої довжини та щільності, помірно жовтого кольору, вузькояйцевидної форми. Трубчасті квітки оранжевого кольору. Зовнішні листки обгортки світло-зеленого кольору, за формою чітко видовжені й чітко округлі, верхівка середньої довжини. Рослина висока, галуження відсутнє. Кошик злегка випуклий, середнього розміру. Положення кошика - обернене донизу разом з прямим стеблом. Сім'янка середнього розміру, вузькояйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями сім'янки відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила - 29,2 ц/га, гарантована прибавка - 3,6 ц/га, у зоні Лісостепу – середня урожайність - 31,1 ц/га, гарантована прибавка - 5,8 ц/га. Потенційна урожайність - 48,7 ц/га. Вміст жиру - 50,0-50,8%, білка - 15,4-16,2%, вихід олії - 1368-1475 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

06017010 Фабіола КС

Заявник: **Кассад Семанс**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Паросток має помірне антоціанове забарвлення гіпокотилю. Листок середнього розміру, пухирчастість слабка, зубці та вушка помірні. Форма поперечного розрізу листка - плеската. Опушення верхівки стебла помірне. Час цвітіння пізній. Язичкові квітки середньої довжини та щільності, помірно жовтого кольору, вузькояйцевидної форми. Трубчасті квітки оранжевого кольору. Зовнішні листки обгортки помірно зеленого кольору, за формою чітко видовжені, верхівка довга. Рослина висока, галуження відсутнє. Кошик злегка випуклий, середнього розміру. Положення кошика - обернене донизу разом з прямим стеблом. Сім'янка середнього розміру, широкояйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях та між краями сім'янки відсутня або дуже слабка.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила - 34,5 ц/га, гарантована прибавка - 8,9 ц/га, у зоні Лісостепу – середня урожайність - 33,5 ц/га, гарантована прибавка - 8,2 ц/га. Потенційна урожайність - 50,2 ц/га. Вміст жиру - 51,5-53,2%, білка - 15,8-16,7%, вихід олії - 1568-1820 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

05017084 Філліа

Заявник: **Р2н**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Антоціанове забарвлення гіпокотилю відсутнє. Листок середнього розміру, пухирчастість відсутня або дуже слабка, зубці дрібні, вушка помірні. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушення верхівки стебла слабке. Час цвітіння середній. Язичкові квітки короткі, середньої щільності, помірно жовтого кольору, вузькояйцевидної форми. Трубчасті квітки оранжевого кольору. Зовнішні листки обгортки помірно зеленого кольору, за формою чітко видовжені й чітко округлі, верхівка середньої довжини. Рослина висока, галуження відсутнє. Кошик сильно випуклий, середнього розміру. Положення кошика напівобернене донизу разом із прямим стеблом. Сім'янка середнього розміру, вузько- яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки дуже сильна, смугастість між краями сім'янки відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила - 29,4 ц/га, гарантована прибавка - 3,8 ц/га, у зоні Лісостепу – середня урожайність - 31,6 ц/га, гарантована прибавка - 6,4 ц/га. Потенційна урожайність - 48,2 ц/га. Вміст жиру - 50,8%, білка - 16,5%, вихід олії - 1532 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

04017038 Шанс

Заявник: **Закрите акціонерне товариство " Селена"**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Паросток має слабке антоціанове забарвлення гіпокотилю. Листок середнього розміру, пухирчастість слабка, зубці та вушка помірні. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушення верхівки стебла помірне. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої довжини та щільності, помірно жовтого кольору, вузькояйцевидної форми. Трубчасті квітки оранжевого кольору. Зовнішні листки обгортки помірно зеленого кольору, за формою чітко видовжені, верхівка довга. Рослина висока, галуження відсутнє. Кошик сильно випуклий, середнього розміру. Положення кошика обернене донизу разом із прямим стеблом. Сім'янка середнього розміру, вузькояйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях та між краями сім'янки відсутня або дуже слабка.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила - 26,0 ц/га, гарантована прибавка - 0,4 ц/га, у зоні Лісостепу – середня урожайність - 27,4 ц/га, гарантована прибавка - 2,1 ц/га. Потенційна урожайність - 45,8 ц/га. Вміст жиру - 51,3-51,7%, білка - 15,4-15,9%, вихід олії - 1319-1658 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

Соя

05018012 Ворскла

Заявник: **Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук"**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Гіпокотиль у рослин сорту з наявним антоціановим забарвленням. Рослини з сірим опушенням, середньої висоти, проміжного типу росту, з відсутнім або дуже слабким ступенем завивання стебла, напівстиснутуою формою куща, мають від дуже раннього до раннього як час початку цвітіння, так і достигання з наявним опадання листя.

Стебло з середньою кількістю вузлів, нефасційоване, середньої товщини.

Листок - помірного зеленого кольору та помірним ступенем пухирчастості. Середній листочок великий, ланцетної форми з заокругленою формою верхівки.

Забарвлення квітки - фіолетове.

Біб - серповидної форми, має середні параметри і довжини, і ширини та світло-коричневе забарвлення.

Насінина округло-випуклої форми з основним жовтим забарвленням оболонки та наявним рубчиком. Рубчик овальної форми з наявним вічком на ньому, має світло-коричневе забарвлення. Малюнок (смужки) навколо рубчика – відсутній.

Маса 1000 зерен – середня (153,5 г).

Напрям використання – зерновий.

Середня врожайність за роки випробування у зоні Степу – 17,9 ц/га, Лісостепу – 21,6 ц/га. Вміст жиру – 22,4%, білка – 37,2%. Висота прикріплення нижнього бобу – 15,7 см.

Стійкий до вилягання, осипання, ураження хворобами, відносно стійкий до посухи.

06018004 Ентерпрайс

Заявник: **Хайленд Сидс Томпсонс ЛТД**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Гіпокотиль у рослин сорту з наявним антоціановим забарвленням. Рослини з жовто-коричневим опушенням, середньої висоти, мають індетермінантний тип росту, середній ступінь завивання стебла, проміжну форму куща, середньораннй час і початку цвітіння, і середній достигання з наявним опаданням листя.

Стебло - з середньою кількістю вузлів, нефасційоване, тонке.

Листок помірного зеленого кольору та з помірним ступенем пухирчастості. Середній листочок за розміром - середній, овальної форми та з загостреною формою верхівки.

Забарвлення квітки - фіолетове.

Біб має серповидну форму, середню довжину, вузький. Забарвлення бобу - коричневе.

Насінина - опукло-випуклої форми з основним жовтим забарвленням оболонки. Рубчик насінини має жовтий колір, лінійної форми з наявним вічком на ньому. Малюнок (смужки) навколо рубчика – наявний.

Маса 1000 насінин - середня.

Напрям використання – зерновий.

Середня врожайність за роки випробування у зоні Лісостепу – 28,5 ц/га. Вміст жиру – 23,1 %, білка – 36,3 %. Висота прикріплення нижнього бобу – 11,4 см. Маса 1000 насінин – 182,8 г.

Стійкий до вилягання, осипання, посухи, ураження хворобами.

05018021 Іна

Заявник: **Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Гіпокотиль у рослин сорту з наявним антоціановим забарвленням. Рослини із сірим опушенням, від середньої до високої висоти, мають проміжний тип росту, середній ступінь завивання стебла, напіврозлогу форму куща, середньоранній час і початку цвітіння, і достигання з наявним опаданням листя.

Стебло з середньою кількістю вузлів, нефасційоване, середньої товщини.

Листок - помірного зеленого кольору та зі слабким ступенем пухирчастості. Середній листочок за розміром - великий, овальної форми та має загострену форму верхівки.

Забарвлення квітки - фіолетове.

Біб має серповидну форму з середніми параметрами довжини та ширини. Забарвлення бобу - коричневе.

Насінина овальної форми з основним жовтим забарвленням оболонки. Рубчик насінини також жовтого кольору, лінійної форми з відсутнім вічком на ньому. Малюнок (смужки) навколо рубчика – відсутній.

Маса 1000 зерен – середня.

Напрям використання – зерновий.

Середня врожайність за роки випробування у зоні Степу – 22,1 ц/га. Вміст жиру – 23,4 %, білка – 37,4 %. Висота прикріплення нижнього бобу – 13,9 см. Маса 1000 насінин – 174,4 г

Стійкий до вилягання, осипання, ураження хворобами, відносно стійкий до посухи.

06018003 Колбі

Заявник: **Хайленд Сидс Томпсонс ЛТД**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Гіпокотиль у рослин сорту з наявним антоціановим забарвленням. Рослини з сірим опушенням, середньої висоти, мають проміжний тип росту, слабкий ступінь завивання стебла, напівстиснуту форму куща, середньоранній час початку цвітіння та пізній достигання з наявним опаданням листя.

Стебло з великою кількістю вузлів, нефасційоване, середньої товщини.

Листок - помірного зеленого кольору та з помірним ступенем пухирчастості. Середній листочок за розміром - середній, клиноподібний та має загострену форму верхівки.

Забарвлення квітки - фіолетове.

Біб має середні параметри довжини та ширини, серповидну форму. Забарвлення бобу - коричневе.

Насінина - овальної форми з основним жовтим забарвленням оболонки. Рубчик насінини також жовтого кольору, лінійної форми з відсутнім вічком на ньому. Малюнок (смужки) навколо рубчика – наявний.

Маса 1000 зерен – велика.

Напрям використання – зерновий.

Середня врожайність за роки випробування у зоні Лісостепу – 25,9 ц/га. Вміст жиру – 21,2 %, білка – 37,5 %. Висота прикріплення нижнього бобу – 17,9 см. Маса 1000 насінин – 196,1 г.

Стійкий до вилягання, осипання, ураження хворобами, відносно стійкий до посухи.

06018001 КСБ 938

Заявник: **Кассад Семанс**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Гіпокотиль у рослин сорту без наявного антоціанового забарвлення. Рослини з сірим опушенням, середньої висоти, мають індетермінантний тип росту, середній ступінь завивання стебла, проміжну форму куща, середньопізній час початку цвітіння і пізній достигання з наявним опаданням листя.

Стебло - з середньою кількістю вузлів, нефасційоване, середньої товщини.

Листок - помірного зеленого кольору та з помірним ступенем пухирчастості. Середній листочок за розміром - великий, овальний та має загострену форму верхівки.

Забарвлення квітки - біле.

Біб має середні параметри довжини та ширини, серповидну форму. Забарвлення бобу - коричневе.

Насінина - округло-випуклої форми з основним жовтим забарвленням оболонки. Рубчик насінини чорного кольору, овальної форми з наявним вічком на ньому. Малюнок (смужки) навколо рубчика – відсутній.

Маса 1000 зерен – середня.

Напрям використання – зерновий.

Середня врожайність за роки випробування у зоні Степу – 19,1 ц/га, Лісостепу – 25,0 ц/га з вмістом жиру – 20,9 %, білка – 39,8 %. Висота прикріплення нижнього бобу – 20,9 см. Маса 1000 насінин – 178,5 г.

Стійкий до вилягання, осипання, ураження хворобами, відносно стійкий до посухи.

06018006 Медісон

Заявник: **Хайленд Сидс Томпсонс ЛТД**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Гіпокотиль у рослин сорту з наявним антоціановим забарвленням. Рослини з жовто-коричневим опушенням, середньої висоти, мають індетермінантний тип росту, середній ступінь завивання стебла, проміжну форму куща, середньоранній час початку цвітіння і середній достигання з наявним опадання листя.

Стебло з середньою кількістю вузлів, нефасційоване, середньої товщини.

Листок помірного зеленого кольору та зі слабким ступенем пухирчастості. Середній листочок за розміром - середній, овальної форми та з загостреною формою верхівки.

Забарвлення квітки - фіолетове.

Біб має середню довжину, вузький, серповидну форму та коричневе забарвлення.

Насінина овально-видовженої форми з основним жовтим забарвленням оболонки. Рубчик насінини темно-коричневого кольору, овальної форми з наявним вічком на ньому. Малюнок (смужки) навколо рубчика – відсутній.

Маса 1000 насінин - середня

Напрям використання – зерновий.

Середня врожайність за роки випробування у зоні Лісостепу – 30,1 ц/га, Полісся – 21,7 ц/га з вмістом жиру – 24,0 %, білка – 36,2 %.

Висота прикріплення нижнього бобу – 13,9 см. Маса 1000 насінин – 171,7 г.

Сорт стійкий до вилягання, осипання, посухи, ураження хворобами.

05018016 Таврія

Заявник: **Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Гіпокотиль у рослин сорту з наявним антоціановим забарвленням. Рослини з сірим опушенням, високі, мають індетермінантний тип росту, середній ступінь завивання стебла, напіврозлогу форму куща, середньоранній час початку цвітіння та середньопізній час достигання з наявним опадання листя.

Стебло з середньою кількістю вузлів, нефасційоване, тонке.

Листок помірного зеленого кольору та зі слабким ступенем пухирчастості. Середній листочок за розміром - середній, овальної форми з загостреною формою верхівки.

Забарвлення квітки - фіолетове.

Біб має середні параметри і довжини, і ширини, серповидної форми та темно-коричневе забарвлення.

Насінина - округло-випуклої форми з основним жовто-зеленим забарвленням оболонки. Рубчик насінини темно-коричневого кольору, овальної форми з відсутнім вічком на ньому. Малюнок (смужки) навколо рубчика – відсутній.

Маса 1000 зерен – середня.

Напрям використання – зерновий.

Середня врожайність за роки випробування у зоні Степу – 21,1 ц/га, Лісостепу – 28,8 ц/га з вмістом жиру – 22,0 %, білка – 38,4 %. Висота прикріплення нижнього бобу – 17,3 см. Маса 1000 насінин – 182,7 г.

Стійкий до вилягання, осипання, ураження хворобами, відносно стійкий до посухи.

05018003 Фарватер

Заявник: **Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Гіпокотиль у рослин сорту з наявним антоціановим забарвленням. Рослини з жовто-коричневим опушенням, середньої висоти, мають проміжний тип росту, відсутній або дуже слабкий ступінь завивання стебла, проміжну форму куща, середньоранній час і початку цвітіння, і достигання з наявним опадання листя.

Стебло з середньою кількістю вузлів, нефасційоване, середньої товщини.

Листок помірного зеленого кольору та зі слабким ступенем пухирчастості. Середній листочок за розміром - середній, овальної форми та з загостреною формою верхівки.

Забарвлення квітки - фіолетове.

Біб має світло-коричневе забарвлення. середні параметри і довжини, і ширини.

Насінина овальної форми з основним жовтим забарвленням оболонки. Рубчик насінини - темно-коричневого кольору, овальної форми з наявним вічком на ньому. Малюнок (смужки) навколо рубчика – відсутній.

Маса 1000 зерен – середня (180,7 г) .

Напрям використання – зерновий.

Середня врожайність за роки випробування у зоні Лісостепу – 27,8 ц/га з вмістом жиру – 22,3 %, а білка – 36,8 %.

Висота прикріплення нижнього бобу – 17,6 см.

Стійкий до осипання, посухи, ураження хворобами, відносно стійкий до вилягання.

Ріпак озимий

04016006 Джеспер

Заявник: Лімагрейн Адванта Ніделенд Б.В.

Власник(и):

Підтримувач(і):

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядоля за шириною - середня, за довжиною - коротка. Зубчастість краю листка помірна. Листок середнього розміру з частками. Довжина черешка листка - коротка. Рослина середньої висоти. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок середній. Середній час цвітіння. Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби - відсутня або дуже слабка.

Урожайність у зоні Лісостепу – 35,1 ц/га, гарантована прибавка - 3,2 ц/га. Стійкість до вилягання - 8,7, посухи - 8,7, осипання - 7,7 бала. Стійкість до ураження пероноспорозом - 9,0, бактеріозом - 9,0 балів. Стійкість до пошкодження ріпаковим квіткоїдом - 9,0 балів. Вміст ерукової кислоти - 0,2%, глюкозинолатів - 0,8%. Вміст жиру - 44,9%, білку - 21,7%.

05016019 Декатлон

Заявник: Лімагрейн Адванта Ніделенд Б.В.

Власник(и):

Підтримувач(і):

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядоля за шириною - середня, за довжиною - середня. Зубчастість краю листка помірна. Листок середнього розміру з середньою кількістю часток. Довжина черешка листка - середня. Рослина висока. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок середній. Ранній час цвітіння. Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби - дуже сильна.

Урожайність у зоні Лісостепу – 35,1 ц/га, гарантована прибавка - 3,2 ц/га. Стійкість до вилягання - 8,7, посухи - 8,5, осипання - 7,3 бала. Стійкість до ураження пероноспорозом - 9,0, бактеріозом - 9,0 балів. Стійкість до пошкодження ріпаковим квіткоїдом - 9,0 балів. Вміст ерукової кислоти - 0,2%, глюкозинолатів - 0,8%. Вміст жиру - 43,8%, білку - 21,8%.

05016018 Нельсон

Заявник: Сінгента Сідз С.А.С.

Власник(и):

Підтримувач(і):

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядоля за шириною - вузька, довжиною - середня. Зубчастість краю листка помірна. Листок середнього розміру з середнью кількістю часток. Довжина черешка листка - середня. Рослина середньої висоти. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок середній. Ранній час цвітіння. Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби - дуже сильна.

Урожайність у зоні Лісостепу – 35,7 ц/га, Полісся - 37,4 ц/га, гарантована прибавка відповідно - 3,8 і 1,4 ц\га. Стійкість до вилягання - 9,0, посухи - 8,5, осипання - 7,4 бала. Стійкість до ураження пероноспорозом - 9,0, бактеріозом - 9,0 балів. Стійкість до пошкодження ріпаковим квіткоїдом в межах 8,0-9,0 балів. Вміст ерукової кислоти - 0,2%, глюкозинолатів - 0,8%. Вміст жиру в межах 45,0-47,2%, білку - 20,9-21,2%.

04016005 Опус

Заявник: Осева ПРО с.р.о.а

Власник(и):

Підтримувач(і):

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядоля за шириною - широка, середньої довжини. Зубчастість краю листка помірна. Листок середнього розміру з частками. Довжина черешка листка - середня. Рослина середньої висоти. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок довгий. Час цвітіння - ранній. Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби - помірна.

Урожайність у зоні Лісостепу - 34,2 ц/га, гарантована прибавка - 2,2 ц/га. Стійкість до вилягання - 8,9, посухи - 8,5, осипання - 7,8 балів. Стійкість до ураження пероноспорозом - 9,0, бактеріозом - 9,0 балів. Стійкість до пошкодження ріпаковим квіткоїдом - 9,0 балів. Вміст ерукової кислоти - 0,08%, глюкозинолатів - 0,6%. Вміст жиру - 45,1%, білку - 22,1%.

05016005 ПР46В31

Заявник: Піонер Семена Холдінг ГезмбХ

Власник(и):

Підтримувач(і):

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядоля за шириною - середня, за довжиною - середня. Зубчастість краю листка помірна. Листок довгий з середньою кількістю часток. Довжина черешка листка - середня. Рослина середньої висоти. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок короткий. Середній час цвітіння. Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби - помірна.

Урожайність у зоні Лісостепу – 38,6 ц/га, гарантована прибавка - 6,7 ц/га. Стійкість до вилягання - 9,0, посухи - 8,6, осипання - 7,1 бала. Стійкість до ураження пероноспорозом - 9,0, бактеріозом - 9,0 балів. Стійкість до пошкодження ріпаковим квіткоїдом - 9,0 балів. Вміст ерукової кислоти - 0,1%, глюкозинолатів - 0,7%. Вміст жиру - 45,4%, білку - 21,8%.

05016016 Токата

Заявник: Сінгента Сідз С.А.С.

Власник(и):

Підтримувач(і):

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядоля за шириною - середня, за довжиною - середня. Зубчастість краю листка помірна. Листок середнього розміру з середньою кількістю часток. Довжина черешка листка - довгий. Рослина середньої висоти. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок середній. Середній час цвітіння. Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби - сильна.

Урожайність у зоні Лісостепу – 35,3 ц/га, Полісся - 37,2 ц/га, гарантована прибавка відповідно - 3,4 і 1,2 ц\га. Стійкість до вилягання - 9,0; посухи - 8,3; осипання - 7,5 бала. Стійкість до ураження пероноспорозом - 9,0, бактеріозом - 9,0 балів. Стійкість до пошкодження ріпаковим квіткоїдом в межах 8,0-9,0 балів. Вміст ерукової кислоти - 0,1-0,2%, глюкозинолатів - 0,7-0,8%. Вміст жиру - 45,3-47,6%, білку - 21,0-21,6%.

Ріпак ярий

06016006 Хідалго

Заявник: Норддойче Пфланценцухт Ганс-Георг Лембке КГ

Власник(и):

Підтримувач(і):

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за шириною - широкі, за довжиною - довгі. Зубчастість краю листка помірна. Листок довгий з середньою кількістю часток. Довжина черешка листка - середній. Рослина середньої висоти. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок довгий. Час цвітіння - середній. Тенденція формування суцвіття в рік пізньолітнього висіву - відсутня або дуже слабка.

Урожайність у зоні Лісостепу – 24,0 ц/га, Полісся - 26,1 ц/га, гарантована прибавка відповідно - 3,6 і 1,5 ц\га. Стійкість до вилягання - 8,2-8,3; посухи-8,3-8,4; осипання - 7,6-7,9 бала. Стійкість до ураження пероноспорозом - 9,0; бактеріозом - 8,6-9,0 балів. Стійкість до пошкодження ріпаковим квіткоїдом - 8,2-8,6 балів. Вміст ерукової кислоти - 0,1%, глюкозинолатів - 0,6%. Вміст жиру в межах 44,0-45,1%, білку - 21,4-22,2%.

05016028 Юра

Заявник: Євраліс Семанс

Власник(и):

Підтримувач(і):

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за шириною - вузькі, за довжиною - середні. Зубчастість краю листка слабка. Листок середнього розміру з середньою кількістю часток. Довжина черешка листка - середній. Рослина середньої висоти. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок середній. Час цвітіння - пізній. Тенденція формування суцвіття в рік пізньолітнього висіву - відсутня або дуже слабка.

Урожайність у зоні Лісостепу – 22,7 ц/га, гарантована прибавка - 2,2 ц/га. Стійкість до вилягання - 8,2, посухи - 8,3, осипання - 7,9 балів. Стійкість до ураження пероноспорозом - 9,0, бактеріозом - 9,0 балів. Стійкість до пошкодження ріпаковим квіткоїдом - 8,0 балів. Вміст ерукової кислоти - 0,1%, глюкозинолатів - 0,7%. Вміст жиру - 43,8%, білку - 22,6%.

Гірчиця сарептська

05144002 Ракета

Заявник: Державна наукова установа Всеросійський науково-дослідний інститут олійних культур ім. В.С.Пустовойта (НВО)

Власник(и):

Підтримувач(і):

Рослина за висотою середня, інтенсивність антоціанового забарвлення стебла слабка, форма суцвіття - китиця, форма пластинки нижнього листка ліровидна, опушеність нижнього листка відсутня або дуже слабка, пластинка нижнього листка за розчленуванням - розсічена, восковий наліт на стебловому листку відсутній або дуже слабкий, забарвлення пелюсток квітки золотисто-жовті, стручок за довжиною середній, довжина носика стручка - середня, забарвлення насінини - жовте, вміст олії в насінні високий, ерукова кислота відсутня, час початку цвітіння ранній, тривалість вегетаційного періоду - короткий.

За період випробування урожайність насіння становила 20,0 ц/га, маса 1000 насінин 3,3 г. Висота рослин 130 см. Вегетаційний період 90 діб. Вміст: жиру - 44%, ерукової кислоти 0. Сорт середньостійкий до вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами незначне.

Гірчиця біла

06092001 Подолянка

Заявник: Хмельницька державна сільськогосподарська дослідна станція Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Рослина за висотою висока, інтенсивність зеленого забарвлення листка помірна, кількість часточок листка (за повного розвитку)- велика, зубчатість краю листка - помірна, довжина черешка листка середня, листок за шириною - широкий, інтенсивність жовтого забарвлення пелюсток квітки помірна, довжина пелюсток квітки середня, стручок за довжиною короткий, стручок - довжина гачка - довгий, довжина ніжки стручка - середня, кількість насіння в стручку середня.

За даними заявника: Вегетаційний період 100 днів. Висота рослин 110 см. Урожайність насіння 24,5 ц/га, маса 1000 насінин 6,9 г. Вміст жиру 29,8%, ерукової кислоти 0,1%. Сорт середньостійкий до вилягання, посухи, осипання. Ураження хворобами незначне.

Мак

06095001 Тріумф

Заявник: Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю ім. Богдана Хмельницького

Власник(и):

Підтримувач(і):

Листкова розетка опушена. Стебло середньої довжини з потроєним розгалуженням. Антоціанове забарвлення між коробочкою та верхівкою стебла відсутнє. Стебловий листок з помірним восковим нальотом та голубуватим відтінком верхньої сторони. Характер надрізів країв стеблового листка двічізубсчатий. Пелюстки квітки рожевого кольору зі смугами та хвилястим розсіченням країв. Коробочка у поздовжньому розрізі кругла середнього діаметра. Насіння голубуватого кольору. Час цвітіння середній.

За даними заявника: Вегетаційний період 110 діб. Висота рослин 100 см. Урожайність насіння 21,0 ц/га, маса 1000 насінин 0,49 г. Вміст морфіну 0,13%, жиру 52%. Сорт відносно стійкий до вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами незначне.

Льон-довгунець

05015003 Глобус

Заявник: Інститут луб'яних культур Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Рослина висока, стебло - довге, квітка з середнім розміром віночка; чашолисток: з відсутньою плямистістю; пелюстка :колір у фазі пупянка - блакитно - фіолетовий, колір віночка за повного цвітіння - блакитний; пелюстка з відсутнім поздовжнім згином; тичинка: з блакитним кольором дистальної частини нитки; пиляк - жовтуватого кольору, коробочка середнього розміру, маса 1000 насінин - середня, насіння за кольором - помірно - коричневе, час початку цвітіння - середній

Середня урожайність за період випробування становила: соломи 38,7 ц/га, насіння 6,6 ц/га, всього волокна 15,8 ц/га, в тому числі довгого 10,5 ц/га. Вегетаційний період в умовах Полісся 85 днів. Середній номер волокна 13,5, розривне навантаження 22,1 КГС, відносне розривне навантаження 44,0. Сорт середньостійкий до посухи, відносно стійкий до вилягання та осипання. Ураження хворобами незначне.

05015004 Гладіатор

Заявник: Інститут луб'яних культур Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Рослина висока, стебло довге, квітка :розмір віночка - середній, чашолисток - наявність плям у фазі пупянка відсутня; пелюстка колір віночка (за повного цвітіння) - блакитний, без поздовжнього згину; тичинка: колір дистальної частини нитки блакитний; пиляк жовтуватого кольору; коробочка середнього розміру, маса 1000 нас. - середня, насіння помірно - коричневе, час початку цвітіння - середній

Середня урожайність за період випробування становила: соломки 57,9 ц/га, насіння 6,97 ц/га, всього волокна 16,7 ц/га, в тому числі довгого 11,7 ц/га. Вегетаційний період в умовах Полісся 78 днів. Середній номер волокна 14,0, розривне навантаження 21,9 КГС, відносне розривне навантаження 41,9 гс/текс. Сорт відносно стійкий до вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами незначне.

Сільськогосподарські: буряк

Буряк цукровий

04013026 Атаманша

Заявник: Сингента Сідс АБ

Власник(и):

Підтримувач(і):

Диплоїдний гібрид. Клубочок – одноростковий. Паросток з наявним антоціановим забарвленням. Тип розетки - напіврозлогий. Листкова пластинка середня за довжиною, середня за шириною, з помірною хвилястістю країв, помірно гофрована. Черешок зелений, середній за шириною з білувато-зеленим забарвленням основи. Коренеплід середнього розміру, довгий, циліндрично-конічної форми, повністю заглиблений в грунт.

Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2005-2007) середня врожайність коренеплодів у зоні Степу становила 572 ц/га, Полісся - 581 ц/га. Цукристість відповідно – 17,5; 17,6 %. Збір цукру з гектара відповідно – 100,2; 103,2 ц. Втрати цукру в мелясі відповідно - 1,8 та 1,6 %. Гібрид стійкий до цвітушності та слабо уражується коренеїдом. Має середні показники стійкості до церкоспорозу. Придатність до механізованого збирання у межах 5,9-8,1 бала.

04013015 Акку

Заявник: Фр.Штрубе Заатцухт КГ Золлінген

Власник(и):

Підтримувач(і):

Диплоїдний гібрид. Клубочок – одноростковий. Антоціанове забарвлення паростку відсутнє. Тип розетки - розлогий. Листок короткий за довжиною. Листкова пластинка коротка за довжиною, вузька за шириною, з помірною хвилястістю країв, сильно гофрована. Черешок зелений, вузький за шириною з білувато-зеленим забарвленням основи. Коренеплід середнього розміру, короткий за довжиною, ширококонічної форми, повністю заглиблений в грунт.

Гібрид урожайно-цукристого типу. У період випробування (2005-2007 рр.) середня врожайність коренеплодів у зоні Лісостепу становила 594 ц/га. Цукристість – 17,2 %. Збір цукру з гектара – 101,9 ц. Втрати цукру в мелясі - 1,8 %.
Гібрид стійкий до цвітушності та слабо уражується коренеїдом. Має високий показник стійкості до церкоспорозу. Придатність до механізованого збирання – 8,4 бала.

05013016 Венчац

Заявник: Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад

Власник(и):

Підтримувач(і):

Диплоїдний гібрид. Клубочок – одноростковий. Паросток з наявним антоціановим забарвленням. Тип розетки - напіврозлогий. Листок короткий за довжиною. Листкова пластинка коротка за довжиною, середня за шириною, з помірною хвилястістю країв, помірно гофрована. Черешок зелений, середній за шириною з білувато-зеленим забарвленням основи. Коренеплід середній за розміром, довгий, рококонічної форми, повністю заглиблений в грунт.

Гібрид урожайно-цукристого типу. У період випробування (2006-2007 рр.) середня врожайність коренеплодів у зоні Полісся становила 606 ц/га. Цукристість – 17,7 %. Збір цукру з гектара – 107,3 ц. Втрати цукру в мелясі - 1,7 %.
Гібрид стійкий до цвітушності та слабо уражується коренеїдом. Має середній показник стійкості до церкоспорозу. Придатність до механізованого збирання – 6,6 бала.

05013014 Галактік

Заявник: Приватне науково-виробниче підприємство "Насіння"

Власник(и):

Підтримувач(і):

Диплоїдний гібрид. Клубочок – одноростковий. Паросток з наявним антоціановим забарвленням. Тип розетки - розлогий. Листок короткий за довжиною. Листкова пластинка середня за довжиною, середня за шириною, зі слабкою хвилястістю країв, помірно гофрована. Черешок зелений, вузький за шириною з білувато-зеленим забарвленням основи. Коренеплід великий за розміром, середній за довжиною, вузькоконічної форми, повністю заглиблений в грунт.

Гібрид урожайно-цукристого типу. У період випробування (2005-2007 рр.) середня врожайність коренеплодів у зоні Степу становила 600 ц/га, Лісостепу - 545 ц/га, Полісся – 569 ц/га. Цукристість відповідно – 17,9;17,2;17,2 %. Збір цукру з гектара відповідно – 107,1; 93,6; 97,9 ц. Втрати цукру в мелясі відповідно - 1,8; 1,8 та 1,7 %.
Гібрид стійкий до цвітушності та слабо уражується коренеїдом. Має середні показники стійкості до церкоспорозу. Придатність до механізованого збирання у межах 6,0-8,5 бала.

04013021 Гезіна

Заявник: KBC ЗААТ АГ

Власник(и):

Підтримувач(і):

Диплоїдний гібрид. Клубочок - одноростковий. Паросток з наявним антоціановим забарвленням. Тип розетки - напіврозлогий. Листок середній за довжиною. Листкова пластинка коротка за довжиною, середня за шириною, з помірною хвилястістю країв, помірно гофрована. Черешок зелений, середній за шириною з білувато-зеленим забарвленням основи. Коренеплід великого розміру, короткий за довжиною, рококонічної форми, повністю заглиблений в грунт.

Гібрид урожайно-цукристого типу. У період випробування (2005-2007 рр.) середня врожайність коренеплодів у зоні Степу становила 587 ц/га, Лісостепу - 556 ц/га. Цукристість відповідно - 16,7;16,9 %. Збір цукру з гектара відповідно – 99,3; 94,1 ц. Втрати цукру в мелясі відповідно - 1,8 та 1,7 %.
Гібрид стійкий до цвітушності та слабо уражується коренеїдом. Має середні показники стійкості до церкоспорозу. Придатність до механізованого

збирання у межах 6,9-7,7 бала.

05013003 Гранате

Заявник: **Насіннєва компанія Лаєн Сідс Лімітед**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Триплоїдний гібрид. Клубочок - одноростковий. Антоціанове забарвлення паростку відсутнє. Тип розетки - розлогий. Листок короткий за довжиною. Листкова пластинка коротка за довжиною, середня за шириною зі слабкою хвилястістю країв, слабко гофрована. Черешок зелений, вузький за шириною з білувато-зеленим забарвленням основи. Коренеплід великого розміру, середньої довжини, циліндрично-конічної форми, повністю заглиблений в грунт.

Гібрид урожайно-цукристого типу. У період випробування (2005-2007 рр.) середня врожайність коренеплодів у зоні Лісостепу становила 560 ц/га, Полісся - 623 ц/га. Цукристість відповідно - 16,7;18,1 %. Збір цукру з гектара відповідно - 93,5; 113,5 ц. Втрати цукру в мелясі відповідно - 1,8 та 1,7 %. Гібрид стійкий до цвітушності та слабо уражується коренеїдом. Має високий показник стійкості до церкоспорозу у зоні Лісостепу та середньостійкий у зоні Полісся. Придатність до механізованого збирання у межах 5,9-8,1 бала.

05013029 Дануб

Заявник: **С.А. Флоримонд Депре**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Диплоїдний гібрид. Клубочок – одноростковий. Антоціанове забарвлення паростку відсутнє. Тип розетки - розлогий. Листок короткий за довжиною. Листкова пластинка коротка за довжиною, середня за шириною, з помірною хвилястістю країв, сильно гофрована. Черешок зелений, широкий, з білувато-зеленим забарвленням основи. Коренеплід середній за розміром, середній за довжиною, ширококонічної форми, повністю заглиблений в грунт.

Гібрид урожайно-цукристого типу. У період випробування (2006-2007 рр.) середня врожайність коренеплодів у зоні Лісостепу становила 574 ц/га, Полісся - 614 ц/га. Цукристість відповідно – 16,6;17,3 %. Збір цукру з гектара відповідно – 95,5; 106,2 ц. Втрати цукру в мелясі відповідно – 2,0 та 1,8 %.

Гібрид стійкий до цвітушності та слабо уражується коренеїдом. Має високий показник стійкості до церкоспорозу на території Лісостепу та середньостійкий у Поліссі. Придатність до механізованого збирання у межах 6,2-8,6 бала.

05013015 Дрена

Заявник: **Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Диплоїдний гібрид. Клубочок – одноростковий. Паросток з наявним антоціановим забарвленням. Тип розетки - напіврозлогий. Листок короткий за довжиною. Листкова пластинка коротка за довжиною, середня за шириною, з помірною хвилястістю країв, помірно гофрована. Черешок зелений, вузький за шириною, з білувато-зеленим забарвленням основи. Коренеплід середній за розміром, середній за довжиною, ширококонічної форми, повністю заглиблений в грунт.

Гібрид урожайно-цукристого типу. У період випробування (2006-2007 рр.) середня врожайність коренеплодів у зоні Полісся становила 580 ц/га. Цукристість – 17,4 %. Збір цукру з гектара – 101,8 ц. Втрати цукру в мелясі - 1,8 %.

Гібрид стійкий до цвітушності та слабо уражується коренеїдом. Має середній показник стійкості до церкоспорозу. Придатність до механізованого збирання - 6,0 бала.

05013013 Зорипа

Заявник: **Приватне науково-виробниче підприємство "Насіння"**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Диплоїдний гібрид. Клубочок – одноростковий. Антоціанове забарвлення паростку відсутнє. Тип розетки - розлогий. Листок середній за довжиною. Листкова пластинка середня за довжиною, середня за шириною, з помірною хвилястістю країв, помірно гофрована. Черешок зелений, середній за шириною з білувато-зеленим забарвленням основи. Коренеплід середнього розміру, середній за довжиною, ширококонічної форми, повністю заглиблений в грунт.

Гібрид урожайно-цукристого типу. У період випробування (2005-2007 рр.) середня врожайність коренеплодів у зоні Степу становила 588 ц/га, Лісостепу - 565 ц/га, Полісся - 555 ц/га. Цукристість відповідно – 17,8;17,2;17,8 %. Збір цукру з гектара відповідно – 104,2; 96,8; 98,3 ц. Втрати цукру в мелясі відповідно - 1,8; 1,8 та 1,7 %.

Гібрид стійкий до цвітушності та слабо уражується коренеїдом. Має середні показники стійкості до церкоспорозу на територіях Степу і Полісся та високостійкий у зоні Лісостепу. Придатність до механізованого збирання у межах 6,1-8,5 бала.

04013019 Золеа

Заявник: **Фр.Штрубе Заатцухт КГ Золлінген**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Диплоїдний гібрид. Клубочок - одноростковий. Паросток з наявним антоціановим забарвленням. Тип розетки - розлогий. Листок короткий за довжиною. Листкова пластинка коротка за довжиною, середня за шириною з помірною хвилястістю країв, сильно гофрована. Черешок зелений, вузький за шириною з білувато-зеленим забарвленням основи. Коренеплід великого розміру, довгий, ширококонічної форми, повністю заглиблений в грунт.

Гібрид урожайно-цукристого типу. У період випробування (2005-2007 рр.) середня врожайність коренеплодів у зоні Степу становила 579 ц/га, Лісостепу - 550 ц/га, Полісся - 572 ц/га. Цукристість відповідно – 17,4;16,8;17,3 %. Збір цукру з гектара відповідно – 101,1; 92,1; 100 ц. Втрати цукру в мелясі відповідно - 1,8; 1,7 та 1,7 %.

Гібрид стійкий до цвітушності та коренеїду у зоні Степу, середньостійкий до коренеїду на території Лісостепу та Полісся. Має середні показники стійкості до церкоспорозу. Придатність до механізованого збирання у межах 6,4-7,7 бала.

05013001 Імперіал

Заявник: **Даніско Сід ГмбХ**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Диплоїдний гібрид. Клубочок - одноростковий. Паросток з наявним антоціановим забарвленням. Тип розетки – вертикальний. Листок довгий. Листкова пластинка коротка за довжиною, середня за шириною, з сильною хвилястістю країв, сильно гофрована. Черешок зелений, вузький за шириною, з білувато-зеленим забарвленням основи. Коренеплід великий за розміром, середній за довжиною, ширококонічної форми, повністю заглиблений в грунт.

Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2005-2007) середня врожайність коренеплодів у зоні Степу становила 587 ц/га, Лісостепу - 565 ц/га. Цукристість відповідно – 17,1; 17,0 %. Збір цукру з гектара відповідно – 101,0; 96,0 ц. Втрати цукру в мелясі - 1,8 %.
Гібрид стійкий до цвітушності та слабо уражується коренеїдом. Має високі показники стійкості до церкоспорозу. Придатність до механізованого збирання у межах 8,1-8,4 бала.

04013011 Імпакт

Заявник: СесВандерхаве Н.Б./С.А.

Власник(и):

Підтримувач(і):

Диплоїдний гібрид. Клубочок – одноростковий. Антоціанове забарвлення паростку відсутнє. Тип розетки - напіврозлогий. Листок короткий за довжиною. Листкова пластинка коротка за довжиною, вузька за шириною, з сильною хвилястістю країв, сильно гофрована. Черешок зелений, вузький за шириною з білувато-зеленим забарвленням основи. Коренеплід великого розміру, середній за довжиною, ширококонічної форми, повністю заглиблений в грунт.

Гібрид урожайно-цукристого типу. У період випробування (2005-2007 рр.) середня врожайність коренеплодів у зоні Лісостепу становила 556 ц/га. Цукристість – 17,2 %. Збір цукру з гектара – 95,7 ц. Втрати цукру в мелясі - 1,8%.
Гібрид стійкий до цвітушності та слабо уражується коренеїдом. Має високий показник стійкості до церкоспорозу. Придатність до механізованого збирання 8,3 бала.

04013022 Леонарда

Заявник: KBC ЗААТ АГ

Власник(и):

Підтримувач(і):

Триплоїдний гібрид. Клубочок - одноростковий. Паросток з наявним антоціановим забарвленням. Тип розетки - напіврозлогий. Листок короткий за довжиною. Листкова пластинка коротка за довжиною, вузька за шириною, з помірною хвилястістю країв, помірно гофрована. Черешок зелений, широкий, з білувато-зеленим забарвленням основи. Коренеплід середнього розміру, середній за довжиною, ширококонічної форми, повністю заглиблений в грунт.

Гібрид урожайно-цукристого типу. У період випробування (2005-2007 рр.) середня врожайність коренеплодів у зоні Степу становила 598 ц/га, Лісостепу - 874 ц/га, Полісся - 586 ц/га. Цукристість відповідно – 16,9;17,2;17,3 %. Збір цукру з гектара відповідно – 101,9; 98,9; 102,6 ц. Втрати цукру в мелясі відповідно - 1,8; 1,7 та 1,6 %.
Гібрид стійкий до цвітушності та слабо уражується коренеїдом. Має середні показники стійкості до церкоспорозу. Придатність до механізованого збирання у межах 5,8-8,1 бала.

04013023 Лангуста

Заявник: Сингента Сідс АБ

Власник(и):

Підтримувач(і):

Диплоїдний гібрид. Клубочок - одноростковий. Паросток з наявним антоціановим забарвленням. Тип розетки - вертикальний. Листок короткий за довжиною. Листкова пластинка коротка за довжиною, широка, з сильною хвилястістю країв, сильно гофрована. Черешок зелений, вузький за шириною з білувато-зеленим забарвленням основи. Коренеплід великого розміру, довгий, вузькоконічної форми, повністю заглиблений в грунт.

Гібрид цукристого типу. У період випробування (2005-2007 рр.) середня врожайність коренеплодів у зоні Степу становила 587 ц/га, Лісостепу - 525 ц/га, Полісся - 548 ц/га. Цукристість відповідно – 17,0;17,6;17,9 %. Збір цукру з гектара відповідно – 100; 92,4; 98,6 ц. Втрати цукру в мелясі відповідно - 1,8; 1,7 та 1,6 %.
Гібрид стійкий до цвітушності та слабо уражується коренеїдом. Має середні показники стійкості до церкоспорозу на територіях Степу і Полісся, та високостійкий у зоні Лісостепу. Придатність до механізованого збирання у межах 6,6-8,7 бала.

04013017 Модус

Заявник: **Фр.Штрубе Заатцухт КГ Золлінген**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Диплоїдний гібрид. Клубочок - однопростковий. Паросток з помірним антоціановим забарвленням. Тип розетки - вертикальний. Листок короткий за довжиною. Листкова пластинка коротка за довжиною, середня за шириною з помірною хвилястістю країв, помірно гофрована. Черешок зелений, вузький за шириною з білувато-зеленим забарвленням основи. Коренеплід середнього розміру, середньої довжини, вузькоконічної форми, повністю заглиблений в грунт.

Гібрид урожайно-цукристого типу. У період випробування (2005-2007 рр.) середня врожайність коренеплодів у зоні Лісостепу становила 568 ц/га. Цукристість - 16,9 %. Збір цукру з гектара - 96,1 ц. Втрати цукру в мелясі - 1,7%.
Гібрид стійкий до цвітушності та слабо уражується коренеїдом. Має високий показник стійкості до церкоспорозу. Придатність до механізованого збирання - 8,1 бала.

04013025 НМ 7163 Рз

Заявник: **Сингента Сідс АБ**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Диплоїдний гібрид. Клубочок – однопростковий. Паросток з наявним антоціановим забарвленням. Тип розетки - напіврозлогий. Листок короткий за довжиною. Листкова пластинка коротка за довжиною, середня за шириною, з сильною хвилястістю країв, помірно гофрована. Черешок зелений, середній за шириною з білувато-зеленим забарвленням основи. Коренеплід середнього розміру, середній за довжиною, ширококонічної форми, повністю заглиблений в грунт.

Гібрид урожайно-цукристого типу. У період випробування (2005-2007 рр.) середня врожайність коренеплодів у зоні Лісостепу становила 532 ц/га, Полісся - 541 ц/га. Цукристість відповідно – 17,3;17,7 %. Збір цукру з гектара відповідно – 92,1; 96,2 ц. Втрати цукру в мелясі відповідно - 1,8 та 1,6 %.
Гібрид стійкий до цвітушності та слабо уражується коренеїдом. Має середні показники стійкості до церкоспорозу. Придатність до механізованого збирання у межах 6,3-8,4 бала.

04013018 Ремос

Заявник: **Фр.Штрубе Заатцухт КГ Золлінген**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Диплоїдний гібрид. Клубочок – однопростковий. Антоціанове забарвлення паростку відсутнє. Тип розетки - розлогий. Листок короткий за довжиною. Листкова пластинка коротка за довжиною, вузька за шириною, з помірною хвилястістю країв, помірно гофрована. Черешок зелений, середній за шириною з білувато-зеленим забарвленням основи. Коренеплід середнього розміру, довгий, вузькоконічної форми, повністю заглиблений в грунт.

Гібрид урожайно-цукристого типу. У період випробування (2005-2007 рр.) середня врожайність коренеплодів у зоні Степу становила 595 ц/га, Лісостепу – 580 ц/га. Цукристість відповідно - 16,7;17,1 %. Збір цукру з гектара відповідно – 99,7; 99,3 ц. Втрати цукру в мелясі відповідно - 1,9 та 1,8 %.
Гібрид стійкий до цвітушності та слабо уражується коренеїдом. Має середні показники стійкості до церкоспорозу. Придатність до механізованого збирання у межах 8,0-8,1 бала.

04013030 Резімакс

Заявник: **С.А. Флоримонд Депре**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Диплоїдний гібрид. Клубочок - однопростковий. Паросток з наявним антоціановим забарвленням. Тип розетки - вертикальний. Листок короткий за довжиною. Листкова пластинка коротка за довжиною, вузька за шириною з сильною хвилястістю країв, слабко гофрована. Черешок зелений, за шириною середній з білувато-зеленим забарвленням в основі. Коренеплід великого розміру, середньої довжини, ширококонічної форми, повністю заглиблений в грунт.

Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2005-2007) середня врожайність коренеплодів у зоні Степу становила 612 ц/га, Полісся - 566 ц/га. Цукристість відповідно - 16,6; 17,1%. Збір цукру з гектара відповідно - 102,1; 97,4 ц. Втрати цукру в мелясі - 1,7%.
Гібрид стійкий до цвітушності та слабо уражується коренеїдом. Має середні показники стійкості до церкоспорозу. Придатність до механізованого збирання 6,6-7,4 бала.

04013024 Хеліта

Заявник: **Сингента Сідс АБ**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Диплоїдний гібрид. Клубочок - однопростковий. Паросток з наявним антоціановим забарвленням. Тип розетки - вертикальний. Листок короткий за довжиною. Листкова пластинка коротка за довжиною, середня за шириною, з сильною хвилястістю країв, помірно гофрована. Черешок зелений, середній за шириною з білувато-зеленим забарвленням основи. Коренеплід середнього розміру, середньої довжини, ширококонічної форми, повністю заглиблений в грунт.

Гібрид урожайно-цукристого типу. У період випробування (2005-2007 рр.) середня врожайність коренеплодів у зоні Степу становила 599 ц/га, Лісостепу - 555 ц/га, Полісся - 592 ц/га. Цукристість відповідно – 17,5;17,1;17,2 %. Збір цукру з гектара відповідно – 105,1; 95,5; 103,3 ц. Втрати цукру в мелясі відповідно - 1,8; 1,8 та 1,6 %.
Гібрид стійкий до цвітушності та слабо уражується коренеїдом. Має середні показники стійкості до церкоспорозу на територіях Степу і Полісся та високостійкий у зоні Лісостепу. Придатність до механізованого збирання у межах 6,5-8,6 бала.

05013004 Шаннон

Заявник: **Насіннєва компанія Лаєн Сідс Лімітед**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Триплоїдний гібрид. Клубочок – однопростковий. Антоціанове забарвлення паростку відсутнє. Тип розетки - напіврозлогий. Листок короткий за довжиною. Листкова пластинка середня за довжиною, вузька за шириною, з помірною хвилястістю країв, помірно гофрована. Черешок зелений,

вузький за шириною з білувато-зеленим забарвленням основи. Коренеплід великий за розміром, довгий, циліндрично-конічної форми, повністю заглиблений в грунт.

Гібрид урожайно-цукристого типу. У період випробування (2005-2007 рр.) середня врожайність коренеплодів у зоні Степу становила 593 ц/га, Лісостепу - 591 ц/га, Полісся – 617 ц/га. Цукристість відповідно – 16,9;16,9;17,8 %. Збір цукру з гектара відповідно – 100,4; 100,6; 111,4 ц. Втрати цукру в мелясі відповідно - 1,8; 1,7 та 1,7 %.

Гібрид стійкий до цвітушності та слабо уражується коренеїдом. Має середні показники стійкості до церкоспорозу. Придатність до механізованого збирання у межах 5,7-8,1 бала.

Буряк кормовий

05046003 Дністер

Заявник: **Коломийська дослідна станція Івано-Франківського інституту агропромислового виробництва Української академії аграрних наук**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Диплоїдна рослина. Клубочок - багатопаростковий. Листок короткий за довжиною, вузький за шириною. Листкова пластинка характеризується середнім відношенням довжини до ширини, помірною інтенсивністю зеленого кольору. Форма кінчика - гостра. Черешок середньої довжини з білувато-зеленим забарвлення основи. Коренеплід циліндрично-конічної форми, середній за довжиною, середнього ступеня заглиблення у грунт.

У період випробування (2006-2007 рр.) середня врожайність коренеплодів у зоні Полісся становила 832 ц/га. Вміст сухої речовини - 11,2 %. Сорт середньостійкий до коренеїду та церкоспорозу.

Сільськогосподарські: картопля

Картопля

05031001 Верді

Заявник: **Золана Аграр-Продукте ГмбХ унд Ко. КГ**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Кущ - напівпрямий, високий, проміжного типу з слабким антоціановим забарвленням на стеблі. Листок - світло - зеленого забарвлення, відкритий за обрисом. Віночок квітки - помірно червоно - фіолетовий, квітка - велика, рясність квіток - дуже висока. Бульби - жовті, овально - округлої форми, шкірка - слабкошерехата, вічка - середні. М'якуш - кремовий.

Урожайність, ц/га: П - 351,7. Гарантована прибавка, ц/га: П - 29,2. Гарантована прибавка, %: П.- 9,1. Вміст крохмалю, %: П.- 21,0. Збір крохмалю, ц/га: П.- 63,3. Вегетаційний період, днів: П.- 116. Маса бульб, гр: П.- 75,4. Смакові якості, бал: П.- 9,0. Група стиглості - середньопізній. Напрям використання - для виробництва чіпсів.

05031015 Дорогинь

Заявник: **Поліська дослідна станція ім. О. М. Засухіна Інституту картоплярства Української академії аграрних наук**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Кущ - напівпрямий, середньої висоти, проміжного типу, стебло - зелене без антоціану. Листок - темно - зеленого забарвлення, відкритий за обрисом

без антоціану. Віночок квітки - темно - червоно - фіолетовий, рясність квіток - низька. Бульби - червоні, овально - округлої форми, вічка - глибокі, червоні, шкірка - шерехата. М'якуш - білий.

Урожайність, ц/га: П - 329,3. Гарантована прибавка, ц/га: П - 19,7. Гарантована прибавка, %: П.- 6,4. Вміст крохмалю, %: П.- 17,7. Збір крохмалю, ц/га: П.- 51,5. Вегетаційний період, днів: П.- 118. Маса бульб, гр: П.- 96,6. Смакові якості, бал: П.- 8,3. Група стиглості - середньостиглий. Напрям використання - столовий.

05031014 Звіздаль

Заявник: **Поліська дослідна станція ім. О. М. Засухіна Інституту картоплярства Української академії аграрних наук**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Кущ - напівпрямий, середньої висоти, проміжного типу з слабким антоціановим забарвленням на стеблі. Листок - помірно - зеленого забарвлення, відкритий за обрисом, середнього розміру. Віночок квітки - білий, великих розмірів, рясність квіток - помірна. Бульби - рожеві, овально - округлої форми з неглибокими червоними вічками, поверхня шкірки - шерехата. М'якуш - жовтий.

Урожайність, ц/га: П - 349,9. Гарантована прибавка, ц/га: П - 33,8. Гарантована прибавка, %: П.- 10,7. Вміст крохмалю, %: П.- 17,2. Збір крохмалю, ц/га: П.- 54,8. Вегетаційний період, днів: П.- 99. Маса бульб, гр: П.- 88,0. Смакові якості, бал: П.- 9,0. Група стиглості - середньоранній. Напрям використання - столовий.

04031012 Завія

Заявник: **Поліська дослідна станція ім. О. М. Засухіна Інституту картоплярства Української академії аграрних наук**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Кущ - напівпрямий, середньої висоти, листового типу. Листок - помірно - зеленого кольору, проміжного типу, середоьго розміру. Віночок квітки - білого кольору, рясність квіток - помірна, квітка - велика. Бульби - жовті, слабкошерхаті, овально - округлої форми, вічка - жовті, середньої глибини. М'якуш - білий.

Урожайність, ц/га: П - 320,8. Гарантована прибавка, ц/га: П - 4,7. Гарантована прибавка, %: П.- 1,5. Вміст крохмалю, %: П.- 17,4. Збір крохмалю, ц/га: П.- 47,9. Вегетаційний період, днів: П.- 100. Маса бульб, гр: П.- 76,1. Смакові якості, бал: П.- 8,0. Група стиглості - середньоранній. Напрям використання - столовий.

® 04031002 Курода

Заявник: **Агріко Кооператив Б.А.**

Власник(и): **Агріко Кооператив Б.А.**

Підтримувач(і):

Кущ - напівпрямий, високий, проміжного типу з помірним антоціановим забарвленням на стеблі. Листок - темно - зеленого забарвлення, відкритий за обрисом з помірним антоціановим забарвленням на центральній жилці. Віночок квітки - темно - червоно - фіолетовий, з високою рясністю квіток, квітка - велика. Бульби - червоні, овально - округлої форми з слабкошерхатою шкіркою, вічка - середньої глибини, з жовтим забарвленням основи. М'якуш - світло - жовтий.

Урожайність, ц/га: Л.- 296,8, П - 331,3. Гарантована прибавка, ц/га:Л.- 50,9, П - 21,7. Гарантована прибавка, %: Л.- 20,7, П.- 7,0. Вміст крохмалю, %:Л.- 14,9, П.- 16,4. Збір крохмалю, ц/га:Л.- 42,7, П.- 45,6. Вегетаційний період, днів:Л.- 107, П.- 117. Маса бульб, гр:Л.- 74,0, П.- 102,8. Смакові якості, бал: Л.- 6,1, П.- 7,2. Група стиглості - середньостиглий. Напрям використання - для переробки, свіже споживання, довгострокове зберігання.

05031008 Лаура

Заявник: Єврoплант Пфланценцухт Гмбх

Власник(и):

Підтримувач(і):

Кущ - прямий, високий, проміжного типу з слабким антоціановим забарвленням на стеблі. Листок - помірно - зеленого забарвлення, проміжний за обрисом з слабким антоціановим забарвленням на центральній жилці. Віночок квітки - слабо червоно - фіолетовий, середнього розміру, рясність квіток - низька. Бульби - червоні, овальної форми з гладенькою шкіркою, вічка - неглибокі з жовтим забарвленням основи. М'якуш - темно - жовтий.

Урожайність, ц/га: П - 322,4. Гарантована прибавка, ц/га: П - 6,2. Гарантована прибавка, %: П.- 2,0. Вміст крохмалю, %: П.- 16,0. Збір крохмалю, ц/га: П.- 43,2. Вегетаційний період, днів: П.- 101. Маса бульб, гр: П.- 85,6. Смакові якості, бал: П.- 7,3. Група стиглості - середньоранній. Напрям використання - столовий.

05031018 Мелоді

Заявник: Маєр Б.В.

Власник(и):

Підтримувач(і):

Кущ - розлогий, середньої висоти, листкового типу з слабким антоціановим забарвленням на стеблі. Листок - помірно - зеленого забарвлення, великий, закритий за обрисом. Віночок квітки - світло - червоно - фіолетовий, рясність квіток - помірна. Бульби - жовті, овально - округлої форми з гладенькою шкіркою, вічка - неглибокі. М'якуш - жовтий.

Урожайність, ц/га: П - 346,1. Гарантована прибавка, ц/га: П - 23,7. Гарантована прибавка, %: П.- 7,4. Вміст крохмалю, %: П.- 13,7. Збір крохмалю, ц/га: П.- 41,0. Вегетаційний період, днів: П.- 121. Маса бульб, гр: П.- 97,5. Смакові якості, бал: П.- 8,6. Група стиглості - середньостиглий. Напрям використання - столовий.

05031013 Оберіг

Заявник: Інститут картоплярства Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Кущ - прямий, середньої висоти, проміжного типу з слабким антоціановим забарвленням на стеблі. Листок - помірно - зеленого забарвлення, відкритого типу з слабким антоціановим забарвленням на центральній жилці. Віночок квітки - помірно червоно - фіолетовий, з високою рясністю квіток. Бульби - рожеві, овально - округлої форми з гладенькою шкіркою, вічка - неглибокі, червоні. М'якуш - світло - жовтий.

Урожайність, ц/га: Л.- 273,6, П - 366,2. Гарантована прибавка, ц/га: Л.- 27,7, П - 56,5. Гарантована прибавка, %: Л - 11,3, П.- 18,3. Вміст крохмалю, %: Л.- 11,6, П.- 15,1. Збір крохмалю, ц/га: Л.- 29,3, П.- 47,0. Вегетаційний період, днів: Л.- 111, П.- 107. Маса бульб, гр: Л.- 72,0, П.- 94,7. Смакові якості, бал: Л.- 7,0, П.- 7,6. Група стиглості - середньоранній. Напрям використання - столовий.

07031004 Піроль

Заявник: Норіка Нордрінг-Картофельцухт-унд Фермерунгс-ГмбХ

Власник(и):

Підтримувач(і):

Кущ - напівпрямий, високий, листового типу. Листок - темний, відкритий за обрисом, середнього розміру. Віночок квітки - світло блакитно - фіолетовий, середнього розміру, рясність квіток - помірна. Бульби - жовті, слабкошерхаті, овально - округлої форми з неглибокими вічками. М'якуш - жовтий.

Урожайність, ц/га: П - 342,6. Гарантована прибавка, ц/га: П - 33,0. Гарантована прибавка, %: П.- 10,7. Вміст крохмалю, %: П.- 18,8. Збір крохмалю, ц/га: П.- 57,4. Вегетаційний період, днів: П.- 110. Маса бульб, гр: П.- 90,5. Смакові якості, бал: П.- 9,0. Група стиглості - середньоранній. Напрям використання - для переробки (чіпси, сушені продукти).

05031012 Поліське джерело

Заявник: **Інститут картоплярства Української академії аграрних наук**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Кущ - напівпрямий, високий, стеблового типу з помірним антоціановим забарвленням на стеблі. Листок - помірно - зеленого забарвлення, проміжний за обрисом з слабким антоціановим забарвленням на центральній жилці. Віночок квітки - світло червоно - фіолетовий, рясність квіток - помірна. Бульби - рожеві, овальні, вічка - неглибокі, червоні, шкірка - слабкошерехата. М'якуш - кремовий.

Урожайність, ц/га: П - 364,0. Гарантована прибавка, ц/га: П - 41,6. Гарантована прибавка, %: П.- 12,9. Вміст крохмалю, %: П.- 17,3. Збір крохмалю, ц/га: П.- 54,4. Вегетаційний період, днів: П.- 121. Маса бульб, гр: П.- 99,4. Смакові якості, бал: П.- 8,8. Група стиглості - середньопізній. Напрям використання - столовий.

05031010 Скарбниця

Заявник: **Інститут картоплярства Української академії аграрних наук**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Кущ - напівпрямий, середньої висоти, проміжного типу з слабким антоціановим забарвленням на стеблі. Листок - помірно - зеленого кольору, проміжного типу з слабким антоціановим забарвленням на центральній жилці. Віночок квітки - світло червоно - фіолетовий, рясність квіток - помірна. Бульби - жовті, слабкошерхаті, овально - округлої форми з неглибокими жовтими вічками. М'якуш - жовтий.

Урожайність, ц/га: Л.- 258,1, П - 414,2. Гарантована прибавка, ц/га: Л.- 0, П - 104,6. Гарантована прибавка, %: Л - 0, П.- 33,8. Вміст крохмалю, %: Л.- 11,8, П.- 14,1. Збір крохмалю, ц/га: Л.- 30,0, П.- 48,4. Вегетаційний період, днів: Л.- 95, П.- 98
Маса бульб, гр: Л.- 84,5, П.- 94,1. Смакові якості, бал: Л.- 6,6, П.- 7,6. Група стиглості - ранньостиглий. Напрям використання - столовий.

05031006 Тайфун

Заявник: **Поморсько Мазовецка Годівля Земляка Сполка з.о.о.**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Кущ - напівпрямий, високий, проміжного типу з слабким антоціановим забарвленням на стеблі. Листок - помірно - зеленого забарвлення, проміжний за обрисом з слабким антоціановим забарвленням на центральній жилці. Віночок квітки - білий, рясність квіток - помірна. Бульби - жовті, овальні з гладенькою шкіркою, вічка - середні. М'якуш - жовтий.

Урожайність, ц/га: П - 331,5. Гарантована прибавка, ц/га: П - 21,8. Гарантована прибавка, %: П.- 7,0. Вміст крохмалю, %: П.- 18,8. Збір крохмалю, ц/га: П.- 52,3. Вегетаційний період, днів: П.- 116. Маса бульб, гр: П.- 99,8. Смакові якості, бал: П.- 8,6. Група стиглості - середньостиглий. Напрям використання - столовий.

Сільськогосподарські: кормові

Сорго цукрове

07472001 Довіста

Заявник: Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Антоціанове забарвлення паростка відсутнє.Сходи темно-зелені. Темп початкового росту високий. Рослини високорослі із слабою кущистістю. Товстостебловий, жилка листка біла. Суцвіття овальне, пряме, середнє за щільністю і довжиною, дуже вузьке. Час достигання пізній.

Середня урожайність: сухої речовини - 160 ц/га; насіння – 18,8 ц/га. Вміст сирого протеїну – 8,3%. Віміст клітковини - 28,4%. Сорт середньопізній, має середні показники посухостійкий та високі показники стійкості до хвороб. Напрям використання - кормовий.

06472001 Пам"яті Шепеля

Заявник: Південний філіал "Кримський агротехнологічний університет" НАУ

Власник(и):

Підтримувач(і):

Антоціанове забарвлення паростка відсутнє.Темп початкового росту середній. Рослини високорослі. Час викидання волоті середній. Листок довгий, середній за шириною, забарвлення центральної жилки зелене. Суцвіття обернено-конусоподібне, пряме, середнє за щільністю і довжиною і шириною. Час достигання ранній.

Середня урожайність: сухої речовини - 145,4 ц/га; насіння – 33,6 ц/га. Вміст сирого протеїну – 8,5%. Віміст клітковини - 28,7%. Сорт середньостиглий, посухостійкий, має високі показники стійкості до хвороб. Напрям використання - кормовий.

Суданська трава

06067001 Білявка

Заявник: Генічеська дослідна станція Інституту зернового господарства Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Сорт має помірне антоціанове забарвлення колеоптиля паростка. Габітус рослини розлогий, середня кількість пагонів і листків. Рослина низька. Стебло середнє за товщиною. Листкова пластинка середнього розміру. Суцвіття довге, нещільне, напівстиснуте. Колоски овальні, сильно опушені. Насінина має світло-коричневе забарвлення після достигання, маса 1000 зерен мала. Час викидання волоті дуже ранній.

Середня урожайність: сухої речовини - 61,5 ц/га; насіння – 14,0 ц/га. Вміст сирого протеїну – 9,4%. Віміст клітковини - 23,6%. Сорт середньостиглий, дуже посухостійкий, має високі показники стійкості до хвороб. Кількість укосів - 2-3. Напрям використання - кормовий.

Горошок (Вика яра)

05047002 Євгена

Заявник: **Білоцерківська дослідно-селекційна станція ім. О.К. Коломієць Інституту цукрових буряків Української академії аграрних наук**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Сіянці рослин сорту через 3-4 тижні після появи сходів мають помірне антоціанове забарвлення основи стебла, зелене листя.

Час початку цвітіння у сорту середній. На цей час верхнє міжвузля стебла опушене, антоціанове забарвлення пазух листків відсутнє, або дуже слабке, форма верхівки листочків на середній третині рослини пряма, листочки середньої ширини, антоціанове забарвлення залозок на прилистках відсутнє або дуже слабке, квітка має світло-фіолетове забарвлення паруса.

У фазі повного розвитку боби мають слабке опушення, середню довжину і ширину, середній дзьобик та середню кількість насінних зачатків.

За збирання, у фазі повної стиглості, сформоване насіння середнє за розміром та округле за формою. Воно має основне сіро-коричневе забарвлення насінної оболонки та тільки дифузну коричневу орнаментацію. Вираження коричневої орнаментації дуже слабке. Блакитно-чорна орнаментація відсутня. Насіння має сірувато-коричневе забарвлення сім'ядолей.

Середня урожайність: сухої речовини - Степ - 46,1 ц/га; Лісостеп - 48,1 ц/га; Полісся - 74,1 ц/га (гарантована прибавка - 8,0 ц/га або 12,0 %); насіння – Степ - 15,7 ц/га; Лісостеп - 13,5 ц/га; Полісся - 23,0 ц/га (гарантована прибавка - 4,7 ц/га або 26,0%). Вміст сирого протеїну –18,3-19,7 %. Сорт середньостиглий, достатньо посухостійкий, незначно уражується хворобами. Залистяність - 51,8-62,1 % . Напрям використання - кормовий.

05047001 Ліліана

Заявник: **Вінницька державна сільськогосподарська дослідна станція Української академії аграрних наук**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Сіянці рослин сорту через 3-4 тижні після появи сходів мають помірне антоціанове забарвлення основи стебла, зелене листя.

Час початку цвітіння у сорту ранній. На цей час верхнє міжвузля стебла не опушене, антоціанове забарвлення пазух листків відсутнє, або дуже слабке, форма верхівки листочків на середній третині рослини увігнута, листочки широкі, антоціанове забарвлення залозок на прилистках слабке, квітка має світло-фіолетове забарвлення паруса.

У фазі повного розвитку боби мають слабке опушення, середню довжину і ширину, короткий дзьобик та середню кількість насінних зачатків.

За збирання, у фазі повної стиглості, сформоване насіння середнє за розміром та округле за формою. Воно має основне сіро-коричневе забарвлення насінної оболонки та тільки дифузну коричневу орнаментацію. Вираження коричневої орнаментації дуже слабке. Блакитно-чорна орнаментація відсутня. Насіння має оранжеве забарвлення сім'ядолей.

Середня урожайність: сухої речовини - Степ - 45,0 ц/га; Лісостеп - 44,3 ц/га; Полісся - 72,8 ц/га (гарантована прибавка - 6,6 ц/га або 10,0 %); насіння – Степ - 12,8 ц/га; Лісостеп - 10,0 ц/га; Полісся 21,5 ц/га (гарантована прибавка - 3,3 ц/га або 17,9%). Вміст сирого протеїну – 19,0 - 19,8 %. Сорт середньостиглий, достатньо посухостійкий, має високі показники стійкості до хвороб. Залистяність - 52,8 - 61,0 % . Напрям використання - кормовий.

Люпин білий

05055001 Макарівський

Заявник: Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук"

Власник(и):

Підтримувач(і):

Відсутня гірка речовина в зерні. Рослина середня за висотою у фазі початку цвітіння, висока - у фазі зеленої стиглості, пряма, індетермінантний тип росту. Листок зелений. Антоціанове забарвлення стебла відсутнє. Верхівковий листочок короткий і вузький. Квітка синювато-біла. Основне забарвлення зерна в стадії повної стиглості біле, орнаментація відсутня. Час початку цвітіння, зеленої і повної стиглості середній.

Середня урожайність: сухої речовини - Лісостеп - 44,0 ц/га; Полісся - 69,6 ц/га (гарантована прибавка - 4,7 ц/га або 7,3%); насіння – Лісостеп - 27,2 ц/га; Полісся 29,0 ц/га. Вміст сирого протеїну – 19,0-20,4 %. Сорт середньостиглий, достатньо посухостійкий, незначно уражується хворобами. Залистяність - 59,3-65,5 % . Вміст алкалоїдів у зеленій масі - 0,010 %, у зерні - 0,017. Напрям використання - кормовий.

Люпин вузьколистий

05056002 Пелікан

Заявник: Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук"

Власник(и):

Підтримувач(і):

Наявна гірка речовина в зерні. Рослина середня за висотою, пряма, індетермінантний тип росту. Листок зелений. Антоціанове забарвлення стебла відсутнє. Верхівковий листочок короткий і вузький. Квітка синювато-біла за кольором. Основне забарвлення зерна в стадії повної стиглості біле, орнаментація відсутня. Час початку цвітіння, зеленої і повної стиглості ранній.

Середня урожайність: сухої речовини - 63,5 ц/га; насіння – 26,0 ц/га. Вміст сирого протеїну – 16,1%. Сорт ранньостиглий, достатньо посухостійкий, має високу стійкість до хвороб. Залистяність - 60,0-63,8 %. Вміст алкалоїдів у зеленій масі - 0,020%, у зерні - 0,025 %. Напрям використання - кормовий.

Серадела

06132001 Ольгінська

Заявник: **Інститут сільського господарства Полісся Української академії аграрних наук**

Власник(и):

Підтримувач(і):

За типом росту рослина пряма, має середню кількість розгалужень.
Стебло середньої довжини, антоціанове забарвлення відсутнє, має слабке опушення.
Листки середньої довжини, еліптичні за формою, прилистки - відсутні.
Суцвіття має від 4 до 5 квіток рожевого кольору.
Біб середнього розміру, вигин відсутній.
Час цвітіння - ранній, достигання - середній.

Середня урожайність: сухої речовини - 51,0 ц/га; насіння – 3,5 ц/га. Вміст сирого протеїну – 15,8%. Сорт середньостиглий, достатньо посухостійкий, має середні показники стійкості до хвороб. Залистяність - 56,0 % . Напрям використання - кормовий.

Конюшина повзуча (біла)

05053002 Муравка

Заявник: **Державний вищий навчальний заклад "Державний агроекологічний університет"**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Листок має середній розмір центрального листочка (3-4 листок від кінця швидкорослого пагона; через 1-2 тижня після цвітіння). Рідко зустрічаються рослини з білими мітками на листках. Черешок листка середнього розміру. Пагони стебла тонкі. Час цвітіння ранній. Рослина зеленого забарвлення.

Середня урожайність сухої речовини - 84,0 ц/га. Вміст сирого протеїну – 25,0%. Сорт ранньостиглий, посухостійкий, має високі показники зимостійкості та стійкості до хвороб. Напрям використання - кормовий.

04053001 Юра

Заявник: **Фельдзаатен Фройденбергер ГмбХ унд Ко.КГ**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Листок має середню довжину центрального листочка (3-4 листок від кінця швидкорослого пагона; через 1-2 тижня після цвітіння), широкий. Часто зустрічаються рослини з білими мітками на листках. Черешок листка середнього розміру. Час цвітіння ранній. Рослина світло-зеленого забарвлення.

Середня урожайність сухої речовини - 99,0 ц/га. Вміст сирого протеїну – 20,5%. Сорт ранньосередній, посухостійкий, має високі показники зимостійкості та стійкості до хвороб. Напрям використання - кормовий.

Турнепс

06140001 Сонячний ранок

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю" Свитязь"

Власник(и):

Підтримувач(і):

Диплоїд. Положення листка напівпрямостоячий, інтенсивність зеленого кольору помірна, часточковий за типом, має середню кількість часток. Листок середній за розміром, хвилястістю краю і зубчастістю.
Коренеплід має світло-бронзовий колір шкірки над грунтом, і білий колір у грунті, форма у поздовжньому розрізі поперечно-еліптична, середній за розміром.

Середній товарний урожай - 750 ц/га. Середня маса коренеплодів - 500 г. Лежкість - 90%. Вегетацій період сорту - 80 днів. Сорт має високі показники стійкості до хвороб. Напрям використання - кормовий.

Костриця червона

05111006 Говерла

Заявник: Передкарпатський філіал Інституту землеробства і тваринництва західного регіону Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Гексаплоїд. Помірне антоціанове забарвлення піхви листка, листкова пластинка скручена влітку в рік сівби. Кореневище відсутнє. Восени в рік сівби тип куща рослини від напівпрямого до проміжного, листок від дуже вузького до вузького, темно-зелений, наліт відсутній.
На другий рік; за викидання волоті стебло і суцвіття за довжиною від короткого до середнього. Наявні остюки. За повної стиглості нижня квіткова луска опушена.

Середня урожайність сухої речовини - 65 ц/га. Вміст сирого протеїну – 10,2%. Вміст клітковини - 29,1%. Сорт середньостиглий, має високі показники посухостійкості, зимостійкості та стійкості до хвороб. Напрям використання - пасовищно-сінокісний.

Еспарцет закавказький

02050001 Адам

Заявник: Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Габітус рослини на початку бутонізації напівпрямий. Висота основної зеленої маси середня. Листок зелений. Стебло опушене, має антоціанове забарвлення. Листок довгий, середньої товщини. Суцвіття довге, яйцеподібне. Квітка рожева, нерівномірного забарвлення. Бобик середнього розміру, наявні короткі зубчики.

Середня урожайність сухої речовини - Степ - 81,1 ц/га (гарантована прибавка - 6,0 ц/га або 8 %); Лісостеп - 50,3 ц/га; Полісся - 52,5 ц/га. Вміст сирого протеїну – 16,9 - 19,2 %. Сорт середньостиглий, достатньо посухостійкий, має високі показники зимостійкості та стійкості до хвороб. Напрям використання - кормовий.

Сільськогосподарські: овочеві

Баклажан

05022008 Міледа F1

Заявник: **Сингента Сідз Б. В.**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Рослина висока, габітус - прямостоячий. Плід довгий, діаметр середній, форма циліндрична, колір шкірки у товарній стиглості - темно-фіолетовий, смугастість та ребристість відсутні. Колір м`якуша плоду білуватий. Колір шкірки за фізіологічної стиглості плоду жовтий. Час початку цвітіння і стиглості середній.

Маса товарного плоду 250 г; період від сівби до початку достигання (від висадки 30-ти денної розсади) 50 днів; період плодоношення 18 днів; дружність достигання 80%; ураженість хворобами та пошкодження шкідниками, %: фітофторозом 4, макроспоріозом 4; гнилями 4; вірусними хворобами 3; попелицею 5; вміст сухої речовини в плоді 4 %; транспортабельність 7 балів.

Боби кінські

05043001 Переможець

Заявник: **Коломийська дослідна станція Івано-Франківського інституту агропромислового виробництва Української академії аграрних наук**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Листок темно-зеленого кольору, середнього розміру. Час цвітіння середній. Помірне антоціанове забарвлення стебла. Наявна меланінова пляма крила коричневого кольору, парус з антоціановим забарвленням. Тип росту детермінантний. Рослина висока. Біб середнього розміру. Сухе насіння еліптичної форми бежевого кольору, наявна чорна пігментація рубчика.

Середня урожайність: сухої речовини - 54,3 ц/га; насіння – 16,0 ц/га. Вміст сирого протеїну – 29,0%. Сорт середньостиглий, достатньо посухостійкий, має високі показники стійкості до хвороб. Залистяність - 47,8-60,0 % . Напрям використання - кормовий.

Буряк столовий

05023004 Січовий

Заявник: **Товариство з обмеженою відповідальністю "Селма"**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Сорт з багаторостковим типом суплідця. Паросток з антоціановим забарвленням гіпокотиля . Листок короткий, положення у просторі напівпряме, за шириною середній, еліптичної форми. Антоціанове забарвлення листкової платинки слабке, хвилястість краю слабка, пухирчастість помірна. Коренеплід округлої форми, на 1/4 заглиблений у грунт. Колір шкірки червоний, основне забарвлення м'якушу білий. Прояв кілець - сильний. Схильність до стрілкування за раннього висіву слабка.

Загальна урожайність сорту 80,0 т/га, товарна - 78,0 т/га. Маса товарного плоду - 200 г. Період від повних сходів до початку достигання 85 діб. Дегустаційна оцінка 9 балів.

05023003 Бастард

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Селма"

Власник(и):

Підтримувач(і):

Сорт з багаторостковим типом суплiддя. Паросток з антоціановим забарвленням гіпокотиля . Листок середньої довжини, положення у просторі напівпряме, за шириною середній, еліптичної форми. Антоціанове забарвлення листкової платинки помірне, хвилястість краю слабка, пухирчастість слабка. Коренеплід округлої форми, на 1/4 заглиблений у грунт. Колір шкірки червоний, основне забарвлення м'якушу червоне. Прояв кілець - слабкий. Схильність до стрілкування за раннього висіву слабка.

Загальна урожайність сорту 80,0 т/га, товарна - 70,0 т/га. Маса товарного плоду - 200 г. Період від повних сходів до початку достигання 85 діб. Дегустаційна оцінка 9 балів.

07023002 Бікорес

Заявник: Бейо Заден Б.В.

Власник(и):

Підтримувач(і):

Тип суплiддя багаторостковий. Наявне антоціанове забарвлення гіпокотиля паростка. Положення черешка і пластинки листка напівпряме. Листок короткий і вузький, вузько-еліптичної форми, світло-зеленого кольору з помірним антоціановим забарвленням. Хвилястість і пухирчастість листкової пластинки помірні. Коренеплід округлої форми у поздовжньому розрізі, середній за розміром, має слабке окорковіння, колір шкірки і м`якуша - червоний, прояв кілець слабкий.

Загальна врожайність - 4-5 кг/м2, маса товарного плоду - 230 г. Вміст загального цукру - 5,2%. Ураженість хворобами, %: борошнистою росою - 2, церкоспорозом - 2. Період від повних сходів до початку достигання 122 дні.

05023006 Кардинал

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю" Свитязь"

Власник(и):

Підтримувач(і):

Сорт з одноростковим типом суплiддя. Паросток з антоціановим забарвленням гіпокотиля . Листок довгий, положення у просторі пряме, за шириною середній, еліптичної форми. Антоціанове забарвлення листкової платинки відсутне, хвилястість краю сильна, пухирчастість слабка. Коренеплід округлої форми, на 1/2 заглиблений у грунт. Колір шкірки червоний, основне забарвлення м'якушу червоне. Прояв кілець сильний. Схильність до стрілкування за раннього висіву слабка.

Загальна урожайність сорту 60,0 т/га, товарна - 50,0 т/га. Маса товарного плоду - 400 г. Період від повних сходів до початку достигання 120 дыб. Дегустаційна оцінка 9 балів.

06023004 Нобол

Заявник: Клоз Тезьє

Власник(и):

Підтримувач(і):

Сорт з однорostковим типом суплiддя. Відсутнэ антоціанове забарвлення гіпокотиля . Листок середньої довжини, положення у просторі напівпряме, за шириною середній, еліптичної форми. Антоціанове забарвлення листкової платинки слабке, хвилястість краю слабка, пухирчастість помірна. Коренеплід округлої форми, на 1/4 заглиблений у грунт. Колір шкірки червоний, основне забарвлення м'якушу пурпурове. Прояв кілець слабкий. Схильність до стрілкування за раннього висіву відсутня.

Загальна урожайність сорту 60,0 т/га, товарна 50 т/га. Маса товарного плоду 250 г. Період від повних сходів до початку достигання 75 день. Дегустаційна оцінка 9,0 балів.

Горох овочевий

05024001 Бастіон

Заявник: Нюнемс Б.В.

Власник(и):

Підтримувач(і):

Рослини сорту низькі, без антоціанового забарвлення, з наявними вторинними листочками, з двома квітками на вузлі, має середній час і цвітіння, і достигання.

Стебло - нефасційоване, коротке, має середню кількість вузлів. Листки помірно зеленого кольору без сіруватого відтінку.

Вторинні листочки характеризуються такими ознаками: відсутнім восковим нальотом на верхніх листочках, малою їх кількістю; середніми розмірами пластинки, довжини, ширини та короткою відстанню від найширшої частини до основи. Ступінь зубчастості вторинних листочків дуже слабка.

Прилисток добре розвинутий, без наявної форми "кролячих вух" та з восковим нальотом на його поверхні, короткий і широкий з помірною плямистістю.

Квітка з малою довжиною квітконіжки від стебла до першої квітки, має середню ширину чашолистка з загостреною формою верхівки верхнього чашолистка на другому квітуючому вузлі.

Колір паруса - білий, з середньою максимальною його шириною, піднесеною формою основи та слабкою інтенсивністю хвилястості.

Біб має велику кількість насінних зачатків, середньої довжини і дуже вузький, жовтого кольору, з наявною пергаментністю, випуклим типом вигину та середнім ступенем його прояву.

Насінина сферичної форми, має просту форму крохмальних зерен та сильну зморшкуватість сім'ядоліей зеленого кольору. Чорне забарвлення рубчика відсутнє.

Маса 1000 насінин - мала.

Напрямок використання – універсальний (сушіння, консервування, споживання в свіжому вигляді). Дружність дозрівання – 90 %.

Товарна урожайність бобів – 8,8 т/га з вмістом загального цукру - 11 %, вітаміну С - 50 мг/100 г. Дегустаційна оцінка як свіжих плодів, так і при переробці - по 9 балів.

05024002 Вада

Заявник: Нюнемс Б.В.

Власник(и):

Підтримувач(і):

Рослини сорту низькі, без антоціанового забарвлення, з наявними вторинними листочками, з двома квітками на вузлі, має ранній час цвітіння та середній - достигання.

Стебло - нефасційоване, середньої довжини, має середню кількість вузлів.

Листки - помірно зеленого кольору без сіруватого відтінку.

Вторинні листочки характеризуються такими ознаками: відсутнім восковим нальотом на верхніх листочках, малою їх кількістю; середніми розмірами пластинки, довжини, ширини та відстані від найширшої частини до основи. Ступінь зубчастості вторинних листочків - дуже слабка.

Прилисток добре розвинутий, без наявної форми "кролячих вух" та з восковим нальотом на його поверхні, короткий та широкий з помірною плямистістю.

Квітка з середньою довжиною квітконіжки від стебла до першої квітки, має середню ширину чашолистка з загостреною формою верхівки верхнього чашолистка на другому квітуючому вузлі.

Колір паруса - білий з середньою максимальною його шириною, прямою формою основи та помірною інтенсивністю хвилястості.

Біб має велику кількість насінних зачатків, довгий і вузький, жовтого кольору з наявною пергаментністю, випуклим типом вигину та відсутнім або дуже слабким ступенем його прояву.

Насінина неправильної форми, має просту форму крохмальних зерен та середньої зморшкуватості сім'ядолі зеленого кольору. Чорне забарвлення рубчика відсутнє.

Маса 1000 насінин - середня.

Напрямок використання – для консервації. Дружність дозрівання - 90 %..

Товарна урожайність бобів - 10,4 т/га з вмістом загального цукру - 11 %, вітаміну С - 50 мг/100 г. Дегустаційна оцінка і свіжих плодів, і при переробці - по 9 балів.

05024004 Женева

Заявник: Нюнемс Б.В.

Власник(и):

Підтримувач(і):

Рослини сорту дуже низькі, без антоціанового забарвлення, з наявними вторинними листочками, з двома квітками на вузлі, має середні час і цвітіння, і достигання.

Стебло - нефасційоване, коротке, має середню кількість вузлів.

Листки - помірно зеленого кольору без сіруватого відтінку.

Вторинні листочки характеризуються такими ознаками: середніми розмірами, наявним восковим нальотом на верхніх листочках, малою їх кількістю; середньою довжиною, шириною та відстанню від найширшої частини до основи. Ступінь зубчатості вторинних листочків - дуже слабка.

Прилисток - добре розвинутий, без наявної формою "кролячих вух" та восковим нальотом на його поверхні, має середні довжину та ширину з помірною плямистістю.

Квітка з малою довжиною квітконіжки від стебла до першої квітки, має середню ширину чашолистка із загостреною формою верхівки верхнього чашолистика на другому квітуючому вузлі.

Колір паруса - білий, з середньою максимальною його шириною, піднесеною формою основи та слабкою інтенсивністю хвилястості.

Біб має велику кількість насінних зачатків, довгий і вузький, жовтого кольору, з наявною пергаментністю, з увігнутим типом вигину та слабким ступенем його прояву.

Насінина неправильної форми, має просту форму крохмальних зерен, сім'ядолі зеленого кольору та відсутнім чорним забарвленням рубчика.

Маса 1000 насінин - мала.

Сорт характеризується універсальнийм напрямком використання (сушіння, консервування, споживання в свіжому вигляді). Дружність дозрівання - 90 %..

Товарна урожайність бобів - 8,8 т/га з вмістом загального цукру - 11 %, вітаміну С - 50 мг/100 г. Дегустаційна оцінка і свіжих плодів, і при переробці - по 9 балів.

05024003 Каріна

Заявник: Нюнемс Б.В.

Власник(и):

Підтримувач(і):

Рослини сорту низькі, без антоціанового забарвлення, з наявними вторинними листочками та кількістю квіток на вузлі від одної до двох, має ранні як час цвітіння, так і час достигання.

Стебло - нефасційоване, коротке, має середню кількість вузлів.

Листки - помірно зеленого кольору, без сіруватого відтінку.

Вторинні листочки характеризуються такими ознаками: відсутнім восковим нальотом на верхніх листочках, малою їх кількістю; середніми розмірами довжини, ширини та відстані від найширшої частини до основи. Ступінь зубчастості вторинних листочків -дуже слабка.

Прилисток добре розвинутий, без наявної формою "кролячих вух" та з восковим нальотом на його поверхні, середньої довжини та широкий з помірною плямистістю.

Квітка з середньою довжиною квітконіжки від стебла до першої квітки, має середню ширину чашолистка з загостреною формою верхівки верхнього чашолистика на другому квітуючому вузлі.

Колір паруса - білий, з середньою максимальною його шириною, прямою формою основи та помірною інтенсивністю хвилястості.

Біб має середню кількість насінних зачатків, середню довжину, вузький, жовтого кольору, з наявною пергаментністю, з випуклимим типом вигину та відсутнім або дуже слабким ступенем його прояву.

Насінина циліндричноїної форми, має просту форму крохмальних зерен, сім'ядолі зеленого кольору та відсутнє чорне забарвлення рубчика.

Маса 1000 насінин - середня.

Сорт характеризується універсальниймнапрямком використання (сушіння, консервування, споживання в свіжому вигляді). Дружність дозрівання - 90 %.

Товарна урожайність бобів - 10,4 т/га з вмістом загального цукру - 11 %, вітаміну С - 50 мг/100 г. Дегустаційна оцінка і свіжих плодів, і при переробці - по 9 балів

04024007 Ода

Заявник: **Товариство з обмеженою відповідальністю "Ярд"**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Рослини сорту низькі, без антоціанового забарвлення, з наявними вторинними листочками та з двома квітками на вузлі, має ранній час і цвітіння, і достигання.

Стебло - нефасційоване, середньої довжини, має велику кількість вузлів.

Листки помірно зеленого кольору без сіруватого відтінку.

Вторинні листочки характеризуються такими ознаками: наявнимним восковим нальотом на верхніх листочках, малою їх кількістю; середніми розмірами пластинки, довжини, ширини та відстанні від найширшої частини до основи, без зубчастосі.

Прилисток добре розвинутий, без наявної формою "кролячих вух" та з восковим нальотом на його поверхні, має середні параметри довжини та ширини з дуже щільною плямистістю.

Квітка з середньою довжиною квітконіжки від стебла до першої квітки, має середню ширину чашолистка з округлою формою верхівки верхнього чашолистика на другому квітуючому вузлі.

Колір паруса - білий, з середнім показником максимальної його ширини, прямою формою основи та помірною інтенсивністю хвилястості.

Біб має велику кількість насінних зачатків, середні показники довжини та ширини, зеленого кольору, з наявною пергаментністю, увігнутим типом вигину та відсутнім або дуже слабким ступенем його прояву.

Насінина неправильної форми, має складну форму крохмальних зерен та сильну зморшкуватість сім'ядолей зеленого кольору. Чорне забарвлення рубчика відсутнє.

Маса 1000 насінин - велика.

Напрямок використання – універсальний (сушіння, консервування, споживання в свіжому вигляді). Дружність дозрівання – висока з періодом плодоношення – 6 діб.

Товарна урожайність бобів –11,7 т/га з вмістом білка - 27,1,%, загального цукру - 7,2 %, вітаміну С – 31,8 мг/100 г.

Дегустаційна оцінка свіжих плодів 4,7, а при переробці - 4,6 балів.

Ураженість аскохітозом становить 6,6 % , а кореневими гнилями – 35,8 %.

04024010 Стриж

Заявник: **Ніжинський агротехнічний інститут Національного аграрного університету**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Рослини сорту низькі, без антоціанового забарвлення, з наявними вторинними листочками та двома квітками на вузлі, має середній час і цвітіння, і достигання.

Стебло - нефасційоване, коротке, з великою кількістю вузлів.

Листки - помірно зеленого кольору без сіруватого відтінку.

Вторинні листочки характеризуються такими ознаками: наявнимним восковим нальотом на верхніх листочках, малою їх кількістю; малими розмірами пластинки та довжини, середньою шириною та короткою відстанню від найширшої частини до основи, без зубчастосі.

Прилисток добре розвинутий, без наявної формою "кролячих вух" та з восковим нальотом на його поверхні, має середні параметри довжини та ширини з малою плямистістю.

Квітка з малою довжиною квітконіжки від стебла до першої квітки, має середню ширину чашолистка з округлою формою верхівки верхнього чашолистка на другому квітуючому вузлі.

Колір паруса - білий, з середнім показником максимальної його ширини, піднесеною формою основи та слабкою інтенсивністю його хвилястості.

Біб має середню кількість насінних зачатків, середню довжину, вузький, жовтого кольору, з наявною пергаментністю, увігнутим типом вигину та відсутнім або дуже слабким ступенем його прояву.

Насінина неправильної форми, має просту форму крохмальних зерен та сильної зморшкуватості сім'ядолі зеленого кольору. Чорне забарвлення рубчика відсутнє.

Маса 1000 насінин - середня.

Напрямок використання – універсальний (сушіння, консервування, споживання в свіжому вигляді). Дружність дозрівання – 92 % з періодом плодоношення – 8 діб.

Товарна урожайність бобів –16 т/га з вмістом білка - 6 %, загального цукру - 6,5 %, вітаміну С – 34 мг/100 г.

Дегустаційна оцінка свіжих плодів 4,8, бала, а при переробці - 4,6 бала.

Диня

06025001 Голді ТЗ F1

Заявник: Клоз Тезьє

Власник(и):

Підтримувач(і):

Листкова пластинка характеризується такими показниками: середній розмір, сильна інтенсивність зеленого забарвлення, помірна вираженість лопатей, помірна зубчастість і хвилястість країв. Черешок середній за довжиною, положення у фазі трьох листків напівпряме. Квітки за статтю однодомні. Основний колір шкірки плоду перед достиганням сіро-зелений. Для плоду характерні такі ознаки: довгий, за діаметром середній, місце найбільшої ширини у центрі, форма поздовжнього розрізу еліптична, основний колір шкірки в період достигання жовтий, форма основи і верхівки заокруглена, смуги відсутні, наявні зморшкуватість поверхні і коркове утворення з сітчастим візерунком. М`якуш в поперечному розрізі товстий, колір кремовий. Насінина еліптична за формою у поперечному розрізі, кремово-жовтого кольору.

Загальний урожай 25 т/га; товарний урожай 22 т/га; маса товарного плоду 2500 г; довжина товарного плоду 25 см; діаметр товарного плоду 18 см; нестандартних плодів від загального врожаю, % - жовтляків, % - 2; нестандартних плодів від загального врожаю, % - з опіками, % - 2; нестандартних плодів від загального врожаю, % - повторних, % - 3; період від повних сходів до першого збору 55 днів; період плодоношення 30 днів; дружність плодоутворення 95%; ураженість борошнистою росою, бактеріозом, антракнозом, вірусними хворобами - 2%; дегустаційна оцінка свіжих плодів 9 балів; транспортабельність 9 балів; група стиглості - дуже ранній.

05025010 Спокуса F1

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю" Свитязь"

Власник(и):

Підтримувач(і):

Основний колір шкірки плоду перед достиганням зелений. Для плоду характерні такі ознаки: середній за довжиною і діаметром, місце найбільшої ширини у центрі, форма поздовжнього розрізу еліптична, основний колір шкірки в період достигання вохряний, форма основи і верхівки заокруглена, смуги відсутні, наявні зморшкуватість поверхні і коркове утворення з сітчастим візерунком. М`якуш кремового кольору. Насінина вузько-еліптична за формою у поперечному розрізі, кремово-жовтого кольору. Початок цвітіння і достигання середні.

Загальний урожай 25 т/га; товарний урожай 22 т/га; маса товарного плоду 1500 г; довжина товарного плоду 20 см; діаметр товарного плоду 15 см; нестандартних плодів від загального врожаю, % - жовтляків, % - 1; нестандартних плодів від загального врожаю, % - з опіками, % - 2; період від повних сходів до першого збору 70 днів; ураженість борошнистою росою 1%, вірусними хворобами - 2%; транспортабельність 8 балів.

05025009 Чайка

Заявник: Дніпропетровська дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Листкова пластинка характеризується такими показниками: середній розмір, помірна інтенсивність зеленого забарвлення, слабка вираженість лопатей. Основний колір шкірки плоду перед достиганням сіро-зелений. Для плоду характерні такі ознаки: довгий, широкий, місце найбільшої ширини у центрі, форма поздовжнього розрізу видовжена, основний колір шкірки в період достигання вохряний, форма основи і верхівки заокруглена, смуги відсутні, зморшкуватість поверхні відсутня або дуже слабка, наявне коркове утворення з сітчастим візерунком. М`якуш в поперечному розрізі товстий, колір зелений. Насінина еліптична за формою у поперечному розрізі, кольору слонової кості. Початок цвітіння і

достигання пізні.

Загальний урожай 9,5 т/га; товарний урожай 8 т/га; маса товарного плоду 1000 г; період плодоношення 16 днів; ураженість бактеріозом 10%, вірусними хворобами - 5%.

Кабачок

06026004 Мостра F1

Заявник: Клоз Тезьє

Власник(и):

Підтримувач(і):

Габітус рослини напівплетистий, наявне слабке галуження. Молодий плід характеризується такими ознаками: розмір і діаметр середні, шийка наявна, колір зелений, форма поперечного перерізу округла, крапчастість тільки дифузна, основна форма циліндрична. Колір крапчастої шкірки стиглого плоду жовтий.

Група стиглості - ранній;Товарний урожай 75 ц/га; урожай ранньої продукції 60 ц/га; середня маса плоду 250 г; вміст сухої речовини 5%; дегустаційна оцінка 9 балів; транспортабельність 80 %; днів до достигання - 35; борошниста роса 5 %; антракноз 5 %; плямистість бактеріальна 5 %; фузаріоз 5%.

Кавун

06027001 Варда F1

Заявник: Нікерсон- Цваан Б.В.

Власник(и):

Підтримувач(і):

Сім`ядолі еліптичної форми, великого розміру. Габітус рослини сланкий. Листкова пластинка середня за розміром, зеленого кольору. Маса плоду від великої до дуже великої, форма поздовжнього розрізу еліптична. Основний колір шкірки плоду зелений, наявні широкі смуги, мармурова крапчастість дуже слабкої інтенсивності. Колір м`якуша плоду рожевий. Початок цвітіння та достигання ранні.

Загальний урожай 50-70 т/га; товарний урожай 50-65 т/га; маса товарного плоду 10000-14000 г; довжина товарного плоду 55 см; діаметр товарного плоду 40 см; період від повних сходів до першого збору 82 дні; період плодоношення 20 днів; дружність плодоутворення 85%; дегустаційна оцінка свіжих плодів 9 балів; транспортабельність 8 балів; група стиглості - ранній.

05027014 Романза F1

Заявник: Сингента Сідз Б. В.

Власник(и):

Підтримувач(і):

Габітус рослини сланкий. Листкова пластинка середня за розміром, сіро-зеленого кольору. Маса плоду дуже велика, форма поздовжнього розрізу широко-еліптична. Основний колір шкірки плоду зелений, наявні смуги і мармурова крапчастість. Колір м`якуша плоду рожевий.

Загальний урожай 60 т/га; товарний урожай 50 т/га; маса товарного плоду 8000 г; довжина товарного плоду 30 см; діаметр товарного плоду 30 см; нестандартних плодів від загального врожаю, % - 4; нестандартних плодів від загального врожаю, % - з опіками, % - 1; нестандартних плодів від загального врожаю, % - повторних, % - 1; період від повних сходів до пешого збору 85 днів; період плодоношення 20 днів; дружність плодоутворення 80%; ураженість хворобами, %: борошнистою росою 4, бактеріозом 4, антракнозом 5, вірусними хворобами - 2%; дегустаційна оцінка свіжих плодів

9 балів; транспортабельність 4 балів; група стиглості - ранній.

05027015 Топган F1

Заявник: Сингента Сідз Б. В.

Власник(и):

Підтримувач(і):

Габітус рослини сланкий. Листкова пластинка середня за розміром, сіро-зеленого кольору. Маса плоду велика, форма поздовжнього розрізу еліптична. Основний колір шкірки плоду зелений, наявні широкі смуги і мармурова крапчастість. Колір м`якуша плоду рожевий.

Загальний урожай 65 т/га; товарний урожай 60 т/га; маса товарного плоду 10000 г; довжина товарного плоду 30 см; діаметр товарного плоду 30 см; нестандартних плодів від загального врожаю, % - 3; нестандартних плодів від загального врожаю, % - з опіками, % - 1; нестандартних плодів від загального врожаю, % - повторних, % - 1; період від повних сходів до пешого збору 100 днів; період плодоношення 20 днів; дружність плодоутворення 80%; ураженість хворобами, %: борошнистою росою 3, бактеріозом 3, антракнозом 4, вірусними хворобами - 2%; дегустаційна оцінка свіжих плодів 8 балів; транспортабельність 6 балів; група стиглості - середній.

05027019 Юнак

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю" Свитязь"

Власник(и):

Підтримувач(і):

Габітус рослини сланкий. Листкова пластинка середня за розміром, сіро-зеленого кольору. Маса плоду від середньої до великої, форма поздовжнього розрізу широко-еліптична. Основний колір шкірки плоду зелений, наявні вузькі смуги, мармурова крапчастість відсутня. Колір м`якуша плоду червоний. Початок цвітіння ранній, достигання - помірний.

Загальний урожай 60 т/га; товарний урожай 50 т/га; маса товарного плоду 5000 г; довжина товарного плоду 30 см; діаметр товарного плоду 25 см; нестандартних плодів від загального врожаю, % - 1; нестандартних плодів від загального врожаю, % - з опіками, % - 1; період від повних сходів до першого збору 80 днів; транспортабельність 9 балів.

Капуста білоголова

06028003 Бородін F1

Заявник: Нікерсон- Цваан Б.В.

Власник(и):

Підтримувач(і):

Рослина за висотою низька. Максимальний діаметр разом із зовнішніми листками малий, положення зовнішніх листків горизонтальне, середнього розміру, форма пластинки округла, профіль верхньої сторони пластинки плескатий, пухирчастість зовнішнього листя слабка, колір з восковим нальотом зелений, восковий наліт помірний, інтенсивність забарвлення сильна. Форма поздовжнього розрізу головки округла, форма основи у поздовжньому розрізі рівна, інтенсивність забарвлення покривних листків помірна, внутрішнє забарвлення качана жовтувате, щільність головки середня, час розтріскування качана після дозрівання ранній.

Загальна урожайність 75,0 т/га, товарність - 95%, маса товарного плоду - 3,0-7,0 кг, щільність головки - 9 бали, дегустаційна оцінка 9,0 бали, транспортабельність 9 балів, універсального напряму використання

05028007 Віват F1

Заявник: Приватне підприємство науково- дослідна селекційна станція " Наско"

Власник(и):

Підтримувач(і):

Рослина середньої висоти. Максимальний діаметр разом з зовнішніми листками великий, положення зовнішніх листків піднесене, великого розміру, черешок відсутній, форма пластинки поперечно-широкоеліптична, профіль верхньої сторони пластинки опуклий, пухирчастість зовнішнього листя слабка, колір з восковим нальотом сіро-зелений, восковий наліт помірний. Форма поздовжнього розрізу качана округло-плеската, форма основи у поздовжньому розрізі рівна, інтенсивність забарвлення покривних листків помірна, внутрішнє забарвлення качана білувате, головка щільна, час розтріскування качана після дозрівання пізній.

Загальна урожайність 100 т/га, товарність 94%, маса товарного плоду 5,0 кг, дегустаційна оцінка 9,0 бали, транспортабельність 9,0 балів, універсального напрямку використання.

06028011 Гігант F1

Заявник: Клоз Тезьє

Власник(и):

Підтримувач(і):

Рослина середньої висоти. Максимальний діаметр разом з зовнішніми листками середній, положення зовнішніх листків піднесене, великого розміру, форма пластинки округла, профіль верхньої сторони пластинки опуклий, пухирчастість зовнішнього листя слабка, колір з восковим нальотом зелений, восковий наліт сильний, інтенсивність забарвлення сильна. Форма поздовжнього розрізу качана округла, форма основи у поздовжньому розрізі рівна, інтенсивність забарвлення покривних листків темна, внутрішнє забарвлення качана білувате, головка щільна, структура середня, час розтріскування качана після дозрівання пізній.

Загальна урожайність 110,0 т/га, товарність 95%, маса товарного плоду 4,0 кг, щільність головки 9,0 бали, дегустаційна оцінка 9,0 бали, транспортабельність 9,0 балів, універсального напрямку використання

05028012 Герда

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю" Свитязь"

Власник(и):

Підтримувач(і):

Рослина середньої висоти. Максимальний діаметр разом з зовнішніми листками середній, черешок наявний, положення зовнішніх листків піднесене, середнього розміру, форма пластинки широкояйцеподібна, профіль верхньої сторони пластинки увігнутий, пухирчастість зовнішнього листя відсутня, колір з восковим нальотом сіро-зелений, восковий наліт сильний, інтенсивність забарвлення сильна. Форма поздовжнього розрізу качана округло-плеската, форма основи у поздовжньому розрізі рівна, інтенсивність забарвлення покривних листків світла, внутрішнє забарвлення качана зеленувате, щільність головки середня, структура середня, час розтріскування качана після дозрівання пізній.

Загальна урожайність 40,0 т/га, товарність 95%, маса товарного плоду 3,0 кг, щільність головки 7,0 бали, дегустаційна оцінка 9,0 бали, транспортабельність 9,0 балів, універсального напрямку використання

06028004 Кастелло F1

Заявник: Нікерсон- Цваан Б.В.

Власник(и):

Підтримувач(і):

Рослина за висотою низька. Максимальний діаметр разом з зовнішніми листками середній, положення зовнішніх листків піднесене, середнього розміру, форма пластинки округла, профіль верхньої сторони пластинки увігнутий, пухирчастість зовнішнього листя відсутня, колір з восковим нальотом синьо-зелений, восковий наліт помірний, інтенсивність забарвлення сильна. Форма поздовжнього розрізу качана округла, форма основи у поздовжньому розрізі піднесена, інтенсивність забарвлення покривних листків помірна, внутрішнє забарвлення качана білувате, головка щільна, час розтріскування качана після дозрівання пізній.

Загальна урожайність 75,0 т/га, товарність 95%, маса товарного плоду 1,0-3,0 кг, щільність головки 9,0 бали, дегустаційна оцінка 9,0 бали, транспортабельність 9,0 балів, універсального напрямку використання

07028007 Камбрія F1

Заявник: Бейо Заден Б.В.

Власник(и):

Підтримувач(і):

Антоціанове забарвлення паростка відсутнє. Світло-зелений колір сім`ядолей. Рослина середня за висотою, діаметр середній. Зовнішній качан середній. Положення зовнішніх листків піднесене. Черешок зовнішнього листка середній. Зовнішні листкі середні за розміром, округлої форми, профіль верхньої сторони пластинки опуклий, наявні дрібні пухирці. Забарвлення зовнішніх листків зелене з восковим нальотом слабкої інтенсивності. Головка овальної форми, покрита, маленька за діаметром. Покривні листки характеризуються такими показниками: вигин наявний; зелене забарвлення, інтенсивність світла, антоціанове забарвлення відсутнє або дуже слабке, внутрішнє забарвлення - зеленувате. Головка щільна, довга. Час збиральної стиглості середній. Час розтріскування головки після достигання середній.

Вміст білка, % - 1,45. Вміст: сухої речовини, % - 8,5. Вміст: вітаміну С, мг% - 52. Вміст: загального цукру, % - 4,2. Лежкість, балів - 6. Загальна урожайність, кг/м2 - 6-7. Період від повних сходів до початку достигання, днів - 65.

07028006 Леопольд F1

Заявник: Бейо Заден Б.В.

Власник(и):

Підтримувач(і):

Антоціанове забарвлення паростка відсутнє. Жовто-зелений колір сім`ядолей. Рослина низька, діаметр малий. Зовнішній качан короткий. Положення зовнішніх листків горизонтальне. Черешок зовнішнього листка короткий. Зовнішні листкі середні за розміром, округлої форми, профіль верхньої сторони пластинки увігнутий, наявні дрібні пухирці. Забарвлення зовнішніх листків зелене з восковим нальотом помірної інтенсивності. Головка округлої форми, рівна, довга, середня за діаметром, покрита. Покривні листки характеризуються такими показниками: вигин відсутній; зелене забарвлення, інтенсивність помірна, антоціанове забарвлення відсутнє або дуже слабке, внутрішнє забарвлення - білувате. Головка щільна, тонка за внутрішньою структурою, довга. Час збиральної стиглості ранній. Час розтріскування головки після достигання пізній.

Вміст білка, % - 1,5. Вміст: сухої речовини, % - 7,6. Вміст: вітаміну С, мг% - 48. Вміст: загального цукру, % - 4,3. Лежкість, балів - 3. Загальна урожайність, кг/м2 - 6,5. Період від повних сходів до початку достигання, днів - 85.

06028009 Меджик F1

Заявник: Клоз Тезьє

Власник(и):

Підтримувач(і):

Рослина середньої висоти. Максимальний діаметр разом з зовнішніми листками середній, положення зовнішніх листків піднесене, середнього розміру, форма пластинки широкояйцеподібна, профіль верхньої сторони пластинки опуклий, пухирчастість зовнішнього листя помірна, колір з восковим нальотом зелений, восковий наліт помірний, інтенсивність забарвлення поміона. Форма поздовжнього розрізу качана округла, форма основи у поздовжньому розрізі піднесена, інтенсивність забарвлення покривних листків світла, внутрішнє забарвлення качана білувате, головка щільна, структура середня, час розтріскування качана після дозрівання середній.

Загальна урожайність 80,0 т/га, товарність 95%, маса товарного плоду 1,2 кг, щільність головки 9,0 бали, дегустаційна оцінка 9,0 бали, транспортабельність 9,0 балів, універсального напрямку використання

07028005 Менді F1

Заявник: Бейо Заден Б.В.

Власник(и):

Підтримувач(і):

Антоціанове забарвлення паростка відсутнє. Жовто-зелений колір сім`ядолей. Рослина висока, діаметр великий. Зовнішній качан короткий. Положення зовнішніх листків горизонтальне. Черешок зовнішнього листка короткий. Зовнішні листкі великі за розміром, округлої форми, профіль верхньої сторони пластинки увігнутий, наявні дрібні пухирці. Забарвлення зовнішніх листків синьо-зелене з восковим нальотом сильної інтенсивності. Головка округлої форми, довга, велика за діаметром, покрита. Покривні листки характеризуються такими показниками: вигин відсутній; синьо-зелене забарвлення, інтенсивність темна, антоціанове забарвлення відсутнє або дуже слабке, внутрішнє забарвлення - білувате. Головка щільна, тонка за внутрішньою структурою, довга. Час збиральної стиглості середній. Час розтріскування головки після достигання пізній.

Вміст білка, % - 1,5. Вміст: сухої речовини, % - 7,6. Вміст: вітаміну С, мг% - 54. Вміст: загального цукру, % - 4,1. Лежкість, балів - 1. Загальна урожайність, кг/м2 - 10. Період від повних сходів до початку достигання, днів - 60.

06028008 Оракл F1

Заявник: Клоз Тезьє

Власник(и):

Підтримувач(і):

Рослина за висотою висока. Максимальний діаметр разом з зовнішніми листками середній, положення зовнішніх листків піднесене, малого розміру, форма пластинки округла, профіль верхньої сторони пластинки опуклий, пухирчастість зовнішнього листя слабка, колір з восковим нальотом сіро-зелений, восковий наліт сильний, інтенсивність забарвлення поміона. Форма поздовжнього розрізу качана округла, форма основи у поздовжньому розрізі рівна, інтенсивність забарвлення покривних листків світла, внутрішнє забарвлення качана білувате, головка щільна, структура тонка, час розтріскування качана після дозрівання пізній.

Загальна урожайність 80,0 т/га, товарність 95%, маса товарного плоду 1,2 кг, щільність головки 9,0 бали, дегустаційна оцінка 9,0 бали, транспортабельність 9,0 балів, універсального напрямку використання

06028005 Парадокс F1

Заявник: Бейо Заден Б.В.

Власник(и):

Підтримувач(і):

Рослина за висотою висока. Максимальний діаметр разом з зовнішніми листками середній, положення зовнішніх листків піднесене, середнього розміру, форма пластинки широкояйцеподібна, профіль верхньої сторони пластинки увігнутий, пухирчастість зовнішнього листя відсутня, колір з восковим нальотом сіро-зелений, восковий наліт дуже сильний, інтенсивність забарвлення сильна. Форма поздовжнього розрізу качана округла, форма основи у поздовжньому розрізі піднесена, інтенсивність забарвлення покривних листків помірна, внутрішнє забарвлення качана білувате, головка щільна, час розтріскування качана після дозрівання пізній.

Загальна урожайність 120,0 т/га, товарність 95%, маса товарного плоду 2,0-4,5 кг, щільність головки 9,0 бали, дегустаційна оцінка 9,0 бали, транспортабельність 9,0 балів, універсального напрямку використання

06028001 Руссо F1

Заявник: Нікерсон- Цваан Б.В.

Власник(и):

Підтримувач(і):

Рослина висока. Максимальний діаметр разом з зовнішніми листками великий, положення зовнішніх листків піднесене, великого розміру, форма пластинки поперечно-широкоеліптична, профіль верхньої сторони пластинки увігнутий, пухирчастість зовнішнього листя слабка, колір з восковим нальотом сіро-зелений, восковий наліт сильний. Форма поздовжнього розрізу качана округла, форма основи у поздовжньому розрізі піднесена, інтенсивність забарвлення покривних листків середня, внутрішнє забарвлення качана білувате, головка щільна, час розтріскування качана після дозрівання пізній

Загальна урожайність 90,0 т/га, товарність 95%, маса товарного плоду 5,0 кг, дегустаційна оцінка 9,0 бали, транспортабельність 9,0 балів, універсального напрямку використання.

06028002 Структон F1

Заявник: Нікерсон- Цваан Б.В.

Власник(и):

Підтримувач(і):

Рослина середньої вистоти. Максимальний діаметр разом з зовнішніми листками середній, положення зовнішніх листків піднесене, малого розміру, форма пластинки широко обернено-яйцевидна, профіль верхньої сторони пластинки увігнутий, пухирчастість зовнішнього листя слабка, колір з восковим нальотом сіро-зелений, восковий наліт сильний, інтенсивність забарвлення сильна. Форма поздовжнього розрізу качана округло-плеската, форма основи у поздовжньому розрізі піднесена, інтенсивність забарвлення покривних листків слабка, внутрішнє забарвлення качана білувате, щільна, час розтріскування качана після дозрівання пізній.

Загальна урожайність 90,0 т/га, товарність 85%, маса товарного плоду 3,0-7,0 кг, щільність головки 9,0 бали, дегустаційна оцінка 9,0 бали, транспортабельність 9,0 балів, універсального напрямку використання

04028003 Толеро F1

Заявник: Приватне мале підприємство " Тирас"

Власник(и):

Підтримувач(і):

Рослина середньої висоти. Максимальний діаметр разом з зовнішніми листками малий, положення зовнішніх листків піднесене, великого розміру, форма пластинки широкояйцеподібна, профіль верхньої сторони пластинки увігнутий, пухирчастість зовнішнього листя слабка, колір з восковим нальотом сіро-зелений, восковий наліт сильний, інтенсивність забарвлення сильна. Форма поздовжнього розрізу качана округло-плеската, форма

основи у поздовжньому розрізі рівна, інтенсивність забарвлення покривних листків світла, внутрішнє забарвлення качана жовтувате, щільність головки середня, структура середня, час розтріскування качана після дозрівання пізній.

Загальна урожайність 40,0 т/га, товарність 95%, маса товарного плоду 0,8-1,0 кг, щільність головки 7,0 бали, дегустаційна оцінка 9,0 бали, транспортабельність 9,0 балів, універсального напрямку використання

06028007 Центуріон F1

Заявник: Клоз Тезьє

Власник(и):

Підтримувач(і):

Рослина за висотою висока. Максимальний діаметр разом з зовнішніми листками середній, положення зовнішніх листків піднесене, середнього розміру, форма пластинки округла, профіль верхньої сторони пластинки опуклий, пухирчастість зовнішнього листя помірна, колір з восковим нальотом зелений, восковий наліт дуже сильний, інтенсивність забарвлення сильна. Форма поздовжнього розрізу качана округла, форма основи у поздовжньому розрізі рівна, інтенсивність забарвлення покривних листків світла, внутрішнє забарвлення качана білувате, головка щільна, час розтріскування качана після дозрівання пізній.

Загальна урожайність 110,0 т/га, товарність 95%, маса товарного плоду 4,0 кг, щільність головки 9,0 бали, дегустаційна оцінка 9,0 бали, транспортабельність 9,0 балів, універсального напрямку використання

Капуста броколі

06148003 Квінта F1

Заявник: Такіі Європа Б.В.

Власник(и):

Підтримувач(і):

Рослина за висотою - від середньої до високої, має одне стебло. Листок за довжиною від середнього до довгого, за положенням - напівпрямий, сіро-зеленого кольору. Головка характеризується такими показниками: середній розмір, кругла форма поздовжнього розрізу, сіро-зеленого кольору, від помірної до щільної, покривні листки відсутні. Квітка жовта. Час початку цвітіння пізній.

Товарний урожай 32 т/га; урожай ранньої продукції 17 т/га; середня маса плоду 1000 г; дегустаційна оцінка 9 балів; днів до достигання 110; щільність головки 8 балів.

Капуста брюссельська

06149001 Франклін F1

Заявник: Бейо Заден Б.В.

Власник(и):

Підтримувач(і):

Рослина середня за висотою. Плід округлої форми у поздовжньому розрізі. Колір плоду помірно-зелений, відкритість зовнішніх листків слабка. Зовнішній вигляд колони плодів циліндричний.

Загальний урожай 40 т/га; товарний урожай 35 ц/га; днів до достигання 145; щільність головки 9 балів; дружність достигання 97 %.

Капуста качанна (червоноголова)

06030002 Антрацит

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Агрофірма-Елітсортнасіння"

Власник(и):

Підтримувач(і):

Рослина середня за висотою. Найбільший діаметр головки середній. Зовнішні листки великого розміру, форма пластинки поперечно-широкоеліптична, забарвлення (з восковим нальотом) фіолетове, наявне зелене забарвлення. Головка характеризується такими показниками: округло-плеската форма поздовжнього розрізу, покрита, забарвлення покривних листків темно-фіолетове, внутрішнє забарвлення фіолетове, щільна, час розтріскування після достигання пізній.

Загальний урожай 60 т/га; товарний урожай 54 т/га; урожай ранньої продукції 5 т/га; середня маса плоду 2500 г; щільність головки 9 балів; період від повних сходів до початку достигання - 110 днів; період плодоношення 25 днів; дружність достигання 90 %; ураженість хворобами, %: бактеріоз слизистий 1, бактеріоз судинний 1; дегустаційна оцінка, балів: свіжої капусти 9, за переробки 9; лежкість, балів 9; транспортабельність, балів 9.

06030003 Палета

Заявник: Інститут овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Рослина середня за висотою. Найбільший діаметр головки середній. Зовнішні листки середнього розміру, форма пластинки широкообернено-яйцевидна, забарвлення (з восковим нальотом) фіолетове, відсутнє зелене забарвлення. Головка характеризується такими показниками: округла форма поздовжнього розрізу, покрита, забарвлення покривних листків фіолетове, внутрішнє забарвлення фіолетове, щільна, час розтріскування після достигання пізній.

Загальний урожай 35-47 т/га; товарний урожай 33-45 т/га; середня маса плоду 1600-1800 г; щільність головки 5 балів; період від повних сходів до початку достигання - 140-150 днів; дружність достигання 100 %; ураженість хворобами, %: бактеріоз слизистий 0,3-0,5, бактеріоз судинний 10-15; дегустаційна оцінка, балів: свіжої капусти 5, за переробки 5; лежкість, балів 4,9; транспортабельність, балів 5.

06030001 Родон F1

Заявник: Нікерсон- Цваан Б.В.

Власник(и):

Підтримувач(і):

Рослина середня за висотою. Найбільший діаметр головки середній. Зовнішні листки великого розміру, форма пластинки округла, забарвлення (з восковим нальотом) фіолетове, наявне зелене забарвлення. Головка характеризується такими показниками: овальна форма поздовжнього розрізу, частково покрита, забарвлення покривних листків фіолетове, внутрішнє забарвлення темно-фіолетове, щільна, час розтріскування після достигання пізній.

Загальний урожай 90 т/га; товарний урожай 85 т/га; урожай ранньої продукції 80 ц/га; маса плоду 3000-5000 г; щільність головки 7 балів; період від повних сходів до початку достигання - 160 днів; період плодоношення 25 днів; дружність достигання 85 %; ураженість хворобами, %: бактеріоз слизистий 0,1, бактеріоз судинний 0,1; дегустаційна оцінка, балів: свіжої капусти 8, за переробки 8; лежкість, балів 8; транспортабельність, балів 9.

Капуста пекінська

07152001 Вітімо F1

Заявник: Нікерсон- Цваан Б.В.

Власник(и):

Підтримувач(і):

Габітус рослини напіврозлогий. Рослина коротка за висотою. Головка характеризується такими показниками: середній розмір, овальна форма поздовжнього розрізу, напіввідкритий тип покриття, зелений колір верхівки, жовте забарвлення внутрішньої частини, щільна.

Товарний урожай 50 ц/га; урожай ранньої продукції 45 ц/га; середня маса плоду 1800 г; дегустаційна оцінка 5 балів; днів до достигання 55; щільність головки 4 бали; вихід стиглих товарних плодів 95 %.

06152003 Кьюстар F1

Заявник: Такіі Європа Б.В.

Власник(и):

Підтримувач(і):

Габітус рослини напіврозлогий. Рослина коротка. Головка характеризується такими показниками: коротка, середня за шириною, еліптична форма поздовжнього розрізу, закритий тип покриття, зелений колір верхівки, жовте забарвлення внутрішньої частини.

Товарний урожай 70 т/га; урожай ранньої продукції 60 т/га; середня маса плоду 1600 г; дегустаційна оцінка 8 балів; днів до достигання 55; щільність головки 3 бали; вихід стиглих товарних плодів 95 %.

Капуста цвітна

05029001 Гілея

Заявник: Приватне підприємство "Агросвіт"

Власник(и):

Підтримувач(і):

Рослина середня за висотою. Листок увігнутої форми поперечного перетину, наявна слабка пухирчастість. Головка середня за висотою і діаметром, форма поздовжнього перерізу округло-плеската, забарвлення білувате, горбкуватість помірна. Час достигання в рекомендований період вирощування середній.

Загальний урожай 22-25 т/га; товарний урожай 21-24 т/га; урожай ранньої продукції 2-3 т/га; середня маса плоду 800-1000 г; щільність головки 4,8 балів; період від повних сходів до початку достигання - 100-110 днів; період плодоношення 15 днів; дружність достигання 80-85%; дегустаційна оцінка, балів: свіжої капусти 4,8, за переробки 4,7; лежкість, балів 4,9; транспортабельність, балів 4,9.

06029003 Акварель

Заявник: Приватне підприємство "Агросвіт"

Власник(и):

Підтримувач(і):

Рослина середня за висотою. Листок спрямований догори за положенням, середнього розміру, еліптичної форми. Головка середня за висотою і діаметром, форма поздовжнього перерізу округла, забарвлення білувате, горбкуватість помірна. Час достигання в рекомендований період вирощування ранній.

Загальний урожай 20-25 т/га; товарний урожай 21-24 т/га; урожай ранньої продукції 15-18 т/га; середня маса плоду 900-1200 г; щільність головки 4,7 балів; період від повних сходів до початку достигання - 100-110 днів; період плодоношення 15 днів; дружність достигання 80-85%; дегустаційна оцінка, балів: свіжої капусти 4,9, за переробки 4,6; лежкість, балів 4,8; транспортабельність, балів 4,9.

06029005 Алабастра F1

Заявник: **Товариство з обмеженою відповідальністю" Свитязь"**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Рослина низька. Листок висхідний за положенням, середнього розміру, широко-еліптичної форми. Головка середня за висотою, велика за діаметром, форма поздовжнього перерізу округло-плеската, забарвлення білувате, горбкуватість незначна. Час достигання в рекомендований період вирощування ранній.

Загальний урожай 28 т/га; товарний урожай 25 т/га; урожай ранньої продукції 25 т/га; середня маса плоду 1800 г; щільність головки 9 балів; період від повних сходів до початку достигання - 100 днів; період плодоношення 30 днів; дружність достигання 80%; ураженість хворобами, %: бактеріоз слизистий 1; дегустаційна оцінка, балів: свіжої капусти 5, за переробки 5; лежкість, балів 7; транспортабельність, балів 8.

04029005 Дельта

Заявник: **Приватне мале підприємство " Тирас"**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Рослина дуже низька (за висотою за збирання). Листок висхідний за положенням, середній за шириною, короткий, еліптичної форми. Головка середня за діаметром, коротка, форма поздовжнього перерізу плеската, забарвлення жовте, горбкуватість значна. Час достигання в рекомендований період вирощування середній.

Загальний урожай 40 т/га; товарний урожай 36 т/га; урожай ранньої продукції 36 т/га; середня маса плоду 1000-1300 г; щільність головки 7 балів; період від повних сходів до початку достигання - 85 днів; дружність достигання 90 %; дегустаційна оцінка, балів: свіжої капусти 9; лежкість, балів 9; транспортабельність, балів 9.

06029008 Зефір

Заявник: **Товариство з обмеженою відповідальністю "Селма"**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Рослина середня за висотою. Листок висхідний за положенням, середнього розміру, еліптичної форми. Головка середня за висотою і діаметром, форма поздовжнього перерізу округла, забарвлення білувате, горбкуватість незначна. Час достигання в рекомендований період вирощування ранній.

Загальний урожай 22-25 т/га; товарний урожай 21-23 т/га; урожай ранньої продукції 17-19 т/га; середня маса плоду 900-1100 г; щільність головки 4,5 балів; період від повних сходів до початку достигання - 105-110 днів; період плодоношення 20-22 дні; дружність достигання 85%; ураженість хворобами, %: бактеріоз слизистий 1-1,1, бактеріоз судинний 0,3-0,4; дегустаційна оцінка, балів: за переробки 4,5-4,7; лежкість, балів 4,7; транспортабельність, балів 4,7.

06029004 Матін F1

Заявник: Клоз Тезьє

Власник(и):

Підтримувач(і):

Рослина середня за висотою. Листок спрямований догори за положенням, середнього розміру, еліптичної форми. Головка коротка, середня за діаметром, форма поздовжнього перерізу плеската, забарвлення білувате, горбкуватість незначна. Час достигання в рекомендований період вирощування дуже ранній.

Загальний урожай 25 т/га; товарний урожай 24 т/га; урожай ранньої продукції 24 т/га; середня маса плоду 2000 г; щільність головки 8 балів; період від повних сходів до початку достигання - 95 днів; період плодоношення 15 днів; дружність достигання 90 %; ураженість хворобами, %: бактеріоз судинний 2; дегустаційна оцінка, балів: свіжої капусти 9, за переробки 9; лежкість, балів 9; транспортабельність, балів 9.

06029001 Тофар F1

Заявник: Бейо Заден Б.В.

Власник(и):

Підтримувач(і):

Рослина середня за висотою. Листок горизонтальний за положенням, довгий і широкий, еліптичної форми. Головка середня за висотою і діаметром, форма поздовжнього перерізу округла, забарвлення жовте, горбкуватість помірна. Час достигання в рекомендований період вирощування середній.

Загальний урожай 40 т/га; товарний урожай 35 т/га; урожай ранньої продукції 30 т/га; середня маса плоду 800 г; щільність головки 7 балів; період від повних сходів до початку достигання - 80 днів; період плодоношення 10 днів.

06029002 Фламінго

Заявник: Приватне підприємство "Агросвіт"

Власник(и):

Підтримувач(і):

Рослина середня за висотою. Листок спрямований догори за положенням, середнього розміру, еліптичної форми. Головка середня за висотою і діаметром, форма поздовжнього перерізу округло-плеската, забарвлення білувате, горбкуватість помірна. Час достигання в рекомендований період вирощування пізній.

Загальний урожай 22-25 т/га; товарний урожай 21-24 т/га; урожай ранньої продукції 10-15 т/га; середня маса плоду 1500-2000 г; щільність головки 4,8 балів; період від повних сходів до початку достигання - 110-120 днів; період плодоношення 15 дніві; дружність достигання 80-85%; дегустаційна оцінка, балів: свіжої капусти 4,8, за переробки 4,7; лежкість, балів 4,9; транспортабельність, балів 4,9.

Квасоля овочева

05087004 Голубка

Заявник: **Товариство з обмеженою відповідальністю" Свитязь"**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Сорт - ранньостиглий. Рослини мають виткий тип росту, з антоціановим забарвленням гіпокотиля, середній час цвітіння з раннім часом завивання та середньою його швидкістю.

Листки темно-зеленого кольору з помірною зморшкуватістю. Середній листочок середнього розміру, трикутної форми з коротко загостреною верхівкою.

Квітка має фіолетовий колір і крилець, і паруса та середній розмір приквітка.

Біб (включно з гачком) – середньої довжини, з середньою шириною посередині та округлою формою поперечного перетину (через насінину), має середнє відношення ширини впоперек до відстані між швами, помірно зморшкувату текстуру поверхні та слабке звуження в сухому стані.

Біб має помірно-фіолетовий основний колір, без волокнистості, увігнутою формою вигину з відсутнім або дуже слабким ступенем його увігнутості та формою верхівки від загостреної до тупої (за виключенням гачка). Гачок – середньої довжини, зі слабким вигином.

Стигле насіння має ниркоподібну форму поздовжнього перетину зі слабким ступенем його вигину, середню ширину з широко-еліптичною формою поперечного перетину.

Стигле насіння - двокольорове зі слабким жилкуванням. Основний колір насінини – коричневий, переважаючий вторинний – червоний з його розподілом штрихами. Колір кільця навкруг рубчика – відрізняється від фону насінини.

Маса 1000 насінин – мала.

Товарний урожай рослин сорту становить 8 т/га при калібрі насіння за шириною – 5 мм..

Оцінка стійкості до обсипання – 9 балів, вилягання – 8, посухостійкості – 6, механізованого збирання – 8 балів.

Час варіння насіння -15 хв. Смакові якості звареного насіння - 9 балів.

05087006 Царівна

Заявник: **Товариство з обмеженою відповідальністю" Свитязь"**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Сорт - ранньостиглий. Рослини мають кущовий тип росту з антоціановим забарвленням гіпокотиля та середній час цвітіння. Листки темно-зеленого кольору з помірною зморшкуватістю. Середній листочок великого розміру, трикутної форми з коротко-загостреною верхівкою.

Квітка має фіолетовий колір і крилець, і паруса та середній розмір приквітка.

Біб (включно з гачком) – середньої довжини, з малою шириною посередині та округлою формою поперечного перетину (через насінину), має середнє відношення ширини впоперек до відстані між швами, помірно зморшкувату текстуру поверхні бобу та слабке звуження в сухому стані.

Біб – помірно-зеленого кольору без волокнистості, з увігнутою формою вигину з відсутнім або дуже слабким ступенем його увігнутості та формою верхівки (за виключенням гачка) від загостреної до тупої.

Гачок – середньої довжини, має слабкий вигин.

Стигле насіння має ниркоподібну форму поздовжнього перетину зі слабким ступенем його вигину, середню ширину з округлою формою поперечного перетину.

Стигле насіння двокольорове зі слабким жилкуванням. Основний колір насінини – коричневий. Колір кільця навкруг рубчика – відрізняється від фону насінини. Маса 1000 насінин – мала.

Вегетаційний період - 65 діб.Товарний урожай рослин сорту становить 8 т/га при вмісті сирого протеїну - 10 % . Оцінка стійкості до обсипання – 8 балів, доилягання – 8, доосухостійкості – 6, механізованого збирання – 8 балів.

Час варіння насіння -15 хв., смакові якості його - 9 балів.

Кукурудза розлусна

05004067 Гостинець

Заявник: **Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка відсутнє, кут між листковою пластинкою і стеблом - середній. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок відсутнє або дуже слабке. Бічні гілочки: за довжиною - довгі, положення на нижній третині волоті - похиле, кількість первинних бічних гілочок волоті - велика , головна вісь волоті за довжиною - середня. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від раннього до середнього, антоціанове забарвлення шовку відсутнє. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга. Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня. Ніжка качана за довжиною - коротка. Качан за формою конічний, за довжиною - короткий, тип зернини розлусний, кількість зернових рядів середня, колір верхівки та низу зернини - жовтий. Антоціанове забарвлення лусок стрижня відсутнє.

Висота рослини від 176 до 250 см, час повного цвітіння волоті та час появи "шовку" - від раннього до середнього, антоціанове забарвлення "шовку" відсутнє, качан конічної форми, короткий, діаметр качана середній (3,1 - 4,0 см)
колір зернівки – жовтий.

ФАО – 210.
Загальна урожайність, т/га – 3,96
Вегетаційний період – 111 діб.
Маса 1000 зерен – 148 г.
Маса кондиційного качана – 110 г,
Довжина качана – 17 см,
Кількість рядів зерен на качані – 18 шт.,
Стійкість проти вилягання - 8 балів.
Вміст у зерні сухої речовини - 40,1 %, крохмалю – 56,0%.

05004067 Гостинець

Заявник: **Синельниківська селекційно-дослідна станція Інституту зернового господарства Української академії аграрних наук**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка відсутнє, кут між листковою пластинкою і стеблом - середній. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок відсутнє або дуже слабке. Бічні гілочки: за довжиною - довгі, положення на нижній третині волоті - похиле, кількість первинних бічних гілочок волоті - велика , головна вісь волоті за довжиною - середня. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від раннього до середнього, антоціанове забарвлення шовку відсутнє. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга. Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня. Ніжка качана за довжиною - коротка. Качан за формою конічний, за довжиною - короткий, тип зернини

розлусний, кількість зернових рядів середня, колір верхівки та низу зернини - жовтий. Антоціанове забарвлення лусок стрижня відсутнє.

Висота рослини від 176 до 250 см, час повного цвітіння волоті та час появи "шовку" - від раннього до середнього, антоціанове забарвлення "шовку" відсутнє, качан конічної форми, короткий, діаметр качана середній (3,1 - 4,0 см)
колір зернівки – жовтий.

ФАО – 210.
Загальна урожайність, т/га – 3,96
Вегетаційний період – 111 діб.
Маса 1000 зерен – 148 г.
Маса кондиційного качана – 110 г,
Довжина качана – 17 см,
Кількість рядів зерен на качані – 18 шт.,
Стійкість проти вилягання - 8 балів.
Вміст у зерні сухої речовини - 40,1 %, крохмалю – 56,0%.

Кукурудза цукрова

05032006 Арктур

Заявник: **Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - від загостреної до округлої. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне, кут між листковою пластинкою і стеблом - середній від 26 до 50. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - середнє. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від дуже раннього до раннього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - середнє. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - дуже ранній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - сильна. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - коротка . Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - вузька, до 8 см. Ніжка качана за довжиною - середня від 10,1 до 20 см. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - дуже короткий (менше 8 см), кількість зернових рядів мала (8 - 14 шт.), колір верхівки зернини - оранжевий, низу зернини - жовтувато - білий. Антоціанове забарвлення лусок стрижня відсутнє.

Загальна урожайність - 11 т/га. Вегетаційний період - 71 доба. Маса кондиційного качана - 200 г.
Вихід кондиційних качанів 80 %, вихід технічно стиглого зерна від маси качана - 64,2 %. Вміст у зерні сухої речовини - 30,6%, цукру -19,3%.

02032003 Андріа F1

Заявник: **Приватне мале підприємство " Тирас"**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка тупа. Антоціанове забарвлення піхви першого листка відсутнє або дуже слабке, кут між листковою пластинкою і стеблом - від малого до середнього. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла відсутнє. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок відсутнє. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від раннього до середнього, антоціанове забарвлення "шовку" відсутнє. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - середня. Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана) - від середньої до широкої. Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою циліндричний, за довжиною - середній.

Товарний урожай - 140 ц/га, маса 1000 насінин - 190 г. Вегетаційний період - 94 діб. Вихід чистого зерна - 65,4%. Вміст сухої речовини - 25 %, цукру - 10,5 %.

06032004 Бандіт F1

Заявник: Харріс Моран Сідс Компані

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - загострено-тупа. Антоціанове забарвлення піхви першого листка відсутнє, кут між листковою пластинкою і стеблом - великий. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла відсутнє. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - відсутнє або дуже слабке. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від середнього до пізнього, наявне антоціанове забарвлення "шовку". Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - середня. Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана) - широка. Ніжка качана за довжиною - коротка. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - довгий, кількість зернових рядів середня, колір верхівки та низу зернини - жовтий. Антоціанове забарвлення лусок стрижня відсутнє.

Товарний урожай - 230 ц/га. Вегетаційний період - 80 діб. Вихід чистого зерна - 34 %, Вміст сухої речовини - 28 %.

05032007 Гламур

Заявник: Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - середнє, кут між листковою пластинкою і стеблом - середній (від 26 до 50 град.). Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла відсутнє або дуже слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок відсутнє або дуже слабке. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" середнє. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - середня. Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - вузька, до 8 см. Ніжка качана за довжиною - середня (від 10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (9 - 10 см), кількість зернових рядів мала (8 - 14 шт.), колір верхівки та низу зернини - жовтий. Антоціанове забарвлення лусок стрижня відсутнє.

Загальна урожайність - 17 т/га. Вегетаційний період - 85 діб. Висота рослини - 160 см, маса кондиційного качана - 250 г. Кількість рядів зерен на качані - 14. Вихід кондиційних качанів 87,5 %, вихід технічно стиглого зерна від маси качанів - 69,8 %. Вміст в зерні сухої речовини - 32,2, цукру - 14%.

06032005 Ескалібур F1

Заявник: Харріс Моран Сідс Компані

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - загострена. Антоціанове забарвлення піхви першого листка відсутнє або дуже слабке, кут між листковою пластинкою і стеблом - середній. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла відсутнє або дуже слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок відсутнє або дуже слабке. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від середнього до пізнього, наявне антоціанове забарвлення "шовку". Рослина за довжиною (враховуючи волоть) - середня. Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана) - широка. Ніжка качана за

довжиною - коротка. Качан за формою циліндричний, за довжиною - дуже довгий, кількість зернових рядів велика, колір верхівки та низу зернини - жовтий. Антоціанове забарвлення лусок стрижня відсутнє.

Товарний урожай - 230 ц/га. Маса 1000 насінин - 185 г. Вегетаційний період - 85 діб. Вихід чистого зерна - 39 %. Вміст сухої речовини -28,5 %.

06032006 Люміна F1

Заявник: **Харріс Моран Сідс Компані**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка загострена. Антоціанове забарвлення піхви першого листка відсутнє або дуже слабке, кут між листковою пластинкою і стеблом - середній. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла відсутнє. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок відсутнє або дуже слабке. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від середнього до пізнього, наявне антоціанове забарвлення "шовку". Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - середня. Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана) - середня. Ніжка качана за довжиною - коротка. Качан за формою конусно - циліндричний, за довжиною - дуже довгий, кількість зернових рядів - велика, колір верхівки та низу зернини - жовтий. Антоціанове забарвлення лусок стрижня відсутнє.

Товарний урожай - 240 ц/га, урожай ранньої продукції - 240 ц/га. Маса 1000 насінин 225 г. Вегетаційний період - 83 доби. Вміст сухої речовини в зерні - 27 %.

06032003 Мегатон F1

Заявник: **Харріс Моран Сідс Компані**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка загострена. Антоціанове забарвлення піхви першого листка відсутнє або дуже слабке, кут між листковою пластинкою і стеблом - великий. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла відсутнє або дуже слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - пізній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок відсутнє або дуже слабке. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від пізнього до дуже пізнього, наявне антоціанове забарвлення "шовку". Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - дуже довга. Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня. Ніжка качана за довжиною коротка. Качан за формою конусно - циліндричний, за довжиною - дуже довгий, кількість зернових рядів - велика, колір верхівки та низу зернини - жовтий. Антоціанове забарвлення лусок стрижня відсутнє.

Товарний урожай - 270 ц/га. Маса 1000 насінин - 170 г. Вихід чистих качанів - 170 %. Вихід чистого зерна - 33 %.
Діб до достигання - 86. Вміст сухої речовини - 28 %.

07004019 Насолода

Заявник: **Інститут фізіології рослин і генетики Національної академії наук України**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка помірне, кут між листковою пластинкою і стеблом - середній. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - ранній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок слабке. Волоть нещільна. Бічні гілочки: за довжиною - середні, положення на нижній третині

волоті - пряме, кількість первинних бічних гілочок волоті - середня, головна вісь волоті за довжиною - коротка. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - ранній, наявне антоціанове забарвлення "шовку". Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - дуже довга. Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - широка. Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий, кількість зернових рядів середня, колір верхівки та низу зернини - жовтий. Антоціанове забарвлення лусок стрижня відсутнє.

ФАО - 210 (середньоранні). Вегетаційний період - 118 діб. Загальна врожайність, 18 т/га, товарна врожайність - 15 т/ га. Маса 1000 зерен - 187 г. Кількість рядів зерен на качані - 18. Вміст в зерні: сухої речовини - 18,2 %, цукру - 7,5 %, крохмалю - 19,5 %, клітковини - 2,5 %.

04032004 Перфекта F1

Заявник: **Приватне мале підприємство " Тирас"**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - відсутнє або дуже слабке, кут між листковою пластинкою і стеблом - середній. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла відсутнє або дуже слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - відсутнє або дуже слабке. Положення бічних гілочок на волоті - пряме, кількість первинних бічних гілочок волоті - невелика (від 6 до 15шт.), головна вісь волоті за довжиною - середня (від 31 до 40 см). Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній, антоціанове забарвлення "шовку" відсутнє. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) - середня. Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - вузька, до 8 см. Ніжка качана за довжиною - середня (від 10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (9 - 10 см), кількість зернових рядів мала (8 - 14 шт.), колір верхівки та низу зернини - оранжевий. Антоціанове забарвлення лусок стрижня відсутнє.

Вегетаційний період - 118 діб. Урожай ранньої продукції - 130 ц/га, товарна врожайність - 180-200 ц/ га. Вихід чистих качанів - 97 %, вихід чистого зерна 98 %. Загальний цукор - 12 %.

06032007 Світ Райзер F1

Заявник: **Харріс Моран Сідс Компані**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - дуже ранній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок відсутнє або дуже слабке. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - дуже ранній, інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" дуже слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - коротка. Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня. Ніжка качана за довжиною - коротка. Качан за формою конусно - циліндричний, за довжиною - дуже довгий, кількість зернових рядів - середня, колір верхівки та низу зернини - жовтий. Антоціанове забарвлення лусок стрижня відсутнє.

Товарний урожай - 190 ц/га. Маса 1000 насінин - 230 г. Вихід чистого зерна - 31 %. Діб до достигання - 68. Вміст сухої речовини - 27%.

06032002 Санданс F1

Заявник: **Клоз Тезьє**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - середнє, кут між листковою пластинкою і стеблом - середній від (26 до 50 град.). Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі

волоті, 50 % рослин) - ранній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - середнє. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - ранній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" середня. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - середня. Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - вузька, до 8 см. Ніжка качана за довжиною - середня (від 10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (9 - 10 см), кількість зернових рядів мала (8 - 14 шт.), колір верхівки та низу зернини - оранжевий. Антоціанове забарвлення лусок стрижня відсутнє.

Товарний урожай - 190 ц/га, урожай ранньої продукції - 161 ц/га. Маса 1000 насінин - 220 г.
Вихід чистого зерна - 45%.
Вміст сухої речовини 27 %, цукру - 13%, крохмалю - 19%.

06032001 Тронка F1

Заявник: **Приватне підприємство "Агросвіт"**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - середнє, кут між листковою пластинкою і стеблом - середній (від 26 до 50 градю.). Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла відсутнє або дуже слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок відсутнє або дуже слабке. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення "шовку" відсутнє. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) - довга . Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня, до 10 см. Ніжка качана за довжиною - середня (від 10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (9 - 10 см), кількість зернових рядів мала (8 - 14 шт.), колір верхівки та низу зернини - оранжевий. Антоціанове забарвлення лусок стрижня відсутнє.

Товарний урожай - 133 ц/га, урожай ранньої продукції - 125 ц/га. Маса 1000 насінин - 240 г. Вихід чистих качанів 91,7 %. Діб до достигання - 115. Вихід чистого зерна - 62,3 %.
Вміст сухої речовини - 27,2 %, цукру - 7,34, клітковини 2,12 %, крохмалю 7,68 %

Морква

06034007 Болтекс

Заявник: **Клоз Тезьє**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Розетка листків вузька. Листок напівпрямий за положенням у просторі, середньої довжини, розсіченість помірна. Антоціанове забарвлення черешка наявне. Коренеплід короткий, діаметр великий. Форма кореневоду у поздовжньому розрізі трикутна, форма плеча плеската. Місце прикріплення листків плескате. Форма кінчика кореневоду тупа. Колір поверхні кореневоду оранжевий. Боріздки на поверхні слабо виражені. Діаметр серцевини кореневоду відносно загального діаметра малий. Забарвлення серцевини оранжеве помірної інтенсивності. Час достигання рослини середній. Тенденція до стрілкування слабка.

Товарна урожайність 90,0 т/га, середня маса плоду 50 г, лежкість 90%, днів до достигання 100. Вміст: Загальний цукор, % - 6,5. Суха речовина, % - 10,0.

07034001 Бастія F1

Заявник: **Бейо Заден Б.В.**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Вузька розетка листків. Листок напівпрямий за положенням у просторі, короткий, розсіченість тонка. Антоціанове забарвлення черешка відсутнє. Коренеплід середній за довжиною, діаметр малий. Форма коренеплоду у поздовжньому розрізі вузькоподовжена, форма плеча плескатоокругла. Місце прикріплення листків піднесене. Форма кінчика коренеплоду загострена. Колір поверхні коренеплоду оранжевий. Відсутнє антоціанове забарвлення поверхні плеча. Боріздки на поверхні слабо виражені. Діаметр серцевини коренеплоду відносно загального діаметра дуже малий. Забарвлення серцевини червоне сильної інтенсивності. Час достигання рослини ранній. Тенденція до стрілкування слабка. Тип чоловічої стерильності - коричневі пиляки.

Альтернаріоз, % - 7, гниль суха, % - 9. Днів до достигання - 110. Загальний цукор, % - 5,2. Суха речовина, % - 8,1. Товарний урожай, кг/м2 - 6,0.

07034002 Балтімор F1

Заявник: **Бейо Заден Б.В.**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Широка розетка листків. Листок прямий за положенням у просторі, довгий, розсіченість помірна. Антоціанове забарвлення черешка відсутнє. Коренеплід довгий, діаметр середній. Форма коренеплоду у поздовжньому розрізі вузькоподовжена, форма плеча округла. Місце прикріплення листків плескате. Форма кінчика коренеплоду загострена. Колір поверхні коренеплоду оранжевий. Відсутнє антоціанове забарвлення поверхні плеча. Боріздки на поверхні відсутні або дуже слабко виражені. Діаметр серцевини коренеплоду відносно загального діаметра малий. Забарвлення серцевини оранжеве помірної інтенсивності. Час достигання рослини ранній. Тенденція до стрілкування слабка. Тип чоловічої стерильності - коричневі пиляки.

Альтернаріоз, % - 3. Гниль суха, % - 3. Днів до достигання - 130. Загальний цукор, % - 5,2. Суха речовина, % - 8,0. Товарний урожай, кг/м2 - 6,0.

05034008 Вереснева

Заявник: **Інститут овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Розетка листків вузька. Листок напівпрямий за положенням у просторі, довгий, розсіченість помірна. Антоціанове забарвлення черешка відсутнє. Коренеплід дуже довгий , діаметр середній. Форма коренеплоду у поздовжньоиу розрізі вузькоподовжена, форма плеча плеската. Місце прикріплення листків плескате. Форма кінчика коренеплоду загострена. Колір поверхні коренеплоду оранжевий. Боріздки на поверхні помірно-виражені. Діаметр серцевини коренеплоду відносно загального діаметра середній. Забарвлення серцевини оранжеве сильної інтенсивності. Час достигання рослини середній. Тенденція до стрілкування середня.

Товарна урожайність 45,0 т/га, середня маса плоду 150-200 г, лежкість 92%, днів до достигання 100. Вміст: Загальний цукор, % - 6,7. Суха речовина, % - 9,7.

06034002 Гіганта

Заявник: **Нікерсон- Цваан Б.В.**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Розетка листків широка. Листок напівпрямий за положенням у просторі, довгий, розсіченість помірна. Антоціанове забарвлення черешка відсутнє. Коренеплід довгий, діаметр великий. Форма коренеплоду у поздовжньому розрізі вузько подовжена, форма плеча плеската. Місце прикріплення листків піднесене. Форма кінчика коренеплоду ледь загострена. Колір поверхні коренеплоду оранжевий. Боріздки на поверхні помірно виражені. Діаметр серцевини коренеплоду відносно загального діаметра дуже великий. Забарвлення серцевини оранжеве помірної інтенсивності. Час достигання рослини пізній. Тенденція до стрілкування слабка.

Товарна урожайність 80,0 т/га, середня маса плоду 300 г, лежкість 95%, днів до достигання 130.

05034009 Долянка

Заявник: **Краковська Ходовля і Насінництво Огродніче "Полан" Сп. з о.о.**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Розетка листків вузька. Листок прямий за положенням у просторі, довгий, розсіченість помірна. Антоціанове забарвлення черешка відсутнє. Коренеплід довгий , діаметр середній. Форма коренеплоду у поздовжньоиу розрізі трикутна, форма плеча плескато-округла. Місце прикріплення листків плескате. Форма кінчика коренеплоду загострена. Колір поверхні коренеплоду оранжевий. Боріздки на поверхні помірно-виражені. Діаметр серцевини коренеплоду відносно загального діаметра середній. Забарвлення серцевини оранжеве помірної інтенсивності. Час достигання рослини пізній. Тенденція до стрілкування слабка.

Товарна урожайність 72,0 т/га, середня маса плоду 220 г, лежкість 92%, днів до достигання 150. Вміст: Загальний цукор, % - 7,5. Суха речовина, % - 14,0.

06034011 Кампіно

Заявник: **Товариство з обмеженою відповідальністю" Свитязь"**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Розетка листків широка. Листок прямий за положенням у просторі, довгий, розсіченість помірна. Антоціанове забарвлення черешка відсутнє. Коренеплід короткий, діаметр великий. Форма коренеплоду у поздовжньому розрізі трикутна, форма плеча плеската. Місце прикріплення листків плескате. Форма кінчика коренеплоду загострена. Колір поверхні коренеплоду оранжевий. Боріздки на поверхні слабо виражені. Діаметр серцевини коренеплоду відносно загального діаметра середній. Забарвлення серцевини оранжеве помірної інтенсивності. Час достигання рослини ранній. Тенденція до стрілкування слабка.

Товарна урожайність 43,0 т/га, середня маса плоду 190г, лежкість 80%, днів до достигання 60.

05034004 Корріда

Заявник: **Товариство з обмеженою відповідальністю "Селма"**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Розетка листків широка. Листок прямий за положенням у просторі, середній, розсіченість помірна. Антоціанове забарвлення черешка наявне. Коренеплід середньої довжини, діаметр середній. Форма коренеплоду у поздовжньому розрізі трикутна. Місце прикріплення листків плескате. Форма

кінчика коренеплоду тупа. Колір поверхні коренеплоду оранжевий. Боріздки на поверхні слабо виражені. Діаметр серцевини коренеплоду відносно загального діаметра малий. Забарвлення серцевини оранжеве сильної інтенсивності. Час достигання рослини пізній. Тенденція до стрілкування слабка.

Товарна урожайність 91,0 т/га, середня маса плоду 250г, лежкість 98%, днів до достигання 137. Дегустаційна оцінка 8,7 балів. Вміст: Сухої речовини 13,7%, загального цукру 8,3%.

06034005 Канада F1

Заявник: Бейо Заден Б.В.

Власник(и):

Підтримувач(і):

Розетка листків вузька. Листок напівпрямий за положенням у просторі, короткий, розсіченість тонка. Антоціанове забарвлення черешка відсутнє. Коренеплід довгий , діаметр середній. Форма коренеплоду у поздовжньому розрізі трикутно-вузьковидовжена, форма плеча піднесена. Місце прикріплення листків плескате. Форма кінчика коренеплоду ледь загострена. Колір поверхні коренеплоду оранжевий. Боріздки на поверхні виражені. Діаметр серцевини коренеплоду відносно загального діаметра середній. Забарвлення серцевини оранжеве сильної інтенсивності. Час достигання рослини середній. Тенденція до стрілкування слабка.

Товарна урожайність 100,0 т/га, середня маса плоду 120 г, лежкість 90%, днів до достигання 130. Вміст: Загальний цукор, % - 6,9. Суха речовина, % - 8,5.

07034003 Купар F1

Заявник: Бейо Заден Б.В.

Власник(и):

Підтримувач(і):

Середня розетка листків. Листок прямий за положенням у просторі, середній, розсіченість помірна. Антоціанове забарвлення черешка відсутнє. Коренеплід середній за довжиною, діаметр великий. Форма коренеплоду у поздовжньому розрізі трикутна, форма плеча плескато-округла. Місце прикріплення листків втиснуте. Форма кінчика коренеплоду загострена. Колір поверхні коренеплоду оранжевий. Відсутнє антоціанове забарвлення поверхні плеча. Боріздки на поверхні відсутні або дуже слабко виражені. Діаметр серцевини коренеплоду відносно загального діаметра малий. Забарвлення серцевини оранжеве помірної інтенсивності. Тенденція до стрілкування слабка. Тип чоловічої стерильності - пелюсткові пиляки.

Альтернаріоз, % - 3. Гниль суха, % - 2. Днів до достигання - 134. Загальний цукор, % - 5,2. Суха речовина, % - 8,2. Товарний урожай, кг/м2 - 7,0.

07034004 Каскад F1

Заявник: Бейо Заден Б.В.

Власник(и):

Підтримувач(і):

Середня розетка листків. Листок горизонтальний за положенням у просторі, середній за розміром, розсіченість груба. Антоціанове забарвлення черешка відсутнє. Коренеплід середній за довжиною, діаметр великий. Форма коренеплоду у поздовжньому розрізі трикутна, форма плеча плескато-округла. Місце прикріплення листків втиснуте. Форма кінчика коренеплоду загострена. Колір поверхні коренеплоду оранжевий. Відсутнє антоціанове забарвлення поверхні плеча. Боріздки на поверхні слабко виражені. Діаметр серцевини коренеплоду відносно загального діаметра малий. Забарвлення серцевини червоне сильної інтенсивності. Тенденція до стрілкування слабка. Тип чоловічої стерильності - коричневі пиляки.

Альтернаріоз, % - 3. Гниль суха, % - 3. Днів до достигання - 130. Загальний цукор, % - 5,2. Суха речовина, % - 8,0. Товарний урожай, кг/м2 - 7,0.

05034001 Кортіна

Заявник: **Приватне мале підприємство " Тирас"**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Положення листків розетки напівпрямостояче, листки середнього розміру. Коренеплід довгий, вузьковидовженої форми, оранжевого кольору, інтенсивність забарвлення помірна, місце прикріплення листків плескате. Боріздки на поверхні слабко виражені. Діаметр серцевини – середній, серцевина оранжевого кольору. Забарвлення флоеми оранжеве. Коренеплід сильно заглиблений в грунт.

Ранньостиглий сорт 65 діб до достигання. Сорт універсального напряму використання. Товарна урожайність 30 т/га, маса плоду 100 г. Товарність 90%, дегустаційна оцінка 9,0 балів. Лежкість 80%. Рекомендований для вирощування у всіх грунтово-кліматичних зонах України.

05034003 Лагуна F1

Заявник: **Нюнемс Б.В.**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Розетка листків вузька. Листок напівпрямий за положенням у просторі, короткий, розсіченість тонка. Антоціанове забарвлення черешка відсутнє. Коренеплід дуже довгий , діаметр великий. Форма коренеплоду у поздовжньоиу розрізі вузькоподовжена, форма плеча плескатоокругла. Місце прикріплення листків плескате. Форма кінчика коренеплоду загострена. Колір поверхні коренеплоду оранжевий. Боріздки на поверхні слабко виражені. Діаметр серцевини коренеплоду відносно загального діаметра середній. Забарвлення серцевини оранжеве слабкої інтенсивності. Час достигання рослини ранній. Тенденція до стрілкування середня.

Товарна урожайність 65,0 т/га, середня маса плоду 110 г, лежкість 75%, днів до достигання 90. Вміст: Загальний цукор, % - 6,1. Суха речовина, % - 7,8.

06034004 Мазурка

Заявник: **Приватне підприємство "Агросвіт"**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Розетка листків середня. Листок напівпрямий за положенням у просторі, середньої довжини, розсіченість помірна. Антоціанове забарвлення черешка відсутнє. Коренеплід середньої довжини, діаметр середній. Форма коренеплоду у поздовжньому розрізі трикутна, форма плеча округла. Місце прикріплення листків плескате. Форма кінчика коренеплоду загострена. Колір поверхні коренеплоду оранжевий. Боріздки на поверхні слабо виражені. Діаметр серцевини коренеплоду відносно загального діаметра малий. Забарвлення серцевини оранжеве помірної інтенсивності. Час достигання рослини пізній. Тенденція до стрілкування слабка.

Товарна урожайність 50,0 т/га, середня маса плоду 120 г, лежкість 80%, днів до достигання 115.

06034010 Памелла

Заявник: **Товариство з обмеженою відповідальністю" Свитязь"**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Розетка листків середня. Листок напівпрямий за положенням у просторі, середній, розсіченість помірна. Антоціанове забарвлення черешка відсутнє. Коренеплід середньої довжини, діаметр середній. Форма коренеплоду у поздовжньому розрізі вузькоподовжена. Місце прикріплення листків плескате. Форма кінчика коренеплоду тупа. Колір поверхні коренеплоду оранжевий. Боріздки на поверхні слабо виражені. Діаметр серцевини коренеплоду відносно загального діаметра малий. Забарвлення серцевини оранжеве сильної інтенсивності. Час достигання рослини ранній. Тенденція до стрілкування слабка.

Товарна урожайність 43,0 т/га, середня маса плоду 190г, лежкість 80%, днів до достигання 60.

06034003 Розал

Заявник: **Нікерсон- Цваан Б.В.**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Розетка листків широка. Листок напівпрямий за положенням у просторі, довгий, розсіченість помірна. Антоціанове забарвлення черешка відсутнє. Коренеплід довгий, діаметр великий. Форма коренеплоду у поздовжньому розрізі вузько подовжена, форма плеча плеската. Місце прикріплення листків піднесене. Форма кінчика коренеплоду тупа. Колір поверхні коренеплоду оранжевий. Боріздки на поверхні помірно виражені. Діаметр серцевини коренеплоду відносно загального діаметра середній. Забарвлення серцевини оранжеве помірної інтенсивності. Час достигання рослини пізній. Тенденція до стрілкування слабка.

Товарна урожайність 75,0 т/га, середня маса плоду 250г, лежкість 95%, днів до достигання 130.

06034008 Скарла

Заявник: **Клоз Тезьє**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Розетка листків середня. Листок прямий за положенням у просторі, довгий, розсіченість помірна. Антоціанове забарвлення черешка наявне. Коренеплід довгий , діаметр великий. Форма коренеплоду у поздовжньому розрізі трикутно-вузьковиражена, форма плеча плескато-округла. Місце прикріплення листків втиснуте. Форма кінчика коренеплоду загострена. Колір поверхні коренеплоду оранжевий. Боріздки на поверхні відсутні. Діаметр серцевини коренеплоду відносно загального діаметра дуже малий. Забарвлення серцевини оранжеве сильної інтенсивності. Час достигання рослини пізній. Тенденція до стрілкування слабка.

Товарна урожайність 100,0 т/га, середня маса плоду 60 г, лежкість 90%, днів до достигання 110. Вміст: Загальний цукор, % - 6,5. Суха речовина, % - 10,3.

Огірок

07035005 Алекс F1

Заявник: Бейо Заден Б.В.

Власник(и):

Підтримувач(і):

Індетермінантний тип росту. Сильна сила росту. Одностебловий характер галуження. Листок середнього розміру. Пухирчастість і хвилястість країв відсутні або дуже слабкі. За вираженням статі рослини - майже виключно жіночі квітки (понад з квітки на вузлі). Поверхня зав`язі помірно опушена, забарвлення біле. Наявна партенокарпія. Плід короткий циліндричної форми. Має місце слабка ребристість, короткі смужкі і плямистість, горбочки відсутні. Гіркота біля основи плоду відсутня.

Вміст сухої речовини в плоді - 4,65 %. Загальна врожайність - 25 кг/м2. Період від повних сходів до першого збирання - 45 діб. Період плодоношення - 20 діб. Пошкодження попелицею - 5 %. Ураженість хворобами: антракнозом - 7 %, бактеріозом - 6%, борошнистою росою - 7 %, пероноспорозом - 7 %, вірусними хворобами - 8 %.

03035010 Бріз F1

Заявник: Приватне підприємство "Агросвіт"

Власник(и):

Підтримувач(і):

Індетермінантний тип росту. Сила росту - сильна. Листок середнього розміру, пухирчастість помірна, хвилястість країв слабка. За вираженням статі рослини – майже виключно жіночі квітки. Поверхня зав`язі шипувата, забарвлення біле. Відсутня партенокарпія. Плід короткий, зеленого кольору, циліндричної форми. Ребристість слабка, ступінь ребристості середня, горбочки наявні. Опушення відсутнє або дуже незначне. Плямистість наявна, плями великі неправильні, інтенсивність слабка. Гіркота біля основи плоду відсутня.

Загальна врожайність - 85 т/га, маса товарного плоду - 105 г; довжина товарного плоду - 8,5-10,5 см; діаметр товарного плоду 2,7-3,2 см; період від повних сходів до першого збору 41 дні; Дегустаційна оцінка 9 балів Універсального напряму використання.

03035011 Мамай F1

Заявник: Приватне підприємство "Агросвіт"

Власник(и):

Підтримувач(і):

Індетермінантний тип росту. Сила росту - сильна. Листок середнього розміру, пухирчастість слабка, хвилястість країв слабка. За вираженням статі рослини – переважно жіночі квітки. Поверхня зав`язі шипувата, забарвлення біле. Відсутня партенокарпія. Плід короткий, зеленого кольору, циліндричної форми. Ребристість слабка, ступінь ребристості середня, горбочки наявні. Опушення відсутнє або дуже незначне. Плямистість наявна, плями маленькі округлі, інтенсивність слабка. Гіркота біля основи плоду відсутня.

Загальна врожайність - 90 т/га, маса товарного плоду - 105 г; довжина товарного плоду - 8 см; діаметр товарного плоду 2,7 см; період від повних сходів до першого збору 41 дні; Дегустаційна оцінка 9,0 бали Універсального напряму використання.

04035001 Патріот F1

Заявник: Приватне мале підприємство " Тирас"

Власник(и):

Підтримувач(і):

Індетермінантний тип росту. Середньої сили росту. Листок середнього розміру, пухирчастість слабка, хвилястість країв слабка. За вираженням статі рослини – майже виключно жіночі квітки. Поверхня зав`язі шипувата, забарвлення біле. Відсутня партенокарпія. Плід короткий, зеленого кольору, циліндричної форми. Ребристість слабка, ступінь ребристості середня, горбочки наявні. Опушення відсутнє або дуже незначне. Плямистість відсутня. Гіркота біля основи плоду відсутня.

Загальна врожайність 60 т/га, маса товарного плоду 100 г; довжина товарного плоду 10 см; діаметр товарного плоду 3 см; період від повних сходів до першого збору 50 дні; Дегустаційна оцінка 9,0 бали. Рекомендований для засолювання та консервування.

06035031 Сократес F1

Заявник: **Енза Заден Де Енхуйзер Заадхандел Б.В.**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Індетермінантний тип росту. Середня сила росту. Листок великого розміру. За вираженням статі рослини - майже виключно жіночі квітки (від 1 до 3 квіток на вузлі). Поверхня зав`язі шипувата, забарвлення біле. Наявна партенокарпія. Плід середній за довжиною, циліндричної форми. Має місце слабка ребристість, горбочки відсутні. Гіркота біля основи плоду відсутня.

Товарних плодів від загального врожаю, %: зеленця 98; маса товарного плоду 250 г; довжина товарного плоду 19 см; діаметр товарного плоду 4 см; урожайність плодів за 10 днів плодоношення (перший місяць збору, кг/м2) 3,8; урожайність, кг/м2: до 1-го червня (жовтня) 20; урожайність, кг/м2: до 1-го липня (листопада) 26; період від повних сходів до першого збору 65 днів; вміст сухої речовини в плоді 4,6%.

05035034 Трой F1

Заявник: **Донецька дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Індетермінантний тип росту. Сила росту - сильна. Листок середнього розміру, пухирчастість середня, хвилястість країв слабка. За вираженням статі рослини – переважно жіночі квітки. Поверхня зав`язі шипувата, забарвлення біле. Відсутня партенокарпія. Плід середньої довжини, зеленого кольору, циліндричної форми. Ребристість наявна, ступінь ребристості середня, горбочки наявні. Опушення відсутнє або дуже незначне. Плямистість наявна, плями маленькі округлі, інтенсивність помірна. Гіркота біля основи плоду відсутня.

Загальна врожайність 39,3 т/га, маса товарного плоду 70 г; довжина товарного плоду 10 см; діаметр товарного плоду 3 см; урожайність плодів за 10 днів плодоношення (перший місяць збору, кг/м2) 10,5; період від повних сходів до першого збору 45 днів; Дегустаційна оцінка 8,4 бали

Перець солодкий

05037025 Велетень

Заявник: Інститут овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Наявне антоціанове забарвлення гіпокотиля паростка. Рослина пряма за положенням у просторі. Укорочення міжвузля (у верхній частині рослини) наявне. Листок зелений, середній за розміром, пухирчастість помірна. Положення у просторі плоду поникле. Плід середній за діаметром, переважна форма поздовжнього розрізу трапецієвидна, поперечного перерізу (на рівні плаценти) - кругла. Структура поверхні плоду гладенька, колір - червоний, помірна глянсуватість. Переважна кількість часток у плоді три-чотири. М`якоть товста. Час достигання ранній.

Товарний урожай 35,0 т/га, середня маса плоду 250 г; дегустаційна оцінка 8,7 балів; вихід стиглих товарних плодів 85,0 %; днів до достигання - 125; дружність достигання 8,0 балів; суха речовина 7,4%; загальний цукор 3,3%; вітамін С 225 мг/%; клітковина 1,8%.

05037024 Лада

Заявник: Інститут овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Наявне антоціанове забарвлення гіпокотиля паростка. Рослина напівпряма за положенням у просторі. Укорочення міжвузля (у верхній частині рослини) наявне. Листок світло-зелений, середній за розміром, пухирчастість слабка. Положення у просторі плоду поникле. Плід середній за діаметром, переважна форма поздовжнього розрізу трикутна, поперечного перерізу (на рівні плаценти) - кругла. Структура поверхні плоду гладенька, колір - червоний, помірна глянсуватість. Переважна кількість часток у плоді дві-три. М`якоть середньої товщини. Час достигання ранній.

Товарний урожай 25,0 т/га, середня маса плоду 95 г; дегустаційна оцінка 9,0 балів; вихід стиглих товарних плодів 95,0 %; днів до достигання - 108; дружність достигання 8,2 балів; суха речовина 6,7%; загальний цукор 3,3%; вітамін С 250 мг/%; клітковина 1,6%.

06037013 Паланська Бабура

Заявник: Центр овочівництва

Власник(и):

Підтримувач(і):

Наявне антоціанове забарвлення гіпокотиля паростка. Рослина розлога за положенням у просторі. Укорочення міжвузля (у верхній частині рослини) наявне. Листок середній за розміром, темно-зеленого кольору, пухирчастість слабка. Положення у просторі плоду горизонтальне. Плід середній за діаметром, переважна форма поздовжнього розрізу квадратна, поперечного перерізу (на рівні плаценти) - кругла. Структура поверхні плоду гладенька, колір - червоний, помірна глянсуватість. Переважна кількість часток у плоді три-чотири. М`якоть середня за товщиною. Час цвітіння і достигання ранній.

Середня маса плоду 120 г; вміст сухої речовини 7,6%; дегустаційна оцінка 9 балів; вихід стиглих товарних плодів 90 %; транспортабельність 8%; днів до достигання - 110; дружність достигання 7 балів; суха речовина - 8,6%; загальний цукор - 3,5%; вітамін С - 166 мг/%; клітковина - 1,2%.

05037001 Сандра

Заявник: Приватне мале підприємство " Тирас"

Власник(и):

Підтримувач(і):

Наявне антоціанове забарвлення гіпокотиля паростка. Рослина напівпряма за положенням у просторі. Укорочення міжвузля (у верхній частині рослини) наявне. Листок темно-зелений, середній за розміром, пухирчастість сильна. Положення у просторі плоду поникле. Плід середній за діаметром, переважна форма поздовжнього розрізу трикутна, поперечного перерізу (на рівні плаценти) - кругла. Структура поверхні плоду гладенька, колір - червоний, помірна глянсуватість. Переважна кількість часток у плоді три-чотири. М`якоть середньої товщини. Час достигання середній.

Товарний урожай 12,6 т/га, середня маса плоду 140 г; дегустаційна оцінка 9 балів; вихід стиглих товарних плодів 95,0 %; днів до достигання - 70; дружність достигання 9,0 балів; суха речовина 6,8%; загальний цукор 2,5%; вітамін С 120 мг/%; клітковина 0,9%.

05037036 Цинтія F1

Заявник: **Приватне мале підприємство " Тирас"**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Наявне антоціанове забарвлення гіпокотиля паростка. Рослина пряма за положенням у просторі. Укорочення міжвузля (у верхній частині рослини) наявне. Листок зелений, середній за розміром, пухирчастість помірна. Положення у просторі плоду горизонтальне. Плід середній за діаметром, переважна форма поздовжнього розрізу трикутна, поперечного перерізу (на рівні плаценти) - кругла. Структура поверхні плоду гладенька, колір - червоний, сильна глянсуватість. Переважна кількість часток у плоді три-чотири. М`якоть середньої товщини. Час достигання пізній.

Товарний урожай 12,0 т/га, середня маса плоду 140 г; дегустаційна оцінка 9,0 балів; вихід стиглих товарних плодів 98,0 %; днів до достигання - 135; дружність достигання 8,0 балів; суха речовина 7,0%; загальний цукор 3,0%; вітамін С 165 мг/%; клітковина 0,9%.

Петрушка

06163004 Акелла

Заявник: **Товариство з обмеженою відповідальністю "Селма"**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Рослина середня за висотою. Листки рідкі. Кучерявість листкової пластинки відсутня. Рослина напівпряма за положенням. Листок трикутний за формою. Черешок листка тонкий.

Товарний урожай - 350-400 ц/га; середня маса коренеплоду - 120-145 г; дегустаційна оцінка - 4,7-4,8 бала; днів до достигання 90-100; борошниста роса - 2-2,5%; гниль біла - 0,5-1,2%.

06163005 Капріччіо

Заявник: **Товариство з обмеженою відповідальністю "Селма"**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Рослина низька. Листки дуже щільні. Наявна сильна кучерявість листкової пластинки. Рослина напівпряма за положенням. Листок трикутний за розміром. Черешок листка тонкий.

Товарний урожай 300-350 ц/га; урожай ранньої продукції 70-80 ц/га; дегустаційна оцінка 4,7-4,8 балів; днів до достигання 95-100; борошниста роса 2-

2,5%; гниль біла 0,5-1,2%.

Помідор

06040001 /Одеська перлина/

Заявник: Одеський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Детермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) горизонтальний, довгий, середній за шириною, перистий, пухирчастість слабка, глянсуватість помірна. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки відсутній. Плід середній за розміром, округлої форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки слабке. Розмір рубчика плодоніжки меленький. Кількість камер - дві-три. Зелене плече (перед достиганням) середнього розміру. Плід помірний за твердістю, червоного кольору. М`якоть червона. Строк лежкості помірний.

Група стиглості - ранній; загальна урожайність - 46-52 т/га; товарна урожайність - 45-50 т/га; урожайність ранньої продукції - 20-25 т/га; маса товарного плоду - 80-95 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 89-95 днів; період плодоношення - 50-68 днів; дружність визрівання - 50-55%; ураженість хворобами та пошкодження шкідниками, %: попелицею 2-3; вміст сухої речовини в плоді - 6,8%; вміст загального цукру - 3,416 %; вміст вітаміну С - 38,7 мг%; дегустаційна оцінка свіжих плодів - 4,8 балів, у переробці - 4,6 бала; транспортабельність - 4 бала.

05040100 Арія

Заявник: Шевченко Ігор Андрійович

Власник(и):

Підтримувач(і):

Індетермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) похилий, середнього розміру, двічі перистий, пухирчастість і глянсуватість слабкі. Квітка жовта. Плід великий за розміром, округлої форми у поздовжньому розрізі, у поперечному розрізі - круглої. Кількість камер – три-чотири. Зелене плече (перед достиганням) маленького розміру. Плід твердий, червоного кольору. М`якоть червона. Строк лежкості помірний. Час цвітіння ранній.

Група стиглості - ранньостиглий; маса товарного плоду 170-190 г; період від повних сходів до початку дозрівання 90 днів; період плодоношення 48 днів; вміст сухої речовини в плоді 7,5 %; вміст загального цукру 4,2 %; вміст вітаміну С 17,1 мг%; дегустаційна оцінка, балів: свіжих плодів 9, у переробці 9; транспортабельність 9 балів.

05040046 Баловень

Заявник: Інститут овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Детермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) горизонтальний, широкий, середній за довжиною, двічі перистий, пухирчастість помірна, глянсуватість слабка. Квітка жовта. Плід середній за розміром, плескато-округлої форми у поздовжньому розрізі, у поперечному розрізі - круглої. Кількість камер - три-чотири. Зелене плече (перед достиганням) великого розміру. Плід помірний за твердістю, червоного кольору. М`якоть червона. Строк лежкості помірний. Час цвітіння ранній.

Група стиглості - ранній; загальна урожайність 62,4 т/га; товарна урожайність 50,1 т/га; урожайність ранньої продукції 21,8 т/га; маса товарного плоду 82 г; період від повних сходів до початку дозрівання 94 дні; період плодоношення 31 день; дружність визрівання 35%; ураженість хворобами та

пошкодження шкідниками, %: фітофторозом 7, макроспоріозом 3; вміст сухої речовини в плоді 5,2%; вміст загального цукру 2,9%; вміст вітаміну С 18,2 мг%; дегустаційна оцінка, балів: свіжих плодів 4,8; дегустаційна оцінка, балів: у переробці 4,6; транспортабельність 4,0 бала.

07040005 Беніто F1

Заявник: Бейо Заден Б.В.

Власник(и):

Підтримувач(і):

Детермінантний тип розвитку. Листок у середній третині рослини похилий, середнього розміру, двічі перистий, пухирчастість та глянсуватість слабкі. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки наявний. Плід середній за розміром еліптичної форми. Поглиблення біля плодоніжки відсутнє або дуже слабке. Розмір рубчику плодоніжки маленький. Кількість камер - чотири, п`ять або шість. Зелене плече (перед достиганням) маленьке, світло-зеленого кольору. Плід твердий, червоного кольору. М`якоть червона. Строк лежкості помірний. Час цвітіння та достигання ранній.

Вміст каротину, мг% - 2,3; Вміст сухої речовини в плоді - 6,0%; Вміст вітаміну С, мг% - 22,3; Вміст загального цукру - 5,3%; Загальна урожайність 20 кг/м2; Маса товарного плоду - 100-140 г; Період від повних сходів до початку дозрівання 70 днів; Період плодоношення 20 днів; Пошкодження шкідниками: попелицею 7%; Ураженість хворобами: вірусними хворобами 7%, гнилями 7%, макроспоріозом 8%, фітофторозом 9%.

05040079 Бобкат F1

Заявник: Сингента Сідз Б. В.

Власник(и):

Підтримувач(і):

Детермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) горизонтальний, довгий, середній за шириною, двічі перистий, пухирчастість і глянсуватість помірні. Квітка жовта. Плід дуже великий за розміром, плескато-округлої форми у поздовжньому розрізі, у поперечному розрізі - круглої. Кількість камер – три-чотири. Зелене плече (перед достиганням) відсутнє. Плід твердий, червоного кольору. М`якоть червона. Строк лежкості помірний. Час цвітіння середній.

Група стиглості - пізньостиглий; загальна урожайність 100 т/га; товарна урожайність 80 т/га; урожайність ранньої продукції 70 т/га; маса товарного плоду 220 г; період від повних сходів до початку дозрівання 80 днів; період плодоношення 35 днів; дружність визрівання 60 %; ураженість хворобами та пошкодження шкідниками, %: фітофторозом 5, макроспоріозом 5, гнилями 5, вірусними хворобами 5; вміст сухої речовини в плоді 6 %; вміст загального цукру 9 %; вміст вітаміну С 4 мг%; дегустаційна оцінка, балів: свіжих плодів 7; дегустаційна оцінка, балів: у переробці 8; транспортабельність 7 балів.

04040026 Бармалєй F1

Заявник: Київська дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Індетермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) горизонтальний, середнього розміру, перистий, пухирчастість помірна, глянсуватість слабка. Квітка жовта. Плід середній за розміром, округлої форми у поздовжньому розрізі, у поперечному розрізі - круглої. Кількість камер – чотири, п`ять або шість. Зелене плече (перед достиганням) відсутнє. Плід середній за твердістю, червоного кольору. М`якоть червона. Строк лежкості помірний. Час цвітіння ранній.

Група стиглості - ранньостиглий; загальна урожайність 16,5 кг/м2; товарна урожайність 16 кг/м2; урожайність ранньої продукції 3,8 кг/м2; маса товарного плоду 145 г; період від повних сходів до початку дозрівання 98 днів; період плодоношення 85 днів; дружність визрівання 75 %; ураженість

хворобами та пошкодження шкідниками, %: макроспоріозом 10; вміст сухої речовини в плоді 5,5 %; вміст загального цукру 2,8 %; вміст вітаміну С 24 мг%; дегустаційна оцінка, балів: свіжих плодів 5, у переробці 5; транспортабельність 4,8 бала.

05040098 Батлер КС

Заявник: Шевченко Ігор Андрійович

Власник(и):

Підтримувач(і):

Індетермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) похилий, довгий, середній за розміром, двічі перистий, пухирчастість помірна, глянсуватість слабка. Квітка жовта. Плід великий за розміром, плескато-округлої форми у поздовжньому розрізі, у поперечному розрізі - круглої. Кількість камер – чотири, п`ять або шість. Зелене плече (перед достиганням) середнього розміру. Плід середній за твердістю, рожевого кольору. М`якоть рожева. Строк лежкості помірний. Час цвітіння ранній.

Група стиглості - ранньостиглий; маса товарного плоду 180 г; період від повних сходів до початку дозрівання 97 днів; період плодоношення 61 день; вміст сухої речовини в плоді 7 %; вміст загального цукру 5,3 %; вміст вітаміну С 16,1 мг%; дегустаційна оцінка, балів: свіжих плодів 9, у переробці 9; транспортабельність 9 балів.

06040004 Баджіо

Заявник: Агро-Тіп

Власник(и):

Підтримувач(і):

Детермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) горизонтальний, довгий і широкий, перистий, пухирчастість та глянсуватість помірні. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки відсутній. Плід середній за розміром округлої форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки слабке. Розмір рубчику плодоніжки середній. Кількість камер - три-чотири. Зелене плече (перед достиганням) відсутнє. Плід помірний за твердістю, червоного кольору. М`якоть червона. Строк лежкості помірний. Час цвітіння та достигання ранні.

Загальна урожайність 120-130 т/га; товарна урожайність 80-90 т/га; маса товарного плоду 75-80 г; період від повних сходів до початку дозрівання 85 днів; період плодоношення 24 дні; дружність визрівання 99%; вміст сухої речовини в плоді 7%; вміст загального цукру 5,5-6%; дегустаційна оцінка, балів: свіжих плодів 3; дегустаційна оцінка, балів: у переробці 5; транспортабельність 9 балів.

05040015 Більшовик F1

Заявник: Динник Анатолій Васильович

Власник(и):

Підтримувач(і):

Детермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) горизонтальний, довгий, середній за шириною, перистий, пухирчастість слабка, глянсуватість помірна. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки наявний. Плід середній за розміром серцевидної форми у поздовжньому розрізі. Розмір рубчику плодоніжки великий. Кількість камер - дві-три. Зелене плече (перед достиганням) відсутнє. Плід м`який, червоного кольору. М`якоть червона. Строк лежкості помірний. Час цвітіння помірній.

Група стиглості - ранній; загальна урожайність 59,8 т/га; товарна урожайність 57,3 т/га; урожайність ранньої продукції 45,4 т/га; маса товарного плоду 100-110 г; період від повних сходів до початку дозрівання 105-110 днів; період плодоношення 32-35 днів; дружність визрівання 88,4%; ураженість хворобами та пошкодження шкідниками, %: фітофторозом 2,9, макроспоріозом 1,1, гнилями 0,9, попелицею 0,8; вміст сухої речовини в плоді 5,7%; вміст загального цукру 2,1-3,9%; вміст вітаміну С 19,0 мг%; дегустаційна оцінка, балів: свіжих плодів 3,9; дегустаційна оцінка, балів: у

переробці 4,3; транспортабельність 4,6 балів.

05040040 Великий Канйон

Заявник: **Товариство з обмеженою відповідальністю "Селма"**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Детермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) горизонтальний, довгий, середній за шириною, двічі перистий, пухирчастість та глянсуватість слабкі. Квітка жовта. Плід маленький за розміром, еліптичної форми у поздовжньому розрізі, у поперечному розрізі - круглої. Кількість камер - три-чотири. Зелене плече (перед достиганням) відсутнє. Плід помірний за твердістю, червоного кольору. М`якоть червона. Строк лежкості помірний. Час цвітіння помірній.

Група стиглості - середньостиглий; загальна урожайність 85-90 т/га; товарна урожайність 83-87 т/га; урожайність ранньої продукції 25-34 т/га; маса товарного плоду 92-105 г; період від повних сходів до початку дозрівання 115-120 днів; період плодоношення 45-50 днів; дружність визрівання 70-72%; ураженість хворобами та пошкодження шкідниками, %: фітофторозом 2,5-3, макроспоріозом 0,21-0,27, гнилями 0,2-0,3, вірусними хворобами 0,3-0,5; вміст сухої речовини в плоді 8,3-8,5%; вміст загального цукру 7,1-7,3%; вміст вітаміну С 75-80 мг%; дегустаційна оцінка, балів: свіжих плодів 4,6-4,7; дегустаційна оцінка, балів: у переробці 4,8-4,9; транспортабельність 4,8-4,9 балів.

05040072 ГС 12 F1

Заявник: **Сингента Сідз Б. В.**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Детермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) горизонтальний, довгий і широкий, двічі перистий, пухирчастість і глянсуватість помірні. Квітка жовта. Плід середній за розміром, округлої форми у поздовжньому розрізі, у поперечному розрізі - круглої. Кількість камер – більше шести. Зелене плече (перед достиганням) середнього розміру. Плід твердий, червоного кольору. М`якоть червона. Строк лежкості довгий. Час цвітіння середній.

Група стиглості - середньоранній; загальна урожайність 95 т/га; товарна урожайність 75 т/га; урожайність ранньої продукції 40 т/га; маса товарного плоду 120 г; період від повних сходів до початку дозрівання 60 днів; період плодоношення 35 днів; дружність визрівання 65 %; ураженість хворобами та пошкодження шкідниками, %: фітофторозом 5, макроспоріозом 7; вміст сухої речовини в плоді 6 %; вміст загального цукру 9 %; вміст вітаміну С 2 мг%; дегустаційна оцінка, балів: свіжих плодів 5; транспортабельність 5 балів.

05040041 Глобемастер F1

Заявник: **Товариство з обмеженою відповідальністю "Селма"**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Індетермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) горизонтальний, середнього розміру, перистий, пухирчастість помірна, глянсуватість слабка. Квітка жовта. Плід середній за розміром, плескатої форми у поздовжньому розрізі, у поперечному розрізі - не круглої. Кількість камер - більше шести. Зелене плече (перед достиганням) маленького розміру. Плід м`який, рожевого кольору. М`якоть рожева. Час цвітіння помірній.

Група стиглості - середньостиглий; загальна урожайність 110-115 т/га; товарна урожайність 105-110 т/га; урожайність ранньої продукції 50-55 т/га; маса товарного плоду 430-750 г; період від повних сходів до початку дозрівання 117-125 днів; період плодоношення 50-60 днів; дружність визрівання

30-35%; ураженість хворобами та пошкодження шкідниками, %: фітофторозом 2,8-3,5, макроспоріозом 0,1-0,2, гнилями 0,1-0,15, вірусними хворобами 0,3-0,4; вміст сухої речовини в плоді 8,2-8,4%; вміст загального цукру 7,6-7,8%; вміст вітаміну С 70-72 мг%; дегустаційна оцінка, балів: свіжих плодів 4,8-5,0; дегустаційна оцінка, балів: у переробці 4,6-4,7; транспортабельність 4,7-4,8 бала.

05040044 Дама

Заявник: **Інститут овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Детермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) піднесений, середній за розміром, перистий, пухирчастість сильна, глянсуватість помірна. Квітка жовта. Плід середній за розміром, оберненояйцевидної форми у поздовжньому розрізі, у поперечному розрізі - круглої. Кількість камер - дві-три. Зелене плече (перед достиганням) відсутнє. Плід твердий, червоного кольору. М`якоть рожева. Строк лежкості помірний. Час цвітіння ранній.

Група стиглості - пізній; загальна урожайність 48,5 т/га; товарна урожайність 44,6 т/га; урожайність ранньої продукції 6,8 т/га; маса товарного плоду 78 г; період від повних сходів до початку дозрівання 110 днів; період плодоношення 49 днів; дружність визрівання 13%; ураженість хворобами та пошкодження шкідниками, %: фітофторозом 0,0, макроспоріозом 9,0; вміст сухої речовини в плоді 5,6%; вміст загального цукру 3,4%; вміст вітаміну С 23,2 мг%; дегустаційна оцінка, балів: свіжих плодів 4,4; дегустаційна оцінка, балів: у переробці 4,8; транспортабельність 5,0 балів.

05040045 Елеонора

Заявник: **Інститут овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Детермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) горизонтальний, довгий, середній за шириною, перистий, пухирчастість та глянсуватість слабкі. Квітка жовта. Плід середній за розміром, плескато-округлої форми у поздовжньому розрізі, у поперечному розрізі - не круглої. Кількість камер - три-чотири. Зелене плече (перед достиганням) відсутнє. Плід середній за твердістю, червоного кольору. М`якоть червона. Строк лежкості помірний. Час цвітіння ранній.

Група стиглості - середньоранній; загальна урожайність 58,2 т/га; товарна урожайність 50,1 т/га; урожайність ранньої продукції 19,8 т/га; маса товарного плоду 76 г; період від повних сходів до початку дозрівання 104 днів; період плодоношення 41 день; дружність визрівання 34%; ураженість хворобами та пошкодження шкідниками, %: фітофторозом 9, макроспоріозом 7, гнилями 3; вміст сухої речовини в плоді 5,4%; вміст загального цукру 3,2%; вміст вітаміну С 24,2 мг%; дегустаційна оцінка, балів: свіжих плодів 4,8; дегустаційна оцінка, балів: у переробці 4,8; транспортабельність 4,8 бала.

07040004 Експрес F1

Заявник: **Бейо Заден Б.В.**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Детермінантний тип розвитку. Листок у середній третині рослини похилий, середнього розміру, перистий, пухирчастість та глянсуватість слабкі. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки відсутній. Плід середній за розміром округлої форми. Поглиблення біля плодоніжки слабке. Розмір рубчику плодоніжки маленький. Кількість камер - три-чотири. Зелене плече (перед достиганням) середнього розміру Плід м`який, червоного кольору. М`якоть червона. Строк лежкості помірний. Час цвітіння та достигання ранній.

Вміст каротину, мг% - 2,1; Вміст сухої речовини в плоді - 6,2%; Вміст вітаміну С, мг% - 22; Вміст загального цукру - 5,3%; Загальна урожайність 12 кг/м2; Маса товарного плоду - 120-130 г; Період від повних сходів до початку дозрівання 54 дні; Період плодоношення 20 днів; Пошкодження шкідниками: попелицею 7%; Ураженість хворобами: вірусними хворобами 7%, гнилями 7%, макроспоріозом 8%, фітофторозом 9%.

05040048 Зореслав

Заявник: **Інститут овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Детермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) горизонтальний, довгий, середній за шириною, перистий, пухирчастість та глянсуватість помірні. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки відсутній. Плід середній за розміром округлої форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки слабке. Розмір рубчику плодоніжки середній. Кількість камер - дві-три. Зелене плече (перед достиганням) маленького розміру. Плід помірний за твердістю, червоного кольору. М`якоть червона. Строк лежкості помірний. Час цвітіння та достигання помірній.

Загальна урожайність 52-61,8 т/га; товарна урожайність 51,7-61,2 т/га; урожайність ранньої продукції 14,5 т/га; маса товарного плоду 80 г; період від повних сходів до початку дозрівання 105-115 днів; дружність визрівання 72%; вміст сухої речовини в плоді 5,5%; вміст загального цукру 3,08%; вміст вітаміну С 31,95 мг%.

05040080 Колядник

Заявник: **Черкаський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Детермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) горизонтальний, довгий і широкий, перистий, пухирчастість і глянсуватість слабкі. Квітка жовта. Плід середній за розміром, округлої форми у поздовжньому розрізі, у поперечному розрізі - круглої. Кількість камер – чотири, п`ять або шість. Зелене плече (перед достиганням) відсутнє. Плід твердий, червоного кольору. М`якоть червона. Строк лежкості помірний. Час цвітіння середній.

Група стиглості - пізньостиглий; загальна урожайність 63,4 т/га; товарна урожайність 34 т/га; маса товарного плоду 90 г; період від повних сходів до початку дозрівання 120 днів; дружність визрівання 46 %; ураженість хворобами та пошкодження шкідниками, %: макроспоріозом 3,9, гнилями 4,2, вірусними хворобами 6,7; вміст сухої речовини в плоді 6 %; вміст загального цукру 3,4 %; вміст вітаміну С 20,8 мг%; дегустаційна оцінка, балів: свіжих плодів 4; транспортабельність висока.

05040097 Конорі

Заявник: **Шевченко Ігор Андрійович**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Детермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) горизонтальний, середнього розміру, перистий, пухирчастість і глянсуватість слабкі. Квітка жовта. Плід маленький за розміром, плескато-округлої форми у поздовжньому розрізі, у поперечному розрізі - круглої. Кількість камер – дві-три. Зелене плече (перед достиганням) середнього розміру. Плід твердий, червоного кольору. М`якоть червона. Строк лежкості довгий. Час цвітіння середній.

Група стиглості - раньостиглий; загальна урожайність 35 т/га; товарна урожайність 32 т/га; урожайність ранньої продукції 25 т/га; маса товарного

плоду 15-25 г; період від повних сходів до початку дозрівання 95 днів; період плодоношення 50 днів; вміст сухої речовини в плоді 7,8 %; вміст загального цукру 5,2 %; вміст вітаміну С 19 мг%; дегустаційна оцінка, балів: свіжих плодів 9; дегустаційна оцінка, балів: у переробці 9; транспортабельність 9 балів.

05040105 Комплімент

Заявник: **Товариство з обмеженою відповідальністю" Свитязь"**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Детермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) горизонтальний, довгий, середній за шириною, перистий, пухирчастість і глянсуватість помірні. Квітка жовта. Плід середній за розміром, плескато-округлої форми у поздовжньому розрізі, у поперечному розрізі - круглої. Кількість камер – більше шести. Зелене плече (перед достиганням) відсутнє. Плід середній за твердістю, червоного кольору. М`якоть червона. Строк лежкості помірний. Час цвітіння середній.

Група стиглості - середньостиглий; загальна урожайність 50 т/га; товарна урожайність 45 т/га; маса товарного плоду 120 г; період від повних сходів до початку дозрівання 80 днів; дружність визрівання 95 %; ураженість хворобами та пошкодження шкідниками, %: макроспоріозом 2; вміст сухої речовини в плоді 6 %; дегустаційна оцінка, балів: свіжих плодів 8; транспортабельність 9.

05040035 Консуело F1

Заявник: **Інститут овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Індетермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) похилий, довгий і широкий, двічі перистий, пухирчастість слабка, глянсуватість помірна. Квітка жовта. Плід середній за розміром, плескато-округлої форми у поздовжньому розрізі, у поперечному розрізі - круглої. Кількість камер – чотири, п`ять або шість. Зелене плече (перед достиганням) відсутнє. Плід твердий, червоного кольору. М`якоть червона. Строк лежкості помірний. Час цвітіння середній.

Загальна урожайність 27,2 кг/м2; товарна урожайність 26,7 кг/м2; урожайність ранньої продукції 21,6 кг/м2; маса товарного плоду 133 г; період від повних сходів до початку дозрівання 128 днів; вміст сухої речовини в плоді 4,45 %; вміст загального цукру 2,36 %; вміст вітаміну С 14,62 мг%; дегустаційна оцінка, балів: свіжих плодів 4,9.

05040094 Казумі

Заявник: **Шевченко Ігор Андрійович**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Індетермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) горизонтальний, середнього розміру, двічі перистий, пухирчастість і глянсуватість слабкі. Квітка жовта. Плід великий за розміром, плескато-округлої форми у поздовжньому розрізі, у поперечному розрізі - круглої. Кількість камер – три-чотири. Зелене плече (перед достиганням) відсутнє. Плід дуже твердий, червоного кольору. М`якоть червона. Строк лежкості довгий. Час цвітіння ранній.

Група стиглості - ранньостиглий; маса товарного плоду 170-180 г; період від повних сходів до початку дозрівання 93 дні; вміст сухої речовини в плоді 8,1 %; вміст загального цукру 4 %; вміст вітаміну С 17 мг%; дегустаційна оцінка, балів: свіжих плодів 9, у переробці 9; транспортабельність 9 балів.

® 00040027 Ліра F1

Заявник: Агрофірма "Наско"

Власник(и): Агрофірма "Наско"

Підтримувач(і):

Детермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) похилий, довгий, середній за шириною, перистий, пухирчастість помірна, глянсуватість слабка. Квітка жовта. Плід середній за розміром, плескато-округлої форми у поздовжньому розрізі, у поперечному розрізі - круглої. Кількість камер – три-чотири. Зелене плече (перед достиганням) відсутнє. Плід твердий, червоного кольору. М`якоть червона. Строк лежкості помірний. Час цвітіння середній.

Загальна урожайність 100 т/га; товарна урожайність 50 т/га; маса товарного плоду 82 г; ураженість хворобами та пошкодження шкідниками, %: попелицею 5,6; вміст сухої речовини в плоді 3 %; дегустаційна оцінка, балів: у переробці 4,7.

05040047 Малиновий дзвін

Заявник: Інститут овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Детермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) горизонтальний, довгий, середній за шириною, перистий, пухирчастість помірна, глянсуватість слабка. Квітка жовта. Плід середній за розміром, плескато-округлої форми у поздовжньому розрізі, у поперечному розрізі - круглої. Кількість камер - чотири, п`ять або шість. Зелене плече (перед достиганням) середнього розміру. Плід м`який, рожевого кольору. М`якоть рожева. Строк лежкості помірний. Час цвітіння помірній.

Група стиглості - ранній; загальна урожайність 45-50 т/га; товарна урожайність 42,7-49,5 т/га; урожайність ранньої продукції 31,4 т/га; маса товарного плоду 80 г; період від повних сходів до початку дозрівання 105 днів; період плодоношення 60 днів; дружність визрівання 85%; ураженість хворобами та пошкодження шкідниками, %: фітофторозом 30, макроспоріозом 9,5; вміст сухої речовини в плоді 3,25%; вміст загального цукру 3,93%; вміст вітаміну С 23,86 мг%; дегустаційна оцінка, балів: свіжих плодів 5,0; дегустаційна оцінка, балів: у переробці 4,8-5,0; транспортабельність 4,0 бала.

® 00040026 Орфей F1

Заявник: Агрофірма "Наско"

Власник(и): Агрофірма "Наско"

Підтримувач(і):

Індетермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) горизонтальний, середнього розміру, перистий, пухирчастість помірна, глянсуватість слабка. Квітка жовта. Плід середній за розміром, плескато-округлої форми у поздовжньому розрізі, у поперечному розрізі - круглої. Кількість камер – чотири, п`ять або шість. Зелене плече (перед достиганням) відсутнє. Плід м`який, червоного кольору. М`якоть червона. Строк лежкості короткий. Час цвітіння ранній.

Загальна урожайність 90 т/га; товарна урожайність 40 т/га; маса товарного плоду 90 г; вміст загального цукру 20 %; дегустаційна оцінка, балів: у переробці 4,6.

05040095 Овація

Заявник: Шевченко Ігор Андрійович

Власник(и):

Підтримувач(і):

Індетермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) похилий, середнього розміру, двічі перистий, пухирчастість і глянсуватість слабкі. Квітка жовта. Плід великий за розміром, округлої форми у поздовжньому розрізі, у поперечному розрізі - круглої. Кількість камер – три-чотири. Зелене плече (перед достиганням) відсутнє. Плід твердий, червоного кольору. М`якоть червона. Строк лежкості помірний. Час цвітіння ранній.

Група стиглості - ранньостиглий; маса товарного плоду 150-180 г; період від повних сходів до початку дозрівання 92 дні; період плодоношення 45-50 днів; вміст сухої речовини в плоді 7,8 %; вміст загального цукру 4,3 %; вміст вітаміну С 17 мг%; дегустаційна оцінка, балів: свіжих плодів 9, у переробці 9; транспортабельність 9 балів.

05040042 Прикраса

Заявник: **Товариство з обмеженою відповідальністю "Селма"**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Детермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) горизонтальний, довгий і широкий, перистий, пухирчастість та глянсуватість помірні. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки наявний. Плід середній за розміром циліндричної форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки слабке. Розмір рубчику плодоніжки маленький. Кількість камер - три-чотири. Зелене плече (перед достиганням) відсутнє. Плід твердий, червоного кольору. М`якоть червона. Строк лежкості помірний. Час цвітіння помірний.

Група стиглості - ранній; загальна урожайність 80-85 т/га; товарна урожайність 79-84 т/га; урожайність ранньої продукції 56-65 т/га; маса товарного плоду 95-102 г; період від повних сходів до початку дозрівання 105-107 днів; період плодоношення 55-60 днів; дружність визрівання 82-85%; ураженість хворобами та пошкодження шкідниками, %: фітофторозом 2,0-2,8, макроспоріозом 0,2-0,3, гнилями 0,1-0,17, вірусними хворобами 0,2-0,4; вміст сухої речовини в плоді 8,0-8,2%; вміст загального цукру 7,2-7,4%; вміст вітаміну С 65-72 мг%; дегустаційна оцінка, балів: свіжих плодів 4,7-4,9; дегустаційна оцінка, балів: у переробці 4,6-4,7; транспортабельність 4,5-4,7 балів.

06040003 Полбіг F1

Заявник: **Бейо Заден Б.В.**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Детермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) горизонтальний, довгий, середній за шириною, перистий, пухирчастість помірна, глянсуватість слабка. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки наявний. Плід середній за розміром плескато-округлої форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки помірне. Розмір рубчику плодоніжки середній. Кількість камер - чотири, п`ять або шість. Зелене плече (перед достиганням) відсутнє. Плід помірний за твердістю, червоного кольору. М`якоть червона. Строк лежкості помірний.

Група стиглості - середньоранній; загальна урожайність 110 т/га; товарна урожайність 103 т/га; урожайність ранньої продукції 80 т/га; маса товарного плоду 180 г; період від повних сходів до початку дозрівання 60 днів; період плодоношення 45 днів; дружність визрівання 95%; дегустаційна оцінка, балів: свіжих плодів 9; дегустаційна оцінка, балів: у переробці 9; транспортабельність 3 бала.

07040006 Річі F1

Заявник: Бейо Заден Б.В.

Власник(и):

Підтримувач(і):

Детермінантний тип розвитку. Листок у середній третині рослини горизонтальний, середньої довжини, вузький, перистий, пухирчастість та глянсуватість слабкі. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки відсутній. Плід середній за розміром округлої форми. Поглиблення та ребристість біля плодоніжки відсутнє або дуже слабке. Розмір рубчику плодоніжки маленький. Кількість камер - три-чотири. Зелене плече (перед достиганням) маленьке, світло-зеленого кольору. Плід твердий, червоного кольору. М`якоть червона. Строк лежкості помірний. Час цвітіння та достигання ранній.

Вміст каротину, мг% - 2,0; Вміст сухої речовини в плоді - 6,0%; Вміст вітаміну С, мг% - 21,7; Вміст загального цукру - 5,5%; Загальна урожайність 15 кг/м2; Маса товарного плоду - 80-120 г; Період від повних сходів до початку дозрівання 70 днів; Період плодоношення 20 днів; Пошкодження шкідниками: попелицею 7%; Ураженість хворобами: вірусними хворобами 7%, гнилями 7%, макроспоріозом 8%, фітофторозом 9%.

05040016 Ротор F1

Заявник: Динник Анатолій Васильович

Власник(и):

Підтримувач(і):

Індетермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) горизонтальний, довгий і широкий, двічі перистий, пухирчастість та глянсуватість помірні. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки наявний. Плід середній за розміром еліптичної форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки відсутнє або дуже слабке. Розмір рубчику плодоніжки маленький. Кількість камер - дві-три. Зелене плече (перед достиганням) відсутнє. Плід твердий, червоного кольору. М`якоть червона. Строк лежкості помірний. Час цвітіння помірній.

Група стиглості - середньоранній; загальна урожайність 58,7 т/га; товарна урожайність 56,4 т/га; урожайність ранньої продукції 47,2 т/га; маса товарного плоду 90-100 г; період від повних сходів до початку дозрівання 100-110 днів; період плодоношення 28-32 днів; дружність визрівання 92,6%; ураженість хворобами та пошкодження шкідниками, %: фітофторозом 3,5, макроспоріозом 0,6, гнилями 0,8, попелицею 1,3; вміст сухої речовини в плоді 6,5%; вміст загального цукру 2,5-3,5%; вміст вітаміну С 18,3 мг%; дегустаційна оцінка, балів: свіжих плодів 4,3; дегустаційна оцінка, балів: у переробці 3,5; транспортабельність 4,0 бала.

04040014 Самсон

Заявник: Приватне мале підприємство " Тирас"

Власник(и):

Підтримувач(і):

Детермінантний тип розвитку. Листок у середній третині рослини горизонтальний, довгий, середній за шириною, двічі перистий, пухирчастість та глянсуватість помірні. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки наявний. Плід середній за розміром, округлої форми. Поглиблення біля плодоніжки слабке. Розмір рубчику плодоніжки середній. Кількість камер - три-чотири. Зелене плече відсутнє. Плід червоного кольору. М`якоть червона. Строк лежкості помірний. Час цвітіння та достигання ранній.

Група стиглості - ранній; загальна урожайність 48-50 т/га; товарна урожайність 40-45 т/га; урожайність ранньої продукції 10-15 т/га; маса товарного плоду 90-100 г; період від повних сходів до початку дозрівання 90-95 днів; дружність визрівання 95-98%; вміст сухої речовини в плоді 6,9%; вміст загального цукру 3,8%; вміст вітаміну С 17,4 мг%; дегустаційна оцінка, балів: свіжих плодів 9; дегустаційна оцінка, балів: у переробці 9; транспортабельність 9 балів.

05040059 Тарпан F1

Заявник: Нюнемс Б.В.

Власник(и):

Підтримувач(і):

Детермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) горизонтальний, довгий, середній за шириною, двічі перистий, пухирчастість та глянсуватість помірні. Квітка жовта. Плід середній за розміром, плескато-округлої форми у поздовжньому розрізі, у поперечному розрізі - круглої. Кількість камер - чотири, п`ять або шість. Зелене плече (перед достиганням) відсутнє. Плід м`який, рожевого кольору. М`якоть рожева. Строк лежкості короткий. Час цвітіння ранній.

Група стиглості - ранній; загальна урожайність 90-150 т/га; товарна урожайність 90-145 т/га; урожайність ранньої продукції 50-55 т/га; маса товарного плоду 135-160 г; період від повних сходів до початку дозрівання 98-100 днів; період плодоношення 20-25 днів; дружність визрівання 25-30 %; ураженість хворобами та пошкодження шкідниками, %: фітофторозом 0-5, макроспоріозом 0-2; вміст сухої речовини в плоді 5,9 %; вміст загального цукру 3,7 %; вміст вітаміну С 30 мг%; дегустаційна оцінка, балів: свіжих плодів 5; транспортабельність 5 балів.

05040081 Тясмінський

Заявник: Черкаський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Детермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) горизонтальний, довгий, середній за шириною, двічі перистий, пухирчастість і глянсуватість помірні. Квітка жовта. Плід середній за розміром, округлої форми у поздовжньому розрізі, у поперечному розрізі - круглої. Кількість камер – три-чотири. Зелене плече (перед достиганням) відсутнє. Плід твердий, червоного кольору. М`якоть червона. Строк лежкості помірний. Час цвітіння ранній.

Загальна урожайність 77,2 т/га; товарна урожайність 59,2 т/га; маса товарного плоду 70-75 г; період від повних сходів до початку дозрівання 110 днів; дружність визрівання 30 %; ураженість хворобами та пошкодження шкідниками, %: макроспоріозом 1,6, гнилями 0,8; вміст сухої речовини в плоді 5,6 %; вміст загального цукру 3,2 %; вміст вітаміну С 18,3 мг%; дегустаційна оцінка, балів: свіжих плодів 4; транспортабельність 5.

05040096 Тайлер

Заявник: Шевченко Ігор Андрійович

Власник(и):

Підтримувач(і):

Індетермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) похилий, довгий, середній за шириною, двічі перистий, пухирчастість і глянсуватість слабкі. Квітка жовта. Плід великий за розміром, округлої форми у поздовжньому розрізі, у поперечному розрізі - круглої. Кількість камер – три-чотири. Зелене плече (перед достиганням) відсутнє. Плід твердий, червоного кольору. М`якоть червона. Строк лежкості довгий. Час цвітіння ранній.

Група стиглості - ранньостиглий; маса товарного плоду 180-200 г; період від повних сходів до початку дозрівання 95 днів; період плодоношення 60 днів; вміст сухої речовини в плоді 8,3 %; вміст загального цукру 4,2 %; вміст вітаміну С 16,9 мг%; дегустаційна оцінка, балів: свіжих плодів 9, у переробці 9; транспортабельність 9 балів.

06040002 Точ F1

Заявник: **Бейо Заден Б.В.**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Детермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) горизонтальний, довгий і широкий, перистий, пухирчастість та глянсуватість помірні. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки наявний. Плід маленький за розміром яйцевидної форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки слабке. Розмір рубчику плодоніжки маленький. Кількість камер - три-чотири. Зелене плече (перед достиганням) відсутнє. Плід помірний за твердістю, червоного кольору. М`якоть червона. Строк лежкості помірний.

Група стиглості - середньостиглий; загальна урожайність 100 т/га; товарна урожайність 95 т/га; урожайність ранньої продукції 40 т/га; маса товарного плоду 75 г; період від повних сходів до початку дозрівання 75 днів; дружність визрівання 95%; вміст сухої речовини в плоді 5,7%; дегустаційна оцінка, балів: свіжих плодів 8; дегустаційна оцінка, балів: у переробці 9; транспортабельність 9 балів.

05040074 Улісс F1

Заявник: **Сингента Сідз Б. В.**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Детермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) горизонтальний, довгий, середній за шириною, двічі перистий, пухирчастість помірна, глянсуватість слабка. Квітка жовта. Плід середній за розміром, округлої форми у поздовжньому розрізі, у поперечному розрізі - круглої. Кількість камер – дві-три. Зелене плече (перед достиганням) відсутнє. Плід твердий, рожевого кольору. М`якоть рожева. Строк лежкості короткий. Час цвітіння середній.

Група стиглості - середньоранній; загальна урожайність 120 т/га; товарна урожайність 100 т/га; урожайність ранньої продукції 50 т/га; маса товарного плоду 110 г; період від повних сходів до початку дозрівання 50 днів; період плодоношення 40 днів; дружність визрівання 70 %; ураженість хворобами та пошкодження шкідниками, %: фітофторозом 6, макроспоріозом 5, гнилями 5, вірусними хворобами 5; вміст сухої речовини в плоді 5%; вміст загального цукру 9 %; вміст вітаміну С 3 мг%; дегустаційна оцінка, балів: свіжих плодів 5; дегустаційна оцінка, балів: у переробці 8; транспортабельність 8 балів.

05040011 Український

Заявник: **Потопальський Анатолій Іванович**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Індетермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) горизонтальний, середній за розміром, перистий, пухирчастість та

глянсуватість слабкі. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки наявний. Плід середній за розміром плескато-округлої форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки відсутнє або дуже слабке. Розмір рубчику плодоніжки маленький. Кількість камер - чотири, п`ять або шість. Зелене плече (перед достиганням) середнього розміру. Плід помірний за твердістю, червоного кольору. М`якоть червона. Строк лежкості помірний. Час цвітіння та достигання ранній.

Група стиглості - ранній; загальна урожайність 60-80 т/га; товарна урожайність 60-75 т/га; урожайність ранньої продукції 15 т/га; маса товарного плоду 55-75 г; період від повних сходів до початку дозрівання 93 дні; дружність визрівання 90%; ураженість хворобами та пошкодження шкідниками, %: фітофторозом 10, вірусними хворобами до 5; вміст сухої речовини в плоді 6%; вміст загального цукру 3%; вміст вітаміну С 21-26 мг%; дегустаційна оцінка, балів: свіжих плодів 5; дегустаційна оцінка, балів: у переробці 5; транспортабельність 5 балів.

05040106 Фландрія

Заявник: **Товариство з обмеженою відповідальністю" Свитязь"**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Детермінантний тип розвитку. Листок у середній третині рослини горизонтальний, довгий і широкий, перистий, пухирчастість та глянсуватість помірні. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки відсутній. Плід середній за розміром плескато-округлої форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки помірне. Розмір рубчику плодоніжки середній. Кількість камер - три-чотири. Зелене плече (перед достиганням) маленького розміру. Плід помірний за твердістю, червоного кольору. М`якоть червона. Строк лежкості помірний. Час цвітіння та достигання помірній.

Група стиглості - середньостиглий; загальна урожайність 50 т/га; товарна урожайність 45 т/га; урожайність ранньої продукції 40 т/га; маса товарного плоду 120 г; період від повних сходів до початку дозрівання 80 днів; дружність визрівання 95%; вміст сухої речовини в плоді 6%; дегустаційна оцінка, балів: свіжих плодів 8; дегустаційна оцінка, балів: у переробці 8; транспортабельність 9 балів.

05040099 Хітомакс

Заявник: **Шевченко Ігор Андрійович**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Індетермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) похилий, середнього розміру, двічі перистий, пухирчастість і глянсуватість слабкі. Квітка жовта. Плід великий за розміром, серцевидної форми у поздовжньому розрізі, у поперечному розрізі - круглої. Кількість камер – три-чотири. Зелене плече (перед достиганням) відсутнє. Плід дуже твердий, червоного кольору. М`якоть червона. Строк лежкості довгий. Час цвітіння ранній.

Група стиглості - ранньостиглий; маса товарного плоду 180-200 г; період від повних сходів до початку дозрівання 95 днів; період плодоношення 62 дні; вміст сухої речовини в плоді 7,5 %; вміст загального цукру 4,3 %; вміст вітаміну С 16,9 мг%; дегустаційна оцінка, балів: свіжих плодів 9, у переробці 9; транспортабельність 9 балів.

05040107 Хасан

Заявник: **Товариство з обмеженою відповідальністю" Свитязь"**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Детермінантний тип росту. Листокза положенням (у середній третині рослини) горизонтальний, довгий, середній за шириною, перистий, пухирчастість та глянсуватість помірні. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки наявний. Плід середній за розміром округлої форми у

поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки слабке. Розмір рубчику плодоніжки середній. Кількість камер - три-чотири. Зелене плече (перед достиганням) відсутнє. Плід помірний за твердістю, червоного кольору. М`якоть червона. Строк лежкості помірний. Час цвітіння та достигання помірній.

Група стиглості - ранній; загальна урожайність 50 т/га; товарна урожайність 45 т/га; урожайність ранньої продукції 40 т/га; маса товарного плоду 120 г; період від повних сходів до початку дозрівання 80 днів; дружність визрівання 95%; вміст сухої речовини в плоді 6%; вміст вітаміну С 6 мг%; дегустаційна оцінка, балів: свіжих плодів 8; дегустаційна оцінка, балів: у переробці 8; транспортабельність 9 балів.

05040073 Чіблі F1

Заявник: **Сингента Сідз Б. В.**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Детермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) горизонтальний, довгий, середній за шириною, двічі перистий, пухирчастість помірна, глянсуватість слабка. Квітка жовта. Плід середній за розміром, плескато-округлої форми у поздовжньому розрізі, у поперечному розрізі - круглої. Кількість камер – чотири, п`ять або шість. Зелене плече (перед достиганням) відсутнє. Плід твердий, червоного кольору. М`якоть червона. Строк лежкості довгий. Час цвітіння середній.

Група стиглості - середньоранній; загальна урожайність 120 т/га; товарна урожайність 100 т/га; урожайність ранньої продукції 50 т/га; маса товарного плоду 110 г; період від повних сходів до початку дозрівання 45 днів; період плодоношення 40 днів; дружність визрівання 70 %; ураженість хворобами та пошкодження шкідниками, %: фітофторозом 10, макроспоріозом 8, гнилями 7, вірусними хворобами 5; вміст сухої речовини в плоді 5%; вміст загального цукру 8 %; вміст вітаміну С 3 мг%; дегустаційна оцінка, балів: свіжих плодів 6; дегустаційна оцінка, балів: у переробці 8; транспортабельність 8 балів.

05040101 Шерідан

Заявник: **Шевченко Ігор Андрійович**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Індетермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) похилий, середнього розміру, двічі перистий, пухирчастість і глянсуватість слабкі. Квітка жовта. Плід великий за розміром, округлої форми у поздовжньому розрізі, у поперечному розрізі - круглої. Кількість камер – три-чотири. Зелене плече (перед достиганням) відсутнє. Плід твердий, червоного кольору. М`якоть червона. Строк лежкості помірний. Час цвітіння ранній.

Група стиглості - ранньостиглий; маса товарного плоду 170-200 г; період від повних сходів до початку дозрівання 90 днів; період плодоношення 40-50 днів; вміст сухої речовини в плоді 8 %; вміст загального цукру 4,5 %; вміст вітаміну С 17,2 мг%; дегустаційна оцінка, балів: свіжих плодів 9, у переробці 9; транспортабельність 9 балів.

® 04040019 Яна

Заявник: **Приватне підприємство "Агросвіт"**

Власник(и): **Приватне підприємство "Агросвіт"**

Приватне підприємство науково- дослідна селекційна станція " Наско"

Підтримувач(і):

Детермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) горизонтальний, середнього розміру, двічі перистий, пухирчастість та глянсуватість сильні. Квітка жовта. Плід середній за розміром, округлої форми у поздовжньому розрізі, у поперечному розрізі - круглої. Кількість камер - дві-три. Зелене плече (перед достиганням) маленького розміру. Плід помірний за твердістю, червоного кольору. М`якоть червона. Строк лежкості довгий.

Група стиглості - ультраранній; загальна урожайність 60-85 т/га; товарна урожайність 57-80 т/га; урожайність ранньої продукції 35-40 т/га; маса товарного плоду 80-100 г; період від повних сходів до початку дозрівання 85-95 днів; період плодоношення 20-25 днів; дружність визрівання 55-60 %; ураженість хворобами та пошкодження шкідниками, %: фітофторозом 1, макроспоріозом 0-3; вміст сухої речовини в плоді 5,4-6,0 %; вміст загального цукру 3,3-3,4 %; вміст вітаміну С 15,0-20,2 мг%; дегустаційна оцінка, балів: свіжих плодів 4,7; транспортабельність 4,6 балів.

05040093 Ядвіга

Заявник: **Шевченко Ігор Андрійович**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Індетермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) похилий, середнього розміру, двічі перистий, пухирчастість і глянсуватість слабкі. Квітка жовта. Плід великий за розміром, серцевидної форми у поздовжньому розрізі, у поперечному розрізі - круглої. Кількість камер – три-чотири. Зелене плече (перед достиганням) середнього розміру. Плід твердий, червоного кольору. М`якоть червона. Строк лежкості помірний. Час цвітіння ранній.

Група стиглості - ранньостиглий; маса товарного плоду 160-180 г; період від повних сходів до початку дозрівання 88 днів; дружність визрівання 75 %; вміст сухої речовини в плоді 7,3 %; вміст загального цукру 4,7 %; вміст вітаміну С 17,4 мг%; дегустаційна оцінка, балів: свіжих плодів 9, у переробці 9; транспортабельність 9 балів.

05040092 Янтар Одеський

Заявник: **Одеський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Індетермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) горизонтальний, довгий, середній за шириною, перистий, пухирчастість та глянсуватість слабкі. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки наявний. Плід середній за розміром кутастої форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки слабке. Розмір рубчику плодоніжки середній. Кількість камер - чотири, п`ять або шість. Зелене плече (перед достиганням) середнього розміру. Плід м`який. Строк лежкості помірний. Час цвітіння та достигання помірній.

Загальна урожайність 46,6 т/га; товарна урожайність 44,3 т/га; урожайність ранньої продукції 7,2 т/га; маса товарного плоду 210 г; період від повних сходів до початку дозрівання 120 днів; дружність визрівання 65%; вміст сухої речовини в плоді 9,1%; вміст загального цукру 5,5%; вміст вітаміну С 33,9 мг%; дегустаційна оцінка, балів: свіжих плодів 5,0; транспортабельність 4,5 балів.

Ріпа

® 06130003 Богема

Заявник: Приватне підприємство "Агросвіт"

Власник(и): Агрофірма "Наско"
Приватне підприємство "Агросвіт"
Приватне підприємство науково- дослідна селекційна станція " Наско"

Підтримувач(і):

Тип листка часточковий, середня хвилястість і зубчастість краю. Коренеплід характеризується такими показниками: червонувато-пурпуровий колір шкірки над грунтом, білий колір м`якоті, округла форма у поздовжньому розрізі, опукла форма верхньої частини, форма основи тупа.

Товарний урожай - 25-30 ц/га; урожай ранньої продукції - 23-28; середня маса коренеплоду - 150-200 г; дегустаційна оцінка - 4,7 бала; днів до достигання - 75-80.

Редиска

06038001 Арсенал

Заявник: Приватне підприємство "Агросвіт"

Власник(и):

Підтримувач(і):

Листкова розетка: за шириною зростання при основі широка. Положення листка у просторі напівпряме, короткий, обернено-яйцеподібної форми із жовтуватим відтінком. Опушення слабке. Черешок з антоціановим забарвленням, Коренеплід обернено-вузько-трикутної форми, рожевого кольору. Товщина кори середня. Забарвлення м'якоті напівпрозоре біле. Час достигання середній.

Товарна урожайність 45,0 т/га, вихід стиглих товарних плодів 93%.Дегустаційна оцінка 8,8 балів. Середня маса плоду 35 г. Днів до достигання 30.

06038006 Герда

Заявник: Приватне підприємство "Агросвіт"

Власник(и):

Підтримувач(і):

Листкова розетка: за шириною зростання при основі середня. Положення листка у просторі пряме, середньої довжини, обернено-яйцеподібної форми із жовтуватим відтінком. Опушення помірне. Черешок з сильним антоціановим забарвленням, Коренеплід форми льодяної бурульки, червоного кольору. Товщина кори середня. Забарвлення м'якоті напівпрозоре біле. Час достигання раній. Здатність до утворення дупла слабка.

Товарна урожайність 35,0 т/га, вихід стиглих товарних плодів 93%. Дегустаційна оцінка 8,9 балів. Середня маса плоду 25 г. Днів до достигання 30.

06038008 Джолі

Заявник: Клоз Тезьє

Власник(и):

Підтримувач(і):

Листкова розетка: за шириною зростання при основі середня. Положення листка у просторі напівпряме, короткий, вузько-обернено-яйцевидної форми із жовтуватим відтінком. Опушення помірне. Черешок з помірним антоціановим забарвленням. Коренеплід округлої форми, червоного кольору. Товщина кори середня. Забарвлення м'якоті напівпрозоре біле. Час достигання пізній. Здатність до утворення дупла середня.

Товарна урожайність 17,5 т/га, вихід стиглих товарних плодів 98%. Дегустаційна оцінка 9,0 балів. Середня маса плоду 21 г. Днів до достигання 20.

06038005 Карбона

Заявник: Приватне підприємство "Агросвіт"

Власник(и):

Підтримувач(і):

Листкова розетка: за шириною зростання при основі широка. Положення листка у просторі пряме, довгий, широко-обернено-яйцеподібної форми із жовтуватим відтінком. Опушення помірне. Черешок з помірним антоціановим забарвленням, Коренеплід обернено-яйцевидної форми, червоного кольору. Товщина кори середня. Забарвлення м'якоті матове біле. Час достигання середній. Здатність до утворення дупла відсутня або дуже слабка.

Товарна урожайність 50,0 т/га, вихід стиглих товарних плодів 92%. Дегустаційна оцінка 8,8 балів. Середня маса плоду 25 г. Днів до достигання 30.

06038007 Краковянка

Заявник: Краковська Ходовля і Насінництво Огородніче "Полан" Сп. з о.о.

Власник(и):

Підтримувач(і):

Листкова розетка: за шириною зростання при основі середня. Положення листка у просторі напівпряме, короткий, вузько-обернено-яйцеподібної форми із жовтуватим відтінком. Опушення слабке. Черешок з слабким антоціановим забарвленням. Коренеплід округлої форми, червоного кольору. Товщина кори середня. Забарвлення м'якоті матове біле. Час достигання ранній. Здатність до утворення дупла середня.

Товарна урожайність 85 ц/га, вихід стиглих товарних плодів 80%. Дегустаційна оцінка 9,0 балів. Середня маса плоду 25 г. Днів до достигання 30.

06038009 Кларія

Заявник: Сатімекс Кведлінбург

Власник(и):

Підтримувач(і):

Листкова розетка: за шириною зростання при основі середня. Положення листка у просторі напівпряме, середньої довжини, обернено-яйцеподібної форми із жовтуватим відтінком. Опушення помірне. Черешок з помірним антоціановим забарвленням. Коренеплід широко-прямокутної форми, яскраво-червоного кольору. Товщина кори середня. Забарвлення м'якоті матове біле. Час достигання середній. Здатність до утворення дупла відсутня або дуже слабка.

Товарна урожайність 20 т/га, вихід стиглих товарних плодів 95%. Дегустаційна оцінка 9,0 балів. Середня маса плоду 24 г. Днів до достигання 23.

06038004 Лінда

Заявник: Приватне підприємство "Агросвіт"

Власник(и):

Підтримувач(і):

Листкова розетка: за шириною зростання при основі широка. Положення листка у просторі пряме, середньої довжини, обернено-яйцеподібної форми із жовтуватим відтінком. Опушення помірне. Черешок з слабким антоціановим забарвленням, Коренеплід округлої форми, червоного кольору. Товщина кори середня. Забарвлення м'якоті матове біле. Час достигання середній. Здатність до утворення дупла відсутня або дуже слабка.

Товарна урожайність 50,0 т/га, вихід стиглих товарних плодів 91%. Дегустаційна оцінка 8,7 балів. Середня маса плоду 28 г. Днів до достигання 30.

05038003 Марта

Заявник: **Приватне підприємство "Агросвіт"**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Листкова розетка: за шириною зростання при основі середня. Положення листка у просторі напівпряме, середньої довжини, вузько-обернено-яйцеподібної форми из жовтуватим відтінком. Опушення помірне. Черешок з антоціановим забарвленням, Коренеплід обернено-яйцеподібної форми, червоного кольору. Товщина кори середня. Забарвлення м'якоті матове біле. Час достигання середній. Здатність до утворення дупла відсутня або дуже слабка.

Товарна урожайність 30 т/га, вихід стиглих товарних плодів 90%.Дегустаційна оцінка 8,7 балів. Середня маса плоду 20-25 г. Днів до достигання 30.

06038003 Опус

Заявник: **Приватне підприємство "Агросвіт"**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Листкова розетка: за шириною зростання при основі широка. Положення листка у просторі пряме, середньої довжини, обернено-яйцеподібної форми із сіруватим відтінком. Опушення помірне. Черешок з слабким антоціановим забарвленням, Коренеплід округлої форми, червоного кольору. Товщина кори середня. Забарвлення м'якоті матове біле. Час достигання ранній. Здатність до утворення дупла відсутня або дуже слабка.

Товарна урожайність 50,0 т/га, вихід стиглих товарних плодів 90%. Дегустаційна оцінка 8,5 балів. Середня маса плоду 30 г. Днів до достигання 30.

06038002 Пікнік

Заявник: **Приватне підприємство "Агросвіт"**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Листкова розетка: за шириною зростання при основі вузька. Положення листка у просторі пряме, короткий, обернено-яйцеподібної форми із жовтуватим відтінком. Опушення слабке. Черешок з антоціановим забарвленням, Коренеплід прямокутної форми, червоного кольору. Товщина кори тонка. Забарвлення м'якоті напівпрозоре біле. Час достигання середній. Здатність до утворення дупла відсутня або дуже слабка.

Товарна урожайність 50,0 т/га, вихід стиглих товарних плодів 93%.Дегустаційна оцінка 8,6 балів. Середня маса плоду 35 г. Днів до достигання 30.

05038005 Червоний гігант

Заявник: **Товариство з обмеженою відповідальністю "Селма"**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Листкова розетка: за шириною зростання при основі середня. Положення листка у просторі напівпряме, середньої довжини, обернено-яйцеподібної форми із жовтуватим відтінком. Опушення помірне. Черешок з помірним антоціановим забарвленням. Коренеплід округлої форми, червоного кольору. Товщина кори середня. Забарвлення м'якоті матове біле. Час достигання середній. Здатність до утворення дупла відсутня або дуже слабка.

Товарна урожайність 38 т/га, вихід стиглих товарних плодів 95%. Дегустаційна оцінка 8,8

Салат головчастий

06165001 Мажор

Заявник: **Приватне підприємство "Агросвіт"**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Насіння чорне. Рослина середня за діаметром, головка відкрита. Зовнішні листки зеленого кольору. Лицевий профіль зовнішніх листків плескатий. На листках наявна помірна пухирчастість, слабка хвилястість краю. Квітуча рослина середня за висотою. Час збиральної стиглості ранній.

Товарний урожай 300-400 ц/га; урожай ранньої продукції 250-350 ц/га; середня маса плоду 300-450 г; оцінка сорту 4,8; процент стрілкуючих (квітучих) 0,1; дегустаційна оцінка 4,9 балів; днів до достигання - 75-90; лежкість 4,8 %.

06165003 Марина

Заявник: **Краковська Ходовля і Насінництво Огродніче "Полан" Сп. з о.о.**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Насіння чорне. Рослина велика за діаметром, головка закрита. Зовнішні листки сірувато-зеленого кольору. Антоціанове забарвлення на листках наявне. Лицевий профіль зовнішніх листків плескатий. На листках наявна помірна пухирчастість, слабка хвилястість краю. Квітуча рослина середня за висотою. Час збиральної стиглості середній.

Товарний урожай 550 ц/га; середня маса плоду 500 г; оцінка сорту 5; дегустаційна оцінка 5 балів; днів до достигання - 65; лежкість 98 %; несправжня борошниста роса 2 %.

06165002 Піжон

Заявник: **Приватне підприємство "Агросвіт"**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Насіння чорне. Рослина велика за діаметром, головка відкрита. Зовнішні листки червонуватого кольору. Антоціанове забарвлення на листках наявне. Лицевий профіль зовнішніх листків плескатий. На листках наявна сильна пухирчастість, слабка хвилястість краю. Квітуча рослина середня за висотою. Час збиральної стиглості ранній.

Товарний урожай 300-400 ц/га; урожай ранньої продукції 250-350 ц/га; середня маса плоду 300-500 г; оцінка сорту 4,8; процент стрілкуючих (квітучих) 0,1; дегустаційна оцінка 4,9 балів; днів до достигання - 40-50; лежкість 4,8 %.

06165005 Стоік

Заявник: **Товариство з обмеженою відповідальністю "Селма"**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Рослина велика за діаметром, головка закрита. Листки обернено-широкоеліптичні за формою. На листках наявна слабка пухирчастість, слабка хвилястість краю. Квітуча рослина середня за висотою. Пазушне гілкування відсутнє або дуже слабке.

Товарний урожай 390 ц/га; урожай ранньої продукції 270 ц/га; середня маса плоду 370 г; оцінка сорту 4,5; процент стрілкуючих (квітучих) 0,1; дегустаційна оцінка 4,7 балів; днів до достигання - 60; лежкість 97 %; несправжня борошниста роса 0,2%.

05165001 Сенатор

Заявник: **Товариство з обмеженою відповідальністю" Свитязь"**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Насіння біле. Рослина велика за діаметром, головка закрита. Зовнішні листки зеленого кольору. Антоціанове забарвлення на листках відсутнє. Лицевий профіль зовнішніх листків увігнутий. На листках наявна помірна пухирчастість, помірна хвилястість краю. Квітуча рослина середня за висотою. Час збиральної стиглості ранній.

Товарний урожай 400 ц/га; урожай ранньої продукції 350 ц/га; середня маса плоду 350 г; оцінка сорту 9; процент стрілкуючих (квітучих) 1; дегустаційна оцінка 5 балів; днів до достигання - 35; лежкість 9 %.

06165004 Цуд Воорбургу

Заявник: **Краковська Ходовля і Насінництво Огродніче "Полан" Сп. з о.о.**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Насіння чорне. Рослина середня за діаметром, головка закрита. Зовнішні листки жовтуватого кольору. Антоціанове забарвлення на листках відсутнє. Лицевий профіль зовнішніх листків увігнутий. На листках наявна сильна пухирчастість, помірна хвилястість краю. Квітуча рослина низька. Час збиральної стиглості середній.

Товарний урожай 500 ц/га; середня маса плоду 200 г; оцінка сорту 5; дегустаційна оцінка 5 балів; днів до достигання - 70; лежкість 98 %; несправжня борошниста роса 2 %.

Салат латук

05291012 Грін Корал

Заявник: **Товариство з обмеженою відповідальністю" Свитязь"**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Насіння біле. Рослина середня за діаметром, головку не утворює. Зовнішні листки зеленого кольору. Лицевий профіль зовнішніх листків плескатий. На листках відсутня або дуже слабка пухирчастість і хвилястість краю. Квітуча рослина середня за висотою. Час збиральної стиглості середній.

Товарний урожай 27 ц/га; урожай ранньої продукції 22 ц/га; оцінка сорту 7 балів; днів до достигання - 60; несправжня борошниста роса 1 %.

05291005 Заграва

Заявник: **Товариство з обмеженою відповідальністю "Селма"**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Насіння біле. Рослина середня за діаметром, головку не утворює. Зовнішні листки червонуватого кольору. Антоціанове забарвлення на листках наявне. Лицевий профіль зовнішніх листків опуклий. На листках наявна помірна пухирчастість, дуже сильна хвилястість краю. Квітуча рослина середня за висотою. Час збиральної стиглості ранній.

Товарний урожай 220-250 ц/га; урожай ранньої продукції 120-135 ц/га; середня маса плоду 230-320 г; оцінка сорту 4,9-5,0; процент стрілкуючих (квітучих) 0,15; дегустаційна оцінка 4,7-4,9 балів; днів до достигання - 45-52; лежкість 97-98 %; несправжня борошниста роса 0,2%.

05291002 Ліка

Заявник: **Товариство з обмеженою відповідальністю "Селма"**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Насіння біле. Рослина велика за діаметром, головку не утворює. Зовнішні листки жовтуватого кольору. Антоціанове забарвлення на листках відсутнє. Лицевий профіль зовнішніх листків опуклий. На листках наявна слабка пухирчастість, дуже сильна хвилястість краю. Квітуча рослина середня за висотою. Час збиральної стиглості ранній.

Товарний урожай 220-250 ц/га; урожай ранньої продукції 150-170 ц/га; середня маса плоду 250-300 г; оцінка сорту 4,9-5,0; процент стрілкуючих (квітучих) 0,2; дегустаційна оцінка 4,7-4,8 балів; днів до достигання - 45-50; лежкість 97-98 %; несправжня борошниста роса 0,3%.

05291004 Оксамит

Заявник: **Товариство з обмеженою відповідальністю "Селма"**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Насіння біле. Рослина середня за діаметром, головку не утворює. Зовнішні листки зеленого кольору. Антоціанове забарвлення на листках відсутнє. Лицевий профіль зовнішніх листків опуклий. На листках наявна слабка пухирчастість, помірна хвилястість краю. Квітуча рослина висока. Час збиральної стиглості середній.

Товарний урожай 230-245 ц/га; урожай ранньої продукції 125-130 ц/га; середня маса плоду 240-320 г; оцінка сорту 4,9-5,0; процент стрілкуючих (квітучих) 0,1; дегустаційна оцінка 4,7-4,9 балів; днів до достигання - 47-55; лежкість 97-98 %; несправжня борошниста роса 0,25%.

05291001 Рішельє

Заявник: **Товариство з обмеженою відповідальністю "Селма"**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Насіння коричневе. Рослина велика за діаметром, головку не утворює. Зовнішні листки жовтуватого кольору. Антоціанове забарвлення на листках відсутнє. Лицевий профіль зовнішніх листків опуклий. На листках наявна слабка пухирчастість, дуже сильна хвилястість краю. Квітуча рослина середня за висотою. Час збиральної стиглості ранній.

Товарний урожай 225-250 ц/га; урожай ранньої продукції 130-140 ц/га; середня маса плоду 80-130 г; оцінка сорту 4,9-5,0; процент стрілкуючих (квітучих) 0,15; дегустаційна оцінка 4,7-4,9 балів; днів до достигання - 40-43; лежкість 97-98 %; несправжня борошниста роса 0,2%.

05291013 Ред Корал

Заявник: **Товариство з обмеженою відповідальністю" Свитязь"**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Насіння біле. Рослина середня за діаметром, головку не утворює. Зовнішні листки червонуватого кольору. Лицевий профіль зовнішніх листків плескатий. На листках відсутня або дуже слабка пухирчастість і хвилястість краю. Квітуча рослина середня за висотою. Час збиральної стиглості середній.

Товарний урожай 25 ц/га; урожай ранньої продукції 20 ц/га; оцінка сорту 7 балів; процент стрілкуючих (квітучих) 0; днів до достигання - 60; несправжня борошниста роса 0%.

05291003 Червоний змій

Заявник: **Товариство з обмеженою відповідальністю "Селма"**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Насіння коричневе. Рослина маленька за діаметром, головку не утворює. Зовнішні листки червонуватого кольору. Антоціанове забарвлення на листках наявне. Лицевий профіль зовнішніх листків опуклий. На листках наявна помірна пухирчастість, сильна хвилястість краю. Квітуча рослина низька. Час збиральної стиглості ранній.

Товарний урожай 235-260 ц/га; урожай ранньої продукції 130-135 ц/га; середня маса плоду 70-120 г; оцінка сорту 4,9-5,0; процент стрілкуючих (квітучих) 0,15; дегустаційна оцінка 4,7-4,9 балів; днів до достигання - 40-45; лежкість 97-98 %; несправжня борошниста роса 0,2%.

Селера листкова

06167002 Блискавка

Заявник: **Товариство з обмеженою відповідальністю "Селма"**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Рослина висока. Кількість листків велика. На листках наявна сильна глянсуватість, пухирчастість слабка. Черешок короткий, вузький, ребристість відсутня або дуже слабка.

Товарний урожай - 450-520 ц/га; процент стрілкуючих (квітучих) - 0,1-0,3; дегустаційна оцінка - 4,9 бала; днів до достигання - 135-145; лежкість - 97-98%; борошниста роса - 0,2-0,4%; гниль біла - 0,1%.

Тиква звичайна

06401001 Луцертола

Заявник: **Товариство з обмеженою відповідальністю "Селма"**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Габітус рослини плетистий, наявне галуження. Стебло зелене, добре розвинені вусики. Молодий плід характеризується такими показниками: довгий, малий діаметр, два кольори білуватий і зелений, наявна слабка тільки дифузна крапчастість, циліндрична форма. Стиглому плоду притаманні: кремовий колір, білуваті смужки на ребрах, шипи відсутні, основний колір кори оранжевий, вторинний колір кори зелений. М`якуш плоду середній за розміром, забарвлення кремове.

Товарна урожайність - 55-100 ц/га; середня маса плоду - 4800 г; днів до достигання - 95-100; ураженість хворобами, %: плямистість бактеріальна - 1,5, фузаріоз - 1,5; дегустаційна оцінка - 4,9 бала; транспортабельність - 78 %.

Холодок лікарський

06169001 Сріблясta

Заявник: **Товариство з обмеженою відповідальністю "Селма"**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Рослина має середню кількість стебел (в кінці вегетації рослин, які не збирають). Стебло довге. Наявне антоціанове забарвлення верхівки пагону. Форма верхівки пагону вузько-трикутна. Час початку цвітіння ранній.

Товарний урожай - 60-72 ц/га; урожай ранньої продукції - 35-40 ц/га; середня маса плоду - 50-65 г; дегустаційна оцінка - 4,8 бала.

Цибуля батун

06174002 Рапіра

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Селма"

Власник(и):

Підтримувач(і):

Однопсевдостебловий тип росту. Рослина висока. Положення листка пряме, наявний сильний восковий наліт. Псевдостебло довге, антоціанове забарвлення відсутнє. Схильність до стрілкування у рослини слабка.

Загальна урожайність 30-35 т/га; товарна урожайність 27-32 т/га; вегетаційний період 115-120 днів; лежкість 75 %; ураженість хворобами та пошкодження шкідниками, %: несправжньою борошнистою росою 2-2,2, гнилями 0,2-0,3, цибулевою мухою 0,1-0,15; вміст сухої речовини в плоді 6,6-6,9%; вміст загального цукру 5,1-5,3 %; вміст вітаміну С 8-8,5 мг%; транспортабельність 4,7-4,9 бала.

Цибуля городня

05041020 Саброссо F1

Заявник: Нюнемс Б.В.

Власник(и):

Підтримувач(і):

У рослини помірна кількість листків на псевдостеблі. Положення листя пряме, восковий наліт дуже сильний. Листок довгий. Цибулина середнього розміру, середньої висоти, округлої форми. Міцність тримання сухої шкірки після збирання помірна. Суха шкірка тонка, коричневого кольору. Забарвлення соковитих лусок відсутнє. Дуже мало зачатків. Початок проростання цибулини протягом зберігання пізній. Низька чоловіча стерильність рослини.

Загальна врожайність – 90,0 т/га, маса товарної цибулини 200 г, вегетаційний період 125 днів. Лежкість - 98%. Вміст вітаміну С, мг% - 10,0. Вміст сухої речовини в плоді, % - 12,0. Вміст загального цукру, % - 9,0.

07041006 Сібір (BGS 204)

Заявник: Бейо Заден Б.В.

Власник(и):

Підтримувач(і):

У рослини помірна кількість листків на псевдостеблі. Положення листя напівпряме, помірний восковий наліт. Листок середній за довжиною, великий - за диаметром. Цибулина мала за розміром, округлоїформи, злегка опукла, сильна міцність тримання сухої шкірки після збирання. Суха шкірка середня за товщиною, жовтого кольору. Соковиті луски зеленуватого забарвлення. Дуже мало зачатків. Початок збиральної стиглості за сівби восени і весняного висіву - ранні.Початок проростання цибулини протягом зберігання пізній. Низька чоловіча стерильність рослини.

Загальна урожайність - 3,5 кг/м2, вегетаційний період 110 днів. Вміст вітаміну С, мг% - 7,2. Вміст сухої речовини в плоді, % - 18. Вміст загального цукру, % - 12. Пошкодження шкідниками, %: цибулевою мухою - 1. Ураженість хворобами, %: гнилями - 3

07041005 Дербі F1

Заявник: Бейо Заден Б.В.

Власник(и):

Підтримувач(і):

У рослини мала кількість листків на псевдостеблі. Положення листя пряме, слабкий восковий наліт. Листок довгий. Цибулина середня за розміром, низька, округлоїформи, злегка опукла, слабка міцність тримання сухої шкірки після збирання. Суха шкірка тонка, коричневого кольору. Соковиті луски зеленуватого забарвлення. Дуже мало зачатків. Початок проростання цибулини протягом зберігання пізній. Низька чоловіча стерильність рослини.

Загальна урожайність - 6,0 кг/м2, вегетаційний період 93 дні. Вміст вітаміну С, мг% - 7,1. Вміст сухої речовини в плоді, % - 10,5. Вміст загального цукру, % - 11,5. Пошкодження шкідниками, %: цибулевою мухою - 1. Ураженість хворобами, %: гнилями - 3

04041001 Краса F1

Заявник: **Приватне мале підприємство " Тирас"**

Власник(и):

Підтримувач(і):

У рослини мала кількість листків на псевдостеблі. Положення листя напівпряме, помірний восковий наліт. Листок короткий. Цибулина середня за розміром, середньої висоти, округлої форми. Міцність тримання сухої шкірки після збирання помірна. Суха шкірка тонка, жовтого кольору. Соковиті луски зеленуватого забарвлення. Дуже мало зачатків. Початок проростання цибулини протягом зберігання пізній. Низька чоловіча стерильність рослини.

Загальна врожайність – 35,0 т/га, вегетаційний період 105 дні. Вміст вітаміну С, мг% - 10,6. Вміст сухої речовини в плоді, % - 11,5. Вміст загального цукру, % - 7,5.

07041008 Леоне

Заявник: **Бейо Заден Б.В.**

Власник(и):

Підтримувач(і):

У рослини мала кількість листків на псевдостеблі. Положення листя пряме, помірний восковий наліт. Листок довгий, середній - за диаметром. Цибулина середня за розміром, широкояйцевидної форми, злегка опукла, сильна міцність тримання сухої шкірки після збирання. Суха шкірка середня за товщиною, коричневого кольору. Соковиті луски зеленуватого забарвлення. Мала кількість зачатків. Початок збиральної стиглості за сівби восени і весняного висіву - середні. Початок проростання цибулини протягом зберігання пізній. Низька чоловіча стерильність рослини.

Загальна урожайність - 3,0 кг/м2, вегетаційний період 150 днв. Вміст вітаміну С, мг% - 7,8. Вміст сухої речовини в плоді, % - 20. Вміст загального цукру, % - 10. Пошкодження шкідниками, %: цибулевою мухою - 1. Ураженість хворобами, %: гнилями - 3

05041022 Моноліт 4

Заявник: **Товариство з обмеженою відповідальністю "Селма"**

Власник(и):

Підтримувач(і):

У рослини велика кількість листків на псевдостеблі. Положення листя пряме, восковий наліт помірний. Листок середньої довжини. Цибулина середнього розміру, середньої висоти, поперечноеліптичної форми. Міцність тримання сухої шкірки після збирання слабка. Суха шкірка тонка, жовтого кольору. Забарвлення соковитих лусок відсутнє. Мало зачатків. Початок проростання цибулини протягом зберігання пізній. Низька чоловіча стерильність рослини.

Загальна врожайність – 60,0 т/га, маса товарної цибулини 130 г, вегетаційний період 120 днів. Лежкість - 95%. Вміст вітаміну С, мг% - 7,0. Вміст сухої речовини в плоді, % - 12,3. Вміст загального цукру, % - 8,3.

05041023 Позолочений Глобус

Заявник: **Товариство з обмеженою відповідальністю "Селма"**

Власник(и):

Підтримувач(і):

У рослини помірна кількість листків на псевдостеблі. Положення листя пряме, восковий наліт помірний. Листок середньої довжини. Цибулина середнього розміру, висока, округлої форми. Міцність тримання сухої шкірки після збирання сильна. Суха шкірка товста, жовтого кольору. Забарвлення соковитих зеленувате. Дуже мало зачатків. Початок проростання цибулини протягом зберігання пізній. Низька чоловіча стерильність рослини.

Загальна врожайність – 85,0 т/га, маса товарної цибулини 95-150 г, вегетаційний період 130 днів. Лежкість - 95%. Вміст вітаміну С, мг% - 9,5. Вміст сухої речовини в плоді, % - 12,5. Вміст загального цукру, % - 8,4.

06041004 Робот (Райнсбургер 5)

Заявник: **Нікерсон- Цваан Б.В.**

Власник(и):

Підтримувач(і):

У рослини помірна кількість листків на псевдостеблі. Положення листя напівпряме, восковий наліт сильний. Листок середньої довжини. Цибулина середнього розміру, середньої висоти, поперечновузькоеліптичної форми. Міцність тримання сухої шкірки після збирання слабка. Суха шкірка середньої товщини, білого кольору. Забарвлення соковитих лусок відсутнє. Середня кількість зачатків. Початок проростання цибулини протягом зберігання пізній. Низька чоловіча стерильність рослини.

Загальна врожайність – 60,0 т/га, маса товарної цибулини 150 г, вегетаційний період 135 днів. Лежкість - 98%. Вміст вітаміну С, мг% - 9,5. Вміст сухої речовини в плоді, % - 12,0. Вміст загального цукру, % - 8,2.

07041007 Ред Булл F1

Заявник: **Бейо Заден Б.В.**

Власник(и):

Підтримувач(і):

У рослини велика кількість листків на псевдостеблі. Положення листя від прямого до напівпрямого, помірний восковий наліт. Листок довгий, великий - за диаметром. Цибулина велика за розміром, плескатої форми, помірна міцність тримання сухої шкірки після збирання. Суха шкірка середня за товщиною, червоного кольору. Соковиті луски червонуватого забарвлення. Дуже мало зачатків. Початок збиральної стиглості за сівби восени і весняного висіву - ранні.Початок проростання цибулини протягом зберігання середній. Низька чоловіча стерильність рослини.

Загальна урожайність - 5,0 кг/м2, вегетаційний період 120 днів. Вміст вітаміну С, мг% - 7,2. Вміст сухої речовини в плоді, % - 18. Вміст загального цукру, % - 12. Пошкодження шкідниками, %: цибулевою мухою - 1. Ураженість хворобами, %: гнилями - 3

05041024 Серпнева

Заявник: **Товариство з обмеженою відповідальністю "Селма"**

Власник(и):

Підтримувач(і):

У рослини велика кількість листків на псевдостеблі. Положення листя напівпряме, восковий наліт відсутній. Листок середньої довжини. Цибулина середнього розміру, середньої висоти, округлої форми. Міцність тримання сухої шкірки після збирання слабка. Суха шкірка тонка, білого кольору. Забарвлення соковитих лусок відсутнє. Дуже мало зачатків. Початок проростання цибулини протягом зберігання пізній. Низька чоловіча стерильність рослини.

Загальна врожайність – 90,0 т/га, маса товарної цибулини 115-250 г, вегетаційний період 130 днів. Лежкість - 95%. Вміст вітаміну С, мг% - 7,5. Вміст сухої речовини в плоді, % - 11,4. Вміст загального цукру, % - 8,2.

05041009 Форум

Заявник: **Приватне підприємство "Агросвіт"**

Власник(и):

Підтримувач(і):

У рослини велика кількість листків на псевдостеблі. Положення листя напівпряме, помірний восковий наліт. Листок середньої довжини. Цибулина середня за розміром, висока, округлої форми. Міцність тримання сухої шкірки після збирання помірна. Суха шкірка тонка, золотистого кольору. Соковиті луски зеленуватого забарвлення. Дуже мало зачатків. Початок проростання цибулини протягом зберігання пізній. Низька чоловіча стерильність рослини.

Загальна врожайність – 80,0 т/га, маса товарної цибулини 85-135 г, вегетаційний період 120 днів. Лежкість - 95%. Вміст вітаміну С, мг% - 11,2. Вміст сухої речовини в плоді, % - 12,5. Вміст загального цукру, % - 7,5.

05041025 Червоний Глобус

Заявник: **Товариство з обмеженою відповідальністю "Селма"**

Власник(и):

Підтримувач(і):

У рослини велика кількість листків на псевдостеблі. Положення листя напівпряме, восковий наліт відсутній. Листок середньої довжини. Цибулина великого розміру, висока, широкооберненояйцевидної форми. Міцність тримання сухої шкірки після збирання помірна. Суха шкірка середньої товщини, червоного кольору. Забарвлення соковитих лусок червонувате. Середня кількість зачатків. Початок проростання цибулини протягом зберігання пізній. Низька чоловіча стерильність рослини.

Загальна врожайність – 68,0-81,0 т/га, маса товарної цибулини 98-120 г, вегетаційний період 130 днів. Лежкість - 95%. Вміст вітаміну С, мг% - 9,5. Вміст сухої речовини в плоді, % - 12,0. Вміст загального цукру, % - 8,2.

05041040 Штутті

Заявник: **Товариство з обмеженою відповідальністю" Свитязь"**

Власник(и):

Підтримувач(і):

У рослини помірна кількість листків на псевдостеблі. Положення листя пряме, восковий наліт сильний. Листок середньої довжини. Цибулина середньо розміру, низька, поперечноеліптичної форми. Міцність тримання сухої шкірки після збирання помірна. Суха шкірка середньої товщини, жовтого кольору. Забарвлення соковитих лусок зеленувате. Мала кількість зачатків. Початок проростання цибулини протягом зберігання пізній. Низька чоловіча стерильність рослини.

Загальна врожайність – 30,0 т/га, маса товарної цибулини 100 г, вегетаційний період 120 днів. Вміст сухої речовини в плоді, % - 11,0.

06041002 Яліско F1

Заявник: **Нікерсон- Цваан Б.В.**

Власник(и):

Підтримувач(і):

У рослини помірна кількість листків на псевдостеблі. Положення листя пряме, восковий наліт помірний. Листок середньої довжини. Цибулина середнього розміру, середньої висоти, поперечновузькоеліптичної форми. Міцність тримання сухої шкірки після збирання помірна. Суха шкірка середньої товщини, жовтого кольору. Забарвлення соковитих лусок зеленувате. Дуже мала кількість зачатків. Початок проростання цибулини протягом зберігання пізній. Низька чоловіча стерильність рослини.

Загальна врожайність – 70,0 т/га, маса товарної цибулини 150 г, вегетаційний період 115 днів. Лежкість - 98%. Товарність - 9 балів.

Шпинат

06179001 Велетень

Заявник: **Товариство з обмеженою відповідальністю "Селма"**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Листкова пластинка має тупу форму верхівки, форма у поздовжньому розрізі опукла. У квітучих рослин мала частка однодомних рослин, середня кількість рослин з жіночими і чоловічими квітками.

Товарний урожай 420-455 ц/га; урожай ранньої продукції 250-350 ц/га; середня маса рослини 270-370 г; процент стрілкуючих 5-7; дегустаційна оцінка 4,6-4,8 балів; днів до достигання 45-50; лежкість 70-75 %.

Гарбуз мускусний

05429001 Полянин

Заявник: **Дніпропетровська дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Габітус рослини плетистий (тип довгоплетистий). Багато стебел. Стебло зелене, округло-гранчасте за формою, м`який тип опушення. Форма листкової пластинки нирковидна, наявна розсіченість, поверхня гладенька. Плід циліндричної форми, поверхня сегментована, колір кори коричневий, структура м`якуша щільна.

Група стиглості - середньостиглий; товарна урожайність 342 ц/га; урожайність ранньої продукції 300 ц/га; середня маса плоду 4100 г; період від повних сходів до початку дозрівання 128 днів; вміст сухої речовини в плоді 8,5 %; дегустаційна оцінка, балів: 4,6; транспортабельність 97 %.

Артишок посівний

06460001 Регбі

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Селма"

Власник(и):

Підтримувач(і):

Рослина середня за висотою. Листок прямий за положенням, короткий, наявний довгий шип, розсіченість краю відсутня. Центральний кошик довгий, короткий за діаметром, маленького розміру, широко-еліптичної форми у поперечному перерізі. Квітколоже велике за діаметром, форма поперечного перерізу ледь увігнута.

Товарний урожай 70-120 ц/га; урожай ранньої продукції 55-100 ц/га; дегустаційна оцінка 4,8 балів; днів до достигання 140-151; борошниста роса 0,1-0,2%; гниль біла 1-2%.

Селера коренеплідна

07474001 Ілона

Заявник: Бейо Заден Б.В.

Власник(и):

Підтримувач(і):

Рослина середньої висоти. Положення листка у просторі горизонтальне. Листок і черешок середнього розміру. Антоціанове забарвлення черешка відсутнє. У листочка гостра форма краю верхівки, помірна щільність надрізів краю. У коренеплоді помірні виступи на поверхні, білуватий колір шкірки, округла форма. Забарвлення м`якуша біле.

Висота рослин 60 см. Вміст білка, % - 1,5. Вміст клітковини, %-1,9. Днів від висіву до збиральної стиглості - 141. Збір сухої речовини в середньому за рік використання, кг/м2 - 1,5. Зимостійкість, балів - 9. Посухостійкість, балів - 7. Стійкість до вилягання, балів - 8. Стійкість до обсипання, балів - 9. Ураженість хворобами: Сажкою, % - 7. Ураженість хворобами: Антракнозом, % - 6. Ураженість хворобами: Аскохітозом, % - 6. Ураженість хворобами: Борошнистою росою, % - 7. Ураженість хворобами: Бурою іржею, % - 6. Ураженість хворобами: Снігова пліснява, % - 8. Ураженість хворобами: Стебловою іржею, % - 7.

Сільськогосподарські: інші

Кмин

06156001 Надійний

Заявник: Хмельницька державна сільськогосподарська дослідна станція Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

*Насіння: колір - брунатний, сіянець: колір листя світло - зелений Рослина: форма куща - напіврозлога. Висота рослини середня. Кількість міжвузлів - середня; Стебло зелене з антоціановим забарвленням помірно гіллясте, неопушене, Листок зелений, середній по довжині і ширині, без опушення; Рослина: стеблування: середнє; Суцвіття - середнього діаметра, помірної щільності, з білими квітками; час початку цвітіння і достигання середні

Урожайність насіння - 14-16 ц/га, вміст ефірної олії 3,8-4,2 % вегетаційний період - 90-95 діб.; початок весняного відростання - III декада березня; Збір ефірної олії 53-67 кг/га, стійкий до хвороб, придатний до механізованого збирання, залистяність - 90 %

Лавандин

07188001 Рабат

Заявник: Державне підприємство дослідне господарство "Новокаховське" Нікітського ботанічного саду Української академії аграрних наук - Національного наукового центру

Власник(и):

Підтримувач(і):

Триплоїдний сорт. Рослина напіврозлога, середня по ширині і висоті, стебло без опушення, листок середній по довжині, широкий, сіро - зелений середньо- опушений; квітконос середній, кількість суцвіть і кількість мутовок в суцвітті - велика, суцвіття видовженоциліндричне, середнє за довжиною, коротке, з великою кількістю квіток у мутовці; забарвлення квіток - синьо-фіолетове, час цвітіння - середній.

Рослина висотою 85,7 см, урожайність надземної маси ц/га - 84,6, тривалість періоду вегетації - 150 -160 діб, кількість діб від початку відростання до початку квітування: 90-95, зимостійкість середня, вміст ефірної олії від абсолютно сухої маси % - 7,13, валовий збір ефірної олії, кг/га - 229,5

М'ята перцева

01189001 Лебедина пісня

Заявник: **Дослідна станція лікарських рослин Української академії аграрних наук**

Власник(и):

Підтримувач(і):

* Сходи без антоціанового забарвлення. Рослина висока, за габітусом компактна. Стебло сильно гіллясте, неопушене з помірною ребристістю. Листкова пластинка світло - зелена, середня по довжині і розміру, слабко опушена. Суцвіття -довге, з ліловими квітками середнього часу цвітіння. Вміст ефірної олії - високий. Кореневище середнє за товщиною з сильним розгалуженням.
*Дані заявника.

* Середньостиглий, довжина вегетаційного періоду - 93 доби, стійкий проти хвороб і шкідників. Урожайність надземної маси - 24,3 ц/га. Маса 1000 насінин - 0,53 г. Рослина заввишки 0,80 м. Збір ефірної олії - 97,2 кг/га. Вміст ефірної оліїі - 4,0%. У складі ефірної олії ментол сягає 59,7 %. Рекомендовано для зони Лісостепу України. *Дані заявника.

Полин лимонний

07196001 Каскад

Заявник: **Державне підприємство дослідне господарство "Новокаховське" Нікітського ботанічного саду Української академії аграрних наук - Національного наукового центру**

Власник(и):

Підтримувач(і):

* Сорт середньостиглий. Рослина середньої висоти компактна, гілок 1-го порядку утворює середню кількість. Стебло середнього діаметра. Листкова пластинка помірно-зеленого кольору, середня за довжиною і шириною із слабким опушенням. Суцвіття середньої довжини, волоті стиснутої форми. Пелюстки квітки сіро-зеленого забарвлення. Вміст ефірної олії середній.

Середня врожайність сирої надземної маси - 85,7 ц/га, маса 1000 насінин - 0,26 г. Збір ефірної олії - 43 кг/га. Вміст ефірної олії в абсолютно сухій масі - 1,5 %. Вегетаційний період - 260 діб. Висота рослин - 85,7 см. Зимостійкість висока, стійкий до несприятливих метеорологічних явищ. *Дані заявника.

Тютюн

06019001 Тернопільський перспективний

Заявник: Українська дослідна станція тютюнництва

Власник(и):

Підтримувач(і):

Рослина конічної форми, середня за висотою, зі світло - зеленим забарвленням головного стебла, з великою кількістю листків; з відсутньою або дуже слабкою схильністю до утворення бічних пагонів. Листки сидячі, довгі, широкі, з помірно гострим кутом відхилення від стебла, світло - зеленого кольору, яйцевидної форми з помірно загостреною верхівкою з слабкою пухирчастістю листкової пластинки; розвиток вушок помірний, із слабкою хвилястістю краю листка. Суцвіття кулястої форми, нещільне, розміщене вище верхніх листків. Квітки помірно рожевого забарвлення, трубки середнього діаметра з добре розвинутими тичинками, віночок середнього розміру, плід округлої форми.

За даними заявника: урожайність повітряно - сухих листків 28,4 ц/га, вихід першого товарного сорту 60%, кількість технічно придатних листків-28. вегетаційний період - 105 діб. Вміст нікотину - 1,15%, число Шмука - 0,60. Тип сировини скелетний з покращеними смаковими якостями (вміст вуглеводів 4,4%). Рекомендується як основа у сигареті.

Хміль

07021003 /Староволинський ароматичний/

Заявник: Приватна агрофірма "Західна насіннєва компанія"

Власник(и):

Підтримувач(і):

*Рослина високорослa, циліндричної форми. На стовбурі велика кількість пагонів.
"Шапку" утворює слабко. Бічні пагони розташовані в просторі від горизонтального до пониклого. У середній і верхній частині рослини пагони середні. Стебло округле, зі слабким антоціановим забарвленням. Міжвузля середньої довжини. Залистяність помірна. Листки зелені, середнього розміру, з помірною хвилястістю поверхні. Шишки кріпляться в середній частині стебла. В середній частині рослини їх багато; у верхній частині - дуже багато. Шишка середньої довжини, середня по ширині, яйцеподібновидовженої форми з помірною щільністю, зі щільними покривними листками, із середньою кількістю члеників зав язі, із зав яззю середньою по довжині. Покривний листок середній по довжині і ширині з помірним загостренням на кінці. Час цвітіння і технічної стиглості - середній.

*Урожайність повітряно сухих шишок 2,5 - 3 т/га. Тривалість вегетаційного періоду 120 діб. Висота рослини 7,5 м. Маса 100 сухих шишок 24 - 26 г. Зимостійкий, стійкий проти хвороб. Вміст, % на суху речовину: альфа-кислот - 6,8 - 9,2, коефіцієнт ароматичності - 25; здатність до переробки у хмелепрепарати, балів - 9; Напрям використання - пивоваріння. Рекомендована грунтово-кліматична зона - Лісостеп, Полісся.
* Дані заявника

М'ята довголиста

04430001 Діана

Заявник: **Прилуцька дослідна станція Інституту ефіроолійних та лікарських рослин Української академії аграрних наук**

Власник(и):

Підтримувач(і):

* Рослина в розсадному віці - без антоціанового забарвлення, середня по висоті, за габітусом компактна. Стебло дуже гіллясте, без опушення з помірною ребристістю. Листкова пластинка зелена, середня за розміром, довга по довжині без опушення. Суцвіття - довге по довжині, з ліловими квітками; час цвітіння - середній. Період від відростання до повного цвітіння - короткий. Вміст ефірної олії - середній. Кореневище середнє за товщиною із сильним розгалуженням .
*Дані заявника.

Рослина заввишки 108 см. Довжина вегетаційного періоду - 87 діб, тривалість цвітіння - 12 днів; стійкий проти хвороб і шкідників. Урожайність зеленої надземної маси - 240 ц/га. Збір ефірної олії - 61,2 кг/га. Вміст ефірної олії - 2,42%. Склад ефірної олії: карвон - 65,4 %.
*Дані заявника.

05430001 Оксамитова

Заявник: **Прилуцька дослідна станція Інституту ефіроолійних та лікарських рослин Української академії аграрних наук**

Власник(и):

Підтримувач(і):

* Рослина в розсадному віці - без антоціанового забарвлення, середня по висоті, за габітусом компактна. Стебло дуже гіллясте, з опушенням з помірною ребристістю. Листкова пластинка світло зелена, середня за розміром, довга по довжині з помірним опушенням. Суцвіття - довге по довжині, з ліловими квітками; час цвітіння - ранній. Період від відростання до повного цвітіння - короткий. Вміст ефірної олії - високий. Вміст ліналоолу - високий. Кореневище середнє за товщиною з сильним розгалуженням .
*Дані заявника.

Довжина вегетаційного періоду - 80 днів, стійкий до хвороб і шкідників. Урожайність зеленої надземної маси - 252 ц/га. Рослина заввишки 102 см. Збір ефірної олії 76,7 кг/га. Вміст ефірної олії - 2,61%. Склад ефірної олії: ліналоол - 82,0 % Рекомендовано для зони Лісостепу і Полісся України.
*Дані заявника.

03430001 Посульська ліналоольна

Заявник: **Дослідна станція лікарських рослин Української академії аграрних наук**

Власник(и):

Підтримувач(і):

* Рослина в розсадному віці - без антоціанового забарвлення, висока, за габітусом компактна. Стебло дуже гіллясте, опушене з помірною ребристістю. Листкова пластинка світло - зелена, середня за розміром, довга по довжині з помірним опушенням. Суцвіття - середнє за довжиною, з ліловими квітками середнього часу цвітіння. Вміст ефірної олії - середній. Кореневище середнє за товщиною з сильним розгалуженням .
*Дані заявника.

* Середньостиглий, довжина вегетаційного періоду - 93 дні, стійкий до хвороб і шкідників. Урожайність надземної маси - 27,9 ц/га. Рослина заввишки 0,80 м. Збір ефірної олії 82,0 кг/га. Вміст ефірної олії - 2,94%. Склад ефірної олії: ліналоол - 80,0 % Рекомендовано для зони Лісостепу України.

*Дані заявника.

Плодові та ягідні
Яблуня домашня

06086003 Білосніжка

Заявник: Кримська дослідна станція садівництва Інституту садівництва Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

* Міжсортова гібридизація Болеро х Ренет Симиренка.
Дерево помірної сили росту, з колоноподібною формою крони. Тип плодоношення – на коротких пагонах. Однорічний пагін помірно опушений у верхній половині. Міжвузля - дуже короткі. Квітка велика. Пелюстки доторкуються одна до одної. Листкова пластинка довга, широка. Краї - пилчасті. Плід від великого до дуже великого розміру, кулясто-плескатої форми, жовто-зеленого забарвлення, рум'янець відсутній. М'якоть помірно пружна, зеленувата. Насінні комірки цілком відкриті.

За даними заявника за схеми садіння (2,5 х 0,5) х 0,5/2 середня врожайність становить 800 ц/га. Середня маса плоду - 200 г, максимальна - 250 г. Сорт зимо- і посухостійкий - 7 балів. Стійкість проти парші і борошнистої роси - 8 балів. Група стиглості - ранньозимова.
Рекомендована грунтово-кліматична зона - Степ.
Напрям використання – десертний.
* Дані заявника.

97086008 Городищенське

Заявник: Інститут помології ім. Л.П. Симиренка Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Пламенне х Вагнера призове.
* Дерево помірної сили росту, з розлогою кроною. Тип плодоношення – на коротких пагонах. Однорічний пагін помірно опушений у верхній половині. Квітка середнього розміру. Пелюстки віночка доторкуються одна до одної. Листкова пластинка середнього розміру. Краї - рифлені. Плід від середнього до великого розміру, широко-кулясто-конічний, жовто-зелений. Рум'янець - помірно червоний, суцільний зі смугами. М'якоть тверда, кремова. Насінні комірки - закриті.

За даними заявника за схеми садіння 3,75 х 1 м середня врожайність становить 237 ц/га. Середня маса плоду - 182 г, максимальна - 305 г. Сорт зимостійкий - 9 балів, менш вимогливий до умов вирощування порівняно із сортом Вагнера призове, швидкоплідний. Напрям використання – столово-десертний. Група стиглості - зимова.
Рекомендовані грунтово-кліматичні зони - Степ, Лісостеп.
* Дані заявника.

92086020 Мліївчанка осіння

Заявник: Інститут помології ім. Л.П. Симиренка Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Новорічне х Мліївська красуня.
* Дерево помірної сили росту, з піднесеною формою крони. Тип плодоношення – на коротких пагонах. Однорічний пагін сильно опушений у верхній половині. Квітка велика. Пелюстки віночка не дотикаються. Листкова пластинка широка. Краї - рифлені. Черешок листка - довгий. Плід великий, кулясто-плескатий, жовто-зелений. Рум'янець - темно-червоний, суцільний зі смугами. М'якоть помірно пружна, біла. Насінні комірки - частково відкриті.

За даними заявника за схеми садіння 4 х 2 м середня врожайність становить 225 ц/га. Середня маса плоду - 240 г, максимальна - 310 г. Сорт рано вступає в плодоношення, зимо- і посухостійкий - 9 балів. Напрям використання – десертний. Група стиглості - пізньоосіння.
Рекомендована грунтово-кліматична зона - Лісостеп.
* Дані заявника.

06086005 Пламенне

Заявник: **Інститут помології ім. Л.П. Симиренка Української академії аграрних наук**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Пепінка литовська х Бісмарк.
* Дерево слаборосле із звислою кроною. Тип плодоношення – на коротких пагонах. Опушення однорічного пагона у верхній половині сильне. Квітка середнього розміру. Пелюстки віночка не дотикаються. Листкова пластинка середнього розміру. Краї - рифлені. Черешок листка середньої довжини. Плід середнього розміру, конічний, жовтий. Рум'янець - помірно червоний, суцільний зі смугами. М'якоть помірно пружна, біла. Насінні комірки - закриті.

За даними заявника за схеми садіння 4 х 2 м середня врожайність становить 225 ц/га. Середня маса плоду - 145 г, максимальна - 250 г. Сорт зимо- і посухостійкий, придатний для вирощування в інтенсивних насадженнях. Група стиглості - ранньозимова. Напрям використання – для споживання у свіжому вигляді і технічної переробки.
Рекомендовані грунтово-кліматичні зони - Степ, Лісостеп.
* Дані заявника.

06086006 Світанок Млієва

Заявник: **Інститут помології ім. Л.П. Симиренка Української академії аграрних наук**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Голден Делішес х Апорт зимовий.
* Дерево помірної сили росту з розлогою кроною. Тип плодоношення – на коротких пагонах. Однорічний пагін слабоопушений у верхній половині пагона. Квітка - велика. Пелюстки віночка - не дотикаються. Листкова пластинка середнього розміру. Краї - рифлені. Черешок листка - середньої довжини. Плід великий, кулясто-конічний, жовтий. Рум'янець - червоний, суцільний зі смугами. М'якоть помірно пружна, кремова. Насінні комірки - закриті.

За даними заявника за схеми садіння 3,75 х 1 м середня врожайність становить 318 ц/га. Середня маса плоду - 211 г, максимальна - 290 г. Сорт швидкоплідний, зимо- і посухостійкий. Група стиглості - зимова. Напрям використання – споживання у свіжому вигляді і технічна переробка.
Рекомендована грунтово-кліматична зона - Лісостеп.
* Дані заявника.

06086004 Фаворит

Заявник: Кримська дослідна станція садівництва Інституту садівництва Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

* Трайдент х Редфрі.
Дерево помірної сили росту з колоноподібною формою крони. Тип плодоношення – на коротких пагонах. Однорічний пагін сильно опушений у верхній половині. Квітка велика. Пелюстки віночка перекриваються. Листкова пластинка довга, краї - пилчасті. Черешок довгий. Плід великий, кулясто-конічний, жовто-зелений з пурпуровим розмитим рум'янцем. М'якоть помірно пружна, кремова. Насінні комірки частково відкриті.

За даними заявника за схеми садіння (2,5 х 0,5) х 0,5/2 середня врожайність становить 700 ц/га. Середня маса плоду - 160 г, максимальна - 190 г. Сорт зимо- і посухостійкий - 7 балів. Стійкість проти борошнистої роси і парші - 7 балів. Група стиглості - пізньоосіння.
Рекомендована грунтово-кліматична зона - Степ.
Напрям використання – десертний.
* Дані заявника.

Груша

97076002 Мрія

Заявник: Кримська дослідна станція садівництва Інституту садівництва Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

* Ізюминка Криму х Деканка дю Коміс.
Дерево помірної сили росту, помірно гіллясте, пряме. Однорічний пагін прямий, коричнево-червоний з-під сонячного боку. Вегетативна брунька з гострою верхівкою, слабко відхилена від пагона. Молодий пагін у період швидкого росту із сильним антоціановим забарвленням. Верхня третина пагона помірно опушена. Листкова пластинка середнього розміру, з гострою основою і тупою верхівкою. Краї - гострозазублені. Черешок - довгий. Прилистки наявні. Пелюстки віночка округлі, доторкуються одна до одної. Приймочка розташована на рівні пиляків. Плід великий, жовтий з рожево-червоним відтінком. М'якоть слабо зерниста, м'яка, дуже соковита. Зернятка - яйцеподібні.

За даними заявника за схеми садіння 4 х 2,5 м середня врожайність становить 320 ц/га. Середня маса плоду - 290 г, максимальна - 340 г. Сорт зимо- і посухостійкий - 9 балів, стійкий до парші - 8 балів та термічного опіку листя, скороплідний, сумісний з підщепами айви. Група стиглості - зимова.
Напрям використання – у свіжому вигляді та для переробки.
Рекомендовані грунтово-кліматичні зони - Степ, Лісостеп.
* Дані заявника.

Черешня

07085001 Дар Млієва

Заявник: **Інститут помології ім. Л.П. Симиренка Української академії аграрних наук**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Відібрано серед сіянців вільного запилення сорту вишні Любська.
* Дерево сильнорослe, напівпіднесене. Вегетативні бруньки злегка відхилені від пагона. Антоціанове забарвлення верхівки молодого пагона слабке. Листкова пластинка довга, темно-зелена. Черешок листка середньої довжини, із світло-червоними залозками. Квітка середня, пелюстки - широко-еліптичні, дотикаються. Плід великий, серцеподібний, темно-червоний. М'якоть червона, помірно пружна, помірно кисла, дуже соковита. Кісточка середнього розміру, округла.

За даними заявника за схеми садіння 6 х 4 м середня врожайність становить 196,8 ц/га. Середня маса плоду - 6,3 г, максимальна - 7,1 г. Сорт зимо- і посухостійкий - 7 балів. Група стиглості - рання. Плодоношення щорічне. Вік вступу щеплених дерев у плодоношення – 4 роки. Напрям використання – універсальний.
Рекомендовані грунтово-кліматичні зони - Лісостеп, Полісся.
* Дані заявника.

Слива

07080001 Кантата

Заявник: **Інститут помології ім. Л.П. Симиренка Української академії аграрних наук**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Отримано в результаті штучного запилення сорту Ісполінська пилком сорту Волошка.
* Дерево середньорослe, помірно щільне. Однорічна гілка розміщена напіввертикально. Плодушка середньої довжини. Вегетативна брунька мала, конічна, злегка відхилена від пагона. Листкова пластинка широкоовальна, світло-зелена, краї - городчасті. Черешок - середньої довжини. Квітка середнього розміру, пелюстки - оберненояйцевидні, вільні. Приймочка розташована на одному рівні з пиляками. Плід великий, продовгуватий, фіолетово-синій. М'якоть оранжева, помірно щільна, дуже соковита. Кісточка велика, округло-еліптична.

За даними заявника за схеми садіння 6 х 4 м середня врожайність становить 135 ц/га. Середня маса плоду - 43,2 г, максимальна - 51,8 г. Сорт зимо- і посухостійкий. Група стиглості - середня. Плодоношення щорічне. Вік вступу щеплених дерев у плодоношення – 4 роки. Напрям використання – універсальний.
Рекомендовані грунтово-кліматичні зони - Лісостеп, Полісся.
* Дані заявника.

01080004 Оригінальна

Заявник: **Інститут помології ім. Л.П. Симиренка Української академії аграрних наук**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Відібрано із сіянців вільного запилення сорту Волошка.

* Дерево середньорослe, помірно щільне. Однорічна гілка розміщена напіввертикально. Плодушка - середньої довжини. Вегетативна брунька середня, конічна, злегка відхилена від пагона. Листкова пластинка широкоовальна, темно-зелена, краї - пилчасті. Черешок листка середньої довжини. Квітка - середнього розміру, пелюстки - обернено-яйцевидні, вільні. Приймочка розміщена на одному рівні з пиляками. Плід великий, округлий, фіолетово-синій. М'якоть жовтувато-зелена, щільна, дуже соковита. Кісточка округло-еліптична із зернистою структурою бокової поверхні.

За даними заявника за схеми садіння 6 х 4 м середня врожайність становить 172 ц/га. Середня маса плоду - 41,5 г, максимальна - 57,8 г. Сорт зимо- і посухостійкий. Група стиглості - середньопізня. Плодоношення щорічне. Вік вступу щеплених дерев у плодоношення – 4 роки. Напрям використання – універсальний.
Рекомендовані грунтово-кліматичні зони - Лісостеп, Полісся.
* Дані заявника.

07080002 Пам'ять матері

Заявник: **Інститут помології ім. Л.П. Симиренка Української академії аграрних наук**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Отримано в результаті запилення гібридної форми №1259 сумішшю пилку сортів сливи Широ Смомо, Рання Ріверса, Трагедія.
* Дерево середньорослe, помірно щільне. Однорічна гілка розміщена напіввертикально. Плодушка - середньої довжини. Вегетативна брунька середнього розміру, овальна, злегка відхилена від пагона. Листкова пластинка широкоовальна, світло-зелена, краї - пилчасті. Черешок листка короткий. Квітка середнього розміру, пелюстки - обернено-яйцевидні, вільні. Приймочка розміщена на одному рівні з пиляками. Плід середнього розміру, округлий, червоний. М'якоть жовта, помірно щільна і соковита. Кісточка мала, округло-еліптична.

За даними заявника за схеми садіння 6 х 4 м середня врожайність становить 157 ц/га. Середня маса плоду - 37 г, максимальна - 45 г. Сорт зимо- і посухостійкий. Група стиглості - рання. Плодоношення щорічне. Вік вступу щеплених дерев у плодоношення – 5 років. Напрям використання – універсальний.
Рекомендовані грунтово-кліматичні зони - Лісостеп, Полісся.
* Дані заявника.

Кизил

04212001 Михайлівський

Заявник: Інститут помології ім. Л.П. Симиренка Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Сіянець вільного запилення, відібраний у 1967 р.
* Дерево або кущ - середньорослі, піднесені, сильно розгалужені. Однорічний пагін без сочевичок. Вегетативні бруньки виразно відхилені від пагона. Антоціанове забарвлення верхівки молодого пагона відсутнє або дуже слабке. Листкова пластинка середнього розміру. Черешок - короткий. Залозки на черешку відсутні. Віночок малий, пелюстки - еліптичні, розташовані вільно. Плід - великий, грушоподібний, темно-червоний. М'якоть - червона, сік - червоний. Плід твердий, помірно кислий, помірно солодкий, соковитий. Плодоніжка середньої довжини, тонка. Кісточка середнього розміру, вузькоеліптична.

За даними заявника за схем садіння 4 х 4 м (Степ), 5 х 5 м (Лісостеп) і 4 х 5 м (Полісся) середня врожайність становить 170 ц/га. Середня маса плоду становить 5,5 г, максимальна - 6,3 г. Сорт зимостійкий, стійкий проти хвороб і шкідників - 9 балів. Група стиглості - рання. Напрям використання - універсальний.
Рекомендовані грунтово-кліматичні зони - Степ, Лісостеп, Полісся.
* Дані заявника.

Актинідія

06208001 Аманда Лі

Заявник: Пітер Богдан Чикалюк

Власник(и):

Підтримувач(і):

Природний відбір.
* Рослина середньорослa. Молодий пагін вкритий оксамитовими ворсинками. Стебло середньої товщини, темно-коричневе, помірно шерехате. Сочевички дуже малі, білуваті. Листкова пластинка овальна, помірно зелена. У суцвітті переважно дві-п'ять квіток. Квітконіс короткий. Чашолистки зелені. Квітка маленька. Пелюстки однокольорові. Плід середнього розміру, еліптичний, у поперечному перерізі - круглий. Плодоніжка середньої довжини. Шкірка плоду помірно-зелена. Серцевина - зеленувато-біла.

За даними заявника за схеми садіння 4 х 4 м середня врожайність становить 312,5 ц/га. Середня маса плоду - 12,5 г, максимальна - 15 г. Сорт зимо- і посухостійкий - 8 балів. Група стиглості - середня. Напрям використання - універсальний.
Рекомендовані грунтово-кліматичні зони - Степ, Лісостеп, Полісся.
* Дані заявника.

06208002 Джон Кар

Заявник: Пітер Богдан Чикалюк

Власник(и):

Підтримувач(і):

Природний відбір.

* Рослина середньоросла. Молодий пагін вкритий рідкими оксамитовими ворсинками. Стебло середньої товщини, зеленувато-біле, помірно шерехате. Сочевички - малі, жовтуваті. Листкова пластинка широкоовальна, вкрита рідкими волосками з верхнього і нижнього боку. У суцвітті переважно дві-п'ять квіток. Квітконіс короткий. Чашолистки - зелені. Квітка - маленька. Пелюстки - однокольорові. Тичинкова нитка біла, пиляк - жовтий. Плід середнього розміру, еліптичний. Плодоніжка коротка. Шкірка плоду - зеленувато-коричнева, у споживчій стиглості - помірно-зелена. Серцевина у поперечному перерізі кругла, зеленувато-біла.

За даними заявника за схеми садіння 4 х 4 м середня врожайність становить 287,5 ц/га. Середня маса плоду - 10 г, максимальна - 12 г. Сорт зимо- і посухостійкий - 8 балів. Група стиглості - пізня. Напрям використання - універсальний.
Рекомендовані грунтово-кліматичні зони - Степ, Лісостеп, Полісся.
* Дані заявника.

Калина

04211001 Рубінова

Заявник: **Інститут помології ім. Л.П. Симиренка Української академії аграрних наук**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Відбір сіянців у 1984 р.
* Рослина середньоросла із середньою кількістю скелетних гілок. Пагін середньої товщини. Забарвлення кори - сіро-буре. Листок великий, помірно зелений. Край - пилчастий. Основа листкової пластинки пряма. Лопатей - п'ять. Прилистки відсутні. Черешок листка середньої довжини. Квітка мала. Зав'язь овальна, неопушена. Ягода велика, округла, червона.

За даними заявника за схеми садіння 4 х 1,5 м середній урожай з куща становить 10 кг. Середня маса ягоди - 1,2 г, максимальна - 1,25 г. Сорт зимо- і посухостійкий. Група стиглості - середня. Напрям використання - універсальний.
Рекомендовані грунтово-кліматичні зони - Лісостеп, Полісся.
* Дані заявника.

Малина

07077002 Благородна

Заявник: **Національний аграрний університет**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Повторне схрещування сортів Столична х Сонце Києва.
* Кущ високий. Пагоноутворювальна здатність – середня. Пагони від коричневого до пурпурово-коричневого забарвлення. Шипи відсутні. Листок помірно рельєфний між жилками. Листочків - іноді три, іноді п'ять, доторкуються. Квітка велика. Ягода пурпурова, дуже велика, помірно тверда. Період основного плодоношення проходить на пагонах минулого року. Тривалість урожайного сезону – середня.

За даними заявника за схеми садіння 3 х 0,3 м середня врожайність рослин сорту становить 111 ц/га. Середня маса ягоди - 4,4 г, максимальна - 7,2 г. Сорт зимо- і посухостійкий - 8 балів. Група стиглості - середньопізня. Напрям використання – універсальний.
Рекомендовані грунтово-кліматичні зони - Лісостеп, Полісся.
* Дані заявника.

07077001 Козачка

Заявник: **Національний аграрний університет**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Схрещування сорту Благородна з гібридом Штамбовий 19.
* Кущ низький. Пагоноутворювальна здатність – висока. Пагони від сіро-коричневого до коричневого забарвлення. Шипи відсутні. Листки слабко рельєфні між жилками. Листочків - звичайно п'ять, не перекриваються. Квітка середнього розміру. Плодоносні пагони короткі. Ягода темно-червона, середнього розміру, тверда, слабко опушена. Період основного плодоношення проходить на пагонах минулого року. Тривалість урожайного сезону – середня.

За даними заявника за схеми садіння 3 х 0,3 м середня врожайність рослин сорту становить 88 ц/га. Середня маса ягоди - 3,4 г, максимальна - 4,5 г. Сорт зимо- і посухостійкий. Група стиглості - пізня. Напрям використання – універсальний.
Рекомендовані грунтово-кліматичні зони - Лісостеп, Полісся.
* Дані заявника.

Смородина чорна

07083001 Аспірантська

Заявник: **Національний аграрний університет**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Мрія Києва х Народна.
* Кущ - середньорослий. Пагоноутворювальна здатність – середня. Брунька з помірним антоціановим забарвленням і слабким восковим нальотом. Листок помірно зелений, слабоблискучий. З однієї бруньки утворюється одне або два квіткових грона. Антоціанове забарвлення зав'язі слабке. Ягода велика, округла, помірно тверда, чорна, кисло-солодка.

За даними заявника за схеми садіння 3 х 0,7 м середня врожайність рослин сорту становить 157,1 ц/га. Середня маса ягоди - 1,8 г, максимальна - 3,8 г. Сорт зимо- і посухостійкий. Група стиглості - середня. Плодоношення щорічне.
Напрям використання – універсальний.
Рекомендовані грунтово-кліматичні зони - Лісостеп, Полісся.
* Дані заявника.

Суниця

05084007 Ароза

Заявник: К.І.В. Консорціо Італіано Віваісті (IT)

Власник(и):

Підтримувач(і):

* Рослина кулясто-сплющена, середньощільна, від помірної до сильнорослої. Листя зелене з верхнього боку, пухирчастість від слабкої до помірної, блиск від помірного до сильного. Краї листків пилчасті. Волоски на черешку сильно відхилені. Вусів від малої до середньої кількості, слабоопушені, антоціанове забарвлення від дуже слабкого до слабкого. Суцвіття розташоване вище листків. Квітка велика. Чашечка однакова з віночком. Пелюстки віночка головної квітки дотикаються. Плід великий, переважно конічної форми. Різниця за формою між плодами першого і другого року ледь помітна. Зона вільна від зерняток від малої до помірної. Забарвлення плоду оранжево-червоне, злегка нерівномірне, із сильним блиском. Зернятка розташовані урівень з плодом. М'якоть оранжево-червоного забарвлення, від твердої до дуже твердої. Повітряна комірка середнього розміру.

За даними заявника середня врожайність рослин сорту становить 220 ц/га. Середня маса ягоди - 28 г, максимальна - 39,7 г. Сорт зимостійкий - 8 балів. Група стиглості - середньопізня. Напрям використання – десертний, можливе заморожування.
Рекомендована грунтово-кліматична зона - Лісостеп.
* Дані заявника.

05084006 Клері

Заявник: К.І.В. Консорціо Італіано Віваісті (IT)

Власник(и):

Підтримувач(і):

Sweet Charlie x Onebor.
* Рослина кулясто-сплющена, від нещільної до середньощільної, від слабкої до помірної сили росту. Листя зелене з верхнього боку, пухирчастість слабка, блиск помірний. Краї листків пилчасті. Волоски на черешку сильно відхилені. Вусів мало і середня кількість, слабоопушені, антоціанове забарвлення відсутнє або дуже слабке. Суцвіття розташоване на рівні листків. Квітка мала. Чашечка однакова з віночком. Пелюстки віночка головної квітки дотикаються. Плід – великий, переважно конічної форми. Різниця за формою між плодами першого і другого року ледь помітна. Зона вільна від зерняток мала. Забарвлення плоду від оранжево-червоного до червоного, злегка нерівномірне, із сильним блиском. Зернятка розташовані урівень з плодом. М'якоть оранжево-червона, тверда. Повітряна комірка середнього розміру. Сорт не повторює плодоношення.

За даними заявника середня врожайність рослин сорту становить 293 ц/га. Середня маса ягоди - 23 г, максимальна - 30 г. Сорт зимостійкий - 7 балів. Група стиглості - дуже рання. Напрям використання – десертний, можливе заморожування.
Рекомендована грунтово-кліматична зона - Лісостеп.
* Дані заявника.

05084005 Чіврі 30

Заявник: К.І.В. Консорціо Італіано Віваісті (IT)

Власник(и):

Підтримувач(і):

* Рослина кулясто-сплющена, від нещільної до середньощільної, від слабкої до помірної сили росту. Листя темно-зелене з верхнього боку,

пухирчастість від дуже слабкої до слабкої, блиск від помірного до сильного. Краї листків пилчасті. Волоски на черешку сильно відхилені. Вусів мало, слабоопушені, антоціанове забарвлення від слабкого до помірного. Суцвіття розташоване вище листків. Квітка від середньої до великої. Чашечка однакова з віночком. Пелюстки віночка головної квітки дотикаються. Плід дещо довший, ніж ширший, від середнього до великого, переважно конічної форми. Різниця за формою між плодами першого і другого року ледь помітна. Зона вільна від зерняток від дуже малої до малої. Забарвлення плоду оранжево-червоне, злегка нерівномірне, із сильним блиском. Зернятка розташовані урівень з плодом. М'якоть ясно-червоного забарвлення, від помірної до твердої. Повітряна комірка середнього розміру. Час цвітіння ранній.

За даними заявника середня врожайність рослин сорту становить 323 ц/га. Середня маса ягоди - 18,4 г, максимальна - 28,4 г. Рослини сорту стійкі до підмерзання - 6-7 балів. Сорт нейтрального дня. Напрям використання – десертний.
Рекомендована грунтово-кліматична зона - Лісостеп.
* Дані заявника.

Унабі

05124001 Плодівський

Заявник: **Державне підприємство дослідне господарство "Новокаховське" Нікітського ботанічного саду Української академії аграрних наук - Національного наукового центру**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Відбір серед сіянців.
* Дерево середньорослe, пряме, колючок мало. Однорічний пагін довгий, коричнево-сірий. Плодоносний однорічний пагін - кремувато-зелений. Квітка середнього розміру, зірчаста. Плід середнього розміру, еліптичний, помірного коричневого забарвлення. М'якоть біло-зелена, помірно щільна. Насінина вузько-еліптична, жовта.

За даними заявника за схеми садіння 3 х 4 м середня врожайність становить 95 ц/га. Середня маса плоду - 5,0 г, максимальна - 6-7 г. Сорт зимо- і посухостійкий. Група стиглості - середня. Напрям використання – споживання у свіжому вигляді, технічна переробка.
Рекомендована грунтово-кліматична зона - Степ.
* Дані заявника.

Актинідія пурпурна х актинідія гостра

05444002 Дон Жуан

Заявник: **Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук України**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Добір серед сіянців гібридного походження з функціонально чоловічими квітками.
* Штамб рослини світло-сірий. Кора сильно розтріскується і відшаровується. Однорічний пагін сіро-зелений, з великими лінійними сочевичками. Бруньки на пагоні сховані під корою. Листок великий, гладенький, темно-зелений. Листкова пластинка - видовжено-овальна. Черешок листка середньої довжини, кремово-зелений. Квітка дрібна з добре розвинутими тичинками і редукованою зав'яззю. Пелюстки - округлі, пиляки - сірі.

За даними заявника сорт Дон Жуан відрізняється високою якістю пилку і тривалим періодом цвітіння. Сорт зимо- і посухостійкий - 9 балів, стійкий проти хвороб і шкідників. Напрям використання - запилювач.
Рекомендована грунтово-кліматична зона - Лісостеп.
* Дані заявника.

Чорниця щиткова

06471001 Аманда 818М

Заявник: Пітер Богдан Чикалюк

Власник(и):

Підтримувач(і):

Відбір серед диких видів.
* Кущ прямий, висотою 1,25-1,75 м. Листок - середньоширокий. Квітка середнього розміру з помірним антоціановим забарвленням. Ягода мала з помірним нальотом. Блакитне забарвлення ягоди після видалення нальоту - сильне. Ягода - помірно солодка.

За даними заявника за схеми садіння 3 х 1 м середній урожай з куща становить 8,6 кг. Середня маса ягоди - 0,8 г, максимальна - 1,0 г. Сорт зимостійкий - 8 балів. Група стиглості - середньопізня. Напрям використання – споживання у свіжому вигляді, переробка, заморожування. Рекомендовані грунтово-кліматичні зони - Степ, Лісостеп, Полісся.
* Дані заявника.

06471003 Блустар 701М

Заявник: Пітер Богдан Чикалюк

Власник(и):

Підтримувач(і):

Природний відбір серед диких форм.
* Кущ прямий, висотою 1,25-1,75 м. Листок середньої ширини. Квітка середнього розміру з помірним антоціановим забарвленням. Ягода середня з помірним нальотом. Інтенсивність блакитного забарвлення шкірки після видалення нальоту помірна. Ягода - помірно солодка.

За даними заявника за схеми садіння 3 х 1 м середній урожай з куща становить 8,4 кг. Середня маса ягоди - 0,91 г, максимальна - 0,91 г. Сорт зимостійкий - 8 балів. Група стиглості - рання. Напрям використання – споживання у свіжому вигляді, переробка. Рекомендовані грунтово-кліматичні зони - Степ, Лісостеп, Полісся.
* Дані заявника.

06471002 Джонні 716Л

Заявник: Пітер Богдан Чикалюк

Власник(и):

Підтримувач(і):

Подвійний природний відбір серед диких видів.
* Кущ прямий, висотою 1,25-1,75 м. Листок середньої ширини. Квітка середнього розміру з помірним антоціановим забарвленням. Ягода велика із сильним нальтом. Блакитне забарвлення шкірки після видалення нальоту слабке. Ягода - дуже солодка.

За даними заявника за схеми садіння 3 х 1 м середній урожай з куща становить 9,1 кг. Середня маса ягоди - 0,72 г, максимальна - 0,85 г. Сорт зимостійкий - 8 балів. Група стиглості - середньорання. Напрям використання – споживання у свіжому вигляді, переробка, заморожування. Рекомендовані грунтово-кліматичні зони - Степ, Лісостеп, Полісся.
* Дані заявника.

06471005 Керрі 728С

Заявник: Пітер Богдан Чикалюк

Власник(и):

Підтримувач(і):

Природний відбір сортів через процес проходження вологих і сухих умов.
* Кущ прямий, висотою 1,25-1,75 м. Листок середньої ширини. Квітка мала із слабким антоціановим забарвленням. Ягода мала із сильним нальотом. Інтенсивність блакитного забарвлення шкірки після видалення нальоту сильна. Ягода дуже солодка.

За даними заявника за схеми садіння 3 х 1 м середній урожай з куща становить 8,1 кг. Середня маса ягоди - 0,65 г, максимальна - 0,82 г. Сорт зимостійкий - 8 балів. Група стиглості - середня. Напрям використання – переробка, сушіння, заморожування.
* Дані заявника.

06471004 Чік 725М

Заявник: Пітер Богдан Чикалюк

Власник(и):

Підтримувач(і):

Природний міжвидовий відбір.
* Кущ прямий, висотою 1,25-1,50 м. Листок середньої ширини. Квітка середнього розміру з помірним антоціановим забарвленням. Ягода середня з помірним нальотом. Інтенсивність блакитного забарвлення шкірки після видалення нальоту помірна. Ягода - помірно солодка.

За даними заявника за схеми садіння 3 х 1 м середній урожай з куща становить 7,9 кг. Середня маса ягоди - 0,87 г, максимальна - 1,0 г. Сорт зимостійкий - 8 балів. Група стиглості - середня. Напрям використання – споживання у свіжому вигляді, переробка.
Рекомендовані грунтово-кліматичні зони - Степ, Лісостеп, Полісся.
* Дані заявника.

07073008 Гвієне

Заявник: **Національний інститут винограду і вина "Магарач" Української академії аграрних наук**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Сорт пізньостиглий технічного напряму використання. Має 167 діб від початку розпускання бруньок до споживчої (технічної) стиглості. Бруньки розгортаються в пізні строки. Верхівки молодих пагонів напіввідкриті. Верхній бік листкової пластинки молодого листка зелений з антоціановими плямами. Положення пагона у просторі напівпряме. Колір дорсальної (добре освітленої) сторони міжвузлів зелений, вентральної (без прямого попадання денного світла) - зелений із червоними штрихами (смугами). Послідовних вусиків менше трьох, середньої довжини. Квітка має добре розвинені тичинки і маточку. Розвинений листок середній за розміром, округлий, з п'ятьма лопатями. Лопаті верхніх листкових вирізів слабко перекриваються, біля черешка - широко відкриті. Глибина верхніх листкових вирізів дуже глибока. Зубці довгі, обидва боки випуклі. Черешок трохи коротший за головну жилку. Гроно середнього розміру, середньої щільності, ніжка середньої довжини. Ягода середня кругла, порівняно легко відокремлюється від плодоніжки. Шкірка чорно-синього кольору середньої товщини. М'якоть дуже соковита, м'яка. Насіння повноцінне.
Здерев'янілий пагін червонувато-коричневий, ребристий.
* Дані заявника.

Сорт пізньостиглий технічного напряму використання, у средньому 167 діб від початку розпускання бруньок до споживчої (технічної) стиглості. Середньостійкий проти мілдью, сірої гнилі, оїдіуму, філоксери. Середня врожайність – 154 ц/га, середня маса грона – 176 г, середня маса 100 ягід – 120 г. Цукристість –27 %, кислотність – 7,5 г/л. Вихід соку (сусла) - 66 %. Зимостійкість середня. Десертне вино. Рекомендовано вирощувати у 6-ій виноградарській зоні України.
* Дані заявника.

07073009 Гранатовий Магарача

Заявник: **Національний інститут винограду і вина "Магарач" Української академії аграрних наук**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Сорт ранньостиглий технічного напряму використання. Має 126 діб від початку розпускання бруньок до споживчої (технічної) стиглості. Бруньки розгортаються в середні строки. Верхівки молодих пагонів відкриті повністю, рідким опушенням нижньої сторони. Верхній бік листкової пластинки молодого листка світлий мідно - червоний. Положення пагона у просторі горизонтальне. Колір дорсальної (добре освітленої) сторони міжвузлів червоний, вентральної (без прямого попадання денного світла) - зелений із червоними штрихами (смугами). Послідовних вусиків менше трьох, середньої довжини. Квітка має добре розвинені тичинки і маточку. Розвинений листок за розміром середній, округлий, з п'ятьма лопатями. Лопаті верхніх листкових вирізів відкриті, біля черешка - широко відкриті. Глибина верхніх листкових вирізів глибокі. Зубці короткі, обидві сторони випуклі. Черешок трохи коротший за головну жилку. Гроно за розміром середнє, середньої щільності, ніжка - коротка. Ягода середня тупо-яйцеподібна, порівняно легко відокремлюється від плодоніжки. Шкірка чорно-синього кольору середньої товщини. М'якоть соковита, м'яка. Насіння повноцінне.
Здерев'янілий пагін червонувато-коричневий, борознистий.
* Дані заявника.

* Сорт дуже ранньостиглий технічного напрямку використання, у середньому 126 діб від початку розпускання бруньок до споживчої (технічної) стиглості. Стійкий до мілдью, сірої гнилі, оїдіуму. Середня врожайність – 134 ц/га, середня маса грона – 187 г, середня маса 100 ягід – 215 г. Цукристість –27,5 %, кислотність – 7,7 г/л. Вихід соку (сусла) - 68 %. Зимостійкість середня. Десертне вино. Рекомендовано вирощувати у 6-ій

виноградарській зоні України.
* Дані заявника.

07073007 Красень

Заявник: **Національний інститут винограду і вина "Магарач" Української академії аграрних наук**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Сорт пізньостиглий технічного напрямку використання. 156 діб від початку розпускання бруньок до споживчої (технічної) стиглості. Бруньки розгортаються в середні строки. Верхівки молодих пагонів напіввідкриті, листки жовто - зелені, з рідким опушенням нижньої сторони. Верхній бік листкової пластинки молодого листка жовто-зелений. Положення пагона у просторі напівпряме. Колір дорсальної (добре освітленої) сторони міжвузлів зелений із червоними штрихами (смугами),
вентральної (без прямого попадання денного світла) - зелений. Послідовних вусиків менше трьох, середньої довжини. Квітка має добре розвинені тичинки і маточку. Розвинений листок середній за розміром п'ятикутний, з п'ятьма лопатями. Лопаті верхніх листкових вирізів відкриті, біля черешка - слабко перекриваються. Глибина верхніх листкових вирізів глибокі. Зубці середньої довжини, обидва боки прямолінійні.Черешок однакової довжини із головною жилкою. Гроно середньовелике, середньої щільності, ніжка - середньої довжини. Ягода середня овальна, порівняно легко відокремлюється від плодоніжки. Шкірка чорно-синього кольору товста. М'якоть соковита, м'яка. Насіння рудиментарне.
Здерев'янілий пагін темно-коричневий, ребристий.
* Дані заявника.

* Сорт пізньостиглий технічного напрямку використання, у середньому 156 діб від початку розпускання бруньок до споживчої (технічної) стиглості. Стійкий до філоксери, мілдью, сірої гнилі, оїдіуму. Середня врожайність – 151 ц/га, середня маса грона – 268 г, середня маса 100 ягід – 234 г. Цукристість –26,3 %, кислотність – 7,5 г/л. Вихід соку (сусла) 78 %. Зимостійкість середня. Десертне вино. Рекомендовано вирощувати у 6-ій виноградарській зоні України.
* Дані заявника.

07073006 Пам'яті Голодриги

Заявник: **Національний інститут винограду і вина "Магарач" Української академії аграрних наук**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Сорт пізньостиглий технічного напрямку використання. 151 діб від початку розпускання бруньок до споживчої (технічної) стиглості. Бруньки розгортаються в середні строки. Верхівки молодих пагонів повністю відкриті. Верхній бік листкової пластинки молодого листка жовто - зелений. Положення пагона у просторі напівпряме. Колір дорсальної (добре освітленої) сторони міжвузлів зелений із червоними штрихами (смугами). вентральної (без прямого попадання денного світла) - зелений. Послідовних вусиків менше трьох, довгі. Квітка має добре розвинені тичинки і маточку. Розвинений листок великий за розміром, серцевидний, з семи лопатей. Лопаті верхніх листкових вирізів відкриті, біля черешка - широко відкриті. Глибина верхніх листкових вирізів - глибокі. Зубці короткі, обидва боки випуклі. Черешок трохи коротший за головну жилку. Гроно середнього розміру, нещільне, ніжка - коротка. Ягода середня еліптична, порівняно легко відокремлюється від плодоніжки. Шкірка чорно-синього кольору середньої товщини. М'якоть соковита, тверда. Насіння повноцінне.
Здерев'янілий пагін червонувато-коричневий, борозенчастий.
* Дані заявника.

Урожайність - 134 ц/га, середня маса гроно 208 г, середня маса 100 ягід 219 г,вихід соку - 62%, цукристість соку ягід -25,7%, вміст кислот у ягодах - 8,6 %, Днів від початку розпускання бруньок до споживчої (технічної стиглості) - 151; стійкість до хвороб - 7 балів, стікість до несприятливих метеорологічних умов - 7 балів Рекомендовано вирощувати в 6-й виноградарській зоні України.

Дані зявника.

07073001 Флора

Заявник: **Національний науковий центр "Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова" Української академії аграрних наук**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Верхівка молодого пагона повністю відкрита, Колір дорсальної (добре освітленої) сторони міжвузлів зелений із червоними штрихами (смугами), вентральної (без прямого попадання денного світла) міжвузлів зелений. Листок малий, округлий, пятилопатевий, слабкорозсічений, лопаті листка біля черешка злегка перекривають одна одну. Антоціанове забарвлення головних жилок на верхній стороні пластинки слабке. Розташування прилеглих волосків між жилками з нижньої сторони листка помірне. Гроно велике, середньої щільності. Ягода дуже велика, овальна, колір шкірки жовто - зеленого кольору. Мякоть дуже тверда, соковита. Насіння повноцінне. Квітка двостатева, гроно середньої щільності, велике. Ягода дуже велика, жовто - зелена, соковита, овальної форми з товстою шкіркою, дуже тверда, важко відокремлюється від плодоніжки

Сорт столового напрямку використання, ранньостиглий, 120 діб від початку розпускання бруньок до споживчої стиглості.Стійкий до мільдью, оїдіуму, філоксери, сірої гнилі. Вихід товарних грон - 90%. Середня врожайність - 130 ц/га. Середня маса гроно -400 г, середня маса 100 ягід - 690 г. Цукристість - 16,0 %, кислотність - 5,7 г/л. Дегустаційна оцінка ягід - 9,0 бала. Транспортабельність висока. Рекомендовано вирощувати в Степу України.

* Дані заявника.

Декоративні та лікарські

Азалія

07219008 Експромт

Заявник: **Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук України**

Власник(и):

Підтримувач(і):

*Сорт створено у результаті вільного запилення сумішшю пилку сортів колекції. Рік відбору – 1974.
Молодий листок має світло-зелене забарвлення. Повністю розвинутий листок середньої довжини, вузький, еліптичний, помірно-зелений – з верхнього і світло-зелений – з нижнього боку. У суцвітті середня кількість квіток. Квітконіжка середньої довжини. Чашечки немає. Квітка середнього розміру, відкритолійкоподібна. Аромат відсутній або слабкий. Віночок повний із середньою кількістю пелюсток. Забарвлення пелюстки відповідає №57C RHS шкали кольорів. Краї пелюсток сильно хвилясті. Квітковий розтруб укритий дотичними цяточками, колір яких відповідає №57D RHS шкали кольорів. Пиляки коричневого кольору. Маточка однакової довжини з пиляками. Час цвітіння – пізній.

Рослини сорту стійкі до більш підвищеного pH грунту, стійкі проти хвороб і шкідників. Вирізняється доброю вкоріненістю живців. Тривалість цвітіння 45 діб. Рекомендовані грунтово-кліматичні зони – Степ, Лісостеп, Полісся.

* Дані заявника.

07219003 Золушка

Заявник: **Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук України**

Власник(и):

Підтримувач(і):

*Сорт створено схрещуванням Landifolium x Ilva. Рік відбору – 1973.
Молодий листок має світло-зелене забарвлення. Повністю розвинутий листок довгий, широкий, еліптичний, помірно-зелений – з верхнього і світло-зелений – з нижнього боку. У суцвітті багато квіток. Квітконіжка довга. Є чашечка. Квітка велика, лійкоподібна. Аромат відсутній або слабкий. Віночок повний, пелюсток багато. Забарвлення пелюстки відповідає №62C RHS шкали кольорів. Краї пелюсток дуже хвилясті. Квітковий розтруб укритий мітками, колір яких відповідає №82B RHS шкали кольорів. Пиляки жовтого кольору. Маточка довша за пиляки. Час цвітіння – пізній.

Рослини сорту стійкі проти хвороб і шкідників, вирізняються доброю вкоріненістю живців. Рекомендована грунтово-кліматична зона – Степ, Лісостеп.
* Дані заявника.

07219004 Лада

Заявник: **Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук України**

Власник(и):

Підтримувач(і):

*Сорт створено схрещуванням Darius x Sanders. Рік відбору – 1969.
Молодий листок має помірно-зелене забарвлення. Повністю розвинутий листок довгий, широкий, майже яйцевидний, помірно-зелений – з верхнього і світло-зелений – з нижнього боку. У суцвітті середня кількість квіток. Квітконіжка середньої довжини. Є чашечка. Квітка дуже велика, відкрито-лійкоподібна. Аромат відсутній або слабкий. Віночок простий. Забарвлення пелюстки відповідає №68A RHS шкали кольорів. Краї пелюсток помірно хвилясті. Квітковий розтруб укритий дотичними цяточками, колір яких відповідає №71C RHS шкали кольорів. Пиляки фіолетового кольору. Маточка довша за пиляки. Час цвітіння – середній.

Рослини сорту стійкі до більш підвищеного pH грунту. Вирізняється активним ростом і доброю вкоріненістю живців. Рекомендована грунтово-кліматична зона – Степ, Лісостеп.
* Дані заявника.

07219009 Марічка

Заявник: **Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук України**

Власник(и):

Підтримувач(і):

*Сорт створено схрещуванням Darius x Concinna x Sanders. Рік відбору – 1975.
Молодий листок має світло-зелене забарвлення. Повністю розвинутий листок довгий, широкий, майже обернено-яйцевидний, темно-зелений – з верхнього і помірно-зелений – з нижнього боку. У суцвітті багато квіток. Квітконіжка середньої довжини. Є чашечка. Квітка велика, широко-лійкоподібна. Аромат відсутній або слабкий. Віночок простий. Забарвлення пелюстки відповідає №61C RHS шкали кольорів. Краї пелюсток сильно хвилясті. Квітковий розтруб укритий дотичними цяточками, колір яких відповідає №58B RHS шкали кольорів. Пиляки коричневого кольору. Маточка довша за пиляки. Час цвітіння – дуже пізній.

Рослини сорту стійкі проти шкідників і хвороб. Вирізняється доброю вкоріненістю живців. Тривалість цвітіння 50 днів. У зрізі квітка залишається свіжою до 10 днів. Рекомендована грунтово-кліматична зона – Степ, Лісостеп, Полісся.
* Дані заявника.

07219002 Мавка

Заявник: **Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук України**

Власник(и):

Підтримувач(і):

*Сорт створено у результаті вільного запилення сумішшю пилку. Рік відбору – 1973.
Молодий листок має темно-зелене забарвлення. Повністю розвинутий листок довгий, вузький, еліптичний, темно-зелений – з верхнього і помірно-зелений – з нижнього боку. У суцвітті багато квіток. Квітконіжка середньої довжини. Є чашечка. Квітка велика, відкрито-лійкоподібна. Аромат відсутній або слабкий. Віночок простий. Забарвлення краю пелюстки відповідає №52B RHS шкали кольорів. Середина верхнього боку пелюстки має забарвлення, що відповідає коду №53A RHS шкали кольорів. Забарвлення середини нижнього боку пелюстки відповідає коду №52B RHS шкали кольорів. Краї пелюсток помірно хвилясті. Квітковий розтруб укритий дотичними цяточками, колір яких відповідає №53A RHS шкали кольорів. Пиляки коричневого кольору. Маточка довша за пиляки. Час цвітіння – середній.

Рослини сорту легко укорінюються живцями. Рекомендована грунтово-кліматична зона – Степ, Лісостеп.
* Дані заявника.

07219007 Орхідний

Заявник: **Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук України**

Власник(и):

Підтримувач(і):

*Сорт створено схрещуванням Concinna x Lendifolium. Рік відбору – 1983.
Молодий листок має світло-зелене забарвлення. Повністю розвинутий листок середньої довжини, широкий, майже обернено-яйцевидний, темно-зелений – з верхнього і світло-зелений – з нижнього боку. У суцвітті багато квіток. Квітконіжка довга. Є чашечка. Квітка велика, широко-лійкоподібна. Аромат відсутній або слабкий. Віночок простий. Забарвлення пелюстки відповідає №76C RHS шкали кольорів. Краї пелюсток сильно хвилясті. Квітковий розтруб укритий дотичними цяточками, колір яких відповідає №76B RHS шкали кольорів. Пиляки фіолетового кольору. Маточка довша за пиляки. Час цвітіння – середній.

Рослини сорту стійкі проти шкідників і хвороб. Вирізняється активним ростом і доброю вкоріненістю живців. Тривалість цвітіння 45 днів.
Рекомендована грунтово-кліматична зона – Степ, Лісостеп, Полісся.
* Дані заявника.

07219001 Подолянка

Заявник: **Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук України**

Власник(и):

Підтримувач(і):

*Сорт створено схрещуванням Rubis x Secuntala. Рік відбору – 1974.
Молодий листок має світло-зелене забарвлення. Повністю розвинутий листок довгий, широкий, оберненояйцевидний, темно-зелений – з верхнього і світло-зелений – з нижнього боку. У суцвітті середня кількість квіток. Квітконіжка довга. Є чашечка. Квітка велика, широко-лійкоподібна. Аромат відсутній або слабкий. Віночок простий. Забарвлення пелюстки відповідає №76A RHS шкали кольорів. Краї пелюсток помірно хвилясті. Квітковий розтруб укритий дотичними цяточками, колір яких відповідає №71C RHS шкали кольорів. Пиляки фіолетового кольору. Маточка довша за пиляки. Час цвітіння – середній.

Рослини сорту стійкі до більш підвищеного pH грунту, легко укорінюються живцями, стійкі проти хвороб і шкідників. Рекомендована грунтово-кліматична зона – Степ, Лісостеп.
* Дані заявника.

07219006 Рум'янок

Заявник: **Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук України**

Власник(и):

Підтримувач(і):

*Сорт створено у результаті вільного запилення сумішшю пилку сортів колекції. Рік відбору – 1976.
Молодий листок має світло-зелене забарвлення. Повністю розвинутий листок довгий, широкий, майже обернено-яйцевидний, темно-зелений – з верхнього і помірно-зелений – з нижнього боку. У суцвітті середня кількість квіток. Квітконіжка середньої довжини. Є чашечка. Квітка середнього розміру, відкрито-лійкоподібна. Аромат відсутній або слабкий. Віночок простий. Забарвлення пелюстки відповідає №58D RHS шкали кольорів. Краї пелюсток слабко хвилясті. Квітковий розтруб укритий окремими цяточками, колір яких відповідає №58C RHS шкали кольорів. Пиляки фіолетового кольору. Маточка довша за пиляки. Час цвітіння – ранній.

Рослини сорту невибагливі до pH грунту і вологості повітря. Легко вкорінюються живцями. Тривалість цвітіння 40 днів. Рекомендована грунтово-кліматична зона – Степ, Лісостеп, Полісся.
* Дані заявника.

07219005 Смуглянка

Заявник: **Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук України**

Власник(и):

Підтримувач(і):

*Сорт створено схрещуванням Rubis x Apollo. Рік відбору – 1980.
Молодий листок має світло-зелене забарвлення. Повністю розвинутий листок довгий, широкий, майже яйцевидний, темно-зелений – з верхнього і помірно-зелений – з нижнього боку. У суцвітті середня кількість квіток. Квітконіжка середньої довжини. Є чашечка. Квітка велика, лійкоподібна. Аромат відсутній або слабкий. Віночок простий. Забарвлення пелюстки відповідає №185D RHS шкали кольорів. Краї пелюсток слабко хвилясті. Квітковий розтруб укритий дотичними цяточками, колір яких відповідає №185B RHS шкали кольорів. Пиляки коричневого кольору. Маточка довша за пиляки. Час цвітіння – пізній.

Рослини сорту стійкі до підвищеного забруднення повітря. Вирізняється активним ростом і доброю вкоріненістю живців. Тривалість цвітіння 70 днів. Квітка довго залишається свіжою у зрізі. Рекомендована грунтово-кліматична зона – Степ, Лісостеп.
* Дані заявника.

Головатень круглоголовий

02405001 Глобус

Заявник: **Дослідна станція лікарських рослин Української академії аграрних наук**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Сім'ядольні листки великі, зеленого кольору. Висота рослини висока. Корінь помірно розгалужений, товстий
Стебло із середньою кількістю генеративних пагонів, опушене. Листок яйцевидноланцетний, середній за розміром
Суцвіття - середньої довжини з блакитно - фіолетовими квітками середнього часу цвітіння.
*Дані заявника.

Урожайність надземної маси - 140 ц/га, Урожайність насіння - 10,2 ц/га, маса 1000 насінин - 28,6 г; висота рослин - 183,2 см, вегетаційний період - 195 діб, середня тривалість цвітіння - 36 діб, стійкий проти хвороб; вміст алкалоїду ехінопсеину - 1,6%, збір ехінопсину - 16,3 кг/га.

Мачок жовтий

02304001 Геліос

Заявник: **Дослідна станція лікарських рослин Української академії аграрних наук**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Рослина зі світло - зеленим забарвленням сім'ядольних листків, середня по висоті, корінь тонкий із слабким розгалуженням. Стебло з малою кількістю генеративних пагонів, без опушення; листок яйцевидноланцентної форми сіро - зеленого кольору, середній по довжині, вузький, Квітка жовтого кольору середнього часу цвітіння; період вегетації середній.

Середньостиглий, рослина висотою 78,3 см, урожайність сухої надземної маси становить 30,2 ц/га, урожайність насіння --1,54 ц/га, маса 1000 нас. - 1,13 г, вегетаційний період - 160 діб., вміст алкалоїдів глауцину - 1,18 %, збір глауцину - 35,2 кг/га; стійкий проти хвороб.

Полин кримський

07432001 Богатир

Заявник: **Державне підприємство дослідне господарство "Новокаховське" Нікітського ботанічного саду Української академії аграрних наук - Національного наукового центру**

Власник(и):

Підтримувач(і):

* Сорт . Рослина висока, габітус розлогий, утворює середню кількість гілок 1-го порядку. Стебло середнього діаметра. Листкова пластинка сірувато-зеленого кольору, середньої довжини і ширини, з помірним опушенням. Суцвіття зібрані у китицеподібну волоть, довге, кулясте. Пелюстки квітки сіро-зеленого забарвлення.
*Дані заявника.

Урожайність сухої надземної маси сягає 300 ц/га, Маса 1000 насінин - 0,26 г. Збір ефірної олії - 40,0 кг/га. Вміст ефірної олії, % від сирої маси - 0,6 %, зимостійкий і стійкий до несприятливих метеорологічних явищ. Висота рослини - 72 см, Вегетаційний період 260 діб.

Азіміна трилопатева

05443001 Мічурінка

Заявник: **Державне підприємство дослідне господарство "Новокаховське" Нікітського ботанічного саду Української академії аграрних наук - Національного наукового центру**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Відбір серед сіянців.
* Дерево середньорослe, пряме. Однорічний пагін коричневого забарвлення. Квітка велика з понад чотирма пелюстками. Плід великий, вузько-еліптичний, з жовтою м'якоттю. Насінина середнього розміру, напівкуляста, помірного коричневого забарвлення.

За даними заявника за схеми садіння 3 х 4 м середня врожайність становить 150 ц/га. Середня маса плоду - 250 г, максимальна - 270 г. Сорт зимо- і посухостійкий. Група стиглості - середня. Напрям використання – споживання у свіжому вигляді.
Рекомендована грунтово-кліматична зона - Степ.
* Дані заявника.

05443002 Новокаховчанка

Заявник: **Державне підприємство дослідне господарство "Новокаховське" Нікітського ботанічного саду Української академії аграрних наук - Національного наукового центру**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Відбір серед сіянців.
* Дерево середньорослe, пряме. Однорічний пагін коричневого забарвлення. Квітка велика з понад чотирма пелюстками. Плід великий, з жовтою м'якоттю. Насінина середнього розміру, напівкуляста, помірного коричневого забарвлення.

За даними заявника за схеми садіння 3 х 4 м середня врожайність становить 150 ц/га. Середня маса плоду - 270 г, максимальна - 290 г. Сорт зимо- і посухостійкий. Група стиглості - середня. Напрям використання – споживання у свіжому вигляді.
Рекомендована грунтово-кліматична зона - Степ.
* Дані заявника.

07443001 Плодівчанка

Заявник: **Державне підприємство дослідне господарство "Новокаховське" Нікітського ботанічного саду Української академії аграрних наук - Національного наукового центру**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Відбір серед сіянців.
* Дерево середньорослe, напіврозлоге. Однорічний пагін коричневого забарвлення. Квітка велика з понад чотирма пелюстками. Плід великий, з жовто-оливковою м'якоттю. Насінина середнього розміру, напівкуляста, коричнева.

За даними заявника за схеми садіння 3 х 4 м середня врожайність становить 140 ц/га. Середня маса плоду - 230 г, максимальна - 250 г. Сорт зимо- і посухостійкий. Група стиглості - середня. Напрям використання – споживання у свіжому вигляді.
Рекомендована грунтово-кліматична зона - Степ.

* Дані заявника.

Любисток лікарський

05461001 Мрія

Заявник: **Закарпатський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Первинний листок неопушений, рослина висока, корінь потовщений з фітомеланіновим забарвленням на зрізі, з пекучим присмаком; розетковий листок довгий, середній по ширині, черешок листка середній. Стебло без розгалуження з антоціановим забарвленням, неопушене. Листок з антоціановим забарвленням.
Суцвіття з дуже малою кількістю на стеблі, час початку цвітіння - середній;

Урожайність наземної маси - 172 ц/га, Урожайність кореневищ з корінням - 58 ц/га, висота рослин - 70-80 см., з квітконосом - 1,5-2 м, вегетаційний період - 100-110 дн.. Урожайність насіння - 2,1 ц/га, вміст ефірної олії - 0,9 - 1,5 %, середня тривалість цвітіння - 25-30 днів, стійкий проти хвороб. Вміст вітаміну С - 88,5 мг%.

Каріоптеріс сивий

07469001 Осіннє небо

Заявник: **Державне підприємство дослідне господарство "Новокаховське" Нікітського ботанічного саду Української академії аграрних наук - Національного наукового центру**

Власник(и):

Підтримувач(і):

* Сорт створено методом відбору серед сіянців.
Кущ середньої висоти, помірної сили росту, розлогий, гіллястий. Однорічний пагін середньої довжини і товщини з помірним антоціановим забарвленням, помірно опушений. Листкова пластинка видовженояйцевидної форми, помірно зазублена, помірно опушена і тьмяно-зелена з верхнього боку, сірувато-зелена - з нижнього боку. Черешок листка середньої довжини. Квітка яскрава, фіолетова, велика. Цвіте у середні строки. Цвітіння тривале і дуже рясне. Рослина утворює багато плодів. Листя восени забарвлюється, обпадає пізно.

Рослина посухостійка, дуже декоративна. Цвітіння триває 40-45 діб. Напрям використання - озеленення. Рекомендована грунтово-кліматична зона - Степ.
* Дані заявника.

Код	Назва	Адреса
177	Ніжинський агротехнічний інститут Національного аграрного університету	Вул. Шевченко, 10, м. Ніжин ,Чернігівська обл., 16600
181	Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю "Насіннєва компанія "Маїс"	19635, с. Білозір"я, вул.Леніна, 2, Черкаського р-ну, Черкаської обл.
191	Мельничук Максим Дмитрович	Вул. Ломоносова, 24, кв. 123, м. Київ, 03022
192	Заграфова Майя Йосипівна	Проїзд Тутковського, 6, кв. 13, м. Житомир
201	ВНДІ зернобобових і круп'яних культур	П. Стрелецький, м. Орел, Росія, 303112,
209	Північно-Донецька державна сільськогосподарська дослідна станція Донського зонального науково-дослідного інституту сільського господарства	П/в Дослідна станція, Тарасівський р-н, Ростовська обл., Росія, 346055
211	ВНДІ виноградарства і виноробства ім. Я..І. Потапенко	Пр. Платова, 166, м. Новочеркаськ, Ростовська обл., Росія, 346421
212	Державна наукова установа Всеросійський науково - дослідний інститут зернових культур ім. І.Г.Калиненко	Науковий городок, 3, м. Зерноград, Ростовська обл., Росія, 347740
213	Кемпбеллс Сідз	28605 Каунтрі Роуд 104, Девіс, СА 95616, США
215	Вілморін	49250 La Menitre, Franse
216	ДНУ "Донська дослідна станція ім. Л.А. Жданова Всеросійського науково-дослідного інституту олійних культур"	П/в Суходольськ, п. Опорний, Азовський р-н , Ростовська обл., Росія, 346754
224	Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю "Перспектива"	Вул. Леніна 112, с. Білозіря, Черкаський р-н, Черкаська обл., 19635
230	Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська насіннєва компанія"	Вул. Озерна 14 кв. 124, м. Київ, 04209
238	Всеросійський науково-дослідний інститут генетики і селекції плодових рослин ім. І.В. Мічуріна	М. Мічурінськ-10, Тамбовська обл., Росія, 393740
272	Науково-виробниче товариство "Насіння"	03022, м. Київ, вул. Васильківська, 28, оф. 406, Україна
273	Мей Агро Сід Корпорейшн ((Мей Агро Тохумсулук Санаі ве Тісарет А.С)	Саманлі Махалесі Ідітлер Кадесі № 28 Ілдірім 16280 Бурса, Туреччина
279	Ходовля Рослин Рольничих "Насьона Кобєжиц"спулка з о.о.	вул. Спортова, 21, 55-040, Кобєжіце, Польща
286	Сілван Угорщина ЛТД	2330 Dunaharasti Irinyi Janjs ut 1
293	Товариство з обмеженою відповідальністю "Біоальянс"	Вул. Колекторна 30, м. Київ, 02099
294	Москаленко Василь Ілліч	Вул. Сковороди 1/3, м. Полтава, 36003
295	Марчук Ніна Степанівна	
302	Національний науковий центр "Інститут бджільництва ім. П.І.Прокоповича Української академії аграрних наук"	03680, м.Київ, вул.акад.Заболотного, 19
303	Ялтушківська дослідно-селекційна станція Інституту цукрових буряків Української академії аграрних наук	П/в Ялтушків, Барський р-н, Вінницька обл., 23021
304	Уладово-Люлінецька дослідно-селекційна станція Інституту цукрових буряків Української академії аграрних наук	П/в Жовтневе, Калинівський р-н, Вінницька обл., 22412
305	Інститут кормів Української академії аграрних наук	21100, Проспект Юності, 16, м. Вінниця
306	Вінницька державна сільськогосподарська дослідна станція Української академії аграрних наук	23227, вул. Мічуріна, 1, с. Агрономічне, Вінницький р-н, Вінницька обл.
307	Волинський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук	с. Рокині, Луцький р-н, Волинська обл., 45626
308	Лавринець Григорій Семенович	Вул. Сковороди 1/3, м. Полтава, 36003
309	Луганський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук	П/в Металіст, Слов'яносербський р-н., Луганська обл., 93733
310	Дніпропетровська дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук	Вул. Дослідна, 1, п/в Олександрівка, Дніпропетровський р-н, Дніпропетровська обл., 52041
311	Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук	49027, вул. Дзержинського, 14, м. Дніпропетровськ

Код	Назва	Адреса
312	Дніпропетровський державний аграрний університет	Вул. Ворошилова, 25, м. Дніпропетровськ, 49600
313	Донецька дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук	П/в Дослідне, Ясинуватський р-н., Донецька обл., 86081
314	Артемівська дослідна станція розсадництва Інституту садівництва Української академії аграрних наук	Вул. Ілліча 7,с. Опитне, Артемівський р-н, Донецька обл., 84571
315	Донецький інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук	С. Піски, Ясинуватський р-н, Донецька обл., 86053
317	Донецький ботанічний сад Національної академії наук України	83053, Донецьк-59, пр-т. Ілліча, 110
318	Інститут хмелярства Української академії аграрних наук	Вул. Київська, 191, м. Житомир, 10000
319	Поліська дослідна станція ім. О. М. Засухіна Інституту картоплярства Української академії аграрних наук	П/в Пересувне 2, Малинський р-н, Житомирська обл., 11605
320	Інститут сільського господарства Полісся Української академії аграрних наук	Вул. Київське шосе, 131, Житомир-7, 10007
323	Закарпатський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук	Пр.Свободи,17, С. Велика Бакта, Берегівський р-н, Закарпатська обл., 295520
324	Ужгородський національний університет	Вул. Підгірна 46, м. Ужгород, Закрпатська обл., 88000
325	Інститут зрошуваного садівництва ім. М.Ф.Сидоренка Української академії аграрних наук	Вул. Вакуленчука, 99, м. Мелітополь, Запорізька обл., 72311, тел.: 80619 431378, 80619 431320
328	Запорізький національний університет	Україна -69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66
329	Інститут олійних культур Української академії аграрних наук	70417, вул. Весняна, 1, с. Сонячне, Запорізький р-н, Запорізька обл.
330	Коломийська дослідна станція Івано-Франківського інституту агропромислового виробництва Української академії аграрних наук	С. Пядики, Коломийський р-н, Івано-Франківська обл., 78254
332	Івано - Франківський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук	Вул. Розумовського, 9а, м. Івано-Франківськ, 76028
333	Інститут молекулярної біології і генетики Національної академії наук	Вул. Заболотного, 150, Київ, 03143
334	Інститут цукрових буряків Української академії аграрних наук	Вул. Клінічна, 25, Київ, 03141
335	Білоцерківська дослідно-селекційна станція ім. О.К. Коломієць Інституту цукрових буряків Української академії аграрних наук	П/в Мала Вільшанка, 1, Білоцерківський р-н, Київська обл., 09175
336	Маслівський державний аграрний технікум	П/в Маслівка, Миронівський р-н, Київська обл., 08850
337	Київська дослідна станція Національного наукового центру "Інститут землеробства Української академії аграрних наук"	С. Литвинівка, Вишгородський р-н, Київська обл., 07334
339	Сквирська дослідна станція Інституту агроекології Української академії аграрних наук	09000, вул. Селекційна, 1, м. Сквира, Київська обл.
340	Синельниківська селекційно-дослідна станція Інституту зернового господарства Української академії аграрних наук	52523, вул. Бугаєнка, 3, п/в Раївка, Синельниківський р-н, Дніпропетровська обл.
341	Миронівський інститут пшениці ім. В.М. Ремесла Української академії аграрних наук	П/в Центральне, Миронівський р-н, Київська обл, 08853
343	Київська дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук	П/в Борова, Фастівський р-н, Київська обл., 08520
344	Інститут садівництва Української академії аграрних наук	03027, м.Київ, вул. Садова 6 ,смт. Новосілки
345	Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук"	08162, вул. Машинобудівників 2-б, смт. Чабани, Києво-Святошинський р-н, Київська обл.
347	Інститут картоплярства Української академії аграрних наук	Вул. Чкалова, 22, смт. Немішаєво, Бородянський р-н, Київська обл.
348	Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук України	вул. Тімірязєвська, 1, Київ, 01014

Код	Назва	Адреса
349	Відкрите акціонерне товариство "Терезине"	П/в. Терезине, м. Біла Церква, Київська обл., 09133 тел. 6-55-12 факс 6-55-64
350	Національний аграрний університет	03041, вул. Героїв оборони, 15, м. Київ
355	Інститут фізіології рослин і генетики Національної академії наук України	вул. Васильківська, 31/17, Київ, 03022
356	Кіровоградський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук	27602, вул. Центральна 2, п/в Сазонівка, м. Кіровоград
357	Кримська дослідна станція овочівництва Інституту південного овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук	С. Укромне, Сімферопольський р-н, Автономна Республіка Крим, 97536 тел. +38-0652-310-918
358	Кримський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук	П/в Клепініно, Красногвардійський р-н, Автономна Республіка Крим, 97010
359	Кримська дослідна станція садівництва Інституту садівництва Української академії аграрних наук	97517, с. Маленьке, Сімферопольський р-н, Автономна Республіка Крим
360	Кримська дослідна станція тютюнництва інституту винограду і вина "Магарач" Української академії аграрних наук	С. Табачне, Бахчисарайський р-н, Автономна Республіка Крим, 98430
361	Південний філіал "Кримський агротехнологічний університет" НАУ	смт Аграрне, м. Сімферополь, Автономна Республіка Крим, 95492 тел. (0652) 26-37-52, 22-72-67 факс. (0652) 22-39-66
362	Кримська науково-дослідна станція лікарських рослин Консорціуму "Укрфітотерапія"	Вул. Верхня, 1, с. Лікарське, Сімферопольський р-н, Автономна Республіка Крим, 97557
363	Кримська помологічна станція Української академії аграрних наук	с. Вавилова, 1, м. Севастополь, Автономна Республіка Крим, 99000
364	Національний інститут винограду і вина "Магарач" Української академії аграрних наук	Вул. Кірова, 31, м. Ялта, Автономна Республіка Крим, 98600
365	Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук	Смт Нікіта, м.Ялта, Автономна Республіка Крим, 98648
366	Інститут ефіроолійних і лікарських рослин Української академії аграрних наук	вул. Київська, 150, м. Сімферополь, Автономна Республіка Крим, 95493 тел. (0652) 267-007, факс (0652) 267-039
367	Моргун Володимир Васильович	Вул. Стрітенська 17 кв. 6, м. Київ -25
368	Дрогобицький державний педагогічний інститут ім. І. Франка	Вул. Гоголя, 34, м. Дрогобич, Львівська обл., 293720
369	Львівський державний аграрний університет	М. Дубляни, Жовківський р-н, Львівська обл., 80381 тел. +38-0322-294-69-19, факс+38-0322-298-07-65
370	Передкарпатський філіал Інституту землеробства і тваринництва західного регіону Української академії аграрних наук	с. Лішня, Дрогобицький р-н, Львівська обл., 82127
371	Інститут землеробства і тваринництва західного регіону Української академії аграрних наук	81115, с. Оброшино, Пустомитівський р-н, Львівська обл.
372	Львівська дослідна станція садівництва Інституту садівництва Української академії аграрних наук	С. Неслухів, Кам'янсько-Бузький р-н, Львівська обл., 80455
375	Логвиненко Валентина Федорівна	Проспект Глушкова 32 кв. 116, м. Київ
376	Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича агрокорпорація "Степова"	Вул. Ходарєва 1а, с. Дерезувате, Синельніківський р-н, Дніпропетровська обл., 52523 тел./факс 0562- 399-125; 0562 - 399-111
378	Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук	65036, Овідіопольська дорога, 3, м. Одеса
379	Національний науковий центр "Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова" Української академії аграрних наук	65496, м. Одеса, вул. 40-річчя Перемоги, 27, смт. Таїрове
381	Одеський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук	Маякська дорога, 1, с. Хлібодарське, Біляївський р-н, Одеська обл., 67667 тел.+38-048-750-8020 факс. +38-048-750-80-00
385	Дослідна станція лікарських рослин Української академії аграрних наук	С. Березоточа, Лубенський р-н, Полтавська обл., 37535

Код	Назва	Адреса
386	Полтавська державна аграрна академія	Вул. Сковороди, 1/3, Полтава, 36003 тел. +38-0532-50-23-51; факс +38-0532-50-23-51
387	Полтавська державна сільськогосподарська дослідна станція	Вул. Шведська, 86, Полтава, 36029
388	Веселоподільська дослідно-селекційна станція Інституту цукрових буряків Української академії аграрних наук	38251, п/в Вереміївка, Семенівський р-н, Полтавська обл.
389	Устимівська дослідна станція рослинництва Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук	П/в Устимівка, Глобинський р-н, Полтавська обл., Україна, 39074
390	Сарненська дослідна станція Інституту гідротехніки і меліорації Української академії аграрних наук	М. Сарни, 1, Рівненська обл., 34501
391	Рівненська державна сільськогосподарська дослідна станція	С. Шубків, Рівненський р-н, Рівненська обл., 35325
392	Сумський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук	42343, вул. Паркова,3, с. Сад, Сумський р-н., Сумська обл.
393	Інститут луб'яних культур Української академії аграрних наук	Вул. Терещинків, 45, м. Глухів, Сумська обл., 41400 тел. +38-05444-2-21-35 факс. +38-05444-2-27-58
394	Іванівська дослідно-селекційна станція Інституту цукрових буряків Української академії аграрних наук	П/в Сонячне, Охтирський р-н, Сумська обл., 42768
395	Подільська дослідна станція Тернопільського інституту агропромислового виробництва Української академії аграрних наук	Вул. Незалежності, 19, м. Хоростків, Гусятинський р-н, Тернопільська обл., 48240 тел. +38-03557-511-47 факс. +38-03557-511-31
396	Українська дослідна станція тютюнництва	Вул. І. Франка, 26, Мельниця-Подільськ, Борщівський р-н., Тернопільська обл., 48751 тел./факс. +38-03541-41-5-45
399	Красноградська дослідна станція Інституту зернового господарства Української академії аграрних наук	м. Красноград, Харківська обл., 63308 тел./факс. +38-057-44-93-145
401	Інститут шовківництва Української академії аграрних наук	М. Мерефа, Харківська обл., 62472
402	Інститут овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук	62478, вул. Інститутська, 1, п/в Селекційний, Харківський р-н, Харківська обл.
403	Краснокутський науково- дослідний центр садівництва Інституту садівництва Української академії аграрних наук	вул.Тельмана, 10, смт. Краснокутськ, Харківська обл., 62000 тел.+38-05756-3-09-88
404	Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук	61060, Московський проспект, 142, м. Харків
405	Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва	62483, Харківська обл., Харківський р-н, п/в Комуніст-1, навчальне містечко ХНАУ, корпус 2, кімната 235
409	Херсонський державний аграрний університет	Вул. Рози Люксембург, 23, м. Херсон, 73006
410	Інститут південного овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук	Вул. Червоноармійська, 71, м. Гола Пристань, Херсонська обл., 75600 тел. 05539-2-63-12 факс (05539)-2-63-22
411	Інститут землеробства південного регіону Української академії аграрнаих наук	с. Наддніпрянське, м. Херсон, 73483
412	Інститут рису Української академії аграрних наук	75705, с. Антонівка, Скадовський р-н, Херсонська обл.
413	Степовий ім. В. М. Виноградова філіал Українського науково-дослідного інституту лісового господарства і агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького	Вул. Комунарів, 62/26, м. Цюрупинськ, Херсонська обл., 75100
414	Генічеська дослідна станція Інституту зернового господарства Української академії аграрних наук	С. Новоолексіївка, 3, Генічеський р-н, Херсонська обл., 75560 тел. +38-05534-255-83
416	Приватне підприємство "Наукова селекційно-насінницька фірма "Соєвий вік"	25006, м. Кіровоград, вул. Мурманська, 29 "Г"
417	Подільський державний аграрно-технічний університет	32316, вул. Шевченка 13, м. Кам'янець-Подільський, Хмельницька обл.
418	Хмельницька державна сільськогосподарська дослідна станція Української академії аграрних наук	31182, с. Самчики, Старокостянтинівський р-н, Хмельницька обл.
420	Товариство з обмеженою відповідальністю "Сади Тавриди"	Вул. Леніна 1а, с. Тінисте, Бахчисарайський р-н, АР Крим, 98452
422	Верхняцька дослідно-селекційна станція Інституту цукрових буряків Української академії аграрних наук	П/в Верхнячка, Христинівський р-н, Черкаська обл., 20022 тел. 04745 2-25-54

Код	Назва	Адреса
423	Науково-виробнича фірма "Геліо"	Вул.Карла Маркса,40,м. Вінниця,21034
424	Інститут помології ім. Л.П. Симиренка Української академії аграрних наук	С. Мліїв, Городищенський р-н, Черкаська обл., 19512
425	Уманський державний аграрний університет	вул.Інтернаціональна, 1, П/в Софіївка, м. Умань, Черкаська обл., 20305 тел.+38-04744-34-163; факс: +38-04744-333-65
427	Прилуцька дослідна станція Інституту ефіроолійних та лікарських рослин Української академії аграрних наук	Вул. Вавилова, 16, м. Прилуки, Чернігівська обл., 17500
428	Закрите акціонерне товариство Науково-виробниче обєднання "Чернігівеліткартопля"	Вул. Я. Лизогуба, 13, п/в Седнів, Чернігівський р-н, Чернігівська обл., 15522
429	Чернігівський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук	с. Прогрес, Козелецький р-н, Чернігівська обл., 17035
430	Носівська селекційна дослідна станція Чернігівського інституту агропромислового виробництва Української академії аграрних наук	вул. Миру, 1, с. Дослідне, Носівський р-н, Чернігівська обл., 17131
432	Буковинський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук	Вул. Кузнєцова, 21а, м. Чернівці, 58026 тел./факс. +38-037-22-59-03-88
433	Придністровська дослідна станція Інституту садівництва Української академії аграрних наук	вул.Яблунівська, 1, м. Чернівці, 58013 тел/факс +38-03722-43707
435	Кравченко Владислав Андрійович	Вул. Васильківська 11/11 кв. 50, м. Київ, 07032
437	Монсанто Інтернешнл Сьорл	Ру дес Вігнеронс 1А, 1110, Моргес, Швейцарія
447	Республіканське унітарне підприємство"Науково-практичний центр Націоенальної академії наук Білорусі по землеробству"	Вул. Тімірязєва, 1, м. Жодіно, Мінська обл., Білорусь, 222160
454	Республіканське унітарне підприємство "Могильовська обласна сільськогосподарська дослідна станція"	Вул. Паркова 14, п/в Дашковка, Могильовський р-н, Могильовська обл., Білорусь, 213108
457	Республіканське унітарне підприємство "Білоруський науково-дослідний інститут льону"	с. Устье, Оршанський р-н, Вітебська обл., Білорусь, 211003
461	Товариство з обмеженою відповідальністю "Сільськогосподарське підприємство "АНК"	Вул. Лайоша Гавро 9-є, кв. 304, м. Київ, 04211, 044-464-99-06; 044-464-99-12
462	Білявська Людмила Григорівна	Вул. Сковороди 1/3, гурт. 3, м. Полтава, 36003, тел. 8-050-948-17-57
463	Рахметов Джамал Бахлул огли	Смт. Глеваха, Васильківський р-н, Київська обл., 08630
465	РАГТ Генетик С.А.	Вул. Еміля Сінгля - сай місуевість Бурран п/с 3336, FR-12033, Розе Седекс 9
466	Гайдаш Василь Дмитрович	Вул. Матейки 33, м. Івано-Франківськ
468	Гуринович Степан Йосипович	Вул. Будівельників 10 кв. 21, м. Івано-Франківськ
469	Мазур Валерій Олександрович	76006, вул.Миколайчука 7 кв. 69, м. Івано-Франківськ
470	Москвич Степан Овсійович	Вул.Кравчука 9 кв. 11, м. Луцьк
471	Харук Ігор Дмитрович	Вул. Стуса 5 кв. 44, м. Івано-Франківськ
472	Товариство зобмеженою відповідальністю "Авіас 2000"	Аеропорт б 42, м. Дніпропетровськ, 49042
477	Самородов Віктор Миколайович	Пров. Шевченка 5 кв. 24, м. Полтава, 36019
479	Поспєлов Сергій Вікторович	Вул. Зигіна 4 кв. 30, м. Полтава, 36014
484	Розен Тантау. Матиас Тантау Нахфольгер	Торнешер Вег 13, 25436, Уетерзен, тел.+ 49(0) 41-22-70-84
485	Кассад Семанс	3.І. Де Мо п/с 109 82303 Кассад Седекс
500	Селянсько фермерське господарство " Родень 10"	Сел. Помоклі, Переяслав - Хмельницкий р-н, Київська обл., тел. (04467) 55-678, 74 - 335, 74 - 267
504	Насіннєва компанія Лаєн Сідс Лімітед	СМ96СН Ессекс, Вудхем Мортімер
506	Товариство з обмеженою відповідальністю "Ярд"	Вул. Совхозна 23, м. Кримськ, 353384 тел. (86131) 511-59

Код	Назва	Адреса
511	Жемела Григорій Пимонович	Вул. Сковороди 1/3, м. Полтава, 36003
513	Шамшева Надія Михайлівна	
519	Осева ПРО с.р.о.а	Янковцова 18, 170 37 Прага
520	Луганський національний аграрний університет	М. Луганськ-8, 91008 тел. 0642-952246
530	Товариство з обмеженою відповідальністю "Міжнародна насіннєва компанія"	вул.Курчатова, 62 а, м. Рівне 33018
531	Гроетзнер Пфланцензухт ГмбХ	Каналплатц 6, 21079 Гамбург
538	Ситнік Ігор Данилович	Вул. Генерала Родимцева 3а кв. 45, м. Київ, 03041
539	Приватне науково-виробниче підприємство "Насіння"	вул.Інтернаціональна 4/6, м.Умань, Черкаська обл., 20300
541	Товариство з обмеженою відповідальністю "Агрофірма "СеДеК "	вул. Орджонікідзе 10, м. Москва, 117071
557	Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю "Поділля-Плант"	вул.Наукова, б 1, к.23, с.Медвеже Вушко, Вінницький р-н, Вінницька обл. 23226
558	Панам Франція САРЛ	Домеін де КАРЛЕС Рю де Віллєбрюмер 31340 Віллємур сур Тарн
568	Приватне підприємство "Насіннєва фірма "Софія"	вул. Героїв оборони 10, офіс 17 м.Київ 03680
569	Товариство з обмеженою відповідальністю "Сільськогосподарське підприємство "Деметра"	вул.Бориспільська, 2а с.Щасливе, Бориспільський р-н, Київська обл., 08325 (044) 568-10-12, ф. 568-12-06
583	Науково-дослідне аграрне підприємство "Мак України" у формі ТОВ	вул. Сім"ї Хохлових м.Київ,
596	Потопальський Анатолій Іванович	м.Київ, вул. Голосіївська, 4 кв 37 03039
597	Юркевич Лариса Назарівна	м.Київ, вул.Теремківська, 15 кв 18, 03187
598	Грамінекс-Насіона Сп.з о.о	вул.Каролiновська, 72 97-300 Пiотрков Трiб. +004844 647 66 43
599	Поморсько Мазовецка Годівля Земляка Сполка з.о.о.	76-024 Сєдзіба в Стрезекесіне 76-024 Свєшино Повят Кошалінський Воєводство Західньопоморське
600	Євро Грас Брідінг ГмбХ і Ко. КГ	вул. Вайсенбургер, 5 59557 Ліпштадт
601	Плант Рісерч Інтернешнл Б.В.	вул. Друвендаалсестег, б 6, (6708 ПБ) м.Вагенінген
603	Динник Анатолій Васильович	вул.Машинобудівників 2а, кв.24 смт.Чабани, Києво-Святошинський р-н, Київська обл.
606	Придністровський науково-дослідний інститут сільського господарства	Вул. Миру, 50, м. Тирасполь, Молдова, 3300
607	Молдавський науково-дослідний інститут плодівництва	Вул. Фруктова, 14, м. Кишинів, Молдова, 277019
614	Науково-дослідний інститут виноградарства і виноробства Молдови	Вул. Фруктова, 14, м. Кишинів, Молдова, 277019
619	Костюк Петро Григорович	вул.Івана Франка 62, кв. 41 м.Козятин, Вінницької обл.
620	Липкін Юхим Абрамович	вул.Сиволана, 40 кв. 10 м.Кроивий Ріг
621	Динник Олександр Васильович	вул.Машинобудівників 2а, кв.24 смт.Чабани, Києво-Святошинський р-н, Київська обл.
622	Кишинівський сільськогосподарський інститут ім. Фрунзе	Вул. Грибова, 44, м. Кишинів, Молдова, 277049
627	Кочубей Олександр Васильович	вул.Міщенка, 2, м.Полтава, 36011
629	Сокирко Петро Григорович	вул.Дослідна, 16, с.Степне, Полтавський р-н, Полтавська обл., 38744
634	Чекрізов Іван Олексійович	вул.Шведська 86, м.Полтава, 36029
635	Товариство з обмеженою відповідальністю "Селма"	03164 , м Київ, вул. Генерала Наумова, буд. 23-Б
637	Дочірнє підприємство "Українські газони"	вул.Садова, 26 с.Новосілки, Києво-Святошинський р-н, Київська обл., 03027 тел. (044)- 526-32-35; факс (044)-526-32-27
644	К.І.В. Консорціо Італіано Віваісті (ІТ)	Лок. Боаттоне Стат. Ромеа КМ 116, 44020, С. Джузеппе ді Комаччо (ФЕ), ІТАЛІЯ
645	Приватне підприємство "Лирис"	вул. Обручева, 2, кв. 1, с. Фурси, Білоцерківський район, Київська обл., 09150
646	Терра Нігра Холдінг Б.В.	Мійншеренвег 23 1433 АР Куделстаарт
647	Приватне підприємство "Агросвіт"	вул.Горького, 40, м.Нова Каховка, Херсонська обл., 74907 тел. +38-055-49-7-11-89 тел/факс+38-05549-7-81-00 E.mail: agrosvit@Kahovka.net

Код	Назва	Адреса
653	Товариство з обмеженою відповідальністю "АгроУкраїна"	вул.Комінтерну, б.3 кв. 25, м.Київ, Україна, 01032 тел./факс +38-044-528-22-87, 528-37-35
654	Агрофірма ім.Івана Франка	с.Івашківці, Шаргородський р-н, Вінницька обл., 76006, +38-03422-6-75-72
655	Товариство з обмеженою відповідальністю "Агрофірма Колос"	вул.Ватутіна, 18А, с.Пустоварівка, Сквирський р-н, Київська обл., 09051 тел. +38-04468-2-21-40; факс. +38-04468-5-12-36
658	Шевченко Ігор Андрійович	вул.Гвардійців Широнінців, 18-Г кв.43, м.Харків, 61120 тел.8-067-466-69-28
663	Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-дослідний інститут сої"	39000, тупик Автопарківський, 5, м. Глобине, Полтавська обл.
670	Майлнфілд Рісеч Сервісез Лтд	Інвергоурі Данді ДД2 5ДА, Шотландія
672	Меосіс Лімітед	Бредбурн Хаус Стебл Блок, Іст Моллінг, Кент МЕ19 6 ДЗ Англія
679	Товариство з обмеженою відповідальністю "Насіннева Приватна Компанія"	Проспект Науки, 37, м.Київ 03028 тел. +38-044-522-40-33
684	Сідс 2000	115 Н. 3 рд. Ст., Брекенрідж, Міннесота США
685	Кітчен Сід кампані Інк.	П.с. 286, 1149 Н.Вайн Ст. Артур, Іллінойс, 61911
686	Сіннер Брос & Бреснахан	П.О. 549, Каселтон, 58012, НД США
687	Експериментальна станція Мінесоти	277 Кофі холл, 1420 Еклес Авеню, Сн.Полл Міннесота 55108 США
690	Просід Інк.	705 Е Брюстер, Харві Північна Дакота, 58341, США
691	Сейбр ТОВ	П.С. 386 Вілмарб Міннесота 56201 США
696	Південний біотехнологічний центр у рослинництві Української академії аграрних наук та Міністерства освіти і науки України	65036 м.Одеса, Овідіопольська дорога, 3
699	Товариство з обмеженою відповідальністю "Агрофірма-Елітсортнасіння"	вул.Кіквідзе, 30 А, м.Київ, 01103
703	Товариство з обмеженою відповідальністю "Селекційно-насіннєва фірма "Манул"	Ярославское шосе, д. 116, м.Митищи, Московська обл,
707	Продукція і Годовля Рослин Огроднічих Кшешовіце Сп. з о.о.	32-065 - Кшешовіце
711	Товариство з обмеженою відповідальністю "Дослідна аграрна компанія "Агромак"	07400, Київська обл., м.Бровари, тел. +38-044-207-47-48, факс +38-044-207-47-47
712	"Спуйня" Селекція і насінництво городніх рослин с.п. з о.о. у Нохові	Вул. Ліпова, 12, 63-100, Шрем, Польща
713	Адванта Інтернешнл Б.В., (СЕС - Європа Н.В./С.А.)	Industriepark 15, 3300 Tienen, Belgium
719	Адванта Інтернешнл Б.В. (Ван дер Хаве, Голландія, та Зенека, Бельгія)	П.я. Бокс 1, 4420 АА Капелла , Дійквелсестраат 70
720	Сільськогосподарський дослідний інститут Угорської академії наук, Мартонвашар	Н - 2462, Мартонвашар, Р.О.В., Угорщина
721	Сатімекс Кведлінбург	Німеччина, 06484, м. Кведлінбург, вул. Гросс Орден, 19
724	ДЛФ - Тріфоліум А/С	9,Ny Qstergade DK 4000,Roskilde Denmark, Postbox 59
725	Товариство з обмеженою відповідальністю "Селекційно-насінницька агрофірма"Ільінічна"	129278, Росія, м.Москва, вул.П.Корчагіна, 2 тел/факс (495) 582-87-13
736	ТОВ "Всеукраїнський науковий інститут селекції (ВНІС)"	вул. Ломоносова 30/2, кв. 36, Київ, Україна, 03022
738	Ейч Зет Пі Сі Холланд Б.В.	П.О.бокс, 9801, Б.Д. Леуварден, Голландія
740	Інносід Б.В.	П.О.Вокс 10000, 5250 ГА Віймен, Голандія
741	Агріко Кооператив Б.А.	П.О. Б. 70 8300 АБ Емелорд, Нідерланди
743	СесВандерхаве Н.Б./С.А.	Індустріпарк, 15 В-3300, м.Тінен, Бельгія
744	СВС Холланд Б.В.	П.О.Б. 22, 1600 АА Енахуизен, Голандія
749	Хайленд Сидс Томпсонс ЛТД	2 Хайленд Драйв Бленхейм, Онтаріо, Канада, Н0Р1А0
751	Бейо Заден Б.В.	П.О.Бокс 50, Трамбан 1, 1749 ЗХ Варменхьюзен, Голандія.
753	Нюнемс Б.В.	П.О.Бокс 4005, 6080 АА, Хелен, Голандія. Пр.
758	Жемойда Віталій Леонідович	Пров. Сільськогосподарський, 1, кв.29, Київ, Україна, 03041
759	Хмарський Микола Іванович	Вул. Академіка Заболотного, 112, кв. 10, Київ, Україна, 03187
760	Калінчук Олег Іванович	Вул. Калініна, 57, кв. 174, м. Черкаси, Україна, 18000

Код	Назва	Адреса
765	ТОВ агрофірма " Нібас"	Вул. Польова 100-А,смт Петропавлівка, Дніпропетрівська обл., Україна, 52700
766	Декалб Дженетікс Корпорейшн	3100 Сікаморе Роуд Декалб, Іллініоіс 60115, USA. Пр.: бульвар Лепсе,4, " Сільвер Центр", Київ, 03067
767	Піонер Семена Холдінг ГезмбХ	Індустрігеланде, Піонерштрасе, А - 7111, Парндорф, Австрія.
770	МТІ Маїс Технолоджіс Інтернейшнл ГмбХ	Ludwig Boltzmann Strabe 2, 7100 Neusiedl am See (office@maizetec.com)
772	Лекс Воорн Розенвеределинк Б.В.	П.Я 94, 1430 АВ Аальсмеер Нідерланди
773	Олій Інновейшн БВ	Ахтервег 73, 1424 РР Де Квакел
786	Мей Сід Компані Лтд. (Мей Тохумсулук Зіраат ве Тісарет Лтд. Шті)	Саманлі Махаллесі Їгітлер Кадддесі, №28 Їлдрім, 16280, Бурса, Туреччина
788	Даніско Сід ГмбХ	Бреуншвайгер Штр., 22 б, Д - 38154, Кенігілютер ам Ельм, Німеччина
789	Харріс Моран Сідс Компані	Модесто СА, 95352, США, поштова скринька 4938
793	Лімагрейн Вернеуль Холдінг	Ферме де Лєтан БП3 77390 Вернуль Лєтан Франція
796	С.А. Флоримонд Депре	Б.П. 41. Капель, Темплев, Франція, 59242
797	Товариство з обмеженою відповідальністю "Селекційно-насіннева фірма "Партенокарпік"	б. 35, оф. 9, м. Московський, Ленінський р-н, Московська обл., Росія, 142784
798	Колодій Юрій Антонович	С. Хиночи, Володимирецький р-н, Рівненська обл., 34313
800	Пітер Богдан Чикалюк	20 Вілдвуд Лейн, Скарбороу, Мейн, США
806	Євраліс Семанс	Авеню Гастон Фоєбюс, 64231 Лескар Седекс, Франція.
807	Дойче Заатфеределунг Ліпштадт-Бремен ГмбХ	Вайсенбургер штр. 5, 59557 Ліпштадт, Німеччина. Пр.: фірма " Голландське насіння Ltd", а/с 249, вул. Луначарського, 1А, кв 12, Київ, 02002
808	Інститут оздоровлення і відродження народів України	Музей НАП України, смт. Пирогів, Київ, 03026
809	Земундо Б.В.	Поштова скринька 2.9970, АА Ульрум
812	В. фон Боріс-Екендорф ГмбХ енд Ко	Більфельдер штрасе 233, 33818 Леопольдсхохе, Німеччина
824	Лохов-Петкус ГмбХ	Поштфах 1197, 29296 Берген, Болерзенер Вег 5, Д-29303 Берген, Німеччина
826	Пархоменко Анатолій Костянтинович	Вул. Родімцева 11, кв. 156, Київ, Україна, 03041
829	Фр.Штрубе Заатцухт КГ Золлінген	Поштфах 1363, 38358 Шонінген, Німеччина. Пр.: с. Хоцки, Переяслав-Хмельницький р-н, Київська обл., 08473
840	Енза Заден Де Енхуйзер Заадхандел Б.В.	Халінг 1Е, 1602 ДБ, Енхуйзен, Нідерланди
841	ТОВ "Земун Поле плюс"	смт Чабани, Києво- Святошинський р-н, Київська обл., 08162
845	Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю ім. Богдана Хмельницького	м.Івано-Франківськ, вул. Миколайчука, 7/69, тел. +38-03422-6-75-72
860	Центр овочівництва	11420, Смедеревська Паланка, ул.Караджорджевича, 71 Сербія
861	Такіі Європа Б.В.	Хофдвег 19, 1424 ПС Де Квакел, Нідерланди
869	Вінницький державний аграрний університет	Вул. Сонячна, 3, м. Вінниця, Україна, 21008
872	Селект Бучани	Словаччина 91928, Бучані, Словенско
873	Інститут тваринництва степових районів ім. М.Ф. Іванова "Асканія - Нова", Української академії аграрних наук	Смт Асканія - Нова, Чаплинський р-н, Херсонська область, Україна, 75230
875	ТОВ Науково-виробнича фірма "Еліта"	вул. Октябрська. 14 с. Металіст, Слов'яносербський район, . Луганська обл., Україна, 937333
877	Приватна агрофірма "Західна насіннєва компанія"	Львівська обл, м.Броди, вул.Лесі Українки. 55 тел. +38-03266-4-40-11 факс. +38-03266-4-31-37
879	Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад	М. Горкого 30, 21000 Нові Сад, Югославія
880	Селген, а.с.	Янковцова 18, 170 37 Прага 7, Чеська Республіка

Код	Назва	Адреса
882	ПІТ СХРЬОРС ХОЛДІНГ БВ (NL)	Hoofdweg 81,1424 PD De Kwakel,The Netherlands (NL)Тел.: + 31297383444, Факс: + 31 297 342700, E- mail: fleurs@schreurs. Nl
884	Кутновска Годовла Бурака Цукрового Сп. з о.о.	Вул. Чопіна 25, 99-300 Кутно, Польща
886	Науково-дослідний центр "Магроселект"	Вул. Косеуцелор, 35, м. Сорока, Молдова, 3001 тел/факс (+373 230) 3-08-02)
887	Нікерсон- Цваан Б.В.	A/c 1, 4410 AA, Рілланд, Голландія (Schanseind 27, 4921PM MADE P.O. Box 28, 4920 AA Made The Netherlands, tel: +31162-690-900, +31 162-680-970) info@nickerson
888	Приватне мале підприємство " Тирас"	Вул. Живова, 32, м. Тернопіль, Україна 46008, тел./факс +38-0352-23-50-22
892	Науково- виробнича агрофірма " Гібрид"	с. Калинівка, Броварський р-н, Київська обл.
893	Товариство з обмеженою відповідальністю " Агрофірма Гавриш"	103287, Москва, вул 2-а Хуторська, 11, стр.1. Росія
898	Некомерційне партнерство "Науково-дослідний інститут овочівництва закритого грунту"	127287, м.Москва, 2-га Хутірська, буд. 11, с. 1
900	Клоз Тезьє	3.1. Ля Моте, авеню Луіс Саліант П.С.-83., 26802 , Порт Лес Валанс, Франція. Пр.: Іванов Г.А., 02140, м. Київ, а/с - 16.
901	Комбісід	Вул. Буйше-Шілінській, 50,21, Х - 1054, Будапешт, Угорщина
906	Одеський державний університет імені І.І.Мечнікова	Вул. Петра Великого, 2, м. Одеса, Україна, 270000, тел. 23 52 54
909	Науково-виробнича асоціація "Кримський міжнародний інститут нетрадиційного рослинництва, екології та здоров'я"	Вул. Київська, буд. 67/2, кв. 3, м. Сімферополь-17, АР Крим, Україна, 95017
912	Норддойче Пфланценцухт Ганс-Георг Лембке КГ	24363, Хохенліті, Хользес, Німеччина
914	Піксід Канада Інк.	п/с.304, Грінфілд Роад 1, Ліндсей, Онтаріо, K9V4S3
917	Державне підприємство "Проектно-конструкторський технологічний інститут "Плодмашпроект"	Вул. Київська/пт. Перемоги, 75/1, м. Сімферополь, Автономна Республіка Крим, Україна, 95017
919	Сумський національний аграрний університет	Вул. Кірова, 160, м. Суми, Україна, 40021
920	Приватне підприємство " Сорт"	08853, П/в Центральне, Миронівкий р-н, Київська обл., Україна
922	Закрите акціонерне товариство " Селена"	65036, Овідіопольська дорога, 3, м. Одеса, Україна
924	Маісадур Семанс	BP27 route de Saint Sever 40001 Mont de Marsan Cedex FRANCE
926	Заатен-Уніон ГмбХ	Ейзенштрасе 12, 30916 Ізернхаген ХБ, Німеччина /Eisenstrabe 12 D 30916 Isernhagen
927	Золана Аграр-Продукте ГмбХ унд Ко. КГ	Кілортале 9, Д - 20144 Гамбург, Німеччина
934	Лімагрейн Адванта Ніделенд Б.В.	п/с 139, 8200 АС Лелистуд, Нідерланди, тел.: +31/113-55-7100; факс: +31/113-55-2237, e-mail: Titus-de.Vries@limagrain.com
936	Інститут кукурудзи "Земун Полє"	с. Баїка 1, 11080 Бєлграде, Югославія
937	Зернова дослідна неприбуткова компанія	шегед, ПФ. 391, 6701, Угорщина
938	КВС ЗААТ АГ	Грімзельштрассе 31, 37555 Айнбек, Німеччина.
939	Маєр Б.В.	Stationsweg 18a 4416 PJ Kruiningen The Netherlands
941	ІнтерПродукт Сістемс Лтд.	Айві Хаус 81 Хай Шт., Монтроуз, Тайсайд, Велика Британия (Шотландія). Пр.: вул. Івана Марьяненка 11/12, кім.1, Київ, 01021
943	Г.А.Е. - Групеман Агріколь Ессонуа	91720 Мес сюр Ессон, Франція
946	Осева Ексімпо Прага с.р.о.	Бженец 1436, 69681 Бзенек, ICO: 639 86175, Чеська Республіка
947	Сейєт Плантефоредлінг І/С	Норемаркевей 67, Сейєт ДК - 8700 Хорсенс, Данія
950	Інститут агроекології та біотехнології Української академії аграрних наук	Вул. Метрологічна, 12, Київ, Україна, 03143
952	Мале підприємство "Нива 1"	вул.Сковороди, 1/3, м. Полтава, Україна, 36003 тел. +38-0532-50-23-51; факс. +38-0532-50-23-51
954	Приватна виробнича фірма " Агроцентр"	Вул. Мільмана,110,м. Дніпропетровськ, Україна, 49049

Код	Назва	Адреса
955	Агро-Тіп	Ам Тобербух 7, Д - 21255, Тоштедт, Німеччина
957	Костюченко Віктор Іванович	Будинок 42, кв 10,с.Дослідне, Дніпропетровський р-н, Дніпропетровська обл., Україна, 52071
962	Науково- виробниче фермерське господарство "Компанія "Маїс"	52502, вул. Гагарина 21, с. Веселе, Синельниківський р-н, Дніпропетровська обл., Україна
963	Державний вищий навчальний заклад "Державний агроекологічний університет"	10008, Старий бульвар 7, м. Житомир
964	Приватне підприємство науково- дослідна селекційна станція " Наско"	вул.Горького, 40, м.Нова Каховка, Херсонська обл., 74907 тел. +38-055-49-7-11-89, тел/факс+38-05549-7-81-00 E.mail: agrosvit@Kahovka.net
966	Товариство з обмеженою відповідальністю науково- виробнича комерційна фірма "Селекта"	49051, м. Дніпропетровськ, вул. Б. Хмельницького, 4/04
969	Моравосід спол. с р.о.	69201 Мікулов-Муслов, Чеська Республіка
971	Фельдзаатен Фройденбергер ГмбХ унд Ко.КГ	47800 Крефельд-Бокум, Магдебург шрт., 2, Гевегбегебіт Бокум-Норд, Німеччина
974	Приватне сільськогосподарське підприємство " Аграрне"	С.Логвин, Володарський р-н, Київська обл., Україна, 09321
984	Дослідна станція "Маяк" Інституту овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук	Вул. Незалежності 39, с. Крути, Ніжинський р-н, Чернігівська обл., Україна, 16645
986	Боярська лісова дослідна станція Національного аграрного університету	Вул. Лісодослідна, 12, Київська обл,. м. Боярка, Україна, 08150
987	Український науково-дослідний інститут гірського лісівництва імені Пастернака	Вул. Грушевського, 31, м. Івано-Франківськ, Україна, 76800
988	Товариство з обмеженою відповідальністю "Лідер Сад"	72382, Запорізька обл., Мелітопільський р-он, с. Садове, вул. Горохова, 8
991	Малополска Годовля Рослин - ХБП - Сполка з о.о.	30-002 Краков, вул. Збозова, 4, Польща
993	БЦ Інститут селекції і рослинництва	пл.Маруличев 5/1, 10 000 Загреб, Хорватія
995	С. Мейер б.в.	Stationsweg 18a, P. O. Box 1, 4416 ZG Kruiningen, The Netherlands. Пр.: ВАТ " Крафт Фудз Україна",вул.Набережна 28а, м. Тростянець, Сумська обл.
998	Кішкун Дослідний Центр	Кішкунхалас Х - 6400, Фузеспустца, 42, Угорщина
999	Компанія (Товаріство з обмеженою відповідальністю) " Агрозовнішнаука"	Вул. Суворова 9, м. Київ, Україна, 01010
1000	Семена АГ Базель	Бірзіг штр. 4, 4054 Базель, Швейцарія
1001	Товариство з обмеженою відповідальністю " Соя - Сєвєр Ко"	Староборисівський тракт 34, Мінськ, Білорусь, 220141 тел. +375 17- 264-23-34 факс +375 17-263-58-27
1006	Заатцухт Фритц Ланге КГ	Постфах 1352, Д - 23602 Бад Швартау, Німеччина
1010	Заявник не зареєстрований	Не визначено
1011	Норіка Нордрінг-Картофельцухт-унд Фермерунгс-ГмбХ	Парквег 4, Д - 18190 Грос Люзевіц, Німеччина
1012	Товариство з обмеженою відповідальністю фермерське господарство "Владам"	Вул. В. Морська, 107, м. Миколаїв, Україна, 327001
1013	Поп Врієнд Сідз Б.В.	П.О.Бокс 52 16193 Г Андійк, Голандія
1019	Єфімов Олександр Павлович	Вул. Дімітрова 3, кв. 8, м. Севастополь, Україна, 99002
1024	НВО "Еліта" Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук	Пр. Московский, 42, м. Харків, Україна, 61060
1025	Інститут захисту рослин Української академії аграрних наук	Вул. Васильківська, 33, Київ, Україна, 01033
1027	Вітвіцький Михайло Антонович	Вул. Машинобудівників, 7/19, смт. Чабаны, Киево-Святошинский р-н, Киевская обл., Україна, 08162
1028	Товариство з обмеженою відповідальністю "Расава"	проспект Глушкова, 30, кв 175, м. Київ, 03187
1029	Ботанічний сад Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна	Пл. Свободи 4, м. Харків, Україна, 61077
1031	Сидорчук Валерій Іванович	Вул. Вокзальна, 3, кв. 57, м. Біла Церква, Київська обл., Україна тел.6-16-26
1032	Беттасід, Інк.	1788 Маршал Роуд, Шейкопі, МН 55379, США
1039	Приватна фірма "Зернова компанія "Слав'янське поле"	Україна, м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 56.
1040	Науково-виробниче підприємство "Агродніпро "	С. Дослідне, б.42, кв. 69, м. Дніпропетровськ, Україна, 52071

Код	Назва	Адреса
1041	ЗАТ "Агрофірма Насіння"	Вул. Гоголя, 1, с. Абазівка, Полтавський р-н, Полтавська область, Україна, 38715
1042	ТОВ "Селекційна станція " ТСГА ім. М.М. Тимофієва	Вул. Пасична, 5, м. Москва, Росія, 127550
1043	Державне підприємство "Россортнасіннєовоч"	Дєгтярний пров., 6, м. Москва, Росія, 103050
1044	Агрофірма "Наско"	Вул. Володимирська 91, Київ, Україна, 03150
1046	Єврoплант Пфланценцухт Гмбх	Wulf-Werum Str. 1; D-21303 Lueneburg (Germany), www.europlant.biz
1048	Секобра Речерчес	Центр де Буа Енді - 78580 МОЛЬ, Франція
1050	Сингента Сідз Б. В.	Вештайнде 62/Постбус 2, НЛ - 1600 АА Енкхаізен, Голландія. Пр.: вул., Предславінська, 19, Київ, 03150
1051	Акціонерне товариство "Українська соя"	Вул. Жуковського, 20, м. Одеса, Україна, 65036
1054	Науково - дослідний виробничий агрокомбінат "Пуща - Водиця"	Вул. Полкова 57, м. Київ, 04078 тел. +38-044-462-95-50 факс +38-044-434-86-66
1059	Луганський інститут селекції і технологій у формі товариства з обмеженою відповідальністю	91490, м. Луганськ, с. Тепличне, вул. Степова, 11
1067	Державне підприємство дослідне господарство "Новокаховське" Нікітського ботанічного саду Української академії аграрних наук - Національного наукового центру	Вул.Садова 1, с. Плодове, м. Нова Каховка, Україна, 74992
1068	Товариство з обмеженою відповідальністю, Науково-впроваджувальна фірма "Ампелос"	Вул. Мухіна, 24, м. Ялта, Автономна Республіка Крим, 334203
1069	Ковальчук Ольга Марковна	С. Укромне, Сімферопольський р-н, Автономна Республіка Крим, Україна, 97536
1070	Мале науково-виробниче підприємство "Корн"	С. Ольгино, Горностаєвський р-н, Херсонська область, Україна, 74621
1071	Підприємство городнього насінництва і розсади, "ЦНОС"	60-951 Познань, вул Копаніна 28/32, Польща.
1072	Краковська Ходовля і Насінництво Огородніче "Полан" Сп. з о.о.	30-130 Краков, вул. Ридля 53/55, Польща. Пр.: ТзОВ "Свитязь", вул. Городоцька, 174, м. Львів, 79022
1073	Н.Л. Крестензен Ерфуртер Замен унд Пфланценцухт ГмбХ	Markstrasse 38, 99084 Erfurt, Germany, Пр. : Пахаренко і Партнери, вул. Пушкінська, 9, к.11, Київ, 252034
1074	Карпатська лісова науково-дослідна станція	Вул. Духновича, 105, м. Мукачево, Україна, 89600
1079	Сінгента Сідз С.А.С.	12, шемен де л"Обі Б.П. 27, 31790 Сен Совер, Франція.
1080	Науково-виробниче товариство з обмеженою відповідальністю "Елітсортнасіння"	Артема 11, Київ, 04053, Україна
1081	Підприємство городнього насінництва і розсади Ожарув Мазовецькі (ПНОС)	Вул. Жеромського 3, 05-850 Ожарув Мазовецькі, Польща.
1082	Закрите акціонерне товариство "Ворскла"	Вул. Б.Хмельницького, 37, м. Тростянець, Сумська обл., Україна, 42600
1083	Товариство з обмеженою відповідальністю "Технаука"	Вул. Степова 11а, с. Тепличне, м. Луганськ, Україна, 94490 тел/факс. +38-0642-91-04-61
1084	ПлантіКо Годовля і Насєнництво Огородніче Големб'єв Сполка з о.о.	99-300 Кутно, Польща
1086	Сингента Сідс АБ	Зокербруксваген 1, БОКС 302, С-261 23, Ландакрона, Швеция.
1087	ВАТ "Крафт Фудз Україна"	Вул. Набережна 28А, м.Тростянець, Сумська обл., Україна, 42460
1091	Сидорчук Валерій іванович	Кв. 57, 3, вул. Вокзальна, м. Біла Церква, Україна, 09100
1092	Синьогуб Сергій Васильович	09100 м.Біла Церква, Київська обл., вул.Леваневського, 47/1, кв. 124, тел.7-62-28
1093	Товариство з обмеженою відповідальністю "Незалежна аграрна індустрія"	Вул. Шушенська, 65, м. Запоріжжя-89, Україна, 69089 тел./факс +38-0612-578-381
1096	Бурлов В.В.,Карпенко О.О.,Краевський А.М.,Крутько В.И.	Вул. Леніна, 51/27, с. Металіст, Слов"яносербський р-н, Луганська обл., Україна, 349020
1097	Бурденюк-Тарасевич Лариса Антонівна	П/в Мала Вільшанка-1, Білоцерківський р-н, Київська обл., Україна, 09175
1100	Спільне підприємство "Виробниче об"єднання "Агро-Пром-Сервіс "	Вул. Велика Бердичівська , 52/19, м. Житомир, Україна, 10008 тел./факс +38-0412-25-18-37
1102	Рійк Цваан Велвер ГмбХ	Верлер штрасе, 1, Д - 59514, Вельвер, Німеччина
1103	Мейянд Ентернасьйональ С.А.	Domaine de Saint-Andre, Le Cannet Des Maures, 83340 Le Luc En Provence - France, Пр. :Пахаренко і Партнери, вул. Пушкінська, 9, к. 11, Київ, 252034

Код	Назва	Адреса
1104	Ходовля Рослин Нізнаніце Сп. з о.о.	42-270 Кломніце, воєв. Сласкє, Польща
1106	Товариство з обмеженою відповідальністю "Рапсодія"	Немирівське шосе, 26, м. Вінниця, Україна., 23200
1108	Науково-виробниче сільськогосподарське підприємство "Фітон - МВ"	Вул. С. Бандери, 62, м. Івано-Франківськ, Україна, 76014
1109	Черкаський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук	Вул. Онопрієнка, 10, м. Черкаси, Україна, 18034
1110	Акціонерна компанія "Контакт"	Пров. Слюсарний, 1, м. Харків , Україна, 61003
1111	Науково-виробниче товариство з обмеженою відповідальністю "Насіння Донбасу"	с. Піски, Ясинуватський р-н, Донецька обл., Україна, 86053, (06236) 4-87-30, 4-87-29
1112	Науково-виробниче товариство з обмеженою відповідальністю "Агро-Інтер"	03680, вул. Героїв Оборони 10 , Київ
1114	Агропромислова фірма "Флора" у формі товариства з обмеженою відповідальністю	65045, вул. Спиридонівська, буд. 26, кв. 3, м. Одеса
1115	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аграрний науково-дослідний інститут "АНДІ"	Вул. С. Бандери, 62, м. Івано-Франківськ, Україна, 76014
1116	"Науково -виробнича фірма Сінтез - Агро" у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю	Вул. Академіка Вільямса 81/3, кв70, м. Одеса, Україна, 65104
1117	Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче мале підприємство "Антарія"	Вул. Машинобудівників, 2-б, а/с 67, стм. Чабани, Києво-Святошинський р-н, Київська обл., Україна, 08162
1119	Приватне підприємство Агрофірма "Сортцветовощ"	Вул. Кооперативна, 22, Харків, Укоаїна, 61003
1120	Приватне підприємство "Віткос"	Вул. Машинобудівників, 2/19, смт Чабани, Києво-Святошинський р-н, Київська обл., Україна, 08162
1121	Товариство з обмеженою відповідальністю "Насіння Луганщини"	С. Металіст, Славяносербський р-н, Луганська обл., Україна, 93733 тел. +38-0642-59-66-40 факс. +38-0642-59-66-40
1123	Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробнича фірма "Дріада, Лтд"	Вул. Рози Люксембург, 23, Херсон, Україна, 73006
1124	Приватне сільськогосподарське селекційно-дослідне підприємтво "БОР"	Вул. Затишна, 17, с. Дачне, Біляївський р-н, Одеська обл., Україна, 67624
1127	ТОВ МакКейн Фудз Україна	Вул. Госпітальна, 12, Київ, 252023, Пр.: вул. Фролівська, 3/34, Київ, Україна, 04070
1129	Клиша Андрій Іванович	М. Красноград, Харківська обл., Україна, 63308
1141	Товариство з обмеженою відповідальністю агрофірма "Сади України"	Вул. Акад. Проскури 1, м. Харків 61070, Україна
1147	ВАТ "Кримсортнасіннєовоч"	Вул. Кубанська, 17, м. Сімферополь , 95022, Жиліну Сергію Яковичу
1149	Заатцухт Йозеф Бройн Гдбр	Амсельвеч 1-Д 91074 Герцогенаурах
1151	Гута Іван Миколайович	С Васильківці, Гусятинський р-н, Тернопільська обл., 48257
1153	"ГАЕ Решерш"	41 рю де рів'єр 91720 Месс
1155	ІНРА-Інстітут Насьйональ де ля Решерш Агрономик, с/о Агрі Обтансіон СА	Шемен де ля Петіт Мінієр- п/я 36, 78041 ГІЯНКУР Седекс, Франція
1157	Букша Олексій Юхимович	Вул. Низова 36, м. Прилуки,Чернігівської обл., 17500
1159	Науково - дослідна виробничо - комерційна фірма "Генезис"	Вул. Салютна 20 А кв. 26, м. Київ, 03190
1161	Плант Селект - товариство з обмеженою відповідальністю	Грубчице 111, 798 21 Будигошть
1163	Товариство з обмеженою відповідальністю" Свитязь"	Вул. Городоцька 174, м. Львів, 79022 тел. +38-032-240-99-70, факс.+38-032-240-39-94
1165	Відкрите акціонерне товариство "Запоріжсортнасіннєовоч"	Вул. Чумаченко 23, м. Запоріжжя,69104
1167	Науково-виробниче підприємство "Агродніпро-насіння"	Вул. Станційна 1, с. Сурсько-Литовське, Дніпропетровський р-н, Дніпропетровська обл., 52064 тел. +38-0562-35-02-18 факс. +38-0562-35-02-19
1169	Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково - виробнича фірма "Агротехнологія"	Вул. Межева 1,смт Кушугум, Запорізький р-н, Запорізька обл., 70450
1172	Селянське (фермерське господарство) "Тритікум"	смт Авангард, Овідіопольський р-н, Одеська обл.,67806

Код	Назва	Адреса
1174	Товариство з обмеженою відповідальністю агрофірма "Мир-Сем і Ко"	с. Мельники, Канівського р-н, Черкаської обл., 19043, тел. 04736 - 9-63-45
1178	Заклад Огороднічий Пшиборув Сп. з о.о.	Пшиборув 123, 39-217, Грабіни, Польща
1180	Закрите акціонерне товариство агропромислова корпорація "Зоря"	с.Зоря, Рівненський р-н, Рівненська обл., 35314 тел. +38-03626-330-70 факс. +38-0362-275-380
1182	Товариство з обмеженою відповідальністю "Верес"	вул. Петропавловська 15, м. Київ, 04086
1184	Закрите акціонерне товариство "Агроком"	Вул. Ленінградська 6, с. Сурсько-Литовське, Дніпропетровський р-н, Дніпропетровська обл., 52064
1192	Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича агрофірма "Землеробець"	с. Полігон, Жовтневий р-н, Миколаївська обл., 57217
1194	Р2н	Руе Еміле Сінгла - Сіте де Бурран, п/я 3336, ФР 122033 Родез Седекс 9, Франція
1197	Де Ройтер Сідз	П.Б. 1050, 2660 ВВ Бергменходк
1199	Науково-виробнича фірма "Фунгі" приватне підприємство	Овідіопольська дорога 3, м. Одеса, 65036
1203	Фермерське господарство "Теософ"	с. Рознощенське, Ульянівський р-н, Кіровоградська обл., 26422
1213	Рапс ГбР насінневе господарство	Лундсгард, 24977, Грундхоф

СКОРОЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Зона - Рекомендована зона вирощування

П	Полісся
Л	Лісостеп
С	Степ
Кр	Крим
ЗГр	захищений ґрунт
1....15	тимчасові виноградарські зони
гідроп	гідропоніка
К	Карпати
ЗГр(СТ)	захищений ґрунт (скляна теплиця)
ЗГр(ПТ)	захищений ґрунт (плівкова теплиця)

Характеристика 1 - Продуктивність

7-9	висока
5	середня
<5	нижче середньої

Характеристика 2 - Напрям використання

впв	весняного промислового використання
оз	озимий
ЗПВ	для зон промислової вигодівлі
уц	урожайно-цукристий
цукр	цукристий
++	технічного напрямку
спц	спеція
парф	парфумерна промисловість
пер	переробка
фарм	фармацевтична промисловість
зпл	запилювач
слн	сильний
дф	добрий філер
цін	цінний
ф	філер
зерн	зерновий
зк	зерно-кормовий
пв	пивоварний
зф	задовільний філер
х	харчовий
фж	фуражний
олн	олійний
конд	кондитерський
вол	високоолеїновий
тхн	технічний
лік	лікарський
стл	столовий
тхст	технічно-столовий
сал	салатний
конс	консервний
зс	для соління
ун	універсального призначення
свж	споживання у свіжому вигляді
сил	силосний
лп	луко-пасовищний
мед	медонос
ск	сінокісний
піщ	піщаний
закав	закавказький
зак	залуження схилів та еродованих земель
овоч	овочевий
зх	захисний
прм	промисловий
зріз	зріз
озл	озеленення
аром	ароматичний
склт	скелетний
нц	напівцукровий
корм	кормовий
він	віничний
дкр	декоративного оформления
лпв	для літнього промислового використання
сд	сидерат
зрош	на зрошуваних землях
хп	для харчової промисловості
всш	придатний для високоштамбової культури
г	гостра
нг	напівгостра
со	солодка
цу	цукристо-урожайний

Характеристика 3 - Група стиглості

дп	дуже пізній
др	дуже ранній
зим	зимовий
літ	літній
нр	надранньостиглий
осін	осінній
пс	пізньостиглий
рс	ранньостиглий
рсдн	ранньосередній
скс	скоростиглий
сп	середньопізній
ср	середньоранній
сс	середньостиглий

Характеристика 4 - Зимостійкість/Холодостійкість

7-9	висока
>5	вищесередньої
5	середня
<5	низька

Характеристика 5 - Стійкість до посухи

7-9	висока
5	середня
<5	низька

Характеристика 6 - Стійкість до полягання

7-9	висока
5	середня
<5	низька

Характеристика 7 - Стійкість до осипання

7-9	висока
5	середня
<5	низька

Характеристика 8 - Стійкість до хвороб

7-9	висока
5	середня
<5	низька

Характеристика 9 - Якість

вбіл	високобілковий
сбіл	середньобілковий
вкліт	висококлітковинний
скліт	середньоклітковинний
мал	малоалкалоїдний
сал	середньоалкалоїдний
вдек	високодекоративний
дек	декоративний
вщі	з високою щільністю покриття
сщі	з середньоющільністю покриття
влеж	високолежкий
слеж	середньолежкий
вц	високоцукристий
сц	середньоцукристий
вкр	висококрохмальний
скр	середньокрохмальний
вл	високоолійний
сл	середньоолійний
боп	безопійний
лік	лікарський
о	низькоеруковий
++	високоеруковий
о+	середньоеруковий
нгл	низькоглюкозинолатний
сгл	середньоглюкозинолатний
цін	цінний
ф	філер
зрош	на зрошуваних землях
слн	сильний
слн	сильний